A MAGYAR BIRODALOM ÁLLATVILÁGA.

A MAGYAR BIRODALOMBÓL EDDIG ISMERT ÁLLATOK RENDSZERES LAJSTROMA.

MAGYARORSZÁG EZERÉVES FENNÁLLÁSÁNAK EMLÉKÉRE

KIADTA

A K. M. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT.

FAUNA REGNI HUNGARIÆ.

ANIMALIUM HUNGARIÆ HUCUSQUE COGNITORUM ENUMERATIO SYSTEMATICA.

III. ARTHROPODA.

IN MEMORIAM REGNI HUNGARIÆ MILLE ABHINC ANNIS CONSTITUTI

EDIDIT

REGIA SOCIETAS SCIENTIARUM NATURALIUM HUNGARICA.

BUDAPEST.
1900.

Bolti ára 35 korona. — Társulati tagoknak 20 korona.



Fauna Regni Hungariae

Grund V utódai Budapest

A MAGYAR BIRODALOM ÁLLATVILÁGA.

A MAGYAR BIRODALOMBÓL EDDIG ISMERT ÁLLATOK RENDSZERES LAJSTROMA.

MAGYARORSZÁG EZERÉVES FENNÁLLÁSÁNAK EMLÉKÉRE

KIADTA

A K. M. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT.

FAUNA REGNI HUNGARIÆ.

ANIMALIUM HUNGARIÆ HUCUSQUE COGNITORUM ENUMERATIO SYSTEMATICA.

III. ARTHROPODA.

IN MEMORIAM REGNI HUNGARIÆ MILLE ABHINC ANNIS CONSTITUTI

EDIDIT

REGIA SOCIETAS SCIENTIARUM NATURALIUM HUNGARICA.

BUDAPEST.

1900.

Közel áll ugyan az egész munka befejezéséhez, mindamellett, számba véve a nagy érdeklődést, mellyel a szakemberek kivált az Arthropodák összeállitását várják, Társulatunk Választmányának f. é. április 25-ikén hozott határozata értelmében e kötetet külön is közrebocsátjuk.

Budapesten, 1900. jul. 14.

Paszlavszky József,
a k. m. Természettudományi Társulat
első titkára.

Exiguo quidem tempore opus totum perfectum iri videtur, tamen ratione habita eximiæ cupiditatis, qua viri doctrinæ de rerum natura dediti librum qui est de Arthropodis, exspectant: ex suffragio Commissionis Societatis Dirigentis 25-a aprilis anni currentis lato tomus hic separatim quoque in lucem editur.

Budapestini, 14-a Julii, a. 1900.

Josephus Paszlavszky,
protosecretarius Regiæ Societatis
Scientiarum Naturalium Hungaricæ.

III.

ARTHROPODA.

Classis. INSECTA.

Ordo. ORTHOPTERA.

Auctore Julio Pungur.

Az Egyenesszárnyúak rendjébe tartozó némely, Magyarországon előforduló rovarokról már a megelőző századok iróinál nem egy feljegyzést találunk, a mely feljegyzések nagyobbára ártalmas fajokra, főképen pedig a mezőgazdaságban nagy kárt okozó sáskákra vonatkoznak.

Krónikáinkban az 1084, 1241, 1242, 1340, 1380, 1475, 1536, 1542, 1549, 1589, 1685, 1691, 1693, 1747, 1748, 1780—1782, 1826, 1828 évek vannak feljegyezve, mint a melyekben gazdáinknak a sáskák nagy károkat okoztak. Ezekhez sorozhatjuk századunkból még az 1847. és 1875. évet; főként pedig 1888—90. éveket, a mely utóbbiakban más közönséges fajokon kivül a szerfelett nagy tömegben megjelenő *Stauronotus maroccanus* Thunb. garázdálkodott volt.

E rovarrend hazai fajainak rendszeres tanulmányozására azonban csak a jelen század elején kezdtek vállalkozni némely tudós férfiak, a kik buvárkodásaik eredményét gyüjteményekben állitották össze, vagy közleményekben juttatták napvilágra.

Koy Tobiás kir. kincstári kamarai felügyelőé volt az első gyüjtemény, a mely 1800-ban 23 fajt s ezek között 3 újat tartalmazott. A másodikat báró Ocskói Ocskay Ferencz Sopron városában hozogatá össze, s ebben a fajok száma, beleértve a báró felfedezte három újat is, 52-őt tett. A harmadikat, mely némely újjal együtt 75 fajból állott, Frivaldszky Imre gyüjté; a negyedik, a Frivaldszky Imre említett gyüjteményével együtt, Budapesten a Nemzeti Múzeumban őriztetik; ezt Frivaldszky János rendezte s nagyobbára gyüjtötte is; gyarapításához hozzájárult Mocsáry Sándor, dr. Horváth Géza, Pável János és Biró Lajos. Kolozsvártt az Erdélyi Múzeumban van az ötödik, melynek első alapját Herman Ottó vetette meg az 1868—70. években Erdélyben gyüjtött 93 fajjal, közöttök nehány újjal.

De quibusdam insectis ordinis Orthopterorum Hungariæ jam apud scriptores sæculorum antecedentium nonnullas invenimus mentiones, quæ plerumquæ de speciebus noxiis et præcipue de Acridiis quibusdam migrantibus et in œconomiam ruralem magna damna ferentibus tractant.

In chronicis nostris Anni 1084, 1241, 1242, 1340, 1380, 1475, 1536, 1542, 1549, 1589, 1685, 1691, 1693, 1747, 1748, 1780—1782, 1826, 1828 sunt adnotati, in quibus hæ bestiolæ maximas devastationes œconomicis afferebant; ad hos sunt adhuc numerandi, ex sæculo nostro, Anni 1847, 1875; et super omnia 1888—1890, quo, cum aliis speciebus, præsertim *Stauronotus maroccanus* Thunb. maximopere grassabatur.

In studio systematico insectorum indigenorum hujus Ordinis solum in ineunte sæculo nostro incipiebant navigare quidam viri docti, qui ex speciebus Orthopterorum collectiones instruebant et scrutata sua publicationibus manifestabant.

Primam collectionem Tobias Koy, Custos Aerarii Camerarii Reg. habebat, quæ in Anno 1800. species 28 vernaculas — inter eas tres novas — continebat. Alteram Franciscus Ocskay Liber Baro de Ocskeő in Oppido Sopron conferebat, in qua 52 species — inclusivis tribus novis a Barone ipso detectis, numerabantur. Tertiam, 75 species cum nonnullis novis continentem, Emericus Frivaldszky colligebat. Quarta, ordinata et plerumque auctaque a Johanne Frivaldszky, una cum collectione jam commemorata Emerici Frivaldszkyi, in Museo Nationali, Budapestini custoditur; ad hanc collectionem multa contulerunt inter alios: Al. Mocsáry, dr. G. Horváth, Joh. Pável et Ludov. Biró. Quinta in Museo Transylvanico, in urbe Kolozsvár habetur, cujus fundamentum primum Otto Herman cum speciebus 93, Annis 1868—70 in Transylvania captis, inter eas nonnullis novis, posuit.

Kisebb gyüjteményeket állitott össze Fuss Károly ev. lelkész (Nagy-Csür, Szebenmegye) és dr. Török József (Debreczen).

A mi a rendszeres irodalomra vonatkozik, Koy Tobiás-nak köszönjük az első közleményt *(Alphabet. Verzeichniss* etc. Anno 1800), melyben a már fennebb említett gyüjteményében levő 23 faj van felsorolva. 1825-ben adta közre de Charpentier Toussaint *Horae Entomologicae* czimü könyvét, melyben hazánkból 16 fajt ir le, de a melyekből azonban tényleg csak 15 hazai. Herrich Schäffer, 1835-ben közzétett könyvében *(Nomenclator Zoologicus)* Magyarországból hét fajt számlál elő, a melyből azonban egy nem lakik Magyarországon. Burmeister ugyancsak 1835-ben *(Handbuch der Entomologie)* tizenegy magyarországi fajt ir le. Serville 1839-ben *(Hist. Nat. des Orthoptères)* hét fajt tulajdonit faunánknak, melyből azonban egy nem oda tartozik. Fieber Xavér Ferenczné 1853-ban és 1854-ben («*Lotos*») 22 fajt találunk Magyarországból felsorolva, a melyek közül azonban kettőt hazánkban nem észleltek. Fischer L. H. 1853-ban *(Orthopt. Europaea.)* Magyarországból Erdélylyel együtt 36 fajt ismertet, melyek közül azonban csak harmincznégy Magyarországnak polgára.

Fuss Károly 1853. és 1854-ben *(Verhandl. Siebenb. Vereins)* kiadott két közleményben adta az Erdélyben gyüjtötte Egyenesszárnyúak jegyzékét; az itt felsorolt 40 fajból 2 teljességgel nem hazai.

Frivaldszky János volt az első, a ki magyar nyelven adta a magyarországi Egyenesszárnyúaknak rendszeres leirását *(A magyarországi Egyenesröpüek Magánrajza)* 1867-ben; abban az időben Magyarországon — bele nem értve Erdély és Horvát-Szlavonország területét és a Magyar Tengerpartot, mint a melyek közigazgatási tekintetben még nem voltak az anyaországgal egyesitve — összesen 117 faj és 7 fajváltozat volt kikutatva. Herman Ottó 1871-ben *(Erdély Bőr- és Egyenesröpüi — Die Dermapt. und Orthopt. Siebenb.)*, 93 erdélyi fajt — s ezek között a tudományra vagy legalább faunánkra nézve némely újakat mutat be; különösen említésre méltó a *Stenobothrus pullus* Phil. megtalálása, a mely faj Közép-Európában mármár veszendőbe indult volt.

Brunner v. Wattenwyl Károly, a ki már 1861-ben *(Disquisitiones)* és 1865-ben *(Nouveau Sistéme)* nehány magyarországi fajt sorolt volt fel, 1878-ban a Phaneropteridákról összeállitott jeles monografiájában 24 magyar faj között nehány ujat ismertet és a *Prodromus*-ban (1882)

Minores collectiones possidebant Carolus Fuss ev. Parochus in Nagy-Csür et Doct. Josephus Török in Debreczen.

Quod ad Litteraturam Systematicam pertinet: Tobiae Koy debemur primam publicationem *(Alphabet. Verzeichniss* etc Ao. 1800.), in qua 23 species, in collectione ejus supralaudata asservatæ, enumerantur. Anno 1825. emisit Toussaint de Charpentier librum cum inscriptione: «*Horae Entomologicae*», in quo ex Patria nostra 16 species describuntur, de quibus verumtamen tantum 15 indigenæ sunt. Herrich-Schäffer in libro suo *(Nomenclator Entomolog.)*, publicato in Ao. 1835, 7 species ex Hungaria enumerat, de quibus tamen una non habitat in Hungaria. Burmeister *(Handbuch der Entom.* Ao. 1835.) 11. species profert hungaricas. Serville (*Histoire Nat. des Orthoptères.* Ao. 1839.) 7 species commemorat ex Patria nostra, quarum unam false nostræ Faunæ contribuit. Apud Xav. Fr. Fieber, Annis 1853. et 1854. *(Lotos)* 22 species reperimus ex Hungaria enumeratas, de quibus tamen 2 nondum in Fauna nostra observabantur. — L. Henr. Fischer de Frieburg *(Orthopt. Europaea.* 1853.) ex Hungaria una cum Transylvania, 36 species producit, quarum 2 non Hungariam patriam suam profitentur.

Carolus Fuss Annis 1853 et 1854 *(Verhandl. Siebenb. Vereins)* in relationes supra species in Transylvania collectas suas, 40 species enumerat, de quibus tamen 2 confuse Faunæ nostræ contribuuntur.

Johannes Frivaldszky Anno 1867. primus dedit lingua vernacula systematicam descriptionem Orthopterorum Hungariæ *(Monographia Orthopterorum Hungariae)*; eo tempore in Hungaria, — exclusis territoriis Transylvaniæ, Croatiæ et Slavoniæ Littoribusque Maritimis Hungaricis, in ratione administrationis nondum unitis — 117 species inter eas nonnullæ novæ, et 7 varietates erant exploratæ. Otto Herman *(Erdély Bőr- és Egyenesröpüi. — Die Dermapt. und Orth. Siebenb.* Anno 1871) 93 species Transylvanicas producit, inter quas inveniuntur aliquæ partim novæ, partim in Fauna nostra ad id tempus nondum observatæ species; commemorationis dignum est, quod hac occasione *Stenobothrus pullus* Phil., quæ species jam prope erat inter formas obscuras cadere, reproducta est.

Dr. C. Brunner de Wattenwyl, qui jam Ao. 1861. *(Disquisitiones)* et 1865. *(Nouveau Système* etc.) nonnullas species Hungaricas enumeraverat, Anno 1878, in insigni *Monographia* sua de Phaneropteridis composita, inter 24 species Hungaricas nonnullas novas describit, et in «*Prodromo*» — Ao. 1882 — circa 158 species profert ex Fauna

körülbelöl 158 fajt tüntet fel faunánkból s köztük sok újat, melyeknek legnagyobb része a Locustidák családjába tartozik.

A magyar faunában ez idő szerint 173 faj van e rendből kikutatva.

Ezek közül hazánkra és a vele közvetetlenebb szomszédterületekre nézve a legjellemzőbbek a Phaneropteridák csoportjába tartozó némely fajok, főként pedig: *Poecilimon affinis* Fieb., *Schmidti* Fieb., *Brunneri* Fieb., *Fussi* Fieb., *elegans* Fieb., *thoracicus* Fieb., *intermedia* Fieb., *Barbitistes constrictus* Brunn., *Ocskayi* Charp., *Isophya modesta* Fieb., *costata* Br., *speciosa* Fieb.; *Leptophyes Bosci* Fieb., *discoidalis* Fieb. Az *Isophya brevipennis* Brunner eddigelé csak hazánkban észleltetett. Továbbá jellemzőbb alakjaink közé tartoznak: *Aphlebia maculata* Schreb. var. *Schäfferi* L., *Stenobothrus crassipes* Ocsk., *Pezotettix Schmidti* Burm., *Xiphidium hastatum* Charp., *Pachytrachelus gracilis* Brunn., *Thamnotrizon litoralis* Fieb., *transylvanicus* Fisch., *Frivaldszkyi* Herm., *Platycleis vittata* Charp., *montana* Koll., *Domogledi* Brunn.

A többi fajokat hazánk Európának különböző vidékeivel, vagy más világrészekkel közösen birja a következő megoszlással:

Európa északibb vidékein is előfordul: *Stenobothrus viridulus* L., *Gomphocerus rufus* L. és *maculatus* Thunb., *Meconema varium* Fab., *Thamnotrizon cinereus* L. és *Platycleis brachyptera* L.

Nyugot-Európával közösen birjuk: *Stenobothrus stigmaticus* Ramb., *miniatus* Charp., *Isophya pyrenaea* Serv. (= *Barbitistes camptoxipha* Fieb.), *Thamnotrizon apterus* Fab. és *Nemobius sylvestris* Fab. fajokat.

A délkeleti Európával közösek közül emlitendők: *Stenobothrus nigromaculatus* Herr.-Schäff., főként pedig az egymástól távolabb fekvő termőhelyeken elszigetelten előforduló érdekes fajok: *Onconotus Servillei* Fisch. de W., és *Dinarchus dasypus* Illig.

Az adriai medencze parti vidékeivel közösek: *Stenobothrus nigromaculatus* Herr.-Schäff. var. *Istriana* Krauss, *Cuculligera hystrix* Germ., *Pezotettix Salamandra* Fisch., *Poecilimon Fieberi* Ullrigh, *Barbitistes Yersini* Brunn., *Pachytrachelus striolatus* Fieb., *Thamnotrizon dalmaticus* Krauss, *Platycleis modesta* Fieb., *Ephippigera limbata* Fisch. et *sphacophila* Krauss, *Troglophilus neglectus* Krauss.

Dél-Európával vagy a földközi tengeri medenczének némely európai országaival osztozunk a következő fajokban: *Ectobia albicincta* Brunn., *Aphlebia marginata*

nostra et inter eas etiam plures novas, maxima parte ad Familiam Locustidarum pertinentes.

In Fauna Hungarica hucusque 173 species hujus ordinis Insectorum exploratæ sunt.

Ex his præsertim in tribum Phaneropteridarum pertinentes species sunt Regni nostri et regionum confinium meridionalium typici cives, ex. gr.: *Poecilimon affinis* Fieb., *Schmidti* Fieb., *Brunneri* Fieb., *intermedia* Fieb.; *elegans* Fieb., *thoracicus* Fieb.; *Barbitistes constrictus* Brunn., *Ocskayi* Charp.; *Isophya modesta* Fieb., *costata* Brunn., *speciosa* Fieb., Friv.; *Leptophyes Bosci* Fieb., Brunn., *discoidalis* Fieb. Species rara: *Isophya brevipennis* Brunn. hucusque tantum in Patria nostra observata est. Deinde inter nostros peculiares typos numerandæ sunt: *Aphlebia maculata* Schreb. var. *Schäfferi* L.; *Stenobothrus crassipes* Ocsk., *Pezotettix Schmidti* Burm.; *Xiphidium hastatum* Charp.; *Pachytrachelus gracilis* Brunn.; *Thamnotrizon litoralis* Fieb.; *transylvanicus* Fisch.; *Frivaldszkyi* Herm.; *Platycleis vittata* Charp.; *montana* Koll.; *Domogledi* Brunn.

Ceteræ species, patriæ nostræ et diversis regionibus Europæ vel aliis partibus Orbis Terrarum communes, tali modo se distribuunt.

In regionibus septentrionalibus Europæ observatæ sunt: *Stenobothrus viridulus* L., *Gomphocerus rufus* L. et *maculatus* Thunb.; *Meconema varium* Fab.; *Thamnotrizon cinereus* L. et *Platycleis brachyptera* L.

Et in Europa Occidentali occurrunt: *Stenobothrus stigmaticus* Ramb.; *miniatus* Charp.; *Isophya pyrenaea* Serv. (=*Barbitistes camptoxipha Fieb.*); *Thamnotrizon apterus* Fab. et *Nemobius sylvestris* Fab.

Ex speciebus et in Europa Meridionali-Orientali observatis, commemorationis dignæ sunt: *Stenobothrus nigromaculatus* Herr.-Schäffer, et super omnia, modo in singulis ac inter se remotis locis occurentes species insignes: *Onconotus Servillei* Fisch. de W. et *Dinarchus dasypus* Illig.

In regionibus litoralibus Adriaticis notatæ sunt: *Stenobothrus nigromaculatus* Herr.-Schäff. var. *Istriana* Krauss, *Cuculligera hystrix* Germ., *Pezotettix Salamandra* Fisch., *Poecilimon Fieberi* Ullrich, *Barbitistes Yersini* Brunn. *Pachytrachelus striolatus* Fieb., *Thamnotrizon dalmaticus* Krauss, *Platycleis modesta* Fieb., *Ephippigera limbata* Fisch. et *sphacophila* Krauss, *Troglophilus neglectus* Krauss.

In Europa Meridionali vel in quibusdam regionibus mediterraneis Europæ simul occurrunt: *Ectobia albicincta* Brunn., *Aphlebia marginata*

Aphlebia marginata Schreb., *Ameles decolor* Charp., *Stethophyma brevipenne* Brunn., *Leptophyes laticauda* Friv., *Meconema brevipenne* Yers., *Cyrtaspis scutata* Charp., *Anterastes Raymondi* Yers., *Thamnotrizon Chabrieri* Charp., *Platycleis sepium* Yers,, *Dolichopoda palpata* Sulz., *Mogisoplistus squamiger* Fisch., *brunneus* Serv. és az *Arachnocephalus vestitus* Costa.

Azoknak a fajoknak legnagyobb része, a melyek egész Európában, vagy Európának nagy részében el vannak terjedve, átcsap más világrészekre is.

A nálunk előjövő fajok közül élnek:

a) Afrikában is: *Bacillus Rossius* Fabr. *Stenobothrus pulvinatus* Fisch. de W., *Acrometopa macropoda* Burm., *Conocephalus mandibularis* Charp., *Thamnotrizon Dalmaticus* Krauss., *Platycleis tessellata* Charp., *Nemobius sylvestris* Fab., *Gryllomorphus Dalmatinus* Ocsk., *Mogisoplistus squamiger* Fisch, és *brunneus* Serv.

b) az Ázsiában is élő fajok száma körülbelől 58—60, melyekben majd minden család képviselve van, de nagyobb mértékben mégis a Locustidák és Acrididák családja.

c) Amerikából is jegyezve van a *Chelidura albipennis* Meg.

d) Ázsiának és Afrikának is lakóiként ismeretesek: *Ectobia livida* Fab., *Loboptera decipiens* Germ., *Mantis religiosa* L., *Tryxalis nasuta* L., *Stauronotus Maroccanus* Thunb., *Epacromia strepens* Latr. és *thalassina* Fab., *Acrotylus insubricus* Scop., *Oedipoda coerulescens* L., *Pachytylus danicus* (= *cinerascens* Fab.) még Uj-Zeelandban is; *Acridium Aegyptium* L., *Caloptenus italicus* L., *Platyphyma Giornae* Rossi, *Tettix depressus* Bris., *Locusta viridissima* L. *Platycleis grisea* Fab. (Teneriffa szigetén is), *Decticus albifrons* Fab., *Gryllus campestris* L., *Gryllotalpa vulgaris* Latr. és *Tridactylus variegatus* Latr.

e) Afrikában és Amerikában észleltettek: *Labia minor* L. és *Stenobothrus parallelus* Zett.

Némely fajok, részint a nagy kereskedelmi közlekedés utján a világnak majdnem minden részébe elszállitva, részint más okoknál fogva elterjedve, már világpolgárokká lettek, ilyenek: *Labidura riparia* Pall., *Forficula auricularia* L., *Phyllodromia germanica* L., *Periplaneta orientalis* L. és *americana* L., *Gryllus domesticus* L., *Tryxalis nasuta* L. (Ázsia, Afrika és Ausztrália), *Sphingonotus coerulans* L. (Afrika, Ázsia, Cuba).

És most nehány szóval meg kell még emlékeznünk arról is, hogy honi fajaink miképen oszlanak meg a földfelület magassági és minőségi viszonyai szerint is.

Schreb., *Ameles decolor* Charp., *Stethophyma brevipenne* Brunn., *Leptophyes laticauda* Friv., *Meconema brevipenne* Yers., *Cyrtaspis scutata* Charp., *Anterastes Raymondi* Yers., *Thamnotrizon Chabrieri* Charp., *Platycleis sepium* Yers., *Dolychopoda palpata* Sulz., *Mogisoplistus squamiger* Fisch., *brunneus* Serv. et *Arachnocephalus vestitus* Charp.

Maxima pars specierum in tota Europa, vel in maxima parte Europæ dispersarum propagatur simul in aliis Orbis Terrarum partibus.

Species apud nos viventes occurrunt:

a) in Africa: *Bacillus Rossius* Fabr., *Stenobothrus pulvinatus* Fisch. de W., *Acrometopa macropoda* Burm., *Conocephalus mandibularis* Charp., *Thamnotrizon dalmaticus* Krauss, *Platycleis tesselata* Charp., *Nemobius sylvestris* Fab., *Gryllomorphus dalmatinus* Ocsk., *Mogisoplistus squamiger* Fisch. és *brunneus* Serv.

b) Specierum earum nostrarum summa, quæ in Asia observatæ sunt, circa 58—60 variat, in qua fere omnes familiæ, præsertim quidem Locustidæ et Acrididæ repræsentantur.

c) In America observata est: *Chelidura albipennis* Meg.

d) Præter Europam, etiam in Asia et Africa habitant: *Ectobia livida* Fab., *Loboptera decipiens* Germ., *Mantis religiosa* L., *Tryxalis nasuta* L., *Stauronotus maroccanus* Thunb., *Epacromia thalassina* Fabr. et *strepens* Latr., *Acrotylus insubricus* Scop., *Oedipoda coerulescens* L., *Pachytylus danicus* L. (= *cinerascens* Fab.) [immo etiam Novæ Zeelandiæ!] *Acridium Aegyiptium* L., *Caloptenus italicus* L., *Platyphyma Giornae* Rossi, *Tettix depressus* Briss., *Locusta viridissima* L., *Platycleis grisea* Fab. (etiam in insula Teneriffa), *Decticus albifrons* Fab., *Gryllus campestris* L., *Gryllotalpa vulgaris* Latr. et *Tridactylus variegatus* Latr.

e) Species quæ etiam in Africa et America occurrunt: *Labia minor* L. et *Stenobothrus parallelus* Zett.

Aliquot species, partim immensa communicatione mercenaria fere in omnes partes Orbis Terrarum advectæ, partim aliis modis expansæ, jam cosmopolitæ factæ sunt, tales: *Labidura riparia* Pall., *Forficula auricularia* L., *Phyllodromia germanica* L., *Periplaneta orientalis* L., et *americana* L., *Gryllus domesticus* L., *Tryxalis nasuta* L. (Asia, Africa et Australia), *Sphingonotus coerulans* L. (Africa, Asia, Cuba).

Et nunc paucis verbis exhibendum est: quomodo in relatione altitudinis qualitatisque diver-

Legmagasabb hegyeink csak két fajt táplálnak; a közép vagy kisebb emelkedésű hegyeket és dombokat 96 faj lakja; 10 faj tenyészik a lapályokon. A többi faj el van terjedve mind a hegyes, mind lapályos területeken. 14 faj lakik többé-kevésbé nedves helyeken; 4 faj az emberi lakásokban éldegél, három faj üregekben és barlangokban vagy ezek közvetlen közelében tartózkodik.

Budapesten, 1899. jun. 18.

sorum territoriorum, species indegenæ distribuuntur. Montes altissimi tantum 2 species alunt; montes mediocre vel minus elevati et colla incolunt 96 species; 10 species vivunt in planitiebus; ceteræ species diffunduntur in territoriis montuosis et planis. 14 species in locis plus minus humidis habitant; 4 species in domiciliis hominum victitant; 3 species cavernas et antra incolunt vel taliorum locorum accolæ sunt.

Budapestini, 18. jun. 1899.

LITTERATURA.

1. Bálint Sándor. *Jelentés az 1888. év nyarán a Székelyföldön tett rovartani gyüjtő kirándulás eredményéről.* (Orvostermészettud. Értesitő XIV. Évf. 1889. Természettud. szak. pag. 266).
2. Baros Károly. *Péczel-maglódi sáskajárás.* (Gazdasági Lapok XL. Évf. 1888. pg. 322. 1. ábrával.)
3. Bartsch Eduard. *Sárosmegye helyirata.* Eperjes, 1846. pg. 30. *Orthoptera.*
4. Biró Lajos. *A Keleti Kárpátok vidékének jellemző Rovarfajai.* (A magyarországi Kárpátegyesület Évkönyve XI. köt. pg. 124—132.)
Die charakteristischen Insekten im Gebiete der Ost-Karpathen. (Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereins. XII. Jahrg. 1885. Igló. pg. 174—183.)
5. — *A lótetű védekezése az árviz ellen.* (Természettud. Közlöny. Budapest, XXIV. 1892. pg. 204—205.)
6. Brunner de Wattenwyl. *Disquisitiones Orthopterologicae.* (Verhandl. d. k. k. zoolog.-botan. Gesellsch. Wien. Tom. XI. 1861.)
7. — *Nouveau système des Blattaires.* Wienne. 1865.
8. — *Monographie der Phaneropteriden.* Wien. 1878.
9. — *Prodromus der Europäischen* Orthopteren. Leipzig. 1882.
10. — *Monographie der Stenopelmatiden und Grylacriden.* (Verhandl. der k. k. zoolog.-botan. Gesellsch. in Wien, Jahrg. 1888. pg. 247.)
11. — *Additamenta zur Monographie der Phaneropteriden.* (Verhandl. d. k. k. zoolog.-botan. Gesellsch. in Wien. Jahrg. 1891. pg. 1—196.)
12. Burmeister, Herm. *Handbuch der Entomologie* Bd. II. Berlin. 1839.
13. Charpentier, Toussaint de. *Horae Entomologicae.* Vratislaviae, 1825.
14. — *Orthoptera descripta et depicta.* Lipsiæ 1841—1845.
15. — *Letzte Insecten-Abbildung,* mitgetheilt v. Ocsky etc. Breslau u. Bonn. 1850. (Aus «Nova Acta, Acad. Leopold. Carol.» Vol. XXII. Præfatio).
16. Chyzer Kornél dr. *Érdekes szöcskefaj.* (Rovartani Lapok, Tom. I. 1884. pg. 172.)
Capture de Saga serrata à Sátoralja-Ujhely. (Ibid Revue pg. XXIII.)
17. — *Zemplén vármegye Orthopterái.* (Rovart. Lapok. Budapest. IV. 1897. pg. 99.)
18. Cserny Béla. *Gyulafehérvár környékének faunája.* (Alsófehérmegyei történelmi, régész. és term. tud. Egylet I. Évkönyve. Kolozsvárott. 1888. *Orthoptera:* pg. 92.)
19. Dezső Béla. *Apró állattani közlemények.* (Orvos-természettud. Értesitő. Kolozsvár. II. Évfolyam. 1877. pg. 27—29.)
20. — *A muszka és a sváb.* (Természet. IX. 1877. Budapest, pg. 330—334.)
21. Dezső Zsigmond. *Magasan repülő sáskák.* (Erdészeti Lapok. 1877. évf. Budapest. pg. 440—441.)
22. Dudinszky Ede. *A lótetű életéből.* (Természettud. Közlöny. XVII. 1886. Budapest. pg. 31—32.)
23. Emich Gusztáv. *A mező- és kertgazdaságra káros rovarok.* I. füzet. Budapest, 1884.
24. Entz Géza. *A vándor sáska.* (Természet, 1869. II. félévi folyam. Pest. pg. 85—88, 100—103.; — Néptanitók Lapja. II. Évf. 1869. 38. sz. pg. 602—605.)
25. — *A Saga serrata Kolozsvár környékén.* (Rovart. Lapok, I. köt. 1884. Budapest. pg. 251).
26. Fieber, Fr. Xav. *Entomologische Monographien* Prag, 1844.
27. — *Synopsis der Europäischen Orthopteren* («Lotos» III. Jahrg. 1853. Prag. Et in separata editione Anno 1854.)
28. — *Egänzungsblätter zur Synopsis der Europäischen Orthopteren.* (Lotos IV. V. Jahrg. 1854. 1855. Prag.)
29. Fischer, L. H. *Orthoptera Europaea Lipsiae.* 1853.
30. Földi János. *Természet historiája.* I. Csomó: *Állatok országa.* 1801. Pozsony.
31. Frivaldszky Imre. *Jellemző adatok Magyarország faunájához.* (Magy. Tudomány. Akadémia Évkönyvei. XI. köt. IV. darab. Pest. 1865. *Orthoptera:* pg. 129.)
32. Frivaldszky János. *A Magyarországi Egyenesröpüek Magánrajza.—Monographia Orthopterorum Hungariae.* Pest. 1867.
33. — *A Herkulesfürdő vidékén élő állatok.* — (Munk Manó: A Herkulesfürdő és környéke. Pest. 1872. pg. 85. et sequ.; *Orthoptera:* pg. 97.)
34. — *Állattani kirándulásaim Orsova, Mehádia és Korniareva vidékein.* (A magy. Orvosok és Természetvizsgálók XVI. (1872.) nagy gyülésének munkálatai. Budapest. 1873. pg. 197—243. *Orthoptera:* pg. 231—233.)
35. — *Adatok Mármaros vármegye Faunájához.* (M. Tud. Akadémia: Mathem. és Természettud. Közlemények. — Budapest, IX. köt. 1873. pg. 183—232; *Orthoptera:* pg. 230.)
36. — *Adatok Temes- és Krassómegyék Faunájához.* — *Data ad Faunam Hungariae Meridionalis comitatum Temes et Krassó.* — (Magy. Tudom. Akadémia: Mathemat. és Természettud. Közlemények. XIII. köt. — 1876 — Budapest, pg. 285—378; Orthoptera genuina: pg. 344—345.)
37. — *Budapest és környékének jellemző rovarfajai.* (Budapest és környéke természetrajzi, orvosi és közmivelődési leirása; szerkeszti dr. Gerlóczy Gyula és Dulácska Géza. Budapest. 1879. I. Rész: pg. 337—403. Orthoptera: pg. 340—341.)
38. Fuss, C. *Beitrag zur Orthopteren- u. Hemipterenfauna Siebenbürgens.* (Verhandlungen und Mittheil.

des siebenb. Vereins f. Naturwissensch. in Hermannstadt Jahrg. IV. 1853. pg. 40—42.)
39. — *Beitrag zur Insektenfauna Siebenbürgens.* (Ibid. Jahrg. VI. 1855.)
40. — *Zur näheren Kenntniss von Myrmecophila acervorum Panz.* (Ibid. Jahrg. XX. 1869. pg. 146.)
41. Gárdonyi Géza *Az őszi bogár (Oecanthus pellucens).* (A Természet II. Évf. No. VI. 1898. pg. 8—9.)
42. Germar, E. Fr. *Reise nach Dalmatien und in das Gebiet von Ragusa.* Leipzig und Altenburg. 1817.
43. Graber, Vit. *Faunistische Studien in der Syrmischen Bucht.* (Verhandl. Zoolog.-botan. Gesellsch. in Wien. Tom. XX. 1870. pg. 367—380.)
44. Grossinger, Joh. Bapt. *Universa Historia Physica Regni Hungariae.* Tom. IV. 1794. Posonii et Comaromii. pg. 118—126; 212—325.
45. Gyulai Kálmán. *Sáskáink.* (A hódmezővásárhelyi ev. ref. főgymn. Értesitője az 1888/89. évről.)
46. Herman Ottó. *Erdély Bőr- és Egyenesröpü.* — *Dermaptera et Orthoptera.* (Az Erdélyi Múzeum-Egylet Évkönyvei. Szerk. Brassai Sámuel. V. köt. (1868—1870.) Kolozsvár. 1871. pg. 105 et sequ. et pg. XIII.)
47. — *Die Dermapteren und Orthopteren Siebenbürgens.* (Verhandl. und. Mittheil. des Siebenbürg. Vereins für Naturwissenschaften. Jahrg. XXI. Hermannstadt 1871.)
48. — *Die Decticiden der Brunner von Wattenwyl'schen Sammlung.* (Verhandlungen der k. k. zoolog.-botan. Gesellsch. in Wien. Bd. XXIV. Hft. 3—4. Jahrg. 1874. pg. 191—210.)
49. — *A száskajárás 1875-ben.* (Természettud. Közlöny. VII. k. 1875. pg. 405—406.)
50. — *A rét zenevilágából.* (Ibid. Tom. VIII. 1876. pg. 297—311.)
51. — *Újabb vizsgálatok a tücsök hangszerve körül.* (Ibid. Tom. X. 1880. pg. 273—275.)
52. Herrich-Schäffer, G. A. W. *Faunae Insectorum Germaniae Initia.* Regensb. Fasc. 157. 1829—44.
53. — *Nomenclator entomologicus. Verzeichniss der Europäischen Insecten.* I. II. 1835—1840. Regensburg.
54. Horváth Antal. *A pirregő tücsök Baranyában.* (Rovart. Lapok. I. 1884. Budapest. pg. 60—61.)
55. Horváth Géza, dr. *Ueber die in v. Frivaldszky's «Monographia Orthopterorum Hungariae» beschriebenen neuen Arten.* (Berliner entomologische Zeitschrift. Jahrg. XIV. 1870. pg. 41—46.)
56. — *A fülbemászó.* (Természet. VI. Évf. 1874. pg. 251—253.)
57. — *Jelentés az 1883-ik évben Magyarország területén fellépett és megfigyelt kártékony rovarokról.* Budapest. 1884.
58. — *A pirregő tücsök fejlődési viszonyairól.* (M. tud. Akad. Mathem. természettud. Értesitő. II. köt. 1883. pg. 76 et sequ. — Rovart. Lapok. Tom. I. 1884. pg. 8. et sequ.)
Sur l'évolution de l'Oecanthus pellucens (Math. naturwiss. Berichte aus Ungarn. Bd. II. 1883—84. Budapest. pg. 170 et sequ. Rovart. Lapok. Tom. I. 1884. Supplément pg. II.)
59. — *A pirregő tücsökről.* (Természettud. Közlöny. Tom. XVI. 1884. pg. 29. et sequ.)
60. — *A magyar fauna legnagyobb rovarfaja.* (Rovart. Lapok. Tom. I. 1884. Budapest. pg. 126.)
61. — *A vándorsáska a magyar tengerparton.*
62. — *Orphania denticauda* Charp. (Természettud. Közlöny. Tom. XXII. 1890. Budapest. pg. 444. no. 75.)
63. Jurinac A. E. *Faunistični pabirci po okolini Krapinskoj.* (Glasnik hrvatskoga Naravoslovnoga Družtva. Godina I. pg. 145—153; Orthoptera: pg. 149—150.)
64. — *Turistično faunistični izlet na Ivančicu.* (Ibid. Godina II. 1887. pg. 17—20; Orthoptera: pg. 19.)
65. — *Prilog fauni zapadne Slavonije.* (Ibid. pg. 21—34; Orthoptera: pg. 24—26.)
66. Kardos Károly. *Mármarosmegye állatrajzi ismertetése.* (Szilágyi István: Marmaros vármegye egyetemes leirása. Budapest. 1876. pg. 211—235; Orthoptera: pg. 232.)
67. Karl János, dr. és dr. Horváth Géza. *Jelentés az Odontura denticauda* Charp. fajról, mint a mely Gyergyó-Ditró és Szárhegy községek határában pusztitólag lépett fel. (Természettud. Közlöny. Tom. IV. 1872. pg. 316—317.)
68. Kertész Miksa. *Nagy-Váradnak és vidékének állatvilága.* (Bunyitai Vincze: Nagy-Várad természetrajza. Budapest, 1890. pg. 137—244; Orthoptera: pg. 210—212.)
69. Kéry Imre, dr. *Honunk legkeletibb, Aradvármegyéhez tartozó hegyes vidékének leirása.* (Magy. Tud. Akad. Mathem. és Természettud. Értesitő. Pest. 1859.)
70. Kimakovicz, v., M. *Abdominalzange der Forficulidae.* (Verhandlungen u. Mitth. des Siebenbürgischen Vereines f. Naturwissenschaften in Hermannstadt. Bd. XLVI. Jahrg. 1896. pg. 103.)
71. Koy, Tobias. *Alphabetisches Verzeichniss meiner Insectensammlung.* Ofen. 1800.
72. Krauss, Herm. *Beiträge zur Orthopteren-Kunde.* (Verhandl. d. k. k. zoolog.-botan. Gesellschaft in Wien. Tom. XXXVI. pg. 137. et sequ.)
73. — *Beitrag zur Kenntniss der Alpinen-Orthopterenfauna.* (Wiener Entom. Zeitung. V. 1886. pg. 319. et sequ.)
74. Kunc Adolf. *Szombathely — Savaria — rendezett tanácsu város Monographiája.* Szombathely. 1880. pg. 24: Orthoptera.
75. Mátyus István, dr. *O és Uj Diaetetica* sat. Tom. III. Pozsony. 1787. pg. 258—286: A Száskákról: de Acridiis.
76. Margó Tivadar. *Budapest és környéke állattani tekintetben.* Budapest. 1879.
77. Méry Etel. *Győrmegye állatvilága.* (Fehér, Ipoly: Győrmegye és város egyetemes leirása. Budapest. 1874. pg. 133—137; Orthoptera: pg. 154.)
78. Mocsáry Sándor. *Adatok Biharmegye Faunájához.* (Magy. Tudom. Akadémia: Mathem. és természettud. Közlemények. Tom. X. 1872. Budapest. 1873. pg. 193. et sequ.
79. — *Bihar és Hajdu megyék Hártya-, Két-, Reczés-, Egyenes- és Félröpü.* (Magy. Tud. Akad. Mathem. és Természettud. Közlemények. Tom. XIV. 1876. Budapest, Orthoptera genuina: pg. 66—69.)
80. — *A rovarvilág zenészei.* (Fővárosi Lapok. XII. Évf. 1875. Budapest. pg. 1184—1185.)
81. — *A száskákról.* (Természettudományi Szemle. 1875. Évfolyam. 4. 5. sz. Nagy-Várad.)
82. — *A torontálmegyei száskáról.* (Természettudom. Közlöny. Tom. VII. 1875. Budapest. pg. 408—409.)
83. — *Adatok Zemplén és Ung megyék Faunájához.* (Magy. Tudom. Akadémia: Mathem. és Természettud. Közlemények. Tom. XIII. 1876. Budapest. Orthoptera: pg. 175—176.)
84. — *Adatok Zólyom és Liptó megyék Faunájához.* (Ibid. Tom. XV. 1878. Budapest. — Orthoptera genuina: pg. 260—261.)
85. — *Az idei száskajárásról.* (Természettud. Közlöny. Tom. XX. 1888. Budapest. pg. 318.)
86. Ocskay de Ocskó, baronius. *Gryllorum Hungariae indigenerorum species aliquot.* (Acta nova Academiæ Cæsareæ Leopoldino-Carolinæ Naturæ curiosorum. Tom. XIII. 1826. Pars I. pg. 407).
87. — *Orthoptera nova.* (Ibidem. Tom. XVI. 1833. Pars II. pg. 959.)
88. — *Fiume vidékén felfedezett uj száskafajról (Barbitistes Ocskayi).* (A magyar Orvosok és Természet-

vizsgálók VIII. (1847. Sopron) nagygyülésének munkálatai. Pest. 1863. pg. 332—333.)
89. Padewieth. *Bacillus Redtenbacheri.* (Glasnik hrvatskoga Narav. Družtva. Godina 1899.)
90. Petricskó Jenő. *Selmeczbánya vidéke állattani tekintetben.* Selmeczbánya. 1892. (Orthopt. pg. 39—40.)
91. Petrogalli Arthur. *Kirándulás a Szitnyára.* (Trencsénmegyei Természettud. Egylet Évkönyve. XI—XII. (1888—89) Évfolyam. Trencsén. 1890. pg. 132—146. Orthoptera: pg. 141.)
92. Pungur Gyula. *Adatok egy kevéssé ismert szöcskefaj természetrajzához.* (Magy. Tudom. Akadémiai Értesitő. Tom. IV. pg. 90—97. Budapest. 1886. — Rovartani Lapok. Tom. III. 1886. Budapest. pg. 45—55.)
Notes pour servir à l'histoire naturelle d'un Orthoptère peu connu. (Rovartani Lapok: Tom. III. Supplément. pg. XII—IX.)
Beiträge zur Naturgeschichte einer wenig bekannten Laubheuschreckenart. (Mathem. und naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn. Tom. IV. 1885/86. Budapest. pg. 70—85.)
93. — *A tücskök tartózkodása és lakása.* (Természettud. Közlöny. Tom. XXII. 1890. Budapest. pg. 628. et sequ.)
94. — *A magyarországi Tücsökfélék Természetrajza. Histoire naturelle des Gryllides de Hongrie.* Budapest. 1891.
95. *Adatok Szilágy vármegye Orthoptera-faunájához.* (Orvos-Természettudományi Értesitő. XVI. 1891. Évf. II. Természettud. szak. III. füzet. Kolozsvár. pg. 255 et s.)
96. — *Egy táltos, a melyik nem ájtatos.* (A Természet. I. Évf. XX. sz. (1898.) pg. 4—7.)
97. Roskoschnik J. *Nachricht von den nach Bontzida in Siebenbürgen gekommenen Zugheuschrecken,* ihrem Aufenthalte daselbst und ihrer Ausrottung etc. (Ungrisches Magazin. II. Bd. 4. Stück. Redig. von L. Windisch. Pressburg. 1782. pg. 389—399.)
98. *Rovartani állomás* (m. kir.). *Jelentés az 1884—1889 években felmerült gazdasági rovarkárokról.* (A m. k. állami Rovartani Állomás Közleményei. Tom. I. 1892. fasc. 8. Orthoptera: pg. 96—104. et 136.)
99. — *Utmutatás a marokkói sáska irtására cziprusi sövénynyel.* (M. k. áll. Rovart. Állomás Közleményei. Tom. I. fasc. 2. 1890. Budapest.)
100. — *Jelentés az 1886—1889. években felmerült Erdei Rovarkárokról.* (Ibidem. Tom. I. fasc. 5. Budapest. 1891. Orthoptera: pg. 42.)
101. — *Jelentés az 1890—1893. években felmerült Erdei Rovarkárokról.* (Ibidem. Tom. I. fasc. 12. Budapest. 1895. Orthoptera: pg. 91—83.)
102. — *Jelentés az 1890—1893. években felmerült Gazdasági Rovarkárokról.* (Ibidem. Tom. I. fasc. 11. Budapest. 1894. Orthoptera: 93—111.
103. Sajó Károly. *A marokkói sáska Magyarországon.* (Természettud. Közlöny. Tom. XXII. 1890. Budapest. pg. 223—256.)
104. — *A marokkói sáska — Stauronotus maroccanus Thunb. — Magyarországon az 1888, 1889. és 1890. években.* (A m. k. áll. Rovartani Állomás Közleményei. Tom. I. fasc. 4. Budapest. 1891.)
105. — *A péczel-maglódi sáskairtás.* (Természettud. Közlöny. Tom. XXI. 1889. Budapest. pg. 206. et sequ.)
106. Saussure, Henri, de. *Mélanges Orthoptérologiques:* Fasc. III. *Mantides.* 1870. Genève et Bâle.
107. — *Mélanges Orthoptérologiques:* Fasc.V. *Gryllides.* Genève. 1887.
108. Schmidt, Ferd. *Több ujonnan felfedezett barlangi rovarról.* (A magy. Orvosok és Természetvizsgálók VIII. (1847. Sopron) nagygyülésének munkálatai. Pest. 1863. pg. 233—235.)
109. Schuk József dr. *Hajdu megye állatvilágának rövid áttekintése.* (Varga Géza: Hajdumegye leirása. Debreczen. 1882. pg. 142 et sequ.; *Orthoptera:* pg. 160.)
110. Serville, Audinet. *Histoire naturelle des Insectes: Orthoptères.* Paris. 1839.
111. Szaniszló Albert. *Kolozsvár határának csapásai.* (Erdélyi Gazda. 1876. évfolyam. Kolozsvár. pg. 179.)
112. — *A Caloptenus italicus — olasz sáska — egy varietása.* (Orvos-Természettud. Értesitő. Kolozsvár. II. Természettud. szak. Tom. IV. pg. 295.)
113. Sziklay János dr. és dr. Borowszky Samu. *Magyarország vármegyéi és városai: Vasvármegye.* Budapest. 1898. *Orthoptera:* pg. 495. h.)
114. Tömösváry Ödön dr. *Délmagyarország állattani tekintetben.* (Dr. Breuer Ármin: Helyrajzi emlékmű a magyar Orvosok és Természetvizsgálók Buziás-Temesvárott megtartott XXIII. vándorgyülésére. Temesvár. 1886. pg. 124—165. Orthoptera: pg. 160.)
115. Vangel Jenő. *Vérnász egy szöcskefajnál.* (Rovartani Lapok. Tom. II. Budapest. 1885. pg. 18—19.)
116. Vellay Imre. *A marokkói sáska vedléséről.* (Rovartani Lapok. Tom. V. Budapest. 1898. pg. 193—197.)
117. — *A marokkói sáska vándorlása.* (Rovartani Lapok. Tom. V. Budapest. 1898. pg. 156—161.)

Publicationes auctorum anonymorum.

118. — *Gryllus migratorius Linn.* (Magyar Hirmondó Pozson. 1780. pg. 595.)
119. — *Sammlung merkwürdiger Nachrichten von Heuschrecken.* Frankfurt am Mayn. 1750.
120. — *A sáskákról.* (Hazánk s a Külföld. VII. Évf. 1871. Pest. pg. 179.)
121. — *A vándor sáska — Gryllus migratorius, Acridium migratorium.* (Természetbarát. III. félév. 1847. Kolozsvártt. pg. 928—932.)
122. — *A sáskák további pusztitása.* (Ibid. pg. 953.)

Ordo. ORTHOPTERA.

I. Subordo: DERMOPTERA.

Fam. FORFICULIDÆ.

Labidura Leach.

1. *riparia* Pall. (*Forficesila gigantea* Serv.) — I. Budapest, Debreczen, Kecskemét, Horgos (Com. Csongrád). II. Ad lacum Fertő. IV. Sátoralja-Ujhely, Tarczal, Szomotor. V. Zilah (Com. Szilágy), Kolozsvár, Vizakna, Székely-Keresztur. VIII. Fiume.

Anisolabis Fieb.

2. *maritima* Bon. — VIII. Fiume, Cirkvenica.

Labia Leach.

3. *minor* Lin. *(Forficesila min.)* — In toto regno communis.

Forficula Linné.

4. *auricularia* Lin. — Frequens.

Anechura Scudd.

5. *bipunctata* Fieb. *(Forficula biguttata* Fab.) — I. Budapest. II. Fel-Csuth. III. in comit. Gömör et Nyitra. IV. Mons Szitnya (com. Hont), Sátoralja-Ujhely, Tokaj, Tarczal. V. Somlyó-Csehi (com. Szilágy), Vizakna. VI. Orsova, Mehádia, Thermæ Hercules.

Chelidura Latr.

6. *albipennis* Meg. — I. Nagyvárad, Révfalu, Debreczen. IV. Sátoralja-Ujhely, Tokaj, Erdőbénye, Szinna. V. Zilah, Görcsön, Diósad, Mező-Záh, Nagy-Szeben. VII. Comit. Szerém.
7. *acantopygia* Géné. — I. Nagy-Várad. III. Mons Szitnya. IV. Comit. Máramaros. V. Zilah, Gurzófalva (Com. Szilágy), Kolozsvár, Nagyszeben. VII. Montes Vellebit. VIII. Beze (Com. Modrus—Fiume).

II. Subordo: ORTHOPTERA GENUINA.

Fam. BLATTIDÆ.

Ectobia Westw.
(*Blatta* Auct.)

1. *lapponica* L. — Communis.
2. *albicincta* Brunn. — VII. Gospić, Raduč, mons Vaganskivrh. VIII. Fiume, Draga, Buccari, Carlopago.
3. *livida* Fab. — Passim fere in toto regno.
   var. *brevipennis* Brunn. — VIII. Buccari.

Aphlebia Brunner.

4. *marginata* Schreb. — Prope Nagyvárad secundum Mocsáry (78). II. Secundum Ocskay (32. Friv). prope Sopron. VIII. Fiume.
5. *maculata* Schreb. — I. Budapest. II. Fel-Csuth. IV. S.-A.-Ujhely, Sárospatak, Málcza.
   var. *Schäfferi* L. — III. Mons Szitnya (Com. Hont), Szádellő (Com. Abauj-Torna). IV. Sáros-Patak. V. Passim occurrit. VI. Mons Domogled.
6. *punctata* Meg. — I. Budapest. IV. Sátoralja-Ujhely, Sáros-Patak. V. Passim in tota regione Transylvanica. VII. in Com. Szerém.
7. *brevipennis* Fisch. — VIII. Fiume, Zengg.

Phyllodromia Serville.

8. *germanica* Lin. — I. Budapest, Kis-Szent-Miklós. V. Kolozsvár. VI. Temesvár.

Periplaneta Burmeist.

9. *orientalis* L. — In urbibus majoribus frequens.
10. *americana* L. — I. Budapest. V. Kolozsvár. (Cum mercibus advecta; sed propagatio ejus nondum observata.)

Loboptera Brunn.

11. *decipiens* Germar. — VIII. Fiume.

Fam. MANTIDÆ.

Mantis Linné.

1. *religiosa* L. — Exceptis locis frigidioribus, occurrit in toto fere regno.

Ameles Burm.

2. *decolor* Charp. — VIII. Zengg.

Empusa Illig.

3. *fasciata* Brullé. — VIII. Zengg.

Fam. PHASMIDÆ.

Bacillus Latr.

1. *Rossius* Fabr. — VIII. Fiume, Zengg, Buccari, Cirkvenica.
2. *Redtenbacheri* Pad. — VIII. Zengg.

Fam. ACRIDIDÆ.

Tryxalis Fabr.

1. *nasuta* L. — In planitiebus et desertis regionum I, II, III, IV, VI, VII. — VIII. Fiume. In regione Transylvanica — IV. — nondum inventa.

Mecostethus Fieb.
(*Stetheophyma* Fisch.)

2. *grossus* L. — Passim in toto fere regno occurrit.

Parapleurus Fisch.

3. *alliaceus* Germ. (*typus* Fisch.) — IV. Sátoralja-Ujhely. V. Görcsön (comit. Szilágy). Nagy-Csür, Márpod (Com. Szeben). VI. Ulma.

Chrysochraon Fisch.

4. *dispar* Heyer. — In regionibus I, II, III, IV, V. frequens.
5. *brachypterus* Ocskay. — Frequens.

Stenobothrus Fisch.

6. *crassipes* Ocskay. — Passim fere in toto regno.
7. *lineatus* Panz. — Præsertim in territoriis montuosis frequens.
8. *nigromaculatus* Herr-Schäf. — In regionibus I, V, VI. et VII. frequens.
   var. *Istriana* Krauss. — VI. Mons Domogled.
9. *stigmaticus* Ramb. — Occurrit fere in toto regno.
10. *geniculatus* Eversm., Friv. (*nigrogeniculatus* Brunn.) I. Budapest, Debreczen. IV. Tálya. VI. Grebenacz. VIII. Fiume.
11. *miniatus* Charp. — V. Nagy-Csür (Com. Szeben), Mező-Záh, Torda. VI. Mehadia. VIII. Zengg.
12. *morio* Fabr. (*melanopterus* De Borck.) — III. Koritnicza, montes Zolyomienses. V. Mons Pilisketető (Com. Háromszék). VI. Krassova, montes Domogled et Kuka.
13. *apricarius* L. — I. Budapest. III. Pozsony. V. Balánbánya, montes Csofronka, Békás et Bucsin (Com. Csik), Kolozsvár.
14. *viridulus* L. — Occurrit passim in regionibus Carpathiensibus: III, IV, V, VI. et partim in I.
15. *rufipes* Zetterst. — Frequens.
16. *haemorrhoidalis* Charp. — In toto fere regno passim occurrit.
17. *petraeus* Bris. — I. Budapest, Puszta-Peszér. VII. Vinkovcze.
18. *pullus* Phil. — V. Balán, Verestó, mons Bucsin, ad lacum Szent-Anna, Gyimes (com. Csik), Passus Tömös; Passus Szurdok apud Petrozsény, montes Retyezát (com. Hunyad).
19. *vagans* Fieb. — II. Sopron. VI. Ó-Moldva. VII. Com. Szerém. VIII. Fiume.
20. *bicolor* Charp. — Communis.
21. *biguttulus* L. — Communis.
22. *pulvinatus* Fisch. de W. (*declivus* Bris.) — In regionibus I., V., VI., VII., VIII. frequens.
23. *elegans* Charp. — Occurrit in omnibus regionibus excepta VIII.
24. *dorsatus* Zetterst. — In toto fere regno passim occurrit.
25. *parallelus* Zetterst. — Communis.

Gomphocerus Thunb.

26. *rufus* L. — Communis.
27. *antennatus* Fieb. — I. Budapest, Puszta-Peszér, Vácz, Őrkény, Tatár-Szent-György, Kis-Szent-Miklós.
28. *maculatus* Thunb. (*Stenobothrus biguttatus* Charp.) — In regionis I., II., III., IV., V. et VII. passim occurrit.

Stauronotus Fisch.

29. *maroccanus* Thunb. — In annis 1888—90. in regionibus I. et II. maximopere grassabatur et in nonnullis locis magnas devastationes ferebat.
30. *brevicollis* Eversm. — (*cruciatus* Eversm.) — In regionibus I., II., VI. passim occurrit. III. Pozsony. VII. Comit. Szerém.

Stethophyma Fisch.
(*Arcyptera* Serv.)

31. *fuscum* Pall. (*Arcyptera variegata* Sulz.) — Passim occurrit fere in toto regno.
32. *flavicosta* Fisch. *(Arcyptera flavicosta.)* — I. Budapest. V. Kolozsvár, Torda, Mező-Záh, Mező-Szakáll, Szent-László. VI. Ulma. VIII. Fiume, montes Vellebit.
33. *brevipenne* Brunn. — VIII. Fiume, Buccari, Zengg.

Epacromia Fisch.

34. *strepens* Latr. — VIII. Cirkvenica.
35. *thalassina* Fab. — Frequens.

Sphingonotus Fieb.

36. *coerulans* L. — I. Budapest, Kis-Szent-Miklós, Puszta-Peszér, Nyir-Bátor; in locis sabulosis communis. IV. Szomotor. V. Paptelek, Görcsön, Kolozsvár, Zsadánypatak, Livazén etc. VI. Grebenácz, Ulma.

Acrotylus Fieb.

37. *insubricus* Scop. — I. Budapest, Kis-Szent-Miklós, Puszta-Peszér, Puszta-Dános etc. Debreczen. IV. Szomotor. VI. Grebenácz, Ulma. VII. Zimony, Vinkovce.

Oedipoda Latr.

38. *variabilis* Pall. — I. Budapest, Gödöllő, Maglód, Kis-Szent-Miklós. IV. Tolcsva, Szomotor, H.-Rokitó. V. Kolozsvár, Torda, Mező-Záh, Méhes, Nagy-Csűr, Szász-Újfalu. VI. Grebenácz.
39. *miniata* Pall. — I. Budapest, Kis-Szent-Miklós, Őrkény, Puszta-Peszér. VIII. Fiume, Zengg.
40. *coerulescens* L. — Communis.

Pachytylus Fieb.

41. *nigrofasciatus* de Geer. — I. Frequens. II. Ad lacum Fertő. VI. Grebenácz, Ulma. VII. Vinkovce, Zimony. VIII. Fiume, Zengg.
42. *migratorius* Lin. — I. Budapest, Nagyvárad, Debreczen, Fehértó apud Szeged. II. Fertő. VI. Kolozsvár, Nagy-Szeben. VI. Baziás. VII. Vinkovce.
43. *danicus* Linné [*cinerascens* Fab.] — I. Budapest, Debreczen. III. Parasznya. IV. Gebe, Nyir-Csaholy, Nyir-Medgyes.

Psophus Fieb.

44. *stridulus* L. *(Pachytylus strid.)* — Fere in toto regno, præsertim in regionibus montuosis frequens.

Cuculligera Fisch.

45. *hystrix* Germ. — VIII. Fiume.

(*Eremobia* Serville.)

(*muricata* Pall.) — Herrich-Schäffer (53. Nomenclat. Ent.) hanc speciem in Hungaria habitare censet, attamen hæc species non Hungariam sed regiones apud fluvium Wolga et urbem Sarepta, in Rossia, patriam suam profitetur.

Acridium Geoffr.

46. *tartaricum* auct. [= *Aegyptium* L.] — VII. Observatum est in comitatu Szerém. VIII. Fiume, Zengg, Novi, Carlopago.

Caloptenus Burm.

47. *italicus* L. — Communis.

Paracaloptenus Brunn.

48. *Brunneri* Stål. [= *Platyphyma caloptenoides* Brunn.] — I. Budapest. VI. Mehadia, mons Domogled, Orsova. VIII. Fiume, Cirkvenica.

Pezotettix Burm.
(*Podisma* Latr. Serv.)

49. *alpinus* Koll. — III., IV., V. et VI. in montibus altioribus
var. *collina* Brunner. — In territoriis montuosis Regionum II., III., IV., V., VI. frequens.
50. *Schmidti* Br. — In territoriis montuosis Regionum I., III., IV., VI. et præsertim V. frequens.
51. *pedestris* L. — Occurrit passim in Regionibus II., III., IV., V., VII. et VIII.
52. *mendax* Fisch. — In territoriis sylvosis et montuosis Regionum omnium frequens.
53. *Salamandra* Fisch. — VIII. Fiume.

Platyphyma Fisch.

54. *Giornae* Rossi. — In regionibus I., [A. Mocsáry primus detexit Ao 1872., prope Nagyvárad (78.)] II., VI., VII. et VIII. frequens.

Tettix Charp.

55. *bipunctatus* L. — Communis.
56. *Kraussi* Saulcy. — Passim occurrit in regionibus I., III., V., VI.
57. *subulatus* L. — Per totum regnum obvius.
58. *Türki* Krauss. — VI. Orsova.
59. *depressus* Bris. — VIII. Fiume, Zengg.

Fam. LOCUSTIDÆ.

Dinarchus Stål.

(*Callimenus* Burm.)

1. *dasypus* Illig. — I. Budapest in monte Svábhegy (specimen ♀ ultimum, anno 1866. mense Augusto inventum, in Mus. Nationali asservatur); Puszta-Peszér (duo specimina larvarum vidi Viennæ in coll. Brunneriana.)

(*Callimenus* Steph.)

[*Oniscus* Charp. (*Bradyporus Dasypus* Serv.), Secundum Serville (110. Hist. Nat.) occurrit et in Hungaria; attamen hæc species, in Rossia, meridionali et in peninsula Balcanica habitans, apud nos nondum erat observata.]

[*Oniscus* Charp., var. *brachynotus* Fieber secundum auctorem (27. Synopsis. Lotos III. pg. 206. n. 1. var. B.) et in Hungaria habitat; ast una cum stirpe tantum in Rossia meridionali et in partibus quibusdam peninsulæ Balcanicæ occurrit.]

Orphania Fischer.

2. *denticauda* Charp. — Fere in toto regno occurrit.

Poecilimon Fisch.

3. *affinis* Fieb., Friv. — V. Kolozsvár; Passus Szurduk (com. Hunyad). VI. Mons Domogled, Bázias. VII. Károlyváros.
4. *Fieberi* Ulrich, Fieb. — VIII. Fiume. Zengg.
5. *Schmidti* Fieb. — IV. Tokaj, Nagy-Bánya. V. Montes Meszes, Kolozsvár, Petrozsény, Ponor, Ohaba (com. Hunyad), Málnás (com. Háromszék). VI. Mehadia, mons Domogled.
6. *Brunneri* Friv. — Rarus. VI. Fehértemplom, Mehadia.
7. *Fussi* Fieb. — V. Zsákfalva (com. Szilágy), Mező-Záh, Mező-Szakál (com. Torda-Aranyos), Homoród (com. Udvarhely) Gyergyó-Szent-Miklós, Tusnád (com. Csik), Málnás, mons Pilisketető (com. Háromszék), Nagy-Csűr (com. Szeben), Ponor, Passus Szurduk (com. Hunyad).
8. *elegans* Fieb. — VIII. Fiume, Zengg.
9. *thoracicus* Fieb. — I. Montes Biharienses. VI. Mons Domogled, Orsova.
10. *intermedia* Fieb., Friv. — Rarus. Auctores (Fieber: Lotos III. pg. 176. No. 5; — Frivaldszky: Mon. pg. 94. No. 4. vide Litt. 27. et 32.) hujus speciei patriam Russiam Meridionalem et Hungariam nominant, tamen inventionis locum præcise non notant. IV. Sátoralja-Ujhely. [17. Chyzer. Rovart. L. IV. pg. 100.]

Barbitistes Charp.

11. *serricauda* Fab. — I. Budapest. II. Sopron. III. Pozsony et in comit. Trencsén et Liptó. IV. Montes Vihorlat. V. Montes Meszes (comit. Szilágy), mons Pilisketető (com. Háromszék), Balánbánya. VI. comit. Temes et Krassó-Szörény. VII. Comit. Szerém.
12. *constrictus* Brunn. — Rarus. VI. Mons Domogled.
13. *Yersini* Brunn. — VIII. Fiume, Carlopago.
14. *Ocskayi* Charp. — VI. Mehadia. VIII. Fiume, Carlopago, Buccari, Zengg.

Isophya Brunn.

15. *modesta* Fieb. — I. Budapest, Nagyvárad. IV. Nagy-Bánya. V. Szilágy-Nagyfalu, Görcsön, Zilah, Kolozsvár, Mező-Záh, Mező-Szakáll (com. Torda-Aranyos), Mons Mező-Havas (com. Maros-Torda), Udvarhely, Fiatfalva, mons Békás, Balánbánya (com. Csik), mons Domogled, Fehértemplom.
16. *costata* Brunn. — Rarus. I. Budapest, Svábhegy.
17. *speciosa* Fieb., Friv. — VI. Mehadia, Oravicza, Baziás.
18. *brevipennis* Brunn. — Rarus. VI. Comit. Máramaros. V. Zilah, montes Hargita.
19. *pyrenaea* Ramb. Serville. [= *camptoxypha* Fieb.] — Frequens in regionibus montuosis.

(*Odontura* Ramb.)

[*spinulicauda* Ramb. — Specimina a Carolo Fuss (39.) apud Nagy-Csűr (com. Szeben) capta, non ad hanc speciem, in Hispania et Portugallia habitantem, sed ad speciem *Poecilimon Fussi* Fieb. pertinent.]

Leptophyes Fieb.

20. *laticauda* — Friv. — V. Szamos-Ujvár. VI. Mehadia. VIII. Fiume.
21. *albovittata* Koll. — Communis.
22. *Bosci* Fieb., Brunn. — VI. Mehadia. VII. Com. Szerém, Gospić. VIII. Fiume, Cirkvenica.
23. *discoidalis* Fieb., Brunn. — V. Parajd, Nyárád-Szereda (com. Maros-Torda). VI. Mehádia, Orsova, mons Allion.

[*autumnalis* Charpentier. — Ab auctore (13.) non recte contribuitur patriæ nostræ.]

[*punctatissima* Bosc. — Specimina a Carolo Fuss (39.) apud Nagy-Csűr (com. Szeben) capta, in specie *Leptoph. albovittata* Koll. et non in hac specie, in Europa occidentali habitante, numeranda sunt].

Acrometopa Fieb.

24. *macropoda* Burm. — VIII. Fiume, Zengg, Buccari.

Phaneroptera Serv.

25. *falcata* Scop. — Exceptis territoriis frigidis et altissimus, frequens.
26. *quadripunctata* Brunn. — VIII. Fiume, Zengg, Cirkvenica.

Tylopsis Fieb.

27. *liliifolia* Fab. — VIII. Fiume, Buccari.

Meconema Serv.

28. *varium* Fab. — In regionibus I., II., III., IV., V, passim occurrit.
29. *brevipenne* Yers. — VIII. Fiume.

Cyrtaspis Fisch.

30. *scutata* Charp. — VIII. Fiume.

Xyphidium Serv.

31. *fuscum* Fab. — Communis.
32. *dorsale* Latr. — I. Budapest, Örkény, Puszta-Peszér. II. Fertő. III. Znio-Váralja, Szlován. IV. S.-A.-Ujhely, Homonna, Nagy-Bánya. In regione V. frequens. VI. Ulma, mons Domogled. VII. Zimony.
33. *hastatum* Charp. — Rarus. V. Mező-Záh. VI. Mehadia.

Conocephalus Thunb.

34. *tuberculata* Rossi [= *mandibularis* Charp]. — I. Puszta-Peszér, Vacs, Kis-Szent-Miklós, Rákos, Nagyvárad, Debreczen. IV. Szőllőske (Com. Zemplén). Nagy-Bánya, V. Nagyfalu (com. Szilágy), Szamos-Ujvár, Nagy-Csűr. VI. Ulma, Mehadia. VII. Zágráb. VIII. Fiume.

Locusta de Geer.

35. *viridissima* L. — Communis.
36. *caudata* Charp. — Frequens.
37. *cantans* Fuessly. — In regionibus montuosis III., IV., V. et VI. passim occurrit.

Onconotus Fisch. de W.

38. *Servillei* Fisch. de W. — Rarus. I. Alsó-Dabas, Örkény, Puszta-Peszér. II. Székes-Fehérvár.

Gampsocleis Fieb.

39. *glabra* Herbst. — I. Kis-Szent-Miklós; in prædiis Rákos et Peszér. V. Torda, Mező-Záh, Méhes. VI. Mehádia, Szabadka.

Rhacocleis Fieb.

40. *germanicus* Herr.-Schäff. [=*discrepans* Fieb.] I. Budapest, Puszta-Peszér. IV. Bártfa. VIII. Fiume.

Anterastes Brunn.

41. *Raymundi* Yersin. — VIII. Fiume, Draga, Buccari.

Pachytrachelus Fieb.

42. *striolatus* Fieb. — VIII. Fiume, Zengg.
43. *gracilis* Brunn. — Fere in toto regno occurrit, et præsertim in regione V. frequens est.

Thamnotrizon Fisch.

44. *Chabrieri* Charp. —VIII. Fiume, Zengg, Buccari.
45. *dalmaticus* Krauss. — VIII. Fiume, Zengg, Carlopago.
46. *litoralis* Fieb. — I. Montes Biharienses. IV. Mons Simonka. V. Hármaspatak, Mező-Záh, Mező-Szakáll, Gyergyó-Szent-Miklós, montes Hargita. VI. Mehadia, Thermæ Herculis.
47. *transylvanicus* Fisch. — In montibus Carpathicis, in regionibus I., IV., V. et VII. sitis frequens.
48. *Frivaldszkyi* Herman. —V. Kolozsvár, Gyergyó-Szent-Miklós.
49. *apterus* Fab. — II. Sopron. III. Pozsony, Znio-Váralja. IV. Mons Vihorlat. V. Lacus «Verestó» ad passum Almamező. VI. Mehadia.
var. *Mikói* Herman. — Rarus. V. Balán.
50. *fallax* Fisch. [= *Austriacus* Türk.] — In territoriis montuosis, fere in toto regno frequens.
51. *femoratus* Fieb. [= *noctivagus* Krauss.] — VIII. Fiume.
52. *cinereus* L. — Frequens.

Platycleis Fieb.

53. *grisea* Fab. — In toto fere regno communis.
54. *intermedia* Serv. — VIII. Carlopago.
55. *affinis* Fieb. — I. Vacs, Bessenyőszög. V. Déva. VI. Orsova. VIII. Fiume.
56. *tessellata* Charp. — Secundum Fieber (27., 28.) occurrit in patria nostra; verisimiliter tantum in regione Adriatica.
57. *vittata* Charp. — I. Budapest, Vacs, Nagyvárad, Szeged. II. Fertőtó. V. In Transsylvania. (Brunner: Prodromus. VI. Temesvár, Mehadia, mons Domogled, Báziás, Ó-Moldova.
58. *stricta* Zeller. — VIII. Zengg.
59. *montana* Koll. — I. Budapest, Örkény, Puszta-Peszér, Rákos, Debreczen. IV. Nagy-Bánya, Berkesz, Remete (com Szatmár). V. Szilágy-Nagyfalu, Görcsön (com. Szilágy), Mező-Záh, Mező-Szakáll (com. Aranyos-Torda).

60. *sepium* Yersin. — VIII. Fiume.
61. *modesta* Fieb. — VIII. Fiume, Zengg.
62. *brachyptera* L. — II. Sopron. III. Com. Nyitra. IV. Mons Gutin, Kapnikbánya. V. Parajd (com. Maros-Torda), montes Hargita (com. Udvarhely), Lacus Szent-Anna-tó, Gyergyó-Szent-Miklós, Balánbánya, Tihucza, Borszék, mons Csalheu (com. Csik), Passus Tömös. Montes Retyezát. VI. Mehádia.
63. *Roeseli* Hagenb. (*brevipennis* Charp.) — I. Örkény (Pestm.), Beél (Biharm.). II. Com. Sopron. III. Verebély (com. Bars). IV. Mons Rabaszkala (com. Zemplén), Nagy-Bánya. V. Jaaz, Somlyó-Csehi, montes Meszes (com. Szilágy), Szamos-Ujvár, mons Cibles, Mező-Záh, Torda, Kolozsvár, Parajd, Székely-Keresztúr, montes Hargita (com. Udvarhely), Balán (com. Csík), Ponor (com. Hunyad). VI. Mehádia, mons Domogled. VII. Zimony, Zágráb.
var. *diluta* Charp (= specimina macroptera). Jaaz (com. Szilágy).
64. *Domogledi* Brunn. — Rarus. VI. Mons Domogled.
65. *bicolor* Phil. — In regione Adriatica nondum inventa; in ceteris passim frequens.
66. *intermedia* Ramb. Serv. — Secundum Fieber (27.) *Synops.* habitat in patria nostra; verisimiliter in regione Adriatica occurrit.

Decticus Serv.

67. *verrucivorus* L. — Fere ubique communis.
68. *albifrons* Fab. — VIII. Fiume, Zengg.

Psorodonotus Brunn.

69. *Fieberi* Friv. — VIII. Brezje (com. Fiume-Modrus).

Ephippigera Latr.

70. *vitium* Serv. — Excepta regione Adriatica, in omnibus ceteris passim propagat.
71. *limbata* Fisch. — VIII. Fiume, Brezje, Kriviput, Carlopago.
72. *sphacophila* Krauss. — VIII. Buccari, Zengg, Brezje, Carlopago.

(*Pycnogaster* Graells.)

[*cucullatus* Charp. — Apud Fischer (29.) *Orth. Eur.* legimus: «in Charpentieri collectione specimina tria ex Hungaria allata asservantur», attamen hæc specimina non ex patria nostra oriuntur, nam hæc species hucdum tantum in Portugallia observata est.]

Saga Charp.

73. *serrata* Fab. — Rarus. I. Montes Sashegy et Gellérthegy apud Budapest. IV. Sátoralja-Ujhely. V. Kolozsvár. VI. Mons Domogled. VIII. Fiume, Zengg. Mas nondum inventa.

Troglophilus Krauss.

74. *cavicola* Kollar. — VII. In cavernis; Vilinska jama et Vrana peč; mons Szmolnik (com. Modrus-Fiume). VIII. Buccari, Cirkvenica.
75. *neglectus* Krauss. — VII. Károlyváros, Fužine. VIII. Fiume, Konjsko.

Dolichopoda Boliv.

76. *palpata* Sulz. — VII. Raduc. VIII. Montes Vellebit.

Fam. GRYLLIDÆ.

Oecanthus Serv.

1. *pellucens* Scop. — Exceptis territoriis altis et frigidis, fere ubique propagat, ubi Vitis vinifera vegetare potest

Nemobius Serv.

2. *sylvestris* Fab. — Rarus. II. Sopron. III. Pozsony.
3. *Heydeni* Fisch. — I. In prædiis Rákos et Vacs, Dabas. Tokaj. V. Jaaz, Zilah; inde a Maros-Ludas usque ad Mező-Záh ad rivos et paludes; Maros-Ujvár. VI. Mehadia, Orsova. VII. Sziszek.

Gryllus Linné.

4. *campestris* L. — Communis.
5. *desertus* Pall. [= *melas* Charp.] — Exceptis territoriis frigidis altissimisque, communis.
6. *domesticus* L. — Frequens.
7. *burdigalensis* Latr. — IV. Tokaj. V. Kolozs, Torda, Mező-Záh, Maros-Ujvár, Bázna.
var. *arvensis* Ramb. — I. Szolnok. VI. Báziás, Pancsova, Grebenácz.
8. *frontalis* Fieb. — Fere in toto regno frequens. (*bimaculatus* de Geer. [= *capensis* Fab.] Quidam auctores (29. Fischer: Orth. Eur.; 43. Graber.: Faun. Stud.; 110. Serv. Hist. nat.) non recte censent hanc speciem, in Europa Meridionali propagantem, et in Hungaria indigenam esse. Dr. Brunner in Prodromo excellente suo «die Angabe Ungarns bei Fischer» apocrypham esse declarat).

Gryllomorphus Fieb.

9. *dalmatinus* Ocsk. — VIII. Cirkvenica, Zengg, Buccari.

Myrmecophila Latr.

10. *acervorum* Panz. — II. Pécs. V. Tasnád, Nagy-Szeben. VI. Mehádia.

Mogisoplistus Sauss.

11. *squamiger* Fisch. — VIII. Novi, Cirkvenica.
12. *brunneus* Serv. — VIII. Cirkvenica.

Arachnocephalus Costa.

13. *vestitus* Costa. — VIII. Cirkvenica, Zengg.

Gryllotalpa Latr.

14. *vulgaris* Latr. — Communis.

Tridactylus Latr.

(*Xya* Illig.)

15. *variegatus* Latr. — I. Budapest, Kis-Szent-Miklós. II. Badacson. IV. Szomotor, Bodrogköz. In regione V. passim occurrit. VI. Orsova. Grebenácz, Doroszló. VII. Sziszek.

Conspectus familiarum, generum et specierum.

Familia	Genus	Species
1. Forficulidæ	6	7
2. Blattidæ	5	11
3. Mantidæ	3	3
4. Phasmidæ	1	2
5. Acrididæ	21	59
6. Locustidæ	27	76
7. Gryllidæ	8	15
	71	173

Summa

Familiarum	7
Generum	71
Specierum	173

Ordo. THYSANOPTERA.

Auctore Josepho Jablonowski.

E renddel hazánkban ez ideig senki sem foglalkozott tüzetesen; az itt elősorolt fajok példányai Jablonowski József gyüjteményében vannak meg, mely azonban ez idő szerint sem rendszerint összeállitva, sem feldolgozva nincs.

Némi biologiai jegyzeteket közölt a *Thrips frumentaria* Bel. (=*Phloeothrips Statices* Hal.) fajról:

1. Dr. Szaniszló Adalb. *Verhandl. der Zool.-Bot.-Gesellschaft in Wien* XXIX. (1879) p. 36; és három uj faj leirását adja

2. Jablonowski J. a *Természetrajzi Füzetek*-ben Budapest. XVII. (1894) p. 45 és p. 93.

Huic ordini in patria nostra hucusquam nemo scrutatorum Faunæ Hungaricæ operam navavit; sequentisque enumerationis specimina in collectione Josephi Jablonowski custodiuntur, cuius collectio tamen hucusque systematice haud ordinata nec perscrutata est.

Notitias nonnullas biologicas de *Thripe frumentaria* Bel. (= *Phloeothrips Statices* Hal.) dedit:

1. Dr. Szaniszló Adalb. in *Verhandl. der Zool.-Bot.-Gesellschaft in Wien* XXIX. (1879) p. 36; et diagnoses trium specierum novarum communicavit

2. Jablonowski J. in *Természetrajzi Füzetek*, Budapest. XVII. (1894) p. 45 et ibid. p. 93.

Fam. THRIPIDAE.

A) TUBULIFERA.

Phloeothrips Hal.

1. *Statices* Hal. — Per totum regnum communis.
2. *aculeata* Fabr. — I. Budapest. V. Csik-Szt-Domokos.
3. *flavipes* Hal. — IV. Bártfa.
4. *parvipennis* Reut. — IV. Nagy-Mihály.
5. *brunnea* Jordan.—VIII. Stalak (C. Modrus-Fiume).
6. *tibialis* Reuter. — I. Budapest.
7. *longispina* Reut. — II. Simontornya. — IV. Torna, Czéke.
8. *coriacea* Hal. — III. Lucski.
9. *dentipes* Reut. — II. Kecskemét.
10. *nodicornis* Reut. — IV. Beregszász. V. Tasnád, Görgény-Szt-Imre.
11. *annulicornis* Hal. — I. Mezőtur, Bánhegyes.
12. *crassipes* Jabl. — (2.) II. Badacsony.
13. *bicolor* Heeg. — I. Farkasd, Simontornya. IV. Varannó.

B) TEREBRANTIA.

Heliothrips Hal.

14. *haemorrhoidalis* Hal. — In calidariis hieme communis. I. Budapest.
15. *dracenae* Heeg. I. Budapest. III. Pozsony.

Sericothrips Hal.

16. *staphylinus* Hal. — II. Badacsony.

Chirothrips Hal.

17. *manicata* Hal. (*longipennis* Burm.) — I. Csepel, Farkasd, Monor, Budapest. IV. Eperjes. V. Görgény-Szt-Imre.

Limothrips Hal.

18. *cerealium* Hal. — In Hungaria rara. III. Losoncz.
19. *denticornis* Hal. — I. Budapest, Farkasd. II Simontornya. IV. Eperjes, Nagy-Mihály. V. Gyergyó-Szt-Miklós.
20. *angulicornis* Jabl. (2). — I. Budapest.

Thrips HAL.

21. *ornata* JABL. — (2). I. Kis-Szt-Miklós.
22. *ulicis* HAL. — I. Budapest, Monor, Csepel, Nagy-Lóré. V. Sepsi-Szt-György.
23. *dispar* HAL. — I. Budapest, Ó-Buda, Rákosfalva. IV. Felső-Sebes. V. Görgény-Szent-Imre (Laposnya in floribus *Telekiae speciosae*).
24. *sambuci* HEEG. — I. Budapest.
25. *physapus* L. — Ubique frequens.
26. *urticae* FAB. — In Hungaria frequens.
var. *obsoleta* UZEL. — I. Budapest.
27. *Benseleri* FRAUENFELD. — I. Budapest. IV. Kassa, Kapnikbánya. V. Tömösi szoros.
28. *minutissima* Lin. — I. Budapest, Farkasd, Budafok. III. Kurimján (C. Szepes). IV. Eperjes. V. Csik-Szt-Domokos. VI. Német-Palánka.
29. *communis* UZEL. — I. Budapest.

Physapus DEGEER.

30. *atratus* HAL. — I. Monor.
31. *obscurus* MÜLL. — I. Budapest.
32. *ater* DEGEER. (*vulgatissima* HAL.) — Per totum regnum communis.
33. *cynorrhodi* HAL. — I. Budapest. V. Gyergyó-Szt-Miklós, Csik-Szt-Domokos.
34. *inconsequens* UZEL. — I. Budapest.

C) COLEOPTRATA.

Melanothrips (HAL.) BURM.

35. *obesa* HAL. — I, Budapest. V. Gyergyó-Szt-Miklós.

Coleotrips HAL.

36. *fasciata* L. — Per totum regnum sat frequens.
37. *vittata* HAL. — I. Gyoma. VIII. Jablanac (C. Lika-Krbava).

Summa

Familiarum	1
Generum	9
Specierum	37

Ordo. APTERYGOGENEA.

Auctore Emerico Vellay.

Hazánkban e rovarcsoporttal csak dr. Tömösváry Ödön foglalkozott behatóbban, a ki gyüjtéseinek eredményét, valamint az e tárgyra vonatkozó megfigyeléseit három terjedelmesebb és egy rövidebb ismertetésben közölte.

E kitartó szorgalmu buvárnak elhalálozása után e rovarcsoport tanulmányozásában szünet állott be s azóta csak igen kevés hazai közlés és adat került róla nyilvánosságra; a mi kevés adat azóta napvilágot látott, az mind apróbb enumeratiókban és egyes külföldi munkákban van elszórva.

Felhasználtam azonban a magyar nemzeti muzeumban őrzött azt a gazdag gyüjteményt, melyet Biró Lajos az ország különböző vidékein gyüjtött és Reuter O. M. helsingforsi tanár határozott meg.

A felvett nyolcz regio közül a legtöbb adatunk van az I-ső regióból, a legkevesebb adat a IV-ik regióból.

Minthogy ezt a rovarrendet hazánkban, aránylag véve, kevéssé tanulmányozták, honi adataink alapján még nem jellemezhetjük.

Egyelőre csak azt emelem ki, hogy hazánkból az eddig felsorolt 70 faj közül a *Smynthurus maculatus* Töm., *Anisosphaera problematica* Töm. és *Seira pallidipes* Reuter eddig kizárólag csak Magyarországon ismeretes s e miatt e két fajt hazánk faunájára jellemző alakoknak tarthatjuk; a *Lepisma myrmecophila* Lucas. és *Lepismina annuliseta* Guér. pedig a mediterrán fauna területéről kerültek hazánkba.

Operam insectis supra notatæ ordinis scrutatorum Hungarorum hucusque solum Edmundus Tömösváry dedit, qui indices collectionum suarum notis instructos in opusculis suis tribus (11—13) iuris publici fecit.

Post mortem huius scrutatoris eximii studium insectis his nemo Hungarorum fovit; additamenta, quæ infra inveniuntur, excerpta sunt enumerationibus parvulis opusculisque alienis.

Huic indici inserui vero et enumerationem collectionis Musæi Nationalis Hungarici, cuius maximam partem Ludovicus Biró collegerat, O. M. Reuter, Universitatis Helsingforsiensis professor vero determinaverat.

Divitissima regionum nostrarum est prima; ex quarta vero minima additamenta habemus.

Et quia hæc ordo usque ad hodiernos dies scrutatorem sum Hungaricum expectat, vix aliquid posse dicere de speciebus horum animalculorum faunæ Hungaricæ propriis. E septuaginta speciebus Hungariæ infra enumeratis attamen *Anisosphaera problematica* Tömösváry et *Seira pallidipes* Reuter solum in Hungaria lectæ et propterea propriæ Hungariæ esse censendæ sunt; *Lepismina myrmecophila* Luc. et *Lep. annuliseta* Guér. vero ex fauna mediterranea ortæ ad regiones patrias nostras adlatæ sunt.

LITTERATURA.

1. Bertkau Ph. Über Tetradontophora gigas Reut. In: Deutsche Entomologische Zeitschrift 1884 XXVIII. p. 235.
2. Biró Lajos. Kirándulás a Pop-Ivánra. In: Rovartani Lapok II. 1885. p. 35.
3. Dr. Dalla Torre K. V. Die Gattungen und Arten der Apterygogenea (Brauer). Sep.-Abdruck aus dem 46. Progr. des k. k. Staats-Gymnasiums in Innsbruck, veröffentl. am Schlusse d. Jahres 1894/95.
4. Dr. Horváth Géza. Izlet u Podused u zagrebačkoj okolici mjeseca novembra. Publicatio Societatis historico-naturalis croaticæ 1888.
5. Jurinac A. E. Faunistični pabirci po okolini Krapinskoj. In: Glasnik Horvatskoga naravoslavnoga drustva I. 1886. p. 145.
6. — Prilog fauni zapadne Slavonije. In: Glasnik Horvatskoga naravoslavnoga drustva II. 1887.
7. Reuter O. M. Species nova generis Poduridarum Seira Lubb. In: Wiener Entomologische Zeitung XIV. 1895.
8. — Apterygogenea fennica. Finnlands Collembola och Thysanura. In: Acta societatis pro fauna et flora fennica XI. 1895.
9. M. kir. állami Rovartani Állomás közleményei. Jelentés az

1890—93. években felmerült gazdasági rovarkárokról 1892.
10. M. kir. állami Rovartani Állomás közleményei. Jelentés az 1890—1893. években felmerült gazdasági rovarkárokról 1894.
11. Dr. Tömösváry Ödön. Magyarországban talált Smynthurus fajok. In: Természetrajzi füzetek VII. 1883.
12. — Adatok hazánk Thysanura faunájához. In: A magyar tud. Akadémia Math. és természett. közleményei XVIII. 1884.
13. — Ujabb adatok hazánk Thysanura faunájához. In: A magyar tud. Akadémia math. és természett. közleményei XIX. 1884.
14. — Fekete hó. In: Rovartani Lapok I. 1884.
15. Uzel Jindrich. Supinuski zemé ceské (Thysanura Bohemiæ) 1890.

Ordo. APTERYGOGENEA.

I. Tribus. COLLEMBOLA Lubbock.

Familia. SMYNTHURIDAE.

Smynthurus Latr.

1. *aureus* Lubb. — V. Pele.
2. *flaviceps* Tullb. — IV. Eperjes.
   var. *fennicus* Reut. — IV. Eperjes.
3. *fuscus* Linné. — I. Ó-Buda, Szt-Endre, Békás-Megyer. IV. Eperjes, Kis-Azar, Hidvég-Ardó. V. Déva. VI. Berzászka. VIII. Fiume.
   var. *ornatus* Uzel. — (Uzel J. (15) affirmat hanc varietatem etiam in Hungaria occurrisse.)
   var. *purpurascens* Schött. — IV. Pop-Iván.
4. *luteus* Lubb. — I. Szt-Endre, Ó-Buda, Farkasd, Békás-Megyer, Tahi-Tótfalu, Vácz, Arad, Szendrő, Sajó-Kaza, Hód-Mező-Vásárhely, Nagy-Szalonta, Gyöngyös. II. Pécs, Esztergom. III. Sik-Abony. IV. Sátoralja-Ujhely. V. Medgyes. VII. Podsused.
5. *maculatus* Tömösváry. — I. Ó-Buda. II. Velencze.
6. *niger* Lubb. — IV. Kis-Azar.
7. *oblongus* Nicol. — II. Csáktornya. VII. Podsused.
8. *viridis* Linné. — I. Szent-Endre, Ó-Buda, Békás-Megyer, Szent-Endre. IV. Pop-Iván (Cottus Máramaros). VI. Ó-Moldova (Cottus Krassó).
   var. *cinereoviridis* Tullb. — I. Nagy-Kőrös, Kecskemét. III. Tátra.

Papirius Lubb.

9. *ater* Linné. — V. Maros-Vásárhely.
10. *longicornis* Fourcr. — III. Mons Vihorlát. IV. Bártfa, Szinnaikő, Kis-Azar.

Fam. ENTOMOBRYIDAE.

Orchesella Templ.

1. *bifasciata* Nicol. — I. Nagy-Kőrös.
2. *cincta* Linné. — I. Budapest, Vácz, Szt-Endre, Békás-Megyer, Farkasd, Kecskemét. II. Pécs. III. Sik-Abony. IV. Bártfa, Sátoralja-Ujhely, Szinna, Szinnaikő. V. Déva, Puj, Maros-Vásárhely, Medgyes.
   var. *vaga* Fabr. — I. Kecskemét.
3. *rufescens* Wulfen. — I. Vácz. III. Vihorlát. IV. Bártfa, Szinnaikő, Pop-Iván. V. Déva, Ohaba-Ponor.
   var. *principalis* Reut. — Secundum Reuter (8) etiam in Hungaria occurrit.
4. *spectabilis* Tullb. — I. Nagy-Kőrös. III. Tátra. IV. Győröcske, Orehova, Eperjes, Runyina.
5. *villosa* Linné. — I. Budapest, Vácz, Szent-Endre, Békás-Megyer, Farkasd. II. Pécs. III. Sik-Abony. IV. Bártfa, Sátoralja-Ujhely, Tolcsva, Szinnaikő. V. Medgyes, Maros-Vásárhely, Ohaba-Ponor. VII. Comitatus Pozsega.

Isotoma Bourl.

6. *cinerea* Nicol. — I. Ó-Buda. IV. Bánszka. V. Déva.
7. *crassicauda* Tullb. — I. Kecskemét.
8. *grisea* Lubb. — I. Szent-Endre. III. Király-Lehota.
9. *palustris* Müller. — I. Szent-Endre. V. Déva, Puj.
10. *viridis* Müller (*fusca* Nicol.). — V. Maros-Vásárhely.

Entomobrya Rond.

11. *annulata* Fabr. — V. Déva.
12. *albocincta* Templ. — I. Budapest, Szent-Endre, Vácz. V. Déva, Medgyes.
   var. *nigrocincta* Töm. — I. Farkasd.
13. *dorsalis* Uzel. — IV. Győröcske.
14. *intermedia* Brook. — I. Kecskemét. IV. Eperjes.
   var. *elongata* Brook. — I. Kecskemét, IV. Eperjes.
15. *lanuginosa* Nicol. — I. Szent-Endre, Tahi-Tótfalu. II. Pécs. III. Sik-Abony. V. Maros-Vásárhely, Puj.

16. *marginata* Tullb. — I. Kecskemét.
17. *maritima* Reut. — I. Kecskemét.
18. *multifasciata* Tullb. — I. Kecskemét.
19. *muscorum* Nicol. — I. Szent-Endre, Kecskemét. V. Déva.
20. *nivalis* Linné. — I. Budapest, Farkasd. IV. Pop-Iván. V. Puj. VI. Karlova.
21. *puncteola* Uzel. — Secundum Uzel (15) etiam in Hungaria occurrit.

Tomocerus Nic.

22. *niger* Bourl. (*vulgaris* Tullb.) — I. Kecskemét, Nagy-Kőrös. IV. Eperjes, Győröcske.
23. *plumbeus* Lin. (*longicornis* Müll.) I. Budapest, Vácz, Szent-Endre, Békás-Megyer, Farkasd, Irsa. II. Bátorkesz, Pécs. III. Verőcze, Tátra. IV. Bártfa, Szinnaikő, Kis-Azar, Sátoralja-Ujhely. V. Pele, Medgyes, Maros-Vásárhely.

Cyphodeirus Nic. (*Beckia* Lubb.)

24. *albinus* Nicol. I. Ó-Buda, Kecskemét.
25. *argenteus* Lub. — I. Szent-Endre. V. Déva.

Seira Lubb.

26. *Buskii* Lubbock. — I. Kecskemét. IV. In ripis fluminis Bodrog.
27. *pallidipes* Reuter. — I. Kecskemét.
28. *pruni* Nicolet. — V. Maros-Vásárhely.

Lepidocyrtus Bourlet.

29. *agilis* Nicolet. — V. Maros-Vásárhely.
30. *assimilis* Reut. — I. Kecskemét.
31. *curvicollis* Bourl. — I. Vácz, Szent-Endre, Ó-Buda, Farkasd, Arad, Nagy-Kőrös, Kecskemét. IV. Erdőbénye, Eperjes, Győröcske. V. Pele, Medgyes, Déva.
32. *lignorum* Fabr. — IV. Sátoralja-Ujhely. V. Puj.
33. *paradoxus* Uzel. — In collectione Musæi nationalis.
34. *purpureus* Lubbock. — IV. Győröcske.
35. *pusillus* Lin. (*lanuginosus* Gmel.) — I. Nagy-Kőrös.
36. *violaceus* Fourcr. — V. Kolozsvár.

Calistella Reut.

37. *superba* Reuter. — IV. Győröcske.

Templetonia Lubb.

38. *crystallina* Müller. — V. Pele. (Dalla Torre (3) hanc speciem *Templetoniae nitidae* Templ. synonimum incertum esse censet.)
39. *nitida* Templ. — I. Kecskemét (in coll. Musæi Nationalis).

Fam. PODURIDAE.

Achorutes Templeton.

1. *armatus* Nicolet. — II. Sóly (C. Veszprém). V. Maros-Vásárhely.
2. *bielanensis* Waga (*alpinus* Töm.). — III. Tátrafüred. Tátra. IV. Kis-Azar. V. Medgyes, Retyezát, Vlegyásza.
3. *dubius* Tullbg. — V. Déva.
4. *purpurascens* Lubbock.—VI. Kossova (C. Krassó-Szörény).

Podura L.

5. *aquatica* Linné. — I. Szent-Endre, Ó-Buda, Békás-Megyer.

Xenylla Tullbg.

6. *brevicauda* Tullb. — I. Kecskemét.

Fam. APHORURIDAE.

Aphorura Mac Gill. (*Lipura* Burm.)

1. *ambulans* Linné. — I. Szent-Endre, Békás-Megyer. IV. Kis-Azar. V. Kolozsvár, Maros-Vásárhely.

Anurophorus Nic.

2. *laricis* Nic. (*Lipura corticina* Bourl.) — IV. Kis-Azar. VI. Mehádia. VIII. Fiume.
3. *stillicidii* Schiödte. — I. Szent-Endre.

Neanura Mac Gill. (*Anura* Gerv.)

4. *muscorum* Templ. — I. Vácz, Nagy-Kőrös. IV. Kis-Azar, Bártfa. V. Maros-Vásárhely. VI. Kossova, Mehádia.

Tetradontophora Reut.

5. *gigas* Reut. — IV. Szinnaikő. VII. Croatia.
var. *alpina* Töm. — IV. Szinnaikő.

II. Tribus. THYSANURA.

Fam. LEPISMIDAE.

Machilis Latr.

1. *fasciola* Nicol. — V. Déva.
2. *polypus* Linné. — I. Szent-Endre. IV. Bártfa, Sátoralja-Ujhely, Szinna. V. Medgyes, Kolozs-

vár, Déva, Maros-Vásárhely. VI. Mehádia. VII. Podsused, Krapina, Comit. Pozsega.

Lepismina Gerv.

3. *myrmecophyla* Lucas. — I. Buda in nido Tetramorii cæspitum.

Lepisma L.

4. *annuliseta* Guérin. — VI. Ó-Moldova (Cottus Krassó-Szörény).
var. *lineata* Fabr. — I. Budapest.
5. *ciliata* Dufour. — VI. Szvinicza (Cottus Krassó-Szörény).
6. *formicaria* Heyden. — I. Ó-Buda.
7. *saccharina* Linné. — I. Budapest, Szt-Endre, Békás-Megyer, Arad. II. Simontornya. IV. Komjáti, Sátoralja-Ujhely. V. Déva, Puj, Maros-Vásárhely. VI. Ó- et Uj-Moldova.

Fam. ANISOSPHAERIDAE.

Anisoshpaera Tömösváry.

1. *problematica* Töm. — IV. Bártfa.

Fam. JAPYGIDAE.

Japyx Halid.

1. *solifugus* Haliday. — I. Szent-Endre.

Fam. CAMPODEIDAE.

Campodea Westw.

1. *staphylina* Westwood. — I. Szent-Endre, Tahi-Tótfalu. II. Pécs. IV. Bártfa. V. Medgyes, Kolozsvár, Maros-Vásárhely, Déva. VI. Mehádia, Kossova.

Summa

Familiarum	8
Generum	24
Specierum	70

Ordo. PSEUDO-NEUROPTERA.

Auctore Alexandro Mocsáry.

Az Ál-reczésszárnyú rovarokat (*Pseudo-Neuroptera)* illetőleg is jobbára állanak azok, a miket a Neuropterák vizsgálatáról elmondtunk. (L. alább.)

Itt azonban egy más kiváló szakbuvárról, dr. Kempny Péter urról is hálás köszönettel kell megemlékeznem, ki szives készséggel revideálta és határozta meg *Taeniopteryx*, *Nemurella* és *Nemura* fajainkat, melyek speciális tanulmánya tárgyai. Hazánkfiai közül pedig első sorban Thalhammer János urról kell megemlékezni, ki szakavatottan első ismertette a Kalocsa vidékén élő Odonátákat és Kohaut Rezső-ről, ki szép monografiát irt a magyarországi Odonátákról, melyet a kir. magy. Természettudományi Társulat adott ki. E munka megjelenése óta (1896) nem is találtatott egynél több faj *(Epitheca bimaculata)* hazánkban, mely ama jeles monografiában hiányzik; noha nem valószinütlen, hogy a szomszéd Ausztriában előforduló fajok közül nálunk még a *Leucorhinia rubicunda* L., *albifrons* Burm., *caudalis* Charp., *Epitheca arctica* Zett., *alpestris* Selys, *Cordulegaster annulatus* Latr., *Aeschna borealis* Zett. is előbb-utóbb meg lesz található.

A hazánkban élő Pseudo-Neuropterák között igen érdekes és nevezetes állatok vannak az Ephemerida alrendben, melyek halainknak igen kedvelt és bőséges táplálékot nyujtanak, s igy fontos nemzetgazdasági tényezők. Ilyenek: a

1. *Polymitarcys virgo* Oliv., mely már Marsili Alajos Ferdinánd grófnak 1726-ban megjelent műve hatodik kötetében előfordul, * hol azt

De perscrutatione Pseudo-Neuropterorum fere eadem dicenda sunt, quæ de Neuropteris attulimus. (Vide infra.)

Attamen hoc loco commemorandus est grati animi alius vir egregius, et Dr. Petrus Kempny, celebris inter entomologos nominis, qui libenter id muneris suscepit, ut examinaret et determinaret species ad genera *Taeniopteryx*, *Nemurella* et *Nemura* pertinentes; has quippe speciali studio colit.

Inter nostros primum commemorandi sunt: Joannes Thalhammer, qui Odonata regionis Colocensis (Kalocsa) eximio modo recensuit et Rudolphus Kohaut, qui Odonata hungarica eleganti monographia implexus est; elucubrationem Regia Scientiarum Naturalium Societas Hungarica publici fecit iuris anno 1896. Ex eo tempore una tantum species inventa est in Hungaria, quam in hoc opere desideres *(Epitheca bimaculata)*, quamvis a veritate vix aberrare dicendus, qui affirmat, aliquot species proximis Austriæ finibus indigenas, ut *Leucorhinia rubicunda* Linn., *albifrons* Burm., *caudalis* Charp., *Epitheca arctica* Zett., *alpestris* Selyp, *Cordulegaster annulatus* Latr., *Aeschna borealis* Zett. etiam apud nos inventum iri.

Inter Pseudo-Neuroptera, quæ patriam nostram incolunt, aliquæ species sunt ex Ephemeridis, quæ et multitudine omnium in se oculos convertunt et gratissimum atque abundantissimum piscibus pabulum præbentes ad rem œconomicam augendi maximi momenti sunt. Quarum:

1. *Polymitarcys virgo* Oliv., quam iam anno 1726. Comes Ferdinandus Aloysius Marsili operis tomo 6-to commemorat «Papilionis» nomine, cuius et pagina 117. insignem æri incisam imaginem exhibet.*

* *Danubius Pannonico-Mysicus*, observationibus geographicis, astronomicis, hydrographicis, historicis, physicis perlustratus et in sex Tomos digestus ab Aloysio Ferd. Com. Marsili. Hagæ et Amstelodami, 1726. Tom. VI. De insectis. Pag. 113. Insecta, quæ ad Ripas Danubii et Tibisci inveniuntur et pag. 123. Insecta, circa aquas vagantia;

* *Danubius Pannonico-Mysicus*, observationibus geographicis, astronomicis, hydrographicis, historicis, physicis perlustratus et in sex Tomos digestus ab Aloysio Ferd. Com. Marsili. Hagæ et Amstelodami, 1726. Tom. VI. De insectis. Pag. 113. Insecta, quæ ad Ripam Danubii et Tibisci inveniuntur et pag. 123. Insecta, circa aquas vagantia; Ane-

«Papilio»-nak nevezi s a 117-ik lapon jól fölismerhető, rézbe metszett rajzát is adja. Ez érdekes állatka Budapestnél augusztus havában a Dunaparton naplemente után egész éjfélig, a mikorra pályafutását bevégezte, néha nagy mennyiségben repked a gáz- és elektromos lámpák körül; de mégsem olyan roppant tömegben, milliárdnyi sokaságban, mint én azt egyszer gyermekkori éveimben szülővárosomban, Nagyváradon láttam, a Sebes-Körös folyóból kikelve.

2. *Palingenia longicauda* Oliv., melyet Marsili alkalmasint szintén ismert, mert említett művének 125-ik lapján «Squila»-nak nevez egy vizben élő rovarálczát s rézbe metszett rajzát is adja, mely nagyon hasonlit a *Palingenia longicauda* álczájához; azt irván róla, hogy «in foraminibus Tibisci, ubi Cancri reperiuntur» található.

A *Palingenia longicauda* nálunk legnagyobb mennyiségben Szegednél fordul elő, rendesen jun. 10—20-a között. Naplemente előtt, délutáni 5 óra után jön ki a vizből, a Tisza folyóból, és este 8 óra után élte pályáját már megfutotta.

3. Nagyváradnál a Sebes-Körösben él az *Ecdyurus venosus* Fabr. is, mely évenkint néhány napig junius hó első felében milliárdnyi mennyiségben

Species hæc ad Budapestinum in ripis Danubii mense Augusto ab occidente sole usque ad mediam noctem, dum vitæ spatium decurrit, magnis agminibus circumvolat lampades; nunquam tamen vidi tantam multitudinem, quantam puer Magno-Varadini, in solo natali meo, ubi millena atque millena animalia ex flumine Sebes-Körös in aëra ferebantur.

2. *Palingenia longicauda* Oliv., quam verosimile est Marsilio etiam notam fuisse; etenim in opere supra laudato pag. 125. erucam comminiscitur in aquis viventem, quam «Squilam» dicit eiusque ex æreis tabulis expressam imaginem exhibet, quæ simillima est chrysalidi *Palingeniae longicaudae;* addit præterea eam «in foraminibus Tibisci, ubi Cancri inveniuntur» degere.

Palingenia longicauda apud nos præsertim in finibus Szegedinis invenitur plerumque circa mediam mensem Junii. Ante solis occasum fere hora quinta post meridiem exsurgit ex Tibisco et circa horam octavam vitæ stadium decurrisse solet.

3. In finibus Magnovaradinensibus (Nagyvárad) degit in flumine Sebes-Körös *Ecdyurus venosus* Fabr., qui quotannis a Calendis Junii per aliquot dies millenis atque millenis agminibus occupat parietes atque frutices ad fluvium sitos; in aliis

Anelytra Quadripennia: Perlæ, igy nevezvén az Odonátákat, a melyekből 2 Libellulinának és 3 Agrioninának rézbe metszett rajza is látható.

Magára a *Polymitarcys virgó*-ra vonatkozó érdekes sorok különben a következők: «Anno 1688. die circiter 20. Augusti cum navi obviam irem Serenissimo Duci Lotharingiæ in Castra quæ ad Belgradum Cæsarei, locum obsidentes ponebant, properanti contigit mihi videre in Danubio non longe a confluentibus Tibisci quoddam papilionum genus in maxima copia ibi circumvolantium, consimile plane ei quod Zahn in sua mundi mirab. œconomia scrutin. 4. disquisit. 3. cap. 18. §. 2. allegat. Unde etiam illum locum hic exscribere, et ipsius insecti figuram hic delineara opere pretium duxi, is vero sic se habet».

«Papilionis quandam speciem circa Mosam Fluvium quotannis mire produci solitam memorat Zodiacus Medicogall. Ann. 2. mens. Septemb. Obs. 3. his verbis: singulis annis octiduo aut decennio ante vel post festum D. Laurentii, si serenum fuerit tempus per biduum, aut triduum circa vesperam animadvertitur emergere e flumine Mosa insignis Papilionum copia albissimorum, pellucidissimorum, extremæ tenuitatis, exiguo post tempore in flumen relabentium; ea propter Mannæ Cœlestis nomine donatarum. Eiusmodi insecta plane inter se similia ope binarum alarum, summa tenuitate et pelluciditate præditarum, non secus ac reliquum corpus volitant: in extremitate quæ capiti observa est, obtinentia duas productiones capillari tenuitate pollicari longitudine, caudæ bifurcatæ quandam speciem præbentia quod reliqua ad figuram spectantia; vide loc. citat.»

lytra Quadripennia: Perlæ, sic nominans Odonata, ex quibus duas Libellulinas et tres Agrioninas etiam æri incisi curavit.

Ipsa, quæ de laudata specie verba affert, hæc sunt: «Anno 1688. die circiter 20. Augusti cum navi obviam irem Serenissimo Duci Lotharingiæ in Castra quæ ad Belgradum Cæsarei, locum obsidentes ponebant, properanti contigit mihi videre in Danubio non longe a confluentibus Tibisci quoddam papilionum genus in maxima copia ibi circumvolantium, consimile plane ei quod Zahn in sua mundi mirab. œconomia scrutin. 4. disquisit. 3. cap. 18. §. allegat. Unde etiam illum locum hic exscribere, et ipsius insecti figuram hic delineare opere pretium duxi, is vero sic se habet»:

Papilionis quandam speciem circa Mosam Fluvium quotannis mire produci solitam memorat Zodiacus Medicogall. Ann. 2. mens. Septembr. obs. 3. his verbis: singulis annis octiduo aut decennio ante vel post festum D. Laurentii, si serenum fuerit tempus per biduum, aut tridium circa vesperam animadvertitur emergere e flumine Mosa insignis Papilionum copia albissimorum, pellucidissimorum, extremæ tenuitatis, exiguo post tempore in flumen relabentium; ea propter Mannæ Cœlestis nomine donatarum. Eiusmodi insecta plane inter se similia ope binarum alarum, summa tenuitate et pelluciditate præditarum, non secus ac reliquum corpus volitant: in extremitate quæ capiti observa est, obtinentia duas productiones capillari tenuitate pollicari longitudine, caudæ bifurcatæ quandam speciem præbentia quod reliqua ad figuram spectantia, vide loc. citat.»

lepi el a körösmenti házak falait és a körösparti cserjéket. Egyes példányokban hazánk más vidékein is előfordul.

Mint nevezetesebb Ephemeridák említendő még: 4. az *Oligoneura rhenana* Imh., mely nálunk csak a keleti részben s 5) az *Oligoneura pallida* Hag., mely Budapestnél a Dunában él, s mindkettő augusztus havában röpül. Ezek már megközelithetőleg sem olyan nagy tömegben szoktak megjelenni, mint az előbb említett fajok.

Odonátáink között is több érdekes és ritkább faj van; de széles elterjedésöknél fogva ezek hazánk jellemző állatainak alig tekinthetők.

Budapesten, 1899 április hó 10-én.

Hungariæ regionibus pariter invenitur, attamen rarius.

Ex Ephemeridis enumerandæ præterea sunt: 4. *Oligoneura rhenana* Imh.; quæ apud nos solummodo in partibus orientalibus et 5. *Oligoneura pallida* Hag., quæ ad Budapestinum in Danubio degit. Utraque mense Augusto volitat. Dici tamen vix potest, quantopere hæ species numero inferiores sint prioribus.

Inter Odonata etiam inveniuntur species insignes et raræ; quia tamen latissimus finibus continentur, species ad faunam Hungariæ characteristicæ vix dici possunt.

Budapestini, die 10. Aprilis, 1899.

LITTERATURA.

1. Albarda H. *Note sur la Taeniopteryx nebulosa L. et de la praetexta* Burm. (Annal. Soc. ent. Belgique. XXXIII. 1889, p. 51.)
2. Biró L. *Kirándulás a Pop-Ivánra* (Rovartani Lapok. II. 1885, p. 30,55. — *Une excursion sur le Pop-Iván.* Ibid. Revue, p. IV. VII.)
3. Brauer, F. und Löw, Fr. *Neuroptera Austriaca. Die im Erzherzogthum Oesterreich bis jetzt aufgefundenen Neuropteren.* Wien, 1857.
4. — *Die Neuropteren Europa's und insbesondere Oesterreichs* (Festschrift zur Feier des fünfundzwanzigjährigen Bestehens des k. k. zoolog.-botan. Gesellschaft in Wien. Wien, 1876, p. 265.)
5. Bunyitay V. *Nagyvárad természetrajza.* Budapest, 1890. — *Nagyvárad és vidékének állatvilaga.* Irta Kertész Miksa. *Pseudoneuroptera. Álreczésszárnyuak,* p. 209.
6. Czekelius, D. Dr. *Beiträge zur Lepidopteren- und Odonaten-Fauna Siebenbürgens* (Verhandlungen und Mittheilungen des siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt. XLVI. Jhrg. 1896, p. 82.)
7. Fuss, C. *Notizen und Beiträge zur Insektenfauna Siebenbürgens* (Verhandlungen und Mittheilungen des siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermanstadt. IV. Jhrg. 1853, p. 207.)
8. Frivaldszky J. *Adatok Mármaros vármegye faunájához* (M. T. Akad. mathem. és természettudományi Közlemények. IX. 1871, p. 230.)
9. — *A Herkulesfürdő vidékén élő állatok* (A Herkules-fürdő és környéke. Irta Munk Manó. Az állattani részt Frivaldszky János. Budapest, 1872. — *Álreczésröpüek,* p. 97.)
10. — *Állattani kirándulásaim Orsova, Mehádia és Korniareva vidékein* (A magy. orvosok és természetvizsgálók XVI. nagygyülésének történeti vázlata és munkálatai. Pest, 1873.)
11. — *Adatok Temes és Krassó megyék faunájához. Data ad faunam Hungariae meridionalis Comitatuum: Temes et Krassó* (M. T. Akad. mathem. és természettud. Közlem. XIII. 1876.)
12. — *Budapest és környéke állattani tekintetben* (Budapest és környéke orvosi és természettudományi helyirata. Irta Margó Tivadar. Budapest, 1879. — *Neuroptera. Reczésröpüek.* Frivaldszky Jánostól, p. 49.)
13. Hermann Otto. *Állattani közlemények.* (Az erdélyi Muzeum-Egylet Évkönyvei. V. köt. 1868—70, p. 92.). (*Thecaphora lunulata* Charp. = *Cordulegaster bidentatus* sec. spec. typ. !)
14. Horváth G. dr. *Termiták hazánkban* (Rovartani Lapok. II. 1885, p. 208. — *Sur la découverte du Termes lucifugus* Rossi *en Hongrie méridionale.* Ibid. Revue, p. XXVIII.)
15. Kohaut R. *A magyarországi Szitakötő-félék természetrajza* (Libellulidæ Auct., Odonata Fabr.). A kir. m. Természettudományi Társulat megbizásából. Három tábla rajzzal. Budapest, 1896. Kiadja a k. m. Természettudományi Társulat.
16. Kunz A. dr. *Szombathely rendezett tanácsu város monographiája.* Szombathely, 1880. *Orthoptera,* p. 24. (Enumeratio specierum aliquot.)
17. Mocsáry S. *Biologiai jegyzetek* (Természetrajzi Füzetek. II. 1878, p. 124.). — *Biologische Notizen* (Ibid. Revue. p. 180.) *(Baëtis purpurascens = Ecdyurus venosus* Fabr.)
18. — *Adatok Biharmegye faunájához. Data ad faunam Hungariae orientalis Comitatus Bihar* (M. T. Akad. mathem. és természettudom. Közlemények. X. 1872, p. 163.)
19. — *Adatok Zemplén és Ung megyék faunájához* (Ibid. XII. 1875, p. 176.)
20. — *Bihar és Hajdu megyék hártya-, két-, reczés-, egyenes- és félröpüi. Hymenoptera, Diptera, Neuroptera, Orthoptera et Hemiptera Hungariae Comitatuum: Bihar et Hajdu* (Ibid. XIV. 1876.)
21. — *Adatok Zólyom és Liptó megyék faunájához. Data ad faunam Hungariae septentrionalis Comitatuum: Zólyom et Liptó* (Ibid. XV. 1878.)
22. — *Délmagyarország állattani tekintetben* (Helyrajzi Emlékmü a magy. orvosok és természetvizsgálók 1886 évi Buziás-Temesvárott megtartott XXIII. vándorgyülésére.). Irta Tömösváry Ödön. — *Orthoptera.* Összeállitotta: Mocsáry Sándor, p. 159.
23. Shuck J. dr. *Hajdumegye leirása.* A magy. orvosok és természetvizsgálók 1882. évi Debreczenben tartott XXII. nagygyülésének alkalmából. Debreczen, 1882. — *A megye állatvilágának rövid áttekintése,* Dr. Shuck Józseftől. *Reczésröpüek,* p. 159. (Publicatio cum datis ex parte falsis.)
24. Simonkai L. *Aradvármegye és Arad szabad királyi város természetrajzi leirása. Aradmegye és Aradváros állatvilága.* Arad, 1893. *Orthoptera,* p. 109. (Nonnulla tantum animalia, ex parte false determinata.)
25. Thalhammer J. *Adatok Kalocsa vidéke rovarfaunájának ismeretéhez. Odonata* Fabr. (A kalocsai főgymnasium Értesitője. Kalocsa, 1885.) (*Leucorhinia rubicunda* L. = *pectoralis* Charp. sec. spec. typ. !)

Ordo. PSEUDO-NEUROPTERA.

A) CORRODENTIA.

Fam. TERMITIDAE.

Termes Linn.

1. *lucifugus* Rossi. — VI. Berzászka (Com. Krassó-Szörény), Szvinicza, Kazán.

Fam. PSOCIDAE.

Ampligerontia Kolbe.

1. *bifasciata* Latr. — III. Tátraháza. V. Görgény (Com. Maros-Torda). VI. Deliblat.
2. *fasciata* Fabr. — III. Montes Carpathici (Tátra).
3. *variegata* Fabr. — VI. Solum ad Deliblat.

Psocus Latr.

4. *saltatrix* Linn. (*longicornis* F., *lineatus* Latr.). — I. Budapest, Rézbánya. V. Sz.-Gothárd, Görgény, balneum Tusnád. VI. Orsova, Mehádia.
5. *nebulosus* Steph. (*similis* Steph.). — I. Gyón. IV. Mons Pop-Iván. VI. Orsova, Deliblat. VIII. Cirkvenica.
6. *sexpunctatus* Linn. — I. Budapest. V. Tihucza (Com. Besztercze-Naszód) VI. Mehádia.
7. *bipunctatus* Linn. — II. Pilis-Marót. IV. Vallis Szádelőensis (Com. Torna).
8. *quadrimaculatus* Latr. — II. Simontornya. V. Görgény.

Mesopsocus Kolbe.

9. *unipunctatus* Mllr. — V. Hucusque solum ad Görgény.

Elipsocus Hag.

10. *cyanops* Rost. — IV. Mons Pop-Iván.

Pterodela K.

11. *pedicularia* Linn. (*domestica* Burm.). — I. Complura specimina e Budapest.

Caecilius Curt.

12. *Burmeisteri* Brau. — I. Sicuti prior.
13. *flavidus* Curt. — IV. Szinyérváralja (Com. Szatmár). VI. Orsova, Mehádia.
14. *fuscopterus* Latr. (*vittatus* Dalm.). — I. Budapest. V. Görgény. VI. Orsova, Mehádia.

Graphopsocus Kolbe.

15. *cruciatus* Linn. — I. Budapest. II. Simontornya. III. Tátra. IV. Szinyérváralja. V. Görgény.

Stenopsocus Hag.

16. *immaculatus* Steph. — I. Budapest, Nagyvárad, Rézbánya. V. Tihucza, Görgény. VI. Mehádia.

Peripsocus Hag.

17. *phaeopterus* Steph. — V. In regione transsilvanica ad Görgény.
18. *alboguttatus* Dalm. — V. Görgény. VI. Mehádia.
19. *subpupillatus* Mc Lachl. — Tantum ad Görgény.

Proctes Burm.

20. *divinatorius* Müll. — In collectionibus animalium plantarumque in domibus.

Atropos Leach.

21. *pulsatorius* Linn. — Sicuti prior.

B) PLECOPTERA.

Fam. PERLIDAE.

Dictyopteryx Pict.

1. *microcephala* Pict. — III. Turcsek (Com. Turócz), Koritnicza (Com. Liptó). V. Görgény, Kerczisóra.
2. *alpina* Pict. — Secundum Brauer est etiam Hungariæ incola (4. pag. 294.).
3. *rectangula* Pict. — I. Rézbánya in montibus Bihariensibus. III. Tátraháza. IV. Vallis Kolbach, Homonna, Szinnaikő, Mármaros.

Adnot. *Pteronarcys reticulata* Burm. secundum specimina typica Musæi Nationalis Hungarici e Barnaul Sibiriæ — olim ab Alberto Kindermann hungaro lecta et ab Emerico Frivaldszky Burmeistero submissa — et non e Hungaria oritur.

Isogenus Newm.

4. *nubecula* Newm. — I. Budapest, insula Csepel. II. Pilis-Marót, Simontornya. III. Verőcze. (Com. Nográd). IV. Ungvár.

Perla Geoffr.

5. *maxima* Scop. — III. Deményfalva, Vratna (Com. Trencsén), Rózsahegy. V. Nagyvizvölgy (Com. Hunyad), Kerczisóra, mons Surul (Com. Szeben).

6. *marginata* Panz. — II. Kőszeg (Com. Vas). III. Borosznó, Vratna, Rózsahegy, Barlangliget (Com. Szepes). V. Görgény, Vöröstorony. VI. Mehádia, Kazán.

7. *pallida* Guér. — I. Rézbánya. IV. Szinnaikő, mons Vihorlat (Com. Zemplén). V. Balneum Tusnád (Com. Csik). VI. Ferenczfalva. VII. Slavonia ad Pakracz.

8. *abdominalis* Burm. — I. Nagyvárad. III. Rózsahegy. V. Rézhegység. VI. Mehádia. VII. Raduć.

9. *vitripennis* Burm. — I. Nagyvárad. IV. Forró. V. Mons Retyezát (Com. Hunyad).

Chloroperla Newm.

10. *grammatica* Scop. — I. Montes Biharienses. III. Beszterczebánya, Rózsahegy, Koritnicza, Lacus Csorba, Lucsivna, Turcsek. V. Görgény, balneum Tusnád, Kis-Disznód, Mons Retyezát, Kerczisóra, Szász-Sebes. VI. Corniareva, mons Szemenik, Mehádia. VII. Balneum Lipik. VIII. Fiume, Buccari.

11. *griseipennis* Pict. — I. Budapest, Csepel, Szeged. II. Pilis-Marót (Com. Esztergom), Zákány (Com. Somogy). VI. Deliblat, Gombos (Com. Bács-Bodrog).

Isopteryx Pict.

12. *torrentium* Pict. — I. Rézbánya. III. Turcsek. V. Görgény.

13. *Burmeisteri* Pict. — I. Hucusque solum ad Nagyvárad legi.

14. *apicalis* Newm. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Duna-Örs, Zákány.

Taeniopteryx Pict.

15. *Leowii* Alb. (*praetexta* Brau.). — I. Complura specimina e Budapest.

16. *trifasciata* Pict. — I. Budapest. IV. Kassa, Varannó, Nagymihály. VI. Ulma.

17. *Risi* Mort. — I. Rézbánya. III. Koritnicza. IV. Montes Beszkid. V. Görgény. VI. Mehádia. VII. Pakracz.

18. *nebulosa* Linn. — I. Budapest. II. Pilis-Marót. IV. Nagymihály.

19. *neglecta* Alb. — Secundum Auctorem est etiam Hungariæ incola: VI. Mehádia (Alb.) et VII. Croatia (Albarda 1, pag 63.)

20. *monilicornis* Pict. — Secundum Brauer etiam Hungariam inhabitat (4, pag. 295.)

Nemurella Kempny.

21. *insconspicua* Pict. — III. Complura specimina e Turcsek.

Nemura Latr. Pict.

22. *cinerea* Oliv. — III. In duobus exemplaribus e Tátraháza.

23. *subtilis* Klap. — VI. Pariter duo specimina e Mehádia.

24. *lateralis* Pict. — I. Gödöllő, Besnyő, Kebesd (Com. Bihar), Rézbánya. II. Visegrád. III. Koritnicza, Turcsek. IV. Bártfa, Varannó. V. Peér, mons Retyezát. VI. Orsova, Mehádia, Corniareva.

25. *variegata* Oliv. — II. Pilis-Marót, Visegrád, Kis-Tapolcsány. III. Poprád, Lucsivna, Lacus Csorba, Rajecz (Com. Trencsén), Turcsek. IV. Varannó, Simonka, Ránk, Tolcsva, S.-A.-Ujhely, Bártfa, montes Beszkid, Szobráncz. V. Zilah, Tasnád, Görgény, Nagyszeben. VI. Orsova, Mehádia, Grebenácz. VII. Fužine, Gospić. VIII. Carlopago, Buccari.

C) EPHEMERIDA.

Fam. EPHEMERIDAE.

Palingenia Burm.

1. *longicauda* Oliv. — I. E Danubio ad Budapest, penes insulam Sanctæ Margarethæ (Margitsziget) et ad Ó-Buda; e fluvio Tibisco (Tisza) ad urbem Szeged medio Junii ingenti copia; e fluvio Hármas-Körös ad urbem Szarvas (Com. Békés). II. Penes urbem Győr in fluviis Rába et Rábcza. IV. E fluvio Bodrog et e rivo Ronyva ad S.-A.Ujhely (Com. Zemplén). VI. Baziás et Orsova e Danubio. VII. Vukovár e Danubio.

Oligoneura Pict.

2. *rhenana* Imh. — V. Medio Augusti penes Rea (Com. Hunyad) in ripa fluvii Riu Mare (Nagypatak) et apud Vöröstorony (Com. Szeben) collecta.

3. *pallida* Hag. — I. Mense Augusto in Budapest ad ripam fluminis Danubii (Duna) haud rara.

Polymitarcys Eat.

4. *virgo* Oliv. (*Palingenia horaria* Burm.). — I. E Danubio ad Budapest et insula Csepel; e fluvio Sebes-Körös ad urbem Nagyvárad medio Augusti ingenti numero. II. E fluvio Lajta ad Magyar-Óvár (teste Brauer), et Czege dicto ad urbem Szent-Gothárd (Com. Vas). VI. Baziás et Orsova e Danubio.

Ephemera Linn.

5. *vulgata* Linn. — I. Rézbánya, Vaskóh. II. Pilis-Marót, Pápa, Tapolcza, Szombathely, Kőszeg. V. Balneum Tusnád. VI. Szászka (Com. Krassó-Szörény). VI. Mehádia. VII. Raduć.

6. *lineata* Eat. — II. Kőszeg (Com. Vas). III. Trencsén. IV. Ungvár.

7. *danica* Müll. — I. Monyásza (Com. Arad). II. Pilis-Marót, Kőszeg. VI. Temesvár, Mehádia. VII. Brušane.

Potamanthus Pict.

8. *luteus* Linn. — I. Budapest, Csepel, Nagyvárad, Beél (Bihar). II. Berhida (Com. Veszprém). IV. S.-A.-Ujhely. VI. Baziás, Mehádia, Ulma. VII. Dálya.

Leptophlebia Westw.

9. *submarginata* Steph. — I. Nagyvárad, Vaskóh. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely. V. Nagyszeben.

10. *cincta* Retz. — I. Specimen unicum e Budapest.

Habrophlebia Eat.

11. *lauta* Mc Lachl. — VIII. Apud nos tantum ad Gospić et Buccari.

Ephemerella Walsh.

12. *gibba* Pict. (*Potamanthus gibbus* Pict.). — I. Mense Maio e rivo Rákos ad Budapest. IV. Homonna.

13. *ignita* Poda. — V. Hucusque apud nos tantum ad balneum Tusnád.

Caenis Steph.

14. *halterata* Fabr. (*lactea* Burm.). — I. Budapest, Csepel. II. Pécs, Szombathely. III. Turcsek. IV. Homonna e fluvio Laborcz. VII. Dálya e Danubio.

15. *robusta* Eat. — I. Hucusque tantum e Budapest.

Baëtis Leach.

16. *binoculatus* Linn. — I. Complura speciminia e Budapest et Rákos-Csaba.

17. *Rhodani* Pict. — VI. Krassova (Com. Krassó-Szörény), Mehádia. VIII. Fiume.

18. *tenax* Eat. — VI. Quatuor specimina e Grebenácz (Com. Temes).

19. *pumilus* Burm. — III. Tantum e Lacu Csorba (Com. Liptó).

Centroptilum Eat.

20. *luteolum* Müll. — II. Visegrád, e Danubio.

Cloeon Leach.

21. *dipterum* Linn. — I. Budapest, prædium Apaj et Peszér, Nagyvárad, Makó, Szeghalom, Mező-Kovácsháza. II. Mohács, Fonyód. IV. S.-A.-Ujhely, Szomotor, Imreg. V. Tasnád, Peér, Pele-Szarvad, Hátszeg. VI. Mehádia, Grebenácz.

22. *simile* Eat. — I. In insula Csepel non procul a Budapest.

23. *rufulum* Müll. — II. Ad urbem Mohács, e Danubio.

Chirotonetes Eat.

24. *ignotus* Walt. — I. Budapest. IV. Bereczki.

Siphlurus Eat.

25. *armatus* Eat. — I. Budapest. V. Tasnád-Szántó.

26. *lacustris* Eat. — I. Budapest. IV. Ungvár. VII. Lipik.

Ametropus Alb.

27. *fragilis* Alb. — I. Quatuor exemplaria e Budapest.

Epeorus Eat.

28. *alpicola* Eat. — V. Görgény. VI. Mehádia.

Rhitrogena Eat.

29. *alpestris* Eat. — V. Hucusque apud nos solum e Görgény.

30. *semicolorata* Curt. — III. E montibus Tatrensibus tria specimina.

31. *aurantiaca* Burm. — I. Nagyvárad. VI. Mehádia.

32. *germanica* Eat. — II. Specimen unicum e Pilis-Marót.

33. *semicolorata* Curt. — I. Budapest, Tizfalu (Com. Bihar). II. Visegrád. III. Mosócz, Turcsek, Koritnicza, Tátraháza. IV. Ungvár. V. Retyezát. VI. Deliblat. VII. Slavonia.

Heptagenia Walsh.

34. *flavipennis* Duf. — I. Budapest. II. Pilis-Marót. IV. Feketepatak (Com. Zemplén).

35. *sulphurea* Müll. — I. Budapest, Kalocsa, complura specimina.

36. *flava* Ross. — I. Nagyvárad, Ujszeged. IV. S.-A.-Ujhely. VI. Grebenácz, Deliblat.

Ecdyurus Eat.

37. *helveticus* Eat. — VI. Mehádia, Baziás.

38. *venosus* Fabr. — I. Apud urbem Nagyvárad et in regione pagi Tizfalu dicti e fluvio Sebes-Körös ingenti numero nascitur initio mensis Junii. III. Koritnicza. IV. Jászó (Com. Abauj), Kassa, Bártfa, Hátszeg. VI. Mehádia, Baziás. VII. Slavonia. VIII. Fiume, Buccari.

39. *forcipula* Kollar. — I. Monyásza. III. Lucsivna, balneum Koritnicza. IV. Bártfa. VIII. Buccari.

40. *insignis* Eat. — I. Kebesd. IV. Szobráncz. V. Hátszeg, balneum Tusnád. VI. Mehádia.

41. *affinis* Eat. — III. Hucusque apud nos tantum e Koritnicza.

42. *lateralis* Curt. — IV. Bártfa, O.-Ruszka (Com. Zemplén).

D) ODONATA.

Fam. LIBELLULIDAE.

Leucorhinia Brittg.

1. *pectoralis* Charp. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa. II. Pannonhalma. III. Körmöczbánya (Com. Bars), Tátraháza (Com. Szepes).

2. *dubia* Lind. — III. Lacus Csorba, Tátraháza. IV. Mármaros sub monte Gutin.

Sympetrum Newm.
(*Diplax* Charp.)

3. *scoticum* Don. — III. Poprád (Com. Szepes), Mosócz (Com. Turócz). IV. Ungvár.

4. *pedemontanum* All. — III. Mosócz, Poprád, Rózsahegy, Nagy-Rőcze. V. Kolozsvár, Torda, Csik-Taplocza (Com. Csik).

5. *flaveolum* Linn. — I. Budapest, Csepel, Kecskemét, Kalocsa, Debreczen. II. Pannonhalma. III. Szent-Antal (Com. Hont), Virágvölgy (Com. Szepes), Rózsahegy, Tátraháza, Ujbánya, Borosznó. IV. Bártfa, vallis Fajna (Com. Mármaros). V. Csik-Taplocza, Nagyszeben.

6. *Fonscolombii* Selys. — I. Budapest, Kalocsa. VI. Palics, Ulma, Grebenácz. Ubique sat rarum.

7. *vulgatum* Linn. — I. Budapest, Kalocsa, Fehértó (Com. Csongrád). II. Öszöd, Kup (Com. Veszprém), Tapolcza, Bodajk, Savanyakut (Com. Sopron). III. Nagy-Rőcze, Virágvölgy (Com. Szepes), Ujbánya, Rózsahegy. V. Szucság (Com. Kolozs), Nagyszeben, Brassó, Nagy-Csür. VIII. Fiume.

v. *striolatum* Charp. — In omni zonarum regione observata minusve rara.

8. *meridionale* Selys. — In omni parte regni est species sat frequens.

9. *sanguineum* Müll. — Regione VIII. excepta ubique observatum et collectum.

10. *depressiusculum* Selys. — I. Budapest, Kalocsa. V. Szász-Sebes. VI. Ulma, Grebenácz (Com. Temes).

Crocothemis Brauer.

11. *erythraea* Brullé. — I. Budapest, Kalocsa, Nagyvárad. IV. Kassa, Szobráncz (Com. Ung). V. Nagyszeben. VI. Deliblat. VII Eszék. VIII. Novi.

Libellula Linn.

12. *depressa* Linn. — Regionibus altissimis montium exceptis ubique communis.

Leptetrum Newm.
(*Libellula* Hag.)

13. *fulvum* Müll. — I. Budapest, Kalocsa, Keczel, Nagyvárad, Szék-Udvar (Com. Arad). II. Lacus Fertő (teste Brauer). VI. Grebenácz.

14. *quadrimaculatum* Linn. — Fere in omni zonarum regione collecta.

Orthetrum Newm.
(*Libella* Brauer.)

15. *coerulescens* Fabr. — I. Budapest, Nagyvárad, Arad. II. Öszöd (Com. Somogy). III. Szliács, Beszterczebánya, Ujbánya. IV. Ungvár. V. Kolozsvár, Mező-Záh, Vizakna. VI. Grebenácz, Ulma, Deliblat.

16. *brunneum* Fonsc. — I. Budapest, Péczel, Pankota, Boros-Jenő (Com. Arad). II. Öszöd. V. Nagyszeben. VI. Deliblat. VII. Vrdnik. VIII. Buccari.

17. *cancellatum* Linn. — I. Budapest, Csepel, prædium Bugacz et Apaj, Monor, Kalocsa, Nagyvárad, Arad, Szeged, Makkos. II. Siófok, Öszöd, Tapolcza. IV. S.-A.-Ujhely, Homonna. VI. Dognácska, Deliblat, Palics. VII. Vrdnik.

18. *albistylum* Selys. — I. Budapest, Csepel, Kalocsa, Nagyvárad, Szeged, Szeghalom, Csaba. II. Siófok, Keszthely. IV. Homonna. V. Nagyszeben. VI. Deliblat. VII. Eszék (Com. Verőcze).

Somatochlora Selys.
(*Chlorosoma* Charp.)

19. *metallica* Lind. — III. Lacus Csorba, balneum Lucsivna (Com. Szepes). V. Csik-Taplocza (Com. Csik). Solum in regionibus subalpinis et alpinis.

20. *flavomaculata* Lind. — I. Budapest, Monor, Kalocsa. II. Pápa, Pannonhalma (Com. Győr). IV. Ungvár. V. Kolozsvár.

Epitheca Charp.

21. *bimaculata* Charp. — I. Apud Budapest valde rara, in insula Csepel ad Csép complura specimina collecta.

Cordulia Leach.

22. *aenea* Linn. — I. Budapest, Kalocsa. II. Pápa (Com. Veszprém). IV. Kassa. V. Szamos-Ujvár (Szolnok-Doboka), Gyula-Fehérvár (Com. Alsó-Fehér).

Fam. AESHNIDAE.

Lindenia De Haan.
(*Onychogomphus* Selys.)

1. *forcipata* Linn. — I. Budapest, montes Biharienses, Szeghalom (Com. Békés). II. Pilis-Marót. III. Körmöczbánya. IV. Homonna-Bresztó, Vihorlat (Com. Zemplén). V. Balneum Tusnád. VI. Oravicza. VII. Fužine.

Diastatomma Burm.
(*Ophiogomphus* Selys.)

2. *Caecilia* Fourcr. (*serpentina* Charp.). — II. Kup (Com. Veszprém), Kőszeg (Com. Vas). V. Brassó, Nagyszeben. Sat rara.

Aeshna Fabr.
(*Gomphus* Leach.)

3. *vulgatissima* Linn. — I. Nagyvárad, Tenke, Élesd (Com. Bihar), Szendrő (Com. Borsod). II. Berhida (Com. Veszprém), Tapolcza, Pápa, Kup, Kőszeg. IV. Szerencs, Csicsvaalja (Com. Zemplén), Bártfa. V. Szent-Erzsébet, Székely-Udvarhely, Borszék, Szamos-Ujvár, Vizakna, Nagyszeben. VI. Mehádia, Corniareva. VII. Fužine.

4. *flavipes* Charp. — I. Budapest, Kalocsa, Beél (Com. Bihar), Szeghalom. III. Nyitra. V. Vizakna. VII. Vrdnik.

Cordulegaster Leach.

5. *bidentatus* Selys. — II. Borostyánkő (Com. Vas). III. Ujbánya, Boroszno, Körmöczbánya, Koritnicza. IV. Bártfa. V. Kolozsvár, Vöröstorony (Ticera petrilor), Kelnek (Com. Szeben). VI. Ferenczfalva, Mehádia. VII. Velebit, Fužine, Raduć, Brušane.

Anax Leach.

6. *imperator* Leach (*formosus* Lind.). — I. Budapest, Monor, Kalocsa, Nagyvárad, Debreczen, Szeged. II. Pécs. III. Lucsivna. IV. S.-A.-Ujhely, Homonna. V. Tasnád, Székely-Udvarhely, Vizakna, Nagyszeben. VI. Deliblat. VII. Eszék, Fužine.

7. *Parthenope* Selys. — I. Budapest, prædium Bugacz ad urben Kecskemét, Kalocsa, Szeged. Sat rarus.

Hemianax Selys.
(*Cyrtosoma* Selys.)

8. *ephippiger* Burm. (*mediterraneus* Selys). — I. Hucusque tantum in unico specimine ad Budapest inventus. Videtur esse valde rarus.

Aeschna Illig.

9. *juncea* Linn. — III. Boroszno (Com. Zólyom), Tátrafüred, Tátraháza. V. Kolozsvár.

10. *colubercula* Harr. (*mixta* Latr.). — I. Budapest, Gyón (Com. Pest), Kalocsa, Debreczen. III. Ujbánya (Com. Bars), Lacus Csorba. IV. S.-A.-Ujhely, Ungvár, Kassa. V. Borszék, Tusnád, Nagyszeben, Kereszténysziget (Magas-Csurgó), Dus in montibus Cibiniensibus. VI. Zombor. VII. Vrdnik. VIII. Fiume.

11. *affinis* Lind. — I. Budapest, Gyón, Kalocsa, Rézbánya, Szeghalom, Csaba. II. Siófok, Öszöd, Pannonhalma, Zircz. III. Szent-Antal (Com. Hont), Ujbánya, Tátraháza. IV. Nagybánya (Com. Szatmár), Ungvár, Marmaros, Bártfa. V. Vizakna, Nagyszeben. VI. Ulma, Deliblat.

12. *cyanea* Latr. — I. Budapest. II. Pilis-Marót, Zircz, Kőszeg. Borostyánkő (Com. Vas). III. Pozsony, Lacus Csorba, Mosócz, Igló-Füred (Com. Szepes), Lucsivna, Tátraháza. IV. Bártfa, Ungvár, Sztropkó, Olyka (Com. Zemplén). V. Zilah. VIII. Fiume.

13. *grandis* Linn. — III. Balneum Lucsivna (Com. Szepes) specimen unicum. V. In regione fluvii Maros (teste Fuss, 7, pag. 20.). Apud nos valde rara.

14. *isoceles* Müll. (*rufescens* Lind.). — I. Budapest, Monor, Kalocsa, Nagyvárad. II. Pilis-Marót, Pannonhalma, Pécs. IV. Ungvár.

Brachytron Evans.

15. *Hafniense* Müll. (*pratense* Müll.). — I. Budapest, Monor, Kalocsa, Nyiregyháza. II. Pannonhalma, Pápa, Szombathely, Pécs. IV. S.-A.-Ujhely, Kassa. V. Tasnád, Gyula-Fehérvár, Nagyszeben.

Fam. AGRIONIDAE.

Agrion Fabr.

(*Calopteryx* Burm.)

1. *splendens* Harr. — Regionibus VII. et VIII. exceptis in planitie et collibus ubique observatum.
2. *virgo* Linn. — In regionibus montanis ubique collectum.

Platycnemis Charp.

3. *pennipes* Pall. — I. Budapest, Kalocsa, Nagyvárad, Beél, Rév, Szendrő, Szeghalom. II. Balatonfüred, Kup, Öszöd, Tapolcza, Zircz, Héviz, Borostyánkő. IV. S.-A.-Ujhely, Ungvár. V. Tasnád, Kolozsvár, Székely-Udvarhely, Szamosujvár, Vizakna, Nagyszeben, Nagycsür, Szászváros. VI. Berzászka, Grebenácz, VII. Eszék, Fužine.

Micronympha Kirby.

(*Ischnura* Charp.)

4. *pumilio* Charp. — I. Budapest, prædium Bugacz, Kalocsa, Nagyvárad, Beél, Kalota, Debreczen, Szőreg. II. Siófok, Fonyód, Szegzárd, Öszöd, Kup, Bodajk. III. Szliács, Beszterczebánya, Rózsahegy, Tátraháza. IV. Sárospatak, Homonna. V. Kolozsvár, Vizakna, Nagyszeben, Szász-Sebes, Nagycsür. VI. Palics, Jassenova, Grebenácz, Ulma, Deliblat. VIII. Buccari.
5. *elegans* Lind. — I. Budapest, prædium Apaj et Bugacz, Kalocsa, Nagyvárad, Debreczen, Hortobágy, Hadház, Szeghalom, Szeged, Makó, Szőreg, Vásárhely. II. Siófok, Héviz, Balatonfüred, Öszöd, Szárszó, Bodajk, Zircz. IV. Páczin. V. Vizakna, Nagyszeben. VI. Palics, Grebenácz, Deliblat, Kubin, Baziás. VII. Dálya, Vukovár. VIII. Buccari.

Enallagma Charp.

(*Agrion* Auct.)

6. *cyathigerum* Charp. — Est species valde communis, in omni zonarum regione observata et collecta.

Nehalennia Selys.

7. *speciosa* Charp. — I. Hucusque solum in Hungaria centrali ad Budapest inventa.

Coenagrion Kirby.

8. *pulchellum* Lind. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa, Hortobágy, Nagyvárad, Rézbánya, Csaba. II. Balatonfüred, Héviz. IV. S.-A.-Ujhely, Imreg, Páczin, Homonna, Nagy-Károly. V. Peér, Torda, Szent-Gothárd, Kocsárd, Vizakna, Nagyszeben. VI. Deliblat. VII. Eszék, Dálya.
9. *puella* Lind. — I. Budapest, Kalocsa, Nagyvárad. II. Héviz, Kup, Balaton-Füred, Szombathely, Pécs. III. Beszterczebánya, Rózsahegy, Poprád, Lucsivna, Tátraháza. IV. S.-A.-Ujhely, Homonna, Varannó, Veresmárth (Com. Mármaros), Nagy-Károly. V. Peér, Tasnád-Szántó, Szent-Gothárd, Szamos-Ujvár, Szucság, Erzsébetváros, Vizakna, Nagyszeben, Szász-Sebes. VI. Deliblat, Jassenova.
10. *hastulatum* Charp. — III. Hucusque tantum ad Tátraháza (Com. Szepes) collectum.
11. *ornatum* Selys. — I. Budapest, Kalocsa, Nagyvárad. II. Siófok, Keszthely, Tapolcza. III. Koritnicza. IV. S.-A.-Ujhely, Bártfa, Ungvár. V. Torda. VII. Vukovár.

Pyrrhosoma Charp.

12. *tenellum* Vill. — I. Tantum in Hungaria centrali ad Budapest collectum.
13. *nymphula* Sulz. (*minium* Harr.). — III. In regione septentrionali-occidentali ad Lacum Csorba (Csorbaitó) numerose collegi et postea etiam ad Tátraháza (Com. Szepes) inventum.

Erythromma Charp.

14. *najas* Hans. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa. II. Tapolcza, Héviz. IV. S.-A.-Ujhely. V. Pele-Szarvad, Tasnád-Szántó (Com. Szilágy), Szamos-Ujvár (Com. Szolnok-Doboka).
15. *viridulum* Charp. — I. Budapest, Szeged, Makó. IV. Kassa. V. Nagyszeben. VI. Palics. VII. Dálya (Com. Verőcze).

Lestes Leach.

16. *macrostigma* Eversm. — I. Budapest, rara. V. Nagyszeben.
17. *viridis* Lind. — I. Budapest: Svábhegy, rara.
18. *Dryas* Kirby (*nympha* Selys.). — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa. II. Öszöd (Com. Somogy), Kup (Com. Veszprém). III. Bártfa, Tátraháza. IV. Ungvár. V. Dicső-Szentmárton, Tusnád, Nagyszeben, Kis-Torony (Com. Szeben). VI. Mehádia, Deliblat.
19. *sponsa* Hans. — I. Budapest, Kalocsa, Nagyvárad, Arad. II. Öszöd, Szárszó, Simontornya. III. Ujbánya, Tátraháza, Poprád. IV. Homonna, Ungvár. V. Nagyszeben. VII. Dálya.
20. *virens* Charp. — I. Budapest, Kalocsa, Gyón, Nagyvárad, Szeghalom, Nyiregyháza. II. Pápa, Öszöd, Szárszó, Siófok. III. Ujbánya. IV. Páczin,

Imreg, Homonna, Szobráncz, Ungvár. V. Torda, Szamos-Ujvár, Nagyszeben. VI. Grebenácz, Jassenova, Kubin. VII. Eszék, Dálya.

21. *barbarus* Fabr. — In omni zonarum regione collectus.

Sympycna Charp.

22. *fusca* Lind. — I. Budapest, Kalocsa, Gyón, Debreczen, Szeghalom, Hortobágy, Algyő, Derekegyház, Szentes, Csongrád, Szatymáz, Makó. II. Balaton-Füred, Székesfehérvár, Tapolcza, Pápa, Zircz, Öszöd, Simontornya, Lacus Fertő (teste Brauer). III. Nagy-Rőcze, Ujbánya. IV. Kis-Azar, S.-A.-Ujhely, Ungvár, Bártfa. V. Tasnád, Székely-Udvarhely, Nagyszeben. VI. Ferenczfalva, Orsova, Mehádia, Kubin, Deliblat. VIII. Fiume.

Conspectus familiarum, generum specierumque.

Familia	Genus	Species	Familia	Genus	Species
1. Termitidæ	1	1	5. Libellulidæ	9	22
2. Psocidæ	11	21	6. Aeshnidæ	8	15
3. Perlidæ	8	25	7. Agrionidæ	10	22
4. Ephemeridæ	19	42		66	148

Summa

Familiarum	7
Generum	66
Specierum	148

Ordo. NEUROPTERA.

Auctore Alexandro Mocsáry.

A Reczésszárnyú rovarok *(Neuroptera)* is ama rovarrendek közé tartoznak, a melyekről hazánkra vonatkozólag a külföld irodalmában csak kevés adatot találunk följegyezve. Ennek oka részben az is, hogy az érdekes, de tanulmányozásra szerfölött nehéz rovarcsoportnak hazánkban eddig specialis mivelője még nem volt.

Magam is csak részben, s főleg csak egyes családjaikban tanulmányoztam őket. S midőn a kir. magy. Természettudományi Társulat elhatározta, hogy hazánk ezer éves fennállásának emlékére kiadja a magyar állam állatvilágának, a tudomány mai állásának megfelelőleg, részletes lelethelyekkel ellátott katalógusát, s engemet a Neuropterák összeállításával is megbízott: már tisztában voltam azzal, hogy a Nemzeti Múzeum ilynemű, meglehetősen tekintélyes gyüjteményét, a tárgy nehézsége s az idő rövidsége miatt, külföldi speciálisták közreműködése nélkül egész terjedelmében feldolgozni nem lehet. Elvállaltam mégis a megbizást, mert reméltem, hogy sikerülni fog megnyernem segítségül a Neuropterák legelső búvárát, az angol Mac Lachlan-t, annál is inkább, mert az európai reczésszárnyú rovarokról irt alapvető klasszikus nagy művében csupán csak két adatot találtam hazánkra vonatkozólag följegyezve. Mac Lachlan azonban, nagyon szíves levélben, meggyöngült szemeire hivatkozva, kérésemnek nem felelhetett meg; de maga helyett egyik legelső tanitványát, a Neuropterák egyik kiváló mivelőjét, Klapálek Ferencz wittingaui tanárt ajánlotta, ki is kérésemre a legnagyobb készséggel és örömmel vállalkozott kétséges és előttem ismeretlen fajaink revíziójára és meghatározására.

Most tehát, midőn a Nemzeti Múzeum meglehetősen gazdag és szép ilynemü gyüjteménye már szabatosan meghatározva, e rovar-rend könnyebb tanulmányozására a biztos alap megvetve, s a fajok katalógusa el van készitve: kell, hogy hálás köszönettel emlékezzem meg a fennevezett urakról.

Neuroptera etiam iis Insectorum ordinibus associanda sunt, de quibus, quod patriam nostram attinet, vix quidquam in exteris literarum monumentis consignatum invenias. Cuius rei ratio inter alia etiam ex eo petenda est, quod ad hæc usque tempora nemo apud nos fuerit, qui pulchræ huic, at difficillimæ entomologiæ parti operam navaverit.

Ipse ego, cui Neuroptera recensenda obtigerunt, nonnisi aliquibus familiis operam dedi. Unde cum regiæ scientiarum naturalium societati hungaricæ placuisset in memoriam regni Hungariæ mille abhinc annis constituti catalogum systematicum faunæ hungaricæ edere, qui ordine atque dispositione præsenti literarum conditioni responderet et distinctis nominibus omnia loca, in quibus singula Insecta apud nos inventa fuissent, exhiberet, inde ab initio mihi persuasum fuit, collectionem sat amplam Musæi Nationalis confici non posse, nisi inter exteros, qui in hac scientia præcipui essent, aliquem in muneris societatem nactus essem. Enimvero sperabam fore, ut primus Neuropterorum cultor, Mac Lachlan id muneris in se susciperet, eo vel magis, quod in opere classico, quod de hoc Insectorum ordine composuit, duæ tantum species originis hungaricæ locum habeant. Attamen vir clarissimus ob oculos nimium debilitatos desiderio meo satisfacere non potuit. Jndicavit tamen, ad quem me converterem, Dom. Franciscum Klapálek, professorem wittingaviensem, huius disciplinæ imprime peritum, qui summa benevolentia paratum se ostendit ad species mihi ignotas vel dubias determinandas collectionemque accurato examine perscrutandam.

Unde cum collectio Musæi Nationalis Hungarici, quantum ad hunc ordinem pertinet, satis ampla et pulchra suis nominibus distincta sit certumque cultoribus fundamentum præbeat, specierum quoque index confectus sit: facere non possum, quin viros supra laudatos grati animi causa commemorem.

A részletekre áttérve, megkisérlem vázolni, hogy áll eddig a magyarországi Neuropterák ismerete a külföld irodalmában.

A klasszikus, régi irók munkáiban Magyarországot még megemlitve sem találjuk. A legelső adat Piller és Mittelpacher (25), budai egyetemi tanárok munkájában fordul elő, kik 1783-ban a *Phryganea luctuosa*-t (*Stenophylax luctuosus* Pill. et Mitt.) irják és rajzolják le Szlavoniából. Csaknem 60 évvel később, 1842-ben a franczia Rambur (26) a Neuropterákról szóló nagy munkájában 6 fajt emlit föl Magyarországból, melyeket Kindermann Albert Budáról küldött volt neki. 1848-ban Kolenati (16), a Frivaldszky Imrétől kapott példányokról már 14 fajt ir le. Egyes adatokkal találkozunk Fuss (5) és Hagen (11) dolgozataiban is; nagyobb számu adatokat Brauer és Loew (2), de különösen Brauernek (3) az európai Neuropterákról irott katalogusában találunk, hol már 54 faj van emlitve hazánkból. Mac Lachlan (19) klasszikus nagy müvében — mint mondottuk — csupán csak 2 fajra akadunk.

A magyar buvárok munkálataiban a legtöbb adat Frivaldszky János (6—10) és Mocsáry Sándor (20—24) dolgozataiban van fölsorolva. Biró Lajos (1) a magyarországi hangyaleső fajokat *(Myrmeleonidae)* csinos kis monografiában dolgozta ki a Nemzeti Múzeum gyüjteménye alapján. A Kertész Miksa (4) közzétette adatok csak az én dolgozataim alapján vannak közölve. — A többi, e téren megjelent enumeratió jóformán figyelmet sem érdemel.

Ilyen kevés, mondhatnám, nagyon is kevés adatból áll mindaz, a mi Magyarország reczésszárnyú rovarainak faunáját illetőleg a külföldi és hazai irodalomban található.

De midőn ezeket itt lelkiismeretesen elmondottam, kell, hogy őszinte elismeréssel adózzak azoknak is, kik hazánk ez érdekes faunáját gyüjteséikkel gyarapitották s lehetővé tették, hogy a Nemzeti Múzeum eme gyüjteménye is ma már meglehetősen szépnek és gazdagnak mondható. Azok, kik a Múzeum gyüjteményének emeléséhez gyüjteséikkel hozzájárultak a következők: Anker Rudolf, Biró Lajos, Cerva Frigyes, Chyzer Kornél dr., Csiki Ernő, Daday Jenő dr., Frivaldszky János, Herman Ottó, Horváth Géza dr., Kertész Kálmán dr., Kohaut Rezső, Kuthy Dezső, Madarász Gyula dr., Méhelÿ Lajos, Merkl Ede, Padewieth M., Pável János, Szépligeti Győző, Szilády Zoltán, Thalhammer János, Vellay Imre, Wachsmann Ferencz és János s Xántus János.

Ha már most eme gyüjtések alapján hazánk ilynemü faunáját röviden jellemezni akarnók: az mintegy keveréke a nyugati, a középeurópai, dél-

Ut ad particularia transeam, in animo est, qui sit status Neuropterorum hungaricorum apud exteros auctores, paucis enumerare.

Apud scriptores veteres classicos nulla fit Hungariæ mentio. Primum invenitur indicium in opere Pilleri et Mittelpacheri (25) in universitate budensi professorum, qui anno 1783. descripserunt *Phryganeam luctuosam (Stenophylax luctuosus* Pill. et Mitt.) e Slavonia eandemque delineatione illustrarunt. Sexaginta fere annis postea Rambur, gallus, in magno, quod de Neuropteris composuit opere (26) sex species affert Hungariam incolentes, quas ab Alberto Kindermann Buda acceperat. Anno 1848. Kolenati (16) ex iis, quæ illi ab Emerico Frivaldszky submissa fuerant, exemplaribus iam 14 species enumerat et describit. Sparsim invenias indicia apud Fuss (5) et Hagen (11), maiori numero apud Brauer et Loew (2); Brauer in indice Neuropterorum Europæ indigenarum (3) iam 54 species commemorat. In opere classico Mac Lachlani supra laudato nonnisi duæ species hungaricæ occurrunt.

Elucubrationibus nostrorum plurima invenire est apud Joannem Frivaldszky (6—10) et Alexandrum Mocsáry (20—24). Ludovicus Biró Myrmeleonidas Musæi Hungarici confecit (1). Demum Maximilianus Kertész (4) indices suos nonnisi elucubrationibus meis innixus composuit. — Reliqua enumerare supersedeo.

Et hæc sunt eaque paucissima, quæ de fauna Hungariæ neuropterologica apud nostros et exteros literis consignata sunt.

His fidelissime enumeratis eo maiorem laudem merentur ii, qui hanc faunam colligendo auxerunt idque effecerunt, ut collectio Musæi Nationalis Hungarici etiam, quod hunc ordinem attinet, pulchra ac ampla dici possit. Viri, qui diligenter Insecta colligendo, res Musæi nostri iuvarunt, sunt: R. Anker, L. Biró, Fr. Cerva, Dr. C. Chyzer, E. Csiki, Dr. E. Daday, Joannes Frivaldszky, O. Herman, Dr. G. Horváth, Dr. C. Kertész, R. Kohaut, D. Kuthy, Dr. J. Madarász, L. Méhelÿ, E. Merkl, M. Padewieth, J. Pável, V. Szépligeti, Z. Szilády, J. Thalhammer, E. Vellay, Fr. et J. Wachsmann et J. Xántus.

Porro si faunæ nostræ characterem determinare voluerimus, dicendum eam ex faunis occidentali, media, australi et ex parte mediterranea mixtam esse; cuius rei ratio in eo sita est, quod animalia

keleti és részben a mediterrán faunának; a mi jobbára, e többnyire vizben élő és fejlődő, vagy a futó homokhoz kötött állatok széles elterjedésében találja magyarázatát. Önálló, sajátos fajt csak néhányat tudunk felmutatni, melyeket legujabban Klapálek Ferencz ur (14—15) a Nemzeti Múzeum gyüjteményéből a Természetrajzi Füzetek-ben irt le; de e fajok is, ha másutt nem, legalább a Balkánfélszigeten előbb-utóbb megtalálhatók lesznek.

A mi végre azt a kérdést illeti, hogy mennyire van már kikutatva hazánk ilynemü faunája, — erre nézve tiszta meggyőződéssel felelhetjük, hogy a már meglevö adatok a mellett tanúskodnak, hogy a Pseudo-Neuropterákkal együtt felsorolt 362 faj hazánk ilynemű állatvilágának érdekességét, gazdagságát bizonyitja, s hogy e tér a későbbi buvároknak is eléggé háladatos leend még.

Budapesten, 1899. április hó 10-én.

hæc in aquosis præsertim viventia et crescentia vel sabuletis inhærentia per latissimos fines disperguntur. Species patriæ nostræ proprias paucas solum invenias, quas Dom. Franciscus Klapálek in fasciculis «Természetrajzi Füzetek» ex collectione Musæi Nationalis Hungarici descripsit; ast hæ quoque species, si non alibi, certo in peninsula Balcanica serius ocius invenientur.

Postremo, si quis quærat, num fauna neuropterologica apud nos omnino explorata sit, iure merito respondeas indicia iam nota satis evincere, faunam patriam et divitem satis esse et omni attentione dignam; attamen ex specierum numero qui, Pseudo-Neuropteris etiam rencensitis, ad 362 ascendit, concludi posse, campum amplissimum etiam iis patere, qui hanc disciplinam colendam suscepturi sunt.

Budapestini, die 10. mensis Aprilis 1899.

LITTERATURA.

1. Biró L. *A magyarországi hangyaleső fajok.* (Rovartani Lapok. II. 1885. p. 177, 193. — *Les Myrmeleonides de la Hongrie.* Ibid. Revue, p. XXXIV.)
2. Brauer, F. und Löw, Fr. *Neuroptera Austriaca. Die im Erzherzogthum Oesterreich bis jetzt aufgefundenen Neuropteren.* Wien, 1857.
3. Brauer F. *Die Neuropteren Europas und insbesondere Oesterreichs.* (Festschrift zur Feier des fünfundzwanzigjährigen Bestehens des k. k zoolog.-botan. Gesellschaft in Wien. Wien, 1876, p. 265.)
4. Bunyitay V. *Nagyvárad természetrajza.* Budapest, 1890. — *Nagyvárad és vidékének állatvilága.* Irta Kertész Miksa. *Neuroptera. Reczésszárnyuak*, p. 209.
5. Fuss, C. *Notizen und Beiträge zur Insektenfauna Siebenbürgens* (Verhandlungen und Mittheilungen des siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermanstadt. IV. Jhrg. 1853, p. 207.) (*Ascalaphus longicornis* Bkh. = *hungaricus* Ramb.)
6. Frivaldszky J. *Adatok Mármarosmegye faunájához* (M. T. Akad. mathem. és természettud. Közlemények. IX. 1871, p. 230.)
7. — *A Herkulesfürdő vidékén élő állatok* (A Herkulesfürdő és környéke. Irta Munk Manó. Az állattani részt Frivaldszky János. Budapest, 1872. — *Reczésröpüek*, p. 97.)
8. — *Állattani kirándulásaim Orsova, Mehádia és Korniareva vidékein* (A magy. orvosok és természetvizsgálók XVI. nagygyülésének történeti vázlata és munkálatai. Pest, 1873.)
9. — *Adatok Temes és Krassó megyék faunájához. Data ad faunam Hungariae meridionalis Comitatuum: Temes et Krassó* (M. T. Akad. mathem. és természettud. Közlem. XIII. 1876.)
10. — *Budapest és környéke állattani tekintetben* (Budapest és környéke orvosi és természettudományi helyirata. Irta Margó Tivadar. Budapest, 1879. — *Neuroptera. Reczésröpüek.* Frivaldszky János-tól, p. 49.)
11. Hagen, H. *Hemerobidarum synopsis synonymica* (Stettiner entom. Zeitung. XXVII. 1866, p. 369.)
12. — *Beiträge zur Kenntniss der Phryganiden* (Verhandlung. d. zoolog.-botan. Gesellsch. in Wien. Wien, 1876, p. 265.)
13. Herman O. *Állattani közlemények* (Az erdélyi Muzeum-Egylet Évkönyvei. V. köt. 1868—1870, p. 92.). (*Ascalaphus italicus = hungaricus* Ramb. sec spec. typ.!)
14. Klapálek F. *Fünf neue Trichopteren-Arten aus Ungarn* (Természetrajzi Füzetek. XXI. 1898, p. 488).
15. — *Bemerkungen über die Trichopteren- und Neuropteren-Fauna Ungarn's* (Ibid. XXII. 1899, p. 429.)
16. Kolenati, Fr. *Genera et species Trichopterorum.* Pars prior. *Heteropalpoidea.* Accedunt tabulæ tres. Ex Actis Regiæ Bohemicæ Societatis Scientiarum. Pragæ, 1848.
17. Kunz A. dr. *Szombathely rendezett tanácsú város monographiája.* Szombathely, 1880. *Reczésszárnyuak*, p. 24. (Enumeratio specierum aliquot.)
18. Löw, Fr. *Beitrag zur Kenntniss der Coniopterygiden* (Sitzungsberichte d. k. Akad. der Wissenschaft in Wien. Mathem.-naturwissensch. Classe. I. Abtheil. Bd. XCI. 1885, p. 73.)
19. Mac Lachlan, R. *A Monographic Revision and Synopsis of the Trichoptera of the European Fauna.* London and Berlin, 1874—1880. et Supplement.
20. Mocsáry S. *Adatok Biharmegye faunájához. Data ad faunam Hungariae orientalis Comitatus Bihar* (M. T. Akad. mathem. és természettudom. Közlemények. X. 1872, p. 163.)
21. — *Adatok Zemplén és Ung megyék faunájához* (Ibid. XII. 1875, p. 176.)
22. — *Bihar és Hajdu megyék hártya-, két-, reczés-, egyenes- és félröpüi. Hymenoptera, Diptera, Neuroptera, Orthoptera et Hemiptera Hungariae Comitatuum: Bihar et Hajdu* (Ibid. XIV. 1876.)
23. — *Adatok Zólyom és Liptó megyék faunájához. Data ad faunam Hungariae septentrionalis Comitatuum: Zólyom et Liptó).* (Ibid. XV. 1878.)
24. — *Délmagyarország állattani tekintetben* (Helyrajzi Emlékmü a magy. orvosok és természetvizsgálók 1886. évi Buziás-Temesvárott megtartott XXIII. vándorgyülésére). Irta Tömösváry Ödön. — *Reczésszárnyuak* (Neuroptera). Összeállitotta: Mocsáry Sándor, p. 157.
25. Piller, M. et Mittelpacher L. *Iter per Poseganam Slavoniae provinciam mensibus Junio et Julio anno 1782 susceptum.* Budae, 1783. (Phryganea luctuosa Pill. et Mitt. p. 85. Tab. VI. fig. 6.)
26. Rambur, P. *Histoire naturelle des Insectes. Nèuroptères.* Paris, 1842.
27. Shuck J. dr. *Hajdumegye leirása.* A magy. orvosok és természetvizsgálók 1882. Debreczenben tartott XXII. nagygyülésének alkalmából. Debreczen, 1882. — *A megye állatvilágának rövid áttekintése.* Dr. Shuck József-től. *Reczésröpüek*, p. 159. (Publicatio cum datis ex parte falsis.)
28. Simonkai L. *Aradvármegye és Arad szabad királyi város természetrajzi leirása. Aradmegye és Aradváros állatvilága.* Arad, 1893. *Neuroptera.* p. 109. (Nonnulla tantum animalia, ex parte false determinata.)

Ordo. NEUROPTERA.

A) TRICHOPTERA.

Fam. PHRYGANEIDAE.

Neuronia Leach.

1. *ruficrus* Scop. — III. Lacus Csorba (Csorbai-tó). Poprád (Com. Szepes). IV. Mármaros.
2. *reticulata* Linn. — I. Péczel (Com. Pest). II. Pilis-Marót. VI. Grebenácz (Com. Temes).
3. *clathrata* Kol. — II. Hucusque tantum ad Pápa.

Phryganea Linn.

4. *grandis* Linn. — I. Budapest, Haraszti, Kalocsa. II. Siófok, Fonyód, Tapolcza, Szent-Gothárd (Com. Vas), Szombathely. V. Mező-Záh.
5. *striata* Linn. — III. Ad Lacum Csorba (Com. Liptó) collegi.
6. *varia* Fabr. — I. Budapest, Csepel, Gyón, Mártonkáta. II. Siófok, Fonyód, Pápa, Szent-Gothárd, Pécs. III. Lacus Csorba. V. Balneum Tusnád.
7. *obsoleta* Hag. — III. Pariter tantum ad Lacum Csorba inveni.

Agrypnia Curt.

8. *pagetana* Curt. — I. Budapest, Csepel, Hadház (Com. Hajdu).

Fam. LIMNOPHILIDAE.

Colpotaulius Kol.

1. *incisus* Curt. — I. Budapest. II. Kenese (Com. Veszprém), Szántód (Com. Somogy).

Grammotaulius Kol.

2. *nitidus* Müll. (*lineola* Schrk.). — I. Budapest, Csepel, Kecskemét, Debreczen. II. Parád, Kup, Pécs, Kőszeg. V. Tasnád-Szántó, Szent-Gothárd (Com. Hunyad). VII. Pakracz.
3. *atomarius* Fabr. — I. Budapest, Kecskemét, Nagyvárad, Rév. II. Balaton-Füred, Pápa, Zircz, Szegzárd. IV. S.-A.-Ujhely, Párnó, Komjáti, Ungvár, Bártfa, Jurko-Volya. V. Peér, Pele-Szarvad, Mező-Záh.

Glyphotaelius Steph.

4. *pellucidus* Retz. — I. Budapest. IV. Nagy-Károly.

Limnophilus Leach.

5. *rhombicus* Linn. — I. Budapest, Dabas. II. Pécs, Pápa, Szombathely. III. Mosócz (Com. Turócz). Lucsivna, Lacus Csorba. IV. Komjáti. VI. Ferenczfalva. VIII. Cirkvenica.
6. *flavicornis* Fabr. — I. Budapest, Csepel, Debreczen, Nagyvárad, Belényes. II. Pécs, Fonyód, Tapolcza. IV. S.-A.-Ujhely, Komjáti, Ungvár, Mármaros, Nagy-Károly. V. Nagyszeben, VI. Orsova, Mehádia, Corniareva, Ulma. VII. Dálya. VIII. Zengg.
7. *decipiens* Kol. — I. Budapest, Csepel, Kecskemét. III. Vallis Kolbach, Mosócz, Lacus Csorba. IV. Vallis Fajna (Com. Mármaros). V. Tasnád-Szántó (Com. Szilágy), mons Retyezát.
8. *stigma* Curt. — III. Hucusque solum ad oppidum Mosócz (Com. Turócz).
9. *xanthodes* Mc Lachl. — I. Budapest, Csepel, Kisujszállás. IV. Nagy-Károly. V. Tasnád, Tasnád-Szántó.
10. *lunatus* Curt. (*vitratus* Brau.). — I. Budapest. II. Pécs, Békás-Megyer. IV. Beregszász, Komjáti.
11. *vittatus* Fabr. (*flavus* Kol.). — I. Budapest, Csepel, prædium Apaj. II. Pécs, Szántód (Com. Somogy), Pápa, Kup (Com. Veszprem), Zircz. III. Lucsivna. IV. S.-A.-Ujhely, Komjáti, Homonna, Simonka, mons Magura, Mármaros.
12. *ignavus* Mc Lachl. — III. Specimen unicum e balneo Lucsivna (Com. Szepes).
13. *affinis* Curt. (*anastomosis* Kol.). — I. Budapest, Csepel, Dömsöd. II. Zircz, Szántód, Berhida. V. Nagyszeben.
14. *auricula* Curt. (*fenestrata* Kol.). — I. Budapest, Nagyvárad. II. Kenese. III. Kis-Tapolcsány. IV. Komjáti, Marmaros. VI. Grebenácz.
15. *griseus* Linn. — I. Budapest, prædium Apaj, Hadház, Nagyvárad, montes Biharienses. II. Siófok, Lelle, Kenese, Balatonfüred, Szántód, Pápa, Zircz. III. Lucski, Koritnicza, Lacus Csorba, Hági, Tátraháza. IV. S.-A.-Ujhely

Tokaj, Forró, Komjáti, Varannó, Mármaros, Beregszász. V. Tasnád, Nagyszeben, mons Retyezát. VI. Grebenácz.

16. *bipunctatus* Curt. — I. Budapest, Csepel, Nagyvárad. II. Szántód, Lelle. III. Turcsek. IV. Homonna, Bereczki. V. Magura, Brassó. VI. Corniareva, balneum Marilla.

17. *extricatus* Mc Lachl. (*Desmotaulius hirsutus* Kol.). — Secundum Kolenati (16, pag. 57.) est etiam Hungariæ incola.

18. *hirsutus* Pict. — IV. Tantum specimen unicum e Tállya.

19. *fuscicornis* Ramb. — I. Csepel, Nagyvárad. IV. Tolcsva, Olyka.

Anabolia Steph.

20. *soror* Mc Lachl. (*Stratmophorus fuscus* Kol.). — III. Solummodo e Mosócz (Com Turócz).

21. *laevis* Zett. — I. Budapest, Csepel. III. Mosócz. IV. Jászó (Com. Abauj).

Phacopteryx Kol.

22. *brevipennis* Curt. — VII. Duo specimina e Pakracz (Com. Verőcze).

Stenophylax Kol.

23. *alpestris* Kol. — V. Görgény (Com. Maros-Torda). VI. Ferenczfalva.

24. *picicornis* Pict. (*puberulus* Kol.) — Hungaria, teste Kolenati (16, pag. 63.)

25. *rotundipennis* Brau. — III. Hucusque solum ad Mosócz (Com. Turócz).

26. *nigricornis* Pict. — II. Pécs. III. Balneum Koritnicza (Com. Liptó).

27. *stellatus* Curt. — III. Mosócz. IV. S.-A.-Ujhely.

28. *latipennis* Curt. (*Anabolia pantherina* Brauer.) III. Montes Tátra, Hági (Com. Szepes). IV. Mármaros. V. Mons Retyezát.

29. *luctuosus* Pill. et Mitt. (*gigantea* Brauer.). — I. Vaskóh. III. Borosznó. IV. Bártfa. V. Görgény, Nagyvizvölgy (Com. Hunyad), mons Retyezát. VII. Velika (teste Pill. et Mitt.).

30. *millenii* Klap. — V. Dus, in montibus Cibiniensibus. VI. Ferenczfalva, Corniareva, Mehádia, mons Retyezát. Solum Hungariæ incola.

31. *permistus* Mc Lachl. — I. Csepel; antrum Igricz, antrum Chyzeri, antrum ad pagum Vársonkolyos, omnia in Comitatu Bihariensi.

32. *speluncarum* Mc Lachl. — V. Görgény. VI. Mehádia.

33. *vibex* Curt. — I. Antrum Igricz nominatum. II. Pécs.

Mesophylax Mc. Lachl.

34. *impunctatus* Mc Lachl. — I. Duo specimina e Monor (Com. Pest).

Micropterna Stein.

35. *testacea* Gmel. — I. In antris Igricz et ad pagum Fericse in Comitatu Bihariensi.

36. *nycterobia* Mc Lachl. — I. Antrum Igricz. VI. Antrum Coroninii ad Mehádiam. VII. Brušane, Ostrovica.

37. *sequax* Mc Lachl. — I. Antrum Igricz. VI. Mehádia. VIII. Buccari.

Halesus Steph.

38. *tesselatus* Ramb. — III. Hucusque tantum ad Mosócz inventus.

39. *digitatus* Schrk. — V. Specimen unicum e Nagyszeben.

40. *auricollis* Pict. (*nigricornis* Brauer.). — I. Solum ad Budapest apud nos.

41. *uncatus* Brauer. — V. Tria specimina e monte Retyezát (Com. Hunyad).

42. *nepos* Mc Lachl. — V. Complura specimina pariter e monte Retyezát.

Catadice Mc Lachl.

43. *tenella* Klap. — V. Tria specimina e monte Retyezát. Solum Hungariæ civis.

Drusus Steph.

44. *discolor* Ramb. — I. Montes Biharienses (ad fluvium Szamos). III. Vallis ad pagum Demény-falva, Koritnicza, Lacus Csorba. VI. Mehádia.

45. *brunneus* Klap. — III. Borosznó. IV. Mármaros. V. Mons Retyezát. VI. Mehádia, Corniareva. Tantum Hungariæ terram colit.

46. *trifidus* Mc Lachl. — III. Exemplar unum e Tátraháza.

47. *Muelleri* Mc Lachl. — VI. Specimen unicum e Mehádia.

Peltostomis Kol.

48. *sudetica* Kol. — III. Tria specimina ad balneum Koritnicza inveni.

Ecclisopteryx Kol.

49. *guttata* Pict. — V. Görgény, mons Retyezát (Com. Hunyad).

50. *madida* Mc Lachl. — III. Hági, Tátra. V. Mons Retyezát.

Chaetopteryx Steph.

51. *villosa* Fabr. — Hungaria (teste Kolenati). VIII. Fiume.

52. *major* Mc Lachl. — II. Pécs, specimen tantum unicum.

Apatania Kol.

53. *fimbriata* Pict. — III. Balneum Koritnicza, Tátra.

Fam. SERICOSTOMATIDAE.

Sericostoma Latr.

1. *personatum* Spence. — III. Specimen tantum unicum e valle Hermanez.
2. *Schneideri* Kol. — I. Budapest, duo specimina.

Notidobia Steph.

3. *ciliaris* Linn. — I. Budapest, Farkasd. II. Visegrád. III. Borosznó, Koritnicza. IV. Mármaros. VI. Mehádia, Corniareva.

Goëra Leach.

4. *pilosa* Fabr. (*capillatum* Pict.) — I. Budapest, Nagyvárad. II. Pápa, Lacus Fertő (teste Brauer). III. Facsko (Com. Trencsén), Mosócz, Koritnicza. IV. Komjáti. VII. Fužine.

Silo Curt.

5. *pallipes* Fabr. — III. Borosznó. VIII. Buccari.
6. *piceus* Brauer. — I. Rézbánya (Com. Bihar). III. Facsko, Poprád. VI. Krassova, Ferenczfalva, Mehádia, Kazán.

Brachycentrus Curt.

7. *subnubilus* Curt. — I. Budapest. II. Simontornya.
8. *montanus* Klap. — VI. Mehádia, Kazán.

Micrasema Mc Lachl.

9. *minimum* Mc Lachl. — VI. Mehádia, duo specimina.

Lepidostoma Ramb.

10. *hirtum* Fabr. — I. Budapest. III. Turcsek. VI. Krassova, Orsova, Grebenácz.

Lasiocephala Costa.

11. *basalis* Kol. — III. Balneum Koritnicza. V. Mons Retyezát.

Fam. LEPTOCERIDAE.

Beraea Steph.

1. *pullata* Curt. — I. Budapest. III. Turcsek (Com. Turócz). V. Görgény. VI. Grebenácz.
2. *articularis* Pict. — VI. Mehádia, Grebenácz. VII. Gospić, Raduć.

Odontocerum Leach.

3. *albicorne* Scop. — III. Borosznó (Com. Zólyom), balneum Koritnicza, Alpes Prasiva (Com. Liptó).

Leptocerus Leach.

4. *nigronervosus* Retz. — III. Mosócz (Com. Turócz). VI. Ulma (Com. Temes).
5. *fulvus* Ramb. — I. Budapest. V. Szent-Gothárd (Com. Szolnok-Doboka).
6. *senilis* Burm. — I. Budapest, duo specimina.
7. *annulicornis* Steph. — I. Budapest. VI. Deliblat (Com. Temes).
8. *aterrimus* Steph. (? *tineoides* Brauer.). — I. Budapest. II. Pápa. III. Turcsek.
9. *cinereus* Curt. — I. Hucusque apud nos tantum ad Budapest.
10. *albifrons* Linn. — I. Csepel, Nagyvárad, Kebesd (Com. Bihar). III. Facsko. IV. Szinna. V. Tusnád.
11. *commutatus* Mc Lachl. — III. Complura specimina e Borosznó (Com. Zólyom).
12. *bilineatus* Linn. — III. Koritnicza, duo exemplaria.
13. *dissimilis* Steph. — I. Apud nos solum ad Budapest.

Mystacides Latr.

14. *nigra* Linn. — I. Budapest. II. Pápa. III. Balneum Lucsivna. IV. Szinna. VI. Grebenácz.
15. *azurea* Linn. — IV. Hucusque solum e Szinna.
16. *longicornis* Linn. (*quadrifasciata* Fabr.). — I. Budapest. V. Mező-Záh. VII. Dálya.

Triaenodes Mc Lachl.

17. *conspersa* Ramb. — I. Budapest. II. Mohács. V. Szent-Gothárd.

Oecetis Mc Lachl.

18. *ochracea* Curt. — I. Budapest, Csepel, Kecskemét. IV. Homonna. VI. Palics, Deliblat. VII. Pétervárad, Dálya.
19. *furva* Ramb. — I. Budapest. V. Rea (Com. Hunyad).
20. *lacustris* Pict. — I. Hucusque tantum e Budapest.
21. *tripunctata* Fabr. — I. Budapest. VI. Balincz (Com. Krassó-Szörény).

Setodes Ramb.

22. *tineiformis* Curt. — VII. Specimen unicum e Dálya (Com. Verőcze).

23. *punctata* Fabr. — I. Budapest. II. Mohács. VI. Grebenácz, Deliblat, Kazán.
24. *viridis* Fourcr. — VI. Hucusque tantum e Deliblat.

Fam. HYDROPSYCHIDAE.

Hydropsyche Pict.

1. *pellucidula* Curt. (*versicolor* Brau.). — I. Budapest. III. Borosznó, Ujbánya. VI. Mehádia.
2. *angustipennis* Curt. — I. Budapest. III. Mosócz (Com. Turócz).
3. *ornatula* Mc Lachl. (*atomaria* Hag.). — Secundum Mc Lachlan est etiam Hungariæ incola (19, pag. 364.)
4. *saxonica* Mc Lachl. — II. Pápa, complura specimina. VII. Raduć.
5. *guttata* Pict. (*Danubii* Brau.). — I. Budapest, Nagyvárad. IV. Homonna. VI. Baziás.
6. *instabilis* Curt. — III. Duo specimina ex Ujbánya (Com. Bars).
7. *nervosa* Klap. — III. Ujbánya. VII. Fužine.
8. *lepida* Pict. — III. Ujbánya. V. Balneum Tusnád.

Philopotamus Leach

9. *ludificatus* Mc Lachl. — III. Borosznó, Lacus Csorba, montes Carpathici.
10. *montanus* Don. — I. Rézbánya. VI. Corniareva, mons Semenik. VII. Brušane.
11. *variegatus* Scop. — VI. Corniareva. VII. Brušane.

Wormaldia Mc Lachl.

12. *triangulifera* Mc Lachl. — I. Rézbánya. VI. Corniareva, mons Semenik, Mehádia. VII. Pakracz, Brušane.

Neureclipsis Mc Lachl.

13. *bimaculata* Mc Lachl. — I. Budapest, Csepel. II. Bodajk (Com. Fehér), Mohács. VI. Vallis Ribis, Mehádia, Baziás. VII. Dálya.

Plectrocnemia Steph.

14. *conspersa* Curt. — III. Hági (Com. Szepes). V. Mons Retyezát.
15. *minima* Klap. — VI. Specimen unicum e Corniareva.

Polycentropus Curt.

16. *flavomaculatus* Pict. — I. Budapest, Bánlaka. III. Balneum Lucski, Koritnicza. VI. Mehádia.
17. *multiguttatus* Curt. — II. Specimen unicum e Pápa.

Holocentropus Mc Lachl.

18. *picicornis* Steph. — VII. Specimen unicum e Dálya.
19. *stagnalis* Alb. — VII. Pariter tantum e Dálya.

Cyrnus Steph.

20. *trimaculatus* Curt. — VII. Specimen unicum e Gospić.

Ecnomus Mc Lachl.

21. *tenellus* Ramb. — VI. Deliblat. VII. Dálya.

Tinodes Leach.

22. *Waeneri* Linn. — I. Duo specimina e Monor (Com. Pest).
23. *unidentata* Klap. — I. Hucusque tantum ad pagum Kebesd (Com. Bihar).

Lype Mc Lachl.

24. *phaeopa* Steph. — I. Budapest, Kebesd. II. Pápa. VI. Krassova.

Psychomia Latr.

25. *pusilla* Fabr. — I. Nagyvárad. V. Hátszeg. VI. Krassova, Mehádia, Kazán. VII. Pakracz. VIII. Buccari.

Fam. RHYACOPHILIDAE.

Rhyacophila Pict.

1. *Mocsáryi* Klap. — V. Görgény, mons Retyezát. Tantum Hungariæ civis.
2. *nubila* Zett. — I. Rézhegység. III. Borosznó, Mosócz. VI. Mehádia.
3. *septentrionis* Mc Lachl. — V. Exemplar unum e monte Retyezát.
4. *polonica* Mc Lachl. — V. Duo specimina e monte Retyezát.
5. *flava* Klap. — IV. Specimen unicum e Marmaros. Solum Hungariam inhabitat.
6. *vulgaris* Pict. — I. Hucusque tantum ad Monor (Com. Pest).
7. *tristis* Pict. — I. Montes Biharienses. III. Turcsek, Lacus Csorba. VI Mehádia.
8. *hirticornis* Mc Machl. —VII. Brušane, complura specimina.
9. *laevis* Pict. — I. Rézbánya. VI. Corniareva.

Glossosoma Curt.

10. *Boltoni* Curt. — III. Borosznó (Com. Zólyom), specimen unicum.
11. *vernale* Pict. — III. Balneum Lucski (Com. Liptó).

Mystrophora KLAP.

12. *intermedia* KLAP. — V. Tria specimina e Görgény.

Agapetus CURT.

13. *fuscipes* CURT. — III. Ad balneum Lucski.

Fam. HYDROPTILIDAE.

Agraylea CURT.

1. *multipunctata* CURT. — I. Complura specimina e Budapest.
2. *pallidula* MC LACHL. — VI. Deliblat, Kazán.

Hydroptila DALM.

3. *Mc Lachlani* KLAP. — I. Budapest, specimen tantum unicum.
4. *occulta* EAT. — I. Pariter e Budapest.

Ithytrichia EAT.

5. *lamellaris* EAT. — I. Budapest, complura specimina.

Oxyethira EAT.

6. *falcata* MORT. — I. Budapest, tria specimina.

B) PLANIPENNIA.

Fam. SIALIDAE.

Rhaphidia LINN.

1. *notata* FABR. (*media* BURM.). — I. Budapest. III. Turcsek. V. Retyezát.
2. *major* BURM. (*laticeps* WALLGR., *notata* SCHNEID.). — I. Budapest. II. Pilis-Marót. VI. Mehádia. VII. Diakovár.
3. *ophiopsis* LINN. — I. Csepel, Agárd (Com. Nográd), prædium Peszér, Debreczen. II. Pilis-Marót, Tapolcza, Pápa, Keszthely, Dénesfa (Com. Vas). III. Mosócz. IV. Forró, Ungvár. V. Mező-Záh, Szent-Erzsébet. VI. Ferenczfalva, Ulma. VII. Diakovár, montes Karst, Brušane.
4. *flavipes* SCHNEID. — I. Budapest, Isaszeg, Csepel, II. Pilis-Marót. III. Kis-Tapolcsány, Koritnicza. IV. Homonna-Jeszenő, Mármaros. V. Szent-Erzsébet. VI. Oravicza, Mehádia. VII. Fužine. VIII. Novi, Buccari.
5. *xanthostigma* SCHUMM. — IV. Balneum Bártfa. V. Balneum Tusnád.
6. *cognata* RAMB. — II. Pilis-Marót, Dobogókő (Com. Esztergom), specimen unicum.

Inocellia SCHND.

7. *crassicornis* SCHUMM. — Teste BRAUER species etiam Hungariæ terram colit (3, pag. 288.)

Sialis LATR.

8. *lutaria* LINN. — I. Budapest, Csepel, Nagyvárad, Tenke, montes Biharienses. II. Pécs, Visegrád, Pápa, Szombathely. III. Turcsek, Lacus Csorba. IV. Csány. V. Tasnád, Peér, Nagyszeben.
9. *fuliginosa* PICT. — VI. Grebenácz, duo tantum specimina.

Fam. PANORPIDAE.

Boreus LATR.

1. *Westwoodii* HAG. — IV. S.-A.-Ujhely, Sárospatak, Torna.

Panorpa LINN.

2. *alpina* RAMB. (*variabilis* BRAU.). — In regionibus montanis et alpinis totius regni sat frequens.
3. *communis* L. — I. Budapest. Nagyvárad, Beél. II. Kőszeg, Szombathely. III. Poprád, Koritnicza. IV. Homonna, Szobráncz. V. Szent-Erzsébet, Nagyszeben. VI. Ulma, Mehádia. VII. Montes Karst.
   ab. *vulgaris* IMH. (*diffinis* MC LACHL.). — I. Nagyvárad, Debreczen, Csaba. II. Simontornya, Visegrád, Pápa. III. Tátraháza. IV. Varannó, Homonna, Szobráncz. V. Montes Retyezát, Görgény. VI. Mehádia. VII. Eszék, Brušane.
4. *germanica* L. (*montana* BRAU.). — I. Budapest. II. Zircz. III. Turcsek, Koritnicza, balneum Lucski, Borosznó, Lacus Csorba. VI. Mehádia. VII. Velebit.
5. *gibberosa* MC LACHL. — Secundum BRAUER (3, pag. 279.) etiam Hungariam inhabitat.
6. *cognata* RAMB. (*germanica* BRAU.). — III. Putnok (Com. Gömör). VIII. Cirkvenica.
7. *hybrida* MC LACHL. (an *gibberosa* BRAU.?). — V. Görgény, balneum Tusnád, Szent-Erzsébet, Nagyszeben.

Bittacus LATR.

8. *tipularius* FABR. (*italicus* KLUG.). — I. Budapest. Csepel. II. Kőszeg. V. Hátszeg. VI. Resicza, Orsova, Mehádia, Grebenácz. VII. Vukovár. VIII. Cirkvenica.

Fam. MYRMELEONIDAE.

Palpares RAMB.

1. *libelluloides* LINN. — VIII. Hucusque apud nos tantum ad Cirkvenica.

Acanthaclisis Ramb.

2. *occitanica* Vill. — I. Budapest, Csepel, Csömör, Monor, Dabas, prædium Peszér, Egreskáta (Com. Pest), Kecskemét. VI. Grebenácz (Com. Temes).

Formicaleo Leach.

3. *tetragrammicus* Fabr. — I. Budapest, Isaszeg, Monor, Csepel, Dabas. VI. Mehádia, Grebenácz, VII. Vrdnik. VIII. Fiume, Cirkvenica, Novi, Zengg.

Dendroleon Brau.

4. *pantherinum* Fabr. — II. Kőszeg (Com. Vas). IV. Tolcsva (Com. Zemplén). Rarum.

Megistopus Ramb.

5. *flavicornis* Rossi (*bipunctatus* Hag.). — I. Budapest, Csepel, Csömör, Gödöllő, Gyón, Mártonkáta (Com. Pest). II. Tapolcza. VI. Deliblat.

Creagris Hag.

6. *plumbeus* Oliv. (*pallidipennis* Ramb.). — I. Budapest, Isaszeg, Csepel, Csömör, Dabas, Kalocsa, Debreczen. II. Siófok. VI. Grebenácz, Palics.

Myrmecaelurus Costa Hag.

7. *punctulatus* Stév. (*lineatus* Fisch.). — I. Budapest, Csepel, prædium Peszér, Mártonkáta, Horgos. II. Siófok. VI. Grebenácz, Ulma, Deliblat.

8. *trigrammus* Pall. (*pictus* Boeb.). — I. Budapest, Csepel, Isaszeg, Gödöllő, Kalocsa, Nagy-Maros, Monor, prædium Peszér, Dabas, Debreczen, Horgos. II. Kis-Tétény. VI. Deliblat.

Myrmeleon Linn. Hag.

9. *formicarius* Linn. (*innotatus* Ramb., *formicalynx* Burm. Brau.). — I. Budapest, Farkasd, Gödöllő, Debreczen, Hortobágy, Horgos. II. Visegrád. III. Trencsén. V. Kolozsvár, Tusnád.

10. *europaeus* Mc Lachl. — I. Budapest, Gödöllő, Monor, Peszér, Debreczen, Horgos. II. Pécs. IV. Forró. V. Kolozsvár.

11. *Erberi* Brau. — I. Budapest, Csepel, Gödöllő, Kecskemét. IV. Szomotor (Com. Zemplén).

Fam. ASCALAPHIDAE.

Theleproctophylla Léfeb.

1. *barbara* Linn. (*Ascalaphus australis* Fabr.). — VIII. Hucusque apud nos tantum ad Zengg, a Padewieth inventa.

Ascalaphus Fabr.

2. *macaronius* Scop. (*kolyvanensis* Laxm.). — VI. Mehádia. VIII. Cirkvenica, Buccari, Zengg.

3. *hungaricus* Ramb. — II. Pécs, Kőszeg (Com. Vas). V. Peér, Kolozsvár, Puj, Brassó, balneum Tusnád. VI. Fehértemplom, Mehádia, Ulma.

(*pupillatus* Ramb. — Secundum Hagen (11, pag. 386.) etiam Hungariam inhabitat. Specimina, quæ ab Emerico Frivaldszky illi submissa sunt, ex Asia minore oriuntur.

(*rhomboideus* Schneid. — Pariter apud Hagen (11, pag. 386.) species dicitur etiam Hungariæ terram colere; sed etiam huius exemplaria Asiam minorem patriam suam profitentur.

Fam. NEMOPTERIDAE.

Nemoptera Latr.

1. *coa* Linn. — VIII. Apud nos ad Lisarica invenit Padewieth.

Fam. MANTISPIDAE.

Mantispa Illig.

1. *styriaca* Poda. — I. Budapest. II. Pilis-Marót. Sat rara.

2. *perla* Pall. — VIII. Hucusque apud nos tantum ad Zengg.

Fam. HEMEROBIIDAE.

Sisyra Burm.

1. *fuscata* Fabr. — II. Specimen unicum e Pápa (Com. Veszprém).

Psectra Hag.

2. *diptera* Burm. — VI. Hucusque apud nos tantum ad Palics.

Micromus Ramb.

3. *aphidivorus* Schrk. — I. Budapest, Nagyvárad, Pestere, Szentes. II. Nezsider (Com. Mosony). III. Turcsek. IV. Tokaj, Varannó. V. Zilah, Tasnád, Nagyszeben. VII. Vrdnik.

4. *variegatus* Fabr. — I. Budapest, Kalocsa, Nagyvárad, Beél. II. Simontornya, Pilis-Marót, Zircz. IV. Bártfa. V. Zilah. VI. Mehádia.

5. *paganus* Vill. — IV. Bártfa. V. Görgény. VI. Mehádia. VII. Raduć.

Hemerobius Linn.

6. *elegans* Steph. — I. Budapest, prædium Apaj, Kecskemét, Kalocsa, Derekegyháza. IV. Széphalom (Com. Zemplén). VI. Orsova, Deliblat.

7. *nitidulus* Fabr. — III. Tantum specimen unicum e Lucsivna (Com. Szepes).
8. *micans* Oliv. (*fuscinervis* Schneid.). — I. Budapest, Kecskemét, Rézbánya, Szeged, Csongrád. III. Mosócz, balneum Lucski, Tátra. IV. Velejte, Mármaros, Ungvár, Bártfa. V. Zilah, Tasnád. VI. Mehádia, Orsova. VII. Vrdnik, montes Karst. VIII. Buccari, Novi.
9. *lutescens* Steph. — I. Unum specimen e Rézbánya.
10. *humuli* Linn. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. Visegrád, Zircz. IV. Szerencs, Velejte (Com. Zemplén), Homonna. VI. Mehádia.
11. *limbatus* Wesm. (*strigosus* Zett.). — Secundum Brauer est etiam Hungariæ incola (3, pag. 291.)
12. *pini* Steph. — V. Duo specimina e monte Magura (Com. Hunyad).
13. *marginatus* Steph. — I. Rézbánya. IV. Mármaros. VI. Mehádia.
14. *subnebulosus* Steph. — II. Zircz. IV. Nagymihály.
15. *nervosus* Fabr. — I. Csepel. III. Montes Carpathici V. Teste Fuss (5, pag. 211.) ad Tihucza (Com. Besztercze-Naszod).
16. *concinnus* Steph. — I. Budapest. III. Deményfalva (Com. Liptó), Tátra. IV. Mármaros.

Megalomus Ramb.

17. *hirtus* Linn. (*tortricoides* Ramb.). — I. Budapest, Rézbánya. II. Kőszeg. VI. Mehádia, Soronist (Com. Krassó-Szörény). VII. Brušane. VIII. Cirkvenica, Buccari.

Drepanopteryx Burm.

18. *phalaenoides* Linn. — I. Rézbánya. II. Pápa. V. Zilah, Kolozsvár, mons Magura. VI. Mehádia. VIII. Fiume.

Fam. OSMYLIDAE.

Osmylus Latr.

1. *maculatus* Fabr. (*chrysops* Brau.). — I. Budapest, Belényes, Rézbánya. III. Borosznó, Turcsek (Com. Liptó). IV. Bártfa. V. Görgény, Nagyszeben, Mons Surul. VI. Szászka, Oravicza, Mehádia. VII. Brušane.

Fam. CHRYSOPIDAE.

Hypochrysa Hag.

1. *nobilis* Heyd. — I. Budapest: Rákos (Coll. Mayri). V. Mehádia.

Notochrysa Mc Lachl.

2. *fulviceps* Steph. — Secundum Brauer species etiam Hungariam inhabitat (3, pag. 292.)
3. *italica* Rossi. — VIII. Hucusque tantum in regione adriatica ad Fiume et Portoré.

Chrysopa Leach.

4. *vulgaris* Schneid. — Est species sui generis frequentissima, in omni zonarum regione observata et collecta.
5. *pallida* Schnd. — IV. Specimen tantum unicum e Bártfa.
6. *perla* Linn. — I. Budapest, Kecskemét, Nagyvárad, Rév. II. Zircz, Szombathely, Kőszeg. III. Beszterczebánya, Koritnicza, Turcsek, Poprád, Lucsivna, Tátraháza. IV. S.-A.-Ujhely, Homonna, mons Vihorlat. V. Zilah, Görgény, Előpatak, Tusnád, Nagyszeben. VI. Oravicza, Ferenczfalva, Mehádia.
7. *Walkeri* Mc Lachl. — I. Debreczen (teste Brauer, 3. pag. 292.). II. Simontornya. VI. Orsova, Mehádia, Ulma. VII. Vrdnik.
8. *alba* Linn. — VII. Specimen unicum e Sveto Brdo in monte Velebit.
9. *aspersa* Wesm. — I. Budapest, Debreczen. II. Zircz. III. Szliács. V. Pele-Szarvad. VI. Mehádia.
10. *formosa* Brau. — I. Budapest, Debreczen. III. Vallis ad pagum Hermanecz, Turcsek. IV. S.-A.-Ujhely, Szomotor. V. Dicső-Szentmárton, Nagyszeben. VI. Palics, Mehádia, Grebenácz, Ulma. VIII. Buccari.
11. *septempunctata* Wesm. — I. Budapest, Csepel, Dabas, Debreczen, Nagyvárad, Rév, Szeghalom. II. Tapolcza. III. Turcsek. IV. Homonna. V. Tasnád, Szent-Gothárd, Rea, mons Retyezát, Nagyszeben. VI. Orsova, Mehádia. VIII. Cirkvenica.
12. *phyllochroma* Wesm. — I. Budapest, Csepel, Dabas, Makkos. V. Mező-Záh. VI. Grebenácz.
13. *abbreviata* Curt. — I. Budapest, Nagyvárad, Debreczen. II. Tapolcza. VI. Mehádia. VIII. Zengg.
14. *hungarica* Klap. — I. Duo specimina e Budapest: Farkasvölgy. Solum Hungariæ terram colit.
15. *vittata* Wesm. — I. In montibus Bihariensibus inventa.
16. *flava* Scop. — I. Budapest, Rézbánya. II. Pilis-Marót, Szegzárd. III. Szliács. IV. S.-A.-Ujhely. V. Kerczesora (Com. Fogaras). VI. Ulma. VIII. Novi.
17. *clathrata* Schnd. — Hungaria meridionalis (teste Brauer, 3, pag. 292). VIII. Novi.

Fam. CONIOPTERYGIDAE.

Coniopteryx Curt.

1. *aleurodiformis* Steph. — I. Budapest. II. Visegrád. VI. Kazán. VII. Croatia, teste Löw. (18, pag. 73.)
2. *psociformis* Curt. — VII. Etiam in Croatia, teste Löw. (18, pag. 73.)
3. *lactea* Wesm. (*tineiformis* Curt.). — I. Debreczen, Makó. II. Szegzárd. Pilis-Marót. III. Kis-Tapolcsány. IV. S.-A.-Ujhely, Szomotor. VI. Mehádia, Kazán.

Aleuropteryx Löw.

4. *lutea* Wallgr. — VIII. Apud nos tantum ad Cirkvenica et Buccari.

Conspectus familiarum, generum specierumque.

Familia	Genus	Species	Familia	Genus	Species
1. Phryganeidæ	3	8	10. Myrmeleonidæ	8	11
2. Limnophilidæ	16	53	11. Ascalaphidæ	2	3
3. Sericostomatidæ	8	11	12. Nemopteridæ	1	1
4. Leptoceridæ	7	24	13. Mantispidæ	1	2
5. Hydropsychidæ	12	25	14. Hemerobiidæ	6	18
6. Rhyacophilidæ	4	13	15. Osmylidæ	1	1
7. Hydroptilidæ	4	6	16. Chrysopidæ	3	17
8. Sialidæ	3	9	17. Coniopterygidæ	2	4
9. Panorpidæ	3	8		84	214

Summa

Familiarum	17
Generum	84
Specierum	214

Ordo. COLEOPTERA.

Auctore Desidério Kuthy.

A férfiak sorában, a kik e haza gazdag, változatos rovar-faunáját kutatni kezdték, feltárták és irodalmilag is megösmertetni igyekeztek, kezdetben majdnem csupán idegen nemzetek szülöttjeit látjuk.

Scopoli J. Ant. tiroli születésű selmeczi bányatanácsos, később páviai egyetemi tanár volt az első, a ki 1772-ben közzétett művében (Annus V. Historico-Naturalis) 18 faj magyar bogarat leirt. Dr. Conrád József 1782-ben Sopron vidékéről 30 faj bogarat irt le. Piller M. és Mitterpacher L. 1783-ban számos uj fajt tettek közzé. Olivier Ant. Guil. 1789-ben 3 magyar fajt ösmertet. Egy névtelen 1792-ben Barsmegyében gyüjtött 74 állatról emlékezik meg, Towson Robert, angol utazó, 1797-ben már 396 fajt enumerál. Creutzer Ch. 1799-ben irt le 2 magyar lelőhelyü bogarat.

Hoffmansegg J. gróf 1800-ban közölte magyarországi gyűjtésének eredményeit. Koy Tóbiás, kamarai pénztárnok, ugyancsak 1800-ban megjelent betürendes katalogusában már 2765 fajt sorol elő.

Fabricius J. Chr. az 1801-ben kiadott «Systema Eleutheratorum»-ban 30 faj magyar termőhelyü bogarat emlit meg jobbára mühlfeldti Megerle J. C.-nek, a bécsi cs. kir. muzeum első őrének adatai alapján.

Blumenbach J. Fr. 1807-ben Igló vidékéről közöl adatokat. Kindermann Albert, korának hires lepkésze, 1820 körül Buda környékén gyüjtött sok érdekes bogarat. Dejean M. gróf az 1825-ben megkezdett «Species Général des Coleoptères» czimü műben 47 magyar fajról ad számot. Palliardi Ant. szintén 1825-ben közzétett dolgozatában (Beschreibung zweier Decaden neuer, wenig bekannter Carabicinen) magyar futóbogarakat irt le.

Schönherr C. I. «Genera et Species Curculionidum»-jában (1833) több magyar új faj leirása van

Qui admirabilem insectorum generum specierumque varietatem, quibus patria nostra abundat, primi observarunt et literarum monumentis illustrare cœperunt, initio fere omnes exteri auctores fuerunt. Inter quos primus commemorandus est J. Antonius Scopoli, natione Tyrolensis, rei montanæ in fodinis Selmeciensibus consiliarius, dein in universitate paviensi professor, qui in opere, cui titulus: «Annus V. historico naturalis», anno 1772 duodeviginti species Coleopterorum hungaricorum descripsit. Dr. Josephus Conrád anno 1782 triginta species elucubrat, quas in ditione Soproniensi inveniri perhibet. M. Piller et L. Mitterpacher anno 1783 complures species novas publicaverunt. A. G. Olivier a. 1789 tres species hungaricæ originis primus descripsit. Auctor quidam anonymus a. 1792 in regione barsiensi septuaginta quatuor species animalium se collegisse testatur. Robertus Towson, anglus, anno 1797 jam 396 species recensuit. Anno demum 1799 Ch. Creutzer descripsit duas Coleopterorum hungaricæ originis species.

Anno 1800, C. J. Hoffmansegg publici iuris fecit, quæ in Hungaria observata collegerat. Eodem anno Tobias Koy, rei pecuniariæ præfectus, iam 2765 species catalogo alphabetico comprehendit. J. Chr. Fabricius in opere, cui titulum fecit: «Systema Eleutheratorum», anno 1801 commemorat triginta species Coleopterorum hungaricorum, ut plurimum iis innixus, quae J. C. Megerle de Mühlfeldt, qui primus musæo cæsareoregio vindobonensi præfuit, observaverat.

J. Fr. Blumenbach de regione Iglóensi pauca quædam commemorat a. 1807. A. Kindermann, clarum apud Lepidopterophilos nomen, circa annum 1820 ad Budam collegit multa eaque rara Coleoptera. Comes M. Dejean in opere: «Species général des Coleoptères», cui anno 1825 initium fecit, 47 species recensuit Coleopterorum in Hungaria lectorum. Eodem anno Ant. Palliardi edidit

Vele egy időben kezdett Dr. Frivaldszky Imre gyűjteni s teljes jogon állithatjuk, hogy munkálkodása a magyar állattani kutatások terén korszakalkotó volt, a hajnal hasadását jelentette. Inkább lepkékkel foglalkozott ugyan, de mint coleopterologus is hirnevet érdemelt ki. Működésének eredményét 1865-ben, a «Jellemző adatok Magyarország faunájához» czimű munkában tette közzé. Mint a magyar nemzeti muzeum természetrajzi tárának őre, gyűjteményeivel megvetette a mai gazdag bogár-gyüjtemény alapját. Rokona és méltó tanítványa volt Frivaldszky János. Valódi hivatottság és szenvedély vezette őt is állattani kutatásaiban, a melyeket kiváltkép az ország bogárfaunájának a megösmerésére és ösmertetésére irányzott. Ügyes gyüjtőjével, Pável János-sal hazánk több megyéjét átkereste s a talált anyagot nagy lelkiösmerettel dolgozta vagy dolgoztatta fel. Gyűjteséinek eredményét 1865—93-ig megjelent közleményeiben irta le s két nagyobb munkában publikálta. Ez utóbbiak «Magyarország Téhelyröpüinek Futonczféléi» és «A magyarországi Eucnemida-félék» czimű monografia. Frivaldszky János, mint Frivaldszky Imre hivatalbéli utódja is kiváló érdemeket szerzett. Két tartalmas, gazdag, jól konzervált bogárgyüjtemény hirdeti becsületes tevékenységét a nemzeti muzeumban: a speciális magyar és a földkerekség coleopteráira vonatkozó általános gyüjtemény.

Az 50-es években Bielz Albert gyüjteséinek eredményét számos enumeráczióban közölte; ezek közül a legfontosabb és hazánk Királyhágón túli faunájának forrásmunkájául tekintendő a «Die Erforschung der Käferfauna Siebenbürgens bis zum Schlusse des Jahres 1886» czimű katalógus.

Fuss Károly Bielz-czel egyidejüleg s hasonlóképen fáradhatatlan buzgalommal kutatott s bogárgyüjteményében, a mely jelenleg a magyar nemzeti muzeum tulajdona, igen számos becses adatra találtam. Kivált még determinálatlan bogarai érdekesnél-érdekesebb adalékokat szolgáltattak, a melyek nyomára a gyüjtőnek 1850-től 1874-ig megjelent közleményeiben s a Bielz-féle katalógusban sem lehetett ráakadni.

Dr. Hampe C., bécsi orvos, hazánk drávántúli és keleti részeiben gyüjtött. Az új fajokat 1850—1873-ig megjelent közleményeiben irta le. Bolla János 1859-ben Pozsony vidékén tett kutatásainak eredményét enumerálta volt.

Dr. Kraatz G., hirneves berlini entomologus 1858-tól 1894-ig publikált műveiben igen sok magyar adat, új faj leirása foglaltatik. Dr. Küster G., «Die Käfer Europas» czimű munkája szintén számos magyar faj leirását tartalmazza. Miller L. a

opusculum, cui titulus: «Beschreibung zweier Decaden, neuer wenig bekannter Carabicinen», in quo aliquot species e familia Carabidarum descripsit Hungariam incolentes. Similiter plures species novas originis hungaricæ invenies in opere clarissimi J. C. Schönherr, qui anno 1833 opus edidit, quod «Genera et Species Curculionidum» inscripsit.

Eodem tempore insectis colligendis et perscrutandis se totum addicere cœpit Dr. Emericus Frivaldszky et iure merito quis affirmaverit, ab ipso novam epocham incepisse entomologiæ hungaricæ, auroram quandam clarissimi solis nuntiam. Eximia diligentia studio Lepidopterorum se dedit etiam inter Coleopterologos non ignobile nomen adeptus. Fructus studiorum anno 1865 in opere: «Jellemző adatok Magyarország faunájához» evulgavit. Musæi nationalis hungarici pro historia naturali custos assiduitate sua amplissimum initium fecit thesauri Coleopterorum, quo hodie musæum gaudet maximo. Propinquus eius dignusque discipulus fuit Joannes Frivaldszky. Summa quadam acerrimi ingenii vi usus est in studio zoologico, quod praecipue in faunam Hungariæ coleopterologicam contulit. In conquirendis Coleopteris auxilio usus est viri dexterrimi Joannis Pavel, quo socio complures patriæ Comitatus exploravit, et quæ invenerant, summa diligentia confecit et in ordinem redegit. Quæ collegerat, ab anno 1865 usque ad a. 1893 identidem publici iuris fecit. Præterea edidit duo opera maiora, quorum priori: «Magyarország téhelyröpüinek futonczféléi», alteri «A magyarországi Eucnemida-félék» titulum fecit. Propinquum suum in munere secutus plurimum de historia naturali hungarica meruit. Duplex Coleopterorum thesaurus, collectionem vocamus, quem in musæo nationali videre est, omni oratione clarius nuntiat eius studium, diligentiam, dexteritatem: alter faunam hungaricam, alter universalem, hungarica exclusa, complectitur.

Ab anno huius sæculi 50. Albertus Bielz insectorum, quæ collegerat, non infrequentes texuit indices, inter quos maximi momenti est: «Die Erforschung der Käferfauna Siebenbürgens bis zum Schlusse des Jahres 1886», ex quo veluti fonte hauriant, qui faunæ transsylvanicæ operam navant. Eodem tempore iisdem studiis navavit Carolus Fuss, fatigationis nescius. Quæ collegit insecta, modo in musæo nationali hungarico habentur, inter quæ plurima inveni, plerumque certo nomine haud insignita, quæ clarissimi viri studium dexteritatemque summopere commendant, quæque nec in indicibus ab ipso editis neque in Bielzianis reperias.

Dr. Cl. Hampe, medicus viennensis, in regionibus trans Dravum et in partibus Hungariæ orientalibus

Fertő környékén, a Tátrában és Fiume vidéken gyüjtögetett. Részben új bogarainak jegyzékét 1858—1880-ig tette közzé. Westwood J. O. Esqu. (1852) leirta a Frivaldszky Imrétől fölfedezett *Glaresis Frivaldszkyi-t.*

A 60-as években Alard E., Brissout Ch. de Barneville, Chaudoir báró, Bedel L., Gautier de Cottes, Marseul S. A. munkáiban több Magyarországból eredő bogárfaj leírására találunk. Kiesenwetter H. 1868 nyarán kirándult a Babia-Gurára s a Tátrába. A rá következő évben aztán gyüjtései eredményét publikálta. Motschulszky V. M. közleményeiben is vannak magyar fajok leirásai.

Reitter E., paskaui entomologus, az északkeleti, déli és keleti Kárpátokban s hazánk drávántúli részeiben behatóbb kutatásokat tett s gyűjteséinek eredményeit megirta. A termékeny coleopterologus irónak 1869-től napjainkig közzétett «Bestimmungs-Tabellen» czímű synoptikus tábláiban, valamint egyéb irodalmi termékeiben is nyomról-nyomra új magyar fajok leirásai és magyar lelőhelyekre vonatkozó adatok találhatók.

Dr. Seidlitz G. munkái szintén számos adatot és nova-leirást tárnak elő különösen az 1891-ben megjelent «Fauna Transsylvanica».

Dr. Stierlin G.-nek 1861-ben közölni kezdett s mind máig meg-megjelenő kisebb-nagyobb publikáczióiban igen gyakran látjuk magyar új fajok leirását s olvasunk magyarországi termőhelyeket. Truqui E., Rottenberg A. báró (szintén gyüjtött a Babia-Gurán), Kirsch Th. hasonlóképen nyujtanak hazánk faunájára vonatkozó adatokat. Kempelen Radó hevesmegyei gyüjtésének eredményeit tette volt közzé. Riess Károly saját gyüjtését, valamint Reitter E. és Hopffgarten M. báró anyagát ösmertette; Rózsay Emil Pozsony és Kassa vidékének bogarait enumerálja.

A 70-es években Baudi F. di Selve, Vicomte Bonvouloir H., Capiomont G., Desbrochers des Loges, Eichhof W., Emery M. C., Dr. Eppelsheim E., Fairmaire L., s Dr. Heyden L. báró munkáiban nem ritkán akadunk hol új magyar faj leirására, hol hazai termőhelyek följegyzéseire. Hopffgarten M. báró a Komárom- és Hontmegyében, továbbá Magyarország déli és keleti részeiben gyüjtött anyagát publikálta. Lefèvre E., Putzeys J., Preudhomme de Borre, Peyron M. E., Redtenbacher L. és Tournier H. művei szintén több magyar új fajt és lelőhelyet említenek. Weise J., berlini entomológus, Magyarországon három ízben gyüjtött s kutatásai-

plurima insecta collegit. Quæ nova invenerat, ab anno 1850 usque ad anno 1883 identidem descripsit. Faunæ Posoniensis catalogum texuit a. 1859 Joannes Bolla. In elucubrationibus clarissimi viri G. Kraatz, entomologi berolinensis, plurima continentur ad faunam Hungariæ spectantia, nec non specierum hungaricarum eousque incognitarum descriptiones non paucæ. Similia habet Dr. G. Küster in opere: «Die Käfer Europas». L. Miller ad lacum Fertő, in montibus Tátra et in regione Fiumana collegit Coleoptera, quorum indicem vulgavit non pauca hucusque ignota continentem ab anno 1858 usque ad a. 1880. J. O. Westwood a. 1852 descripsit speciem ab E. Frivaldszky detectam, *Glaresim Frivaldszkyi*. Plurium Coleopterorum, quorum Hungaria patria est, descriptionem videre est in commentariis M. E. Allard, Brissout de Barneville, Chaudoir, L. Bedel, Gauttier de Cottes, S. A. Marseul, qui ab anno huius sæculi 60 in lucem prodierunt. H. Kiesenwetter anno 1868 se contulit in montes Babia-Gura et quæ collegit, anno insequenti publici iuris fecit. In elucubrationibus clarissimi V. M. Motschulszki pariter occurrunt hungaricarum specierum descriptiones.

Edmundus Reitter, entomologus paskoviensis, montes carpathicos, qui inter septentriones et orientem protenduntur nec non eorundem partes orientales et meridionales ac regionem trans Dravum accuratione inquisitione perscrutatus est fructusque non pigendos retulit, quorum accuratam rationem reddidit in pagellis, quas «Bestimmungstabellen» inscripsit; in quibus sicut et in aliis eiusdem fertilissimi ingenii scriptoris elucubrationibus passim occurrunt, quæ ad faunam Hungariæ illustrandam pertinent.

Idem dicendum de operibus Dr. G. Seidlitz, inter quæ eminet «Fauna Transsylvanica», quam anno 1891 publici iuris fecit.

Dr. Stierlin scribere cœpit anno 1861, in cuius elucubrationibus sæpissime invenias descriptiones novarum specierum Hungariæ indigenarum vel iam notarum accuratiora indicia. De eodem argumento tractant E. Truqui, b. A. Rottenberg, qui in montibus Babia-Gura insecta collegit, et Th. Kirsch, Radoslaus Kempelen elucubrationem typis vulgavit de iis, quæ in regione Hevesiensi collegerat, tandem Carolus Riess ea recensuit, quæ tum ipse tum Edmundus Reitter et b. M. Hopffgarten collegerant; Emilius vero Rózsay catalogum texuit Coleopterorum, in regione Cassoviensi et Posoniensi occurrentium.

Anno 1870 et sequentibus in operibus F. Baudi di Selve, H. Bonvouloir, G. Capiomont, Des-

nak eredményét közli. Számos új magyar faj és termőhely van 1875-től napjainkig megjelent kisebb-nagyobb publikációiban, nemkülönben a Chrysomelidákról és Coccinellákról írt nagyszabásu monografiája keretében.

Herman Otto a «Mezőség» faunáját kutatta, gyüjtött a Királyhágón túli részeken s az ország egyéb vidékein is. Munkálkodásának eredménye több rendbeli enumerációjában van letéve.

Dr. Brancsik Károly kivált Trencsén megye bogaraival foglalkozott. 1870-től 1893-ig napvilágot látott irásaiban több új faj és új termőhely vonja magára a figyelmet.

Dr. Horváth Géza a magyar királyságnak csaknem minden megyéjében gyüjtött. A Tátrán, a tornai hegyekben, Szamosfalva sóstava mellett és Podsused környékén tett kutatásainak eredményéről értékes enumerációkban adott számot.

Kardos Károly tanár Mármaros megyéből való bogarak jegyzékét bocsátotta közre. Dr. Kenderesy Dénes Hátszeg vidékén gyüjtött. Ott födözte föl az *Anophthalmus Budae*-t, a melyet le is írt. Kirschberg Oszkár 1870-ben a Királyhágón túli fauna katalogusát adta ki. Massányi Mihály 1872-ben a Léva város vidékén talált bogarak névsorát közli. Merkl Ede Magyarország déli és délkeleti részeiben kutatott s faunánk ösmeretét számos új faj felfedezésével gazdagitotta. Méry Etel, tanár, 1874-ben győrmegyei bogarakról tett közzé egy névsort. Mocsáry Sándor a Tátrában, Zólyom, Liptó, Ung, Zemplén és Bihar megyében, de különösen Nagyvárad környékén gyüjtött anyagát publikálva, végzett hasznos munkát. Dr. Szmolay Vilmos Temesvár vidékének faunáját kutatta s publikálta is.

A 80-as években és azon túl napjainkig Abeille El. de Perrin, Apfelbeck V., Bargagli P., Bodemeyer Heinrichau E. báró, Brisout H. de Barneville, Duvivier Ant., Faust J., Flach C., Fauvel A., Fowler W. W., Guillebeau T. munkáiban sok új magyar fajról és termőhelyről van feljegyzés. Bodemeyer az ország déli részein gyüjtött anyagát a maga egészében közzétette. Ganglbauer L. közléseiben, de leginkább az 1892. folyamán megkezdett nagy munkájában: «Die Käfer von Mitteleuropa» található igen sok, ránk nézve különös fontosságu adat. Severin G., Wachtl F. közleményei szintén tartalmaznak magyar adatot. Bálint Sándor 1889-ben székelyföldi gyüjtését tette közzé. Biró Lajos a magyar korona területének csaknem minden megyéjében gyüjtött. Mármarosi kirándulásának eredményeit s a Chyzer-féle zemplénmegyei gyüjtemény jegyzékét kiadta. Megösmertette igy a Dr Chyzer Kornél

brochers des Loges, W. Eichhof, M. C. Emery, E. Eppelsheim, L. Fairmaire et Dr. L. Heyden, quæ prodierunt, non raro legas novarum specierum Hungariæ incolarum descriptiones nec non enumerationes locorum, in quibus insecta iam nota in Hungariæ regno inveniuntur. B. M. Hopffgarten perscrutatus est Comitatum Comaromiensem et Hontiensem nec non partes Hungariæ australes et orientales laborisque fructus accurato catalogo recensuit. Plurima ad faunam Hungariæ spectantia, sive novarum specierum descriptiones sive nova indicia geographica invenies in elucubrationibus E. Lefèvre, J. Putzeys, Preudhomme de Borre, E. M. Peyron, L. Redtenbacher et H. Tournier. J. Weise, entomologus berolinensis ter Hungariam adiit insecta collecturus, et que collegit, recensuit in elucubrationibus suis, inter quas eminet monographia, quam dicimus, Chrysomelidarum et Coccinellidarum, in quibus omnibus abundant indicia novarum specierum Hungariæ incolarum, locorumque, in quibus insecta alias nota apud nos gignuntur.

Faunam regionis «Mezőség» et Transsylvaniæ variarumque patriæ regionum scrutatus est Otto Herman laborisque pluribus elucubrationibus rationem reddidit. Dr. Carolus Brancsik præcipue regionis Trenchiniensis Coleoptera tractavit ac de iis ab a. 1870 usque ad a. 1893 plura evulgavit. Dr. Geyza Horváth in Comitatibus fere omnibus Hungariæ collegit insecta. Quæ indagare contigit in montibus Tátra et Tornensibus, ad lacum salsum prope Szamosfalva et in agro Podsusediensi, eorum indicem composuit accuratum, qui apud peritos rerum æstimatores magno in pretio habetur. Professor Car. Kardos indicem texuit Coleopterorum Comitatus Marmaros, Dr. Dionysius Kenderesy in agro Hátszegiensi novam speciem invenit, *Anophthalmum Budae*, quam et descripsit. Faunæ transsylvanicæ catalogum typis edidit Oscarus Kirschberg, regionis ad oppidum Léva faunam enumeravit Michaël Massányi a. 1872. Idem præstitit Etel Méry pro ditione Jaurinensi. Eduardus Merkl in indaganda fauna Hungariæ partium ad austrum et orientem sitarum solertissimus novas species non paucas invenit. Utilissimam operam posuit Alexander Mocsáry in indagandis insectis in montibus Tátra, in Comitatibus Zólyom, Liptó, Ung, Zemplén et Bihar; sed præcipue eminent ea, quæ de fauna ditionis Magno-Varadinensis typis vulgavit. Dr. G. Szmolay, quæ ad faunam Temesvarinensem pertinent indagavit et inventa literis consignavit.

Annis 1880 et sequentibus in operibus El. Abeille de Perrin, V. Apfelbeck, P. Bargagli, B. E. Bodemeyer Heinrichau, H. Brisout de Barneville,

éveken át ritka kitartással folytatott gyüjtésének anyagát is. Biró irodalmi munkássága és gyüjteménye általában annyi biztos adatot, jól határozott állatot, stb. tárt föl előttem, hogy felhasználhatásuk nélkül e munka legalább is nehány ezer adattal szegényebb maradt volna. Birthler Frigyes közleményeiben szintén számos érdekes adalék található. Dr. Chyzer Kornél maga újabb adatokat szolgáltatott Zemplén vármegye faunájához. Jelentékeny gyüjteményét, melyben Magyarország több helyén gyüjtött anyaga egyesitve van, lekötelező szivességgel bocsátotta rendelkezésemre. Cserny Béla Gyulafehérvár környékének faunáját publikálta volt. Dr. Kaufmann Ernő Pécs vidékén s a Velebitben fedezett föl érdekes bogarakat. Kuthy Dezső főleg Pestmegyében gyüjtött s az isaszegi erdő jellemző bogarairól számolt be. Méhely Lajos hazánk Királyhágón túli részeiben gyüjtött. Enumeráczióiban s különösen 1895-ben megjelent «Erdély új és ritka bogárfajai» czimü közleményében számos biztos új fölfedezésre akadunk. Ormay Sándor szintén a Királyhágón túl foglalkozott gyüjtéssel. Sok új és érdekes adat van kétrendbeli ennumeráczijában. Apróbb közleményei hasábjain nehány merőben új fajt is irt le. Paszlavszky József Budapest vidékén s a Szepességen gyüjtött. Entomologiai közlése a *Coraebus bifasciatus* Oliv.-ra, egy érdekes déli fajra vonatkozik. Dr. Petri Károly Segesvár faunáját enumerálta. Kisebb közleményeiben s a *Liparus*-genusról irt monografiájában több új magyar faj leirása foglaltatik. Petricskó Jenő Beszterczebánya vidékéről való bogarakról adott jegyzéket. Petrogalli Artur trencsénmegyei gyüjtését közölte. Pisó Kornél marmarosmegyei adatokat sorol elő. Polinszky Emil Pestmegyében, a Kárpátok északi és északkeleti részeiben gyüjtött s közleményei számos becses új lelőhely följegyzését tartalmazzák. Rózsay Emil Pozsony vidéke bogarainak jegyzékét adta ki. Sajó Károly Pestmegyében gyüjtött; *Coccinella*-fajváltozatokat irt le. Speiser Ferencz, Thalhammer János társaságában Kalocsa környékét kutatta át ritka szorgalommal. Gyüjteseinek eredményeit első izben 1883-ban, másodizben 1893-ban közölte: «Kalocsa környékének bogárfaunája» («Coleoptera regionis Colocensis») czímen. E munka minden lapján találunk hazánk bogárvilágára jellemző avagy új adatot. Gyüjtött Speiser Zala mégyében is. Kiváló szivességgel rendelkezésemre bocsátott számos legújabban szerzett még közöletlen adatot is. Nagy hasznát vettem munkám megirásában a Dr. Heyden, Reitter E., és Weise J.-féle katalógusnak: «Coleoptera Europæ et Armeniæ rossicæ» 1891. A kitünő mű nomenklaturáját és synonymikáját is követtem Ant. Duvivier, J. Faust, C. Flach, A. Fauvel, W W. Fowler et T. Guillebeau plurima invenies, quæ ad novas species hungaricæ originis et ad zoogeographiam hungaricam spectant. Bodemeyer omnia, quæ in regionibus Hungariæ meridionalibus collegit, typis vulgavit. In pagellis a D. Ludovico Ganglbauer editis, præprimis vero in opere: «Die Käfer von Mitteleuropa» plurima habentur, quæ maximi momenti sunt, si Hungariæ faunam attendamus. Similia invenies in elucubrationibus G. Severin, F. Wachtl. Anno 1889 idem prostitit Alexander Bálint quoad ditionem siculorum. Ludovicus Biró, qui in omnibus fere Hungariæ Comitatibus insecta collegit, eorum, quæ in Comitatu Marmarosiensi invenerat, sicut et collectionis, quam dicimus, Chyzerianæ accuratum edidit indicem. Quod ad hanc meam elucubrationem attinet, fere aliquot millia indiciorum vel ex catalogo Bióiano desumpsi vel ex iis, quæ collegit thesauris, quos perscrutari licuit, hausi. Plurima pariter eaque non contemnenda indicia habent opuscula Friderici Birthler. Præter ea, quæ Ludovicus Biró ex thesauris Chyzerianis deprompsit, ipse clarissimus vir Cornelius Chyzer non pauca præbuit argumenta, quæ faunam Hungariæ illustrant. Amplissimam insectorum collectionem, quam rara diligentia per plurimos annos Comitatum Zempliniensem aliasque regiones perscrutando comparaverat, pro eximia sua humanitate mihi patere voluit. Albertus Cserny faunam regionis Gyulafehérvár literis illustravit. D. Kuthy in Comitatu Pestinensi collegit insecta, et typis evulgavit, quæ in silvis isaszegiensibus invenit. Dr. E. Kaufmann in regione Pécs et in montibus Velebit invenit Coleoptera eximia. L. Méhely Transsylvaniam perscrutatus in elucubrationibus suis, præcipue vero in ea, quam «Erdély új és ritka bogárfajai» inscripsit, plurima nova attulit. Idem in eadem regione præstitit A. Ormay. Regionem Budapestinensem et Comitatum Scepusiensem perscrutatus est J. Paszlavszky; quod publici iuris fecit, speciem tractat regiones ad meridiem versas incolentem, *Coraebum bifasciatum*. Dr. C. Petri faunam Segesvarinam catalogo illustravit. In opusculis eius minoribus et in monographia quam dicimus generis *Liparus* novæ species originis hungaricæ plures continentur. A. Petrogalli faunæ Comitatus Trenchiniensis, C. Pisó Marmarosiensis catalogum composuerunt. E. Polinszky Comitatum Pestinensem et montium Carpathicorum partes ad septentriones et ad aquilonem vergentes perscrutatus in elucubrationibus suis plurima indicia maxime memorabilia quoad Coleopterorum originem complexus est. Emilius Rózsay indicem Coleopterorum regionis

és csak ott tértem el, a hol a legújabb kutatások az eltérést megkivánták.

Magyarország földjének geografiai és természetrajzi képe mindjárt első tekintetre gazdag bogáréletet sejttet. Megvan itt minden, a mi változatos faunát teremt.

Van egynehány fajunk, a mely mind az öt kontinensen él. Van igen számos fajunk és faj-változatunk, mely az európai és a palæarktikus faunaterület sajátja.

Mind a négy világtáj felé távol vidékekig húzódik az a vonal, a melyen egyes bogárfajok tovavándorolva, Magyarország területére még eljutottak s számosan közülök határainkon túl, tovább már nem találhatók.

Északi irányban például a Skandináv félsziget, kezdve az Északi-Fokon, a Balti-tengermelléki orosz tartományok, Észak-Németország és Lengyelország azok, a melyek faunájából egy sereg faj a magyar birodalom déli határait nem igen lépi át. Ime belőlük egynéhány: *Nebria Gyllenhali* Schönh. *v. rufescens* Stroem., *Bembidion Fellmani* Mannh., *Platynus impressus* Panz., *Calathus micropterus* Duft., *Amara Quenseli* Schönh., *Chlaenius sulcicollis* Payk., *Metabletus foveatus* Fourc., *Stenus flavipalpis* Thoms., *Pteroloma Forstroemi* Gyll., *Rhizophagus puncticollis* Sahlb., *Ditylus laevis* Fabr., *Scleropterus offensus* Germ., *Pachyta lamed* L., *Hoplosia fennica* Payk.

Nyugatról Angliának, Francziaországnak, a Pyrænei félszigetnek, Németországnak és Ausztriának a bogaraiból hazánkat még lakják pld. a következők: *Carabus Creutzeri* Fabr., *Dyschirius semistriatus* Dej., *Bembidion Starki* Schaum, *Platyderus ruficollis* Marsch., *Atheta perexigua* Sharp., *Stenus fuscicornis* Er., *Anthobium aucupariae* Kiesw., *Euplectus Spinolae* Aub., *Liodes lunicollis* Rye, *Cryptophagus reflexicollis* Reitt., *Malthodes furcatus* Kiesw., *Otiorrhynchus alpinus* Richter, *Pityophthorus ramulorum* Perr., *Psylliodes subaenea* Kutsch.

Kelet felől Szibéria, a Kaspi-tó környéke, a Kaukazus és a Szarmata-sivatag, továbbá a Fekete-tenger melléke van képviselve Magyarország határain belül. E keleti fajok közül megemlithetők: *Cicindela soluta* Latr., *Zabrus blapoides* Creutz., *Acinopus ammophilus* Dej., *Stenolophus Steveni* Kryn., *Chlaenius aeneocephalus* Dej., *Coproporus colchicus* Kr., *Metoponcus basalis* Aub., *Compsochilus Heydeni*

Posoniensis publici iuris fecit. Carolus Sajó in Comitatu Pestinensi colligebat insecta; Coccinellarum aliquot varietates, quas dicimus, descripsit. Franciscus Speiser cum Joanne Thalhammer regionem Colocensem rara diligentia perscrutabatur. Quæ collegerunt, eorum primo a. 1883 dein a. 1893 indicem texuit et sub titulo: «Coleoptera regionis Colocensis» in lucem edidit. Collegit idem insecta etiam in Comitatibus Zala et Tolna. Plurimis me uti permisit indiciis, quæ nondum typis vulgavit.

In hoc catalogo conscribendo plurimum usui fuit «Catalogus Coleopterorum Europæ et Armeniæ rossiacæ» auctoribus Dr. L. Heyden, E. Reitter et J. Weise, cuius denominationes et synonyma secutus nonnisi necessitate cogente recentissimorum auctorum vestigiis insistebam.

Qui Hungariæ situm naturamque consideraverit, illi absque dubio primo intuitu planum fiet, in ea omnia convenire, quæ maximam faunæ varietatem iuvant.

Sunt apud nos aliquot species, quæ toti terrarum orbi communes sunt; præterea plurimæ species ac varietates, quæ faunæ europææ et palæarcticæ propriæ sunt.

Versus quatuor mundi partes longissime protenditur via, qua aliquæ Coleopterorum species progressæ fines Hungariæ attigerunt, inter quas non paucæ ultra eosdem fines frustra quæsieris.

Septentrionem versus exempli gratia Scandinavia peninsula inde promontorio septentrionali, provinciæ rossicæ, mari Baltico adiacentes, Germania inferior et Polonia eæ sunt regiones, quarum insecta vix superant fines Hungariæ meridionales. Sufficiat sequentia commemorasse: *Nebria Gyllenhali* Schönh. *v. rufescens* Stroem., *Bembidion Fellmani* Mannh., *Platynus impressus* Panz., *Calathus micropterus* Duft., *Amara Quenseli* Schönh., *Chlaenius sulcicollis* Payk., *Metabletus foveatus* Fourc., *Stenus flavipalpis* Thoms., *Pteroloma Forstroemi* Gyll., *Rhizophagus puncticollis* Sahlb., *Ditylus laevis* Fabr., *Scleropterus offensus* Germ., *Pachyta lamed* L., *Hoplosia fennica* Payk.

Ab occidente ex Coleopteris Britanniæ, Galliæ, Hispaniæ, Germaniæ et Austriae indigenis in Hungaria e. g. sequentia inveniuntur: *Carabus Creutzeri* Fabr., *Dyschirius semistriatus* Dej., *Bembidion Starki* Schaum, *Platyderus ruficollis* Marsch, *Atheta perexigua* Sharp., *Stenus fuscicornis* Er., *Anthobium aucupariae* Kiesw., *Euplectus Spinolae* Aub., *Liodes lunicollis* Rye, *Cryptophagus reflexicollis* Reitt., *Malthodes furcatus* Kiesw., *Otiorrhynchus alpinus* Richter, *Pityophtorus ramulorum* Perr., *Psylliodes subaenea* Kutsch.

Epp., *Liodes calcarifera* Reitt., *Thorictus laticollis* Motsch., *Blaps longicollis* Stev., *Otiorrhynchus repletus* Boh., *Chrysomela cinctipennis* Harold.

Délről, Afrikából — kezdve a Szaharán — Kis-Ázsiából, a Balkán- és Olasz-Félszigetről vannak állataink, a melyek felfelé nyomulva, a magyar királyságban érik el az észak sorompóját. Soraikból álljon itt például a *Procerus gigas* Creutz., *Carabus catenatus* Panz., *Scarites arenarius* Bon., *Acinopus picipes* Oliv., *Ditomus tricuspidatus* Fabr., *Gynandromorphus etruscus* Quens., *Chlaenius Dejeani* Dej., *Lareynia Kirschi* Gerh., *Neuraphes ornatus* Reitt., *Triplax Lacordairei* Crotch., *Sternodea Baudii* Reitt., *Corticus diabolicus* Schauf., *Adelina turcica* Reitt., *Otiorrhynchus Kratteri* Boh., *Agapanthia Kirbyi* Gyll., *Chrysomela cribrosa* Ahr.

Az ország egyes részeinek, geografiai egységeinek azonkivül részben saját bogárfaunájok is van. Igy az északi, keleti és déli határokat félkörben övező Kárpátok sajátos fajainak mondhatók a következők: *Carabus obsoletus* Strm., *Colathus metallicus* Dej., *Pterostichus rufitarsis* Dej., *foveolatus* Duft., *Findeli* Dej., *maurus* Duft. *v. erythromerus* Ganglb., *fossulatus* Quens., *Abax Schüppeli* Pall. *v. Rendschmidti* Germ., *Atheta alpicola* Mill., *Cephennium carpathicum* Reitt., *Otiorrhynchus proximus* Stierl., *corvus* Boh., *Orina plagiata* Suffr., *Orestia carpathica* Reitt.

A Tátrában élnek: *Nebria tatrica* Mill., *Trechus microphthalmus* Mill., *Deltomerus tatricus* Mill., *Homalota alpicola* Mill., *Otiorrhynchus graniventris* Mill., *tatricus* Reitt.

Az északkeleti Kárpátokban találhatók: *Trechus ruthenus* Reitt., *Bielzi* Seidl., *Deltomerus carpathicus* Mill., *Amara misella* Mill., *Stenus Reitteri* Ws., *Euplectus Frivaldszkyi* Saulcy., *Bythinus carpathicus* Saulcy., *ruthenus* Saulcy., *Bathyscia hungarica* Reitt., *Atomaria Attila* Reitt., *Epuraea carpathica* Reitt., *Meligethes humerosus* Reitt. *v. subalpinus* Friv., *Otiorrhynchus confinis* Friv., *Sclerophaedon carpathicus* Ws.

A keleti Kárpátokban: *Carabus planicollis* Küst., *Fabricii* Panz. *v. malachiticus* Thms., *Leistus gracilis* Fuss, *alpicola* Fuss, *Nebria transsylvanica* Germ., *Reichi* Dej., *Fussi* Bielz, *Trechus parengensis* Ganglb., *procerus* Putz., *Platynus glacialis* Reitt., *Pterostichus tenuimarginatus*

Inter Coleoptera, quæ partes orientales, Sibiriam, regionem maris Caspici, Caucasum, Sarmatiam et oras Ponti Euxini incolunt, non pauca etiam apud nos inveniuntur, ut: *Cicindela soluta* Latr., *Zabrus blapoides* Creutz., *Acinopus ammophilus* Dej., *Stenolophus Steveni* Kryn., *Chlaenius aeneocephalus* Dej., *Coproporus colchicus* Kr., *Metoponcus basalis* Aub., *Compsochilus Heydeni* Epp., *Liodes calcarifera* Reitt., *Thorictus laticollis* Motsch., *Blaps longicollis* Stev., *Otiorrhynchus repletus* Boh., *Chrysomela cinctipennis* Harold.

Sunt et alia Africæ inde a deserto Sahara, Asiæ minoris, Græciæ et Italiæ regiones incolentia, quæ septentrionem versus fines suos extendentia montium Carpathicorum repagula non superarunt. Talia sunt: *Procerus gigas* Creutz., *Carabus catenatus* Panz., *Scarites arenarius* Bon., *Acinopus picipes* Oliv., *Ditomus tricuspidatus* Fabr., *Gynandromorphus etruscus* Quens., *Chlaenius Dejeani* Dej., *Lareynia Kirschi* Gerh., *Neuraphes ornatus* Reitt., *Triplax Lacordairei* Crotch., *Sternodea Baudii* Reitt., *Corticus diabolicus* Schauf., *Adelina turcica* Reitt., *Otiorrhynchus Kratteri* Boh., *Agapanthia Kirbyi* Gyll., *Chrysomela cribrosa* Ahr.

Singulis regni partibus, quæ unum quid geographice constituunt, familiaris quædam Coleopterorum turma propria est. In montibus Carpathicis, qui regnum a septentrione, oriente et meridie cingunt, gignuntur: *Carabus obsoletus* Strm., *Calathus metallicus* Dej., *Pterostichus rufitarsis* Dej., *foveolatus* Duft., *Findeli* Dej., *maurus* Duft. *v. erythromerus* Ganglb., *fossulatus* Quens., *Abax Schüppeli* Pall. *v. Rendschmidti* Germ., *Atheta alpicola* Mill., *Cephennium carpathicum* Reitt., *Otiorrhynchus proximus* Stierl., *corvus* Boh., *Orina plagiata* Suffr., *Orestia carpathica* Reitt.

In montibus Tátra nascuntur: *Nebria tatrica* Mill., *Trechus microphthalmus* Mill., *Deltomerus tatricus* Mill., *Homalota alpicola* Mill., *Otiorrhynchus graniventris* Mill., *tatricus* Reitt.

Qua montes Carpathici inter septentriones et orientem protenduntur, præcipuæ species sunt: *Trechus ruthenus* Reitt., *Bielzi* Seidl., *Deltomerus carphathicus* Mill., *Amara misella* Mill., *Stenus Reitteri* Ws., *Euplectus Frivaldszkyi* Saulcy, *Bythinus carpaticus* Saulcy., *ruthenus* Saulcy, *Bathyscia hungarica* Reitt., *Atomaria Attila* Reitt., *Epuraea carpathica* Reitt., *Meligethes humerosus* Reitt. *v. subalpinus* Friv., *Otiorrhynchus confinis* Friv., *Sclerophaedon carpathicus* Ws.

Ad orientem iisdem familiares sunt: *Carabus planicollis* Küst., *Fabricii* Panz. *v. malachiticus* Thms., *Leistus gracilis* Fuss., *alpicola* Fuss., *Nebria*

Chaud., *Borborapora Reitteri* Ws., *Lycoperdina crassicollis* Reitt., *Otiorrhynchus Riessi* Fuss, *montigena* Friv., *Ormayi* Stierl.

A déli Kárpátok különlegességeiből: *Carabus coriaceus* L. *v. banaticus* Redtb., *montivagus* Palld., *Ullrichi* Germ. *v. fastuosus* Pall., *Scotodipnus brevipennis* Friv., *Trechus Hegedüsi* Friv., *Milleri* Friv., *Herculis* Friv., *Platynus banaticus* Friv., *Pterostichus cophosoides* Dej., *Molops robusta* Dej., *orthogonia* Chaud., *Dromius longulus* Friv., *Atheta capitulata* Epp., *Pselaphus mehadiensis* Friv., *Bathyscia Reitteri* Friv., *Eucinetus Hopffgarteni* Reitt., *Metophthalmus hungaricus* Reitt., *Otiorrhynchus banaticus* Stierl., *Chrysomela atrovirens* Friv., *Orestia Páveli* Friv.

A Kárpát-láncz legterjedelmesebb ágának, a bihari hegyeknek s a Királyhágón túli résznek gazdag saját faunájából az alábbiak érdekesek: *Carabus obsoletus* Strm. *v. fossilifer* Fleisch., *Kollari* Pall. *v. Hampei* Küst., *decorus* Seidl., *Dyschirius similis* Petri, *Bembidion transsylvanicum* Bielz, *Trechus marginalis* Chaum, *Ormayi* Ganglb., *Budae* Kenderesy, *Merkli* Friv., *cognatus* Friv., *paroecus* Friv., *Redtenbacheri* Friv., *Deubeli* Ganglb., *Pterostichus Jurinei* Panz. *v. Sacheri* Friv., *Daptus vittatus* Fisch. *v. Kominecki* Bielz., *Stenus Reitteri* Ws., *Batrisus Ormayi* Reitt., *Laena Ormayi* Reitt., *Orchesia transsylvanica* Reitt., *Otiorrhynchus costipennis* Rosh., *antennatus* Stierl., *longiventris* Küst., *Reichei* Stierl., *Hampei* Stierl., *Brachysomus transsylvanicus* Seidl., *Sclerophaedon carniolicus* Germ. *v. Kenderesyi* Kiesw.

Magyarország középhegységeiben, dombos tájain és rónaságán kiemelendő fajok: *Pogonus Peisonis* Ganglb., *Amara proxima* Friv., *Zuphium hungaricum* Friv., *Olophrum puncticolle* Epp., *Cybocephalus obliquestriatus* Reitt., *Meligethes Frivaldszkyi* Reitt., *Anthaxia Hackeri* Friv., *Platyscelis hungarica* Friv., *Hymenalia amplicollis* Linder, *Otiorrhynchus Kelecsényii* Friv., *arrogans* Friv., *Poophagus Hopffgarteni* Tourn., *Ceuthorrhynchus albolineatus* Friv., *hungaricus* Bris., *Frivaldszkyi* Schultze, *Paszlavszkyi* Kuthy, *Grammoptera Frivaldszkyi* Kr.

A királyság Dráván túli részét tudvalevőleg a keleti alpesek eldombosodott végágai futják be. A dombvonalak a tenger felé közeledve hegyekké és alhavasokká magasodnak s a Karszt, Kapella és

transsylvanica Germ., *Reichi* Dej., *Fussi* Bielz, *Trechus parengensis* Ganglb., *procerus* Putz., *Platynus glacialis* Reitt., *Pterostichus tenuimarginatus* Chaud., *Borborapora Reitteri* Ws., *Lycoperdina crassicolis* Reitt., *Otiorrhynchus Riessi* Fuss., *montigena* Friv., *Ormayi* Stierl.

In montibus Carpathicis, qui protenduntur, ad austrum, nascuntur: *Carabus coriaceus* L. *v. banaticus* Redtb., *montivagus* Palld., *Ullrichi* Germ. *v. fastuosus* Pall., *Scotodipnus brevipennis* Friv., *Trechus Hegedüsi* Friv., *Milleri* Friv., *Herculis* Friv., *Platynus banaticus* Friv., *Pterostichus cophosoides* Dej., *Molops robusta* Dej., *orthogonia* Chaud., *Dromius longulus* Friv., *Atheta capitulata* Epp., *Pselaphus mehadiensis* Friv., *Bathyscia Reitteri* Friv., *Eucinetus Hopffgarteni* Reitt., *Metophthalmus hungaricus* Reitt., *Otiorrhynchus banaticus* Stierl., *Chrysomela atrovirens* Friv., *Orestia Páveli* Friv.

In perpetuis montium iugis, quæ per Comitatum Bihariensem eique adiacentes ac Transsylvaniam porriguntur sequentes species veluti domesticæ ac innatæ commemorandæ sunt: *Carabus obsoletus* Strm. *v. fossilifer* Fleisch., *Kollari* Pall. *v. Hampei* Küst., *decorus* Seidl., *Dyschirius similis* Petri, *Bembidion transsylvanicum* Bielz, *Trechus marginalis* Schaum, *Ormayi* Ganglb., *Budae* Kenderesy, *Merkli* Friv., *cognatus* Friv., *paroecus* Friv., *Redtenbacheri* Friv., *Deubeli* Ganglb., *Pterostichus Jurinei* Panz. *v. Sacheri* Friv., *Daptus vittatus* Fisch. *v. Kominecki* Bielz., *Stenus Reitteri* Ws., *Batrisus Ormayi* Reitt., *Laena Ormayi* Reitt., *Orchesia transsylvanica* Reitt., *Otiorrhynchus costipennis* Rosh., *antennatus* Stierl., *longiventris* Küst., *Reichei* Stierl., *Hampei* Stierl., *Brachysomus transsylvanicus* Seidl., *Sclerophaedon carniolicus* Germ. *v. Kenderesyi* Kiesw.

In imis collibus et in planitie inveniuntur: *Pogonus Peisonis* Ganglb., *Amara proxima* Friv., *Zuphium hungaricum* Friv., *Olophrum puncticolle* Epp., *Cybocephalus obliquestriatus* Reitt., *Meligethes Frivaldszkyi* Reitt., *Anthaxia Hackeri* Friv., *Platyscelis hungarica* Friv., *Hymenalia amplicollis* Linder., *Otiorrhynchus Kelecsényii* Friv., *arrogans* Friv., *Poophagus Hopffgarteni* Tourn., *Ceuthorrhynchus albolineatus* Friv., *hungaricus* Bris., *Frivaldszkyi* Schultze, *Paszlavszkyi* Kuthy, *Grammoptera Frivaldszkyi* Kr.

Notum est partes regni trans Dravum sitas Alpium in colles leviter desinentium iugis impleri, quæ Adriam versus in montes excrescunt et Karst, Capella, Velebit nominibus insigniuntur. Operæ pretium duxi inter species huic regioni intestinas

Velebit hegységeket alkotják. E terület eddigelé ösmert sajátlagos fajaiból is megemlitjük a jellemzőbbeket: *Carabus pseudonotus* Kr., *montivagus* Palld. *v. velebiticus* Hampe, *Trechus cavernicola* Friv., *Eurydice* Schauf., *Reitteri* Mill., *oszailensis* Bed., *Ganglbaueri* Padewieth., *Bythinus croaticus* Reitt., *Brusinae* Reitt., *Molops plitvicensis* Heyden, *grandiceps* Ganglb., *longipennis* Dej., *latiuscula* Kr., *Amara croatica* Ganglb., *Esolus Czwalianae* Kuw., *Geostiba croatica* Epp., *Quedius Sturanyi* Ganglb., *Phloeocharis Birói* Epp., *Euconnus Thomayi* Reitt., *Spelaeodromus Pluto* Reitt., *Bathyscia likanensis* Reitt., *Olibrus Reitteri* Flach., *Anthrenus incanus* Friv., *Iphthimus croaticus* Truqui, *Otiorrhynchus Milleri* Stierl., *duniensis* Germ., *inductus* Gyll., *croaticus* Stierl., *Brusinae* Stierl., *Troyeri* Stierl.

Végül, mielőtt az irodalom elsorolására térnék, hálás köszönetet mondok mindazon igen tisztelt jóakaróimnak és barátaimnak, a kik e feladatom megoldásában szives előzékenységükkel gyámolitani kegyesek voltak.

Budapest, 1897. márczius hó 1-én.

aliquot commemorare. Tales sunt: *Carabus pseudonotus* Kr., *montivagus* Palld. *v. velebiticus* Hampe, *Trechus cavernicola* Friv., *Eurydice* Schauf., *Reitteri* Mill., *oszailensis* Bed., *Ganglbaueri* Padewieth., *Bythinus croaticus* Reitt., *Brusinae* Reitt., *Molops plitvicensis* Heyden, *grandiceps* Ganglb., *longipennis* Dej., *latiuscula* Kr., *Amara croatica* Ganglb., *Esolus Czwalianae* Kuw., *Geostiba croatica* Epp., *Quedius Sturanyi*, Ganglb., *Phloeocharis Birói* Epp., *Euconnus Thomayi*, Reitt., *Spelaeodromus Pluto* Reitt., *Bathyscia likanensis* Reitt., *Olibrus Reitteri* Flach., *Anthrenus incanus* Friv., *Iphtimus croaticus* Truqui, *Otiorrhynchus Milleri* Stierl., *duniensis* Germ., *inductus* Gyll., *croaticus* Stierl., *Brusinae* Stierl., *Troyeri* Stierl.

Et hæc de his sufficiant. Antequam ad auctores rem coleopterologicam, quantum Hungariam attinet, tractantes eorumque opera enumeranda transeam, facere non possum, quin maximas gratias referram amicis meis omnibusque clarissimis viris, qui pro sua erga me benevolentia in hoc opere sane difficillimo perficiendo me adiuvarunt.

Budapestini, 1. martii anno 1897.

LITTERATURA.

1. Abeille de Perrin El., Catalogus Malachiidarum Europæ et Circa. — Deutsche Entom. Zeitschrift, 1885, p. 257.
2. Allard M. E., Classification du genre Sitones. — Annal. de la Soc. Entom. de France, 1864, p. 329.
3. — Essai de classification des Blapsides de l'ancien monde. L. c., 1880, p. 269; 1881, p. 493; 1882, p. 77.
4. — Revision des Helopides vrais. — Mitth. der schweizer. entom. Gesellschaft, 1880, p. 13.
5. Anonymus, Beitrag zur Entomologie von Ungarn. — Neues Ungarisch. Magazin, Pressburg, 1792, II. Bd., 5. Heft, p. 337.
6. — Jelentés az 1886—89. években felmerült erdei rovarkárokról. — A m. kir. rovartani állomás közleményei, Budapest, 1891, I. köt., 5. füz., p. 18.
7. — Jelentés az 1884—89. években felmerült gazdasági rovarkárokról. — L. c., Budapest, 1892, I. köt., 8. füz., pag. 41; 1894, I. köt., 11. füz., p. 36.
8. Apfelbeck Viktor, Monographische Bearbeitung der zwölfstreifigen Otiorrhynchus-Arten. — Wissenschaftliche Mitth. aus Bosnien und der Hercegovina, Wien, 1895, Bd. III.
9. Bálint Sándor, Jelentés az 1888-ik év nyarán Székelyföldön tett rovartani kirándulás eredményéről. — Orvos-Természettud. Értesitő, Kolozsvár, 1889, II., p. 226.
10. Bargagli P., Rassegna biologica di Rincofori europei. — Bolletino della Società entom. italiana, 1884, p. 3.
11. Bau Al., Anomala vitis v. cupreonitens. — Berliner Entom. Zeitschr., 1883, p. 286.
12. Baudi Flaminio a Selve, Melasomata et Tenebrionidae in Cat. Dejean. — Deutsche Entom. Zeitschrift, 1876, p. 225.
13. — Europaeae et circum mediterraneæ Faunæ Heteromerorum specierum, etc. — L. c., 1877, p. 385.
14. — Mylabridum seu Bruchidum Europae et finitimarum regionum Faunæ recensio. — L. c., 1887, p. 33.
15. Bedel Louis, Monograph. des Erotyliens. — L'Abeille, 1868—1869, Tom. V, p. 1.
16. — Revision des Brachycerides. — Annal. de la Soc. Entom. de France, 1874, p. 119.
17. Beuthin H., Neue Varietäten von Carabus. — Entom. Nachrichten, 1885, p. 219.
18. Bieltz E. Albert, Systemat. Verzeichniss der Käfer Siebenbürgens. — Verhandl. und Mitth. des siebenb. Vereins für Naturwiss. zu Hermannstadt, 1850, Jg. I, p. 96.
19. — Zoologische Notizen zur Fauna Siebenbürgens. — L. c., p. 138.
20. — Entomologische Notizen. — L. c., p. 175.
21. — Der Schlossberg bei Déva in entom. Beziehung. — L. c., 1851, Jg. II, p. 146.
22. — Entomologische Beiträge. — L. c., 1852, Jg. III, p. 13.
23. — Zusätze, Nachträge und Berichtigungen, etc. — L. c., pag. 61.
24. — Naturhistorische Reiseskizzen. — L. c., p. 171.
25. — Handbuch der Landeskunde Siebenbürgens, Hermannstadt, 1857.
26. — Excursion in Siebenbürgen. — Verhandl. und Mitth. des siebenb. Vereins für Naturwiss. zu Hermannstadt, 1869, Jg. XX, p. 7, 29, 39, 59, 153, 170, 185.
27. — Die Erforschung der Käferfauna Siebenbürgens bis zum Schlusse des Jahres 1886. — L. c., 1887, Jg. XXXVII, pag. 59.
28. Biró Lajos, Adatok Zemplénmegye természetrajzi ismertetéséhez. Dr. Chyzer Kornél gyüjteményének bogarai. — A m. orvos. és természetvizsg. 1882. évi XXII. nagygyülésének Munkálatai, Budapest, 1883, p. 195.
29. — Kirándulás a Pop-Ivánra. — Rovartani Lapok, 1885, p. 30, 55.
30. — A keleti Kárpátok vidékének jellemző rovarfajai. — A Magyarorsz. Kárpát-Egyesület Évkönyve, 1885, XII. évf., p. 124.
31. Birthler Friedrich, Ueber die Varietäten der siebenbürg. Käferart Carabus Rothi Dej. — Verhandl. und Mitth. des siebenb. Vereins für Naturwiss. zu Hermannstadt, 1885, Jg. XXXV, p. 69.
32. — Ueber siebenbürg. Caraben und deren nächste Verwandte. — L. c., 1886, Jg. XXXVI, p. 55.
33. Blumenbach Johann Fridr., Fortsetzung des Versuches einer Igloer entomographischen Fauna. — Neue Beiträge zur Topographie und Statistik des Königr. Ungarn 1807.
34. Bodemeyer—Heinrichau E. v., Coleopterologische Ergebnisse einer Excursion nach Süd-Ungarn in Mai 1880. — Entom. Nachrichten, 1881, p. 245, 257.
35. Bolla Joh., Beitrag zur Kenntniss der Coleopteren-Fauna Pressburgs, 1859.
36. Bonvouloir Henri Vicomte, Monographie de la famille Eucnemides, Paris, 1870—71.
37. Brancsik C. Dr, Metoponcus tricolor n. sp. — Berliner Entom. Zeitschr., 1870, p. 418.
38. — Neue Coleopteren aus Ungarn. — L. c., 1874, p. 224.
39. — Eine Excursion auf dem Krivan in Ungarn. — Deutsche Entom. Zeitschr., 1876, p. 314.
40. — Trencsénmegye Téhelyröpüinek felsorolása. — Die Käfer des Trencsiner Comitates. — Trencsén Vármegyei Természettud. Egylet Évkönyve, II. évf., 1879.
41. — Zoologisch-botanische Wanderungen. — L. c., IV. évf., 1881, p. 69; VI. évf., 1883, p. 59; VII. évf. 1884, p. 77.
42. — I. Toldalék Trencsénmegye Téhelyröpüinek felsorolásához. — L. c., V. évf., 1882, p. 64.
43. — Állat- és növénytani megfigyelések a rajecz-tepliczi fürdőben. — L. c., VIII. évf., 1885, p. 21.
44. — II. Toldalék etc. — L. c., IX. évf., 1886, p. 84.
45. — Additamenta ad Faunam Comitatus Trencsiniensis. — L. c., XIII—XIV. évf., 1890—91, p. 43.
46. — Durch das Trencsiner Comitat. — L. c., XIV—XV évf., 1892—93, p. 135.
47. Brenske E. und E. Reitter., Curimus erinaceus Duft. — Deutsche Entom Zeitschr., 1884, p. 17.
48. Brissout Charles de Barneville, Ceuthorrhynchus nouveaux. — L'Abeille, 1868/69, Tom. V, p. 346.
49. — Monographie des espèces européennes et algériennes du genre Baridius. — Annal. de la Soc. Entom. de France, 1870, p. 31.
50. Brisout Henri de Barneville, Essai monograph. des espèces d'Europe et des confins de la Mediterranée du genre Corticaria. — Annal. de la Soc. Entom. de France, 1881, p. 375.
51. Bunyitay Vincze. Nagyvárad Természetrajza, Budapest, 1890.
52. Capiomont G., Monograph. des Larinus. — Annal. de la Soc. Entom. de France, 1874, p. 283.
53. — Monogr. des Lixus. — L. c., 1875, p. 41.
54. Chaudoir M. Baron, Description d'espèces nouvelles ou peu connues de Feronia Europ. — L'Abeille, 1868/69, Tom. V, p. 219.
55. — Essai monogr. sur le genre Cymindis. — Berliner Entom. Zeitschr., 1873, p. 53.
56. Chevrolat M. Aug., Strophosomus ocularis n. sp. — Bulletin de la Soc. Entom. de France, 1879, p. 139.
57. Chyzer Kornél, Ujabb adatok Zemplénmegye bogár-faunájához. — Rovartani Lapok, 1885, II. köt., p. 100, 122.
58. — Pótló adatok Zemplénmegye bogárfaunájához. — L. c., p. 251.

59. Conrad Josef, Bemerkung über Entomologie überhaupt. Ungar. Magazin, 1782, Bd. II.
60. Creutzer Christian, Entomologische Versuche, Wien, Schaumburg, 1799.
61. Cserny Béla, Gyulafehérvár környékének faunája. — Az alsó-fehérmegyei tört., régészeti és természettud. egylet évkönyve, 1888/89, I—IV. köt.
62. Daday Jenő, A pesterei barlangban tett kutatások eredménye. — Orvos-Természettud. Értesitő, Kolozsvár, 1880, p. 147.
63. Daniel K. und J., Coleopterenstudien, München, 1891.
64. Dejean M. le Comte, Species général des Coléoptères, Paris, 1825—1831.
65. Desbrochers des Loges J., Description d'Apiniodes, etc. — Mitth. der schweiz. entom. Gesellschaft, 1870, p. 179.
66. — Diagnoses d'espèces nouvelles de Coléoptères. — Annal. de la Soc. Entom. de France, 1871, p. 231.
67. — Remarques sur les Anoxia emarginata, etc. — L. c., 1874, p. 81.
68. — Bradybatus tomentosus. — Le Frelon, 1892/93, p. 117.
69. — Apion hungaricum n. sp. — L. c., 1894/95, p. 44.
70. Duvivier Ant., Enumeration des Staphylinides decrits depuis la publication du catalogue de MM. Gemminger et de Harold. — Annal. de la Soc. Entom. Belgique, 1883, p. 91.
71. Eichhof W., Ueber europ. Tomicus-Arten. — Entom. Zeitung, Stettin, 1877, p. 386.
72. Emery M. C., Essai monogr. sur les Mordellides, etc. — L'Abeille, Tom. XIV, 1876, p. 33.
73. Emich Gusztáv, A mező- és kertgazdaságra káros rovarok, Budapest, 1884.
74. Eppelsheim E. Dr., Ueber deutsche Staphylinien. — Deutsche Entom. Zeitschr., 1878, p. 385.
75. — Neue Staphylinen. — Entom. Zeitung, Stettin, 1881, p. 386.
76. — Neue Staphylinen der österr-ungar. Monarchie und der angrenzenden Ländern. — Wiener Entom. Zeitung, 1883, p. 251, 270, 301.
77. — Drei neue österreichische Staphylinen. — L. c., 1887, p. 229.
78. — Neue Staphylinen Europas und der angrenzenden Länder. — Deutsche Entom. Zeitschr., 1889, p. 161.
79. — Neue Staphylinen der österr.-ungar. Monarchie und der angrenzenden Länder. — Wiener Entom. Zeitung, 1892, p. 291.
80. — Eine neue Staphylinide aus Croatien. — Természetrajzi Füzetek, 1895, p. 220.
81. Fabricius Joh. Christ., Systema Eleutheratorum, Kiliae, 1801.
82. Fairmaire Leon et Allard Ernest, Revision du genre Timarcha. — Annal. de la Soc. Entom. de France, 1873, p. 143.
83. Faust J., Die europäischen und asiatischen Arten der Gattungen Erirrhinus, Notaris, Icaris, Dorytomus. — Bullet. de la Soc. Imperiale des Naturalists de Moscou, 1882, p. 133 et 368.
84. — Zur Gattung Echinocnemus Sch. — Entom. Zeitung, Stettin, 1887, p. 187.
85. Flach C., Fünf neue Trichopterygier. — Wiener Entom. Zeitung, 1888, p. 101.
86. — Bestimmungs-Tabellen der europ. Coleopteren, Phalacridae. — Verhandl. des naturf. Vereines in Brünn, 1888, Bd. XXVII, p. 54.
87. — Bestimmungs-Tabelle der Trichopterygidae des europ. Faunengebietes. — Verhandl. der zool.-botan. Gesellschaft in Wien, 1889, Bd. XXXIX, p. 481.
88. — Dichotrachelus Kimakoviczi, eine neue Art aus Siebenbürgen. — Wiener Entom. Zeitung, 1890, p. 36.
89. Fleischer Ant. Dr, Ein entomologisch. Ausflug von Brünn an die Grenze von Siebenbürgen im Jahre 1888. — Verhandl. des naturf. Vereines in Brünn, 1888, Bd. XXVII, p. 81.
90. — Eine neue Varietät von Cymindis humeralis Fourc., etc. — Wiener Entom. Zeitung, 1892, p. 208.
91. — Eine neue Varietät von Carabus obsoletus Strm. — L. c., 1893, p. 217.
92. Fauvel Alb., Aveugle ou non ? Réponse à M. de Saulcy au sujet des Glyptomerus et description d'une espèce nouvelle. — Revue d'Entomologie, 1885, p. 28.
93. — Revision du genre Tropiphorus. — L. c., 1888, p. 161.
94. Fowler W. W., The european Species of the genus Cerylon. — The Entomologist's Monthly Magazine, 1886/87, p. 71.
95. Frivaldszky Imre, Kirándulás a szepesi Kárpátokra. — A magy. orvos. és természetvizsg. IV. nagygyülésének Munkálatai, Pest, 1844, p. 100.
96. — Entomologiai kémletek. — Mathemat. és Term.-tud. Közlemények, kiadja a m. tud. Akadémia, Budapest, 1863, p. 251.
97. — Jellemző adatok Magyarország faunájához. — A m. tud. Akadémia Évkönyvei, 1865, XI. köt.
98. — Adatok a magyarhoni barlangok faunájához. — Mathem. és Természettud. Közl., kiadja a m. tud. Akadémia, Budapest, 1865, p. 18.
99. Frivaldszky János. A Herkulesfürdőn és környékén élő állatok. — «Herkulesfürdő és környéke» czimü Munk Manótól szerkesztett munkában, Budapest, 1872, p. 85.
100. — Állattani kirándulásaim Orsova, Mehádia és Korniaréva vidékein. — A m. orvosok és természetvizsgálók XVI. nagygyülésének Munkálatai, Budapest, 1873, p. 197.
101. — Honismertető. — Az 1873-ik évi bécsi kiállitás Magyar Catalogusának bevezető részében.
102. — Adatok Máramaros vármegye faunájához. — Math. és Természettud. Közlemények, kiadja a magyar tud. Akadémia, Budapest, 1873, p. 183.
103. — Magyarország Téhelyröpüinek Futonczféléi. — Értekezések a Természettud. köréből, kiadja a magyar tud. Akadémia. Budapest, 1874.
104. — Adatok Temes- és Krassómegyék Faunájához. — Mathemat. és Természettud. Közlemények. Kiadja a m. tudom. Akadémia, Budapest, 1876, XIII. köt. p. 285.
105. — Uj téhelyröpüek Magyarország déli részéből. — Coleoptera nova ex Hungaria meridionali. — Természetrajzi Füzetek, 1877, I. köt., p. 17.; 1880, IV. köt. p. 181.
106. — Magyarországi új Futó-bogarak. — L. c., 1877, I. k., p. 133.
107. — Az Anophthalmus al-nem Magyarországban eddig felfedezett fajainak átnézete s az Anophthalmus Merkli magyar leirása. — L. c., 1878, II. köt. p. 13.
108. — Uj Téhelyröpüek. — L. c., p. 111.
109. — Jellemző adatok Máramarosmegye téhelyröpüinek faunájához. — A magyar orvosok és természetvizsg. XIX. nagygyülésének munkálatai, Budapest, 1878, p. 128.
110. — Budapest és környéke állattani tekintetben. — Budapest és környéke természetrajzi, orvosi és közmüvelődési leirása, 1879, I.
111. — Magyarországi uj Téhelyröpüek. — Coleoptera nova ex Hungaria. — Természetr. Füzetek, 1879, III. kötet, p. 3., 1883, VII. köt., p 9.; 1884, VIII. köt., p. 279., 1388, XI. köt., p. 159.
112. — A magyarországi Eucnemida-félék. — L. c., 1879, III. köt., p. 204.
113. — Európai uj Téhelyröpüek. — Coleoptera Europæa nova. — L. c., 1881, VI. köt., p. 26.
114. — A mult években Magyarországban gyüjtött s hazánk téhelyröpü faunájára jellemző téhelyröpü fajok. — L. c., 1884, VIII. köt., p. 286.
115. — Cartodere filum Aub., — Rovartani Lapok, 1884, I. köt., p. 44.
116. — Az ivarok számviszonyai a rovaroknál. — L. c., pag. 250.
117. — Pótadatok a dr. Tömösváry Ödöntől összeállitott «Délmagyarország állattani tekintetben» czimü jegyzékhez.

A m. orvosok és természetvizsg. XXIII. nagygyülésének Munkálatai, Budapest, 1887, p. 272.
118. — Adatok Biharmegye födelesszárnyu rovarainak faunájához. — L. c., XXV., 1891, p. 504.
119. — Coleoptera duo nova ex Hungaria. — Természetrajzi Füzetek, 1892, XV. köt., p. 132.
120. — Coleoptera nova. — L. c., 1893, XVI. köt., p. 85.
121. Fuss Carl, Die siebenbürg. Arten der Gattung Nebria Latr. — Verhandl. und Mitth. des siebenb. Vereins für Naturwiss. zu Hermannstadt 1850, Jg. I, p. 13.
122. — Corticaria macularis. — L. c., p. 127.
123. — Entomologische Mittheilungen. — L. c., 1851, Jg. II, p. 112.
124. — Ueber Attagenus pantherinus. — L. c., 1852, Jg. III, p. 63.
125. — Beitrag zur siebenb. Insektenfauna. — L. c., p. 73.
126. — Entomologische Notizen. — L. c., p. 110, 136.
127. — Notizen und Beiträge zur Insektenfauna Siebenb. — L. c., 1853, Jg. IV, p. 207.
128. — Ueber die siebenb. Arten der Käfergattung Pæderus. — L. c., 1854, Jg. V, p. 16.
129. — Beitrag zur Insektenfauna Siebenbürgens. — L. c., 1855, Jg. VI, p. 20; 1856, Jg. VII, p. 35; 1858, Jg. IX, p. 4, 173; 1860, Jg. XI, p. 231; 1861, Jg. XII; pag. 151.
130. — Die siebenb. Chrysomelen und Oreinen. — L. c., 1856, Jg. VII, p. 25.
131. — Entomologische Excursion in die Kerzer Gebirge. — L. c., 1858, Jg. IX, p. 121.
132. — Beitrag zur Coleopterenfauna Siebenb. — L. c., p. 173.
133. — Leistus gracilis und alpicola. — L. c., 1860, Jg. XI, pag. 29.
134. — Die siebenb. Scydmænus-Arten. — L. c., p. 127.
135. — Die Siebenb. Eros-Arten. — L. c., p. 146.
136. — Berichtigungen und Beiträge zur siebenb. Käferfauna. — L. c., 1863, Jg. XIV, p. 50, 67, 118; 1864, Jg. XV, p. 146, 205; 1865, Jg. XVI, p. 14, 49; 1868, Jg. XIX, pag. 108.
137. — Drei neue Otiorrhynchus-Arten. — L. c., 1868, Jg. XIX, p. 171.
138. — Verzeichniss der Käfer Siebenbürgens. — Archiv des Vereins für siebenb. Landeskunde, Kronstadt, 1869, VIII. Bd., 3. H.
139. — Beiträge zum Verzeichniss der siebenb. Käferfauna. — Verhandl. und Mitth. des siebenb. Vereins für Naturwiss. zu Hermannstadt. 1871, Jg. XXI, pag. 18.
140. — Notizen und Beiträge zur Insectenfauna Siebenbürgens. — L. c., 1873, XXIII. Jg., p. 17; 1874, XXIV. Jg., p. 34.
141. Ganglbauer L., Zur Kenntniss der europ. Anomala-Arten. — Wiener Entom. Zeitung, 1882, Jg. I, pag. 164.
142. — Bestimmungs-Tabellen der europ. Coleopteren, VIII, Cerambycidæ. — Verhandl. der zool.-bot. Gesellschaft in Wien, 1883, Bd. XXIII, p. 437.
143. — Revision der Molops-Arten. — Deutsche Entom. Zeitschr., 1889, p. 113.
144. — Die Käfer von Mitteleuropa, Wien, 1892.
145. — Zwei neue Anophthalmen. — Wiener Entom. Zeitung. 1895, p. 261.
146. Gautier de Cottes, IX-e et X-e Recueil. — Mitth. der schweizer. Entom. Gesellschaft, 1869, p. 130.
147. Géhin J. B., Sur une variété du Carabus Parreyssi. — Revue d'Entom., Caen, 1882, p. 263.
148. Gever Gyula, Adatok Rozsnyó vidékének faunájához, phænologiai észleletekkel. — A m. orvosok és természetvizsg. XIII. nagygyülésének Munkálatai, Eger, 1869, pag. 239.
149. Guillebeau F., Revision des espèces du genre Phloeophthorus Woll., etc. — Annal de la Soc. Entom. de France 1893, p. 57.
150. Hampe Clemens Dr., Beschreibung einiger neuen Käfer-Arten. — Entom. Zeitung, Stettin, 1850, p. 351.
151. — Pleganophorus, eine neue siebenb. Käfergattung. — Verhandl. und Mitth. des siebenb. Vereins für Naturwiss. zu Hermannstadt, 1855, Jg. VI, p. 97.
152. — Ein kleiner Beitrag zur gross-österreichischen Käferfauna. — Wiener Entom. Monatschr., 1863, p. 285.
153. — Beschreibung einiger neuer Käfer. — Berliner Entom. Zeitschr. 1866, p. 271; 1870, p. 331.
154. — Zwei neue Anthicinen. — Verhandl. der zoolog.-bot. Gesellschaft in Wien, 1873, Bd. XXIII, p. 165.
155. Hampe Hermann, Beitrag zur Käferfauna Siebenbürgens. — Verhandl. und Mitth. des siebenb. Vereins für Naturwiss. zu Hermannstadt, 1852, Jg. III, p. 140.
156. — E. A. Bielz, Nachtrag zum Käfer-Verzeichnisse Siebenbürgens. — L. c., 1853, Jg. IV, p. 222.
157. Haury H., Descriptions de plusieurs variétés du genre Carabus. — Petites nouvelles entomologiques, 1877, Vol. II.
158. — Carabus catenatus und seine Varietäten. — Wiener Entom. Zeitung, 1885, p. 112.
159. Heller K. M., Meine Orsovaer Coleopteren-Ausbeute. Entom. Nachrichten, 1883, p. 183.
160. Herbst Johann Frid. Wilh., Natursystem aller bekannten in- und ausländischen Insecten; nach dem System des Ritters Carl von Linne, etc., Berlin, 1785—1806.
161. Herman Ottó, A Mezőség I. — Erdélyi Muzeum-Egylet Évkönyvei, Kolozsvár, 1868/70, V. köt., p. 8.
162. — Állattani Közlemények. — L. c., p. 92.
163. — Appendix Catalogi Coleopterorum Transsylvaniæ. — L. c., V. köt., p. 101.
164. — A Mezőség II. — L. c., 1872. VI. köt., p. 42.
165. — Korcsbogarak. — Természetr. Füzetek, 1877, 1. köt., pag. 22.
166. Heyden L. v., Beiträge zur europäischen Käferfauna. — Deutsche Entom. Zeitschr., 1875, p. 377.
167. — E. Reitter et J. Weise Catalogus Coleopterorum Europæ et Caucasi, Ed. III, Berolini, 1883.
168. — Ueber Plateumaris sericea L. und discolor Panz., — Deutsche Entom. Zeitschr., 1883, p. 209.
169. — Ueber die Varietäten der Nebria Dahli Strm. — L. c., 1884, p. 171.
170. — Varietäten von Melolontha vulgaris und hippocastani. L. c., p. 416.
171. — E. Reitter et J. Weise, Catalogus Coleopterorum Europæ, Caucasi et Armeniæ rossicæ, Mödling, 1891.
172. Hoffmann Anton von, Eine neue Form des Carabus catenatus aus dem kroatischen Gebirge. — Entom. Nachrichten, 1883, p. 213.
173. — Eine neue Agonalia-Art. — Deutsche Entom. Zeitschr., 1887, p. 96.
174. Hoffmannsegg Johan Graf v., Reise in einigen Gegenden von Ungarn, etc., Görlitz, 1800.
175. Hopffgarten Maximilian v., Berichte über entom. Excursionen nach einigen Comitaten Ungarns. — Deutsche Entom. Zeitschr., 1876, p. 337.
176. — Entomologische Reise nach Südungarn, Siebenbürgen und dem Biharer Comitate. — Entom. Zeitung, Stettin, 1877, p. 221.
177. — Einige Nachträge und Berichtigungen zur zweiten Auflage des Catalogus Coleopterorum Europæ v. Stein-Weise. — Entom. Nachrichten, 1878, p. 97.
178. — Domene aciculata n. sp. — L. c., p. 269.
179. — Thambus Frivaldszkyi Bonv. — L. c., 1880, p. 58.
180. Horn W., Roeschke H., Monographie der paläarktischen Cicindelen. — Deutsche Entom. Zeitschr., 1891. — Beiheft.
181. Horváth Géza Dr., A Magas-Tátra Téhelyröpüi. — A m. orvosok és természetvizsg. XIV. nagygyülésének Munkálatai, Pest, 1870, p. 296.
182. — A tornai hegység Téhelyröpü faunája. — L. c., XV., 1872, p. 219.

183. — A szamosfalvi sóstavakban élő rovarokról. — Természetr. Füzetek, 1877, I. köt., p. 94.
184. — Jelentés az 1883-ik évben Magyarország területén fellépett és megfigyelt kártékony rovarokról, Budapest, 1884.
185. — Izlet u Podsused u zagrebačkoj okolici mjeseca novembra. — Glasnik Hrvatsk. Naravosl. Druztva, Zagreb. 1887. p. 267.
186. Hostinszky C., Nächtlicher Fang der Käfer. — Entom. Nachrichten, 1876, p. 77.
187. Huebner Johann Gotfr., Beiträge zur Naturgeschichte der Insekten. — Naturforscher, 1789, Stück 24, p. 39.
188. Jurinac A. E., Faunistični pabirci po okolini Krapinskoj. — Glasnik Hrvatsk. Naravosl. Druztva, Zagreb. 1886, p. 145.
189. — Turistično faunistični izlet na Ivaniču. — L. c., 1887, p. 17.
190. — Prilog fauni zapadni Slavonije. — L. c., p. 21.
191. Kardos Károly., Máramaros vármegye egyetemes leirása, Budapest, 1876.
192. Kaufmann Ernő Dr, Ueber Verbreitung einiger Käferarten. — Entomolog. Nachrichten, 1880, p. 94.
193. — Polydrusus Merkli n. sp. — Rovarászati Lapok, 1883, p. 170.
194. Kempelen Radó, Heves- és Külső-Szolnokmegyék állattani leirása. — Heves- és Külső-Szolnok t. e. vármegyék leirása, 1868.
195. Kenderesy Dénes, Anophthalmus Budæ, uj faj leirása Hunyadmegyéből. — Természetr. Füzetek, 1879, III. kötet, p. 6.
196. Kiesenwetter H., Eine Excursion nach der Babia-Gura und in das Tatragebirge in Sommer 1868. — Berlin. Entom. Zeitschr., 1869, p. 305.
197. — Revision der europ. Arten der Gattung Malthodes. — I. Stück., l. c., 1872, p. 367; II. Stück, 1874, p. 45.
198. — Anobidæ. — Naturg. der Insekten Deutschlands, Berlin, 1877, Bd. V. I. Abtheilung.
199. Kirsch Th., Beitrag zur Kenntniss der Gattung Omophlus. — Berlin. Entom. Zeitschr., 1869, p. 97.
200. — Zur Kenntniss der deutschen Hyperiden. — Entom. Zeitung, Stettin, 1871, p. 173.
201. Kirschberg Oskar., Catalogus Coleopterorum Transsylvaniæ. — Az erdélyi muzeum-egylet évkönyvei, 1870, V. köt., p. 73.
202. Kov Tobias, Alphabetisches Verzeichniss meiner Insecten-Sammlung, Ofen, 1800.
203. Kraatz G. Dr, Staphylinii. — Naturg. der Insecten Deutschlands. Berlin, 1858.
204. — Beiträge zur europ. Käferfauna. — Berlin. Entom. Zeitschr., 1862, p. 263.
205. — Beiträge zur Kenntniss der Cassida-Arten etc. — L. c., 1874, p. 83.
206. — Vier neue europ. Molops-Arten etc. — Deutsche Entom. Zeitschr., 1875, p. 369.
207. — Zwei neue Grammoptera-Arten. — L. c., 1876, p. 344.
208. — Ueber Systematik und geogr. Verbreitung der Gattung Silpha L. und verwandten Genera. — L. c., p. 353.
209. — Ueber Carabus repercussus Drap. — L. c., 1877, p. 303.
210. — Varietäten deutscher Carabus. — L. c., 1878, p. 129.
211. — Carabus Ullrichii und seine Varietäten. — L. c., p. 134.
212. — Ueber einige Varietäten des Carabus Scheidleri. — L. c., p. 145; 1887, p. 339.
213. — Ueber Carabus Rothii Dej. — L. c., p. 295.
214. — Beiträge zur kritischen Scheidung und Deutung der früher zur Carabus violaceus gezogenen Arten. — L. c., p. 303.
215. — Die deutschen Orinocarabus. — L. c., p. 417.
216. — Ueber einige Varietäten des Procrustes coriaceus. — L. c., 1879, p. 63.
217. — Carabus irregularis v. bucephalus. — L. c., p. 170.
218. — Uebersicht der europ. Tropiphorus-Arten nach Dr. Stierlin's Arbeit. — L. c., 1882, p. 53.
219. — Ein fraglich neuer Carabus aus Ungarn. — L. c., 1887, p. 154.
220. — Dorcadion Cervæ Friv. etc. — L. c., 1894, p. 229.
221. Kraszny ánszky K., A bellusi hőforrások. — Trencsén Vármegyei Természettud. Egylet Évkönyve, 1890/91, XIII—XIV. évf., p. 29.
222. Kriesch János, Állattani utazási jelentések az 1870. és 1872-ik évről. — Mathemat. és Természettud. Közlemények, kiadja a m. tud. Akadémia, 1875, X. köt., p. 201.
223. Kuthy Dezső, Az isaszegi korona-erdő jellemző Coleopterái. — Rovarászati Lapok, 1883, p. 78.
224. — Trachyphloeus Frivaldszkyi species Coleopterorum nova e familia Curculionidarum. — Természetr. Füzetek, 1887, XI. köt., p. 27.
225. — Ceuthorrhynchus Paszlavszkyi n. sp. — L. c., 1890, XIII. köt., p. 7.
226. Kuwert A., Beiträge zur Kenntniss der Helephoren aus Europa und den angrenzenden Ländern. — Wiener Entom. Zeitung, 1886, p. 90, 135, 169.
227. — General-Uebersicht der Helephorinen Europas und der angrenzenden Gebiete. — L. c., p. 221, 247, 281.
228. — Uebersicht der europ. Hydrochus. — Deutsche Entom. Zeitschr., 1887, p. 289.
229. — Uebersicht der europ. Ochtebius-Arten. — L. c., p. 369.
230. — General-Uebersicht der Hydraenen der europ. Fauna. — L. c., 1888, p. 113.
231. — Uebersicht der Berosus-Arten Europas, der Mittelmeer-Fauna und der angrenzenden Länder. — L. c., p. 129.
232. — General-Uebersicht der Phylidrus-Arten Europas und der Mittelmeer-Fauna. — L. c., p. 273.
233. — Bestimmungs-Tabelle der Hydrophiliden Europas, Westasiens und Nordafrikas. — Verhandl. des naturf. Vereins in Brünn, 1890, Bd. XXVIII, p. 1, 159.
234. — Bestimmungstabelle der Parniden Europas etc. — Verhandl. der zool.-botan. Gesellschaft in Wien, 1890, Bd. XL, p. 15.
235. — Bestimmungstabelle der Heteroceren Europas etc. — L. c., p. 517.
236. Küster H. C. Dr, Die Käfer Europas, Nürnberg, 1844—1853.
237. Lefèvre Ed., Monogr. des Clythrides d'Europe et du bassin de la Méditerranée. — Annal. de la Soc. Entom. de France, 1872, p. 49.
238. Marseul M. S. A. de, Monographie des Buprestides. — L'Abeille, 1865, Tom. II.
239. — Monogr. des Endomychides d'Europe et des contrées limitrophes. — L. c., 1868/69, Tom. V, p. 51.
240. — Monographie des Mylabrides d'Europe. — L. c., 1871, Tom. VII.
241. — Monographie des Anthicides de l'ancien monde. — L. c., 1879, Tom. XVIII.
242. — Nouveau repertoire Coléoptères de l'ancien monde. — L. c., 1880, Tom. XIX.
243. — Monogr. des Chrysomélides d l'ancien monde. — L. c., 1883, Tom. XXI; 1886/87, Tom. XXIV.
244. Massányi Mihály, Léva város területén talált téhelyröpüek. — Értesitvény a lévai állami tanitóképezdéről az 1871/72. tanév végén.
245. Méhely Lajos, Adatok a Barczaság bogárvilágának ismeretéhez. — Orvos-Természettud. Értesitő, Kolozsvár, 1889, II., p. 193.
246. — Ujabb adatok Erdély s különösen a Barczaság bogárvilágának ismeretéhez. — L. c., 1890, II., p. 258.
247. — Erdély uj és ritka bogárfajai. — L. c., 1895, II., p. 179.
248. Merkl Ede, Egyes adatok a Phrygonophilus ruficollis életrajzához. — Természetr. Füzetek, 1878, II., p. 114.
249. — Anophthalmus Milleri Friv. eddigi lelhelyei. — L. c., 1879, III. köt., p. 112.

250. Méry Etel, Győrmegye és város egyetemes leirása, Győr, 1874.
251. Miller L., Eine September-Ausbeute v. Neusiedler See. — Wiener Entom. Monatschr., 1858, p. 347.
252. — Eine Excursion in die Tatra-Gebirge. — L. c., 1859, p. 300, 353.
253. — Bericht über eine in Frühling 1879 nach Dalmatien unternommene coleopterologische Reise. — Verhandl. der zool.-botan. Gesellschaft in Wien, 1880, Bd. XXX, pag. 1.
254. Mocsáry Sándor, Jellegző adatok Biharmegye téhelyröpüinek ismeretéhez. — A m. orvosok és természetvizsgálók XIV. nagygyülésének Munkálatai, Pest, 1870, p. 311.
255. — Adatok Biharmegye faunájához. — Mathem. és Természettud. Közlemények. Kiadja a m. tud. Akadémia, Budapest, 1872, X. kötet, p. 163.
256. — Biharmegye téhely- és pikkelyröpüi. — L. c., 1873, XI. köt., p. 95.
257. — Adatok Zemplén- és Ungmegyék faunájához. — L. c., 1875, XII. köt., p. 134.
258. — A biharmegyei barlangok állatvilága. — Természettud. Szemle, N.-Várad, 1876, p. 224.
259. — Adatok Zólyom- és Liptómegyék faunájához. — Mathem. és Természettud. Közlemények. Kiadja a m. tud. Akadémia, Budapest, 1878, XV. köt., p. 223.
260. Motschulsky Viktor M., Énumération des nouvelles espèces de Coléoptères. — Bulletin de la société imp. des naturalistes de Moscou, 1864, p. 171 ; 1865, p. 286.
261. Mulsant M. E., Species des Coléoptères Trimères Sécuripalpes, Paris, 1850.
262. Olivier Antoine Guill., Entomologie ou histoire naturelle des insectes, etc., Paris, 1789—1808.
263. Olivier E., Essai d'une révision des espèces européennes de la famille des Lampyrides. — L'Abeille, 1884, Tom. XXII, p. 1.
264. Ormay Sándor, Adatok Erdély bogárfaunájához, Nagy-Szeben, 1888.
265. — Coleoptera nova e Transsylvania. — Wiener Entom. Zeitung, 1888, p. 165.
266. — Újabb adatok Erdély bogárfaunájához, Budapest, 1890.
267. Paszlavszky József, A Corœbus bifasciatus Ol., etc. — Rovartani Lapok, 1885, p. 232.
268. Petri Carl Dr, Beitrag zur siebenb. Käferfauna. — Verhandl. und Mitth. des siebenb. Vereins für Naturwiss. in Hermannstadt, 1886, Jg. XXXVI, p. 72.
269. — Ueber den Stand der Coleopterenfauna der Umgebung Schässburgs. — L. c., 1891, Jg. XLI, p. 1.
270. — Monographie des Coleopteren-Genus Liparus Oliv. — L. c., 1894, Jg. XLIV, p. 26.
271. Petricskó Jenő, Adatok Beszterczebánya és vidékének faunájához. — A beszterczebányai kir. kath. főgymn. 1882/83 iki értesitőjében.
272. Petrogalli Arthur, Kirándulás a Nagy-Fátra Hermánd nevü völgyébe. — Trencsén Vármegyei Természettud. Egylet Évkönyve, 1886, IX. évf., p. 57.
273. — Kirándulás a Szitnyára. — L. c., 1888/89, XI—XII. évf., p. 132.
274. Peyron M. E., Étude sur les Malachiides d'Europe et du bassin de la Méditerranée. — L'Abeille, 1877, Tom. XV, p. 1.
275. Pisó Kornél, Az aranyos futrinka hazánkban. — Rovartani Lapok, 1885, p. 249.
276. Polinszky Emil, Árvamegyei bogarak. — L. c., 1886, p. 43.
277. — Adatok Somogymegye bogárfaunájához. — L. c., p. 146.
278. — Adatok az erdős Kárpátok bogárfaunájához. — L. c., p. 257.
279. Preudhomme de Borre, Étude sur les espèces de la tribu des Férionides. — Annal. de la Soc. Entom. de Belgique, 1879, p. 31 ; 1880, p. 131.
280. Putzeys J., Trechorum oculatorum Monographia. — Entom. Zeitung, Stettin, 1870, p. 7.
281. — Reitter, de Saulcy, Weise, Neue Käferarten aus Ungarn. — Deutsche Entom. Zeitschr., 1875, p. 355.
282. Redtenbacher Ludwig, Fauna Austriaca, Wien, 1874.
283. Régimbart Maurice, Essai monographique de la famille des Gyrinidæ. — Annal. de la Soc. Entom. de France, 1883, p. 121, 190.
284. — Dytiscidæ et Gyrinidæ d'Afrique et Madagascar IV. — Memoires de la Soc. Entom. Belgique, 1895, p. 1.
285. Reitter Edmund, Eine Excursion in's Tatragebirge im Jahre 1869. — Verhandl. des naturf. Vereins in Brünn, 1869, Bd. VIII, p. 3.
286. — Revision der europ. Meligethes-Arten. — L. c., 1870, Bd. IX, p. 39.
287. — Die europ. Nitidularien. — Deutsche Entom. Zeitschr. 1875, p. 1.
288. — Revision der europ. Cryptophagiden. — L. c., p. 31.
289. — Nachtrag zu den europ. Nitidularien. — L. c., p. 87.
290. — Revision der europ. Lathridiidæ. — Entom. Zeitung, Stettin, 1875, p. 297.
291. — Nachtrag zur Revision der europ. Lathridiidæ. — L. c., 1876, p. 50.
292. — Orthoperus punctatus n. sp. — Deutsche Entom. Zeitschr., 1876, p. 312.
293. — Coleopterologische Ergebnissee einer Reise nach Süd-Ungarn und die Transsylvanischen Alpen. — Verhandl. des naturf. Vereins in Brünn, 1877, Bd. XV, pag. 3.
294. — Ueber die geogr. Verbreitung einiger Käferarten. — Deutsche Entom. Zeitschr., 1887, p. 175.
295. — Beitrag zur Coleopteren-Fauna der Carpathen. — L. c., 1878, p. 33.
296. — Description des espèces d'Europe des genres Sacium et Arthrolips. — L'Abeille, 1878, Tom. XVI, p. 1.
297. — Coleopterologische Ergebnisse einer Reise nach Croatien und Slavonien. — Verhandl. der zool.-botan. Gesellschaft in Wien, 1879, Bd. XXIX, p. 35.
298. — Bestimmungs-Tabelle der europ. Coleopteren. Cucujidæ, Telmathophilidæ, etc. — L. c., p. 71.
299. — Coleopterologische Ergebnisse einer Reise nach Croatien, Dalmatien und der Herzegovina im Jahre 1879. — L. c., 1880, Bd. XXX, p. 201.
300. — Bestimmungs-Tabellen der europ. Coleopt. VI. Colydiidæ, Rhysodidæ, Trogositidæ. — Verhandl. des naturforsch. Vereines in Brünn, 1881, Bd. XX, p. 113.
301. — Bestimmungs-Tabellen der europ. Coleopt. Pausidæ, Clavigeridæ, Pselaphidæ und Scydmænidæ. — Verhandl. der zool.-botan. Gesellschaft in Wien, 1881, Bd. XXXI, p. 443 ; 1884, Bd. XXXIV, p. 59.
302. — L. Dr. v. Heyden et J. Weise, Catalogus Coleopterorum Europæ et Caucasi. — Ed. III., Berolini, 1883.
303. — Tableaux synoptiques des Pausides, Clavigerides, Pselaphides et Scydménides. — L'Abeille, 1883, Tom. XXI, p. 1.
304. — Revision der Alexia-Arten. — Deutsche Entom. Zeitschr., 1883, p. 236.
305. — Einige neue Coleopteren aus Süd-Europa. — L. c., 1884, p. 255.
306. — Bestimmungs-Tabellen der europ. Coleopt. XII. Necrophaga. — Verhandl. des naturf. Vereins in Brünn, 1884, Bd. XXIII, p. 1.
307. — Neue Coleopteren aus Europa und den angrenzenden Ländern, etc. — Deutsche Entom. Zeitschr., 1885, p. 67 ; 1887, p. 241 ; 1888, p. 417.
308. — Coleopterologische Notizen. — Wiener Entom. Zeitung, 1886, p. 347 ; 1887, p. 28, 104, 171, 214, 224, 230.
309. — Ueber die mit Abræus Leach verwandten Coleopteren-Gattungen. — L. c., 1886, p. 271.
310. — Bestimm.-Tabellen der europ. Coleopt. III. Scaphidiidæ, Lathridiidæ und Dermestidæ, II. Auflage, Mödling, 1887.

341. — Bestimmungs-Tabellen der europ. Coleoptera. Erotylidæ, Cryptophagidæ. — Verhandl. des naturf. Vereines in Brünn, 1887, Bd. XXVI, p. 3.
342. — Bestimm.-Tabelle der europ. Acupalpus-Arten. — Wiener Entom. Zeitung, 1888, p. 74.
343. — Uebersicht der Arten der Coleopteren-Gattung Alexia aus Europa und den angrenzenden Ländern. — L. c., p. 322.
344. — Analytische Tabelle zur Bestimmung der europ. Throscus-Arten. — L. c., 1889, p. 35.
345. — Uebersicht der mir bekannten Arten der Coleopteren-Gattung Triodonta Muls. — L. c., p. 283.
346. — Uebersicht der Arten der Coleopteren-Gattung Anisoplia aus Europa, etc. — Deutsche Entom. Zeitschr., 1889, p. 99.
347. — Uebersicht der Arten der Coleopt.-Gattung Anoxia Lap. aus Europa, etc. — Wiener Entom. Zeitung, 1890, p. 105.
348. — Uebersicht der bekannten Meleus-Arten aus Europa.— Deutsche Entom. Zeitschr., 1890, p. 94.
349. — Neue Coleopteren aus Europa, etc. — L., c., p. 145, 385.
350. — Uebersicht der mir bekannten Cortodera-Arten aus Europa, etc. — Wiener Entom. Zeitung, 1890, p. 243.
351. — L. Dr. v. Heyden et J. Weise. Catalogus Coleopterorum Europæ, Caucasi et Armeniæ rossicæ, Mödling, 1891.
352. — Uebersicht der Arten des Subgen. Menas Motsch. — Wiener Entom. Zeitung, 1893, p. 65.
353. — Vierter Beitrag zur Coleopteren-Fauna von Europa und den angrenzenden Ländern. — Wiener Entom. Zeitung, 1894, p. 101.
354. Rey Cl., Notices sur les Palpicornes et diagnoses d'espèces nouvelles ou peu connues. — Revue d'Entomologie, 1884, p. 266.
355. Riess Carl., Ausflüge in den Jahren 1868 und 1869. — Verhandl. und Mitth. des siebenb. Vereins für Naturwiss. zu Hermannstadt, 1869, Jg. XX, p. 131.
356. — Beitrag zur Käferfauna Siebenbürgens. — L. c., 1877, Jg. XXVII, p. 92.
357. Roeschke H., Horn W., Monogr. der paläarktischen Cicindelen. — Deutsche Entom. Zeitschr., 1891, — Beiheft.
358. Rosenhauer Wilhelm G., Beiträge zur Insekten-Fauna Europas, Erlangen, 1847.
359. Rottenberg A. B. v., Eine Excursion nach der Babia-Gura. — Berliner Entom. Zeitschr., 1867, p. 408.
360. — Revision der europ. Lacobius-Arten. — L. c., 1874, p. 305.
361. Rózsay E., Catalogus Coleopterorum Posonii et Cassoviæ inventorum. — Pozsonyi kath. főgymn. Értesitvénye, 1867/68.
362. — Enumeratio Coleopterorum Posoniensium. — A pozsonyi természettud.- és orvosegylet közleményei, 1873—75, p. 25.
363. Sajó Károly, Beiträge zu Weise's Bestimm.-Tabellen der europ. Coccinelliden. — Entomologische Monatsblätter, 1880, p. 159.
364. — Entom. Bilder aus den ungarisch. Flugsandsteppen. — Entom. Nachrichten, 1880, p. 198.
365. — Acht neue Coccinelliden-Varietäten aus Central-Ungarn. — L. c., 1881, p. 273.
366. Schilsky J., Beitrag zur Kenntniss der deutschen Käfer-Fauna. — Deutsche Entom. Zeitschr., 1891, p. 157.
367. Schlosser J. Dr, Fauna Kornjašah Trojedne Kraljevine, Zagrebu, 1877.
368. Schmidt Joh., Tabellen zur Bestimmung der europ. Histeriden. — Berliner Entom. Zeitschr., 1885, p. 279.
369. Schönherr Carl, Johann, Synonymia insectorum. Genera et species Curculionidum, Parisii, 1833—45.
370. Schwab Fridrich, Ueber das Vorkommen Cincidela elegans Fisch. in Siebenbürgen. — Verhandl. und Mitth. des siebenb. Vereins für Naturwiss. zu Hermannstadt, 1889, Jg. XXXIX, p. 90.
371. Schwarz O., Revision der paläarktischen Arten der Elateriden-Gattung Agriotes Esch. — Deutsche Entom. Zeitschr., 1891, p. 81.
372. Scopoli J. Anton., Annus V. Historico-Naturalis. Lipsiæ, 1772.
373. Seidlitz Georg Dr, Beitrag zur Käferfauna Siebenbürgens. — Verhandl. und Mitth. des siebenb. Vereins für Naturwiss. zu Hermannstadt, 1867, Jg. XVIII, p. 43.
374. — Zur genaueren Kenntniss einiger Catops-Arten Europas. — Deutsche Entom. Zeitschr., 1887, p. 81.
375. — Fauna transsylvanica, Königsberg, 1891.
376. — Tenebrionidæ. — Naturgesch. der Insekten Deutschlands, Berlin, 1893, Bd. V.
377. Severin G., Catalogue des Coleoptères de la famille des Gyrinides. — Annal. de la Soc. Entom. de Belgique, 1889, p. 149.
378. Speiser Ferencz, Coleopterák Kalocsa vidékéről. — A kalocsai Jézus-társaság főgymn. értesitője, 1883.
379. — Kalocsa környékének Bogárfaunája. — Coleoptera regionis Colocensis. — Kalocsa, 1893.
380. Stierlin G. Dr, Revision der europ. Otiorrhynchus-Arten, Berlin, 1861.
381. — Erster Nachtrag zur Revision der europ. Otiorrhynchus-Arten. — Berliner Entom. Zeitschr., 1862, p. 358.
382. — Otiorrhynchus Brancsiki n. sp. — Mitth. der schweiz. Entom. Gesellschaft, 1875, p. 484.
383. — Beiträge zur Kenntniss der Tropiphorus-Arten. — L. c., 1880, p. 71.
384. — Bestimm.-Tabellen europ. Coleopt. IX. Curculionidæ.— L. c., 1883, p. 403.
385. — Beschreibung einiger neuer Rüsselkäfer. — L. c., 1884, p. 36.
386. — Bestimm.-Tabellen europ. Rüsselkäfer. II. Brachyderidæ. — L. c., p. 57.
387. — Beschreibung einiger neuer Rüsselkäfer. — L. c., 1886, p. 282.
388. — Beschreibung neuer Rüsselkäfer und Bemerkungen. — L. c., 1887, p. 390.
389. — Beschreibung einiger neuer Rüsselkäfer. — L. c., 1888, p. 9.
390. — Ueber Otiorrhynchus bicostatus und verwandte Arten. Deutsche Entom. Zeitschr., 1889, p. 225.
391. — Bemerkungen über Coleopteren und Beschreibung neuer Arten. — Mitth. der schweiz. Entom. Gesellschaft, 1890, p. 240.
392. — Beschreibung einiger neuer Rüsselkäfer. — L. c., 1891, p. 269.
393. — Drei neue Rüsselkäfer-Arten. — L. c., 1893, p. 56.
394. — Beschreibung einiger neuer Rüsselkäfer. — L. c., 1894, p. 109.
395. Szmolay Vilmos Dr. Temesvár vidékén észlelt Téhelyröpü rovarok ösmertetése. — Délmagyarországi természettud. társulat évkönyve, 1875, p. 26.
396. Tournier Henri, Observations sur les espèces européennes et circumeurop. de la Tribu de Trychiides. — Annal. de la Soc. Entom. de France, 1873, p. 449.
397. — Curculionides nouveaux. — Mitth. der schweizer. Entom. Gesellschaft, 1873, p. 170.
398. — Matériaux pour servir à la Monographie de la Tribu de Tychiides. — Annal. de la Soc. Entom. de Belgique, 1874, p. 63.
399. — Liophloeus Hungaricus. — Pet. Nouvell. Entom. 1876, No. 14, p. 10.
400. — Phyllobius Gyllenhalli. — Mitth. der schweizer. Entom. Gesellschaft, 1877, p. 3.
401. Towson Robert, Travels in Hungary with a short account of Vienna in the year 1793, London, 1797.
402. Truqui E., Genre Iphthimus. — L'Abeille, 1868/69, Tom. V, p. 271.
403. Wachtl Fr. A., Die doppelzähnigen europ. Borkenkäfer. Mitth. aus dem forstlichen Versuchswesen Oesterreichs, Wien, 1884, p. 14.

374. Weise Julius, Neue Käferarten aus Ungarn, beschrieben von Putzeys, Reitter und de Saulcy. — Deutsche Entom. Zeitschr., 1875, p. 355.
375. — Phædon carniolicus Germ. und seine Varietäten. — L. c., p. 365.
376. — Coleopterologische Ergebnisse einer Bereisung der Cserna-Hora. — Verhandl. des naturf. Vereins in Brünn, 1875, Bd. XIV, p. 85.
377. — Beitrag zur Kenntniss der Gattung Læna. — L. c., 1877, Bd. XVI, p. 227.
378. — L. Dr. v. Heyden et E. Reitter, Catalogus, Coleopterorum Europæ et Caucasi, Ed. III, Berolini, 1883.
379. — Bestimmungs-Tabelle der Orina-Arten. — Deutsche Entom. Zeitschr., 1883, p. 248.
380. — Bemerkungen über Chrysomeliden. — L. c., p. 251.
381. — Bestimmungs-Tabelle der blauen oder metallischen Ceuthorrhynchus-Arten. — L. c., p. 321.
382. — Einige neue Chrysomeliden und Coccinelliden. — L. c., 1884, p. 161.
383. — Bestimmungs-Tabellen der europ. Coleopteren. II. Coccinellidæ, Mödling, 1885.
384. — Bemerkungen zur Gattung Julistus Kiesw. — Deutsche Entom. Zeitschr., 1887, p. 186.
385. — Malthodes fundator. — Zeitschrift für Entom., Breslau. 1887, p. 56.
386. — Ueber einige Chrysomelinen aus Siebenbürgen. — Deutsche Entom. Zeitschr., 1890, p. 30.
387. — L. Dr von Heyden et E. Reitter, Catalogus Coleopterorum Europæ, Caucasi et Armeniæ rossicæ, Mödling, 1891.
388. — Wie viel Arten enthält die Gattung Sclerophædon. — Deutsche Entom. Zeitschr., 1891, p. 158.
389. — Bemerkung zu Gattung Cassida. — Wiener Entom. Zeitung, 1891, p. 203.
390. — Über die Fundorte verschiedener Chrysomeliden, etc. — Deutsche Entom. Zeitschr., 1891, p. 384.
391. — Chrysomelidæ. — Naturg. der Insecten Deutschlands, Berlin, 1893, Bd. VI.
392. — Eine Excursion in das Tátra-Gebirge, etc. — Deutsche Entom. Zeitschr., 1894, p. 241.
393. Wény János, Bogarászat gyertyafénynél. — Rovartani Lapok, 1895, II. köt., p. 42.
394. Westwood J. O. Esqu. Glaresis Frivaldszkyi. — The Transactions of the Entom. Society of London, 1852—53, II, p. 72.

Addenda.

395. Beuthin H., Die Varietäten der Carabus cancellatus Ill. — Entom. Nachrichten, 1896, p. 115.
396. Desbrochers des Loges J., Espèces inédites de Curculionides de l'ancien monde. — Le Frelon, 1891—1896, p. 29.
397. — Description de huit espèces inédites de Curculionides. — L., c., p. 97.
398. Dietl. E. Carabus Linnei var. nov. Ludovicus. — Wiener Entom. Zeitung, 1896, p. 197.
399. Ganglbauer L., Sammelreisen nach Südungarn und Siebenbürgen. Coleopt. Ergebnisse derselben. — Annalen des Naturhist. Hofmuseums, 1896, XI. Bd, Heft 2, p. 165.
400. — Ein neuer Bythinus vom Neusiedlersee. — Verhandl. der zool.-bot. Gesellschaft in Wien, 1896, Bd. XLVI., p. 170.
401. — Neue und wenig bekannte Carabiden. — L. c., p. 457.
402. — Eine neue Art der Scydmæniden-Gattung Euthia. — L. c., p. 468.
403. Petri Karl Dr, Revision der Mittel- und Westeuropäischen Arten der Gattung Plinthus Germ. — Wissenschaftliche Mitth. aus Bosnien und der Hercegovina, 1896, IV. Bd., p. 559.
404. Procházka Joh., Revision der Coleopteren-Gattung Danacæa Laporte aus der paläarcktischen Fauna. — Verhandl. des naturf. Vereines in Brünn, 1894, Bd. XXXIII., p. 7.
405. Reitter Edmund, Bestimmungs-Tabellen der Borkenkäfer (Scolitidæ) aus Europa und den angrenzenden Ländern. — Verhandl. des naturf. Vereines in Brünn, 1894, XXXIII. Bd., p. 36.
406. — Bestimm.-Tab. Europ. Coleop. Carabidæ. — L. c., 1895, XXXIV.. Bd., p. 36.
407. — Siebenter Beitrag zur Coleopteren-Fauna von Europa und den angrenzenden Ländern. — Wiener Entom. Zeitung, 1896, p. 225.
408. — Beitrag zur Kenntniss der Arten und Varietäten der Coleopteren-Gattung Cetonia L. — Entom. Nachrichten, 1896, p. 241.
409. — Übersicht der bekannten Arten der Coleopteren-Gattung: Adrastus Esch. aus Europa und den angrenzenden Ländern. — Deutsche Entom. Zeitschr., 1896, p. 157.
410. — Übersicht der Arten der Coleopteren-Gattung: Liparus Oliv., Molytes Schönh. — L. c., p. 319.
411. Schultze August, Beschreibung einiger neuer Ceuthorrhynchinen. — Deutsche Entom. Zeitschr., 1895, p. 422.
412. — Zur Kenntniss von Ceuthorrhynhus marginatus Payk. und Mölleri Thoms. — L. c., p. 434.
413. — Beschreibung neuer Ceuthorrhynchinen. — L. c. 1896, p. 261.
414. Stierlin G. Dr, Beschreibung einiger neuen europäischen Rüsselkäfer. — Mitth. der. schweiz. Entom. Gesellschaft, 1895, p. 300.
415. — Description de deux Curculionides nouveaux d'Europe. — Le Frelon, 1895—96, p. 43.

Ordo. COLEOPTERA.

Fam. CICINDELIDAE.

Cicindela L.

1. *silvatica* L. — III. Sasvár. IV. Bártfa.
2. *campestris* L. — Communis.
   v. *affinis* Fisch. — I. Budapest, Szeged. V. Montes Kerczenses, Segesvár, Sz.-Régen, Montes ad fluvium Maros, Borszék. VI. Herkulesfürdő.
   v. *funebris* Strm. — V. Brassó. (Legit L. Méhely, 245, p. 195.)
   v. *connata* Heer. — V. Segesvár, Vallis Zsil. (Bielz, 27. p. 39.)
3. *silvicola* Latr. — III. Selmecz, Hermánd, Zsolna, Koritnyicza, Tátrafüred. IV. Bártfa, Mons Simonka, Varannó, Montes Szinnaikő et Rabaszkala. Vallis Lopuszánka, V. Bogdánháza, Zilah, Apácza, Vallis Zsil, Mons Paring, Kis-Disznód, Praesbe, K.-Talmács, Porcsesd, Fenyőfalva, Montes Kerczenses, Héviz, Brassó, Predeál, Bükszád, Mons Büdös, Sz.-Régen, Montes ad fluvium Maros. VI. Mons Szemenik, Herkulesfürdő. VII. Fužine.
4. *hybrida* L. — (*maculata* Degeer, *silvicola* Curtis, *integra* Strm.) — In toto regno occurrit.
   v. *riparia* Latr. — I. Debreczen, N.-Várad, Székelyhid. II. D.-Örs. III. Tátrafüred. IV. Kassa, Bártfa, N.-Bocskó. V. Montes Kerczenses, Brassó, Segesvár.
5. *maritima* Latr. v. *magyarica* Roeschke. — I. Akasztó, Keczel. VI. Grebenácz.
6. *soluta* Latr. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Hadház, Debreczen. II. Keszthely, Pécs. V. Brassó. VI. Grebenácz.
7. *arenaria* Fues. v. *sinuata* Panz. — I. Budapest, Péczel, Isaszeg, Keczel, Hajós, P.-Poó, Debreczen. II. Keszthely, III. K.-Kálna. IV. Szomotor. V. N.-Enyed, Vizakna, Porcsesd, Medgyes, Sz.-Régen, M.-Záh.
8. *chiloleuca* F. — V. Déva, Szeredahely, Vizakna, F.-Bajom, Segesvár, Idecspatak, G.-Sóakna, Szamosfalva, Torda, M.-Záh.
9. *elegans* Fisch. v. *Seidlitzi* Kr. — V. Torda. (Legit. A. Ormay.)
10. *littoralis* F. — Frequens.
    v. *lunulata* F. (*nemoralis* Oliv.) — III. Beczkó. (Brancsik, 40. p. 12.)
11. *germanica* L. — In toto regno occurrit.

Fam. CARABIDAE.

Calosoma Web.

1. *inquisitor* L. — Frequens.
2. *sycophanta* L. — Ut prior.
   v. *severum* Chaud. — In regione V. (Reitter, 406. p. 47.)
3. *auropunctatum* Herbst. — I. Budapest, Péczel, Félegyháza, Hajós, P.-Poó, B.-Csaba, M.-Kovácsháza, Szeged. II. Bicske, D.-Örs. III. Putnok. IV. S.-A.-Ujhely. VI. Temesvár.

Procerus Dej.

4. *gigas* Creutz. — V. Vöröstorony. VI. Herkulesfürdő (Mons Domoglet, Vallis Zserelen). VIII. Fiume, Sušak, Buccari, Crkvenica, Carlopago, Zengg.

Carabus L.

5. *coriaceus* L. — In regionibus montanis frequ., in planitie passim occurit.
   v. *rugifer* Kr. — Simul cum stirpe.
   v. *imminutus* Kr. — VII. Plišević. (Auctor, 216. p. 64.)
   v. *spretus* Dej. — VII. Ogulin. VIII. Fiume.
   v. *banaticus* Redtb. — II. Pécs VI. Báziás, Drenkova, Orsova, Herkulesfürdő. VII. Ruma.
   v. *subrugosus* Kr. — II. N.-Vázsony. V. Frequens.
   v. *rugosus* Dej. — VII. Teste Ganglbauer. (144, p. 45.)
6. *caelatus* F. v. *Schreiberi* Kr. — VII. Velebit. VIII. Fiume.
   v. *macretus* Kr. — VII. Velebit. VIII. Carlopago.
   v. *dalmatinus* Duft. — Ut prior.
7. *croaticus* Dej. — VII. Capella, Velebit, Fužine.
8. *planicollis* Küst. — V. Dús, Praesbe, Vallis Czód,

Mons Szurul, Telek, Lacus Girbova, Montes Porumbákenses, Negoi, Montes Kerczenses, Lacus Bulea-tó dictus, Montes Fogarasenses, Bucsecs. VI. Alpes Szörényenses, Vallis Jucz.

9. *Deubeli* Reitt. — V. In regionibus alpinis. (Auctor, 407. p. 225.)

10. *violaceus* L. — In regionibus montanis communis.
v. *exasperatus* Duft. — VI. Herkulesfürdő. (Legit. J. Pável.)
v. *cyaneolimbatus* Kr. — V. Montes Retyezát et Cibinenses, K.-Disznód, Praesbe, Montes Kerczenses, Mons Királykő, Oláhfalu. (Bielz, 27, p. 39.)
v. *Méhelyi* Ganglb. — V. In regionibus alpinis (Montes Korongyos et Ünökő).
v. *Wolffi* Dej. — VI. Herkulesfürdő, Mons Domoglet.
v. *aurolimbatus* Dej. — III. Teste E. Frivaldszky in Comitatu Gömör.
v. *obliquus* Thoms. — II. Kőszeg. V. Borszék, Brassó (secundum Bielz). VII. Ljeskovac.
v. *macilentus* Reitt. — I. Hagymádfalva. (Legit Dr. A. Fleischer, 89, p. 82.)
v. *Neesii* Hoppe. — III. Trencsén. (Brancsik, 40, p. 13.)
v. *Germari* Strm. (*detritus* Drap.) — V. Praesbe, Montes Kerczenses, Bodza, Borgó, Mons Ünökő (secundum Bielz). VII. Našice, Fužine.
v. *azurescens* Dej. — VI. Mons Szemenik. VII. Velebit. (Kraatz, 214. p. 314.)

11. *hungaricus* F. — I. Budapest, Isaszeg, Dabas, P.-Poó. II. Sopron. VI. Temesvár.

12. *catenulatus* Scop. — II. Kőszeg. III. Z.-Váralja, Montes Szoblahóenses. V. Montes Nagyhagymás, Vigyázókő et Királykő. VII. Ivanec.

13. *intricatus* L. — In regionibus montanis frequens.
v. *liburnicus* Haury. — VII. Velebit. VIII. Fiume.
v. *angustulus* Haury. — I. Hagymádfalva. III. Beszterczebánya. VI. Báziás, Herkulesfürdő.

14. *Fabricii* Panz. — III. Mons K.-Kriván, Vallis Vrátna, Mons Chocs, Tátrafüred. IV. Mons Pietrosz. V. Montes Radnaenses: Mons Ünökő. VII. Velebit.
v. *nigrinus* Schilsky. — III. Mons Djumbir, Lacus Felkai-tó dictus.
v. *malachiticus* Thoms. — III. Tátra (Zöldtó). V. Mons Ünökő.

15. *Creutzeri* F. — VII. Risnjak, Fužine, Velebit.

16. *pseudonothus* Kr. — VII. Velebit. (Ganglbauer, 144, p. 57.)

17. *irregularis* F. — III. Mons K.-Kriván, Vallis Vrátna. IV. Montes Vihorlat, Szinnaikő, Hoverla et Pietrosz, Vallis Fajna, V. K.-Disznód, Praesbe, Montes Kerczenses, Brassó, Montes ad fluvium Maros, Mons Ünökő. VI. Korniaréva. VII. Risnjak.
v. *bucephalus* Kr. — VII. Velebit. (Auctor, 217, p. 170.)
v. *Montandoni* Buysson (*brunnipes* Beuth.) — III. Montes Babia-Gura. V. Mons Sánta (Montes Cibinenses), Vallis Czód, Montes Kerczenses et Fogarasenses, Brassó, Mons Bucsecs, Toplicza, Mons Nagykőhavas, Hoszszufalu, Montes Tészla et Dongókő, Bodza.

18. *auronitens* F. — III. Hermánd, Beszterczebánya, Trencsén. IV. Mons Vihorlat.
v. *atratus* Heer. — V. Mons Strázsa, Montes Fogarasenses, Mons Negoi (secundum Bielz, 27, p. 40).
v. *subcatenulatus* Westh. — V. Montes Kerczenses. (Bielz, 27, p. 40.)
v. *Escheri* Pall. (*Fussi* Birthl.) — I. Feketeerdő (Montes Biharenses). IV. Montes Vihorlat et Rabaszkala, Vallis Fajna, Mons Hoverla, Cserna-Hóra. V. In regionibus alpinis et subalpinis frequens. VI. Mons Szemenik, Vallis Jucz, Mons Cserteg, Vallis Zserelen.
v. *laevipennis* Seidl. — I. Montes Biharenses. IV. Mons Hoverla. V. Vallis Czód, Mons Korongyos.
v. *Deubeli* Hopffg. — V. Montes Csikenses (Bielz, 27. p. 40.)
v. *opacus* Haury. — IV. Cserna-Hóra (Com. Marmaros). V. Fogaras, Mons Negoi.

19. *variolosus* F. — In regionibus subalpinis et territoriis vicinis frequens.

20. *nitens* L. — III. T.-Teplicz, Oravicz, Montes Babia-Gura. IV. Bártfa.

21. *auratus* Schaum. — I. Szeged (ad ripam fluvii Tisza). IV. Bustyaháza, N.-Bocskó.

22. *clathratus* L. — I. Budapest, Péczel, Hajós, M.-Túr, Debreczen, N.-Várad, Székelyhid. II. Pécs. III. Beszterczebánya. V. Tasnád, Brassó, K.-Somlyó. VI. Temesvár.

23. *granulatus* L. — Communis.
v. *rubripes* Géh. — Ut prior.
v. *forticostis* Kr. — V. Prázsmár. (Legit L. Méhely, 246, p. 262.)
v. *interstitialis* Duft. — III. Á.-Váralja. IV. Bártfa.

24. *cancellatus* Ill. — Frequens.
v. *biharicus* Reitt. (*rufoscapus* Beuthin). — I. Montes Biharenses. VI. Szekul, Herkulesfürdő.
v. *femoralis* Géh. — V. N.-Szeben, Montes Kerczenses, Brassó.

v. *tuberculatus* Dej. — I. Debreczen, Hagymádfalva. V. Brassó, Zajzon, Mons Tészla, N.-Ajta.
v. *bicolor* Beuthin. — Simul cum priori.
v. *durus* Reitt. — III. Comitatus Trencsén. (Auctor, 406. p. 151.)
v. *scythicus* Schaum. — III. Koritnyicza, Oravicz. V. Resinár, Vöröstorony, Montes Kerczenses et Brassóenses, Mons Dongókő, Montes Bodzaenses, Montes Korongyos et Ünökő.
v. *pseudograniger* Reitt. — III. Trencsén. (Auctor, 406. p. 152.)
v. *graniger* Pall. (*szobroniensis* Géh.) — I. Hagymádfalva. IV. Montes Lungacsásza et Hoverla. V. Frequens. VI. N.-Bogsán, Resicza, Ferenczfalva, Szekul, Herkulesfürdő.
v. *Nicanor* Haury. — VI. Baziás, Orsova.
v. *basalis* Beuthin. — Ut prior.
v. *Mühlfeldti* Géh. — I. Comitatus Bihar. (Reitter, 406. p. 152.)
v. *subgraniger* Reitt. — V. Kolozsvár. (Auctor, 406. p. 152.)
v. *nigricornis* Dej. — I. Hagymádfalva. V. Brassó.
v. *emarginatus* Duft. — I. Kalocsa. II. Nagy-Vázsony. V. Hátszeg. VI. Temesvár. VII. Capella.
v. *intermedius* Dej. — V. Hátszeg, N.-Csűr, Segesvár (secundum Bielz). VIII. Fiume.

25. *Ullrichi* Germ. (*Leuckarti* Petri). — In regionibus montanis frequens.
v. *parallelus* Kr. — I. Hagymádfalva. VI. N.-Bogsán.
v. *viridilimbatus* Kr. — VI. N.-Bogsán. (Auctor, 210, p. 136.)
v. *robustus* Kr. — II. Pécs. VI. Herkulesfürdő.
v. *fastuosus* Pall. (cupreonitens Kr., *superbus* Kr.) — V. Brassó, Nagyág, VI. Resicza, Anina, Domán, Báziás, Uj-Moldova, Orsova, Herkulesfürdő.

26. *catenatus* Panz. — VII. Ogulin, Fužine, Velebit. VIII. Fiume, Buccari, Zengg.
v. *alternatus* Haury. — VII. Gospić, Velebit. (Auctor, 158, p. 114.)
v. *Herbsti* Dej. (*Korlevići* Hoffm.) — VII. Lič. (Hoffmann, 172. p. 213.)

27. *Parreyssi* Pall. — VII. Ljeskovac, Mons Sveto-Brdo.
v. *Gattereri* Géh. — VII. Jadovno. (Auctor, 147, p. 263.)

28. *arvensis* Herbst. — In regionibus alpinis vage occurrit.
v. *alpicola* Heer. — V. Montes Csukásenses, Mons Ünőkő.
v. *nigrinus* Westhof. — V. Montes Fogarasenses, Montes Királykő et Bucsecs, Montes Bodzaenses.

29. *obsoletus* Strm. (*Sacheri* Thoms, *aurocupreus* Reitt.) — I. Montes Biharenses. III. Mons Sztrazsov (Com. Trencsén), T.-Teplicz, Oravicz, Barlangliget, Igló, Rosnyó. IV. Mons Jólesz, Bártfa, Montes Rabaszkaia et Hoverla, Kapnikbánya. V. Montes Láposenses, Mons Korongyos, Montes Görgényenses et Marosenses, Gyergyó.
v. *euchromus* Palld. — V. Vallis Zsil. K.-Disznód, Praesbe, Montes Felekenses, Kerczenses, Árpásenses et Fogarasenses, Brassó, Mons Nagykőhavas, Zerneszt, VI. Mons Szemenik, Herkules-Fürdő, Mons Opesata, Korniaréva.
v. *carpathicus* Palld. — I. Mons Betfia (Com. Bihar), Feketeerdő, Sonkolyos. III. Hermánd, IV. Szádellő, Runyina, S.-A.-Ujhely, M.-Sziget.
v. *nagyagensis* Birthl. (*procerus* Bielz). — V. Zalatna, Déva, Nagyág.
v. *Bielzi* Birthl. — V. Montes Cibinenses, Montes Galbina et Negován.
v. *fossilifer* Fleisch. — I. Hagymádfalva. (Auctor, 91, p. 217.)

30. *monilis* F. v. *Schartowi* Heer. — IV. Bártfa, Málca.

31. *Scheidleri* Panz. — I. Budapest, Kalocsa, Nagy-Várad, Feketeerdő, Vallis fluvii Kőrös, Vaskóh. II. D.-Földvár, Paks, Pécs. III. Pozsony, Tavarnok, K.-Kálna.
v. *Preyssleri* Duft. — I. Budapest, Verseg, Vallis fluvii Kőrös. III. Pozsony, Tavarnok, Trencsén, Koritnyicza, Szliács, Putnok. IV. Almás, Jabloncza, Nádaska, Komjáti, Montes Rabaszkala et Hoverla.
v. *repercussus* Drap. — In montibus Carpathicis. (Kraatz, 209. p. 303.)
v. *gibbicollis* Mots. — Hungaria (Cat. Col. Europ. 1891. p. 9.)*
v. *Helleri* Ganglb. — II. Komárom. III. Nyitra.
v. *excellens* F. — V. Montes Cibinenses, Nagy-Szeben, Kereszténysziget.
v. *styriacus* Kr. — I. Montes Biharenses. IV. Comitatus Marmaros.
v. *praecellens* Pall. — II. Pécs. VI. Pétervárad. VII. Vrdnik.
v. *Illigeri* Dej. — VII. Capella, Pliševica.

32. *Kollari* Pall. — VI. Stájerlak, Szászka, Herkulesfürdő, Vallis Zserelen.
v. *Zawadszkyi* Kr. (*dacicus* Bielz). — III. Hermánd, Budatin. IV. Com. Marmaros. V. Deés. Csáki-Gorbó, M.-Lápos, O.-Láposbánya, Mons Cibles, Radna.

* Secundum Auctorem Austriae, non Hungariae incola (260, 1865. p. 287.)

v. *Ormayi* Reitt. — IV. Beregszász. (Leg. A. Ormay.)

v. *comptus* Dej. (*Merkli* Kr.) — I. Hagymádfalva. V. Montes Biharenses, H.-Szamos, Gyalu, Kolozsvár, Segesvár. VI. Alpes Szörényenses, Mons Szárko.

v. *Hopffgarteni* Kr. — V. Montes Hátszegenses. VI. Alpes Szörényenses.

v. *incompsus* Kr. — V. Brassó (Mons Czenk), Montes Kereszténvhavas et Tészla, Udvarhely, Tömös, Előpatak, Sz.-Magyaros, Krizba, Montes Korongyos et Ünökő.

v. *Hampei* Küst. — IV. Vallis Fajna, Mons Hoverla, Vallis Tiszcsora. V. Magyarpatak, N.-Enyed, Buzamező, Származás, M.-Záh, Gyeke.

v. *aurosericeus* Kr. — V. Sz.-Ujvár, N.-Enyed, M.-Vásárhely, Vallis Nyárad, Sz.-Régen, Teke, Höltövény.

v. *Rothi* Dej. (*aequistriatus* Kr., *Birthleri* Reitt.) — V. Frequens.

v. *varistriatus* Kr. — V. N.-Szeben, Fogaras, N.-Sink, Kőhalom, Segesvár.

v. *quadricatenatus* Kr. — V. Nagy-Szeben, N.-Sink, Segesvár.

v. *latestriatus* Kr. — Ut prior.

v. *rugulosus* Birthl. — V. N.-Sink. (Bielz, 27, p. 40.)

v. *Marusii* Bielz (*Kollari* Fuss). — V. Nagy-Enyed, Zalatna, Gyulafehérvár, Nagyág, Déva.

v. *magnificus* Kr. — VI. Báziás. (Auctor, 212, 1878, p. 145.)

v. *Frivaldszkyi* Kr. — Secundum Auctorem etiam Hungariæ incola. (212., 1887. p. 240.)

33. *scabriusculus* Ol. — Habitat in toto regno.

v. *Lippi* Dej. — I. B.-Csaba, M.-Kovácsháza. V. Sz.-Ujvár, Gyalu, Kolozsvár, Oláhfalu, Segesvár, N.-Sink, N.-Szeben, Sz.-Sebes, Sz.-Város, Piski, Déva, Hátszeg. VI. Temesvár, Fehértemplom.

34. *montivagus* Palld. — V. Déva, Szelindek, Szelyiste, Berethalom, Medgyes, Segesvár, Gyeke, Montes Persányenses. VI. Stájerlak, Uj-Moldova, Mons Allion, Herkulesfürdő. VII. Teste Reitter.

v. *blandus* Friv. — I. Péczel, Isaszeg, Hagymádfalva. III. Tavarnok, Lévárt. IV. Szádellő, S.-A.-Ujhely. V. Sz.-Ujvár, Csik.

v. *velebiticus* Hampe. — VIII. Crni-Dabar, Oštarije.

35. *nemoralis* Müll. — In regionibus montanis passim occurrit.

36. *glabratus* Payk. — In regionibus subalpinis frequens.

v. *punctatocostatus* Haury. — V. Montes Kerczenses, Brassó, Mons Bucsecs.

v. *extensus* Kr. — I. Hagymádfalva. VI. Herkulesfürdő.

v. *breviusculus* Kr. — V. Brassó: Mons, Czenk. (Leg. F. Deubel; Méhely, 245, p. 196.)

37. *marginalis* F. — VI. Mons Pietrosz, V. Nagy-Szeben, Kereszténysziget, Montes ad fluvium Maros.

38. *decorus* Seidl. — V. Rátosnya. (Auctor, 345, p. 14.)

39. *hortensis* L. — In regionibus montanis occurrit.

v. *Neumayeri* Schm. — VII. Velebit, Oštarije.

40. *sylvestris* Panz. v. transsylvanicus Dej. (*glacialis* Mill., *Hoppei* Kr.) — III. Mons Djumbir, Tátra, (Felkaitó, Zöldtó, Javorina). IV. Cserna-Hóra, Mons Pietrosz. V. Frequens.

41. *Linnei* Pz. — In regionibus subalpinis frequens.

v. *Scopolii* Dej. — In montibus regionis VI. (Auctor, 64, II. p. 170.)

v. *Macairei* Dej. — III. Trencsén. IV. Mons Pietrosz. V. Montes Kerczenses.

v. *Ludovicus* Dietl. — V. Vöröstorony. (Detexit Auctor.)

v. *bescidensis* Reitt. — IV. Montes Beszkidenses. (Auctor, 406, p. 191.)

v. *Hopffgarteni* Beuth. — V. Montes Kerczenses. (Bielz, 27, p. 39.)

v. *polonicus* Motsch. — V. Teste Seidlitz. (345, p. 16.)

42. *convexus* F. — In toto regno passim occurrit.

v. *dilatatus* Dej. — VI. Orsova. (Mons Allion). VII. Fužine, V.-Gorica.

Cychrus F.

43. *rostratus* L. — In regionibus subalpinis frequens.

v. *elongatus* Hoppe. — III. F.-Hámor. IV. Mons Hoverla. V. Montes Hátszegenses, Mons Retyezát.

v. *pygmaeus* Chd. — III. Koritnyicza, Tátrafüred. IV. Vallis Lopuszánka. V. Praesbe, Mons Szurul, Cibinjézer, Mons Surian, Montes Kerczenses.

44. *semigranosus* Pall. — V. Valles Zsil et Czód, N.-Csür, Montes Kerczenses, Dragus, Fogaras, Brassó, Mons Kereszténvhavas, Sz.-Magyaros, Berethalom, Medgyes, Segesvár. VI. Oravicza, Mons Szemenik, Mehádia.

45. *attenuatus* F. — II. Badacsony. III. Várna, T.-Teplicz, Rajecz, Mons K.-Kriván, Hermánd, Mons Prasiva, Koritnyicza, Tátrafüred. IV. Szádellő, H.-Olyka. V. Medgyes, Berethalom. VI. Capella, Velebit.

Leistus Fröl.

46. *spinibarbis* F. — VII. Karst (Visevica), Carlopago, Buccari.

47. *montanus* Steph. — VII. Velebit. (Marseul, 242, p. 60.)
48. *rufomarginatus* Duft. — In regionibus montanis frequens.
49. *nitidus* Duft. — V. Praesbe, Brassó, Montes Fogarasenses. VI Herkülesfürdő, Korniaréva. VII. Fužine.
50. *ferrugineus* L. — Communis.
51. *rufescens* F. — I. Budapest. IV. Kőrösmező, Cserna-Hóra. V. Segesvár.
52. *gracilis* Fuss. — V. Bucsecs. VI. Montes in Comitatu Krassó-Szörény, Mehádia.
53. *piceus* Fröl. — In regionibus subalpinis frequens.
54. *alpicola* Fuss. — V. Lacus Girbova et Bulea, Montes Kerczenses et Felekenses, Mons Bucsecs.

Nebria Latr.

55. *livida* L. — I. Budapest, Péczel, Mezőtúr. II. Mohács, Lacus Fertő. III. Pozsony, Csejte, D.-Jenő.
v. *lateralis* F. — III. T.-Tepla. V. Teste Seidlitz. (345, p. 17.)
56. *picicornis* F. — III. Trencsén, Rózsahegy, Barlangliget. IV. Bártfa. V. Vöröstorony, Brassó.
57. *Jockischi* Strm. — III. Vallis Vrátna, Mons Prasiva, Koritnyicza, ad rivulum Bisztra, Tátra (Zöldtó).
v. *nigricornis* Villa. — I. Szegyestel, Montes Biharenses. IV. Vallis Fajna, Cserna-Hóra. V. Vizakna, Vallis Zsil, Montes Cibinenses, Mons Paring, Gurraró, N.-Szeben, Vöröstorony, H.-Falu, Montes Fogarasenses, Radna. VI. Korniaréva.
58. *Gyllenhali* Schönh. — I. Montes ad vallim Kőrös. III. Ad rivulum Bisztra, Mons Prasiva, Koritnyicza, Tátrafüred, Javorina. IV. Mons Lungacsásza, Cserna-Hóra, Mons Pop-Iván. V. Mons Paring, Papolcz, Montes Kerczenses et Fogarasenses, Montes Királykő et Bucsecs, H.-Falu, Döblény, Halom.
v. *rufescens* Stroem. — III. Tátrafüred. (Legit L. Biró.)
v. *Balbi* Bon. — III. Rivulus Bisztra, Koritnyicza, Vallis Tarpatak.
59. *Heegeri* Dej. — V. Montes Hátszegenses, Kerczenses, Fogarasenses et Bodzaenses. VI. Mons Vrvu Babilor, Mons Pusztahegy dictus, Vallis Juczvölgy dicta.
60. *brevicollis* F. — Frequens.
61. *transsylvanica* Germ. — IV. Mons Pietrosz, Cserna-Hóra, Mons Pop-Iván. V In regionibus alpinis et subalpinis frequens. VI. Mehádia, Montes Vrvu Babilor et Opesata.
62. *Dahli* Strm. — VI. Teste Heyden. VII. Risnjak, Lič, Mrzla-Vodica; Fužine, Crni-Dabar, Mons Sveto-Brdo. VIII. Fiume.
v. *Bonellii* Dej. — VII. Oštarije. VIII. Fiume.
v. *littoralis* Dej. — VII. Teste Heyden. (169, p. 171.)
v. *velebitica* Heyd. — VII. Velebit. (Auctor, 169, p. 171.)
63. *fasciatopunctata* Mill. — In reg. VII. (Schlosser, 337, p. 14.)
64. *Reichi* Dej. — I. Alpes Bohodej, Remecz. V. Mons Paring, Guraró, Montes Stefleste et Galbina, Praesbe, Montes Czódenses, K.-Disznód, Montes Kerczenses et Fogarasenses.
v. *basipes* Reitt. — IV. Luhi, Rahó, Mons Pietrosz. V. Montes Felekenses, Porumbákenses et Kerczenses, Mons Szurul, Montes Fogarasenses. VI. Herkülesfürdő.
65. *Fussi* Bielz. — IV. Mons Breczkul (Com. Marmaros), Luhi, Rahó, Mons Pietrosz, Kapnikbánya. V. Deés, Mons Sátor, M.-Lápos, O.-Láposbánya, Montes Cibles et Korongyos, Radna.
66. *carpathica* Bielz. — IV. Cserna-Hóra. V. Mons Paring, Cibinjézer, Havas-Gyógy. VI. Herkulesfürdő, Mons Vrvu-Babilor.
67. *tatrica* Mill. — III. Vallis Vrátna, Montes K.-Kriván et Djumbir, Tátra (Felkai-tó, Kézsmárki csúcs, Lengyelnyereg, Kéktó, Zöldtó).

Notiophilus Dum.

68. *aquaticus* L. — In regionibus montanis frequens.
69. *melanophtalmus* Schlosser. — VII. Fužine. (Auctor, 337. p. 12.)
70. *palustris* Duft. — Communis.
71. *laticollis* Chaud. — V. Mons Ünökő, Segesvár. VI. Orsova.
72. *rufipes* Curt. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Szeged, N.-Várad, Feketeerdő. II. N.-Vázsony, Z.-Tapolcza, Pécs. IV. Torna, S.-Patak, Homonna, Varannó, Montes Szinnaikő et Vihorlat, Kassa, Bártfa, N.-Bocskó. V. Sólyomkő, Hátszeg, Brassó, Előpatak. VI. Grebenácz, Oravicza, Mehádia.
73. *biguttatus* F. — Frequens.

Omophron Latr.

74. *limbatus* F. — In toto regno communis.

Blethisa Bon.

75. *multipunctata* L. — I. Budapest, Péczel, Eger, Kalocsa. II. Sz.-Fehérvár, Martonvásár, Szent-György. III. Pozsony, Tátrafüred, IV. Tolcsva. V. Kolozsvár, Gyeke, Rüsz.

Elaphrus F.

76. *uliginosus* F. — I. Budapest, Péczel, Kecskemét,

Kalocsa, Hajós, M.-Berény, Hadház, Debreczen. II. Lacus Fertő, Lelle, Csopak. III. Pozsony, Ocskó, Beszterczebánya, Putnok. IV. Torna. V. Sz.-Ujvár, N.-Szeben, Szt-Erzsébet, Vöröstorony, Gyeke, M.-Záh. VI. Resicza, Orsova.

77. *cupreus* Duft. — III. Pozsony, Beszterczebánya, N.-Lipcse, Tátrafüred. IV. Varannó, Vallis Fajna. V. A.-Szombat, Sz.-Régen, Kolozsvár.

78. *riparius* L. — Frequens.

79. *aureus* Müll. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, N.-Várad, Feketeerdő, Rév. II. D.-Örs. III. Pozsony, K.-Kálna, Beszterczebánya, Trencsén, Rosnyó. IV. N.-Mihály, Kassa. V. Frequens. VI. Ulma, Grebenácz. VII. Zimony.

80. *Ullrichi* W. — III. Trencsén, Beszterczebánya, Tátra (Béla-Patak), Rosnyó. IV. Bártfa, Vallis Fajnavölgy dicta. V. A.-Szombat, Brassó, Zerneszt, Gy.-Tölgyes, Kolozsvár. V. Buzamező.

Lorocera Latr.

81. *pilicornis* F. — I. Pályi Csere, Rézbánya. II. Sopron. III. Ocskó, Pozsony, Beszterczebánya, Trencsén, Mons Prasiva, N.-Lipcse, Koritnyicza, Rózsahegy, Tátra (Bélapatak, Javorina). V. Hátszeg, K.-Disznód, N.-Szeben, Mons Sánta, Brassó, Mons Keresztényhavas. VI. Mehádia.

Scarites F.

82. *arenarius* Bon. — I. Budapest, Péczel, Monor, Kecskemét, Kalocsa, Keczel, Hajós, Konyár, Debreczen, N.-Várad. II. Alcsút, Kenese, Lelle, Lacus Fertő. VI. Báziás.

Dyschirius Bon.

83. *digitatus* Dej. — I. Szeged. III. Trencsén. IV. Bártfa, Kassa, M.-Laborcz. V. Segesvár.

84. *thoracicus* Rossi. — I. Budapest. V. A.-Szombat, Fogaras, N.-Sink, Sz.-Régen.
v. *numidicus* Putz. — VI. Grebenácz. (Leg. J. Pável.)

85. *latipennis* Seidl. — V. Vöröstorony, Vallis fluvii Olt.

86. *nitidus* Schaum. — Frequens.

87. *politus* Dej. — I. Budapest, Tiszafüred, Nyiregyháza, Peszér, Kecskemét, Kalocsa. II. D.-Örs, Ács, Paks. IV. Sátoralja-Ujhely, Királyháza. V. Brassó, Földvár.

88. *strumosus* Putz. — I. Budapest, Debreczen, Kecskemét, Szeged, Kalocsa. II. Ács, Lacus Fertő. III. K.-Kálna. VIII. Selce.

89. *extensus* Putz. — I. Praedium apud urbem Kisszállás. (Leg. L. Madarassy.)

90. *angustatus* Ahr. — I. Hajós. V. Szászváros.

91. *pusillus* Dej. — I. M.-Káta, Szeged, Konyár.

92. *punctatus* Dej. — IV. Páczin, Királyháza.

93. *ruficornis* Putz. — IV. B.-Szögh. V. Ad fluvium Maros, Gyulafehérvár.

94. *substriatus* Duft. — II. Ács, Lacus Fertő. III. Beczkó. V. Déva, Dobra, Csáki-Gorbó, Segesvár.

95. *salinus* Schaum. — I. Budapest, Peszér, Kecskemét, Debreczen, Konyár II. Velencze. V. Déva, Vizakna, Sz.-Magyaros, Idecspatak, G.-Sóakna.

96. *aeneus* Dej. — Communis.

97. *intermedius* Putz. — II. Ács, Lacus Fertő, Paks. III. Tátrafüred. V. Vöröstorony, Sz.-Magyaros. VI. Báziás, Mehádia. VII. Diakovár.

98. *Bonellii* Putz. — I. Budapest, Hagymádfalva, II. Z.-Tapolcza. V. N.-Enyed.

99. *Lafertei* Putz.—V. Teste Seidlitz. (345, p. 22.)

100. *similis* Petri. — V. Segesvár, Montes Radnaenses : ad balneum Valea-Vinului.

101. *semistriatus* Dej. — V. Ad ripam fluvii Olt, Vöröstorony.

102. *globosus* Herbst. — Communis.
v. *ruficollis* Kol. — VII. V.-Gorica. (Reitter, 297. p. 36.)

103. *laeviusculus* Putz. — IV. M.-Sziget. V. Törcsvár.

104. *rufipes* Dej. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa. II. Ács, Kőszeg. III. Tátrafüred. IV. Kassa, Torna, Sátoralja-Ujhely, Szomotor. V. Szent-Erzsébet, Nagy-Enyed, Nagy-Csűr. VI. Temesvár.

105. *rufilabris* Motsch. — In regione VI. (Auctor, 260, 1864, p. 214.)

106. *rotundipennis* Chd. — VII. Capella, Velebit.

Clivina Latr.

107. *fossor* L. — Frequens.

108. *collaris* Herbst. — Ut prior.

109. *ypsilon* Dej. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa. II. Ad lacum Fertő.

Nomius Lap.

110. *pygmaeus* Dej. — Secundum E. Frivaldszky in montibus regionis VI.

Broscus Panz.

111. *cephalotes* L. — Communis.

Tachypus Lap.

112. *caraboides* Schrk. — I. Budapest, Péczel. II. D.-Örs. III. K.-Kálna, Pozsony, Beszterczebánya, ad ripas fluviorum Vág, Kisucza et Árva. IV. Bártfa, M.-Laborcz. V. Hátszeg, N.-Szeben,

N.-Talmács, Remete, Vöröstorony, Fogaras, Földvár, Medgyes, Segesvár.

113. *pallipes* Duft. — I. N.-Várad. II. Ad lacum Fertő. III. Budatin.

114. *flavipes* L. — Communis.

Bembidion Latr.

115. *striatum* F. — I. Kalocsa. II. D.-Örs. III. K.-Kálna, Trencsén. IV. Kassa. V. Hátszeg, Fenyőfalva, Vöröstorony, Brassó.

116. *foraminosum* Strm. — I. N.-Várad. III. Trencsén, Putnok. IV. Kassa, Varannó, N.-Bocskó. V. Hátszeg, N.-Szeben, Kercz, Mons Keresztényhavas, Földvár, Segesvár, Kolozsvár, Deés.

117. *velox* L. — V. Hátszeg, Vöröstorony, Brassó, Sz.-Régen.

118. *argenteolum* Ahr. — II. Lacus Fertő. (Redtenbacher, 282, p. 79.)

119. *littorale* Ol. — I. Nagyvárad, Székelyhid. II. D.-Örs. III. Ocskó, K.-Kálna, Trencsén, Rozsnyó. IV. Kassa, Bártfa. V. Vöröstorony, Kercz, Brassó, Földvár, Sz.-Régen, Kolozsvár.

120. *laticolle* Duft. — I. Budapest, Kalocsa II. D.-Örs. III. K.-Kálna, Trencsén. IV. Szőllőske. V. Kolozsvár, Vöröstorony, Berethalom, Medgyes.

121. *splendidum* Strm. — III. Pozsony, Trencsén. IV. M.-Sziget. V. Berethalom, Deés.

122. *pygmaeum* F. — I. Péczel. II. Ad lacum Fertő. III. Pozsony, Beszterczebánya. IV. Mád, Gercsely. V. Hátszeg, N.-Szeben, N.-Csűr, Fogaras, Brassó, Segesvár, Kolozsvár.

v. *bilunulatum* Bielz. — I. Péczel. III. Beczkó, ad rivum Kisucza, Mons K.-Kriván. IV. O.-Ruszka, Vallis Fajna, V. Hátszeg, Vöröstorony, Fogaras, Törcsvár, Medgyes, Kolozsvár.

123. *lampros* Herbst. — Communis.

v. *properans* Steph. — Simul cum priori.

124. *punctulatum* Drap. — I. Budapest, Feketeerdő, Vaskóh, II. Lacus Fertő, Z.-Tapolcza, Kőszeg, Paks. III. Pozsony, K.-Kálna, Trencsén, Tátra (Bélapatak), Putnok. IV. Jászó, Visk, N.-Bocskó. V. Mons Szurul, F.-Sebes, N.-Talmács, Hosszufalu. VI. Báziás, Mehádia.

125. *bipunctatum* L. — II. Pécs. III. Koritnyicza, Tátrafüred. IV. Mont. Hoverla et Pietrosz, Csorna-Hóra, Montes Turkul et Pop-Iván. V. N.-Szeben, K.-Disznód, Montes Fogarasenses. VI. Mehádia.

126. *dentellum* Thunbg. — I. Budapest, Péczel, Kecskemét, Kalocsa, Eger, N.-Várad. II. D.-Örs, Ács, Lacus Fertő, Pécs. III. K.-Kálna, Pozsony, Trencsén. IV. Jászó, Sátoralja-Ujhely, Tolcsva, Bély, Tárkány. V. Szt.-Erzsébet, Barót, N.-Ajta, Kolozsvár. VI. Báziás, Grebenácz.

127. *Starki* Schaum. — In reg. VII. (Ganglbauer, 144, p. 159.)

128. *varium* Ol. — Communis.

129. *adustum* Schaum. — Ut prior.

130. *obliquum* Strm. — I. Budapest. (Leg. J. Frivaldszky.)

131. *ephippium* Marsch. — I. Kecskemét, Akasztó, Uszod, Kalocsa, Tiszafüred, Debreczen, Konyár. VI. Temesvár.

132. *Fellmani* Mannh. — V. Teste Seidlitz. (345, p. 75.)

133. *prasinum* Duft. — V. Montes Felekenses, Kerczenses.

134. *fasciolatum* Duft. — I. Mons Oncsásza. III. Pozsony, Hermánd, Trencsén, ad fluvium Árva, Tátra (Bélapatak). IV. M.-Laborcz, Visk, Vallis Fajna, Bogdán, Kőrösmező. V. Hátszeg, Guraró.

v. *coeruleum* Dej. — III. Trencsén. V. Remete, Gy.-Tölgyes.

135. *atrocoeruleum* Steph. — III. Pozsony, Tátrafüred. IV. Montes Hoverla et Pietrosz. V. Montes Kerczenses, Lacus Bulea, Mons Bucsecs, Borgó, Deés.

136. *conforme* Dej. — IV. Tátrafüred. (Legit L. Őrley.)

137. *tibiale* Duft. — In regionibus subalpinis frequens.

138. *tricolor* F. — I. N.-Várad, Élesd, Belényes. III. Trencsén, Mons K.-Kriván, ad fluvium Árva et ad rivulum Béla. IV. M.-Laborcz, Vallis Fajna, Bogdán, Kőrösmező. V. Frequens. VI. Grebenácz, Stájerlak, Mehádia.

139. *eques* Strm. — VIII. Crkvenica. (Legit L. Biró.)

140. *fulvipes* Strm. — II. Sopron. III. Beszterczebánya. V. Csáki-Gorbó, Borgó. VI. Mehádia.

141. *ripicola* Duft. v. *oblongum* Dej. — IV. Mező-Laborcz, Visk.

v. *testaceum* Duft. — I. Parád, Élesd, ad rivum Jádvize. III Pozsony, K.-Kálna, Trencsén, ad fluvium Árva, Tátrafüred. IV. Parnó, ad fluvium Tapoly, N.-Bocskó. V. N.-Enyed, Hátszeg, Nagy-Szeben, Vöröstorony, Kercz, Földvár, Kőhalom, Medgyes, Segesvár, Sz.-Régen, Deés.

142. *fluviatile* Dej. — V. Szamosujvár, Vöröstorony, Fogaras, N.-Sink.

143. *Andreae* F. — Communis.

v. *distinguendum* Duv. — IV. Valles Fajna et Szekkó. V. Kőhalom.

v. *femoratum* Strm. — Simul cum stirpe.

144. ustulatum L. — Communis

145. *rupestre* L. — V. Hátszeg, Selistye, Guraró, Besztercze.

146. *saxatile* Gyll. — IV. M.-Sziget. (Legit E. Polinszky.)

147. *lunatum* Duft. — I. Bpest, Kalocsa. III. Tepla, Beczkó, ad fluvium Árva, Rosnyó. IV. Kassa. V. Kercz, A.-Szombat.
bisignatum Mén. — V. Teste Bielz. (27, p. 41.)*

148. *modestum* F. — I. Budapest, N.-Várad, Feketeerdő, Sólyomkő. II. Lacus Fertő, Z.-Tapolcza. III. K.-Kálna, Pozsony, Hermánd, Trencsén, ad rivulum Béla. V. Frequens.

149. *decorum* Panz. — I. Budapest, Nagyvárad, Székelyhid, Feketeerdő. II. Lacus Fertő, Sopron, Pécs. III. Trencsén, ad fluvium Árva, ad rivulos Bisztra et Béla. IV. Jászó, Erdőbénye, Valles Fajna et Szekkó. V. Remete, Guraró, K.-Disznód, N.-Sink, Brassó.

150. *dalmatinum* Dej. — I. Budapest. II. N.-Harsány, Baán, Pécs. IV. Tolcsva. V. Montes Kerczenses, N.-Szeben. VI. Temesvár, Mehádia. VIII. Vallis Draga, Buccari.

151. *nitidulum* Marsch. — In regionibus subalpinis frequens.
v. *alpinum* Dej. — VI. Mons Vrvu-Babilor.

152. *brunnicorne* Dej. v. *Milleri* Duv. — V. K.-Disznód, Előpatak.

153. *monticola* Strm. — II. Komárom. V. Detunáta, Vöröstorony, Porcsesd, Montes Kerczenses, Fogaras.

154. *transsylvanicum* Bielz. — V. Deés, Montes Láposenses, Besztercze, Segesvár, Fogaras, Nagyszeben.
v. *cardionatum* Putz. — IV. Máramarossziget. V. Montes Láposenses et Radnaenses.

155. *ruficorne* Strm. — I. Nagy-Várad, Rézbánya. III. Kékkő, Vallis Vrátna, Mons K.-Kriván, Hermánd, Mons Prasiva, ad fluvium Árva, Rosnyó. IV. Mons Hoverla. V. K.-Disznód, Segesvár, VI. Mehádia.
v. *Millerianum* Heyd. — III. Trencsén, Tátrafüred, Barlangliget. IV. Jászó, Vallis Fajna, Mons Balzatul, N.-Bánya. V. Sebeshely, Szászváros, Montes Kerczenses.

156. *stomoides* Dej. — I. N.-Várad, Székelyhid, Csernaháza. III. Ad fluvium Árva et ad rivulum Bisztra. V. Bodza. VI. Mehádia.

157. *decoratum* Duft. — V. Guraró Montes Fogarasenses, Brassó.

158. *elongatum* Dej. — VI. Báziás. (Leg. J. Pável.)

159. *aspericolle* Germ. — II. Lacus Fertő. V. Medgyes, F.-Bajom.

160. *minimum* F. — Frequens.

* Speciebus dubiosis et importatis numeros non adjeci.

v. *latiplaga* Chaud. — I. Budapest, Kalocsa. II. Keszthely. VI. Báziás, Orsova.

161. *glaciale* Heer. — III. Tátrafüred, IV. Mons Pietrosz, Cserna-Hóra. V. Cibinjézer, Montes Szurul et Negoi, Lacus Girbova, Montes Kerczenses et Árpásenses, Mont. Bucsecs et Ünökő.

162. *quadriguttatum* F. — Frequens.

163. *quadripustulatum* Serv. — I. Bpest, Kalocsa, Debreczen. II. Pécs. III. K.-Kálna. V. N.-Csűr, Sz.-Régen, Gy.-Tölgyes, Kolozsvár.

164. *quadrimaculatum* L. — Communis.

165. *humerale* Strm. — IV. Pány. V. N.-Szeben.

166. *tenellum* Er. — Frequens.
v. *triste* Schilsky. — V. Gy.-Tölgyes. (Legit A. Ormay, 266. p. 10.)

167. *gilvipes* Strm. — II. Lacus Fertő. III. Trencsén.

168. *Schüppeli* Dej. — III. Mons Prasiva, T.-Füred. IV. Valles Fajna et Lazescsina. V. Segesvár, B.-Bánya.

169. *Doris* Gyll. — N.-Szeben. V. Vallis Czód, Szász-Régen.

170. *articulatum* Gyll. — Frequens.

171. *octomaculatum* Goeze. — Ut prior.

172. *fumigatum* Duft. — I. Budapest, Kalocsa, Tiszafüred, Nyiregyháza. II. Lacus Fertő.

173. *assimile* Gyll. — Communis.

174. *obtusum* Strm. — I. Budapest, Ujpest, Kalocsa. II. Lacus Fertő. V. Segesvár.

175. *Mannerheimi* Sahlb. — V. N.-Szeben, Segesvár, Borszék.

176. *guttula* F. — Frequens.

177. *biguttatum* F. — Ut prior.

178. *inoptatum* Schaum. — V. Lacus Kisszéki-tó dictus. (Leg. L. Méhely, 247, p. 182.)

179. *lunulatum* Fourc. — V. M.-Sámsond. VI. Grebenácz, Oravicza.

Ocys Steph.

180. *quinquestriatus* Gyll. — II. Lacus Fertő. III. Trencsén. IV. Bártfa.

Tachys Steph.

181. *bisulcatus* Nicol. — I. Bpest. (Leg. J. Pável.)

182. *haemorrhoidalis* Dej. — II. N.-Varsány. IV. M.-Laborcz. VI. Grebenácz.

183. *sexstriatus* Duft. v. *crux* Putz. — III. Kékkő. IV. Királyháza. V. Montes Radnaenses.

184. *quadrisignatus* Duft. — I. Budapest, Eger, Montes Biharenses.

185. *parvulus* Dej. — I. Eger. III. Trencsén. IV. M.-Sziget. V. Zilah, N.-Szeben, Nagyág.
v. *diabrachys* Kolen. — IV. N.-Bocskó. V. Segesvár. VI. Báziás, Orsova, Dognácska, Krassova, Mehádia.

186. *fulvicollis* Dej. — I. Kalocsa. IV. M.-Sziget.
187. *bistriatus* Duft. — Communis.
v. *testaceus* Motsch. — I. Kalocsa. (Speiser, 349, p. 7.)
v. *gregarius* Chd. — I. Montes Biharenses. IV. Bártfa, N.-Bocskó.
188. *scutellaris* Steph. — I. Kalocsa, V. Szamosfalva, Déva.

Tachyta Kirby.

189. *nana* Gyll. — In regionibus montanis frequens.

Limnastis Motsch.

190. *galilaeus* Brul. — VI. Csősztelek (Leg. Dr. G. Horváth).

Scotodipnus Schaum.

191. *brevipennis* Friv. — VI. Mons Domoglet. (Detexit J. Pável).

Perileptus Schaum.

192. *areolatus* Creutz. — I. Kalocsa. II. Lacus Fertő. III. K.-Kálna, Trencsén, Beczkó, Kézsmárk. IV. Zboj, Visk, Ó.-Ruszka, N.-Bocskó. V. Déva, Vöröstorony, Kőhalom, Sz.-Régen, Kolozsvár.

Thalassophilus Wallast.

193. *longicornis* Strm. — I. Budapest. II. D.-Örs. III. Trencsén. IV. M.-Laborcz. V. Kolozsvár.

Trechoblemus Ganglb.

194. *micros* Herbst. — I. Budapest. II. Lacus Fertő. III. Koritnyicza. V. Sz.-Ujfalu, Fogaras, ad balneum Valea-Vinului.

Lasiotrechus Ganglb.

195. *discus* F. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. Sopron. III. Ocskó, Beczkó, Trencsén, Tátrafüred. V. Vöröstorony, N.-Szeben, Szt.-Erzsébet, Brassó, Földvár, Segesvár, Montes ad fluvium Maros.

Trechus Clairv.

196. *rubens* F. — III. Ad fluvium Árva. IV. Bártfa, M.-Sziget, Mons Pietrosz. V. Montes Cibinenses, Præsbe, ad balneum Valea-Vinului.
197. *amplicollis* Fairm. (*sculptus* Schaum). — V. Montes Radnaenses. (Bielz, 27. p. 42.)
198. *quadristriatus* Schrk. — Communis.
199. *obtusus* Er. — I. Budapest, Hajós, N.-Várad. V. Montes Czódenses, Vöröstorony, Vallis Lotrióra, Montes Sebesenses et Kerczenses.
200. *nigrinus* Putz. — V. Mons Szurul (Bielz, 27. p. 42.).
201. *austriacus* Dej. — I. Budapest, Kalocsa. IV. Bártfa.
202. *palpalis* Dej. — In regionibus subalpinis frequens.
v. *cardioderus* Putz. — V. Montes Kerczenses et Radnaenses.
203. *latus* Putz. — In regionibus subalpinis frequens.
204. *plicatulus* Mill. — IV. Mons Pietrosz, Cserna-Hóra, Mons Turkul. V. Montes Radnaenses.
205. *banaticus* Dej. (*Dejeani* Putz.) — IV. Mons Pietrosz, Cserna-Hóra. V. Frequens. VI. Mehádia, Mons Vrvu-Babilor.
206. *parengensis* Ganglb. — V. Mons Paringhavas. (Leg. E. Merkl.)
207. *striatulus* Putz. — In regionibus subalpinis frequens.
208. *marginalis* Schaum. — I. Montes Biharenses. V. Hátszeg, Mons Sánta, Montes Czódenses et Kerczenses.
209. *pulchellus* Putz. — In regionibus subalpinis frequens.
210. *rotundatus* Dej. — V. Montes Kerczenses (Bielz. 27, p. 42.)
211. *glacialis* Heer. — IV. Cserna-Hóra, Mons Balzatul.
v. *Pertyi* Heer. — V. Mons Kereszthegy dictus, Resinár, Mons Szurul, Montes Görgényenses.
212. *Hampei* Ganglb. (*laevipennis* Schaum). — IV. Mons Hoverla, Montes Lungacsásza et Pietrosz.
213. *cavernicola* Friv. — VII. Mračna pec, Lucovo.
214. *croaticus* Dej. — V. Fogaras. VII. Fužine, Capella.
215. *alpicola* Strm. — IV. Mons Pietrosz, Cserna-Hóra.
216. *rotundipennis* Duft. — V. Præsbe, Montes Fogarasenses, Mons Ünökő.
Longhii Comm. — V. Csáki-Gorbó (Bielz, 27, p. 42.)*
217. *procerus* Putz. — IV. Montes Pietrosz et Pop-Iván. V. Mons Szurul, Montes Felekenses, Lacus Girbova, Mons Negoi, Montes Kerczenses, Lacus Bulea, Montes Árpasenses, Fogarasenses et Radnaenses, Mons Ünökő.
218. *corpulentus* Weise. — IV. Luhi, Cserna-Hóra. V. Præsbe.
219. *subterraneus* Mill. — IV. Mons Hoverla, Cserna-Hóra. V. Montes Radnaenses.

* Exemplar Fussianum — Musæi Nationalis Hungarici — est = *subterraneus* Mill.

220. *microphthalmus* Mill.— III. Antrum ad Deménfalva, Mons Deménfalvi hegy dictus, Tátra. IV. Cserna-Hóra.

221. *Ormayi* Ganglb. — V. In regionibus alpinis. (Auctor, 144. p. 119.)

222. *ruthenus* Reitt.— IV. Cserna-Hóra, Mons Ünökő.

223. *Kimakoviczi* Ganglb. — V. Mons Negoi. (Detex. M. Kimakovicz; Auct., 144. p. 209.)

224. *Dietli* Ganglb. — V. Vöröstorony: Vurfu mare. (Detexit E. Dietl.)

225. *Bielzi* Seidl. — IV. Montes Hoverla, Lungacsásza, Tomnatek et Balzatul. V. Montes Felekenses, Mons Kereszténvhavas, Rosnyó (Antrum Flincs), Montes Radnaenses, Lacus Girbova.

226. *Budae* Kenderesy. — V. Hátszeg: Antrum Ponorics. (Detexit Auctor.)

227. *Hegedűsi* Friv. — VI. Herkulesfürdő. (Detexit J. Pável.)

228. *Deubeli* Ganglb. — V. Alpes Hátszegenses: Pirgu-Zenagi. (Detexit F. Deubel; Auctor, 145. p. 261.)

229. *dacicus* Friv. — V. Malomviz. VI. Herkulesfürdő.

230. *Merkli* Friv. — V. M. Paring. (Detex. E. Merkl.)

231. *cognatus* Friv. — I. Alpes Biharenses: Antrum Fericse. (Detex. E. Merkl.)

232. *Milleri* Friv. — VI. Antrum Szokolovácz, Szekul, Tomest.

233. *Herculis* Friv. — VI. Antrum Domoglet. (Detexit J. Pável.)

234. *paroecus* Friv. — I. Antra Meziád, Fericse, Fonácza et Remecz. V. Bedelő (Antrum Pestere-la-gros).

235. *Redtenbacheri* Friv. — I. Antra Fonácza, Igricz, Pestere, Meziád et Remecz. V. Antrum Remete (N.-Enyed).

236. *Eurydice* Schauf. — VII. Antrum Lovinac. (Leg. L. Biró.)

237. *Reitteri* Mill. — VII. Antrum Perušic. (Reitter, 299. p. 202.)

238. *oszailensis* Bed. — VII. Károlyváros: Antrum Oszail. (Marseul, 242, p. 456.)

239. *likanensis* Schauf. — VII. Antrum Pazariste. (Leg. M. Dobiasch.)

v. *vexator* Schauf. — VII. Velebit: Duliba. (Leg. M. Dobiasch.)

240. *Kiesenwetteri* Schaum. — VII. Antrum Perušic. (Leg. H. N. Hoffmann.)

241. *Ganglbaueri* Pad. — VII. Leskovo. (Leg. Auctor.)

Epaphius Leach.

242. *secalis* Payk. — I. Kalocsa. II. Sopron. III. K.-Kálna, Trencsén, Ó-hegy (Com. Zólyom), N.-Lipcse, Koritnyicza, Tátrafüred IV. Bártfa, Homonna, Olyka. V. Petrozsény, Nagy-Szeben, Prázsmár, Segesvár, Oláhfalu, Kolozsvár. VII. Ruma.

Pogonus Dej.

243. *luridipennis* Germ. — I. Kecskemét, Kalocsa, Konyár, Debreczen. II. Velencze, Kenese, Lacus Fertő. V. Szamosfalva, Kolozs, G.-Sóakna, Medgyes.

244. *iridipennis* Nic. — V. Déva, Vizakna, Szamosfalva, Kolozs, G.-Sóakna.

245. *chalceus* Marsh. — V. Déva, Persány.

246. *riparius* Dej. — I. Budapest, Konyár, N.-Várad. II. Lacus Fertő. V. Déva, Vizakna, Szamosfalva, Idecspatak, G.-Sóakna.

247. *Peisonis* Ganglb. — II. Lacus Fertő. (Ganglbauer, 144, p. 283.)

248. *punctulatus* Dej. — I. Hagymádfalva. (Legit Dr. C. Fleischer, 89, p. 83.)

Patrobus Dej.

249. *atrorufus* Ström. — In regionibus montanis frequens.

250. *styriacus* Chaud. — VI. Alpes Krassó-Szörényenses. VII Teste Ganglbauer.

251. *quadricollis* Mill. — IV. Mons Pietrosz, Kőrösmező, Ráhó, Luhi, Mons Breczkul. V. Montes Kerczenses, Montes Bucsecs et Kereszténvhavas, Tömös, Montes Nagykőhavas, Csukás, Tészla et Dongókő, Bodza, Montes Radnaenses: Mons Ünökő.

Deltomerus Motsch.

252. *tatricus* Mill. — III. Montes Kriván et Djumbir, Tátra (Felkai-tó, Tarpataki-völgy, Zöldtó-csúcs, Kék-tó).

253. *carpathicus* Mill. — IV. Rahó, Luhi, Mons Pietrosz. V. Montes Radnaenses.

Atranus Lec.

254. *collaris* Mén. — VI. Herkulesfürdő: Vallis Cserna. (Legit. J. Pável.)

Perigona Casteln.

nigriceps Dej. — I. Kalocsa. (Peregrina species; Leg. F. Speiser, 349, p. 7.)

Platynus Bon.

255. *ruficornis* Goeze. — Frequens.

256. *obscurus* Herbst. — Ut prior.

257. *scrobiculatus* F. — IV. Ad rivum Bartos. V. K.-Disznód, Vallis Czód, Praesbe, Montes

Felekenses, Kerczenses et Fogarasenses, Segesvár. VI. Grebenácz, Resicza, Ferenczfalva, Szászka, Mehádia. VII. Montes Fruska-Góra. VII. Ljeskovac, Raduč.

258. *banaticus* Friv. — V. Montes Retyezát. VI. Herkulesfürdő (Montes Vrvu-Babilor et Opesata).

259. *glacialis* Reitt. — V. Montes Csukásenses, Gyulafalva, Montes Fogarasenses, Kerczenses et Brassóenses, Montes Nagykőhavas et Keresztényhavas.

260. *assimilis* Payk. — Communis.

261. *Krynickii* Sperk. — I. Budapest, Kalocsa, M.-Berény. IV. Jászó. VI. Ulma.

262. *longiventris* Mannh. — I. Budapest, Péczel, Eger, Beél, Félegyháza. V. N.-Szeben.

263. *livens* Gyll. — I. Budapest, Peszér, Kalocsa. II. D.-Örs

264. *quadripunctatus* Deg. — I. Alpes Biharenses. II. Felsőlő. III. Beczkó, Tátra (Marmotahegy). IV. Szinna. V. Gy.-Tölgyes.

265. *impressus* Panz. — I. Eger, Hajós. II. Lacus Fertő III. Szt.-György, Svedlér. V. Mons Sánta, Segesvár.

266. *sexpunctatus* L. — In regionibus montanis frequens.

267. *viridicupreus* Goeze. — I. Budapest, Péczel, Debreczen. III. K.-Kálna, Pozsony, Putnok. IV. Bártfa. V. Nagyfalu. VI. Resicza, Mehádia.
v. *austriacus* F. — Frequens.

268. *marginatus* L. — In toto regno occurrit.

269. *Mülleri* Hbst. — Ut prior.

270. *gracilipes* Duft. — I. Budapest, Parád, Kalocsa. II. Ács, Lacus Fertő. III. Beszterczebánya. IV. Vallis Tiszcsora. V. Mons Paring, Petrozsény, Segesvár. VI. Mehádia. VII. Diakovár.

271. *lugens* Duft. — I. Budapest, Péczel, Dabas, Peszér, Félegyháza, Kalocsa, Tiszafüred, Mező-Berény, N.-Várad. II. D.-Örs, Ács, Lacus Fertő, Pécs. IV. Sátoralja-Ujhely, Páczin, N.-Mihály. VI. Resicza.

272. *versutus* Strm. — I. Kalocsa, Parád. II. Ács, Lacus Fertő, Felsőlő. III. Pozsony. V. N.-Csűr, Marpód, Bükszád, Segesvár.

273. *viduus* Pz. — In regionibus montanis communis.
v. *moestus* Duft. — Frequens.

274. *Dahli* Borre. — I. Budapest, Péczel, Peszér, Kalocsa, M.-Berény, Debreczen. II. Ács, D.-Örs. III. K.-Kálna, Trencsén. IV. Szőllőske.

275. *atratus* Duft. — I. Budapest, Eger, M.-Berény. II. Ács, Lacus Fertő. IV. Szinna, Szőllőske, Nagymihály. VI. Temesvár, Orsova.

276. *antennarius* Duft. — II. N.-Vázsony, Sopron, Pécs. III. V.-Mikola, K.-Kálna, Beszterczebánya, Rosnyó. IV. S.-A.-Ujhely, K.-Azar, Szőllőske. V. Zilah, Montes Retyezát, Brassó. VI. Mehádia. VII. Diakovár.

277. *scitulus* Dej. — IV. Vallis Fajna. V. N.-Szeben.

278. *micans* Nic. — I. Budapest, Kalocsa, M.-Berény. II. Ács. III. Beszterczebánya. IV. S.-A.-Ujhely, Erdőbénye, Tokaj. V. N.-Szeben, N.-Ajta.

279. *fuliginosus* Pz. — I. Budapest, Dabas, Kalocsa, M.-Berény. V. N.-Csűr.

280. *piceus* L. — I. Budapest, Eger. II. D.-Örs, Ács. V. N.-Csűr. VII. Županje.

281. *gracilis* Gyll. — I. Budapest. III. Koritnyicza. V. Brassó. VII. Diakovár.

282. *Thoreyi* Dej. — I. Budapest, Péczel, Kecskemét, Kalocsa. II. D.-Örs, Lacus Fertő. III. Kékkő, K.-Kálna, Ocskó. V. Tasnád, M.-Záh.
v. *puellus* Dej. — I. Budapest, Péczel, Eger, Kalocsa. III. Ocskó. IV. Lelesz. V. N.-Csűr.

283. *dorsalis* Pont. — Frequens.

Olisthopus Dej.

284. *Sturmi* Duft. — I. Budapest. II. Lacus Fertő, Soóly. III. Trencsén, Zsolna. IV. Varannó. V. Déva, N.-Szeben, Oláhfalu. VI. Mehádia.

285. *rotundatus* Payk. — I. Budapest, N.-Várad. III. Hermánd, Trencsén. IV. O-Ruszka, K.-Azar, Tállya. V. N.-Csűr, Sz.-Sebes. VII. Raduč.

286. *glabricollis* Germ. — VIII. Fiume, Buccari.

Synuchus Gyllh.

287. *nivalis* Pz. — I. Budapest, Péczel, Montes ad fluvium Kőrös. II. Zircz, Sopron. III. Tavarnok, Beszterczebánya, Hermánd, Zsolna, Tátrafüred. IV. Bártfa, Vallis Lazescsina, Mons Menczul, V. Déva, Montes Retyezát, Vallis Zsil, K.-Disznód, Mons Szurul, Bükszád, Kolozsvár, Gyalu. VI. Mehádia, Korniaréva. VII. Gospić.

Dolichus Bon.

288. *halensis* Schall. — I. Budapest, Eger, Dabas, Kalocsa, Mező-Berény, Debreczen, Nagyvárad, Székelyhid. II. Szilas, Paks, Pécs. III. Trencsén, Rosnyó. IV. N.-Mihály, Szerencs. V. Déva, Kazanesd, Vácza, Piski, N.-Szeben. Sz.-Ujfalu, Fogaras, Brassó, Szász-Régen, Medgyes. VI. Mehádia.

Calathus Bon.

289. *fuscipes* Goeze. — Communis.
v. *punctipennis* Germ. — I. Kalocsa, Nagyvárad. II. Badacsony, Pécs. IV. Bártfa.

290. *erratus* Sahlb. — Frequens.

291. *fuscus* F. — Ut prior.

292. *metallicus* Dej. — I. Alpes Biharenses.

III. Mons K.-Kriván, Koritnyicza, Mons Prasiva, Királyhegy, Montes Babia-gura, Tátrafüred. IV. Montes Lungacsásza, Pietrosz et Pop-Iván. V. Frequens. VI. Mehádia.

293. *micropterus* Duft. — I. Montes Biharenses. III. Deménfalva, Tátrafüred. IV. Montes Pietrosz et Lungacsásza. V. Mons Surian, Montes Cibinenses, Montes Stefleste et Bucsecs. VI. Mehádia. VIII. Carlopago.

294. *melanocephalus* L. — Frequens.
v. *alpinus* Dej. — III. Felka. V. Præsbe, Montes Sz.-Sebesenses, Mons Szurul, Montes Felekenses et Kerczenses, Lacus Bulea, Mons Bucsecs.

295. *mollis* Marsh. — I. Budapest, Csernaháza, N.-Várad. II. Lacus Fertő, Sopron, Badacsony. III. Vallis ad Deménfalva. VI. Herkulesfürdő.

Laemosthenes Bon.

296. *venustus* Clairv. — V. Riu-Szát. VI. Resicza, Oravicza, Herkulesfürdő. VIII. Fiume.

297. *janthinus* Duft. — VII. Velebit: Konjsko. (Leg. L. Biró.)
v. *amethystinus* Dej. — Hungaria meridionalis et orientalis. (Ganglbauer, 144, p. 223.)
v. *coeruleus* Dej. — V. N.-Szeben, Vallis Lotrióra, Sz.-Régen, Kolozsvár.

298. *punctatus* Dej. — I. Budapest, Péczel, Nagy-Várad. II. Pécs. III. K.-Kálna. IV. S.-A.-Ujhely, V. Brassó, Rosnyó. VI. Temesvár, Antrum Szokolovácz, Ferenczfalva, Jeselnicza, Mehádia. VII. Diakovár.

299. *terricola* Hbst. — I. Budapest, Isaszeg, Eger. II. Lacus Fertő, Sopron. III. Pozsony, Illava, Trencsén. V. N.-Szeben, Berethalom, Brassó, Hosszufalu, Krizba.

300. *elongatus* Dej. — I. Montes Biharenses. VII. Velebit. VIII. Fiume.

301. *cavicola* Schaum (*exaratus* Hampe). — VII. Raduč, Antrum Perušic. VIII. Buccari.

302. *bosnicus* Reitt. — VII. Lič. (Legit L. Bíró.)

Sphodrus Clairv.

303. *leucophthalmus* L. — In toto regno occurrit.

Platyderus Schaum.

304. *ruficollis* Marsh. — V. Toroczkó, Szt.-Erzsébet, Medgyes.

305. *rufus* Duft. — I. Budapest, Mons Pilis, P.-Poó, Kalocsa, Makó, N.-Várad, Kalota. III. Aggtelek, Putnok. IV. Szinna, S.-A.-Ujhely, Szőllőske. V. Vallis Zsil, Præsbe, Porcesd, Mons Szurul, Montes Kerczenses, Mons Királykő, Segesvár, Borszék. VI. Resicza, Vallis Zserelen, Rumunyest.

Lagarus Chaud.

306. *vernalis* Pz. — Communis.
v. *cursor* Dej. — I. Kalocsa, Csongrád. II. Lacus Fertő, N.-Harsány. IV. A.-Bereczki. V. Lacus ad Kisszék.

307. *submetallescens* Chd. — I. Budapest, Peszér. VI. Báziás.

Poecilus Bon.

308. *punctulatus* Schall. — I. Budapest, R.-Palota, Poroszló, Kalocsa, Nagyvárad, Székelyhid. II. D.-Örs, Lacus Fertő, Alcsut, Soóly. III. Pozsony, Oravicz, Putnok. IV. Kassa, S.-A.-Ujhely, Szomotor, Tokaj.

309. *Koyi* Germ. — VII. Fužine, Raduč. VIII. Fiume, Carlopago.

310. *marginalis* Dej. — Frequens.

311. *lepidus* Leske. — Ut prior.
v. *violaceus* Letzn. — V. Montes Kerczenses, Gy.-Tölgyes.

312. *gressorius* Dej. — I. Debreczen. III. Beszterczebánya, Rajecz, Znióváralja, Tátrafüred. VI. Mehádia.

313. *cupreus* L. — Communis.
v. *affinis* Strm. — Simul cum priori.
v. *erythropus* Fald. — I. Kalocsa. V. N.-Ajta.

314. *coerulescens* L. (*cupreoides* Heer). — In regionibus montanis frequens.

315. *cursorius* Dej. — V. Mons Sánta, Sebeshely, N.-Szeben. VI. Herkulesfürdő.

316. *striatopunctatus* Duft. — I. M.-Berény, Makó, N.-Várad. III. K.-Kálna, Trencsén, Putnok. IV. Kasssa, A.-Bereczki. V. Dobra, Rüsz, Vörös-torony, Fogaras, Segesvár, Deés. VI. Resicza, Mehádia.

317. *puncticollis* Dej. — I. Kecskemét, Kalocsa, Makó, Debreczen, N.-Várad. II. Lacus Fertő.

Pterostichus Bon.

318. *inquinatus* Strm. — I. Budapest, M.-Berény. IV. Aszaló. V. K.-Vásárhely.

319. *inaequalis* Marsh. — I. Budapest, Péczel, Eger, Kalocsa, Szeged, N.-Várad, Feketeerdő, Rézbánya. II. Lacus Fertő, Sopron. III. Vallis Vrátna, Putnok, Rosnyó. IV. M.-Sziget. V. K.-Disznód.

320. *macer* Marsh. — I. Budapest, Szt-Endre, Eger, Kalocsa, Kecskemét, M.-Berény, Debreczen, N.-Várad. II. Lacus Fertő, Sopron, Pécs. III. Pozsony. IV. Parnó, S.-A.-Ujhely, Varannó. V. Zilah, Hátszeg, Vizakna, N.-Szeben, Szakadát, Montes Csikenses. VI. Lippa.

321. *aterrimus* Hbst. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Debreczen, N.-Várad. II. Lacus Fertő, Sopron.

III. Pozsony. IV. S.-A.-Ujhely. V. N.-Sink, Sz.-Régen, Montes Csikenses.

322. *elongatus* Duft. — I. Budapest, Eger, Félegyháza, Kalocsa. V. Kolozsvár.

323. *oblongopunctatus* F. — In regionibus montanis frequens.

324. *angustatus* Duft. — III. Vallis Vrátna, Tátrafüred. V. Montes Retyezát et Cibinenses, Lacus Bulea, Vallis Czód, Brassó. VI. Mons Szemenik, Mehádia.

325. *niger* Schall. — Communis.

v. *subcordatus* Chd. — V. Segesvár. (Bielz, 27, p. 45.)

326. *vulgaris* L. — Communis.

327. *nigrita* F. — In regionibus montanis frequens.

328. *anthracinus* Illig. — Communis.

329. *gracilis* Dej. — I. Budapest, Eger, Dabas, Peszér, Félegyháza, Kalocsa, Debreczen, Mező-Berény. II. D.-Örs, Lacus Fertő. III. Pozsony. IV. Parnó, S.-A.-Ujhely, Tokaj. V. Sz.-Régen, Kolozsvár. VI. Ulma.

330. *minor* Gyll. — I. Budapest, Dabas, Peszér, Debreczen, Nagy-Várad, Tenke. II. Lacus Fertő, Veszprém. III. Pozsony, Beszterczebánya, Rosnyó, Szádellő. IV. Kassa. V. Déva, N.-Szeben, N.-Csür, Sz.-Régen, Deés, M.-Záh. VI. Báziás.

331. *interstinctus* Strm. — In regionibus montanis frequens.

332. *strenuus* Pz. — Communis.

333. *diligens* Strm. — I. Peszér, Kalocsa, Montes Biharenses, Bánlak. III. Tátrafüred, Rosnyó. IV. Jászó, Parnó, Mons Lungacsásza. V. Hátszeg, Nagy-Szeben, Kis-Disznód. VI. Ferenczfalva. VII. Našice.

334. *negligens* Strm. — III. Tátrafüred. V. Sz.-Régen.

335. *blandulus* Mill. — III. Mons Prasiva, Lacus ad Felka.

336. *unctulatus* Duft. — IV. Montes Lungacsásza et Pietrosz, Cserna-Hóra. V. Montes Cibinenses, Præsbe, Montes Czódenses, Kerczenses, Mont. Vista-Mare et Keresztényhavas, Montes Árpasenses et Radnaenses.

337. *subsinuatus* Dej. — In regionibus subalpinis frequens.

338. *pumilio* Dej. — III. Trencsén, Koritnyicza, Mons K.-Kriván, F.-Bocza, Tátrafüred.

339. *brevis* Duft. — V. Montes Kerczenses. VI. Mons Vrvu-Babilor, Szulicza, Mons Domoglet, Vallis Jucz, Mehádia. VII. Velebit.

340. *Bielzi* Fuss (*festinans* Chaud.) — I. Alpes Bohodej. V. Muncsel-Mare (Com. Kolozs).

acrogonus Chd. — V. Teste Ormay. (Ganglbauer, 144, p. 279.)

341. *rufitarsis* Dej. — I. Feketeerdő, Vall. Száldobágy. III. Tátrafüred. IV. Mont. Vihorlat et Rabaszkala, Runyina, Mont. Szinnaikő, Hoverla, et Pietrosz, Cserna-Hóra, Montes Cibinenses, Sebesenses, Árpásenses, Kerczenses, Czódenses, et Porumbákenses, Apácza, Bodza, Mons Ünökő.

342. *tenuimarginatus* Chd. — V. Sec. Bielz frequ.

343. *cordatus* Letzn. — Teste Seidlitz in Hungaria. (345, p. 42.)

344. *aethiops* Pz. — II. Veszprém. III. Beszterczebánya, Óvár, Hermánd, N.-Lipcse, Deménfalva, Tátrafüred, K.-Hnilecz, Igló. IV. Torna, Bártfa. V. Mons Szurul, Montes Kerczenses, Montes Keresztényhavas et Cibles, Montes Radnaenses : Mons Ünökő. VII. Montes Fruska-Góra.

345. *cophosioides* Dej. — V. Déva. VI. Resicza, Oravicza, Orsova, Mehádia. VII. Našice.

346. *cylindricus* Hbst. — I. Verseg, Eger, Verpelét, Parád, N.-Várad. II. Pécs. III. Pozsony, Zsolna, Gbellán. IV. Tornalja. V. N.-Szeben. VI. Ulma, Mehádia. VII. Karlovic.

v. *magnus* Dej. — I. Debreczen, Nagy-Várad. II. Pécs. III. I.-Ság, K.-Kálna, Ocskó, Nagy-Szombat, T.-Szt-Márton. VI. Ulma, Mehádia. VII. Diakovár, Daruvár.

v. *filiformis* Dej. — I. Geszt, M.-Kovácsháza, Monyásza. VI. Temesvár, Ulma, Grebenácz.

347. *melas* Creutz. — In regionibus montanis communis.

348. *hungaricus* Dej. (*transsylvanicus* Chd.) — V. Nagy-Szeben, Montes Cibinenses, Bodza. Szamosujvár. VI. Resicza, Szekul, Mehádia.

349. *Kokeili* Mill. — V. Montes Radnaenses : Mons Ünökő, Montes Fogarasenses, Mons Bucsecs.

350. *foveolatus* Duft. — I. Montes Biharenses. III. Hermánd, Mons K.-Kriván, Koritnyicza, Mons Prasiva, Montes Babia-Gura, Tátra (Zöldtó, Javorina), Kézsmárk. IV. Bártfa, Jászó, Mont. Vihorlat et Pop-Iván. V. Montes Kerczenses et Fogarasenses, Mons Bucsecs, Predeál, Montes ad fluvium Maros et Radnaenses, Mons Ünökő. VI. Mehádia.

v. *interruptestriatus* Bielz. — IV. Montes Zsihovecz, Pietrosz et Pop-Iván. V. Mons Szurul, Montes Kerczenses, Felekenses, Fogarasenses, et Brassóenses.

351. *Findeli* Dej. — III. Selmecz, Mons Djumbir, Montes Babia-Gura, Tátrafüred. IV. Cserna-Hóra. V. Frequens. VI. Ferenczfalva, Mehádia.

352. *metallicus* F. — In Regionibus subalpinis frequens.

353. *transversalis* Duft. — V. Remete. (Ormay, 264, pag. 13.)

354. *Etelkae* Ormay. — I. Dámos, Monyásza. III. Beszterczebánya. V. Hátszeg, Montes Retyezát, Mons Detunáta, Skerisóra. VI. Lippa.

355. *fasciatopunctatus* Creutz. — II. Kőszeg. VII. Fužine, Mrzla-Vodica.

356. *maurus* Duft. — I. Vaskóh. III. Montes K.-Kriván, Djumbir et Chocs, Montes Babia-Gura, Tátra (Homlokos, Tarpatak, Zöldtó). V. Montes Paring et Szurul, Montes Felekenses, Lacus Bulea, Montes Fogarasenses, Mont. Királykő et Keresztényhavas, Brassó, Mons Bucsecs.

v. *erythromerus* Ganglb. — Simul cum priori.

357. *Jurinei* Pz. — VI. Mehádia. (Leg. E. Frivaldszky.)

v. *Heydeni* Dej. — IV. Montes Pietrosz, Hoverla et Pop-Iván. V. Creber. VI. Szekul, Mons Szemenik, Mehádia.

v. *Sacheri* Friv. — I. Alpes Bohodej. (Detex. C. Sacher.)

358. *variolatus* Dej. v. *carniolicus* Ganglb. — V. Teste Seidlitz. (345, p. 42.)

359. *fossulatus* Quens. — III. Beszterczebánya, Hermánd, Montes Sztrazsov, K.-Kriván, Prasiva et Djumbir, Montes Babia-Gura, Mons Chocs, Lacus ad Felka. IV. Montes Simonka, Vihorlat et Pop-Iván. V. Montes Retyezát, Cibinenses et Fogarasenses.

v. *Welensi* Drap. — V. Frequens. VI. Ferenczfalva, Mons Szemenik, Mehádia. VII. Fužine, Ljeskovac.

Abax Bon.

360. *ater* Vill. — In regionibus montanis communis.

v. *subpunctatus* Dej. — In montibus regionis VII. (Auctor, 64, III, p. 380.)

v. *inferior* Seidl. — V. Frequens. (Auctor, 345, pag. 41.)

361. *parallelus* Duft. — In regionibus subalpinis frequens.

362. *ovalis* Duft. — Ut prior.

363. *carinatus* Duft. — I. Budapest, Parád, Nagy-Várad, Feketeerdő, Vallis Jád. II. Villány, Pécs. III. Rosnyó. IV. Ránk, S.-Patak, K.-Azar, Montes Szinnaikő et Hoverla. V. Creber. VI. Grebenácz, Oravicza, Báziás, Mehádia. VII. Našice.

v. *porcatus* Duft. — V. Hátszeg, Montes Kerczenses.

v. *latus* Dej. — V. Teste Bielz. VI. Mehádia. VIII. Carlopago.

364. *Schüppeli* Pall. — I. N.-Várad, Székelyhíd, Mons Onesász. IV. S.-A.-Ujhely, Montes Vihorlat et Rabaszkala. V. Déva, Gyalu, Brassó, Szász-Régen. VI. Lippa, Resicza, Oravicza, Orsova, Rumunyest, Mehádia.

v. *bihariensis* Friv. — I. Mons Budurásza, Fenes, ad rivulum Kalugyer, Monyásza.

v. *Rendschmidti* Germ. — III. Hermánd, Várna, Rajecz, Gbellán, Szmrecsán, Tátrafüred, Rosnyó. IV. Montes Jólesz, Vihorlat et Szinnaikő, Máramaros-Sziget, Nagy-Bánya. V. In regionibus subalpinis frequens.

Tapinopterus Schaum.

365. *placidus* Ros. (*cognatus* Schaum). — V. Montes Hátszegenses. VI. Mehádia. (Csernavölgy, Domoglet.)

366. *Kaufmanni* Ganglb. — VI. Mehádia: Vallis Cserna. (Auctor, 401, p. 464.)

Myas Dej.

367. *chalybaeus* Pall. — VI. Mons Domoglet (Legit E. Frivaldszky).

Molops Bon.

368. *striolata* F. — VII. Fužine, Capella, Velebit. VIII. Fiume.

369. *robusta* Dej. — VI. Herkulesfürdő. (Legit E. Frivaldszky).

370. *simplex* Chd. (*croatica* Kr.) — VII. Udbina, Otočac, Ljeskovac.

371. *elata* F. (*Cottellii* Duft.) — III. Pozsony, Trencsén. IV. K.-Azar, Mons Rabaszkala. V. Kis-Disznód, Præsbe, N.-Talmács, Montes Fogarasenses, Sz.-Magyaros, Oláhfalu. VI. Mons Szemenik, Oravicza.

372. *plitvicensis* Heyd. — VII. Lacus ad Plitvica, Ljeskovac.

373. *alpestris* Dej. — II. Z.-Tapolcza. V. K.-Disznód, Montes Fogarasenses, Mons Királykő, Brassó. VI. N.-Bogsán, Mons Szemenik. VII. Montes Fruska-Góra.

374. *bucephala* Dej. — In regione VII. (Auctor, 64, III, p. 415.)

375. *grandiceps* Ganglb. — Secundum Auctorem in reg. VII. (143, p. 121.)

376. *longipennis* Dej. — VII. Capella, Velebit. (Ganglbauer, 144, p. 305.)

377. *latiuscula* Kr. — VII. Švica (Leg. Dr. L. Heyden; Reitter, 297, p. 38.)

378. *orthogonia* Chd. — VI. N.-Bogsán, Szekul, Mehádia.

v. *Sturmi* Kr. — In regione VI. (Auctor, 206, pag. 375.)

379. *picea* Pz. (*montana* Heer). — In regionibus montanis communis.

380. *austriaca* Ganglb. — I. Budapest. VI. Mehádia.

381. *oripennis* Chd. (*subtilis* Kr.) — III. Tátra-

füred. V. Montes Kerczenses, Brassó. VII. Capella.

v. *Hopffgarteni* Heyd.—VII. Capella. VIII. Fiume.

Stomis Clairv.

382. *pumicatus* Pz. — In toto regno occurrit.

v. *maxillosus* Dej.— IV. Borsa. (Legit E. Reitter, 295, p. 35.)

Amara Bon.

383. *fulvipes* Serv. — I. Eger, N.-Várad. II. Lacus Fertő, Zircz. IV. Páczin, Czéke. V. Sz.-Ujvár, N.-Szeben, Montes Kerczenses, Brassó.

384. *rufipes* Dej. — I. Budapest, Eger, Szeged, Debreczen, N.-Várad. II. Ács, Zircz. IV. Sátor-Alja-Ujhely, S.-Patak, Szerencs. VI. Resicza.

385. *erythrocnemis* Zimm. — Etiam Hungariam inhabitat. (Ganglbauer, 144, p. 315.)

386. *concinna* Zimm. *(amabilis* Hampe). — V. Vizakna, F.-Kercz, Sz.-Régen.

387. *strenua* Zimm. — I. Peszér. VI. Krasova, Mehádia.

388. *tricuspidata* Dej. — I. Budapest, Parád, Dabas. II. Lacus Fertő. IV. Bártfa, Nagy-Mihály. V. Szelindek, Felek, Brassó.

389. *plebeja* Gyll. — I. Kalocsa. II. Lacus Fertő, Zircz, Felsőlő. III. Beszterczebánya, Trencsén, Tátrafüred. IV. Homonna, Páczin, Királyháza. V. N.-Szeben, Brassó. VI. Ferenczfalva, Báziás.

390. *similata* Gyll. — Frequens.

391. *ovata* F. — In toto regno occurrit.

392. *saphyrea* Dej. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, N.-Várad, Kóly. V. Déva. VI. Mehádia.

393. *montivaga* Strm. — IV. Torna, Mons Lungacsász a. V. N.-Szeben, Præsbe, Vöröstorony, Vallis Lotrióra, Montes Kerczenses. VI. Korniaréva, Vallis Cserna. VII. Fužine.

394. *nitida* Strm. — I. Budapest, Eger, Kalocsa, Nagy-Várad, Székelyhid. II. Felsőlő, Kőszeg. III. Pozsony, Beszterczebánya, Mons Prasiva, Á.-Váralja. IV. Szinna, Montes Vihorlat, Pietrosz et Balzatul. V. Hátszeg, Præsbe, Vallis Lotrióra, Kőhalom, Sz.-Régen. VI. Mehádia. VII. Fužine.

395. *communis* Pz. — I. Budapest, Debreczen, N.-Várad. II. Lacus Fertő, Sopron, Felsőlő, Turony. III. Léva, Pozsony, Beszterczebánya, Vallis Vrátna, Koritnyicza, Kézsmárk, Lőcse, Rosnyó. IV. Kassa, Bártfa, Kőrösmező, Mons Pietrosz. V. Frequens. VI. Ferenczfalva, Oravicza. VII. Fužine.

396. *convexior* Steph. — V. Mons Sánta, Vallis Lotrióra, Montes Kerczenses, Segesvár. VI. N.-Bogsán.

397. *lunicollis* Schdte. — II. Lacus Fertő, Sopron, Felsőlő. III. Pozsony, Beszterczebánya, Trencsén, Tátrafüred, Rosnyó. IV. Mons Simonka, Nagy-Bocskó. V. Nagyág, N.-Szeben, Montes Porumbákenses, Medgyes, Sz.-Régen.

398. *Schimperi* Wenck. — V. Montes Radnaenses: ad balneum Valea-Vinului (Ganglbauer, 399, pag. 170).

399. *curta* Dej. — II. Lacus Fertő, Zánka. III. Belánszkó, Tátrafüred, Rosnyó. IV. Szinna, Barkó. V. Vallis Zsil, N.-Szeben, N.-Csür, N.-Disznód, Fogaras, Sz.-Magyaros, Gy.-Tölgyes. VI. Német-Bogsán, Ferenczfalva, Szekul, Mons Szemenik, Stájerlak, Mehádia. VII. Ruma.

400. *aenea* Deg. — Communis.

401. *proxima* Friv. — I. Budapest. II. Pécs.

402. *spreta* Zimm. — IV. Kassa, Áj. V. Mons Sánta, N.-Szeben, Vallis Lotrióra, Gy.-Tölgyes, Szász-Régen.

403. *famelica* Zimm. — III. Tátrafüred. V. Hátszeg, Montes Kerczenses. VI. Herkulesfürdő, Korniaréva

404. *eurynota* Pz. — Frequens.

405. *familiaris* Duft. — Ut prior.

406. *anthobia* Villa. — II. Komárom. V. N.-Szeben.

407. *lucida* Duft. — I. Budapest, Kalocsa, Debreczen, N.-Várad, Székelyhid. II. D.-Őrs, Ács, Lacus Fertő, N.-Vázsony, Kantavár. IV. Bártfa, Jászó, Tolcsva, Erdőbénye, Olyka. V. Magyarpatak, Brassó. VI. Temesvár.

408. *tibialis* Payk. — I. Budapest, Szombatság. II. Lacus Fertő, Zánka. III. Tátrafüred, Rosnyó. V. N.-Szeben, N.-Csür, Montes Kerczenses, Ojtoz.

409. *equestris* Duft. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. Lacus Fertő, Zánka. III. Beszterczebánya, Igló, Rosnyó. IV. Bártfa, Varannó. V. Kercz. VI. Mehádia.

410. *ingenua* Duft. — I. Budapest, Eger, Nyiregyháza, Dabas, Kalocsa, Szeged, B.-Csaba, Nagy-Várad, Székelyhid. II. Lacus Fertő, Sopron. III. Óhegy. IV. Jászó, S.-A.-Ujhely, S.-Patak, Tokaj. V. Déva, N.-Szeben, Sz.-Régen, M.-Záh. VI. Temesvár.

411. *cursitans* Zimm. — I. Budapest. VI. Mehádia.

412. *municipalis* Dft. — I. Budapest, Eger, Péczel, Dabas, Debreczen, N.-Várad, Vaskóh. II. Ács, Lacus Fertő, Felsőlő. III. Beszterczebánya. V. Ad balneum Gyógy, Vöröstorony, N.-Szeben, Sz.-Régen. VI. Stájerlak. VII. Fužine.

413. *misella* Mill.—IV. Montes Lungacsász a, Pietrosz et Tomnatek, Cserna-Hóra, Mons Pop-Iván. V. Montes Cibinenses, Mons Szurul, Montes

Felekenses, Lacus Girbova, Montes Kerczenses. Lacus Bulea, Montes Bucsecs, Nagykőhavas et Csukás.

414. *erratica* Duft. — III. Zsolna, Mons K.-Kriván, Koritnyicza, Mons Chocs, Lacus ad Felka. IV. Mons Lungacsásza. V. Nagy-Szeben, Montes Árpásenses et Kerczenses, Borszék, Mons Ünökő, Deés. VI. Mehádia.

415. *Quenseli* Schönh. — III. Árva-Váralja, Tátrafüred.

416. *bifrons* Gyll. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. III. Kis-Kálna. IV. Vallis Lopuszánka, Mons Zsihovecz. V. Kolozsvár, Hátszeg, N.-Szeben, N.-Csür, Fogaras, Kőhalom.

417. *infima* Duft. — II. Lacus Fertő, Sopron.

418. *praetermissa* Sahlb. — I. Péczel. III. Várna. V. Kolozsvár, N.-Csür.

419. *brunnea* Gyll. — V. Brassó. (Bielz, 27, p. 44.)

420. *sabulosa* Dej. — I. Budapest. III. K.-Kálna. V. N.-Szeben.

421. *croatica* Ganglb. — VII. Velebit. (Auctor, 144, pag. 45.)

422. *dalmatina* Dej. — VIII. Carlopago, Zengg.

423. *crenata* Dej. — I. Péczel, Nagy-Várad, Beél. III. K.-Kálna, Tavarnok, Pozsony. V. Zilah. VI. Resicza, Stájerlak.

424. *apricaria* Payk. — Frequens.

425. *fulva* Deg. — I. Budapest, Fót, Kalocsa, Debreczen, Érmihályfalva. II. Lacus Fertő, Sopron, Z.-Tapolcza. III. Pozsony, Beszterczebánya, Trencsén, Tátrafüred, Rosnyó. IV. Jászó, Bártfa, Szomotor, Varannó, Homonna, Nagy-Bocskó. V. N.-Szeben, Vallis Czód, Medgyes, Brassó. VI. Grebenácz, Báziás, Mehádia.

426. *consularis* Duft. — I. Budapest, Péczel, Fót, Parád, Debreczen, N.-Várad. II. Lacus Fertő, Sopron, Kőszeg. III. Sulyó, Rosnyó. IV. Bártfa, Torna, N.-Bocskó. V. N.-Szeben. K.-Disznód, Montes Árpásenses, Brassó, Hosszúfalu, Segesvár, Sz.-Régen.

427. *aulica* Pz. — I. Budapest, Csepel, Dabas, Kalocsa, N.-Várad. II. Lacus Fertő, Sopron. III. Tavarnok, Beszterczebánya, Hermánd, Trencsén, N.-Lipcse, ad rivum Béla, Rosnyó. IV. Szinna, Mons Szinnaikő, Varannó, Mons Zsihovecz, Kőrösmező. V. N.-Szeben, Szelindek, Csib, K.-Disznód, Vöröstorony, Bisztra, Medgyes, Segesvár, Sz.-Magyaros, Krizba, Kolozsvár. VI. Mehádia.

428. *convexiuscula* Msh. — I. Eger, Kalocsa, Debreczen. II. Lacus Fertő. IV. Bártfa, Parnó. V. Hosszúfalu, M.-Záh.

429. *nobilis* Duft. — V. Brassó. (Bielz, 27, p. 44.)

Zabrus Clairv.

430. *incrassatus* Germ. — VII. Konjsko. VIII. Fiume.

431. *tenebrioides* Goez. (*gibbus* F.). — In toto regno occurrit.

432. *blapoides* Creutz. — Ut prior.

Daptus Fisch.

433. *pictus* Fisch. v. *Kominecki* Bielz. — V. Déva, A.-Idecs, G.-Sóakna.

Acinopus Latr.

434. *ammophilus* Dej. — I. Hajós. VI. Grebenácz, Deliblat.

435. *picipes* Oliv. — VIII. Fiume, Carlopago.

Aristus Latr.

436. *clypeatus* Rossi. — VI. Stájerlak, Oravicza, Fehértemplom, Ulma, Mehádia. VII. Diakovár, Gospić, Raduč.

Ditomus Bon.

437. *tricuspidatus* F. — VIII. Carlopago (secundum F. Ocskay).

Ophonus Bed.

438. *sabulicola* Pz. — I. Budapest, Parád, Kalocsa, M.-Berény, N.-Várad. III. K.-Kálna. V. Zilah, Kolozsvár, Déva, Berethalom, Medgyes, Segesvár. VI. Mehádia.

v. *columbinus* Dej. — I. N.-Várad. V. Sz.-Régen. VIII. Carlopago.

439. *obscurus* F. — I. Eger, Tinnye, Kalocsa. II. Lacus Fertő, Sopron, N.-Vázsony. IV. Parnó. V. Zilah, Vizakna, N.-Csür, Fogaras, Brassó, Hosszúfalu, Segesvár, M.-Záh.

440. *diffinis* Dej. — I. Péczel, Eger, Kalocsa, Mező-Berény. II. Lacus Fertő. V. Előpatak.

v. *rotundicollis* Fairm. — VIII. Fiume. (Leg. L. Biró.)

441. *punctatulus* Duft. — I. Budapest, Parád, Nagy-Várad. III. Trencsén, Lucski, Koritnyicza. IV. Mons Pietrosz. V. Sz.-Ujvár, Brassó, Bükszád, Montes ad fluvium Maros, Besztercze. VI. Mehádia.

v. *laticollis* Mannh. — I. Budapest, N.-Várad. III. Pozsony, Beszterczebánya. V. Nagy-Csür, Medgyes, Mons Hargita, Oláhfalu.

442. *incisus* Dej. — VIII. Fiume. (Legit. L. Biró.)

443. *rupicola* Strm. — I. Budapest, Kalocsa, Mező-Berény, N.-Várad. II. Lacus Fertő. III Rajecz, Trencsén. IV. Olyka. V. Sz.-Sebes, Sz.-Ujfalu, N.-Csür, Vöröstorony, Fogaras, Brassó, Szász-Régen. VII. Našice.

444. *rufibarbis* F. — I. Budapest, Kalocsa, Debreczen, Nagy-Várad. II. Lacus Fertő, Kőszeg. III. Tavarnok. IV. Jászó, Tarczal, Tokaj. V. Mons Paring, Montes Kerczenses, M.-Záh, Zilah. VI. Oravicza, Mehádia. VIII. Fiume, Buccari.

445. *puncticollis* Payk. — Frequens.

v. *parallelus* Dej. — V. Szt-Erzsébet. (Bielz, 27, pag. 43).

446. *cordatus* Duft. — I. Budapest, Palota, Parád, Dabas. II. Lacus Fertő, Sopron. III. Ocskó, Rosnyó. IV. Sátoralja-Ujhely V. Nagy-Szeben, Præsbe, Brassó, Sz.-Régen.

447. *azureus* F. — Frequens.

v. *similis* Dej. — I. Budapest, Mons Pilis. II. Z.-Tapolcza. IV. Mons Zsihovecz.

v. *cribricollis* Dej. — I. Budapest, Kalocsa, Debreczen, Nagy-Várad. II. Lacus Fertő, Z.-Tapolcza. V. Brassó. VI. Mehádia.

v. *coeruleipennis* Mén. — V. Vallis Lotrióra. (Legit. A. Ormay, 264, p. 12.)

448. *signaticornis* Duft. — I. Péczel. II. Lac. Fertő. IV. Nagy-Mihály. V. Nagy-Szeben, Sz.-Régen. VII. Našice.

449. *maculicornis* Duft. — I. Budapest, Bugyi, Kalocsa, Debreczen, N.-Várad. II. Sopron, Pécs, Megyer. IV. Királyháza. V. Vallis Lotrióra, Brassó. IV. Temesvár. Ferenczfalva.

v. *complanatus* Dej. — I. Kalocsa, Nagy-Várad. III. Pozsony. V. Hátszeg, Berethalom, Medgyes, Segesvár. VI. Temesvár.

450. *mendax* Rossi. — I. N-Várad. II. Pécs. V. Déva, V.-Hunyad. VI. Ulma. VII. Buccari.

451. *cephalotes* Fairm. — I. Budapest, M.-Berény, Debreczen. VI Ulma.

452. *pubescens* Müll. — Communis.

453. *griseus* Pz. — Ut prior.

454. *hospes* Strm. — I. Budapest, Eger, Kalocsa, Mező-Berény. II. Z.-Tapolcza. III. Pozsony. IV. S.-A.-Ujhely. V. Sz.-Ujvár, Fogaras, Brassó. VI. Csenej, Temesvár, Stájerlak, Fehértemplom, Mehádia.

v. *Stürmi* Dej. — I. Hajós. III. Rosnyó. V. Déva, Hátszeg, Vizakna, Fogaras, Hosszúfalu, Borszék, M.-Záh. VI. Lippa.

455. *calceatus* Duft. — Frequens.

Harpalus Latr.

456. *aeneus* F. — Communis.

v. *confusus* Dej. — Simul cum stirpe.

v. *semipunctatus* Dej. — Ut prior.

457. *psittaceus* Fourc. — Pariter communis.

458. *oblitus* Dej. — III. K.-Kálna. IV. Szerencs.

459. *cupreus* Dej. — I. Mező-Berény, Nagy-Várad. III. K.-Kálna, Pereszlény, Putnok. IV. Sátoralja-Ujhely, Tolcsva, Szomotor. V. Zilah, Déva, Vizakna, Brassó, Sz.-Régen. VI Orsova, Mehádia.

460. *smaragdinus* Duft. — In toto regno frequens.

461. *rubripes* Duft. — Ut prior.

v. *sobrinus* Dej. — V. Brassó. (Bielz, 27, p. 44.)

462. *marginellus* Dej. — IV. Parnó. (Legit Dr. G. Horváth.)

463. *latus* L. — Frequens.

464. *quadripunctatus* Dej. — I. Budapest, Parád. III. Óhegy, Rajecz, Zsolna, Montes Babia-Gura, Tátrafüred. IV. Bártfa, Torna, Mons Lungacsász. V. Mons Sánta, Szt-Erzsébet, Bisztra, Præsbe, Montes Kerczenses. VI. Mehádia.

465. *luteicornis* Duft. — Frequens.

466. *atratus* Latr. — I. Budapest, Mons Pilis Kalocsa, Montes Biharenses, Vallis ad fluvium Kőrös. II. Lacus Fertő, Sopron. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Szerencs. V. Nagy-Szeben, Brassó. VI. Krassova, Mehádia. VIII. Fiume, Buccari.

v. *subsinuatus* Duft. — I. Budapest, Mons Pilis. V. Brassó VI. Herkulesfürdő.

467. *laevicollis* Duft. — In regionibus subalpinis communis.

468. *neglectus* Dej. — V. N.-Szeben, Montes Kerczenses.

469. *rufitarsis* Duft. — I. Nagy-Várad. II. Lacus Fertő, Pellérd. III. Beszterczebánya, Tátrafüred, Rosnyó. V. Vöröstorony, Rosnyó. VI. Resicza. VIII. Fiume.

v. *decipiens* Dej. — VI. Orsova, Mehádia.

470. *honestus* Duft. — I. Bpest. II. Baán, Karancs, Pécs. IV. S.-A.-Ujhely, Szomotor, Barkó. V. Déva, N.-Csűr, Vallis Czód, Besenyő, Mons Szurul, Brassó, Sz.-Magyaros, Segesvár, Mons Hargita.

471. *sulphuripes* Germ. — IV. Mons Hoverla. VII. Raduč. VIII. Fiume, Crkvenica, Carlopago.

472. *pygmaeus* Dej. — I. Bpest, Parád, Kecskemét, Kalocsa, Debreczen, N.-Várad. II. Pécs. IV. Tállya. V. Tasnád, Vizakna. VI. Orsova.

473. *tenebrosus* Dej. — I. Budapest, Kalocsa, Debreczen. II. Lacus Fertő. IV. S.-A.-Ujhely.

474. *melancholicus* Dej. — I. Budapest, Eger, Kalocsa, Debreczen, N.-Várad. III. Pozsony, Trencsén.

475. *zabroides* Dej. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, M.-Kovácsháza.

476. *dimidiatus* Rossi. — I. Budapest, Mons Pilis Kalocsa, Debreczen, Nagy-Várad, Székelyhid, Belényes. II. Lacus Fertő, Sopron, Z.-Tapolcza Villány, Pécs. III. K.-Kálna, Tavarnok, Agárd,

Beszterczebánya, Beczkó, Rosnyó. IV. Ránk. S.-A.-Újhely, Tállya, Szőllőske, Varannó, Parnó. V. Déva, N.-Szeben, Sz.-Ujfalu, Holczmány, N.-Talmács, Montes Kerczenses, Medgyes, Szász-Régen, Deés. VI. Mehádia. VII. Diakovár. VIII. Fiume, Martinšćica, Buccari.

477. *autumnalis* Duft. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Debreczen, N.-Várad, Rév. II. Lacus Fertő, Sopron. III. Ocskó. IV. Máramaros-Sziget. V. Szászváros, N.-Szeben, Vallis Czód, Fogaras, Sz.-Régen, Segesvár. VI. Resicza, Mehádia.

478. *Fröhlichi* Strm. — I. Budapest, Kalocsa, Parád, Debreczen, N.-Várad, Rézbánya. II. Lacus Fertő. VI. Temesvár, Mehádia. VII. Eszék.

479. *fuscipalpis* Strm. — I. Budapest, Eger, Beél. II. Ács, Lacus Fertő. V. Montes Kerczenses.

480. *serripes* Quens. — Communis.

481. *tardus* Pz. — Ut prior.

482. *flavicornis* Dej. — I. Budapest, Parád, Kalocsa. II. Sopron, Pécs, Kantavár. III. Ocskó. V. Pele, Segesvár. VI. Mehádia.

483. *anxius* Duft. — Frequens.

v. *pumilus* Dej. — Simul cum stirpe.

484. *modestus* Dej. — I. Budapest, B.-Csaba, Kalocsa, Debreczen, N.-Várad. II. Lacus Fertő. V. M.-Záh. VI. Resicza, Orsova, Mehádia.

485. *servus* Duft. — I. Budapest, Eger, Peszér, Kecskemét, Kalocsa, Debreczen, Nagy-Várad, Kalota. IV. Kassa, Szomotor. V. M.-Záh. VI. Grebenácz, Mehádia.

486. *picipennis* Duft. — I. Budapest, Parád, Dabas, Kecskemét, Kalocsa, Debreczen, Nagy-Várad. II. D.-Örs, Lacus Fertő, Sopron, Z.-Tapolcza, Zánka, Kőszeg, Pécs. III. K.-Kálna, Tavarnok, Beszterczebánya. IV. Kassa, Sátoralja-Ujhely, Tokaj, Szinna, Szomotor, K.-Helmecz, Tarczal. V. Déva, N.-Csür, Resinár, Földvár, Gyeke. VI. Mehádia.

487. *rufus* Brügg. — I. Budapest, Kalocsa, Debreczen, Nagy-Várad. IV. Szomotor, Nagy-Mihály. V. Vöröstorony, Kőhalom, Brassó. VI. Grebenácz, Orsova, Mehádia.

488. *hirtipes* Pz. — I. Budapest, Kalocsa, Debreczen, Nagy-Várad. II. Arács. IV. Szerencs, Szomotor. V. Mons Hargita, Sz.-Régen, Gyeke, M.-Záh.

Pangus Lec.

489. *scaritides* Strm. — I. Budapest. II. Komárom. V. Kolozsvár.

Anisodactylus Dej.

490. *binotatus* F. — I. Kalocsa, N.-Várad. II. Lacus Fertő, Sopron, Felsőlő. III. Trencsén, Rajecz. IV. Zboj, Tokaj, N.-Bocskó, Mons Pietrosz. V. Frequens. VI. Temesvár.

v. *spurcaticornis* Dej. — I. Budapest, Péczel, Parád, Kalocsa, M.-Berény, Debreczen, Nagy-Várad. II. Lacus Fertő, Sopron, Kantavár, Pécs. IV. S.-A.-Ujhely, N.-Mihály, Vallis Fajna, Mons Pietrosz. V. Hátszeg, Sz.-Ujfalu, Nagy-Szeben, Kis-Disznód, Brassó, Segesvár, Szász-Régen, Beszterce, Deés. VI. Mehádia.

491. *nemorivagus* Duft. — Frequens.

492. *signatus* Pz. — Ut prior.

493. *poeciloides* Steph. — I. Montes Biharenses. V. Torda.

494. *pseudoaeneus* Dej. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa, N.-Várad. II. Lacus Fertő. III. Lőcse.

Gynandromorphus Dej.

495. *etruscus* Quens. — I. Kalocsa. (Leg. F. Speiser.)

Diachromus Er.

496. *germanus* L. — In toto regno occurrit.

Dichirotrichus Dv.

497. *obsoletus* Dej. — V. Torda, Vizakna, N.-Sink.

v. *lacustris* Redtb. — II. Lacus Fertő, Sopron.

498. *pubescens* Payk. — V. Vizakna, Nagy-Szeben, Sz.-Sebes, Brassó, Sz.-Ujvár.

v. *ustulatus* Dej. — V. Déva, Vizakna, Szamosfalva.

Tachycellus Seidl.

499. *placidus* Gyllh. — II. Lacus Fertő, Sopron.

Bradycellus Er.

500. *harpalinus* Dej. — I. Budapest, Péczel, Nagy-Várad. IV. Jászó, Czéke. V. Vallis Zsil.

501. *collaris* Payk. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. Ács. III. K.-Kálna, Zsolna, Mons Oroszlánkő, Koritnyicza, Tátrafüred. IV. Bártfa, Torna, Sátoralja-Ujhely, N.-Mihály, Szomotor, Körtvélyes, Szatmár. V. Berethalom, Segesvár. VI. Mehádia.

Stenolophus Latr.

502. *teutonus* Schrk. — Frequens.

v. *abdominalis* Gené. — I. Bpest. VI. Temesvár.

503. *skrimshiranus* Steph. — In toto regno occurrit.

v. *affinis* Bach. — I. Kalocsa. (Leg. F. Speiser.)

504. *discophorus* Fisch. — Communis.

v. *flaviusculus* Motsch. — Simul cum stirpe.

505. *Steveni* Kryn. — V. N.-Szeben, Szt-Erzsébet, Rüsz, Gyeke, Kolozsvár, Zilah. VI. Oravicza, Mehádia.

506. *mixtus* Hbst. — Frequens.

Acupalpus Latr.

507. *elegans* Dej. — I. Bugyi, Dabas, Debreczen. II. Ács, Lacus Fertő. IV. Szomotor. V. Déva.
v. *ephippium* Dej. — I. Bugyi, Dabas.
508. *flavicollis* Strm. — I. Kecskemét, Nyiregyháza, Remecz, Hagymádfalva. IV. Tokaj. V. Dobra, Sz.-Erzsébet, Vöröstorony, Fogaras, Segesvár, Sz.-Régen. VI. Stájerlak.
509. *brunnipes* Strm. — I. Kalocsa, P.-Poó. II. Ács. IV. Szinna. V. Dobra.
510. *interstitialis* Reitt. — In regione VI. (Auctor, 312, p. 74.)
511. *suturalis* Dej. — I. Budapest, Kalocsa, B.-Csaba. IV. Szomotor. V. Sz.-Ujvár. VI. Grebenácz, Ferenczfalva, Báziás.
512. *dorsalis* F. — Communis.
v. *maculatus* Schaum. — I. Kalocsa. (Legit F. Speiser.)
513. *luteatus* Duft. (*luridus* Dej.) — I. Budapest, Kalocsa, Debreczen. VI Grebenácz, Báziás.
514. *exiguus* Dej. — Frequens.
515. *meridianus* L. — Ut prior.
516. *longicornis* Schaum. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa. VII. Eszék.
517. *consputus* Duft. — In toto regno creber.
518. *transversalis* Schaum. — I. Kalocsa. VI. Báziás.

Amblystomus Er.

519. *metallescens* Dej. — I. Budapest, Dabas, Peszér, Kalocsa, N.-Várad. II. D.-Örs, Vilonya, Kőszeg, Darócz. IV. Bártfa. VI. Mons Szemenik, Mehádia.
520. *niger* Heer. — I. Hagymádfalva. II. Ács. IV. S.-A.-Ujhely, Szomotor.

Badister Clairv.

521. *unipustulatus* Bon. — I. Budapest, Kalocsa, Debreczen. II. Lacus Fertő. III. Pozsony. V. Hátszeg, Brassó, Vallis Ragadó, M.-Záh.
522. *bipustulatus* F. — Frequens.
523. *sodalis* Duft. — I. Budapest, Kalocsa, Nagy-Várad. II. Lacus Fertő, Z.-Tapolcza. III. Zsolna, IV. A.-Bereczki, Nagy-Mihály, Nagy-Bocskó. V. Tasnád, Kolozsvár, Nagy-Szeben, N.-Csür, Brassó, Hosszufalu.
524. *peltatus* Pz. — I. Budapest, Kalocsa, Nagy-Várad. II. Lacus Fertő, Sopron. IV. Komjáti, S.-A.-Ujhely, S.-Patak, Varannó. V. Brassó. VI. Ulma, Grebenácz. VII. Eszék.

Licinus Latr.

525. *cassideus* F. — I. Budapest, Palota, Eger, M.-Berény, N.-Várad. II. Lacus Fertő, Sopron, Soóly, Veszprém, Z.-Tapolcza. III. Beczkó. V. Déva, Fogaras, Montes ad fluvium Maros, Kolozsvár. VI. Temesvár.
526. *depressus* Payk. — In toto regno occurrit.
527. *Hoffmannseggi* Pz. — In regionibus montanis frequens.
v. *nebrioides* Hoppe.. — I. Remecz. II. Nagy-Vázsony.
v. *separatus* Dej. — In regione VI. (Auctor, 64, II, p. 404.)

Oodes Bon.

528. *helopioides* F. — Frequens.
529. *gracilis* Villa. — I. Kalocsa, Debreczen. IV. Bártfa, N.-Mihály, Szomotor. V. Radna, Lacus Kisszéki-tó dictus, Brassó. VI. Lippa.

Chlaenius Bon.

530. *aeneocephalus* Dej. v. *gracilis* Dej. — VI. Oravicza. (Leg. J. Pável.)
531. *azureus* Duft. — I. Budapest, Kalocsa, Mező-Berény, N.-Várad. II. Z.-Tapolcza, Pécs. V. Bürgezd, ad ripam fluvii Olt, Fogaras. VI. T.-Kubin, Ulma, Oravicza.
532. *tristis* Schall. — In toto regno occurrit.
533. *nigricornis* F. — I. Eger, Kalocsa, Debreczen, N.-Várad. III. Pozsony, Beszterczebánya, Lőcse. V. Sz.-Ujvár, Pókafalva, N.-Szeben, Sz.-Ujfalu, N.-Sink, Sz.-Régen, Gyeke. VI. Temesvár.
v. *melanicornis* Dej. — I. Budapest, Kalocsa, Debreczen, N.-Várad. II. D.-Örs, Lacus Fertő, Sopron, Pécs. III. Putnok. IV. Komjáti, Sátoralja-Ujhely, Varannó. VI. Resicza.
534. *nitidulus* Schrk. — Frequens.
v. *tibialis* Dej. — III. Trencsén, N.-Lipcse, Á.-Váralja, Tátra (Bélapatak), Rosnyó, Nagy-Rőcze. IV. Szádellő, Komjáti, Kassa, N.-Mihály, Varannó.
535. *flavipes* Mén. — VI. Herkulesfürdő. (Legit J. Pável.)
536. *vestitus* Payk. — Communis.
537. *festivus* F. — I. Budapest, Eger, Kalocsa, M.-Berény. II. Velencze, Csopak, Felsőlő, Pécs. IV. Szerencs. V. Sz.-Ujvár, Déva, Fogaras, Medgyes, Gyeke. VI. Grebenácz, Orsova, Mehádia.
538. *Dejeani* Dej. — I. Budapest, Péczel, Kecskemét, Kalocsa. IV. S.-A.-Ujhely. VI. Grebenácz.
539. *circumscriptus* Duft. — VIII. Carlopago (sec. F. Ocskay).
540. *sulcicollis* Payk. — I. Péczel, Czinkota, Dabas, Kalocsa. II. Pápa.

Chlaenites Motsch.

541. *spoliatus* Rossi. — Frequens.

Callistus Bon.

542. *lunatus* F. — In toto regno occurrit.

Panagaeus Latr.

543. *crux major* L. — Frequens.
v. *trimaculatus* Dej. — I. Budapest, Kalocsa, V. Fogaras, Segesvár.

544. *bipustulatus* F. — I. Budapest, Kalocsa. II. Sopron, Lacus Fertő, Z.-Tapolcza. III. Pozsony, Trencsén, Rosnyó. IV. Bártfa, Komjáti, Parnó, S.-A.-Ujhely, Varannó. V. Hátszeg, Sz.-Sebes. N.-Csür, Sz.-Ujfalu, Fogaras, Brassó, Előpatak, Segesvár, Sz.-Régen. VI. Temesvár.

Masoreus Dej.

545. *Wetterhali* Gyll. — I. Budapest, Péczel. II. Lacus Fertő. III. K.-Kálna. IV. Komjáti.

Lebia Latr.

546. *pubipennis* Duf. — VIII. Fiume, Buccari, Crkvenica, Carlopago, Zengg.

547. *cyanocephala* L. — Frequens.

548. *chlorocephala* Hoffm. — Ut prior.

549. *crux minor* L. — Communis.
v. *nigripes* Dej. — I. Budapest. (Leg. L. Rayé.)

550. *trimaculata* Vill. — I. Budapest. V. Kolozsvár, Déva, F.-Orbó. VI. Mehádia.

551. *marginata* Fourc. — I. Parád. II. Sopron. III. Beszterczebánya, Beczkó. V. Kolozsvár, Medgyes, Szász-Régen. VI. Temesvár, Mehádia.

552. *humeralis* Dej. — In toto regno occurrit.

553. *scapularis* Fourc. — I. Budapest, Kalocsa, Debreczen. II. Lacus Fertő. V. Medgyes. VI. Orsova.

Lionychus Schm.-Göb.

554. *quadrillum* Duft. — I. Eger, Kalocsa, Debreczen. II. Lacus Fertő, Lelle. III. Trencsén, Putnok. IV. N.-Mihály, Tolcsva, Szőllőske. V. Vörös-torony, Sz.-Régen, Deés. VI. Temesvár, Báziás, Orsova.
v. *bipunctatus* Heer. — I. Kalocsa. (Legit F. Speiser 349, p. 11.)
v. *major* Mill. — III. Trencsén. V. Secundum Bielz.

Metabletus Schm.-Göb.

555. *obscuroguttatus* Duft. — Communis.

556. *pallipes* Dej. — Ut prior.

557. *truncatellus* L. — Frequens.

558. *foveatus* Fourc. — I. Budapest. II Soóly. III. K.-Kálna.

Blechrus Schaum.

559. *glabratus* Duft. — Communis

560. *minutulus* Goeze. — V. N.-Szeben, Vallis Lotrióra, Brassó.

561. *maurus* Strm. — I. Budapest, Parád, Kalocsa, Szombatság. II. Lacus Fertő. III. Pozsony, Rosnyó. IV. Komjáti, Tokaj. V. Gyeke, M.-Záh, M.-Sámsond, N.-Szeben, Prázsmár, Segesvár. VI. Uj-Moldova.

562. *plagiatus* Duft. — I. Budapest, Kalocsa. II. Lacus Fertő. V. Tasnád. VI. Temesvár.

Dromius Schaum.

563. *longiceps* Dej. — I. P.-Megyer, Péczel. II. Lacus Fertő. V. N.-Szeben, Szt-Erzsébet, Medgyes, Segesvár.

564. *linearis* Ol. — Communis.

565. *marginellus* F. — II. Ács. III. Kézsmárk.

566. *agilis* F. — Frequens.

567. *longulus* Friv. — VI. Ferenczfalva. (Legit E. Merkl.)

568. *meridionalis* Dej. — I. Dabas. (Leg. F. Metelka.)

569. *fenestratus* F. — III. Beszterczebánya, Vallis Vrátna, F.-Bocza. IV. Mons Szinnaikő. V. Montes Radnaenses. VI. Temesvár, Mehádia.

570. *quadrimaculatus* L. — I. Budapest, Eger, Nagy-Várad, Székelyhid, Vaskóh. II. Sopron, Szent-Márton. III. Verebély, Trencsén, Putnok. IV. S.-A.-Ujhely, S.-Patak, Bély, K.-Azar, Varannó. V. N.-Csür, N.-Szeben, Sz.-Ujfalu, Vöröstorony Sz.-Régen. VI. Temesvár, Mehádia.

571. *quadrinotatus* Pz. — III. K.-Kálna. V. Ad balneum Gyógy, Vallis Lotrióra, Fogaras, Brassó.

572. *quadrisignatus* Dej. — V. N.-Szeben. (Legit A. Ormay, 264, p. 16.)

573. *nigriventris* Thoms. — I. Budapest, Mons Pilis, Kecskemét, Kalocsa, Debreczen. II. Ács, Lacus Fertő, Soóly, Pécs. III. Trencsén. IV. Komjáti, S.-A.-Ujhely, N.-Mihály, Varannó, Homonna, Mons Szinnaikő. V. Nagy-Szeben, N.-Csür, Brassó, Segesvár. VI. Resicza, Stájerlak, Mehádia.

574. *sigma* Rossi. — I. Budapest, Kalocsa. II. Lacus Fertő. IV. A.-Bereczki, Sztropkó. VI. Resicza, Mehádia. VII. Montes Fruska-Góra.

Demetrias Bed.

575. *imperialis* Germ. — I. Budapest, Szt-Endre, Péczel, Félegyháza, Kecskemét, Kalocsa, Debreczen, N.-Várad. II. Lacus Fertő, Ercsi. III. Agárd. IV Tokaj, Vinna, Szathmár. V. Tasnád, Kolozsvár, Mező-Záh, Brassó. VI. Temesvár, Orsova, Mehádia.

576. *monostigma* Sam. — I. Budapest, Péczel, Eger, Peszér, Kecskemét, Kalocsa. II. D.-Örs, Lacus Fertő. III. Pozsony. IV. Tokaj. V. Tasnád, Hátszeg, N.-Csür. VI. Temesvár. VII. Eszék.

577. *atricapillus* L. — II. Zircz, Pécs. III. Trencsén. V. Zilah, Szilvás, Nagy-Szeben, Nagy-Csür, Sz.-Ujfalu, Botfalu, Segesvár, Hosszúfalu. VII. Pakrac.

Cymindis Latr.

578. *humeralis* Fourc. — In regionibus montanis frequens.

v. *rubrotestacea* Fleisch. — I. Comitatus Bihar. (Auctor, 90, p. 208.)

579. *axillaris* F. — I. Budapest, Parád. II. Lacus Fertő, Sopron. III. Vallis Vrátna, Rajecz. IV. Torna, Szőllőske. V. Tasnád, Borszék, N.-Csür, Déva. VI. Ulma, Fehértemplom.

v. *palliata* Fisch. — Teste Chaudoir et Hungariæ incola. (55, p. 67.)

v. *lineata* Quens. — VIII. Carlopago (Legit L. Biró.)

580. *cingulata* Dej. — In regionibus montanis occurrit.

581. *melanocephala* Dej. — I. Budapest. VII. Raduč, Velebit. VIII. Carlopago.

582. *scapularis* Schaum. — I. Budapest. II. Pettend, Lacus Fertő.

583. *angularis* Gyll. — II. Lacus Fertő. VI. Mehádia.

584. *variolosa* F. — I. Budapest. II. Pettend, Lacus Fertő, Sopron, Z.-Tapolcza. IV. Torna. VII. Raduč.

Frivaldszkyi Reitter. — IV. S.-A.-Ujhely. sec. L. Biró).

Polystichus Bon.

585. *connexus* Fourc. — I. Budapest, Szt-Endre, Kecskemét, Kalocsa, M.-Berény. II. Lacus Fertő, Sopron. III. Ad ripam fluvii Ipoly. IV. Parnó, S.-A.-Ujhely, Szerencs. VI. Pancsova, Grebenácz.

Zuphium Latr.

586. *hungaricum* Friv. — VI. Temesvár. (Legit Dr. J. Fodor.)

Drypta Dej.

587. *dentata* Rossi. — I. Budapest, Kalocsa, Debreczen, N.-Várad, Lunka, Hagymádfalva, Székelyhid, Rév. II. Lacus Fertő, Zalabér. III. Pozsony, Rozsnyó. IV. S.-A.-Ujhely, Szinna. V. Zilah, Sz.-Somlyó, Mojád, Hátszeg, N.-Szeben, Segesvár. VI. Temesvár.

Odacantha Payk.

588. *melanura* L. — I. Budapest, Szt-Endre, Péczel, Félegyháza, Kalocsa. II. Lacus Fertő, Sopron. III. Agárd. IV. Királyháza, K.-Majtény. V. Mojád, Kolozsvár, M.-Záh, N.-Csür.

Brachynus Web.

589. *bipustulatus* Quens. — I. Budapest, Szt.-Endre, Kecskemét, Hajós. II. Alcsút.

immaculicornis Dej. — V. Dobra, Medgyes, Segesvár, Deés. (Bielz, 27, p. 47.)

590. *crepitans* L. — Communis.

591. *psophia* Dej. — I. Budapest, Páty, Palota, Kecskemét, M.-Túr. II. Lacus Fertő, Berhida, Pécs. IV. Szerencs. V. Peér, Sz.-Ujvár, Deés, Déva, Hátszeg, Dobra, Medgyes. VII. Eszék.

592. *explodens* Duft. — Communis.

v. *strepens* Fisch. *(bombarda* Duft.) — Simul cum stirpe.

v. *glabratus* Dej. — I. Budapest. II. Ács, Tátika. V. Hátszeg, N.-Csür, Medgyes, Sz.-Régen, Deés.

Aptinus Bon.

593. *bombarda* Illig. — I. Budapest, Eger, Rézbánya, Vaskóh, Mons Királyhágó. II. Tátika. III. Beszterczebánya, T.-Teplicz. IV. Ránk. V. Kolozsvár, Segesvár. VI. Resicza, Mehádia. VII. Lič, Crni-Dabar, Fužine, Raduč. VIII. Fiume, Buccari.

Fam. DYTISCIDAE.

Brychius Thoms.

1. *elevatus* Pz. — III. Trencsén. V. Fogaras.

Haliplus Latr.

2. *obliquus* F. — I. Budapest. III. Trencsén. V. Sz.-Ujfalu, N.-Szeben. VIII. Fiume.

3. *lineatus* Aub. — I. Bpest. (Legit E. Frivaldszky.)

4. *variegatus* Strm. — I. Budapest, Kalocsa, Hajós. II. Z.-Tapolcza. III. Trencsén.

5. *fulvus* F. — I. Budapest, Kalocsa, Debreczen. III. Ocskó, Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj, Czéke. V. N.-Szeben, Segesvár, Alkenyér. VI. Resicza.

6. *flavicollis* Strm. — I. Budapest. II. Pozsony. V. Zilah, Hátszeg, Sz.-Ujfalu, Brassó. VI. Resicza.

7. *laminatus* Schall. — I. Kalocsa. IV. Bártfa, Kassa. V. Segesvár.

8. *ruficollis* Deg. — I. Budapest, Kalocsa, Nyiregyháza. II. Sopron, Lacus Fertő. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, A.-Bereczki, Czéke, Tokaj. V. Zilah, Nagy-Szeben, Szt-Erzsébet, N.-Csür, Fogaras, Fenyőfalva. VI. Resicza.

9. *Heydeni* Wehncke. — V. Segesvár. (Legit Dr. C. Petri, 269, p. 9.)
10. *fulvicollis* Er. — IV. Szomotor. V. Segesvár. M.-Záh, Gyeke.
11. *fluviatilis* Aub. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. III. Trencsén. V. Sz.-Ujfalu, Vallis Czód, Brassó.
12. *immaculatus* Gerh. — IV. Szerencs. (Legit Dr. C. Chyzer.)
13. *lineatocollis* Marsh. — I. Budapest, Kalocsa. III. Trencsén. IV. Mons Menczul.

Cnemidotus Ill.

14. *caesus* Duft. — I. Budapest, Kalocsa, Mező-Berény, Szeged, Debreczen. II. Z.-Tapolcza. IV. Kassa, S.-A.-Ujhely, Czéke, Varannó, Tokaj. V. N.-Szeben, Poplaka, Kercz, Fenyőfalva, Sz.-Régen. VI. Gombos, Báziás.

Pelobius Schönh.

15. *tardus* Hbst. — VIII. Fiume. (Leg. L. Biró.)

Oxynoptilus Schaum.

Hydrovatus Sharp.

16. *cuspidatus* Kunze. — I. Budapest, Nyiregyháza, M.-Berény. V. Kolozs.

Hyphydrus Ill.

17. *ovatus* L. — I. Budapest, Péczel, Vacs, Kalocsa, Nyiregyháza, Debreczen, M.-Berény, Szeged. III. Trencsén. IV. Tokaj. V. Kolozsvár, Sz.-Régen, Fogaras, Botfalva.
18. *variegatus* Aub. — VIII. Fiume. (Leg. L. Biró.)

Hygrotus Steph.

19. *inaequalis* F. — Communis.
20. *versicolor* Schall. — I. Kalocsa, Nyiregyháza. IV. Tokaj. V. Kákova, N.-Szeben, Rüsz.
21. *decoratus* Gyllh. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. V. N.-Szeben, Montes Kerczenses, Sz.-Régen.

Coelambus Thoms.

22. *impressopunctatus* Schall. — Frequens.
v. *lineellus* Gyll.— I. Budapest. IV. S.-A.-Ujhely, Szomotor.
23. *parallelogrammus* Ahr. — I. Bpest, Prædium apud urbem Kisszállás, Kalocsa. V. Brassó, M.-Záh.
24. *enneagrammus* Ahrs. — V. Szamosfalva, Déva, Vizakna.
25. *confluens* F. — I. Budapest, Palota, Péczel. II. Zalabér, Z.-Tapolcza, Kőszeg. III. Aggtelek. IV. S.-A.-Ujhely, Czéke, K.-Helmecz, Tokaj. V. Sz.-Ujfalu, F.-Bajom.

Bidessus Sharp.

26. *pumilus* Aub.— I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa, Nyiregyháza. IV. Czéke, Tokaj. VI. Báziás.
27. *Goudoti* Lap.— V. Brassó. (Seidlitz, 345, p. 856.)
28. *unistriatus* Ill. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa, Nyiregyháza. IV. Tokaj. V. Rüsz, Fenyőfalva.
29. *minutissimus* Germ. — I. Kalocsa. (Legit Fr. Speiser, 349, p. 12.)
30. *geminus* F. — Communis.
31. *confusus* Klug. — Hungaria (Regimbart, 284, pag. 89).

Deronectes Sharp.

32. *platynotus* Germ. — VI. Korniaréva. (Legit E. Frivaldszky.)
33. *assimilis* Payk. — III. Zólyom. (Legit A. Hell).

Hydroporus Clairv.

34. *septentrionalis* Gyll. — Teste Seidlitz in Hungaria. (345, p. 92.)
35. *Sanmarki* Sahlb. — V. Brassó, Prázsmár.
36. *pictus* F. — III. Zsolna, Kézsmárk. V. Görcsön, N.-Szeben, Brassó, Fenyőfalva.
37. *granularis* L. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Nyiregyháza. V. N.-Szeben, Sz.-Régen.
38. *bilineatus* Strm. — I. Budapest, Péczel, Kecskemét, Kalocsa, Szeged, Nyiregyháza. IV. Sátoralja-Ujhely, Czéke, K.-Helmecz, Varannó, Nagy-Mihály. VI. Temesvár.
39. *obliquesignatus* Bielz. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Hajós, Debreczen, P.-Poó, M.-Berény, Szeged. IV. S.-A.-Ujhely, Czéke, Tokaj. V. Kolozsvár. VI. Temesvár.
40. *lineatus* F. — Frequens.
41. *halensis* F. — I. Budapest, Péczel. III. Besztercebánya, Gbellán. IV. N.-Bánya. V. N.-Szeben, Medgyes, Kolozsvár.
42. *dorsalis* F. — V. Árapatak. (Leg. C. Fuss.)
43. *erythrocephalus* L.— I. Kalocsa. IV. K.-Helmecz. V. N.-Szeben, Montes Kerczenses, Botfalva, Fenyőfalva.
v. *deplanatus* Gyll. — V. Segesvár. (Legit Dr. C. Petri.)
44. *rufifrons* Duft. — V. N.-Szeben, Vöröstorony.
45. *scalesianus* Steph. — IV. K.-Helmecz. (Legit Dr. C. Chyzer.)
46. *angustatus* Strm. — I. Eger, Kalocsa. IV. K.-Helmecz. V. Botfalu, N.-Szeben, Brassó.
47. *palustris* L. — I. Budapest, Kecskemét. II. Sopron. III. Pozsony, Tátrafüred. IV. Kassa, S.-A.-Ujhely, Czéke, K.-Helmecz. V. N.-Szeben, Montes Kerczenses, N.-Csür, Sz.-Magyaros,

Kőhalom, Segesvár, Sz.-Régen. VI. Montes Szörényenses.

v. *vittula* Er. — IV. K.-Helmecz. (Legit Dr. C. Chyzer.)

48. *tristis* Payk. — V. N.-Szeben, Brassó.

49. *notatus* Strm. — I. Kalocsa. II. Pécs.

50. *umbrosus* Gyll. — I. Budapest. (Legit E. Frivaldszky.)

51. *elongatulus* Strm. — V. N.-Enyed. Montes Kerczenses.

52. *marginatus* Duft. — III. Zsolna. IV. N.-Bocskó. V. K.-Torony. VII. Gospić.

53. *planus* F. — Communis.

54. *pubescens* Gyll. — I. Péczel, Kalocsa. V. Nagy-Szeben, M.-Záh.

55. *discretus* Fairm. — III. Várna, Zsolna. V. Segesvár.

56. *nigrita* F. — III. Zólyom. V. K.-Torony, Brassó, Balánbánya, Torda. VI. Stájerlak.

57. *melanarius* Strm. — V. Montes Kerczenses. (Bielz, 27, p. 48.)

58. *ferrugineus* Steph. — III. Várna. V. N.-Szeben, K.-Disznód, Præsbe, Montes Kerczenses. VI. Mons Szárko.

Noterus Clairv.

59. *clavicornis* Deg. — I. Budapest, Dabas, Kalocsa, Nyiregyháza. II. D.-Örs. IV. Sátoralja-Ujhely, Lelesz. V. Hátszeg, Kercz, Fogaras, Brassó, Medgyes, Segesvár, Sz.-Régen, M.-Záh, Gyeke. VI. Báziás.

60. *sparsus* Marsh. — I. Budapest, Kalocsa, Nyiregyháza, Debreczen. II. D.-Örs, Z.-Tapolcza. III. Rozsnyó. IV. S.-A.-Ujhely, Czéke, N.-Mihály. V. N.-Szeben, Kercz, Fogaras, Brassó, Segesvár, Sz.-Régen, Gyeke. VI. Gombos, Báziás.

Laccophilus Leach.

61. *variegatus* Strm. — I. Budapest, Péczel, Szeged. IV. Páczin. V. Dobra, Kolozsvár. VI. Báziás.

62. *obscurus* Pz. — Frequens.

63. *interruptus* Pz. — I. Budapest, Palota, Kalocsa, Nyiregyháza. II. Sopron. III. Trencsén. IV. Sátoralja-Uhely, Nagy-Mihály. V. Nagy-Szeben, Dolmány, Sz.-Magyaros, Előpatak, Héviz, Medgyes, Segesvár, Gyeke, M.-Záh.

Agabus Leach.

64. *guttatus* Payk. — Frequens.

65. *nitidus* F. — I. Budapest, Rézbánya. II. Csopak, Pécs. III. Rozsnyó. IV. Mons Rabaszkala, Körtvélyes. V. Brassó. VI. Stájerlak.

66. *biguttatus* Ol. — I. Beél. V. K.-Disznód, Montes Kerczenses, Brassó, Balánbánya.

67. *bipustulatus* L. — Communis.

68. *Solieri* Aub. — III. Tátrafüred. V. Montes Kerczenses (Lakucz).

69. *chalconotus* Pz. — III. Rozsnyó. VI. Montes Szörényenses.

70. *paludosus* F. — V. N.-Szeben, Sz.-Régen.

71. *uliginosus* L. — I. Budapest, Péczel, Kecskemét, Kalocsa, Debreczen. II. Z.-Tapolcza. IV. S.-A.-Ujhely, N.-Mihály. V. N.-Szeben, Brassó, Sz.-Régen.

72. *congener* Payk. — V. Medgyes, Bodza.

73. *affinis* Payk. — I. Debreczen. V. N.-Szeben, Montes Kerczenses.

74. *nebulosus* Forst. — I. Budapest, Kalocsa. VII. Eszék.

75. *Sturmi* Gyll. — V. N.-Szeben, A.-Szombat.

76. *undulatus* Schrk. — I. Budapest, Dabas, Peszér, Kalocsa, M.-Berény. V. N.-Szeben, K.-Disznód, Brassó, Segesvár, Csáki-Gorbó, Oláhfalu.

77. *femoralis* Payk. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa, Debreczen, Szeged. II. Lacus Fertő, Pécs. IV. S.-A.-Ujhely.

78. *maculatus* L. — In toto regno occurrit.

Ilybius Er.

79. *fenestratus* F. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Hadház. III. Trencsén. IV. Torna, Olyka, Szőllőske. V. Nagy-Szeben, Segesvár, Sz.-Régen, M.-Záh.

80. *fuliginosus* F. — Frequens.

81. *subaeneus* Er. — I. Budapest, Palota. III. Trencsén, Lacus Csorba. V. Mező-Záh.

82. *ater* Deg. — I. Budapest, Péczel, Rézbánya. IV. Bártfa. V. N.-Szeben, Sz.-Ujfalu, Montes Kerczenses, Fogaras.

83. *obscurus* Marsh. — I. Budapest, Kalocsa, Nyiregyháza. II. D.-Örs. IV. Torna. V. Tasnád, Sz.-Régen.

84. *guttiger* Gyll. — I. Rézbánya. II. D.-Örs. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Szőllőske, Tokaj. V. Præsbe, Montes Kerczenses.

Liopterus Aub.

85. *ruficollis* Schall. — Communis.

Colymbetes Clairv.

86. *Grapii* Gyll. — I. Budapest, Péczel. II. Pécs. V. N.-Szeben, Brassó.

Rantus Lac.

87. *conspersus* Gyll. — Frequens.

88. *notaticollis* Aub. — III. Trencsén. (Legit Dr. C. Brancsik, 45, p. 16.)

89. *notatus* F. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa. II. Z.-Tapolcza. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj. V. Nagy-Szeben, Fenyőfalva, Brassó, Sz.-Régen, N.-Ajta, Bibarczfalva, Mező-Záh.
90. *bistriatus* Er. — I. Hajós. (Leg. Dr. E. Kaufmann.)
91. *adspersus* F. — I. Budapest, Kalocsa, Rézbánya. II. D.-Örs, Z.-Tapolcza, Pécs. III. Aggtelek. IV. S.-A.-Ujhely, Czéke, Tárkány. V. N.-Szeben, Fenyőfalva, Kercz, Fogaras.
92. *consputus* Strm. — I. Kalocsa. (Leg. F. Speiser, 349, p. 12.)
93. *exoletus* Forst. — I. Budapest, Kalocsa, Nyiregyháza. II. D.-Örs. III. Trencsén V. N.-Szeben.

Cymatopterus Lac.

94. *fuscus* L. — Communis
95. *striatus* L. — I. Debreczen. (L. E. Frivaldszky.)

Hydaticus Leach.

96. *seminiger* Deg. — I. Budapest, Nyiregyháza. II. Sopron. III. Pozsony. IV. Sátoralja-Ujhely, Czéke, Beregszász. V. Nagy-Szeben, Fogaras, Fenyőfalva, Segesvár.
97. *stagnalis* F. — I. Budapest, Dabas, Kalocsa.
98. *transversalis* Pont. — I. Budapest, Kalocsa. II. D.-Örs, Kőszeg, Pécs. III. Trencsén. IV. Torna, S.-A.-Ujhely, Varannó. V. N.-Enyed, Miriszló, Kákova, Sz.-Sebes, N.-Szeben, Segesvár.
99. *grammicus* Germ. — Teste Küster etiam Hungariæ incola (236, XIX, 9.).

Graphoderes Eschsch.

100. *austriacus* Strm. — I. Budapest, Kalocsa, M.-Berény, M.-Kovácsháza, Debreczen, Nagy-Várad. IV. Kassa, S.-A.-Ujhely. V. N.-Szeben, N.-Ajta, M.-Záh.
101. *bilineatus* Deg. — I. Budapest, Kalocsa.
102. *cinereus* L. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Hadház. III. T.-Szt-Márton. IV. S.-A.-Ujhely. V. N.-Szeben, Sz.-Magyaros, Medgyes, M.-Záh, Gyeke.
103. *zonatus* Hoppe. — I. Budapest, Péczel, Isaszeg. II. Sopron. III. Ocskó, Kézsmárk. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely. V. Brassó.

Acilius Leach.

104. *sulcatus* L. — Frequens.
105. *canaliculatus* Nic. — I. Budapest, Kalocsa. IV. Bártfa.

Dytiscus L.

106. *latissimus* L. — I. Budapest, Szeged. III. Beszterczebánya.
107. *marginalis* L. — Frequens.
108. *dimidiatus* Bergs. — I. Budapest, Kalocsa, Mező-Berény. II. D.-Örs, Z.-Tapolcza, Felsőlő. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, N.-Mihály, A.-Bereczki, Tokaj. V. N.-Szeben, Kercz, Fogaras, N.-Sink, Segesvár, Sz.-Régen, Gyeke. VI. Temesvár.
109. *circumcinctus* Ahr. — I. Budapest, Kalocsa. II. Sopron, III. Ocskó, Á.-Váralja. IV. Görgő, Páczin, S.-A.-Ujhely. V. Nagy-Szeben, Fogaras, Brassó.
110. *circumflexus* F. — I. Budapest, Péczel, Mező-Berény. II. D.-Örs. V. N.-Szeben, Fenyőfalva, Vizakna, Bibarczfalva. VI. Temesvár.

Cybister Curt.

111. *laterimarginalis* Deg. — Frequens.

Fam. GYRINIDAE.

Aulonogyrus Regimb.

1. *concinnus* Klug. — I. Vácz, Péczel.

Gyrinus Geoffr.

2. *minutus* F. — IV. Bártfa, Mons Szinnaikő, Tokaj.
3. *bicolor* Payk. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. IV. Varannó, Tokaj. V. Sz.-Ujvár, Nagy-Szeben, M.-Záh.
4. *elongatus* Aub. — I. Budapest, Péczel.
5. *caspius* Mén. — I. Kalota (Regimbart, 283, p. 158.).
   v. *velox* Severin. — In regione VI. (Auctor, 347, p. 161.).
6. *hungaricus* Seidl. — I. Kalocsa. V. Vallis Majalesti, Gyulafalva. VI. Szászka.
7. *distinctus* Aub. — I. Kalota. V. Bodza. VI. Szászka.
   v. *colymbus* Er. — I. Hagymádfalva, Remecz. II. Z.-Tapolcza. IV. Mons Vihorlat.
8. *mergus* Ahr. — I. Budapest, Hagymádfalva, Remecz. VI. Temesvár, Ferenczfalva.
9. *natator* Ahr. — Communis.
10. *marinus* Gyll. — IV. Szinna, Szerencs.

Orectochilus Lac.

11. *villosus* F. — III. Kisucza-Ujhely. IV. M.-Laborcz, Szinna. V. N.-Szeben, Medgyes, Fogaras, Kolozsvár.

Fam. HYDROPHILIDAE.

Hydrous Leach.

1. *aterrimus* Eschsch. — Frequens.
2. *piceus* L. — Communis.

Hydrophilus Geoff.

Hydrous Brull.

3. *caraboides* L. — Frequens.
4. *flavipes* Stev. — Ut prior.

Limnoxenus Rey.

5. *oblongus* Hbst. — Communis.

Hydrobius Leach.

6. *fuscipes* L. — Communis.
   v. *aeneus* Sol. — I. Kalocsa. (Leg. F. Speiser, 349, p. 13.)
   v. *Rottenbergi* Gerhdt. — I. Budapest, Kalocsa, Szeged, Debreczen. V. N.-Szeben.

Helochares Muls.

7. *lividus* Forst. — Communis.
8. *erythrocephalus* F. — I. Kalocsa. (Legit F. Speiser, 349, p. 13.)
9. *dilutus* Er. — I. Szeged, Makó.

Philydrus Sol.

10. *frontalis* Er. — V. N.-Szeben. (Bielz, 27, p. 49.)
11. *testaceus* F. — In toto regno occurrit.
    v. *rubicundus* Kuw. — Solum Hungariam inhabitat. (Auctor, 232, p. 275.)
12. *ferrugineus* Küst. — Etiam Hungariæ incola. (Kuwert, 232, p. 257.)
13. *grisescens* Gyll. — I. Kalocsa. (Leg. F. Speiser, 349, p. 13.)
14. *torquatus* Marsh. — V. Teste Kuwert. (232, p. 277.)
15. *maritimus* Thoms. — I. Dabas, Szentes, Makó. V. Déva. VI. Palics.
16. *melanocephalus* Ol. — Communis.
17. *nigricans* Zett. — V. N.-Szeben, Brassó.
18. *affinis* Thunbg. — I. Budapest, Kalocsa, N.-Várad. V. N.-Szeben, Fenyőfalva.
19. *coarctatus* Gredl. — I. Budapest, Kalocsa, Nagy-Várad. II. Pécs. III. Tavarnok, Putnok. IV. Szomotor, Czigánd, Szerencs, Tokaj.

Cymbiodyta Bed.

20. *marginella* F. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa. II. D.-Örs. III. Tavarnok. IV. Kir.-Helmecz, Szomotor, Tokaj. V. Déva. N.-Szeben.

Enochrus Thoms.

21. *bicolor* Payk. — I. Budapest, Csongrád. VI. Palics.
    v. *italus* Kuw. — I. Kalocsa. (Legit F. Speiser, 349, p. 13.)

Crenitis Bed.

22. *punctatostriatus* Letz. — Etiam Hungariam inhabitat. (Seidlitz, 345, p. 116.)

Paracymus Thoms.

23. *aeneus* Germ. *(salinus* Bielz). — I. Kalocsa. V. Déva, Szamosfalva, N.-Csür. VI. Temesvár.

Anacaena Thoms.

24. *bipustulata* Marsh. — I. Budapest. IV. Homonna.
25. *ovata* Reiche. — I. Budapest. II. Csopak, Pécs. IV. M.-Sziget.
26. *limbata* F. — I. Kecskemét, Kalocsa. II. Pécs. IV. N.-Bocskó. V. Pele, Hátszeg, N.-Szeben, Kőhalom, Fenyőfalva, Segesvár.
27. *globulus* Payk. — I. Budapest, Péczel, Kecskemét, Kalocsa, Nyiregyháza. II. D.-Örs, Csopak, Pécs. III. Trencsén. IV. Kis-Majtény, Nagy-Bocskó. V. Nagy-Szeben, Nagy-Csür, Kercz, Mező-Záh, Sz.-Ujfalu.

Laccobius Er.

28. *alternus* Motsch. — III. L.-Szt-Miklós. (Rottenberg, 330, p. 320.)
29. *gracilis* Motsch. *(viridiceps* Rottb.) — Hungaria. (Rottenbeg, 330, p. 312.)
30. *nigriceps* Thoms. — I. Budapest, Péczel. II. Csopak, Arács, Z.-Tapolcza. III. Várna, Trencsén, L.-Szt-Miklós. VI. Grebenácz.
31. *scutellaris* Motsch. — I. Budapest, Péczel. IV. Varannó, K.-Helmecz, Szerencs.
    v. *atratus* Rottbg. — V. F.-Vidra. (Legit A. Ormay, 264, p. 17.)
32. *alutaceus* Thoms. — I. Budapest, Kalocsa, Segesvár, Szeged. II. Csopak, Arács. III. Mons K.-Kriván, Poprád. IV. S.-A.-Ujhely, Király-Helmecz.
33. *minutus* L. — Communis.
34. *bipunctatus* F. — I. Budapest, Szeged. IV. Tolcsva. V. Teste Seidlitz.

Limnebius Leach.

35. *papposus* Muls. — I. Budapest, Kalocsa, Nagy-Várad. II. Paks, Pécs. III. Beszterczebánya, Kézsmárk. IV. S.-A.-Ujhely, K.-Azar, Király-Helmecz.
36. *nitidus* Seidl. — I. Budapest. II. Pécs. IV. Luhi. V. N.-Szeben. VI. Resicza.
37. *truncatellus* Thunbg. — I. Budapest. III. Verebély, Trencsén, Poprád. IV. M.-Sziget. V. Nagy-Szeben, N.-Csür, Sz.-Ujfalu.
38. *picinus* Marsh. — I. Budapest, Kalocsa, Nyiregyháza. IV. S.-A.-Ujhely. V. N.-Szeben.

Chaetarthria Steph.

39. *seminulum* Payk. — I. Budapest, Kalocsa, Mező-Berény. II. D.-Örs. III. Trencsén, Poprád. IV. Tárkány, K.-Majtény. V. N.-Szeben.

Acanthoberosus Kuw.

40. *Schusteri* Kuw. — Solum in Hungaria habitat. (Auctor, 231, p. 133.)
41. *spinosus* Stev. — Frequens.

Berosus Leach.

42. *luridus* L. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Mező-Berény. II. Z.-Tapolcza. III. Verebély. V. Sz.-Ujvár, Hátszeg, N.-Szeben, Brassó, Fenyőfalva, M.-Záh.
43. *signaticollis* Charp. — Frequens.
44. *affinis* Brull. — I. Kalocsa. (Leg. F. Speiser, 349, p. 13.)

Cercyon Leach.

45. *littoralis* Gyll. — V. Teste Seidlitz. (345, p. 119.)
46. *ustulatus* Preyssl. — Frequens.
47. *obsoletus* Gyll. — II. Zircz, Szegzárd, Felsőlő. III. Tátra (Zöldtó). IV. Mons Hoverla. V. Nagy-Szeben, Fogaras. VI. Mehádia.
48. *haemorrhoidalis* F. — Communis.
49. *flavipes* F. — Ut prior.
50. *melanocephalus* L. — III. N.-Lipcse. V. Ad balneum Gyögy, Remete, N.-Szeben, K.-Disznód, Fogaras, Brassó, Prázsmár, Medgyes.
51. *aquaticus* Lap. — In toto regno occurrit.
52. *lateralis* Marsh. — IV. Torna. V. Prázsmár, Segesvár. VI. Mehádia.
53. *unipunctatus* L. — Frequens.
54. *quisquilius* L. — Ut prior.
55. *centrimaculatus* Strm. — I. Budapest, III. Kézsmárk, Putnok. V. N.-Szeben. VI. Mehádia. VII. Eszék.
56. *terminatus* Marsh. — Frequens.
57. *pygmaeus* Ill. — Ut prior.
    v. *conspurcatus* Strm. — V. Krizba. (Legit L. Méhely, 247, p. 183.)
58. *analis* Payk. — Communis.
59. *minutus* F. — I. Budapest, Kalocsa, N.-Várad. IV. Torna, Máramaros-Sziget. V. N.-Szeben. VI. Mehádia.
60. *granarius* Er. — I. Budapest, Péczel, Kecskemét. IV. Czigánd. V. Vallis Lotrióra Mons Sánta, N.-Szeben. VI. Mehádia.
61. *lugubris* Payk. — I. Budapest, Dabas, Kalocsa. IV. Lelesz. V. N.-Szeben, Sz.-Sebes, Montes Kerczenses.

Megasternum Muls.

62. *obscurum* Marsh. — Communis.

Cryptopleurum Muls.

63. *crenatum* Pz. — V. Teste Seidlitz. (345, p. 121.)
64. *atomarium* Oliv. — Frequens.

Sphaeridium F.

65. *bipustulatum* F. — Communis.
    v. *4.-maculatum* Marsh. — I. Péczel, Kalocsa.
    v. *bimaculatum* Kuw. — I. Bpest, Kecskemét, Kalocsa.
    v. *marginatum* F. — I. Kalocsa, Makó. V. Nagy-Szeben, Szent-Ersébet, Brassó, Krizba, F.-Komána, Sósmező, Segesvár.
    v. *semistriatum* Lap. — I. Kalocsa. (Leg. F. Speiser, 349, p. 14.)
66. *scarabaeoides* L. — Communis.
    v. *lunatum* F. — V. Nagy-Enyed, Nagy-Szeben. Barót. VI. Stájerlak.

Coelostoma Brull.

67. *orbiculare* F. — Frequens.

Spercheus Kug.

68. *emarginatus* Schaller. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Beél. II. Pettend. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely. V. Dobra, Vizakna, N.-Szeben, Fogaras, Sz.-Magyaros, Bodza, Segesvár, Kolozsvár. VI. Báziás.

Helophorus F.

69. *alternans* Gené v. *intermedius* Muls. — VI. Orsova (sec. J. Frivaldszky).
70. *nubilus* F. — Communis.
71. *micans* Fald. — I. Bpest, Kecskemét, Kalocsa, Nyiregyháza, Szentes, Szegvár. II. Lacus Fertő. III. K.-Jobbágyi. V. Déva.
    v. *subcostatus* Kol. — I. Kalocsa. VI. Herkulesfürdő.
72. *avernicus* Muls. — V. Montes Kerczenses. (Bielz, 27, p. 49.)
73. *nivalis* Giraud. — III. Várna. IV. Mons Lungacsász, Cserna-Hóra.
74. *glacialis* Villa. — I. Feketeerdő. III. Tátrafüred. IV. Montes Lungacsász et Pietrosz. V. Cibinjézer, Praesbe, Mons Negoi. VI. Mehádia.
75. *griseus* Hbst. — Frequens.
    v. *brevipalpis* Bed. — VII. Teste Kuwert. (233, p. 196.)
    v. *montenegrinus* Kuw. — In regione VII. (Auctor, 227, p. 228.)
76. *aquaticus* L. — Communis.

77. *aequalis* Thoms. — V. Sz.-Ujvár. (Leg. A. Ormay.)
78. *dorsalis* Marsh. — I. M.-Káta, Kalocsa, Makó. III. Á.-Váralja, Putnok. IV. S.-A.-Ujhely, Sáros-Patak, Szerencs. VI. Palics.
79. *strigifrons* Thoms. v. *croaticus* Kuw. — In regione VII. (Auctor, 227, p. 248.)
80. *nanus* Strm. — I. Budapest, Kalocsa, Szeged, Beél. V. Hátszeg, N.-Szeben.
81. *pumilio* Er. — I. Kalocsa. III. Beszterczebánya. V. N.-Szeben.
v. *Redtenbacheri* Kuw. — V. Teste Seidlitz. (345, p. 125.)
82. *confrater* Kuw. — Teste Auctore est solum Hungariæ incola. (227, p. 283.)
83. *Erichsoni* Bach. — I. M.-Káta, Kalocsa, Makó. III. Ad ripam fluv. Árva, Putnok. IV. S.-A.-Ujhely, S.-Patak. VI. Palics.
84. *fulgidicollis* Motsch. — In reg. VII. (Kuwert, 233, p. 212.)
85. *elongatus* Motsch. — Hungaria. (Kuwert, 227, p 282.)
86. *granularis* L. — Communis.
87. *aeneipennis* Thoms. — I. Kalocsa. V. Sz.-Régen.

Hydrochus Leach.

88. *carinatus* Germ. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. III. Tátrafüred. V. Dobra, Fenyőfalva.
89. *brevis* Hbst. — I. Péczel, Kalocsa, Nyiregyháza. V. Dobra, N.-Szeben.
90. *elongatus* Schall. — Frequens.
91. *flavipennis* Küst. — VIII. Fiume. (Leg. L. Biró.)
v. *filiformis* Kuw. — Secundum Auctorem solum in Hungaria habitat. (228, p. 291.)
92. *angustatus* Germ. — I. Budapest, Kecskemét, Szeged, H.- Vásárhely. II. Lacus Fertő, Apar. III. Várna. IV. S.-A.Ujhely, Tolcsva, Czéke, Varannó, Páczin. V. Dobra.
93. *nitidicollis* Muls. — I. Eger. II. Lacus Fertő. VIII. Buccari.

Ochthebius Leach.

94. *exsculptus* Germ. — III. Montes Klakenses IV. Mons Vihorlat. V. Montes Hátszegenses.
95. *gibbosus* Germ. — V. Montes Hátszegenses. (Bielz, 27, p. 49.)
v. *lacunosus* Strm. — IV. Luhi (sec. J. Frivaldszky).
96. *metallescens* Rosh. — IV. Tokaj. (Leg. Dr. C. Chyzer.)
97. *caudatus* Friv. — V. Vizakna (teste Auctore).
98. *foveolatus* Germ. — V. Montes Hátszegenses, N.-Szeben. VI. Temesvár.
99. *exaratus* Muls. — I. Péczel. V. Kolozsvár.
100. *punctatus* Steph. — V. Déva, Vizakna, Torda, Szamosfalva.
101. *opacus* Baudi (*montanus* Friv.) — VI. Mehádia. (Legit J. Pável.)
102. *narentinus* Reitt. — V. Teste Seidlitz. (345, p. 127.)
103. *riparius* Ill. — Frequens.
104. *Eppelsheimi* Kuw. — Solum in Hungaria habitat (Auctor, 229, p. 384.)
105. *margipallens* Latr. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa, Makó. H.-Vásárhely. II. Pécs. V. Vizakna, G.-Sóakna. VI. Temesvár.
106. *marinus* Payk. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa, Szeged, Makó, H.-Vásárhely. V. Déva, Vizakna, G.-Sóakna. VI. Palics, Grebenácz, Mehádia.
107. *glabratus* Seidl. — In regione VII. (Kuwert, 229, p. 386.)

Hydraena Kug.

108. *testacea* Curt. — II. Pécs. (Leg. J. Pável.)
109. *palustris* Er. — I. Kalocsa. IV. Felsőfalu.
110. *croatica* Kuw. — VII. Teste Auctore. (230, p. 116.)
111. *riparia* Kug. — III. Zsolna, N.-Lipcse, Kézsmárk. IV. Rahó. V. N.-Szeben. VI. Resicza, Mehádia.
112. *dentipes* Germ. — III. Tátra (Keresztfalu). IV. Bártfa, Mons Vihorlat, Sz.-Váralja, Felsőfalu.
113. *hungarica* Rey. — In Hungaria detecta. (Kuwert, 230, p. 118.)
114. *gracilis* Germ. — IV. Ráhó. V. Nagy-Szeben, N.-Disznód.
115. *pulchella* Germ. — V. N.-Szeben, VI. Mehádia.
116. *perparvula* Kuw. — VII. Teste Auctore. (233, p. 303.)
117. *Sieboldi* Rosh. — IV. Bártfa, Czigelka, Luhi.

Fam. GEORYSSIDAE.

Georyssus Latr.

1. *crenulatus* Rossi. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. D.-Örs. IV. Kassa, Királyháza. V. Vallis Zsil, N.-Szeben, Szt.-Erzsébet, Segesvár, Gy.-Tölgyes.
2. *substriatus* Heer. — I. Budapest. V. Kolozsvár.
3. *laesicollis* Germ. — V. Dobra, Vöröstorony.
4. *caelatus* Er. — V. Hátszeg. (Bielz, 27, p. 50.)

Fam. PARNIDAE.

Limnius Müll.

1. *Dargelasi* Latr. — IV. Montes Beszkidenses. (Reitter, 295, p. 55.)

Elmis Latr.

2. *Germari* Er. — III. Sztrecsnó. IV. Bártfa, Mons Vihorlat, Luhi, Mons Menczul. VI. Uj-Moldova.
3. *Volkmari* Pz. — II. Pécs. III. Trencsén, Keresztfalu. IV. Bártfa, Rónaszék, N.-Bocskó. V. Porcsesd. VI. Mehádia.
4. *rufiventris* Kuw. — In regione VII. (Auctor, 234, p. 23.)
5. *opacus* Müll. — IV. Luhi. VII. Secundum Kuwert.
6. *lepidopterus* Kuw. — VII. Teste Auctore. (234, p. 24.)

Esolus Muls.

7. *angustatus* Müll. — III. Sztrecsnó, Koritnyicza. IV. Montes Vihorlat, Menczul et Pop-Iván. VI. Uj-Moldova.
8. *Czwalinae* Kuw. — In regione VII. (Auctor, 234, p. 26.)
9. *parallelepipedus* Müll. — III. Vallis Vrátna. IV. Mons Szinnaikő, Rónaszék. V. Fogaras, Ad ripam fluvii Olt.
10. *Kuenowi* Kuw. — II. Pécs. (Auctor, 234, p. 27.)

Lareynia Duv.

11. *Maugeti* Latr. — III. Vallis Vrátna, Koritnyicza. IV. Perbenyik, Mons Pop-Iván, Felsőfalu, Nagy-Bánya.
12. *longicollis* Kuw. — Secundum Auctorem in reg. VII. (234, p. 28.)
13. *obscura* Müll. — Hungaria. (Legit E. Frivaldszky.)
14. *croatica* Kuw. — VII. Teste Auctore. (234, p. 29.)
15. *aenea* Müll. — II. Zircz, Pécs. III. Sztrecsnó, Német-Lipcse, Tátra (Keresztfalu). IV. Montes Szinnaikő et Vihorlat, Luhi, Rónaszék.
v. *Megerlei* Duft. (*Kirschi* Gerh.) — VII. Teste Kuwert. (234, p. 31.)

Riolus Muls.

16. *nitens* Müll. — II. Pécs. III. Montes Klakenses (Com. Trencsén.)
17. *cupreus* Müll. — IV. Bártfa. V. F.-Vidra, Brassó.
18. *subviolaceus* Müll. v. *bosnicus* Kuw. — VII. Secundum Auctorem. (234, p. 34.)

Macronychus Müll.

19. *4-tuberculatus* Müll. — I. Budapest. III. Trencsén.

Potamophilus Grrm

20. *acuminatus* F. — I. Nagy-Várad. V. Dobra, Medgyes.

Dryops Oliv.

21. *substriatus* Müll. — I. N.-Várad. II. Pécs. III. Verebély. IV. Rónaszék. V. Fenyőfalva, Nagy-Talmács.

Parnus F.

22. *striatopunctatus* Heer. — I. N.-Várad, Remecz. III. K.-Kálna, Trencsén, Á.-Váralja, ad rivum Béla. IV. Vidrány, Vallis Fajna. V. Hátszeg, Dobra, Prázsmár.
23. *lutulentus* Er. — I. Hajós. IV. S.-A.-Ujhely. V. Hátszeg, N.-Szeben, Vallis Czód. VII. Teste Kuwert.
24. *prolifericornis* F. — Frequens.
25. *luridus* Er. — V. Hátszeg, N.-Szeben, Montes Kerczenses, Vöröstorony, Sebeshely, F.-Vidra.
26. *niveus* Heer. — VI. Mons Szemenik. (Leg. E. Merkl.)
27. *obscurus* Duft. — I. N.-Várad. II. Sopron. III. Beczkó, Á.-Váralja, Lacus Zöldtó dictus, ad rivum Béla. IV. Vallis Fajna, ad ripam fluv. Iza, M.-Sziget, Rónaszék, Felsőfalu. V. Segesvár. VI. Krassova, Mehádia.
28. *auriculatus* Pz. — Frequens.
29. *pilosellus* Er. — I. Budapest, Kecskemét, Debreczen. II. Ács, Lacus Fertő, Pécs. V. Dobra, Vallis Zsil. VI. Báziás.
30. *nitidulus* Heer. — III. Koritnyicza, ad rivum Béla. IV. M.-Sziget, Felsőfalu. V. N.-Szeben, Kőhalom.

Fam. HETEROCERIDAE.

Heterocerus Fabr.

1. *murinus* Kiesw. — V. Hátszeg. (Bielz, 27, p. 50.)
2. *salinus* Kuw. (*parallelus* Kiesw.) — I. Budapest, Szeged. II. Lacus Fertő. III. Tátrafüred, Putnok. VI. Kelebia.
3. *femoralis* Kryn. — II. Lacus Fertő. (Redtenbacher, 282, p. 450.)
4. *fossor* Kiesw. — I. Budapest. II. Ács. III. Kis-Kálna, Beczkó, Putnok. V. Déva, N.-Sink, Fogaras, Sz.-Régen. VI. Kelebia.
5. *crinitus* Kiesw. — V. Segesvár. VII. Eszék.
6. *marginatus* F. — I. Budapest, Nyiregyháza. II. Lacus Fertő. V. N.-Enyed, Vizakna, Barót.
7. *pruinosus* Kiesw. — I. Budapest. III. K.-Kálna.
8. *hispidulus* Kiesw. — V. Remete, Dobra, Szelindek.
9. *intermedius* Kiesw. — V. Kőhalom. (Legit C. Fuss.)
10. *sericans* Kiesw. — I. Budapest, Kalocsa. III. Verebély, Beczkó, Putnok. IV. Szőllőske. V. N.-Enyed, Segesvár.

11. *obsoletus* Curt. — I. Budapest. V. Vizakna, Mező-Záh.
12. *similis* Kuw. — VII. Teste Auctore. (235, p. 547.)
13. *pulchellus* Kiesw. — VII. Secundum Kuwert. (235, p. 537.)
14. *oblongulus* Kuw. — In regione VII. (Auctor, 235, p. 537.)
15. *fusculus* Kiesw. — I. Budapest. II. Ács, Zircz, Z.-Tapolcza, Pécs. III. Putnok. IV. Czigánd.
16. *laevigatus* Panz. — Frequens.
v. *croaticus* Kuw. — In regione VII. (Auctor, 235, p. 538.)
bicornis Curt. — V. Vizakna. (Bielz, 27, p. 50.)

Fam. STAPHYLINIDAE.

Ocalea Er.

1. *brevicornis* Kr. — In reg. VII. (Cat. Col. Europ, p. 78.)
2. *puncticollis* Rey. — VI. Herkulesfürdő. VII. Gospić.
3. *badia* Er. — I. M.-Káta, Kecskemét, Kalocsa, N.-Várad. II. Boglár, Soóly. IV. S.-A.-Ujhely, Velejte. V. Brassó. VI. Drenkova, Herkulesfürdő.
4. *dubia* Mots. — VI. Herkulesfürdő, Mons Opesata.
5. *puncticeps* Kr. — I. Budapest. II. Pécs. VI. Mehádia. VII. Velebit.
6. *picata*. Steph. — IV. Luhi. V. N.-Szeben. VI. Zlaticza, Herkulesfürdő.
7. *rivularis* Mill. — IV. Bártfa. VI. Drenkova, Herkulesfürdő, Mons Opesata.
8. *angulata* Epp. — VI. Teste Merkl.. VII. Capella. (Reitter, 299, p. 205.)

Ilyobates Kr.

9. *Mech* Baudi. — III. F.-Bocza. IV. Luhi, Mons Hoverla. V. Malomviz.
10. *nigricollis* Payk. — I. Budapest, Kalocsa, Nagy-Várad. II. Pécs. III. Beczkó. IV. S.-A.-Ujhely, M.-Sziget. V. Malomviz, K.-Disznód, Brassó. VI. Mehádia.
11. *Merkli* Epp. — Hungaria mer. (Detexit E. Merkl; Auctor, 76, p. 254.)
12. *forticornis* Lac. — I. Budapest, Kalocsa, Szoboszló. V. Praesbe, K.-Disznód.

Chilopora Kr.

13. *longitarsis* Er. — III. Beczkó. VI. Szekul. VIII. Fiume.
14. *rubicunda* Er. — I. Budapest. II. Csurgó, Zákány. III. Trencsén, ad ripam fluv. Árva, Tátra (Rókuszpatak). IV. Bártfa, M.-Laborcz.

Calodera Mannh.

15. *nigrita* Mannh. — IV. S.-A.-Ujhely, A.-Bereczki, Terebes. V. Tihucza, Borgó.
16. *protensa* Mannh. — IV. Torna. (Legit domina Gizella Raisz.)
17. *uliginosa* Er. — V. Kercz. (Bielz, 27, p. 51.)
18. *aethiops* Grav. — I. Bpest, Kecskemét, Kalocsa. II. Baán. IV. S.-A.-Ujhely, A.-Bereczki. V. Peér.
19. *rubens* Er. — IV. Lelesz, Beregszász.
20. *umbrosa* Er. — I. Budapest, N.-Várad. V. Montes Cibinenses. VII. Eszék.

Phloeopora Er.

21. *reptans* Grav. — II. Pereszlény. IV. A.-Bereczki. V. Porumbák, Brassó, Sz.-Régen. VI. Herkulesfürdő.
22. *angustiformis* Baudi. — I. Remecz, M.-Kovácsháza. VII. Lič.
23. *corticalis* Grav. — Frequens.
24. *latens* Er. — I. Kalocsa. III. T.-Teplicz. IV. S.-A.-Ujhely, Mons Szinnaikő, Papina, K.-Azar, Gesztely, Mád. V. Brassó. VII. Lič.

Phloeodroma Kr.

25. *concolor* Kr. — III. Zsolna. (Brancsik, 40, p 19.)

Ocyusa Kr.

26. *crassa* Epp. — VI. Resicza. (Auctor, 76, p. 303.)
27. *incrassata* Rey. — III. Javorina. IV. Mons Hoverla. V. Borszék.
28. *nigrata* Frm. — VII. Fužine. (Leg. J. Pável.)

Ischnoglossa Kr.

29. *prolixa* Grav. — I. Budapest, IV. Mons Szinnaikő. V, Peér, Præsbe, Montes Czódenses. VI. Mehádia.
30. *corticina* Er. — Frequens.

Stichoglossa Fairm.

31. *semirufa* Er. — I. Budapest, Kalocsa. II. Nagy-Vázsony. IV. Lelesz. V. N.-Szeben.

Platyola Rey.

32. *fuscicornis* Rey. — VI. Herkulesfürdő. (Legit J. Frivaldszky.)

Thiasophila Kr.

33. *angulata* Er. — I. Péczel. III. Zsolna (Montes Szoblahóenses). V. Segesvár. VI. Oravicza, Mehádia.

Oxypoda Mannh.

34. *ruficornis* Gyll. — V. Montes Cibinenses. VI. Mehádia, Rumunyest.
v. *spectabilis* Märk. — I. Parád. V. Montes Cibinenses.
35. *lividipennis* Steph. — Communis.
36. *vittata* Märk. — I. Budapest. II. M.-Peterd. IV. S.-A.-Ujhely, A.-Bereczki. V. Pele, Nagy-Szeben, Montes Cibinenses. VI. Mehádia.
37. *lateralis* Mannh. — IV M.-Laborcz. (Leg. Dr. C. Chyzer.)
38. *opaca* Grav. — Communis.
39. *humidula* Kr. — I. Bpest, Kecskemét, Kalocsa, Szentes, Derékegyháza, Mező-Kovácsháza. III. Vallis Vrátna, Koritnyicza. VII. Gospić.
40. *induta* Rey. — I. Kalocsa. (Leg. F. Speiser, 349, p. 15.)
41. *umbrata* Gyll. — I. Budapest, Z.-Tapolcza, Soóly. III. Montes K.-Kriván et Chocs, Tátrafüred. IV. Bártfa. V. Brassó. VI. Szekul, Mehádia.
42. *sericea* Heer. — I. Kalocsa, Hajós. II. Soóly. V. Teste Seidlitz.
43. *exoleta* Er. — I. Bpest, Kalocsa. III. Vallis Vrátna.
44. *rufula* Rey. — V. N.-Szeben. (Bielz, 27, p. 52.)
45. *exigua* Er. — I, Budapest. III. Tátrafüred.
46. *longiuscula* Grav. — IV. Lelesz. (Leg. Dr. C. Chyzer.)
47. *rufa* Kr. — I. Kecskemét V. N.-Szeben. VII. Teste Reitter.
48. *togata* Er. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa, Hadház. II. Soóly. III. Trencsén, Mons Chocs. V. Montes Kerczenses, Brassó.
49. *abdominalis* Mannh. — I. Budapest, M.-Káta, Kecskemét, Kalocsa. IV. Szinna, Czigánd, Páczin.
50. *bicolor* Rey. — IV. N.-Bocskó. VI. Herkulesfürdő.
51. *praecox* Er. — I. Budapest, M.-Káta. IV. Csap. V. Teste Seidlitz.
52. *testacea* Er. — III. Trencsén. (Leg. Dr. C. Brancsik, 40, p. 18.)
53. *formosa* Kr. — VI. Mehádia. VII. Mrzla-Vodica.
54. *alternans* Grav. — In regionibus montanis communis.
55. *haemorrhoa* Sahlb. — I. Budapest, Kalocsa. II. Soóly. III. Verebély. IV. Bártfa, Czigánd. V. Vallis Lotrióra, N.-Szeben, Brassó. VI. Mehádia.
56. *amoena* Fairm. — IV. Páczin, V. Brassó. VI. Mehádia.
57. *filiformis* Redtb. — I. Budapest, Kecskemét. IV. Czigánd. VII. Eszék.
58. *montana* Kr. — IV. Cserna-Hóra. V. Montes Porumbákenses, Montes Negoi, Korongyos et Ünökő.
59. *annularis* Sahlb. — I. Budapest. III. Mons Kis-Kriván, Tátrafüred. IV. Bártfa. V. Peér, Kis-Disznód, Brassó, Prázsmár. VI. Mehádia. VII. Fužine, Crni-Dabar, Mons Sveto-Brdo.
v. *pallidula* Sahlb. — V. Teste Seidlitz, (345, p. 490.)

Dasyglossa Kr.

60. *prospera* Er. — I. Budapest. IV. S.-A.-Ujhely, A.-Bereczki, Szomotor, Liszsza-Hóra.

Microglossa Kr.

61. *gentilis* Märk. — I. Budapest, Kalocsa, II. Boglár, V. N.-Szeben, Segesvár,
62. *picipennis* Gyll. — II. Boglár. (Leg. J. Pável.)
63. *pulla* Gyll. — I. Budapest. II. Szt.-Márton. IV. S.-A.-Ujhely, A.-Bereczki, Rahó. V. K.-Disznód, Segesvár. VI. Temesvár, Mehádia.
64. *marginalis* Grav. — I. Budapest, Dabas. II. Boglár. IV. S.-A.-Ujhely, A.-Bereczki, Luhi, M.-Sziget.
65. *suturalis* Sahlb. — I. Budapest, N.-Várad. II. Soóly. III. Beszterczebánya. Zsolna. IV. Tokaj, Tolcsva, Czéke, Luhi. V. Pele, Montes Kerczenses. VI. Temesvár, Grebenácz.

Aleochara Grav.

66. *ruficornis* Grav. — I. Parád. II. Kőszeg. III. Vallis Vrátna.
67. *erythroptera* Grav. — I. Budapest, Parád, Kalocsa. IV. Bártfa. V. N.-Csür.
68. *lata* Grav. — I. N.-Várad. (Leg. A. Mocsáry.)
69. *fuscipes* F. — Frequens.
70. *laticornis* Kr. — VI. Herkulesfürdő. (Leg. J. Frivaldszky.)
71. *spissicornis* Er. — I. Budapest, Péczel.
72. *crassicornis* Lac. — In toto regno occurrit.
73. *fumata* Grav. — V. Malomviz. (Leg. J. Pável.)
74. *brevipennis* Grav. — I. Budapest, Kalocsa. II. D.-Örs, Felsőlő. IV. M.-Sziget. VI. Ferenczfalva, Báziás.
75. *puberula* Klug. — I. Kalocsa. III. Trencsén. IV. Homonna, N.-Mihály.
76. *bipunctata* Ol. — Frequens.
77. *morion* Grav. — I. Budapest, Kalocsa, N.-Várad. IV. S.-A.-Ujhely, S.-Patak, Velejte, K.-Helmecz, Mons Hoverla. V. N.-Szeben.
78. *crassiuscula* Sahlb. — I. Budapest, Kalocsa. VI. Mehádia.
79. *Milleri* Kr. — I. Budapest. (Leg. J. Frivaldszky.)
80. *tristis* Grav. — I. Budapest, Kalocsa, N.-Várad. II. D.-Örs, Z.-Tapolcza, Vaiszló. III. Trencsén. IV. Bártfa. V. Hátszeg, Szt.-Erzsébet, Holczmány. VI. Temesvár.
81. *laevigata* Gyll. — Frequens.

82. *cuniculorum* Kr. — Hungaria. (Cat. Col. Europ., 1883, p. 39.)
83. *mycetophaga* Kr. — I. Vallis Száldobágy. II. Pécs. IV. N.-Bocskó. V. Montes Kerczenses. VII. Fužine. VIII. Fiume.
84. *lygaea* Kr. — Hungaria (Cat. Col. Eur., 1891, p. 82.)
85. *lanuginosa* Grav. — I. Feketeerdő. II. Keszthely. III. Zsolna. IV. Bártfa, K.-Azar, Mons Hoverla. V. Brassó, Mons Kereszténythavas. VI. Mehádia.
86. *rufitarsis* Heer. — V. N.-Szeben. VI. Herkulesfürdő.
87. *villosa* Mannh. — I. Budapest, Kalocsa. IV. Bártfa, K.-Azar, N.-Mihály, Vallis Lazescsina. V. N.-Szeben, Brassó.
88. *succicola* Thoms. — I. Budapest. II. Zircz. III. Kékkő. IV. Kassa. S.-A.-Ujhely. V. Brassó. VI. Mehádia.
89. *moesta* Grav. — In toto regno occurrit.
90. *vagepunctata* Kr. — Hungaria. (Cat. Col. Eur., 1891, p. 82.)
91. *inconspicua* Aub. — II. Pécs. V. N.-Szeben.
92. *sanguinea* L. — I. Budapest. IV. S.-A.-Ujhely, Huszt. V. Montes Kerczenses, Segesvár.
93. *haematodes* Kr. — V. Montes Kerczenses. VI. Ferenczfalva.
94. *haemoptera* Kr. — I. Kalocsa. (Leg. F. Speiser, 349, p. 15.)
95. *moerens* Gyll. — III. Barlangliget, Lucsivna. V. Teste Seidlitz. VI. Ferenczfalva.
96. *bilineata* Gyll. — I. Budapest. IV. Szőllőske. V. Nagy-Szeben, Oláhfalu. VI. Ferenczfalva, Mehádia. VII. Risnjak.
97. *nitida* Grav. — Frequens.
98. *verna* Say. — I. N.-Várad. III. Lacus Zöldtó dictus. IV. Bártfa.
99. *spadicea* Er. — V. Montes Kerczenses, Segesvár.

Homoeusa Kr.

100. *acuminata* Märk. — I. Székelyhid. III. Gbellán, Tátrafüred. IV. Mons Szinnaikő, Rahó. V. Montes Retyezát, Kis-Disznód, Brassó. VI. Oravicza, Mons Domoglet. VII. Ljeskovac.

Dinarda Mannh.

101. *Märkeli* Kiesw. — III. Montes Szoblahóenses. IV. Mons Hoverla. V. Segesvár. VI. Resicza.
102. *dentata* Grav. — I. Budapest. V. Kis-Disznód. VI. Ferenczfalva.

Lomechusa Grav.

103. *strumosa* Fbr. — III. Trencsén. V. Præsbe. VI. Ferenczfalva.

Atemeles Steph.

104. *emarginatus* Payk. — III. Zsolna. IV. Bártfa. V. Hátszeg, Kercz. VI. Resicza.
105. *pubicollis* Bris. — II. Pécs. (Leg. J. Pável.)
106. *paradoxus* Grav. — I. Budapest, Péczel, Remecz. II. Pécs, N.-Harsány. IV. Királyháza. V. K.-Disznód, Præsbe.

Zyras Steph.

107. *Haworthi* Steph. — I. Budapest, Péczel, Nagy-Várad. III. Beczkó, Gbellán. V. Montes Retyezát, N.-Csür, Kolozsvár.
108. *fulgida* Grav. — II. N.-Vázsony. V. N.-Szeben, Sz.-Régen.
109. *collaris* Payk. — I. Budapest, Kalocsa. III. Trencsén. IV. Jászó, Torna, Bártfa, N.-Mihály, Sztropkó, Mons Szinnaikő, Királyháza. V. Nagy-Szeben, N.-Csür.

Myrmedonia Er.

110. *humeralis* Grav. — V. Nagy-Szeben, N.-Csür, ad rivum Hortobágy, Hosszufalu. VI. Oravicza, Mehádia.
111. *cognata* Märk. — I. Budapest, Nagy-Várad. II. Belvárd. IV. Tavarna, Szinna, M.-Sziget. V. Tasnád, N.-Csür, Holczmány, M.-Záh.
112. *funesta* Grav. — I. Budapest, Péczel, N.-Várad. II. Pécs, Belovár. III. T.Teplicz. IV. Körtvélyes. V. Vallis Lotrióra, N.-Szeben, Medgyes, Szász-Régen. VI. Herkulesfürdő.
113. *similis* Märk. — I. Budapest, Kalocsa. III. Vallis Vrátna. V. N.-Szeben. VI. Mehádia. VII. Gospić. VIII. Fiume.
114. *limbata* Payk. — I. Budapest, Kalocsa. II. Pécs. III. Trencsén. IV. N.-Mihály. V. N.-Szeben.
115. *lugens* Grav. — I. Kalocsa. III. Beczkó. IV. S.-A.-Ujhely, Csap, Szomotor, Szőllőske. V. N.-Szeben, M.-Záh. VI. Mehádia. VII. Gospić.
116. *ruficollis* Grimm. — I. Szombatság. II. Boglár, Pécs, Belovár. IV. Csap, Szőllőske. VII. Teste Ganglbauer.
117. *laticollis* Märk. — I. Montes Biharenses. V. Segesvár.
118. *Hampei* Kr. — I. Budapest, Debreczen. IV. Páczin, Csap, Beregszász. V. Nagy-Szeben. VII. Teste Hampe.

Drusilla Leach.

119. *canaliculata* F. — Communis.

Myrmoecia Rey.

120. *plicata* Er. — I. Budapest. V. Mihályfalva, Medgyes.

Aleuonota Thoms.

121. *rufotestacea* Kr. — V. Brassó. VI. Herkulesfürdő.

122. *splendens* Kr. — I. Budapest: Farkasvölgy. (Leg. D. Kuthy.).

Callicerus Grav.

123. *rigidicornis* Er. — VI. Temesvár, Oravicza, Mehádia.

124. *Kaufmanni* Epp. — II. Pécs. (Detex. Dr. E. Kaufmann; Auctor, 37, p. 232.)

125. *fulvicornis* Epp. — In reg. VI. (Leg. E. Merkl.)

Alianta Thoms.

126. *incana* Er. — I. Budapest. III. Agárd. IV. Szőllőske, Szatmár.

Nototheca Thoms.

127. *flavipes* Grav. — I. Budapest. IV. Bártfa.

128. *anceps* Er. — III. Trencsén. V. Szarvad, Segesvár.

Alaobia Thoms.

129. *scapularis* Sahlb. — III. Trencsén. V. Montes Kerczenses.

130. *Heydeni* Epp. — VII. Capella. (Reitter, 297, p. 40.)

Thamiaraea Thoms.

131. *hospita* Märk. — I. Isaszegh. II. Zircz. V. N.-Szeben, Montes Kerczenses.

132. *cinnamomea* Grav. — I. Szombatság. II. Zircz. V. N.-Szeben, Brassó, Hosszúfalu. VI. Mehádia.

Colpodota Rey.

133. *sordida* Marsh. — Communis.

134. *melanaria* Mannh. — I. Kecskemét, Kalocsa. IV. Beregszász. V. Brassó. VII. Mrzla-Vodica.

135. *consanguinea* Epp. — IV. M.-Laborcz, Mons Pietrosz. V. Montes Retyezát et Cibinenses, Brassó. VI. Resicza, Mehádia. VII. Buccari.

136. *pygmaea* Grav. — I. Budapest, Kalocsa. III. Kékkő, Trencsén. IV. Czigánd, Páczin, Lelesz. V. Montes Kerczenses, Brassó.

137. *aterrima* Grav. — I. Kecskemét. III. Zöldtó IV. Bártfa, Czigánd. V. Montes Cibinenses, K.-Disznód, Præsbe.

138. *parva* Sahlb. — I. Nyiregyháza, M.-Kovácsháza. IV. Páczin. V. Krizba. VI. Mehádia.

139. *parens* Rey. — VI. Mehádia. VII. Eszék, Karst.

140. *fungi* Grav. — Communis.

v. *clientula* Er. — I. Kalocsa. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely. A.-Bereczki, Szomotor. V. Brassó. VI. Báziás.

141. *orphana* Er. — I. Budapest, Kalocsa. II. Kőszeg. IV. S.-A.-Ujhely, Velejte, N.-Mihály, Lelesz. V. Teste Seidlitz.

142. *pulchra* Kr. — I. Budapest, Kalocsa. II. Pécs. V. N.-Szeben. VI. Báziás. VII. Eszék.

143. *laticollis* Steph. — I. Budapest, M.-Káta, Kalocsa, Szeged, Szentes. IV. S.-A.-Ujhely, Homonna, Varannó, K.-Helmecz, N.-Mihály. VI. Palics, Mehádia. VII. Fužine.

144. *fuscipes* Heer. — I. Kalocsa, Kecskemét, Nagy-Várad. IV. Torna, S.-A.-Ujhely, Varannó, Gesztely, Csap, Beregszász. V. Nagy-Szeben. VI. Ferenczfalva, Báziás, Mehádia.

145. *subsinuata* Er. — IV. Beregszász. (Leg. L. Biró.)

Amischa Thoms.

146. *analis* Grav. — Frequens.

147. *soror* Kr. — I. Bély. V. K.-Disznód, Præsbe.

148. *cavifrons* Sharp. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa. III. Vallis Vrátna. IV. Czigánd. V. Vallis Lotrióra.

149. *talpa* Heer. — III. Trencsén. (Legit Dr. C. Brancsik, 40, p. 18.)

150. *exilis* Er. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa. II. Soóly. III. Beczkó.

151. *indocilis* Heer. — I. Kalocsa. IV. S.-A.-Ujhely.

152. *validiuscula* Kr. — I. Budapest. IV. Mons Vihorlat. V. Brassó. VII. Mons Sveto-Brdo.

Geostiba Thoms.

153. *circellaris* Grav. — Frequens.

154. *spinicollis* Kr. — VII. Teste Hampe. (Auctor, 204, p. 267.)

155. *Chyzeri* Epp. — IV. S.-A.-Ujhely, Czéke. (Detexit Dr. C. Chyzer.)

156. *armata* Epp. — VIII. Fiume. (Leg. L. Biró.)

157. *croatica* Epp. — VII. Velebit, Gospić.

Taxicera Rey.

158. *polita* Rosh. — In reg. VII. (Cat. Col. Europ., 1891, p. 86.)

159. *deplanata* Grav. — I. Budapest. V. Sec. Seidlitz. VIII. Vallis Draga.

Thectura Thoms.

160. *cuspidata* Er. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, N.-Várad. IV. S.-A.-Ujhely. V. Nagy-Szeben, Prázsmár.

Dadobia Thoms.

161. *immersa* Er. — I. Montes Biharenses. IV. Montes Marmarosenses.

Dinaraea Thoms.

162. *arcana* Er. — IV. O.-Ruszka, Mons Hoverla. V. Præsbe, Brassó.
163. *linearis* Grav. — I. Budapest, Kalocsa, Nagy-Várad. IV. S.-A.-Ujhely, Sáros-Patak, Mons Szinnaikő. V. K.-Disznód, Præsbe, Brassó, Hosszufalu. VI. Herkulesfürdő.
164. *angustula* Gyll. — I. Budapest, N.-Várad. III. Vallis Vrátna. IV. Homonna, Vallis Fajna. V. Prázsmár, Gy.-Tölgyes.
165. *aequata* Er. — Frequens.
166. *nigella* Er — I. Kalocsa, N.-Várad. VI. Mehádia.

Liogluta Thoms.

167. *brunnea* F. — I. Budapest. III. Trencsén, Putnok. IV. Kassa. V. Brassó, Sz.-Régen, M.-Záh.
168. *melanocephala* Heer. — I. Budapest. III. Pereszlény, Trencsén, Putnok. IV. Varannó, Páczin. VII. Fužine.
169. *montivagans* Epp. — In montibus Carpathicis. (Auctor, 79, p. 292.)
170. *hypnorum* Kiesw. — I. N.-Várad. V. Zilah, Segesvár.
171. *vicina* Steph. — I. Budapest. II. Pécs. IV. Kassa. V. N.-Szeben, Brassó. VI. Resicza. VII. Fužine,
172. *micans* Rey. — III. Tátrafüred. V. Kolozsvár. VII. Crni-Dabar.
173. *granigera* Kiesw. — Frequens.
v. *subalpina* Rey. — I. Montes Biharenses. V. Malomviz.
174. *sexnotata* Thoms. — III. Koritnyicza, Tátrafüred. IV. Mons Hoverla.
175. *pagana* Er. — III. Koritnyicza. V. Segesvár. VI. Mehádia.
176. *oblonga* Er. — III. Trencsén. V. Montes Cibinenses.
177. *alpestris* Heer. — I. Montes Biharenses (sec. J. Frivaldszky).
178. *nitidula* Kr. — I. Budapest, Parád, Kecskemét, Nagy-Várad. II. Boglár. III. Zsolna. IV. Mons Szinnaikő, Nagy-Bocskó, Mons Hoverla. V. Brassó.
179. *graminicola* Grav. — VI. Ferenczfalva, Herkulesfürdő.

Atheta Thoms.

180. *aquatica* Thoms. — V. N.-Szeben, Brassó.
181. *Pertyi* Heer. — III. Trencsén. IV. Mons Vihorlat. V. Brassó, Hosszúfalu. VI. Mehádia.
182. *castanoptera* Mannh. — Frequens.
183. *euryptera* Steph. — I. Budapest, N.-Várad. II. Pécs. IV. Kassa, S.-A.-Ujhely. VI. Mehádia.
184. *trinotata* Kr. — Communis.
185. *xanthopus* Thoms. — IV. Kassa, Gesztely. VI. Mehádia.
186. *pilicornis* Thoms. — III. Tátrafüred. IV. Bártfa, Mons Vihorlat, Mező-Laborcz. VI. Stájerlak, Oravicza, Mehádia.
187. *crassicornis* F. — In toto regno occurrit.
188. *nitidicollis* Fairm. — I. Tiszafüred. II. Kőszeg. III. Tátrafüred. IV. Bártfa. VI. Herkulesfürdő.
189. *spelaea* Er. — II. Abaliget. VII. Antrum Pazariste, Vagan, Mons Sveto-Brdo.
190. *boletophila* Thoms. — IV. Bártfa, Gesztely, Rahó. VI. Mehádia.
191. *liturata* Steph. — I. Kalocsa. IV. Bártfa, Mons Vihorlat, M.-Laborcz, Mons Hoverla. V. Mons Bucsecs. VI. Mehádia. VII. Mrzla-Vodica.
192. *nigritula* Grav. — Frequens.
193. *pallidicornis* Thoms. — Ut prior.
194. *sodalis* Er. — Communis.
195. *clancula* Er. — IV. M.-Laborcz, Vallis Fajna.
196. *rudiventris* Epp. — IV. S.-A.-Ujhely. (Detex. Dr. C. Chyzer.)
197. *myrmecobia* Kr. — I. Montes Biharenses III. Tátra. (Lersch villa.)
198. *capitulata* Epp. — In regione VI. (Detexit E. Merkl; Reitter, 299, p. 208.)
199. *gagatina* Baudi. — I. N.-Várad. II. Kőszeg. III. Vallis Vrátna. IV. Bártfa, Olyka, M.-Sziget, Vámfalu. V. Montes Retyezát, Nagy-Szeben, Brassó, Tömös. VI. Mehádia. VII. Gospić.
200. *coriaria* Kr. — I. Szeged. VIII. Vallis Draga.
201. *oblita* Er. — I. N.-Várad. IV. Bártfa, Beregszász, Vámfalu.
202. *autumnalis* Er. — IV. Mons Szinnaikő. (Leg. Dr. C. Chyzer.)
203. *basicornis* Rey. — I. Montes Biharenses. IV. S.-A.-Ujhely, Bereczki.
204. *clavigera* Scriba (*clavicornis* Epp.) — V. Montes Kerczenses, Brassó.
205. *palleola* Er. — V. Montes Retyezát. VI. Oravicza. VII. Gospić.
206. *debilis* Er. — I. Kalocsa. IV. Tokaj.
207. *fallaciosa* Sharp. — V. Mons Kereszténhavas, Brassó.
208. *vilis* Er. — IV. Csap. V. K.-Disznód, Præsbe.
209. *gemina* Er. — I. Montes Biharenses. (Leg. Dr. A. Fleischer; Frivaldszky, 118, p. 508.)
210. *tibialis* Heer. — III. K.-Kriván, Zöldtó. IV. Cserna-Hóra, Montes Lungacsásza et Pop-Iván. V. K.-Disznód, Præsbe, Brassó.
211. *alpicola* Mill. (*carpathica* Mill.) — III. Zöldtó IV. Cserna-Hóra, Mons Pop-Iván. V. Montes Kerczenses.

212. *glacialis* Mill. — III. Montes Babia-Gura. (Kiesenwetter, 196, p. 307.)
213. *Brisouti* Gemm. — IV. Cserna-Hóra. (Leg. J. Frivaldszky.)
214. *sequanica* Bris. — I. Szeged. (Leg. Dr. G. Horváth.)
215. *elongatula* Grav. — Frequens.
216. *melanocera* Thoms. — I. Kalocsa. IV. Páczin, Lelesz. V. N.-Szeben.
217. *hygrotopora* Kr. — III. Tátrafüred. IV. Bártfa. V. Montes Retyezát, Brassó. VI. Mehádia.
218. *terminalis* Grav. — III. Pereszlény. IV. Lelesz, Beregszász, K.-Majtény.
219. *luridipennis* Mannh. — I. Budapest. IV. Marmarossziget. VI. Vallis Cserna, Korniaréva.
220. *contristata* Kr. — VI. Ferenczfalva. (Leg. J. Frivaldszky.)
221. *cadaverina* Bris. — IV. Bártfa. V. Montes Retyezát. VI. Mehádia. VII. Crni-Dabar.
222. *cinnamoptera* Thoms. — I. Montes Biharenses. (Leg. Dr. A. Fleischer; Frivaldszky, 118, p. 508.)
223. *putrida* Kr. — III. Tátrafüred. IV. N.-Bocskó. VI. Resicza, Mehádia.
224. *livida* Rey. — III. Tátrafüred. IV. Vallis Fajna.
225. *picipennis* Mannh. — I. Budapest, N.-Várad. II. Soóly. III. Trencsén, Tátrafüred. IV. Marmarossziget. V. Brassó. VI. Resicza.
226. *nigripes* Thoms. (*villosula* Kr.) — Hungaria. (Cat. Col. Eur., 1891, p. 89.)
227. *laevana* Rey. — III. Zöldtó. IV. Bártfa, Runyina. V. Montes Retyezát.
v. *setigera* Sharp. — I. Kecskemét. III. Zöldtó.
228. *procera* Kr. — V. Segesvár. (Leg. Dr. C. Petri, 269, p. 10.)
229. *marcida* Er. — II. Kőszeg. (Leg. J. Pável.)
230. *intermedia* Thoms. — I. Parád. III. Tátrafüred.
231. *longicornis* Grav. — Communis.
232. *macrocera* Thoms. — I. Kecskemét. (Leg. L. Biró.)
233. *parvula* Mannh. — I. Budapest, Kalocsa, Nagy-Várad. IV. Sátoralja-Ujhely, Czéke. V. Montes Rozsnyóenses.
234. *nigricornis* Thoms. — V. N.-Szeben. (Leg. A. Ormay, 266, p. 12.)
235. *divisa* Märk. — I. Budapest, N.-Várad, Montes Biharenses.
236. *excavata* Gyll. — V. K.-Disznód, Præsbe.
237. *picipes* Thoms. — III. Trencsén, Tátrafüred. IV. S.-A.-Ujhely. V. Mons Szurul, Brassó. VII. Mrzla-Vodica.
238. *excellens* Kr. — V. Segesvár. (Leg. Dr. C. Petri, 269, p. 10.)
239. *monticola* Thoms. — III. Hermánd, Tátrafüred. IV. Bártfa, Cserna-Hóra. VI. Mehádia.
240. *fungivora* Thoms. — IV. S.-A.-Ujhely. (Leg. Dr. C. Chyzer.)
241. *occulta* Er. — I. Budapest, Kalocsa. III. Koritnyicza. IV. S.-A.-Ujhely, Gesztely, Páczin, Vallis Fajna, Mons Balzatul. V. Ó-Brassó. VI. Orsova, Mehádia, Korniaréva.
242. *palustris* Kiesw. — II. Boglár. IV. Bártfa, Czéke, V. Pele, Vallis Lotrióra, Præsbe.
243. *ravilla* Er. — II. Pécs. IV. Bártfa, Gesztely. V. N.-Szeben, Brassó. VI. Mehádia.
244. *corvina* Thoms. — III. Zöldtó. IV. Mons Vihorlat. V. Teste Seidlitz.
245. *spatula* Fauv. — In montibus Carpathicis (Eppelsheim, 74, p. 393.)
246. *excisa* Epp. — VII. Teste Auctore. (76, p. 302.)
247. *perexigua* Sharp. — Hungaria. (Cat. Col. Eur., 1891, p. 89.)
248. *sordidula* Er. — I. Budapest. IV. Homonna. V. Montes Cibinenses, Brassó. VII. Mrzla-Vodica.
249. *celata* Er. — I. Budapest. V. Brassó. VI. Vallis Cserna, Korniaréva. VII. Mrzla-Vodica.
250. *zosterae* Thoms. — I. N.-Várad. II. Soóly. IV. Bártfa, Sztropkó, Varannó, Páczin. V. Brassó. VII. Mons Sveto-Brdo.
251. *indubia* Sharp. — V. N.-Csür. VI. Báziás.
252. *subtilis* Scriba. — III. Barlangliget. VII. Mrzla-Vodica.
253. *amicula* Steph. — Frequens.
254. *inquinula* Er. — I. Budapest, Ér-Mihályfalva.
255. *aegra* Heer. — I. Hagymádfalva, Remecz.
256. *gracilicornis* Er. — Hungaria. (Cat. Col. Eur., 1891, p. 90.)
257. *longula* Heer. — I. Hagymádfalva Remecz.
258. *delicatula* Sharp. — IV. Sátoralja-Ujhely, Szomotor, Királyháza.

Aloconota Thoms.

259. *languida* Er. — I. Budapest. III. Vallis Vrátna. IV. Czigánd.
260. *insecta* Thoms. — I. Budapest, Kalocsa. III. Trencsén, Tátrafüred. IV. Bártfa. VI. Mehádia.
261. *sulcifrons* Steph. — I. Budapest, Nagy-Várad. III. Trencsén, Tátrafüred. V. Brassó. VI. Resicza, Mehádia.
262. *aegyptiaca* Motsch. — I. Budapest. III. Trencsén.
263. *debilicornis* Er. — IV. N.-Mihály. (Legit Dr. C. Chyzer.)
264. *cambrica* Woll. — III. Trencsén, Javorina. IV. N.-Bánya.
265. *currax* Kr. — III. Javorina. IV. Nagy-Bocskó, N.-Bánya. V. Mons Sánta, Montes Cibinenses. VI. Mehádia.

266. *gregaria* Er. — I. Budapest, Kalocsa, Debreczen, Nagy-Várad. III. Videfalva, Tátrafüred. IV. S.-A.-Ujhely, Bély, Terebes. V. Nagy-Szeben. Brassó. VII. Mons Sveto-Brdo.

Schistoglossa Kr.

267. *viduata* Er. — I. Kalocsa. IV. Lelesz.

Dilacra Thoms.

268. *luteipes* Er. — I. Budapest, M.-Káta, Kalocsa. II. Boglár. V. K.-Disznód, Præsbe. VIII. Fiume.

269. *fallax* Kr. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa.

Gnypeta Thoms.

270. *carbonaria* Mannh. — I. Kalocsa. II. Mohács. III. Trencsén, Poprád. IV. Mons Rabaszkala. V. Szt-Erzsébet.

271. *ripicola* Kiesw. — I. Budapest, Debreczen. IV. K.-Azar, Varannó. V. Segesvár.

Thinonoma Thoms.

272. *atra* Grav. — I. Budapest. II. Z.-Tapolcza. III. K.-Kálna. VII. Eszék.

273. *concolor* Er. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa. II. Lacus Fertő. IV. Beregszász. VI. Palics.

Ischnopoda Thoms.

274. *umbratica* Er. — I. Budapest, Nagy-Várad. II. Pécs. III. Trencsén. IV. Kassa, M.-Sziget. V. Pele, N.-Csür. VI. Grebenácz, Orsova. VIII. Fiume.

275. *exarata* Er. — III. Beczkó. IV. Felsőfalu. VI. Herkulesfürdő.

Tachyusa Er.

276. *balteata* Er. — II. Lacus Fertő. V. Hátszeg. VI. Grebenácz, Krassova.

277. *constricta* Er. — I. Budapest. III. Trencsén. V. Pele, N.-Szeben. VII. Eszék.

278. *linearis* Heer. — In regione VII. (Cat. Col. Eur., 1891, p. 91).

279. *cyanea* Kr. — IV. Varannó. VI. Grebenácz.

280. *concinna* Heer. — I. Kalocsa. IV. Szatmár. VII. Ostrvica.

281. *coarctata* Er. — I. Budapest, Kalocsa, Nyiregyháza. II. Z.-Tapolcza. III. Trencsén. IV. N.-Bocskó. V. Hátszeg, N.-Szeben, Montes Kerczenses. VI. Grebenácz, Báziás. VII. Eszék.

282. *objecta* Rey. — I. Budapest, Kalocsa. II. Zákány. VI. Grebenácz, Báziás.

283. *scitula* Er. — III. K.-Kálna. VI. Grebenácz, Orsova, Herkulesfürdő.

Borboropora Kr.

284. *Kraatzi* Fuss. — VI. Mehádia (secundum J. Frivaldszky).

285. *Reitteri* Weise. — V. Montes Kerczenses. (Reiter, 293, p. 9.)

Falagria Steph.

286. *thoracica* Curt. — I. Feketeerdő. III. Sztrecsnó. IV. Mons Menczul. V. Vallis Zsil, N.-Szeben, N.-Csür, Brassó, Montes ad fluvium Maros. VI. Báziás, Herkulesfürdő. VII. Gospić.

287. *sulcata* Payk. — Frequens.

288. *splendens* Kr. — Hungaria (Cat. Col. Eur., 1891, p. 91.)

289. *sulcatula* Grav. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa, Hadház, N.-Várad. IV. Czigánd, Bélatanya, N.-Bocskó.

290. *nigra* Grav. — Communis.
laevigata Epp. (*laeviuscula* Epp.) — In reg. VII. (Cat. Col. Eur., 1891, p. 91.) *

291. *obscura* Grav — Communis.

Autalia Steph.

292. *impressa* Ol. — I. Budapest, Kalocsa, Feketeerdő. II. Pécs. III. Tátrafüred. IV. Montes Szinnaikő, et Menczul. V. Kolozsvár, N.-Szeben. VI. Herkulesfürdő. VII. Eszék.

293. *rivularis* Grav. — IV. Rahó. V. Ad rivum Hortobágy, N.-Csür, Brassó, Montes ad fluv. Maros. VIII. Fiume.

Bolitochara Mannh.

294. *Reyi* Sharp (*eximia* Epp.) — II. Zákány. VI. Resicza, Mehádia.

295. *lucida* Grav. — I. Vaskóh. III. Vallis Vrátna. IV. Olyka, Mons Hoverla. V. Hátszeg, Montes Kerczenses. Brassó. VII. Vrdnik.

296. *Mulsanti* Sharp. — IV. Beszkid. V. Borszék.

297. *lunulata* Payk. — II. Zircz. III. Vallis Vrátna, Koritnyicza, Lucsivna. IV. Erdőbénye, Szinna, N.-Bocskó. V. Vallis Lotrióra, Montes Kerczenses, Brassó, Tömös.

298. *bella* Märk. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Makó. II. Kőszeg. III. Kékkő, Vallis Vrátna. IV. Olyka. V. N.-Szeben, Brassó. VI. Mehádia. VII. Eszék.

299. *obliqua* Er. — I. Budapest, Nagy-Várad. III. Vallis Vrátna. IV. Bártfa, Mons Szinnaikő, Szinna. V. Montes Retyezát, K.-Disznód, Præsbe, Montes Kerczenses, N.-Csür, Brassó, Sz.-Régen. VI. Stájerlak, Mehádia. VII. Diakovár.

* Teste Auctore Dalmatiam et non Hungariam inhabitat (Reitter, 299, p. 204).

300. *brevicollis* Kr. — III. Vallis Vrátna. (Legit Dr. C. Brancsik, 40, p. 17.)

Stenusa Kr.

301. *rubra* Er. — I. Budapest, N.-Várad. II. Ács, N.-Vázsony. III. Vallis Vrátna. IV. M.-Sziget. VI. Temesvár. VII. Crni-Dabar, Mrzla-Vodica.

Silusa Er.

302. *rubiginosa* Er. — I. Budapest, Kalocsa. III. Kis-Kálna. IV. Homonna, S.-A.-Ujhely. V. N.-Szeben, Mező-Záh.

Euryusa Er.

303. *sinuata* Er. — I. Budapest, Péczel, Isaszeg, Remecz. V. N.-Szeben, K.-Disznód, Brassó.

304. *brachelytra* Kiesw. — I. Remecz. IV. M.-Sziget. V. Ad balneum Gyógy, Vallis Lotrióra, Nagy-Szeben, Montes Kerczenses, Brassó: Mons Czenk, Montes Rozsnyóenses. VI. Mehádia. VII. Capella, Ljeskovac.

305. *laticollis* Heer. — IV. Homonna. VI. Mehádia. VII. Pakrac.

306. *castanoptera* Kr. — I. Parád. III. Mons K.-Kriván, Koritnyicza. IV. Rahó. VII. Ljeskovac.

Leptusa Kr.

307. *gracilis* Er. — I. Parád. III. Putnok.

308. *angusta* Aub. — Frequens.

309. *haemorrhoidalis* Heer. — III. Vallis Vrátna, Tátrafüred, Királyhegy. IV. M.-Laborcz, Rahó, Mons Hoverla. V. Montes Kerczenses, Brassó. VI. Mehádia. VII. Vagan, Mons Sveto-Brdo. VIII. Fiume.

310. *ruficollis* Er. — II. Zircz, Boglár, Szt-Márton. IV. M.-Laborcz. VII. Capella.

311. *fuliginosa* Aub. — I. Remecz. (Legit Dr. A. Fleischer.)

312. *eximia* Kr. — I. Rézbánya. IV. Mons Hoverla. V. Ad balneum Gyógy, N.-Szeben, Mons Sánta, Præsbe, Brassó, Radna. VI. Ferenczfalva, Mehádia.

313. *Reitteri* Epp. — VII. Capella, Crni-Dabar, Mons Sveto-Brdo.

314. *alpicola* Brancs. — III. Mons K.-Kriván, Vallis Vrátna, Mons Chocs, Tátrafüred, Javorina. IV. Montes Hoverla, et Pop-Iván. V. Montes Kerczenses, et Porumbákenses, Mons Korongyos.

315. *Bodemeyeri* Epp. — V. Mons Sánta. VI. Szekul, N.-Bogsán (Lokája).

316. *carpathica* Weise. — I. Remecz, Mons Oncsásza. IV. Visk, Montes Hoverla et Pop-Iván. V. Montes Retyezát et Cibinenses, Præsbe, Brassó, Mons Korongyos. VI. Mons Szemenik.

317. *globulicollis* Rey. — I. Budapest. (Legit J. Frivaldszky.)

318. *puellaris* Hampe. — VII. Zágráb. (Auctor, 152, p. 285.)

319. *piceata* Rey. — III. Koritnyicza. IV. Mező-Laborcz, Mons Pietrosz, Cserna-Hóra. VII. Capella, Crni-Dabar, Mons Sveto Brdo.

320. *flavicornis* Brancs. — III. Mons K.-Kriván, Beczkó, Barlangliget. IV. Mons Hoverla.

321. *koronensis* Ganglb. — V. Mons Korongyos. (Auctor, 399, p. 171.)

322. *infirma* Weise. — Cserna-Hóra. V. Præsbe, Mons Negoi.

323. *arida* Epp. — V. Brassó. (Bielz, 27, p. 51.)

324. *cuneiformis* Kr. — II. Kőszeg. III. Mons K.-Kriván, Vallis Vrátna, Tátrafüred, Királyhegy.

Homalota Mannh.

325. *plana* Gyll. — I. Budapest, Kalocsa. III. Kis-Kálna. V. Segesvár.

Placusa Er.

326. *complanata* Er. — IV. Bártfa. (Legit A. Mihalovics.)

327. *humilis* Er. — IV. Mons Vihorlat. V. Brassó.

328. *pumilio* Grav. — V. F.-Komána. VI. Mehádia. VII. Vrdnik.

329. *atrata* Mannh. — V. N.-Szeben. (Legit A. Ormay, 264, p. 19.)

330. *infima* Er. — V. N.-Szeben, Mons Sánta. (Collegit A. Ormay, 264, p. 19.)

331. *adscita* Er. — V. N.-Szeben. VIII. Fiume.

Cyphea Fauv.

332. *curtula* Er. — V. Montes Kerczenses. (Bielz. 27, p. 52.)

Encephalus Westw.

333. *complicans* Westw. — V. N-Szeben. (Legit A. Ormay, 264, p. 19.)

Gyrophaena Mannh.

334. *pulchella* Heer. — I. Budapest. III. Hermánd. V. Oláhfalu.

335. *affinis* Sahlb. — Frequens.

336. *nitidula* Gyll. — I. N.-Várad. IV. Mons Vihorlat. V. Præsbe, Bodza. VI. Mehádia, Mons Opesata.

337. *nana* Payk. — In regionibus montanis occurrit.

338. *gentilis* Er. — I. Kalocsa, N.-Várad. II. Zircz. III. Koritnyicza, Putnok. IV. Mons Hoverla. V. Fenyőfalva, Montes Kerczenses, Fogaras, Brassó, Sz.-Régen. VI. Mehádia.

339. *fasciata* Marsh. — Communis.

340. *bihamata* Thoms. — III. Gbellán. IV. Sátoralja-Ujhely, A.-Bereczki.
341. *laevipennis* Kr. — In toto regno frequens.
342. *lucidula* Er. — I. Kalocsa, Nagy-Várad. IV. S.-A.-Ujhely, Mons Hoverla. V. Nagy-Szeben, Præsbe.
343. *Poweri* Crotch. — I. Vaskóh. IV. M.-Laborcz.
344. *minima* Er. — I. N.-Várad. III. Gbellán, Tátrafüred. IV. Montes Vihorlat et Rabaszkala. VI. Mehádia. VII. Mrzla-Vodica.
345. *manca* Er. — I. Kalocsa. II. Pécs. III. Koritnyicza. IV. Montes Vihorlat, Rabaszkala et Hoverla. V. Borszék, Bodza. VI. Mehádia.
346. *polita* Grav. — I. Kalocsa, Nagy-Várad. IV. M.-Sziget. V. Montes Retyezát et Kerczenses, Fogaras, Bodza.
v. *strictula* Er. — III. Putnok. IV. Visk, Nagy-Bocskó. V. Nagy-Szeben, Montes Kerczenses, Brassó, Hosszufalu. VI. Mehádia.
347. *boleti* L. — IV. Bártfa, Mons Hoverla. V. Montes Kerczenses, Mons Nagykőhavas. VI. Oravicza. VII. Risnjak.
348. *laevicollis* Kr. — I. Tőtös. VI. Szekul.

Brachida Rey.

349. *exigua* Heer. — I. Budapest, Kalocsa, Nagy-Várad. IV. Homonna. V. Montes Retyezát, N.-Szeben.

Hygronoma Er.

350. *dimidiata* Grav. — I. Budapest, Kalocsa. III. Agárd. IV. Bacska, Czigánd, Királyháza. V. Dobra, ad ripam fluvii Olt.

Pronomaea Er.

351. *rostrata* Er. — I. Budapest, Kalocsa, N.-Várad. II. Baán. III. Trencsén. IV. Varannó. V. Nagy-Szeben. VIII. Fiume.

Myllaena Er.

352. *dubia* Grav. — IV, Lelesz. (Leg. Dr. C. Chyzer.)
353. *intermedia* Er. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa, N.-Várad. IV. A.-Bereczki, Páczin, Czigánd, Beregszász, K.-Majtény, Rahó. V. Sec. Seidlitz.
354. *brevicornis* Matth. — IV. Bártfa, Luhi. V. Kis-Disznód, Præsbe.
355. *minuta* Grav. — I. Budapest, Kalocsa. IV. Páczin, Lelesz, Czigánd, Bacska, Beregszász. V. Montes Cibinenses, Sz.-Régen, M.-Záh.
356. *infuscata* Kr. — V. Brassó. (Bielz, 27, p. 52.)

Gymnusa Grav.

357. *brevicollis* Pk. — I. Szabolcs. IV. Beregszász.

Dinopsis Matth.

358. *erosa* Steph. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa. II D.-Örs. IV. Lelesz, Czigánd, Beregszász. V. Montes Cibinenses, Brassó.

Oligota Mannh.

359. *pusillima* Grav. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa. II. Soóly. III. Trencsén. IV. Tolcsva. V. Tasnád, N.-Szeben.
360. *atomaria* Er. — I. Feketeerdő. II. Kapuvár.
361. *inflata* Mannh. — I. Budapest, Kalocsa. II. Soóly. III. Montes Szoblahóenses, Putnok. IV. K.-Helmecz. VI. Mehádia.
362. *rufipennis* Kr. — I. Budapest. (Legit J. Frivaldszky.)
363. *granaria* Er. — III. Trencsén. VI. Mehádia.
364. *apicata* Er. — I. Budapest, Kalocsa, Szeged, N.-Várad. II. Kapuvár. IV. S.-Patak. Mons Hoverla. V. Præsbe. VI. Mehádia.

Trichophya Mannh.

365. *pilicornis* Gyll. — IV. S.-A.-Ujhely, Luhi.

Habrocerus Er.

366. *capillaricornis* Grav. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa. III. Trencsén. IV. Homonna, K.-Azar. V. Törcsvár, N.-Csür, Brassó, Segesvár, Szász-Régen. VI. Resicza, Mehádia. VII. Diakovár. Svica, Ljeskovac.

Leucoparyphus Kr.

367. *silphoides* L. — I. Budapest, Kalocsa. II. D.-Örs, Pécs. III. Trencsén, Tátrafüred, Putnok. IV. Ránk, Bártfa, S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Királyháza. V. Hátszeg, N.-Csür, Sz.-Ujfalu, Kis-Disznód, N.-Sink, Sz.-Régen. VI. Diakovár.

Coproporus Kr.

368. *colchicus* Kr. — I. N.-Várad. VI. Resicza. Uj-Moldova, Mehádia. VII. Ljeskovac.

Tachinus Grav.

369. *flavipes* F. — I. Budapest, Kalocsa. II. Kőszeg. IV. Kassa, Bártfa. V. Montes Cibinenses, Mons Keresztényhavas, Brassó, Segesvár, Oláhfalu, Sz.-Régen.
370. *proximus* Kr. — III. Tátrafüred. IV. Rahó, Mons Lungacsásza.
371. *humeralis* Grav. — I. Budapest, Kecskemét. III. K.-Kálna, Beszterczebánya, Hermánd, Trencsén, Zöldtó, Putnok. IV. Montes Szinnaikő et Turkul. V. Montes Cibinenses, Brassó.

372. *rufipennis* Gyll. — III. Mons K.-Kriván. V. Montes Cibinenses.
373. *marginatus* Gyll. — IV. Bártfa. (Legit A. Mihalovics.)
374. *pallipes* Grav. — I. Feketeerdő. III. Beszterczebánya, N.-Lipcse, Tátrafüred. IV. M.-Laborcz, Rahó. V. Vallis Zsil, Fogaras, Szász-Bégen. VI. Mehádia.
375. *scapularis* Steph. — I. Kalocsa. IV. Sátoralja-Ujhely, Gesztely.
376. *bipustulatus* F. — II. Zircz, Tátrafüred. IV. Rahó. V. N.-Szeben, Sz.-Ujfalu.
377. *rufipes* Deg. — I. Budapest. II. Sopron. III. Turcsek, Trencsén, Tátrafüred. IV. Varannó. V. K.-Disznód, Montes Kerczenses, Hosszufalu, Prázsmár, Sz.-Régen. VII. Capella.
378. *laticollis* Grav. — I. Kalocsa. II. Sopron. III. Trencsén, Turcsek, Zöldtó. IV. Bártfa, Mons Turkul, M.-Laborcz. V. Brassó. VI. Mehádia.
379. *marginellus* F. — I. Mons Pilis, Kalocsa, Nagy-Várad. II. Sopron. III. Trencsén. V. N.-Szeben, K.-Disznód, Segesvár, Sz.-Régen.
380. *collaris* Grav. — Frequens.
381. *subterraneus* L. — Ut prior.
v. *ruficollis* Epp. — Solum Hungariam colit (Eppelsheim 78, p. 172.)
382. *fimetarius* Grav. — Communis.
383. *Bonvouloiri* Pand. — Hungaria. (Cat Col. Eur., 1891, p. 96.)
384. *discoideus* Er. — I. Kalocsa, Szeged.
385. *elongatus* Gyll. — III. Mons K.-Kriván, Tátrafüred. V. Montes Cibinenses, Mons Ünökő. VI. Mons Szemenik.

Tachyporus Grav.

386. *obtusus* L. — I. Budapest, N.-Várad, Feketeerdő. III. K.-Kálna, Tavarnok, Trencsén Szliács, Tátra-Füred. IV. S.-A.-Ujhely, Homonna, Körtvélyes, N.-Mihály, N.-Bocskó. V. Hátszeg, K.-Disznód, N.-Csür, Montes Kerczenses, Brassó, Hosszufalu, Segesvár, M.-Záh. VI. Mehádia. VII. Zágráb.
387. *formosus* Matth. — I. Budapest, Kalocsa, N.-Várad. II. D.-Örs. IV. S.-A.-Ujhely, Terebes, N.-Mihály. V. T.-Szántó, Zilah, Deés, N.-Szeben, Segesvár. VI. Resicza. VII. Diakovár.
388. *abdominalis* F. — I. Budapest, Kalocsa. III. K.-Kálna. IV. Szomotor, M.-Sziget. V.-Hátszeg, N.-Csür, Segesvár, Sz.-Régen. VI. Mehádia. VII. Eszék.
389. *solutus* Er. — I. Budapest, Kalocsa, III. Trencsén, Tátrafüred. IV. Homonna, N.-Bocskó. V. Hátszeg, N.-Szeben, N.-Sink, Előpatak, Szász-Régen. VI. Mehádia.
390. *chrysomelinus* L. — Frequens.
391. *hypnorum* F. — Communis.
v. *armeniacus* Kol. — I. Kalocsa. (Legit F. Speizer, 349, p. 17.)
392. *atriceps* Steph. — I. Budapest, Kalocsa, Kóly, N.-Várad. II. Boglár, Pécs. III. Kékkő, Trencsén, Tátrafüred. IV. Homonna, Cserna-Hóra. V. Montes Kerczenses, Sz.-Régen. VI. Mehádia, Rumunyest. VIII. Fiume.
393. *macropterus* Steph. — Frequens.
394. *pusillus* Grav. — Ut Prior.
395. *transversalis* Grav. — II. Felsőlő. V. Fenyőfalva.
396. *nitidulus* F. — Communis.
397. *ruficollis* Grav. — I. Kalocsa, Miskolcz, III. Mons K.-Kriván, Trencsén, Mons Chocs, Tátrafüred. IV. S.-Patak, M.-Sziget. V. Vallis Zsil, N.-Szeben, Fogaras, Kőhalom, Sz.-Régen.
v. *posticus* Foerst. — IV. Erdőbénye. VII. Diakovár.
398. *tersus* Er. — V. Segesvár. (Bielz, 27, p. 53.)
399. *saginatus* Grav. — V. Brassó: Mons Czenk, Kőhalom.
400. *erythropterus* Pz. — V. Segesvár. (Leg. Dr. C. Petri, 269, p. 10.)

Conurus Steph.

401. *littoreus* L. — I. Kalocsa. III. Beszterczebánya. IV. Mons Menczul. V. N.-Szeben, Hosszufalu, Sz.-Régen. VI. Resicza.
402. *pubescens* Payk. — Communis.
403. *immaculatus* Steph. — I. Budapest, Kalocsa. III. Trencsén. IV. N.-Mihály, Mons Hoverla. V. Montes Cibinenses, Brassó, Sz.-Régen. VI. Mehádia.
404. *pedicularius* Grav. — I. Budapest, Kalocsa, N.-Várad. III. Kékkő, Trencsén. IV. Sátoralja-Ujhely, Szerencs, Szomotor. V. N.-Csür, Kőhalom, Segesvár, Sz.-Régen. VI. Grebenácz.
405. *bipustulatus* Grav. — I. Kóly. IV. Szinna. V. Vallis Lotrióra, Montes Kerczenses, N.-Talmács, F.-Sebes. VI. Mehádia.
406. *binotatus* Grav. — IV. S.-A.-Ujhely, Zboj, Mons Rabaszkala. VI. Mehádia.
407. *bipunctatus* Grav. — I. Budapest, Péczel. III. Trencsén. IV. Mons Vihorlat. VI. Mehádia.

Bolitobius Steph.

408. *lunulatus* L. — In regionibus montanis communis.
409. *speciosus* Er. — I. Remecz. II. Zircz, Boglár. IV. Montes Vihorlat et Hoverla. V. Montes Cibinenses, N.-Sink, Medgyes, Sz.-Régen. VII. Svica.

410. *pulchellus* Mannh. — I. Budapest, Kalocsa, Miskolcz. IV. A.-Bereczki. V. N.-Szeben.

411. *bicolor* Grav. — III. Vallis Vrátna. IV. Mons Vihorlat.

412. *trimaculatus* Pk. — I. Hagymádfalva. II. Zircz. III. K.-Kálna, Trencsén. V. Hátszeg, Dus, Montes Kerczenses, Brassó. VI. Ferenczfalva, Mehádia. VII. Vrdnik.

v. *flavicollis* Hochh. — V. Sec. Bielz. VI. Mehádia.

413. *trinotatus* Er. — I. Kalocsa. III. Trencsén, Tátrafüred. IV. Mons Vihorlat, Szinna, O.-Ruszka, Vinna. V. Hátszeg, Montes Cibinenses, Fogaras, Brassó, Segesvár, Oláhfalu. VI. Mehádia.

414. *exoletus* Er. — I. Péczel, Parád. II. Pécs. III. Barlangliget. IV. Visk. V. Vallis Zsil, Hátszeg, Montes Kerczenses. VI. Ferenczfalva, Mehádia, Korniaréva. VII. Mrzla-Vodica.

415. *pygmaeus* F. — Frequens.

v. *biguttatus* Steph. — Ut prior.

Megacronus Steph.

416. *striatus* Ol. — In regionibus montanis occurrit.

Bryocharis Lac.

417. *cingulata* Mannh. — I. Kalocsa. IV. S.-A.-Ujhely, N.-Mihály.

418. *analis* Pk. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. III. Zsolna. V. Montes Cibinenses.

v. *merdaria* Gyll. — IV. Vallis Fajna. (Leg. J. Frivaldszky.)

419. *inclinans* Grav. — III. Zsolna. IV. Mons Lungacsásza. V. Brassó. VI. Mons Domoglet.

420. *formosa* Grav. — III. Beczkó, Tátrafüred. IV. S.-A.-Ujhely. V. Montes Cibinenses, N.-Sink. VI. Resicza. VII. Montes Fruska-Góra.

421. *cernua* Grav. — I. Hagymádfalva. III. Várna. V. Déva, Mons Királykő, Gy.-Tölgyes. VI. Korniaréva.

v. *merdaria* Ol. — III. Tátrafüred. IV. Mons Hoverla.

422. *multipunctata* Hampe. — I. Budapest, Péczel. VI. Stájerlak, Mehádia.

423. *rufa* Er. — I. Budapest. IV. Mons Balzatul. VI. Mehádia.

424. *rugipennis* Pand. — III. Királyhegy. V. Montes Radnaenses: ad balneum Valea-Vinului.

Mycetoporus Mannh.

425. *splendidus* Grav. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, N.-Várad. II. N.-Peterd. III. Mons K.-Kriván, Vallis Vrátna Mons Chocs. IV. Homonna, Terebes, N.-Mihály. V. N.-Szeben, Brassó, Sz.-Régen. VII. Gospić.

v. *longicornis* Mäkl. — IV. Szerencs, Czéke. V. Montes Retyezát, Volkány.

426. *Brucki* Pand. — I. Budapest. (Leg. L. Biró.)

427. *rufescens* Steph. — II. Zircz, Boglár. III. Tátrafüred. V. Mons Bucsecs, Brassó. VI. Mehádia. VII. Fužine.

v. *laevicollis* Epp. — Hungaria. (Cat. Col. Eur., 1891, p. 98.)

428. *Märkeli* Kr. — I. Feketeerdő. II. Kőszeg. III. Mons K.-Kriván, Vallis Vrátna. IV. Zboj, Rahó, Mons Hoverla. VI. Rumunyest.

429. *nanus* Er. — I. Budapest, Kalocsa. II. Zákány, Pécs. III. Putnok. IV. Mons Pietrosz. VI. Mehádia. VII. Raduč, Gospić.

430. *tenuis* Rey. — I. Montes Biharenses. III. Mons K.-Kriván.

431. *punctus* Gyll. — III. Trencsén. V. Ad balneum Gyögy, Brassó. VI. Mehádia.

432. *punctipennis* Scriba. — V. Sec. Bielz. VIII. Zengg. (Leg. L. Biró.)

433. *brunneus* Marsh. — I. Budapest. II. Sopron. III. Trencsén, N.-Lipcse. IV. M.-Laborcz. V. N.-Szeben, Montes Cibinenses, Sz.-Régen.

v. *longulus* Mannh. — I. Budapest. III. Trencsén. IV. N.-Mihály. V. Montes Cibinenses, Sz.-Régen

v. *bimaculatus* Lac. — I. Péczel. IV. Bártfa, N.-Bocskó.

434. *niger* Fairm. — V. Borszék. (Leg. A. Ormay, 266, p. 12.)

435. *angularis* Rey. — VI. Herkulesfürdő. (Leg. J. Pável.)

436. *Reichei* Pand. — VI. Mehádia, Korniaréva.

437. *splendens* Marsh. — I. Budapest, Kalocsa, N.-Várad. IV. S.-A.-Ujhely. K.-Azar, N.-Mihály. V. Tasnád, N.-Szeben. VI. Mehádia. VII. Vagan. VIII. St.-Giorgio.

438. *forticornis* Fauv. — I. Budapest, Kalocsa. III. Kékkő. IV. S.-A.-Ujhely. V. N.-Szeben. VI. Mehádia. VII. Raduč, Gospić.

439. *clavicornis* Steph. — I. Budapest, Kalocsa, Kóly. II. Pécs. III. Mons K.-Kriván, Vallis Vrátna, Tátrafüred. IV. M.-Laborcz. V. Balla, Vallis Lotrióra. VII. Gospić.

440. *Reitteri* Epp. — III. Tátra. (Auctor, 79, p. 296.)

Hypocyptus Mannh.

441. *longicornis* Payk. — I. Budapest, N.-Várad. II. Boglár, Kőszeg. III. Trencsén. IV. Sátoralja-Ujhely, S.-Patak, Tolcsva, Szomotor, Tokaj, N.-Mihály. V. Tasnád, Montes Cibinenses, Brassó, Sz.-Régen.

442. *seminulum* Er. — I. Budapest, Kalocsa, Nagy-Várad. II. Soóly. III. Trencsén. IV. Lelesz. V. Montes Cibinenses, Segesvár. VII. Fužine.

443. *ovulum* Heer. — I. Budapest, Debreczen. IV. Tolcsva.

444. *laeviusculus* Mannh. — I. Parád, Kalocsa. IV. Tolcsva, Sáros-Patak. V. Montes Cibinenses.

445. *discoideus* Er. — I. Budapest, Kalocsa. II. Lacus Fertő. V. Peér, N.-Szeben.

Tanygnathus Er.

446. *terminalis* Er. — I. Szabolcs. (Leg. A. Miketz.)

Acylophorus Nordm.

447. *glabricollis* Lac. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Nyiregyháza. IV. Torna, S.-A.-Ujhely, Bély. V. N.-Szeben.

Euryporus Er.

448. *picipes* Payk. — III. Mons K.-Kriván, Koritnyicza. IV. Mons Szinnaikő, Olyka, Luhi. V. N.-Szeben, Kolozsvár.

Astrapaeus Grav.

449. *ulmi* Rossi. — I. Budapest, Kalocsa. IV. S.-A.-Ujhely, Szőllőske. V. N.-Szeben, Brassó. VI. Resicza, Mehádia. VII. Karst. VIII. Fiume.

Heterothops Steph.

450. *praevia* Er. — I. Budapest, Kalocsa. III. Trencsén. IV. Kassa, S.-A.-Ujhey, N.-Mihály. V. Brassó. VI. Mehádia. VII. Karst.

451. *4-punctula* Grav. — III. Tátrafüred. IV. Tolcsva.

452. *dissimilis* Grav. — I. Budapest, Kecskemét. Kalocsa, Debreczen. III. Turcsek, Trencsén. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, Szomotor, Sztropkó. V. Tasnád, Montes Radnaenses, N.-Szeben. VI. Temesvár.

Velleius Mannh.

453. *dilatatus* F. — I. Budapest, Monyásza. IV. Kassa, Com. Marmaros. V. Kolozsvár, Segesvár, Sz.-Régen, Gyalu.

Quedius Leach.

454. *microps* Grav. — IV. Áj, Mons Szinnaikő. V. Segesvár.

455. *brevis* Er. — IV. Bártfa. V. Segesvár. VII. Fužine.

456. *lateralis* Grav. — I. Rézbánya. III. K.-Kálna, Vallis Vrátna. V, N.-Szeben, Brassó. VI. Mehádia.

457. *brevicornis* Thoms. — V. Segesvár, Brassó.

458. *ochripennis* Mén. — I. Péczel, Kalocsa, Monyásza. V. N.-Szeben. VI. Rumunyest.

459. *fulgidus* F. — Frequens.

460. *mesomelinus* Marsh. — Ut prior.

461. *ventralis* Arag. — I. Budapest. II. Zircz. IV. Szőllőske.

462. *cruentus* Ol. — In toto regno occurrit.
v. *virens* Rottb. — IV. S.-A.-Ujhely, Mons Szinnaikő. V. Montes Kerczenses, Bodza, VII. Fužine.

463. *xanthopus* Er. — I. Budapest, Kalocsa, Nagy-Várad. II. Pécs. III. Hermánd, Zsolna, Koritnyicza. IV. Sátoralja-Ujhely, Olyka, Szinna, M.-Sziget. V. Brassó, Prázsmár. VI. Mehádia. VII. Mons Sveto-Brdo.

464. *scitus* Grav. — I. N.-Várad. III. Vallis Vrátna. IV. S.-A.-Ujhely, Mons Szinnaikő. V. Præsbe. VI. Mehádia.

465. *infuscatus* Er. — III. Kékkő. IV. M.-Sziget. V. Montes Cibinenses, Sz.-Régen. VI. Mehádia.

466. *punctatellus* Heer. — III. Mons K.-Kriván, Deménfalu, Vallis Bisztra, Tátrafüred. IV. Mons Pietrosz, Cserna-Hóra. V. Montes Kerczenses.

467. *cinctus* Payk. — Frequens.

468. *laevigatus* Gyll. — In regionibus subalpinis occurrit.

469. *tristis* Grav. — II. Zákány. V. Brassó. VI. Korniaréva. VII. Eszék.

470. *fuliginosus* Grav. — Frequens.

471. *molochinus* Grav. — Ut prior.

472. *unicolor* Kiesw. — V. Segesvár. (Leg. A. Petri, 269, p. 10.)

473. *ochropterus* Er. — I. Rézbánya. III. Zsolna, Mons K.-Kriván, Koritnyicza, Tátrafüred, Javorina. IV. Montes Rabaszkala et Hoverla, Vallis Fajna. V. Montes Radnaenses, Hátszeg, Kis-Disznód, Volkány, Brassó, Medgyes. VI. Korniaréva. VII. Fužine.

474. *transsylvanicus* Weise. — IV. M.-Sziget, Rahó, Mons Hoverla. V. Lacus Bulea.

475. *picipes* Mannh. — II. Pécs. IV. Czéke. V. Brassó, Mons Kereszténvhavas. VI. Resicza. VII. Gospić.

476. *nigriceps* Kr. — III. Mons K.-Kriván. (Leg. Dr. C. Brancsik, 40, p. 20.)

477. *fumatus* Steph. — I. Kalocsa. IV. M.-Sziget, Rahó, Mons Hoverla. V. Montes Cibinenses, Brasssó. VI. Resicza, Ferenczfalva.

478. *dubius* Heer. — I. Kalocsa. III. Mons K.-Kriván, Montes Babia-Gura, Tátra-Füred. IV. Mons Rabaszkala.

479. *Sturanyi* Ganglb. — VII. Fužine. (Legit L. Biró.)

480. *cincticollis* Kr. — III. Mons K.-Kriván, Koritnyicza, Mons Chocs, Tátrafüred, Javorina. IV. Montes Hoverla et Pietrosz. V. Montes Negoi, Szurul et Bucsecs.

481. *plancus* Er. — V. Montes Czódenses et Cibinenses, Sz.-Régen.
482. *umbrinus* Er. — I. Kalocsa. III. Mons K.-Kriván, Koritnyicza, Tátrafüred. IV. Mons Hoverla, Vallis Fajna. V. K.-Disznód, Brassó, Sz.-Régen, Borgó.
483. *humeralis* Steph. — I. Rézbánya. III. Mons K.-Kriván, Beczkó. IV. Mons Hoverla. V. Montes Retyezát, N.-Szeben, K.-Disznód.
484. *limbatus* Heer. — Frequens.
485. *obliteratus* Er. — Ut Prior.
486. *maurorufus* Grav. — I. Budapest, Kalocsa. III. Vallis Vrátna. IV. S.-A.-Ujhely. V. Montes Cibinenses, Mons Bucsecs, Sz.-Régen.
487. *riparius* Kelln. — V. Oláhfalu. (Bielz, 27, p. 54.)
488. *lucidulus* Er. — I. Budapest, IV. Luhi, Montes Hoverla et Menczul.
489. *scintillans* Grav. — I. Budapest, Kalocsa. II. Soóly. IV. Bártfa, N.-Mihály. V. Montes Cibinenses.
490. *pyrenaeus* Bris. — V. Montes Kerczenses, Brassó. VI. Ferenczfalva. VII. Capella. VIII. Fiume.
491. *auricomus* Kiesw. — V. Vallis Czód. (Legit A. Ormay, 266, p. 12.)
492. *alpestris* Heer. — I. Mons Királyhágó. III. Mons K.-Kriván, Koritnyicza, Montes Babia-Gura, Tátrafüred. IV. Mons Hoverla, Csorna-Hóra, Montes Pietrosz et Pop-Iván. V. Montes Retyezát, Lacus Bulea, Vallis Czód, Brassó, Mons Dongókő, Montes Radnaenses. VI. Korniaréva.
493. *rufipes* Grav. — I. Kalocsa, Rézbánya. III. Mons K.-Kriván, Deménfalu. IV. Montes Hoverla et Breczkul. V. Montes Cibinenses, Mons Dongókő, Mons Tészla. Montes Árpásenses, Gy.-Tölgyes. VI. Mons Szemenik.
494. *semiaeneus* Steph. — IV. Mons Hoverla. (Leg. J. Frivaldszky.)
495. *paradisianus* Heer. — In regionibus subalpinis frequens.
496. *collaris* Er. — I. Rézbánya. III. Vallis Vrátna, Mons K.-Kriván, Koritnyicza, Montes Babia-Gura, Tátrafüred. IV. Mons Rabaszkala, Marmarossziget, Rahó. V. Montes Radnaenses, N.-Disznód, Montes Kerczenses, Brassó. VI. Mons Szemenik, Mehádia.
497. *acuminatus* Hochh. — III. Mons K.-Kriván. V. Mons Sánta, N.-Szeben, Montes Kerczenses.
v. *falliciosus* Kr. — V. Montes Radnaenses. (Ganglbauer, 399, p. 173.)
498. *attenuatus* Gyll. — Frequens.
499. *fulvicollis* Steph. — III. Lacus Zöldtó dictus. IV. Mons Hoverla. V. Lacus Bulea, Montes Kerczenses, Segesvár. VII. Gospić.
500. *picipennis* Scriba. — III. Tátra (Lersch villa). VI. Mehádia. VII. Raduč.
501. *boops* Grav. — Ubique frequens.
v. *brevipennis* Frm. — III. Koritnyicza. VI. Mehádia.

Emus Curt.

502. *hirtus* L. — I. Budapest, Parád, Kalocsa. II. Sopron, Badacsony, Kőszeg, Pécs. III. V.-Mikola, Bakabánya, Tavarnok, Pozsony, Beszterczebánya, Trencsén, Kézsmárk, Rozsnyó. IV. S.-A.-Ujhely, K.-Azar. V. Hátszeg, N.-Szeben, Fenyőfalva, Brassó, Prázsmár, Medgyes, Szász-Régen, Kolozsvár. VII. Eszék.

Creophilus Mannh.

503. *maxillosus* L. — Communis.
v. *ciliaris* Steph. V. St.-Erzsébet. (Bielz, 27. p. 54.)

Leïstotrophus Perty.

504. *nebulosus* F. — I. Rétfalu. III. Pozsony, Trencsén, N.-Lipcse, Koritnyicza, ad rivum Béla. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, Tolcsva. V. N.-Csür, K.-Disznód, Montes Kerczenses, Brassó, Prázsmár, Medgyes. Sz.-Régen.
505. *murinus* L. — Communis.

Staphylinus L.

506. *pubescens* Deg. — Frequens.
507. *chloropterus* Pz. — I. Budapest, N.-Várad. II. Kőszeg, Pécs. III. Zsolna. IV. S.-A.-Ujhely. V. N.-Szeben, Montes Cibinenses, N.-Csür, Brassó.
508. *chalcocephalus* F. — I. Budapest, N.-Várad. II. Kőszeg, Pécs. III. Zsolna. IV. S.-A.-Ujhely. V. N.-Szeben, Montes Cibinenses, N.-Csür. Brassó.
509. *stercorarius* Ol. — I. Budapest. III. Szliács, N.-Lipcse, Koritnyicza, Tátrafüred IV. Bártfa, N.-Mihály. V. N.-Csür, N.-Szeben, Vörösstorony, Borgó, Montes Kelemenenses. VI. Mons Szemenik.
510. *latebricola* Grav. — III. Várna. V. Segesvár.
511. *fulvipes* Scop. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. III. Szliács, Vallis Vrátna. V. Montes Cibinenses, Guraró, Brassó, Sz.-Régen. VI. Resicza, Mehádia.
512. *fossor* Scop. — I. Rézbánya. II. Kőszeg. III. Hermánd, Trencsén, N.-Lipcse, Koritnyicza, Tátrafüred. IV. Áj, S.-A.-Ujhely. VII. Fužine. VIII. Fiume.

513. *erythropterus* L. — I. Kalocsa. II. Pécs. III. Beczkó, T.-Teplicz, N.-Lipcse, Koritnyicza. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, Tolcsva, N.-Mihály, Mons Rabaszkala. V. Hátszeg, Montes Kerczenses, Fogaras, Brassó, Segesvár.

514. *caesareus* Cederh. — Frequens.

Ocypus Kirby.

515. *olens* Müll. — In toto regno occurrit.
v. *curtipennis* Motsch. — I. Remecz. V. Hátszeg, Montes Cibinenses et Kerczenses, Mons Kereszténvhavas, Brassó, Sz.-Magyaros.

516. *macrocephalus* Grav. — I. Remecz. III. Hermánd, Zsolna, Mons Sztrazsov, Koritnyicza, Á.-Váralja, Tátrafüred. IV. Bártfa, O.-Ruszka, Cserna-Hóra. V. Montes Cibinenses et Porumbákenses, Sz.-Régen.
v. *Ormayi* Reitt. — V. Mons Sánta, N.-Szeben, Præsbe.
v. *banaticus* Sharp. — VI. Mons Szemenik. (Leg. E. Merkl.)

517. *alpestris* Er. — III. Vallis Vrátna. IV. O.-Ruszka. V. N.-Szeben, Montes Fogarasenses.

518. *ophthalmicus* Scop. — I. Budapest, T.-Bálint, Kalocsa. II. Sopron. III. Trencsén. IV. Szádellő. V. Mons Királykő. VI. Mehádia.

519. *brunnipes* F. — I. Nagy-Várad. II. Pécs. III. Rajecz, Zsolna, Mons Oroszlánkő. V. Tasnád, Montes Cibinenses. VII. Eszék.
v. *alpicola* Er. — V. Montes Cibinenses. et Kerczenses.

520. *nitens* Schrk. — Frequens.

521. *pullus* Hochh. — In regione VII. (Cat. Col. Eur., 1891, p. 101.)

522. *mus* Brull. — I. Budapest, Péczel, M.-Kovácsháza. II. Boglár. III. Kézsmárk, Aggtelek. V. Mons Szurul.

523. *picipennis* F. — Frequens.

524. *fuscatus* Grav. — III. K.-Kálna, Fülek, Beszterczebánya, T.-Teplicz, Koritnyicza, Tátra-Füred. IV. Vallis Fajna. V. K.-Disznód, Brassó, Mons Bucsecs, Medgyes, Montes ad fluvium Maros. VII. Vrdnik.

525. *fulvipennis* Er. — I. Budapest, Péczel, Aszód, Kalocsa. II. Soóly. III. K.-Kálna, Trencsén, Aggtelek. IV. N.-Mihály, M.-Laborcz, Szinna, N.-Bocskó. V. Sz.-Ujvár, Semesnye, N.-Szeben, Vöröstorony. VI. Ulma.

526. *aeneocephalus* Deg. — III. Beszterczebánya, Trencsén, Koritnyicza, Tátrafüred. IV. Vallis Fajna. V. K.-Talmács, Brassó, Montes Bucsecs et Dongókő, Gyeke.

527. *pedator* Grav. — I. Budapest, Dabas, Mezőberény. IV. Torna, Tokaj. V. Montes Cibinenses, Rosnyó. VI. Fehértemplom, Ulma. VII. Raduč.

528. *falcifer* Nordm. — V. Medgyes. VI. Mehádia.

529. *edentulus* Block. — Frequens.

530. *compressus* Marsh. — I. Péczel. V. N.-Szeben, Montes Cibinenses. VI. Mehádia.
v. *cerdo* Er. — III. Trencsén. (Leg. Dr. C. Brancsik, 40, p. 21.)

Tasgius Steph.

531. *ater* Grav. — I. Budapest, Péczel. II. Z.-Tapolcza. IV. N.-Mihály.

Hesperus Fauv.

532. *rufipennis* Grav. — I. Budapest, Debreczen. V. N.-Szeben, Montes Cibinenses. VI. Resicza. VII. Eszék.

Bisnius Thoms.

533. *villosulus* Steph. — I. Budapest. II. Zákány, N.-Varsány. III. Beczkó. IV. S.-A.-Ujhely. V. Segesvár.

534. *procerulus* Grav. — I. Budapest, Kalocsa, Nyiregyháza. IV. Nagy-Bocskó. VI. Gombos, Jaszenova, Báziás, Oravicza, Krassova, Mehádia.

535. *prolixus* Er. — I. Kecskemét, Kalocsa, Nagy-Várad. III. Trencsén, ad rivum Béla. IV. Kassa, Királyháza. V. Montes Cibinenses, Fogaras.

Actobius Fauv.

536. *cinerascens* Grav. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa, Nyiregyháza. II. Sopron. IV. Sátoralja-Ujhely, Czigánd, Beregszász. V. Montes Cibinenses, M.-Záh.

Philonthus Curt.

537. *punctus* Grav. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa, Debreczen. III. Verebély, Jobbágyi. IV. Tarczal, M.-Laborcz. V. Brassó, Gy.-Tölgyes. VI. Pancsova, Grebenácz.

538. *puella* Nordm. — IV. Bártfa, Királyháza.

539. *splendens* F. — In regionibus subalpinis occurrit.

540. *intermedius* Lac. — I. Kalocsa. III. Léva, Trencsén. V. N.-Szeben, Montes Cibinenses. VI. Mehádia. VIII. Fiume.

541. *laminatus* Creutz. — I. Budapest, Kalocsa, N.-Várad. III. Trencsén, Rosnyó. IV. Sátoralja-Ujhely, Olyka, M.-Sziget. V. K.-Disznód, Brassó, Bodza, Medgyes. VI. Ulma, Stájerlak, Mehádia.

542. *cyanipennis* F. — I. Budapest, Hagymádfalva. IV. Vinna, Mons Vihorlat, N.-Bocskó. V. Nagy-

Szeben, Montes Fogarasenses, Mons Királykő. VI. Szekul, Mehádia, Rumunyest.

543. *nitidus* F. — III. Beszterczebánya, Vallis Bosácz, Koritnyicza. IV. Bártfa. V. N.-Szeben, Montes Cibinenses, Sz.-Régen.

544. *chalceus* Steph. — I. N.-Várad. IV. Bély. VI. Grebenácz, Báziás, Mehádia.

545. *politus* L. — Frequens.

546. *addendus* Sharp. — V. Brassó. VI. N.-Bogsán.

547. *temporalis* Rey. —V. Montes Bucsecs et Dongókő, Bodza.

548. *carbonarius* Gyll. — Communis.

549. *atratus* Grav. — I. Budapest, Kalocsa, Debreczen. III. Beszterczebánya, Trencsén, Tátrafüred. IV. S.-A.-Ujhely, A.-Bereczki, N.-Bocskó. V. Déva, N.-Csür. N.-Sink, Bükszád, Sz.-Régen. VI. Herkulesfürdő.

v. *coerulescens* Lac. — III. Beczkó, Tátrafüred. IV. Vallis Fajna. V. Gy.-Tölgyes.

550. *Bodemeyeri* Epp. — VI. Mehádia. (Legit E. Merkl.)

551. *rotundicollis* Mén. — III. Poprád. IV. Mons Szinnaikő, Vallis Fajna. V. Déva, Dobra, Nagy-Szeben, K.-Disznód, Gy.-Tölgyes.

552. *umbratilis* Grav. — I. Budapest, Kalocsa. III. Léva, Tátrafüred. IV. S.-A.-Ujhely, Szatmár. V. Zilah, N.-Szeben, Vöröstorony, Gy.-Tölgyes, Kolozsvár. VI. Mehádia. VII. Fužine.

553. *cephalotes* Grav. — I. Budapest, Kalocsa. II. Sopron. III. Beczkó, Koritnyicza, Kézsmárk. IV. Bártfa, Párkány, N.-Mihály, Nagy-Bocskó. V. N.-Szeben, Holczmány, Brassó. VI. Grebenácz. VIII. Fiume.

554. *sordidus* Grav. — I. Budapest, Péczel, Kecskemét, Kalocsa, N.-Várad, Kóly. II. Soóly. III. Trencsén, Koritnyicza, Tátrafüred. IV. Nagy-Mihály, Terebes. V. Kolozsvár. VI. Temesvár. Stájerlak.

555. *Scribae* Fauv. — I. Budapest, Péczel. V. Nagy-Talmács. VI. Mehádia.

556. *fuscus* Grav. — IV. Homonna. V. N.-Szeben.

557. *ventralis* Grav. — I. Budapest, Kalocsa, Nagy-Várad. II. Belvárd. III. Beszterczebánya, Trencsén, IV. N.-Mihály, Ungvár. V. Vallis Zsil, Oláhfalu. VII. Eszék.

558. *debilis* Grav. — Frequens.

559. *discoideus* Grav. — I. Budapest, Kalocsa. II. Paks. III. Trencsén. IV. Gesztely. V. Déva, Remete, N.-Szeben, Bükszád, Oláhfalu.

560. *dimidiatus* Sahlb. — I. Budapest, Kalocsa.

561. *corruscus* Grav. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa. II. Z.-Tapolcza, M.-Peterd. IV. Szinna. VI. Temesvár, Mehádia. VII. Diakovár.

562. *ebeninus* Grav. — Frequens.

563. *concinnus* Grav. — Ut prior.

v. *ochropus* Grav. — I. Debreczen. (Legit Dr. J. Török.)

564. *frigidus* Kiesw. — I. N.-Várad. IV. Csorna-Hóra. V. Præsbe. VI. Mehádia, Korniaréva.

565. *corvinus* Er. — I. Budapest, Kalocsa, Nagy-Várad. III. Pozsony, Trencsén. IV. K.-Azar. V. N.-Csür, Gy.-Tölgyes. VI. Temesvár.

566. *immundus* Gyll. — Frequens.

567. *sanguinolentus* Grav. — Ut prior.

568. *laevicollis* Lac. — III. Koritnyicza, Poprád. V. Serbota, Sz.-Ujfalu, Præsbe, Lacus Girbova, Brassó, Mons Nagykőhavas, Bodza, Medgyes, Besztercze. VI. Ferenczfalva, Mehádia.

569. *aerosus* Kiesw. — IV. Mons Hoverla. V. Præsbe. VI. Csenej.

570. *montivagus* Heer. — III. Mons K.-Kriván, Koritnyicza, A.-Váralja, Tátrafüred. IV. Montes Hoverla et Pietrosz. V. Mons Ünökő, Lacus Bulea. VI. Mehádia.

571. *quisquiliarius* Gyll. — Frequens.

v. *inquinatus* Steph. — I. Budapest, Kalocsa. V. Ad balneum Gyógy, Segesvár.

572. *rufimanus* Er. — IV. Kassa. V. Montes Cibinenses. VI. Báziás, Mehádia.

573. *fimetarius* Grav. — Frequens.

574. *dimidiatipennis* Er. — VI. Resicza. (Legit E. Merkl.)

575. *astutus* Er. — I. Budapest. III. Trencsén. IV. M.-Sziget, Rahó. V. Montes Cibinenses, Szász-Régen. VII. Velebit. VIII. Fiume, Buccari.

576. *splendidulus* Grav. — Communis.

577. *nigritulus* Grav. — Ut prior.

578. *thermarum* Aub. — I. Kalocsa. V. Bükszád.

579. *femoralis* Hochh. — I. Budapest, Kalocsa. V. Montes Retyezát et Vigyázókő.

580. *vernalis* Grav. — I. Budapest, Kalocsa, Nagy-Várad, Kóly. II. Pécs. III. Trencsén. IV. Sátoralja-Ujhely, Tokaj, Szerencs, Velejte, Tárkány, Sztropkó. V. N.-Szeben, Montes Cibinenses, Brassó, Kőhalom, Szász-Régen, Mező-Záh. VI. Mehádia. VII. Gospić.

581. *exiguus* Nordm. — IV. Homonna. (Legit Dr. C. Chyzer.)

582. *nitidulus* Grav. — I. Budapest, Kalocsa. V. Déva.

583. *decorus* Grav. — In regionibus montanis frequens.

584. *fuscipennis* Mannh. — Ut prior.

585. *lucens* Er. — I. Rézbánya. V. Vallis Lotrióra, Montes Cibinenses, Brassó.

586. *varius* Gyll. — In toto regno occurrit.

v. *bimaculatus* Grav. — Simul cum stirpe.

587. *marginatus* Stroem. — I. Mont. Biharenses. III. Zsolna, N.-Lipcse, Koritnyicza. IV. Sátoralja-Ujhely. V. Montes Czódenses, K.-Disznód, Montes Kerczenses, Brassó, Mons Fettifói, Barczaság, Mons Kereszténvhavas, Medgyes, Borszék.

588. *bipustulatus* Woll. — V. N.-Szeben. (Legit A. Ormay, 264, p. 21.)

589. *cruentatus* Gmel. — I. Budapest, Kalocsa, Makó, Nagy-Várad. II. Sopron, Z.-Tapolcza. III. Verebély, Trencsén. IV. Barkó. V. K.-Disznód, Brassó, Medgyes, Borgó. VI. Mehádia, Stájerlak.

590. *stragulatus* Er. — VII. Gospić. (Reitter, 299, p. 210.)

591. *longicornis* Steph. — I. Budapest, Kalocsa, N.-Várad. II. Sopron, Soóly. III. Montes Szoblahóenses. IV. Bártfa, Gáboltó, Nagy-Mihály, N.-Bocskó, Luhi. V. Zilah, Brassó.

592. *varians* Payk. — Frequens.

593. *agilis* Grav. — I. Kalocsa, Szeged, Szegvár, Szentes. II. Sopron. IV. Páczin, Luhi. V. Mons Detunáta, N.-Szeben, F.-Komána.

594. *albipes* Grav. — I. Parád, Kalocsa. III. Trencsén. IV. Bártfa, N.-Mihály, S.-A.-Ujhely, Luhi. V. Montes Cibinenses et Czódenses, Brassó, Montes Bucsecs et Csukás Sz.-Régen.

v. *alpinus* Epp. — IV. Bártfa. V. Præsbe, Brassó.

595. *lepidus* Grav. — I. Budapest, Kalocsa, Debreczen. II. Kőszeg. III. Trencsén, Poprád. IV. Varannó, Jászó. V. Déva, Kőhalom, N.-Szeben, Előpatak, Sz.-Régen. VI. Grebenácz.

v. *gilvipes* Er.— III. Nyitra (sec. J. Frivaldszky).

596. *fumarius* Grav. — I. Budapest, Kalocsa. III. Pozsony. IV. Tokaj, Varannó, A.-Bereczki, N.-Bocskó. V. Vallis Lotrióra, Segesvár, M.-Záh.

597. *nigrita* Grav. — I. Budapest, Nyiregyháza. III. Nyitra.

598. *virgo* Grav. — V. N.-Szeben. (Leg. A. Ormay, 266, p. 12.)

599. *micans* Grav.— I. Budapest, Dabas, Kecskemét, Kalocsa, Szeged, Csongrád, N.-Várad. II. Soóly, III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj, Terebes, Bély, Szomotor. VI. Jaszenova. VII. Eszék.

600. *salinus* Kiesw. — I. Kalocsa, Algyő. IV. Czigánd. VI. Jaszenova.

601. *fulvipes* F. — Frequens.

602. *tenuis* F. — Ut prior.

603. *pullus* Nordm. — I. Budapest, Kalocsa, Hadház. II. D.-Örs. III. Rozsnyó. IV. K.-Helmecz, Nagy-Bocskó. V. Déva, Vallis Lotrióra, Montes Kerczenses, Sz.-Magyaros, Segesvár, Oláhfalu. VI. Mehádia.

Othius Steph.

604. *fulvipennis* F. — In toto regno occurrit.

605. *laeviusculus* Steph. — III. Montes Babia-Gura. V. Segesvár.

606. *melanocephalus* Grav. — III. Zsolna, Á.-Váralja, Tátrafüred. IV. N.-Bocskó. V. Brassó.

607. *myrmecophilus* Kiesw. — III. Tátra. (Lerschvilla.) IV. Mons Pietrosz. V. K.-Disznód, Montes Kerczenses et Czódenses, Præsbe, Montes Porumbákenses, Brassó.

608. *lapidicola* Kiesw. — III. Montes Kis-Kriván et Oroszlánkő. IV. Rahó, Mons Hoverla, Csorna-Hóra, Mont. Lungaesásza et Pop-Iván. V. Montes Kerczenses, Brassó. VI. Mons Szemenik.

609. *brevipennis* Kr. — IV. Mont. Turkul et Pietrosz. V. Montes Kerczenses. VI. Korniaréva.

610. *crassus* Motsch. (*pallidus* Brancsik). — I. Montes Biharenses. III. Tátra (Lersch villa). IV. Montes Szinnaikő et Turkul. V. Montes Radnaenses, Com. Hunyad: ad balneum Gyógy, Bucsecs. VI. Herkulesfürdő.

611. *transsylvanicus* Ganglb. — V. Montes Radnaenses et Kerczenses, Præsbe.

Baptolinus Kr.

612. *pilicornis* Pk. — I. Montes Biharenses. III. Vallis Vrátna, Koritnyicza. IV. Bártfa, Montes Vihorlat, Szinnaikő et Rabaszkala, O.-Ruszka, Mons Hoverla. V. Montes Cibinenses, Præsbe, Vallis Czód, Montes Kerczenses, Fogaras, Brassó, Hosszufalu, Bodza.

613. *affinis* Pk. — I. Feketeerdő. III. Beczkó. IV. Mont. Vihorlat, Szinnaikő, Hoverla et Pop-Iván, V. Præsbe, Montes Czódenses, Felekenses. Lacus Girbova, Montes Kerczenses, Brassó, Montes Bucsecs et Dongókő. VI. Ferenczfalva, Mehádia.

614. *longiceps* Fauv. — III. Zólyom. V. N.-Csür.

Leptacinus Er.

615. *parumpunctatus* Gyll. — I. Kalocsa. IV. Bártfa, Páczin.

616. *batychrus* Gyll. — Communis.

617. *formicetorum* Märk. — III. Trencsén. V. Segesvár.

Leptolinus Kr.

618. *nothus* Er. — I. Kalocsa. VII. Teste Ganglbauer.

Metoponcus Kr.

619. *brevicornis* Er. — IV. Rahó. VI. Stájerlak.

620. *basalis* Aub. (*tricolor* Brancs.) — II. Nagy-Kanizsa. (Brancsik, 37, p. 418).

Eulissus Mannh.

621. *fulgidus* F. — I. Budapest, Kalocsa. III. Beszterczebánya. IV. Szinna. V. Ad balneum Gyógy, N.-Szeben, Montes Kerczenses, Fogaras, Brassó, Montes ad fluvium Maros, Deés, T.-Szántó. VI. Temesvár, Ferenczfalva, Mehádia.

Nudobius Thoms.

622. *lentus* Grav. — III. Koritnyicza, Oravicz, Tátrafüred. IV. N.-Bocskó. V. Montes Radnaenses, Brassó, Gyulafalva. VI. Alpes Krassó-Szörényenses.

Xantholinus Serv.

623. *punctulatus* Pk. — Communis.

v. *Thomsoni* Schwarz. — III. Turcsek, Rajecz. V. Segesvár. VII. Diakovár, Fužine, Mons Sveto-Brdo.

624. *angustatus* Steph. — I. Budapest, Kalocsa, N.-Várad, Kalota. III. Beszterczebánya, Vallis Vrátna, Tátrafüred. IV. Sztropkó, M.-Sziget. V. Vallis Lotrióra, N.-Szeben, Kőhalom, Segesvár, M.-Záh. VI. Temesvár, Mons Szemenik. VII. Diakovár.

625. *glabratus* Grav. — IV. Bártfa. (Legit A. Michalovics).

626. *relucens* Grav. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. IV. Sztropkó. V. Zilah, Gy.-Tölgyes.

627. *glaber* Nordm. — I. Budapest, Kalocsa, Nagy-Várad. II. Zircz. IV. N.-Mihály, M.-Sziget. V. T.-Szarvad, Tasnád, Segesvár. VI. Mons Szemenik, Mehádia. VII. Eszék.

v. *signatipennis* Fleischer. — I. Remecz. (Detex. Auctor.)

628. *procerus* Er. — V. Hátszeg, Segesvár. VI. Herkulesfürdő.

629. *decorus* Er. — I. Kalocsa, N.-Várad. II. Zircz, Pécs. IV. Mons Szinnaikő. V. Peér, N.-Szeben, N.-Csür, Montes Kerczenses, Sz.-Régen. VI. Zlaticza, Uj-Moldova, Mehádia.

630. *rufipennis* Er. — III. Beszterczebánya, Trencsén. V. Zilah, Montes Kerczenses.

631. *crassicornis* Hochh.—V. Præsbe. (Leg. C. Fuss.)

632. *tricolor* F. — In regionibus montanis occurrit.

633. *distans* Rey. — I. Montes Biharenses. IV. Bártfa, Tokaj, O.-Ruszka. V. Mons Retyezát, Montes Kerczenses, Brassó, Semesnye.

634. *cribripennis* Fauv. — V. Vallis Zsil. (Bielz, 27, p. 55.)

635. *linearis* Ol. — Communis.

Cryptobium Mannh.

636. *fracticorne* Pk. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa, Nyiregyháza. II. Lacus Fertő, Z.-Tapolcza. III. Trencsén, Tátrafüred. IV. Tolcsva, Szomotor, Tárkány, Bély, Varannó, Homonna, Szőllőske, M.-Laborcz, Mons Hoverla. V. Tasnád, Montes Radnaenses, Vallis Lotrióra, Montes Cibinenses, Sz.-Régen. M.-Záh. VI. Mehádia.

Dolicaon Lap.

637. *biguttulus* Lac. — I. Budapest, Kalocsa, P.-Poó, Érmihályfalva. II. Lacus Fertő, Zircz. III. V.-Mikola. IV. Tokaj, Tolcsva, Terebes, Máramaros-Sziget. VI. Temesvár.

Lathrobium Grav.

638. *coecum* Friv. — V. Vallis Lotrióra. VI. Rumunyest.

639. *testaceum* Kr. — II. Kőszeg. (Leg. J. Pável.)

640. *elegantulum* Kr. — In regione VII. (Auctor. 203, p. 680.)

641. *fovulum* Steph. — I. Budapest, Kalocsa, Nagy-Várad, Hagymádfalva. V. N.-Szeben.

642. *brunnipes* F. — I. Budapest, Debreczen, Kalocsa. II. D.-Örs. III. Tavarnok, Vallis Vrátna, Tátrafüred. IV. Sátoralja-Ujhely, Nagy-Mihály, Beregszász, Luhi, N.-Károly. V. Zilah, Déva Montes Kerczenses, Mező-Záh.

643. *geminum* Kr. — I. Budapest, Kalocsa, Füzes-Abony. III. Trencsén. IV. K.-Azar, N.-Mihály.

644. *ripicola* Czwal. — IV. Gálszécs, Mons Hoverla. V. Mons Fettifói, Gy.-Tölgyes, Bükszád.

645. *elongatum* L. — Frequens.

646. *rufipenne* Gyll. — II. Pécs. III. Trencsén. V. Montes Kerczenses, Bükszád, Gy.-Tölgyes.

647. *laevipenne* Heer. — III. Trencsén, N.-Lipcse, Koritnyicza. IV. Mons Szinnaikő. V. Bükszád. VI. Resicza, Mehádia.

648. *furcatum* Czwal. — I. Hagymádfalva, Kalocsa. IV. Szomotor.

649. *castaneipenne* Kol. — I. Budapest, Parád, Kalocsa, Hagymádfalva. IV. Bártfa, Körtvélyes, N.-Bocskó. V. Montes Retyezát, Brassó, Prázsmár.

650. *fulvipenne* Grav. — I. Budapest, Nagy-Várad. II. Pécs, Z.-Tapolcza. III. Trencsén. IV. Bártfa, Tolcsva, Nagy-Mihály. V. Zsibó, Hátszeg, Nagy-Szeben, Præsbe, Segesvár, Sz.-Régen. VI. Mons Szemenik, Báziás, Mehádia.

v. *Letzneri* Gerh. — I. Budapest, Kalocsa, Nagy-Várad. III. Beczkó, Aggtelek. IV. Bártfa, Nagy-Mihály, M.-Sziget. V. Zilah. VI. Grebenácz.

651. *filiforme* Grav. — I. Budapest, Kalocsa. III. Trencsén. IV. Szomotor. V. N.-Szeben, M.-Záh.

652. *longulum* Grav. — I. Budapest, Kalocsa. III.

Trencsén. IV. Szomotor, Homonna, K.-Azar, S.-A.-Ujhely. V. N.-Szeben, Montes Cibinenses. VI. Korniaréva. VII. Gospić.

v. *longipenne* Fm. — I. Budapest, Kalocsa. IV. Páczin, Széphalom. V. N.-Szeben.

653. *dilutum* Er. — III. Zólyom. V. Segesvár.

654. *pallidum* Nordm. — I. Kalocsa. III. Budatin. V. Segesvár, Prázsmár.

655. *quadratum* Payk. — I. Budapest, Dabas, Kecskemét, Kalocsa. II. D.-Örs, Pécs. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Bély, Tolcsva, Terebes, Varannó. V. Déva, N.-Szeben, Mező-Záh.

656. *terminatum* Grav. — I. Kalocsa. III. Trencsén. IV. Bély, Gálszécs, N.-Mihály, M.-Sziget. V. N.-Szeben, N.-Csür, Brassó.

657. *gracile* Hampe. — In regione VII. (Auctor, 153, 1866, p. 371).

658. *angustatum* Lac. — I. Kalocsa. II. Mohács. V. N.-Csür.

659. *scutellare* Nordm. — I. Szent-Endre. III. K.-Kálna. IV. Királyháza. V. Pele, Montes Cibinenses.

660. *multipunctum* Grav. — I. Budapest, Péczel. III. Trencsén. V. Vallis Lotrióra, Montes Cibinenses.

661. *angusticolle* Lac. — IV. Vallis Fajna. V. Segesvár.

v. *sodale* Kr. — III. Vallis Vrátna, Mons K.-Kriván. (Leg. Dr. C. Brancsik, 40, p. 21.)

662. *picipes* Er. — V. Montes Kerczenses. (Leg. A. Ormay, 264, p. 22.)

Achenium Curt.

663. *ephippium* Er. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa. IV. Tokaj. VI. Grebenácz, Báziás.

664. *depressum* Grav. — I. Kalocsa, Csongrád. II. Lacus Fertő. VI. Temesvár, Báziás.

665. *humile* Nicol. — I. Budapest, Kalocsa. II. D.-Örs, Z.-Tapolcza. III. Jobbágyi, Rozsnyó. IV. Göncz, Torna, S.-A.-Ujhely. V. Szamosujvár, M.-Záh, N.-Szeben.

Scimbalium Er.

666. *anale* Nordm. — I. M.-Túr, M.-Berény. V. Teste Bielz.

Medon Steph.

667. *castaneus* Grav. — V. N.-Szeben. (Bielz, 27, p. 55.)

668. *rufiventris* Nordm. — I. Parád. V. Montes Kerczenses. VI. Mehádia.

669. *ferrugineus* Er. — IV. Torna, K.-Majtény. V. Teste Ganglbauer.

670. *brunneus* Er. — Communis.

671. *Brancsiki* Epp. (*nitidus* Petri). — I. Budapest. III. Mons K.-Kriván. IV. Mons Szinnaikő, Czéke, Körtvélyes. V. Segesvár. VI. Mehádia.

672. *fusculus* Mannh. — I. Budapest, Kalocsa, N.-Várad. II. Zákány. III. Beczkó. IV. Sátoraljа-Ujhely, M.-Sziget. V. Kákova, N.-Csür, Holczmány. VI. Temesvár, Szászka, Mehádia.

673. *ripicola* Kr. — IV. Mons Hoverla. VI. Szekul.

674. *nigritulus* Er. — I. Kalocsa, Mező-Túr.

675. *bicolor* Ol. — I. Budapest. III. Trencsén. VI. Resicza, Mehádia.

676. *melanocephalus* F. — Frequens.

677. *obsoletus* Nordm. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Szomotor, Czigánd, Perbenyik. V. N.-Szeben. VI. Resicza, Mehádia. VIII. Fiume.

678. *obscurellus* Er. — V. N.-Szeben. (Bielz, 27, p. 55.)

679. *ochraceus* Grav. — I. Budapest, Kalocsa. III. Verebély, Trencsén. IV. Bártfa, Páczin. V. Brassó, M.-Záh.

Scopaeus Er.

680. *pusillus* Hochh. — IV. Tolcsva. (Leg. Dr. C. Chyzer.)

681. *gracilis* Sperk. — I. Péczel, Szeged. III. Trencsén. VI. Mehádia.

682. *debilis* Hochh. — I. Kalocsa. IV. M.-Sziget.

683. *sericans* Rey. — V. Segesvár. (Leg. Dr. C. Petri, 269, p. 10.)

684. *laevigatus* Gyll. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa, N.-Várad. III. K.-Kálna, Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Czéke, K.-Helmecz, Beregszász. V. Tasnád, N.-Szeben, Sz.-Régen. VI. Palics, Grebenácz.

685. *didymus* Er. — I. Budapest. III. Trencsén. IV. Tolcsva. VI. Resicza.

686. *cognatus* Rey. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely. V. Vallis Lotrióra, Montes Kerczenses.

687. *sulcicollis* Steph. — I. Budapest, Debreczen. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Sáros-Patak, Tolcsva, Kőrösmező. V. Montes Kerczenses, Brassó, Oláhfalu. VI. Orsova. VIII. Fiume.

v. *intermedius* Rey. — V. N.-Csür. (Legit C. Fuss.)

688. *minimus* Er. — I. Budapest, Kalocsa, Érmihályfalva. II. Darócz. IV. Bártfa, N.-Károly. V. S.-Ujlak, Pele.

Domene Fauv.

689. *scabricollis* Er. — III. Hermánd, Mons K.-Kri-

ván, Turcsek, Koritnyicza, Tátrafüred, Javorina. VII. Capella, Ostrvica, Vagan, Crni-Dabar.

690. *aciculata* Hopffg.—VII. Lacus ad Plitvica. (Auct. 178, p. 269.)

Stilicus Latr.

691. *angustatus* Fourc. — I. N.-Várad. III. Tavarnok. IV. Vallis Fajna. V. Zilah, Hátszeg, F.-Sebes, Kőhalom, Sz.-Régen, Deés. VI. Mehádia, Rumunyest.

692. *subtilis* Er. — I. Budapest, Kecskemét, Nagyvárad. II. Darócz. III. Trencsén. IV. Tolcsva, Varannó, N.-Mihály. V. N.-Szeben, Segesvár, Oláhfalu. VI. Temesvár.

693. *similis* Er. — I. Budapest, Kalocsa, N.-Várad. III. Beszterczebánya, Trencsén, Poprád. IV. N.-Mihály. V. Hátszeg, N.-Csür, Sz.-Ujfalu, Medgyes, Segesvár, Oláhfalu, Sz.-Régen, M.-Záh.

694. *orbiculatus* Payk. — In toto regno occurrit.

695. *rufipes* Germ. — Ut prior.

696. *Erichsoni* Fauv. — I. Budapest, N.-Várad. III. Tátra (Lersch villa). IV. Mons Hoverla. VI. Mehádia.

Astenus Steph.

697. *filiformis* Latr. — I. Budapest, Kalocsa, Horgos, Szentes. II. Soóly. III. Verebély, Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Szomotor. V. Vallis Lotrióra, Kákova, N.-Szeben, Szt.-Erzsébet, N.-Csür, Sz.-Ujfalu, Holczmány, Kercz, Földvár, Segesvár, Sz.-Régen, M.-Záh, Gyeke. VI. Mehádia. VII. Buccari.

698. *cribrellus* Baudi. — V. Segesvár. (Leg. Dr. C. Petri, 269, p. 10.)

699. *bimaculatus* Er. — I. Budapest. (Leg. J. Frivaldszky.)

700. *pulchellus* Heer. — I. Kalocsa. Nagy-Várad.

701. *angustatus* Payk. — Frequens.

702. *neglectus* Märk. — I. Montes Biharenses. V. Vallis Lotrióra.

703. *immaculatus* Steph. — I. Bpest, Debreczen, Kalocsa.

Paederus Fabr.

704. *Baudii* Fairm. — II. Zircz, Kőszeg. VI. Stájerlak, Mehádia.

705. *brevipennis* Lac. — I. Budapest, N.-Várad. III. Zsolna. IV. Mons Zsihovecz. V. N.-Szeben. Nagy-Csür, Vöröstorony, Bárczaság, Mező-Záh, Gyeke.

706. *littoralis* Grav. — Frequens.

707. *riparius* L. — Ut Prior.

708. *fuscipes* Curt. — Communis.

709. *caligatus* Er. — I. Kalocsa. (Leg. F. Speiser, 349, p. 20.)

710. *limnophilus* Er. — I. Budapest, Kalocsa, Nagy-Várad. III. Beczkó, Turcsek, ad rivum Béla. IV. Sztropkó, N.-Bocskó. V. Hátszeg, Szt.-Erzsébet, N.-Csür, Porcsesd, Földvár, Bükszád, Medgyes, Segesvár, Gy.-Tölgyes. VI. Krassova. VII. Eszék, Karst.

711. *ruficollis* F. — I. Budapest, Debreczen, Nagy-Várad, Székelyhid. II. D.-Örs. III. K.-Kálna, Pozsony, Trencsén, Tátrafüred. IV. N.-Bocskó, V. Nagy-Szeben, Szt.-Erzsébet, Kercz, Montes Árpásenses, Fogaras, Brassó, Földvár, Héviz, Medgyes, Segesvár, Montes ad fluvium Maros. VI. Stájerlak, Mehádia. VIII. Fiume.

712. *gemellus* Kr. — III. Koritnyicza, Tátrafüred. IV. Vallis Fajna. V. Hátszag, Montes Árpásenses, Deés. VI. Grebenácz, Krassova. VII. Našice.

713. *sanguinicollis* Steph. — III. Beszterczebánya, Trencsén, ad rivum Béla. IV. Varannó, Nagy-Mihály, Vidrány, Mons Szinnaikő, Szinna, Vallis Fajna, Kőrösmező. V. Sz.-Ujvár, Nagy-Talmács, Bodza, Porumbák.

Dianous Sam.

714. *coerulescens* Gyll. — I. N.-Várad, Remecz. III. Trencsén. IV. H.-Rokitó, Rahó, Kőrösmező, Luhi. V. Déva ad balneum Valea-Vinului, Segesvár, Sz.-Régen. VI. Mehádia.

Stenus Latr.

715. *biguttatus* L. — Communis.

716. *bipunctatus* Er. — Ut prior.

v. *nigricornis* Petri. — V. Földvár. (Bielz, 27, p. 56.)

717. *longipes* Heer. — I. Budapest. III. Ad rivum Béla, IV. Sátoralja-Ujhely, Mons Szinnaikő, Runyina, Nagy-Bocskó. V. Bodza, Segesvár. Gy.-Tölgyes. VI. Mehádia.

718. *maculiger* Weise. — In regione VII. (Cat. Col. Eur., 1891, p. 110.)

719. *bipustulatus* Thoms. — V. N.-Szeben, Fogaras, Gy.-Tölgyes.

720. *guttula* Müll. — IV. A.-Bereczki, M.-Sziget, Mons Hoverla, Királyháza. V. Hátszeg, Segesvár. VI. Orsova, Mehádia. VIII. Fiume, Vallis Draga.

721. *Guynemeri* Duv. — Habitat etiam Hungariam. (Ganglbauer, 144, II, p. 569.)

722. *aterrimus* Er. — II. Kőszeg. V. Vallis Lotrióra.

723. *asphaltinus* Er. — I. Budapest. IV. Beregszász, Nagy-Bocskó. V. Nagy-Talmács. VI. Oravicza, Mehádia. VIII. Fiume, Vallis Draga.

724. *fossulatus* Er. — III. Tátra (Marmotahegy). IV. Montes Hoverla et Pietrosz. V. Brassó, Bükszád.
725. *gracilipes* Kr. — III. Ad rivum Bisztra. IV. Vallis Fajna.
726. *incanus* Er. — I. Budapest. III. Ad rivum Béla. IV. O.-Ruszka, N.-Bocskó. V. Montes Retyezát. VI. Mehádia.
727. *pusillus* Er. — V. Segesvár. (Leg. Dr. C. Petri, 269, p. 10.)
728. *nanus* Steph. — I. Budapest, Kalocsa. II. Boglár. III. Trencsén. IV. Tolcsva, Peticse. V. Sztána, N.-Szeben, Brassó. VII. Gospić.
729. *circularis* Grav. — Frequens.
730. *pumilio* Er. — III. Tátrafüred. IV. Beregszász. VI. Mehádia.
731. *humilis* Er. — I. Kalocsa, Debreczen, N.-Várad. III. Beszterczebánya, Trencsén, Tátrafüred. IV. S.-A.-Ujhely, A.-Bereczki, Szerencs, Perbenyik, Homonna, Sztropkó, M.-Sziget. V. Montes Retyezát, Sz.-Ujfalu, Kőhalom, Brassó, Előpatak, Montes Radnaenses. VII. Mrzla-Vodica.
732. *carbonarius* Gyll. — I. Budapest. V. Nagy-Szeben, Sz.-Magyaros. VI. Mehádia.
733. *stigmula* Er. — I. Kalocsa, Szeged, N.-Várad. IV. S.-A.-Ujhely, V. Segesvár. VI. Grebenácz.
734. *bimaculatus* Gyll. — I. Budapest. II. D.-Örs. III. Trencsén, Rosnyó. IV. S.-A.-Ujhely, Nagy-Mihály, M.-Sziget. V. Nagy-Szeben, Segesvár, Sz.-Régen.
735. *clavicornis* Scop. — I. Budapest, Kalocsa. II. Soóly. III. Trencsén, Tátra (Lersch villa). IV. Mons Szinnaikő, Beregszász, M.-Sziget. V. Tasnád, Segesvár, Kőhalom, Sz.-Magyaros, Brassó, M.-Záh. VII. Fužine.
736. *scrutator* Er. — I. Budapest, Kalocsa. IV. Tolcsva, Lelesz. V. Brassó, Segesvár, Oláhfalu. VI. Mehádia.
737. *providus* Er. — Frequens.
V. *Rogeri* Kr. — IV. Mons Hoverla. V. Teste Bielz.
738. *sylvester* Er. — I. Kalocsa. V. N.-Szeben.
739. *lustrator* Er. — IV. A.-Bereczki. V. Tasnád.
740. *proditor* Er. — I. Kalocsa. IV. Mons Hoverla. V. Malomviz, ad balneum Gyögy.
741. *Juno* F. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa, N.-Várad. III. Tavarnok, Rosnyó. IV. Tolcsva, K.-Helmecz, Véke, Terebes. V. Nagy-Szeben, Segesvár. VI. Temesvár. VII. Eszék.
742. *ater* Mannh. — Frequens.
743. *affaber* Baudi. — Hungaria. (Cat. Col. Eur., 1891, p. 111.)
744. *longitarsis* Thoms. — I. Hadház. IV. Sátoralja-Ujhely. V. Tasnád.
745. *incrassatus* Er. — I. Budapest, Kalocsa, Debreczen. IV. Tolcsva. VI. Palics, Grebenácz.
746. *atratulus* Er. — I. Budapest. V. Oláhfalu. VII. Raduč.
747. *melanarius* Steph. — I. Budapest. V. Brassó.
748. *subdepressus* Muls. — Etiam Hungariæ incola. (Ganglbauer, 144, II, p. 575.)
749. *morio* Grav. — I. Budapest, Kalocsa, Szeged, Hadház. II. D.-Örs. IV. S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Szőllőske, Szerencs, Terebes. V. Fogaras, Segesvár.
750. *buphthalmus* Grav. — Frequens.
751. *canaliculatus* Gyll. — I. Budapest, Kalocsa, Nyiregyháza. II. Zákány. III. Trencsén. IV. Bártfa, Tolcsva. V. N.-Szeben.
752. *palposus* Zett. — I. Budapest. IV. Királyháza.
753. *ruralis* Er. — I. Budapest. III. Tátrafüred. V. Fogaras. VI. Grebenácz.
754. *nitens* Steph. — I. Budapest. (Leg. J. Pável.)
755. *foraminosus* Er. — V. Segesvár. VI. Grebenácz.
756. *melanopus* Marsh. — V. Vallis Lotrióra, Nagy-Szeben.
757. *cautus* Er. — II. Soóly. V. Vallis Lotrióra, N.-Szeben, Brassó.
758. *vafellus* Er. — I. Budapest. IV. M.-Sziget. V. N.-Csür.
759. *fuscipes* Grav. — I. Budapest, Kalocsa, Nyiregyháza. IV. S.-A.-Ujhely, A.-Bereczki. V. N.-Szeben.
760. *Argus* Grav. — I. Budapest. IV. S.-A.-Ujhely, A.-Bereczki, N.-Bocskó.
761. *opticus* Grav. — I. Budapest, Nyiregyháza. V. N.-Szeben.
762. *eumerus* Kiesw. — IV. M.-Sziget, Mons Hoverla. V. Segesvár.
763. *crassus* Steph. — I. Kalocsa, Nagy-Várad. III. Poprád. IV. Bártfa. V. Brassó, Hosszufalu.
764. *formicetorum* Mannh. — I. Bpest, Kecskemét, Kalocsa.
765. *nigritulus* Gyll. — I. Kalocsa, Nagy-Várad. V. N.-Szeben. VI. Mehádia.
766. *brunnipes* Steph. — I. Budapest. III. Tátra-Füred.
767. *latifrons* Er. — I. Budapest. IV. Torna, S.-A.-Ujhely. V. M.-Záh.
768. *fulvicornis* Steph. (*paganus* Er.) — V. Secundum Seidlitz (345, p. 393).
769. *tarsalis* Ljungh. — I. Kalocsa. II. Pécs. III. Trencsén, Tátrafüred. IV. Bártfa, Mons Vihorlat, M.-Sziget.
770. *similis* Hbst. — I. N.-Várad. III. Trencsén, Tátra (Lersch villa). IV. Bártfa, M.-Laborcz,

Mons Pop-Iván. V. Puj, Hátszeg, Sz.-Ujfalu, Segesvár, Kőhalom, Héviz. VI. Ferenczfalva, Mehádia. VII. Eszék.

771. *solutus* Er. — I. Kalocsa. V. N.-Szeben, Szent-Erzsébet, Vöröstorony.

772. *cicindeloides* Schall. — In toto regno occurrit.

773. *fornicatus* Steph. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa, Hadház. IV. K.-Majtény. V. Brassó.

774. *pubescens* Steph. — I. Budapest. (Legit J. Frivaldszky.)

775. *binotatus* Ljungh. — I. Budapest, Kalocsa, Nyiregyháza. II. D.-Örs. III. Tátra (Rókuszpatak). IV. S.-A.-Ujhely, A.-Bereczki, Szatmár. V. Tasnád, N.-Szeben, Holczmány, M.-Záh. VII. Mrzla-Vodica.

776. *pallitarsis* Steph. — I. Budapest, Kalocsa, Debreczen. IV. S.-A.-Ujhely, Lelesz, Alsó-Bereczki, Czéke, Vallis Fajna. V. Tasnád, Holczmány.

777. *picipes* Steph. — IV. Bártfa. V. Hátszeg, Segesvár.

778. *bifoveolatus* Gyll. — IV. Tokaj. V. Zilah, Segesvár.

779. *flavipes* Steph. — I. Kalocsa, N.-Várad. IV. M.-Sziget. VI. Oravicza.

780. *cordatus* Grav. (*princeps* Hampe). — In regione VII. (Hampe, 150, p. 349.)

781. *hospes* Er. — VIII. Fiume. (Leg. L. Biró.)

782. *cyaneus* Baudi. — IV. Mons Szinnaikő. (Leg. Dr. C. Chyzer.)

783. *glacialis* Heer. — III. Mons K.-Kriván, Árva-Váralja, Tátrafüred. IV. Mons Vihorlat, Rahó, Cserna-Hóra. VIII. Fiume.

784. *subaeneus* Er. — VI. Mehádia. VIII. Vallis Draga.

785. *fuscicornis* Er. — I. Budapest. II. Baán. V. T.-Szarvad. VI. Mehádia.

786. *elegans* Rosh. — VI. Mehádia. (Leg. J. Pável.)

787. *scaber* Fauv. — VIII. Fiume. (Leg. L. Biró.)

788. *pallipes* Grav. — I. Budapest, Kalocsa, Nagy-Várad. II. Sopron. III. Mons K.-Kriván, Tátrafüred. IV. S.-A.-Ujhely, A.-Bereczki, Szomotor, Vallis Fajna. V. Vallis Lotrióra, N.-Szeben. VI. Rumunyest.

789. *aceris* Steph. — VIII. Fiume. (Leg. L. Biró.)

790. *impressus* Germ. — I. Budapest, Nagy-Várad. III. Trencsén, Tátrafüred. V. Nagy-Szeben, Segesvár.

791. *geniculatus* Grav. — III. Vallis Vrátna. V. N.-Szeben. VI. Mehádia.

792. *flavipalpis* Thoms. — I. Kecskemét. III. Vallis Vrátna, Mons K.-Kriván, Tátra (Marmotahegy). V. Sztána, Segesvár.

793. *palustris* Er. — I. Kalocsa. III. Trencsén. V. N.-Szeben, Héviz, Segesvár.

794. *coarcticollis* Epp. — IV. Mons Hoverla. V. Montes Radnaenses. VI. Oravicza, Mehádia.

795. *Erichsoni* Rye. — I. Budapest, Márton-Káta, Kalocsa, N.-Várad, Kóly. II. Boglár, Szt.-Márton, III. Mons K.-Kriván, Koritnyicza. IV. Sátoralja-Ujhely, Czéke, Homonna, Mons Szinnaikő, Beregszász. V. Zilah, Pele, Hátszeg, Brassó, Kőhalom, Segesvár. VI. Ferenczfalva, Zlaticza, Mehádia. VII. Fužine, Raduč, Gospić. VIII. S.-Giorgio.

796. *Kolbei* Gerhardt. — V. Montes Radnaenses. (Ganglbauer, 399, p. 174.)

797. *Reitteri* Weise. — IV. Luhi, Rahó.

798. *Hopffgarteni* Epp. — VII. Capella. (Reitter 297, p. 40.)

799. *montivagus* Heer v. *carpathicus* Ganglb. — IV—VI. In regionibus subalpinis frequens.

Euaesthetus Grav.

800. *bipunctatus* Ljungh. — I. Kalocsa Nyiregyháza. III. Trencsén.

801. *ruficapillus* Lac. — I. Budapest, Kalocsa. IV. S.-A.-Ujhely. V. N.-Szeben.

802. *laeviusculus* Mannh. — V. N.-Szeben. (Legit A. Ormay, 266, p. 12.)

Oxyporus F.

803. *rufus* L. — I. Budapest, Kalocsa, Debreczen. II. Sopron, Pécs. III. Trencsén, Koritnyicza. IV. N.-Mihály, Olyka. V. Hátszeg, N.-Szeben, Montes Kerczenses, N.-Csür, Fogaras, Brassó, Medgyes, Sz.-Régen, Deés, M.-Záh.

804. *Mannerheimi* Gyll. — VI. Herkulesfürdő. (Leg. J. Pável.)

805. *maxillosus* F. — II. Zircz. III. Beszterczebánya, Hermánd, Montes Szoblahóenses, IV. Mons Vihorlat, Olyka, V. Hátszeg, Nagy-Csür, Montes Felekenses et Kerczenses, Brassó, Bodza, Sz.-Régen. VI. Stájerlak.

Platysthetus Mannh.

806. *cornutus* Grav. — Communis.

807. *alutaceus* Thoms. — IV. Kassa, Nagy-Bocskó. V. Segesvár.

808. *spinosus* Er. — I. Budapest, Kalocsa. VI. Mehádia.

809. *capito* Heer. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa, N.-Várad. III. Kékkő, Vallis Vrátna. IV. Kassa, Bártfa, S.-A.-Ujhely, Czéke. V. Tasnád, Peér, S.-Ujlak, N.-Szeben, Segesvár. VI. Stájerlak, Dognácska, Mehádia. VII. Diakovár.

810. *nodifrons* Sahlb. — I. Szoboszló. IV. Bártfa, Tolcsva, Kis-Azar. V. Nagy-Szeben, Nagy-Sink, Sz.-Régen.

811. *nitens* Sahlb. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa. II. N.-Vázsony. III. Verebély, Szaláncz. IV. Kassa, S.-A.-Ujhely, Varannó. V. Sz.-Ujvár. VI. Temesvár.

812. *arenarius* Fourc. — Frequens.

Oxytelus Grav.

813. *rugosus* F. — Communis.

814. *opacus* Kr. — I. Kalocsa. V. Fogaras. VI. Ferenczfalva.

815. *rugifrons* Hochh. — I. Kalocsa. III. Trencsén. V. Hátszeg, N.-Sink, Sz.-Régen.

816. *insecatus* Grav. — I. Budapest, Kalocsa, Szoboszló, Kóly. III. K.-Kálna, Trencsén, Tátrafüred. IV. S.-Patak, Gesztely, Sztropkó, Mező-Laborcz. V. N.-Szeben, Holczmány, N.-Sink. Sz.-Régen.

817. *fulvipes* Er. — III. Trencsén (secundum J. Frivaldszky).

818. *laqueatus* Marsh. — I. Parád. II. N.-Vázsony. III. Trencsén, Tátrafüred. IV. Bártfa, Mező-Laborcz. V. Vizakna, Nagy-Sink, Bárczaság, Sz.-Régen.

819. *piceus* L. — Frequens.

820. *sculptus* Grav. — I. Budapest, Kalocsa, Mező-Túr. III. Trencsén, Tátrafüred. IV. Bártfa, Parnó, Terebes. V. Brassó, Segesvár, M.-Záh. VI. Mehádia.

821. *inustus* Grav. — I. Budapest, Kalocsa. II. Kőszeg. III. K.-Kálna, Trencsén. V. Zilah. VI. Temesvár, Resicza, Mehádia. VIII. Fiume.

822. *politus* Er. *(bisulcatus* Petri). — I. P.-Poó. V. Segesvár. VI. Mehádia.

823. *sculpturatus* Grav. — I. Budapest, Kalocsa. III. Trencsén. IV. Mons Vihorlat. V. N.-Szeben, Vöröstorony, Segesvár. VI. Stájerlak, Orsova, Mehádia. VII. Medak, Velebit. VIII. Fiume, Crkvenica.

824. *nitidulus* Grav. — Communis.

825. *intricatus* Er. — I. Kecskemét, Kalocsa. IV. Czéke. V. Nagy-Szeben, Sz.-Régen.

826. *complanatus* Er. — I. Bpest, Péczel, Kalocsa, III. K.-Kálna, ad rivum Béla. IV. Sztropkó, Ladomér, N.-Mihály. V. S.-Ujlak, Segesvár, Oláhfalu. VI. Grebenácz. VIII. Fiume.

827. *pumilus* Er. — I. Kecskemét, Kalocsa, Montes Biharenses

828. *speculifrons* Kr. — IV. N.-Mihály. (Legit Dr. C. Chyzer.)

829. *clypeonitens* Pand. — III. Tátra (Lersch villa). IV. Bártfa. V. Pele, Montes Retyezát, Vallis Lotrióra, Montes Kerczenses, Brassó.

830. *tetracarinatus* Block. — Communis.

831. *hamatus* Fairm. — V. Montes Kerczenses. (Bielz, 27, p. 57.)

832. *tetratoma* Czwal. — In regione VII. (Cat. Col. Eur., 1891, p. 114.)

Haploderus Steph.

833. *caelatus* Grav. — Frequens.

834. *caesus* Er. — I. Budapest, Kalocsa, Nyiregyháza. IV. Bártfa, Tolcsva, Vallis Fajna. V. Sz.-Ujfalu, Semesnye. VI. Orsova, Mehádia.

Bledius Mannh.

835. *furcatus* Ol. — II. Lacus Fertő, Zircz. V. Déva. VI. Grebenácz.

836. *tricornis* Herbst. — I. Budapest, Péczel, Kecskemét, Hadház, Debreczen, Konyár. II. D.-Örs, Lacus Fertő, Z.-Tapolcza, Lelle. IV. Rónaszék. V. Sz.-Ujvár, Vizakna, Segesvár, Gy.-Tölgyes. VI. Titel.

837. *unicornis* Germ. — I. Kalocsa, Debreczen. II. Lacus Fertő. V. Déva, Vizakna. VI. Temesvár.

838. *bicornis* Germ. — II. Zircz. V. Vizakna.

839. *littoralis* Heer. — IV. Mons Menczul. V. Brassó, Prázsmár.

840. *opacus* Block. — I. Budapest, Kalocsa. III. Trencsén. IV. Királyháza, Rónaszék. V. Nagy-Szeben, Berethalom, Sz.-Régen. VI. Mehádia

841. *atricapillus* Germ. — I. Kalocsa. IV. Sátoralja-Ujhely. V. Kákova, Segesvár.

842. *nanus* Er. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa.

843. *defensus* Fauv. — In regione VII. (Cat. Col. Eur., 1891, p. 115.)

844. *fracticornis* Payk. — I. Budapest, Kalocsa. III. Beszterczebánya, Trencsén, Koritnyicza, Tátrafüred, Rozsnyó. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj. V. N.-Szeben, Sz.-Régen. VI. Palics, Temesvár, Pancsova.

845. *longulus* Er. — I. Hadház. V. Segesvár.

846. *crassicollis* Lac. — I. Budapest. II. Ács. IV. Bártfa, Montes Vihorlat et Hoverla. V. Berethalom, Barót. VI. Mehádia.

847. *cribricollis* Heer. — I. Budapest, Kalocsa. III. Beczkó, Koritnyicza, Tátrafüred. IV. Varannó. V. Nagy-Enyed, Hátszeg, Sz.-Ujfalu, Medgyes, Segesvár, Sz.-Régen. VII. Eszék.

848. *heterocerus* Epp. — In regione VII. (Auctor, 78, p. 180.)

849. *dissimilis* Er. — I. Budapest, Kalocsa, Nyiregyháza. II. D.-Örs, Ács. III. K.-Kálna. IV. Szomotor. V. N.-Szeben, Brassó. VI. Grebenácz, Báziás.

850. *erraticus* Er. — IV. Mons Szinnaikő. V. Nagy-Szeben.
851. *Baudii* Fauv. — IV. Bártfa. (Legit A. Mihalovics.)
852. *arenarius* Pk. — I. Budapest. V.-Torda, Nagy-Szeben, Sz.-Régen.
853. *talpa* Gyll. — IV. Mons Hoverla. (Legit J. Pável.)
854. *subterraneus* Er. — III. Trencsén. V. Nagy-Szeben.
855. *pallipes* Grav. — V. N.-Szeben, Sz.-Régen.
856. *tibialis* Heer. — I. Budapest. III. Trencsén.
857. *fossor* Heer. — VI. Grebenácz, Mehádia.

Trogophloeus Mannh.

858. *dilatatus* Er. — III. Trencsén, ad rivum Kisucza. IV. N.-Mihály, Mons Szinnaikő, Visk, Királyháza. V. N.-Szeben. VI. Mehádia.
859. *arcuatus* Steph. — V. N.-Csür. VI. Mehádia.
860. *riparius* Lac. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa, N.-Várad. II. D.-Örs. III. Kis-Kálna, Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Ungvár. V. Nagy-Szeben, Medgyes, Sz.-Régen. VI. Grebenácz, Mehádia.
861. *bilineatus* Er. — I. Budapest, Péczel, Kecskemét. III. K.-Kálna. IV. S.-A.-Ujhely, Terebes, N.-Mihály, Körtvélyes, Ungvár. V. Pele, Nagy-Szeben, Barót, Segesvár, Szász-Régen. VI. Grebenácz. VII. Diakovár.
862. *memnonius* Er. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa. II. D.-Örs, Pécs. IV. K.-Helmecz, Nagy-Mihály. VI. Pancsova, Báziás.
863. *fuliginosus* Grav. — I. Budapest. III. Beszterczebánya. IV. Bártfa. V. Segesvár. VI. Temesvár.
864. *impressus* Lac. — II. D.-Örs. IV. S.-A.-Ujhely. V. Barót, Segesvár. VII. Diakovár.
865. *corticinus* Grav. — Frequens.
866. *elongatulus* Er. — I. Kalocsa. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Homonna, Beregszász. V. N.-Talmács, N.-Szeben, Brassó.
867. *nitidus* Baudi. — I. Budapest, Kalocsa. IV. S.-A.-Ujhely. VI. Grebenácz.
868. *punctatellus* Er. — IV. Nagy-Károly. V. Vallis Lotrjóra, Brassó.
869. *foveolatus* Sahlb. — VI. Temesvár. (Legit Dr. V. Szmolay, 365, p. 38.)
870. *halophilus* Kiesw. — II. Lacus Fertő. VI. Grebenácz.
871. *pusillus* Grav. — I. Budapest, Péczel.
872. *gracilis* Mannh. — I. Budapest, Hadház.
873. *subtilis* Er. — I. Budapest. (L. J. Frivaldszky.)
874. *despectus* Baudi. — I. Kecskemét, Szeged. IV. Páczin. VI. Palics.
875. *exiguus* Er. — I. Kalocsa. IV. Királyháza. V. Gyulafehérvár.

Ochthephilus Rey.

876. *Rosenhaueri* Kiesw. — Habitat etiam Hungariam (Ganglbauer, 144, II, p. 668).
877. *longipennis* Fairm. — III. Mons K.-Kriván, Tátrafüred. IV. Luhi.
878. *aureus* Fauv. — V. Lacus Bulea. (Legit A. Ormay, 266, p. 12.)

Compsochilus Kr.

879. *palpalis* Er. — I. Kalocsa. II. Ács, N.-Vázsony. III. V.-Mikola. IV. S.-A.-Ujhely. V. N.-Szeben.
880. *Heydeni* Epp. — I. M.-Káta, Kalocsa, Makó. II. Pécs. VI. Titel, Pancsova. VII. Županje.
881. *Kahri* Kr. — I. Budapest, Kalocsa. VI. Temesvár.

Coprophilus Latr.

882. *striatulus* F. — I. Kalocsa, N.-Várad, Nyiregyháza. III. Trencsén. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely. V. Tasnád, N.-Csür, N.-Sink, Sz.-Régen.
883. *piceus* Solsky. — I. Kalocsa. IV. Szomotor.

Syntomium Curt.

884. *aeneum* Müll. — IV. Bártfa, M.-Sziget. V. Mons Korongyos, Vöröstorony. VI. Mehádia.

Deleaster Erichs.

885. *dichrous* Grav. — I. Budapest. II. Kenese. III. Nyitra, Beczkó, Koritnyicza, Árva-Váralja. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely. V. N.-Szeben, Vöröstorony, Brassó. VI. Stájerlak, Mehádia, Korniaréva.
v. *Leachi* Curt. — V. Volkány, ad balneum Gyógy, Sz.-Sebes, Vallis Czód, Vöröstorony, F.-Sebes, Porcsesd, N.-Sink, Brassó, Hosszufalu. VI. Herkulesfürdő.

Anthophagus Grav.

886. *bicornis* Block. — In regionibus montanis frequens.
v. *marginicollis* Epp. — In reg. VII. (Auctor, 78, p. 181.)
887. *forticornis* Kiesw. — III. Tátrafüred. (Legit J. Frivaldszky.)
888. *sudeticus* Kiesw. — III. Trencsén. IV. Mons Pop-Iván. V. Montes Cibinenses, Mons Negován. Montes Kerczenses, Mons Bucsecs.
889. *alpinus* F. — III. Beszterczebánya, Hermánd, Lacus Zöldtó dictus. IV. Mons Lungacsásza, Cserna-Hóra. V. Mons Surian, Montes Cibinenses, Kerczenses et Brassóenses.

890. *abbreviatus* F. — I. Mons Pilis, Montes Biharenses. V. Brassó, Bodza. VI. Herkulesfürdő. VII. Fužine. VIII. Fiume.

891. *melanocephalus* Heer. — V. Montes Cibinenses et Fogarasenses.

892. *omalinus* Zett. — III. Mons K.-Kriván, Koritnyicza, Mons Chocs, Tátrafüred. IV. Montes Turkul et Breczkul, Cserna-Hóra.

893. *alpestris* Heer. — III. Beszterczebánya, Hermánd, Turcsek, Trencsén, Koritnyicza, Oravicz. IV. Montes Breczkul, Balzatul, Pietrosz et Poplván. V. Mons Surian, Montes Cibinenses Præsbe, Montes Felekenses, Kerczenses et Fogarasenses, Borszék. VI. Ferenczfalva.

894. *caraboides* L. — In regionibus montanis occurrit.

895. *praeustus* Müll. — V. Sz.-Ujvár. (Legit A. Ormay, 266, p. 12.)

Geodromicus Redtb.

896. *plagiatus* F. — III. Tátrafüred. IV. M.-Laborcz. V. Montes Kerczenses, Borszék. VI. Mehádia.

v. *nigrita* Müll. — III. Trencsén, Koritnyicza, Tátrafüred. IV. M.-Laborcz. V. Montes Kerczenses. VI. Korniaréva.

v. *puncticollis* Weise (*cordicollis* Petri). — III. Tepla, Tátra (Bélapatak, Turista-út). IV. Luhi, Mons Balzatul. V. Segesvár.

Lesteva Latr.

897. *pubescens* Mannh. — I. Kalocsa. III. Trencsén, Tátrafüred. V. F.-Vidra, Remete, Montes Cibinenses, N.-Szeben, N.-Disznód, Vöröstorony, Sz.-Régen.

898. *longelytrata* Goeze. — I. Kerepes. III. Trencsén, Koritnyicza. IV. Bártfa, Gáboltó, Sátor-Alja-Ujhely, S.-Patak, M.-Sziget. V. Pele, Nagy-Csür, F.-Venicze. VI. Temesvár, Mehádia.

v. *maura* Er. — I. Kerepes. V. Hátszeg, Montes Cibinenses, N.-Szeben, Sz.-Régen. VI Stájerlak.

899. *punctata* Er. — IV. Luhi. V. Montes Cibinenses, Præsbe.

900. *sicula* Er. — IV. Luhi. (Leg. E. Reitter.)

Niphetodes Mill.

901. *Redtenbacheri* Mill. — IV. Cserna-Hóra, Mons Pietrosz. V. Montes Ünökő et Negoi.

902. *Eppelsheimi* Ganglb. — V. Mons Korongyos. (Auctor, 399, p. 178.)

903. *Deubeli* Ganglb. — V. Montes Ünökő et Bucsecs.

Eudectus Redtb.

904. *Giraudi* Redtb. — IV. Mons Hoverla. (Leg. J. Frivaldszky.)

Coryphium Steph.

905. *angusticolle* Steph. — IV. Rahó. VI. Mehádia.

Olophrum Er.

906. *fuscum* Grav. — III. Montes ad Zsolna. (Leg. Dr. C. Brancsik, 40, p. 23.)

907. *boreale* Payk. — V. Segesvár. (Leg. Dr. C. Petri, 269, p. 10.)

908. *assimile* Payk. — I. Budapest. II. Z.-Tapolcza. III. Zsolna. IV. Nagy-Mihály, M.-Sziget, K.-Majtény, Bikszád. V. Sz.-Ujvár, N.-Szeben, Brassó.

909. *puncticolle* Epp. — I. Budapest. II. Pécs.

910. *alpinum* Heer. — I. Alpes Bohodej. III. Mons Chocs, Tátrafüred. IV. Montes Lungacsásza et Pietrosz. VI. Korniaréva.

Deliphrum Er.

911. *crenatum* Grav. — I. Feketeerdő, Sólyomkő. V. Montes Kerczenses.

912. *tectum* Payk. — IV. K.-Azar. (Leg. Dr. C. Chyzer.)

Lathrimaeum Er.

913. *unicolor* Marsh. — V. Montes Cibinenses. VI. Resicza.

914. *atrocephalum* Gyll. — I. Budapest, Kalocsa, N.-Várad. III. Trencsén. IV. Páczin, Czéke, Olyka, N.-Bocskó. V. Pele, ad balneum Gyógy, Praesbe, Brassó. VI. Mehádia. VII. Fužine.

915. *melanocephalum* Ill. — I. Budapest, Debreczen. III. Vallis Vrátna. IV. S.-A.-Ujhely, Sáros-Patak, Bély, Terebes, Mons Szinnaikő, N.-Bocskó. V.-Peér, Præsbe, Montes Cibinenses, Sz.-Régen. VI. Báziás, Mehádia.

Amphichroum Kr.

916. *canaliculatum* Er. — III. Zsolna, Tátrafüred. IV. Montes Rabaszkala, Vihorlat, Szinnaikő et Hoverla. V. Montes Cibinenses et Kerczenses. VI. Temesvár, Mehádia.

Acidota Steph.

917. *crenata* F. — III. Mons K.-Kriván, Koritnyicza, Mons Chocs. IV. Mons Pietrosz. V. Felső-Sebes, Montes Kerczenses.

918. *cruentata* Mannh. — I. Budapest, Kalocsa. V. Zilah.

Arpedium Er.

919. *quadrum* Grav. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa. II. D.-Örs. III. Tátra (Zöldtó). V. Montes Cibinenses.

920. *macrocephalum* Epp. — III. Mons K.-Kriván. (Leg. Dr. C. Brancsik, 40, p. 23.)

921. *brachypterum* Grav. — III. Trencsén (Klakhegy), Lacus ad Felka.

Philorinum Kr.

922. *Hopffgarteni* Epp. — In regione V. (Auctor, 79, p. 297.)

Xylodromus Heer.

923. *concinnus* Marsh. — I. Budapest, Kalocsa. IV. S.-A.-Ujhely, A.-Bereczki, Mád. V. Pele, Montes Cibinenses, Volkány, Brassó.

924. *depressus* Grav. — I. Budapest. III. Beszterczebánya. IV. Mons Rabaszkala, N.-Bocskó. V. N.-Szeben, Montes Cibinenses et Kerczenses, Brassó. VI. Mehádia, Rumunyest.

925. *testaceus* Er. — I. Budapest, Péczel, Szombatság. II. Sopron. V. Zilah, N.-Szeben. VI. Csenej, Mehádia. VII. Mons Sveto-Brdo.

Omalium Grav.

926. *planum* Payk. — I. Száldobágy. III. Tátrafüred. IV. Mons Szinnaikő, M.-Laborcz. V. Vallis Lotrióra, N.-Szeben, N.-Csür, Brassó (Czenk). VI. Resicza, Mehádia.

927. *lapponicum* Zett. — V. Papolcz (sec. J. Frivaldszky).

928. *monilicorne* Gyll. — III. Zsolna. V. Montes Radnaenses, Brassó (Czenk).

929. *pusillum* Grav. — IV. Mons Hoverla. V. Nagy-Szeben. VI. Korniaréva. VIII. Buccari.

930. *rivulare* Payk. — I. Budapest, Kalocsa. II. D.-Örs, Soóly, Pécs. III. Beszterczebánya, Turcsek, Rosnyó. IV. S.-A.-Ujhely, A.-Bereczki, Tolcsva, Tokaj, Mons Vihorlat. V. Tasnád, Montes Kerczenses, Brassó, Sz.-Régen. VI. Zlaticza.

931. *validum* Kr. — VI. Mehádia. (Leg. J. Pável.)

932. *oxyacanthae* Grav. — I. Kalocsa. III. Koritnyicza. V. Montes Radnaenses. VI. Grebenácz.

933. *excavatum* Steph. — III. Koritnyicza. IV. Montes Szinnaikő, Hoverla et Lungacsásza. V. Montes Radnaenses, N.-Szeben, N.-Csür, Medgyes. VI. Mehádia. VII. Vagan.

934. *ferrugineum* Kr. — III. Mons K.-Kriván, Tátrafüred. VI. Mehádia. VIII. Carlopago.

935. *caesum* Grav. — Frequens.

936. *scabriusculum* Kr. — II. Kapuvár. IV. Bártfa, Cserna-Hóra. V. Mons Sánta, Montes Cibinenses.

937. *iopterum* Steph. — I. Budapest, Márton-Káta, Kalocsa, Nagy-Várad. IV. Kassa, S.-A.-Ujhely, Szomotor, M.-Sziget. VI. Mehádia.

938. *melanocephalum* F. — I. Kalota. III. Vallis Vrátna. IV. Kassa, Montes Vihorlat, Szinnaikő et Hoverla. V. N.-Szeben, Montes Cibinenses, Sz.-Régen. VI. Mehádia.

939. *florale* Payk. — I. Budapest, N.-Várad. II. Pécs. III. Jobbágyi, Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Nagy-Mihály. V. N.-Szeben, N.-Csür, Montes Cibinenses, Sz.-Régen.

v. *nigrum* Grav. — I. Bpest, Kalocsa, Szeged, III. Trencsén, T.-Szt.-Márton. IV. N.-Bocskó. V. Montes Cibinenses. VI. Mehádia, Rumunyest.

940. *salicis* Gyll. — I. Budapest, Nagy-Várad. IV. S.-A.-Ujhely. V. N.-Szeben. VI. Mehádia, Rumunyest.

941. *striatum* Grav. — I. Budapest. V. Montes Cibinenses.

Hapalaraea Thoms.

942. *pygmaea* Payk. — I. N.-Várad. II. N.-Vázsony. III. Trencsén. IV. N.-Bocskó. VI. Mehádia.

Acrulia Thoms.

943. *inflata* Gyll. — I. Tőtös. III. Trencsén. IV. Bártfa, Mons Rabaszkala, Olyka, M.-Laborcz, Mons Hoverla, V. Montes Cibinenses, Præsbe, N.-Disznód. Mons Szurul, Montes Kerczenses et Radnaenses. VI. Szekul, Mehádia.

Anthobium Steph.

944. *abdominale* Grav. — I. Budapest. III. Tátrafüred. IV. Bártfa. V. Fogaras, Brassó. VIII. Fiume.

945. *signatum* Märk. — III. Hermánd, Koritnyicza, Mons Chocs, Tátrafüred. IV. Bártfa.

946. *limbatum* Er. — III. Tátrafüred. IV. Bártfa, Körtvélyes. V. Mons Sánta, Resinár, Brassó (Czenk). VI. Mehádia.

947. *primulae* Steph. — V. Vallis Czód, K.-Disznód, Fenyőfalva, Brassó.

948. *Viertli* Ganglb. — II. Pécs. (Detex. A. Viertl; Auctor, 144. II, p. 748.)

949. *florale* Pz. — I. Budapest. IV. Bártfa, Mons Rabaszkala, Czéke, Mons Pietrosz. V. Nagy-Szeben, K.-Disznód, Fogaras, Brassó, Botfalu, Segesvár, Sz.-Régen. VI. Mehádia.

950. *minutum* F. — I. Sólyomkő. III. Trencsén, Koritnyicza. IV. Bártfa, M.-Laborcz, Runyina, Mons Lungacsásza. V. Montes Cibinenses, Brassó, Oláhfalu.

951. *obsoletum* Er. — V. Montes Cibinenses. (Bielz, 27, p. 58.)

952. *torquatum* Marsh. — V. Mons Sánta (Montes Cibinenses), Montes Kerczenses.

953. *aucupariae* Kiesw. — III. Tátrafüred. V. Segesvár.

954. *Marshami* Fauw. — V. K.-Disznód, Brassó.
955. *rectangulum* Fauv. — III. Vallis Vrátna. IV. Bártfa.
956. *sorbi* Gyll. — I. Budapest. III. Trencsén, Koritnyicza. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, Mons Szinnaikő, Runyina. V. N.-Szeben. K.-Disznód, Fogaras, Brassó, Medgyes. VI. Stájerlak, Mehádia.
957. *rhododendri* Baudi. — IV. O.-Ruszka. (Leg. Dr. C. Chyzer.)
958. *ophthalmicum* Pk. — III. Hermánd, Koritnyicza, Javorina. IV. Mons Hoverla. V. Montes Retyezát et Cibinenses, Sz.-Régen.
959. *Kraatzi* Bris. — In reg. VII. (Cat Col. Eur., 1891, p. 121.)
960. *longipenne* Er. — In regionibus subalpinis frequens.
961. *palligerum* Ksw. — V. Montes Cibinenses et Kerczenses. VII. Fužine, Capella.
962. *alpinum* Heer (*montanum* Er.) — I. Alp. Bohodej. III. Trencsén, Tátrafüred. IV. O.-Ruszka, Runyina, Montes Pietrosz et Pop-Iván. V. Resinár, Montes Kerczenses, Papolcz.
963. *anale* Er. — III. Mons K.-Kriván, Koritnyicza, Montes Chocs, Zöldtó. IV. Montes Lungacsásza et Pietrosz. V. Montes Cibinenses.

Protinus Latr.

964. *ovalis* Steph. — VI. Mehádia. VIII. Sušak.
965. *brachypterus* F. — I. Budapest, Kalocsa, II. Soóly, Pécs. III. Verebély, Beszterczebánya, Hermánd, Tátrafüred. IV. Bártfa, Mons Rabaszkala, Homonna, Vallis Fajna. V. N.-Szeben, K.-Disznód, Montes Cibinenses et Kerczenses, Medgyes. VI. Rumunyest. VII. Crni-Dabar, Mrzla-Vodica.
966. *macropterus* Gyll. — I. Budapest, Kalocsa. III. Trencsén, Tátrafüred. IV. S.-A.-Ujhely, A.-Bereczki, Mons Szinnaikő, Lelesz. V. Mons Sánta, N.-Szeben, Præsbe, Brassó. VI. Mehádia.
967. *atomarius* Er. — V. N.-Szeben, Brassó. VI. Temesvár. VII. Mrzla-Vodica.
v. *oblongus* Petri. — V. Segesvár. (Detex. Auctor, 269, p. 22.)

Megarthrus Steph.

968. *depressus* Payk. — III. Beszterczebánya. IV. Cserna-Hóra. V. Mons Sánta, N.-Csür, Sz.-Régen.
969. *sinuatocollis* Lac. — III. Tátra (Lersch villa). IV. Bártfa, Hoverla, Rahó. V. Montes Radnaenses.
970. *affinis* Mill. — I. Budapest, Kalocsa. II. Soóly. III. Beszterczebánya, Trencsén, Hermánd. V. N.-Szeben. VI. Temesvár.
971. *denticollis* Beck. — I. Pályi csere. IV. Kassa, Mons Hoverla. V. N.-Szeben, Segesvár.
972. *hemipterus* Ill. — I. N.-Várad, Feketeerdő. III. Hermánd. IV. S.-A.-Ujhely, Olyka, Montes Szinnaikő et Balzatul. V. N.-Szeben, Sz.-Régen.

Phloeobium Er.

973. *clypeatum* Müll. — I. Budapest. II. Boglár, Pécs. III. Beczkó. IV. Olyka. V. Pele, Tasnád, ad balneum Gyögy. VI. Resicza, Mehádia.

Pseudopsis Newm.

974. *sulcata* Newm. — VII. Diakovár. (Leg. L. Biró.)

Phloeocharis Mannh.

975. *subtilissima* Mannh. — I. Tőtös. II. Pécs. III. V.-Mikola, Trencsén, Poprád. IV. S.-A.-Ujhely, S.-Patak, Papina. V. N.-Szeben, Montes Kerczenses, Brassó. VI. Ferenczfalva. VII. Našice.
976. *Birói* Epp. — VII. Mons Sveto-Brdo. (Detex. L. Biró; Auctor, 80, p. 220.)

Olistherus Heer.

977. *substriatus* Gyll. — I. Budapest, Rézbánya, IV. Montes Hoverla et Menczul. V. Montes Czódenses, Mons Negován, Montes Felekenses.

Siagonium Kirby.

978. *quadricorne* Kby. — I. Budapest, Kalocsa. III. K.-Kálna. IV. S.-A.-Ujhely, Gesztely. V. Nagy-Szeben. VII. Ljeskovac.
979. *humerale* Germ. — I. Budapest, Remecz. VI. Eszék.

Thoracophorus Motsch.

980. *corticinus* Motsch. — V. N.-Szeben. (Bielz, 27, p. 58.)

Fam. MICROPEPLIDAE.

Micropeplus Latr.

1. *porcatus* Payk. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, N.-Várad. II. Soóly. III. Trencsén. IV. Eperjes, S.-A.-Ujhely, M.-Sziget. V. Pele, Sz.-Régen. VI. Resicza.
2. *staphylinoides* Marsh. — I. Budapest, Hagymádfalva. IV. S.-A.-Ujhely. V. Peér, Vallis Lotrióra, Sz.-Ujfalu. VI. Grebenácz, Mehádia.
3. *fulvus* Er. — I. Kalocsa. II. N.-Vázsony. VII. Županje.
4. *latus* Hampe. — VII. Županje, Zágráb.
5. *laevipennis* Epp. — V. Montes Radnaenses. VI. Resicza.

Fam. PSELAPHIDAE.

Trimium Aub.

1. *Hopffgarteni* Reitt. — VI. Mehádia. (Leg. J. Pável.)
2. *latiusculum* Reitt. — VI. Oravicza, Mehádia. VII. V.-Gorica, Ljeskovac.
3. *brevicorne* Reichb. — I. Budapest, Hagymádfalva. III. Trencsén. IV. Mons Szinnaikő. V. Nagy-Szeben. VI. Temesvár, Mehádia. VIII. Fiume.
4. *Domogleti* Reitter. — VI. Herkulesfürdő. (Auctor, 301, 1881, p. 535).
5. *Emonae* Reitt. — V. Buzamező. VI. Herkulesfürdő. VII. Teste Ganglbauer.
6. *longipenne*. Reitt. — VII. Capella. (Auctor, 297, p. 46.)
7. *carpathicum* Saulcy — I. Hagymádfalva, Szombatság. IV. Czéke, Mons Hoverla. V. Ad balneum Gyógy. VI. Oravicza, Herkulesfürdő.

Euplectus Leach.

8. *Erichsoni* Aub. — VII. Ljeskovac. (Reitter, 297, p. 45.)
9. *nubigena* Reitt. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Szombatság. II. Zircz. V. Brassó. VI. Herkulesfürdő. VII. Ljeskovac.
10. *Fischeri* Aub. — I. Montes Biharenses. IV. Bártfa, Montes Rabaszkala et Hoverla. V. Montes Radnaenses et Kerczenses. Brassó. VI. Mons Szemenik. VII. Capella.
11. *carpathicus* Reitt. — IV. Com. Marmaros. V. Montes Radnaenses.
12. *tenuicornis* Reitt. — VI. Resicza. (Reitter, 301, 1884, p. 80.)
13. *brunneus* Grimm. — I. Montes Biharenses. IV. N.-Bocskó. V. Montes Kerczenses, Brassó, Montes Radnaenses. VII. Ljeskovac.
14. *Frivaldszkyi* Saulcy. — I. Mátra. IV. Rahó.
15. *Duponti* Aub. — IV. M.-Sziget, Rahó, Mons Hoverla, Liszsza-Hóra. V. Montes Radnaenses. VII. Capella.
16. *pelopis* Reitt. — I. Kalocsa. (Leg. F. Speiser, 349, p. 22.)
17. *piceus* Motsch. — I. Szombatság. IV. Mons Vihorlat. V. Vöröstorony, Montes Kerczenses, VII. Herkulesfürdő.
18. *nanus* Reichb. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Lunka. II. Nagy-Vázsony, Pécs. III. V.-Mikola, Trencsén. IV. Szerencs, Terebes, Mons Hoverla. V. Vallis Lotrióra, Nagy-Szeben, Montes Kerczenses, Fogaras, Brassó, Segesvár, VI. Mehádia. VII. Županje. V.-Gorica.
19. *sanguineus* Denny. — I. Budapest. II. Darócz, Baán. IV. S.-A.-Ujhely, Szomotor. V. N.-Szeben. VI. Mehádia.
20. *signatus* Reichb. — I. Budapest, Kalocsa, Nagy-Várad. III. Trencsén. IV. O.-Ruszka, Rónaszék. V. Brassó. VI. Mehádia.
21. *punctatus* Muls. — I. Rézbánya. IV. Mons Hoverla. V. Montes Kerczenses. VII. Capella.
22. *intermedius* Woll. — I. Feketeerdő. II. Zircz. IV. Mons Hoverla.
23. *Karsteni* Reichb. — Frequens.
24. *Spinolae* Aub. — IV. Csap. (Leg. E. Reitter.)
25. *ambiguus* Reichb. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Vallis Száldobágy. IV. S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Lelesz, Sztropkó, Páczin, Beregszász. V. N.-Szeben.

Bibloporus Thoms.

26. *bicolor* Denny. — I. Budapest, Péczel, N.-Várad. III. V.-Mikola. IV. K.-Helmecz, A.-Bereczki, K.-Azar, Montes Rabaszkala et Hoverla. V. Montes Radnaenses, Holczmány, Montes Kerczenses. VI. Oravicza, Mehádia.

Scotoplectus Reitt.

27. *Capellae* Reitt. — VII. Capella. (Auctor, 297, p. 44.)

Trichonyx Chaud.

28. *sulcicollis* Reichb. — I. Budapest. III. Zsolna, Rosnyó. IV. Jászó. V. N.-Szeben. VI. Temesvár, Stájerlak, Mehádia, Rumunyest. VII. V.-Gorica.

Amauronyx Reitt.

29. *Maerkeli* Aub. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. V. N.-Szeben, Holczmány. VI. Mehádia.

Batrisus Lap.

30. *Ormayi* Reitt. — V. Vallis Lotrióra, Vöröstorony, Vallis Riu-Vadului, K.-Disznód.
31. *formicarius* Aub. — I. Budapest, Péczel, Hagymádfalva. II. N.-Vázsony. IV. Varannó, Nagy-Bocskó. V. N.-Szeben, Fogaras, Brassó, Szász-Régen. VI. Mehádia. VII. Ljeskovac.
32. *Delaportei* Aub. — I. Parád, Hagymádfalva. IV. Bártfa. VI. Mehádia. VII., VIII. Communis.
33. *venustus* Reichenb. — I. Budapest, Péczel, Parád, Kalocsa, Debreczen, Hagymádfalva. II. Zircz, Pécs. III. V.-Mikola, K.-Kálna. IV. Bártfa, Sátoralja-Ujhely, A.-Bereczki, Szőllőske, Mons Vihorlat. V. N.-Szeben, N.-Csür, K.-Disznód, Montes Kerczenses. VI. Mehádia, Rumunyest. VII., VIII. Communis.

34. *adnexus* Hampe. — V. N.-Szeben. VI. Mehádia.
35. *exsculptus* Hampe. — V. N.-Szeben. (Bielz, 27, pag. 58.)
36. *oculatus* Aub. — I. Kalocsa. (Leg. F. Speiser.)

Bryaxis Leach.

37. *Lefebvrei* Aub. — I. Budapest. (Legit J. Frivaldszky.)
38. *xanthoptera* Reichb. — I. Budapest. IV. Lelesz, O.-Ruszka, Királyháza. V. Montes Kerczenses, Brassó. VI. Mehádia.
39. *haemoptera* Aub. — I. Budapest. V. Segesvár.
40. *fossulata* Reichb. — In toto regno frequens.
v. *aterrima* Reitt. — Secundum Auctorem in montibus Carpathicis. (301, 1881, p. 468.)
v. *rufescens* Reitt. — IV. Terebes, Homonna, Mons Szinnaikő, Máramaros-Sziget, Rahó. VII. Ljeskovac.
41. *tristis* Hampe. — IV. Csap, M.-Sziget, N.-Bocskó, Rahó. V. N.-Szeben. VI. Mehádia.
42. *Helferi* Schmidt. — I. Kalocsa, Nagy-Várad. II. Lacus Fertő. V. Déva.
43. *longispina* Reitt. — II. Ad lacum Fertő (Ganglb., 144, II, p. 810).
44. *haematica* Reichb. — Frequens.
45. *juncorum* Leach.—V. Vallis Lotrióra, Besztercze.
46. *nigriventris* Schaum. — III. Trencsén. (Legit Dr. C. Brancsik, 40, p. 23.)
47. *impressa* Pz. — I. Budapest, Kalocsa, Nyiregyháza, Debreczen. IV. K.-Helmecz, Czigánd. V. N.-Szeben, Brassó. VI. Szulicza, Mons Cserteg.
48. *antennata* Aub. — I. Budapest. IV. Páczin. V. Vöröstorony. VII. Švica. VIII. Fiume.

Rybaxis Saulcy.

49. *sanguinea* L. — Frequens.

Bythinus Leach.

50. *Ottonis* Ganglb. — II. Ad lacum Fertő. (Auctor, 400, p. 170.)
51. *Heydeni* Reitt. — VII. Capella, Ljeskovac, Švica.
52. *solidus* Reitt. — VIII. Fiume. (Leg. J. Pável.)
53. *crassicornis* Motsch. — Frequens.
54. *Viertli* Reitt. — VI. Mehádia. (Leg. J. Pável.)
55. *bajulus* Hampe. — I. Montes Biharenses. IV. Torna, Sz.-Váralja. V. Ad balneum Gyógy. N.-Szeben, Vallis Lotrióra, Vöröstorony, Brassó, Mons Bucsecs. VI. Resicza, Oravicza, Mehádia, Rumunyest.
56. *Attila* Saulcy. — VI. Herkulesfürdő. (Reitter, 295, p. 43.)
57. *Erichsoni* Kiesw.—VII. Capella, Ljeskovac, Švica.
58. *Reitteri* Saulcy. — I. Rézbánya. IV. Mons Rabaszkala, Nagy-Bocskó, Montes Hoverla et Zsihovecz. V. Montes Radnaenses, K.-Disznód, Montes Kerczenses. VI. Ferenczfalva.
59. *sculptifrons* Reitt. — I. Rézbánya. V. Montes Radnaenses, Malomviz, Vallis Lotrióra, Montes Kerczenses. Brassó (Czenk). VI. Mehádia. Rumunyest.
60. *carpathicus* Saulcy. — IV. Montes Rabaszkala, Hoverla et Menczul.
61. *muscorum* Kiesw. — I. Budapest. V. Brassó. VII. Zágráb, Capella.
62. *longulus* Kiesw. — VII. Capella, Ljeskovac.
63. *femoratus* Aub. — III. Trencsén. IV. Tolcsva, Mons Lungacsásza.
64. *Weisei* Saulcy. — IV. N.-Bocskó, Mons Hoverla. V. Montes Kerczenses.
65. *bulbifer* Reichb. — I. Budapest, Kalocsa. V. N.-Szeben, N.-Disznód, Sz.-Régen. VI. Mehádia. VII. Županje. V.-Gorica.
66. *clavicornis* Pz. — III. Beszterczebánya. IV. S.-A.-Ujhely, Mons Szinnaikő. VI. Mehádia.
67. *Curtisi* Denny. — I. Budapest, N.-Várad. IV. S.-A.-Ujhely, Montes Vihorlat et Szinnaikő, Rónaszék. V. Montes Radnaenses, N.-Szeben, N.-Disznód, K.-Disznód, Montes Kerczenses. VI. Szekul, Mehádia. VII. Fužine. VIII. Fiume.
v. *hungaricus* Reitt. — V. Ad balneum Gyógy. VI. Resicza, Mehádia.
68. *banaticus* Reitt. — VI. Ferenczfalva, Herkulesfürdő.
69. *nodicornis* Aub. — I. Kalocsa, Nagy-Várad. IV. Mons Hoverla. V. Ad balneum Gyógy, Nagy-Talmács, Vöröstorony, Montes Kerczenses Brassó. VI. Oravicza, Mehádia.
70. *ruthenus* Saulcy. — IV. Mons Szinnaikő, M.-Sziget, Mons Breczkul.
71. *Deubeli* Ganglb. — V. Ad balneum Valea-Vinului, Mons Korongyos.
72. *acutangulus* Reitt. — I. Kalocsa. IV. M.-Sziget. VI. Mehádia. VII. Ljeskovac.
73. *securiger* Reichb. — I. Budapest, Nagy-Várad. II. Pécs. IV. Czéke, Mons Hoverla, Rahó. V. Ad balneum Gyógy, N.-Szeben, Montes Kerczenses. VI. Mehádia.
74. *specialis* Saulcy. — I. N.-Várad. IV. M.-Sziget.
75. *distinctus* Chaud. — I. Budapest. IV. Mons Zsihovecz. V. N.-Szeben. VI. Mehádia.
76. *Hopffgarteni* Reitter. — V. N.-Szeben, Montes Cibinenses, Brassó. VI. Mehádia.
77. *lunicornis* Reitt. — V. Brassó. VI. Oravicza, Mehádia.

78. *Burelli* Denny. — I. Budapest, Kalocsa. IV. Mons Zsihovecz. V. N.-Szeben, Montes Cibinenses, Brassó VI. Mehádia.
79. *kninensis* Reitt. — VI. Mehádia. (Legit J. Frivaldszky.)
80. *Frivaldszkyi* Reitt. — IV. Mons Hoverla. (Detexit J. Frivaldszky.)
81. *nigripennis* Aub. — I. Budapest, Nagy-Várad. III. Beszterczebánya, Trencsén. IV. Gáboltó, Peticse, Mons Szinnaikő, M.-Laborcz, M.-Sziget, N.-Bocskó, Luhi, Rahó, Montes Hoverla et Pop-Iván, V. Montes Radnaenses, N.-Szeben, Nagy-Talmács, Vörőstorony, Montes Kerczenses, Brassó. VII. Capella.
82. *Brusinae* Reitt. — IV. M.-Sziget. VII. Ljeskovac, Švica.
83. *Stussineri* Reitt. — IV. Mons Hoverla, M.-Sziget, Rahó. VII. Capella.
84. *validus* Aub. — IV. Lelesz, Montes Hoverla et Menczul. V. Ad balneum Gyógy, Montes Radnaenses. VII. Zágráb, Švica.
85. *puncticollis* Denny. — I. Budapest, Kalocsa, N.-Várad. III. Trencsén. IV. Sátoralja-Ujhely, M.-Sziget. V. Ad balneum Gyógy, N.-Szeben, Montes Kerczenses, Fogaras, Brassó. VI. Oravicza, Mehádia.
86. *croaticus* Reitt. — VI. Mehádia. VII. Capella.

Tychus Leach.

87. *niger* Pk. — I. Budapest, Kalocsa. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Szomotor, K.-Helmecz, Velejte, Homonna, Mons Szinnaikő, Ungvár, Csap, Beregszász, Rahó, Nagy-Bocskó. V. S.-Ujlak, Sztána, Hátszeg, N.-Csür, Montes Kerczenses, Fogaras. VI. Oravicza, Mehádia. VII., VIII. Frequens.
v. *dichrous* Schmidt. — I. Kalocsa. V. Nagy-Szeben, Segesvár. VII. Károlyváros.
88. *hirtulus* Reitt. — I. Kalocsa. (Leg. F. Speiser, 349, p. 22.)
89. *rufus* Motsch. — VIII. Fiume. (Leg. L. Biró.)
v. *morio* Reitt. — VI. Herkulesfürdő. (Legit J. Frivaldszky.)
v. *puncticollis* Reitt. — VI. Herkulesfürdő. (Leg. J. Pável.)

Pselaphus Herbst.

90. *Heisei* Hbst. — Frequens.
91. *dresdensis* Hbst. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa.
92. *longicornis* Saulcy. — I. Kalocsa. VII. Károlyváros.
93. *mehadiensis* Friv. — VI. Herkulesfürdő. (Leg. J. Pável.)

Chennium Latr.

94. *bituberculatum* Latr. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. III. Hermánd.
95. *Steigerwaldi* Reitt. — VII. Gospić. (Auctor, 303, p. 16.)

Ctenistes Reichb.

96. *palpalis* Reichb. — In toto regno occurrit.

Tyrus Aub.

97. *mucronatus* Pz. — I. Budapest, Remecz, Tötös, Lunka. II. Pécs. IV. Tolcsva. V. Nagy-Szeben, K.-Disznód, Præsbe, Montes Kerczenses. VI. Oravicza, Mehádia. VII., VIII. Communis.
v. *costatus* Fleischer. — I. Hagymádfalva. (Leg. Auctor, 89, p. 86.)

Fam. CLAVIGERIDAE.

Claviger Preyssler.

1. *testaceus* Preyssl. — I. Budapest, Nagy-Várad. III. Beszterczebánya, Hermánd, Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj, N.-Bocskó. V. Hátszeg, Vallis Lotrióra, N.-Csür, K.-Disznód. VI. Mehádia.
2. *nitidus* Hampe. — VI. Mehádia. VII. Ogulin.
3. *longicornis* Müll. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. III. K.-Kálna. IV. Mármaros-Sziget. V. K.-Disznód. VII. Diakovár.

Fam. SCYDMAENIDAE.

Chevrolatia Duv.

1. *egregia* Reitter. — VI. Herkulesfürdő. (Auctor, 301, 1881, p. 545.)

Euthiconus Reitt.

2. *conicollis* Fairm. — In reg. VII. (Reitter, 301, 1881, p. 545.)
3. *parallelocollis* Saulcy. — V. Ad balneum Gyógy, Montes Kerczenses. VI. Mehádia. VIII. Fiume.

Euthia Steph.

4. *plicata* Gyll. — V. Brassó. (Bielz, 27, p. 59.)
5. *Merkli* Simon. — V. Teste Bielz. VI. Resicza.
6. *scydmaenoides* Steph. — I. Budapest, Péczel, N.-Várad. II. Pécs. IV. S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Sztropkó. V. Hátszeg, N.-Szeben. VII. V.-Gorica.
7. *linearis* Muls. — II. N.-Vázsony, Felsőlő.
8. *Deubeli* Ganglb. — V. Brassó. (Auctor, 402, p. 468.)

Cephennium Müll.

9. *laticolle* Aub. — IV. Bártfa, M.-Laborcz, Montes Szinnaikő et Hoverla, N.-Bocskó. V. Montes

Kerczenses. VI. Oravicza, Mehádia, Rumunyest. VII. Fužine.

10. *difficile* Reitt. — I. Montes Biharenses. V. Vallis Lotrióra. VI. Resicza, Mehádia.

11. *carnicum* Reitt. — VII. Konjsko, Velebit. (Auctor, 301, 1881, p. 549.)

12. *Reitteri* Bris. — I. Remecz. IV. Mons Hoverla. V. Vallis Zsil, N.-Szeben, K.-Disznód, Montes Kerczenses, Brassó. VI. Resicza, Oravicza, Mehádia.

13. *thoracicum* Müll. — I. Montes Biharenses. IV. N.-Bocskó. V. Hátszeg, Montes Kerczenses, Brassó. VI. Oravicza, Mehádia.

14. *hungaricum* Reitt. — I. Budapest, M.-Kovácsháza. V. Montes Radnaenses, Vöröstorony, Montes Cibinenses et Kerczenses. VI. Mehádia.

15. *carpathicum* Reitt. — IV. M.-Sziget, Liszsza-Hóra. VI. Mehádia.

16. *delicatulum* Reitt. — I. Budapest. IV. K.-Azar, Czéke.

17. *turgidum* Reitt. — VI. Mehádia. (L. J. Pável.)

18. *minutissimum* Aub. — I. Budapest. V. Nagy-Szeben, Szt-Erzsébet, Fogaras, Brassó.

19. *latum* Motsch. — III. Zsolna. (Legit Dr. C. Brancsik, 40, p. 24.)

20. *Saulcyi* Reitt. — VII. Capella, Velebit. (Auctor, 297, p. 47.)

Neuraphes Thoms

21. *angulatus* Müll. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Hagymádfalva. III. K.-Kálna. IV. S.-A.-Ujhely, Terebes, Lelesz, Páczin, Sztropkó. V. Nagy-Szeben. VI. Csenej. VII. Gospić.

22. *elongatulus* Müll. — I. Budapest. IV. Montes Rabaszkala et Hoverla. V. Ad balneum Gyógy, Præsbe, Vöröstorony, Montes Kerczenses et Porumbákenses, Brassó. VI. Temesvár, Mehádia, Rumunyest. VII. Frequens.

23. *semicastaneus* Reitt. — VII. Capella. (Auctor, 297, p. 47.)

24. *Capellae* Reitt. — VII. Capella. (Auctor, 303, p. 155.)

25. *ornatus* Reitt. — I. Budapest. II. Pécs. VI. Mehádia.

26. *longicollis* Motsch. — VI. Mehádia. (Legit J. Pável.)

27. *leptocerus* Reitt. — VI. Herkulesfürdő. (Auctor, 303, p. 157).

28. *geticus* Saulcy. — I. Péczel, Szombatság. IV. Csap, M.-Sziget. V. Ad balneum Gyógy, Vöröstorony, Montes Kerczenses, Brassó, Hosszufalu. VI. Mons Szemenik. VII. V.-Gorica.

29. *subparallelus* Saulcy. — IV. Comitatus Marmaros. V. Montes Radnaenses.

30. *latitans* Saulcy. — V. Ad balneum Gyógy, Montes Kerczenses, Brassó. VI. Mons Szemenik, Mehádia.

31. *tricavulus* Reitt. — VI. Ferenczfalva, Mons Domoglet.

32. *Hopffgarteni* Reitt. — I. Hagymádfalva. VI. Mehádia. VII. Capella.

33. *Diocletianus* Reitt. — Hungaria orientalis. (Auctor, 308, p. 171.)

34. *Sparshalli* Denny. — V. Segesvár. VI. Mehádia.

35. *Merkli* Saulcy. — VI. Resicza, Mehádia.

36. *minutus* Chaud. — Hungaria. (Reitter, 303, p. 168.)

37. *nigrescens* Reitt. — VI. Mehádia. (Auctor, 303, p. 168.)

Cyrtoscydmus Motsch.

38. *Godarti* Latr. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, N.-Várad. II. Pécs. IV. S.-A.-Ujhely, Szerencs, Csap, Mons Hoverla. V. N.-Szeben. VI. Mehádia, Rumunyest. VII. Gospić. VIII. Fiume.

39. *scutellaris* Müll. — I. Budapest. III. Putnok. IV. Czéke. V. Hátszeg, Vallis Lotrióra, Nagy-Szeben, N.-Csür. VI. Mehádia. VIII. Fiume.

40. *collaris* Müll. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, N.-Várad. IV. N.-Bocskó, N.-Szeben, Brassó. VI. Mehádia. VII. Fužine, Velebit.

41. *pusillus* Müll. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Nyiregyháza. IV. Mons Hoverla. V. Segesvár. VI. Mehádia.

42. *exilis* Er. (*croaticus* Hampe). — VII. Teste Hampe (150, p. 351).

Euconnus Thoms.

43. *claviger* Müll. — I. Péczel, Feketeerdő. IV. S.-A.-Ujhely. V. Segesvár.

44. *Mäklini* Mannh. — V. K.-Disznód. VI. Herkulesfürdő.

45. *Motschulskyi* Strm. — I. Budapest, Szombatság. V. N.-Szeben, Fogaras, Brassó, Sz.-Régen. VI. Oravicza, Mehádia. VII. Fužine, Gospić. VIII. Fiume.

v. *Kiesenwetteri* Kiesw. — I. Montes Biharenses. V. Ad balneum Gyógy, N.-Szeben, Vöröstorony, Montes Kerczenses, Brassó. VI. Mehádia.

46. *denticornis* Müll. — I. Montes Biharenses. III. Koritnyicza. IV. Mons Hoverla. V. Hátszeg, N.-Szeben, Szt-Erzsébet, Montes Kerczenses. VI. Mehádia. VII. Frequens.

47. *Schlosseri* Reitt. — VII. Capella. (Auctor, 297, pag. 48.)

48. *rutilipennis* Müll. — I. Budapest, Kalocsa, Nyiregyháza. IV. Lelesz, Királyháza, Szatmár.

49. *hirticollis* Ill. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, N.-Várad. III. Putnok. IV. Terebes, Páczin, Bacska. V. Sztána, N.-Szeben, Kercz, Sz.-Régen. VII. Ljeskovac.

50. *confusus* Bris. — I. Budapest. IV. Bártfa.

51. *Wetterhali* Gyll. — I. Budapest, Péczel, Nyiregyháza, N.-Várad. II. D.-Örs. III. Trencsén, Putnok. IV. S.-A.-Ujhely, A.-Bereczki, K.-Azar, N.-Mihály, Lelesz, N.-Bocskó, Királyháza. V. Tasnád, Kolozsvár, Hátszeg, N.-Szeben, Kercz. VI. Mehádia. VII. Communis.

52. *nanus* Schaum. — I. Montes Biharenses. V. N.-Szeben, Montes Kerczenses. VI. Mehádia.

53. *oblongus* Strm. — V. N.-Csür, Sz.-Ujfalu. VI. Mehádia. VII. Velebit. VIII. Fiume.
transsylvanicus Saulcy. — I. Montes Biharenses. IV. Vinna, Bánszka, M.-Sziget, Kőrösmező, Rahó. V. Ad balneum Gyógy, Vallis Lotrióra, Vöröstorony, Montes Kerczenses, Brassó. VI. Mehádia, Rumunyest.

55. *pubicollis* Müll. — I. N.-Várad. III. Trencsén. IV. Terebes, Homonna, Czéke, A.-Bereczki, Mons Hoverla. V. Pele, Kolozsvár, Hátszeg, N.-Szeben. VI. Resicza, Mehádia, Rumunyest. VII. Frequens. VIII. Fiume.

56. *styriacus* Grim. — I. Budapest. V. Montes Cibinneses, Præsbe, Vallis Lotrióra, Vöröstorony, Montes Kerczenses, Brassó. VII. Fužine.

57. *Thomayi* Reitt. — VII. Capella. (Auctor, 297, pag. 49.)

Scydmaenus Latr.

58. *tarsatus* Müll. — I. Budapest, Debreczen, Nagy-Várad. III. K.-Kálna, Trencsén, Putnok. IV. Sátoralja-Ujhely, Páczin, Mons Hoverla. V. Nagy-Szeben, Nagy-Csür. VI. Báziás. VII. V.-Gorica.

59. *rufus* Müll. — I. Budapest, Péczel, Monyásza. III. K.-Kálna, Putnok. IV. S.-A.-Ujhely, Páczin. V. Nagy-Szeben, Nagy-Csür. VI. Mons Allion, Mehádia. VII. V.-Gorica.

60. *Perrisi* Reitt. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. VI. Mehádia. VII. V.-Gorica, Ljeskovac.

61. *Hellwigi* F. — I. Budapest, Péczel, Nagy-Várad, Lunka. II. Pécs. IV. S.-Patak, Tolcsva, Szomotor, Velejte, Mons Hoverla. V. N.-Szeben, Szent-Erzsébet, Medgyes, Sz.-Régen. VI. Mehádia.

62. *cornutus* Motsch. — I. Budapest: Orczykert. (Leg. D. Kuthy.)

Leptomastax Pirazz.

63. *hypogaeus* Pirazz. — VI. Herkulesfürdő. (Leg. J. Pável.)

Ablepton Friv.

64. *Treforti* Friv. — VI. Herkulesfürdő. (Detex. J. Pável.)

Mastigus Latr.

65. *dalmatinus* Heyd. — VII. Gospić. (Legit L. Biró.)

Fam. SILPHIDAE.

Propus Abeil.

1. *sericeus* Schmidt. — VII. Vrebac. (Leg. J. Pável.)
2. *zavaljensis* Pad. — VII. Zavalje. (Detex. Auctor.)

Apropeus Reitt.

3. *leptoderus* Friv. — I. Antrum Fonácza. (Detex. J. Frivaldszky.)
4. *Hazayi* Friv. — I. Antrum Magura. (Detex. J. Hazay.)

Pholeuon Hampe.

5. *angusticolle* Hampe. — I. Antrum Oncsásza. (Detex. E. Frivaldszky.)
6. *gracile* Friv. — I. Antrum ad Kalota. (Detexit Auctor.)

Drimeotus Mill.

7. *Kovácsi* Mill. — I. Antrum ad Kalota. V. Bedelő: Antrum Pestere-la-gros.
8. *Ormayi* Reitt. — V. Bedelő: Antrum Pestere-la-gros. (Detexit A. Ormay.)
9. *Kraatzi* Friv. — I. Antra Fericse et Remecz.

Bathyscia Schioedte.

10. *Páveli* Friv. — VI. Herkulesfürdő. (Detexit J. Pável.)
11. *Merkli* Friv. — V. Pojana-Turkului (Comit. Hunyad). VI. Alpes Szörényenses.
12. *insignis* Friv. — VI. Herkulesfürdő. (Detexit J. Pável.)
13. *Reitteri* Friv. — VI. Herkulesfürdő. (Detexit J. Pável.)
14. *croatica* Mill. — VII. Antrum Oszail. (Reitter, 306, p. 19.)
15. *likanensis* Reitt. — VII. Secundum Auctorem (319, IX. p. 191).
16. *hungarica* Reitt. — IV. Rahó. VII. Capella.
17. *montana* Schioedte. — VII. Fužine, Velebit.
18. *celata* Hampe. — VII. Zágráb Fužine.

Leptinus Müll.

19. *testaceus* Müll. — I. Antrum Fonácza. III. Beszterczebánya. IV. Rahó, N.-Bocskó. VI. Mehádia. Rumunyest. VII. Fužine.

Choleva Latr.

20. *spadicea* Strm. — I. Parád. V. Nagy-Szeben, Brassó (Czenk). VI. Mehádia.
21. *biharica* Fleischer. — I. Hagymádfalva. (Detex. Auctor, 89, p. 87.)
22. *intermedia* Kr. — IV. Rahó. V. Nagy-Szeben, M.-Ujvár. VI. Montes Szörényenses.
23. *angustata* F. — I. Dabas. III. Zolyóm. V. Nagy-Szeben, Sz.-Ujfalu. VI. Temesvár, Mehádia.
24. *cisteloides* Fröl. — I. Budapest, Nagy-Várad. II. Z.-Tapolcza, Pécs. III. Trencsén. IV. Varannó, Mons Pietrosz. V. Szent-Erzsébet, Fogaras, Brassó. VI. Baja, Csenej.
25. *oresitropha* Ganglb. — V. Mons Ünökő. (Auctor, 399, p. 180.)
26. *agilis* Ill. — I. Budapest. II. Pécs. III. Tátrafüred.

Nargus Thoms.

27. *velox* Spence. — I. Budapest, N.-Várad. IV. Páczin. V. K.-Disznód. VII. Capella.
28. *badius* Strm. — I. Budapest, N.-Várad. II. Visz. V. Montes Cibinenses. VI. Oravicza, Mehádia.
29. *Wilkini* Spence. — I. Budapest. III. Putnok. V. Brassó, Segesvár. VI. Resicza, Mehádia. VII. Podsused.
30. *brunneus* Strm. — I. Budapest, Nyiregyháza. II. Ács, Szt.-György. IV. Tolcsva. VII. Capella.
31. *anisotomoides* Spence. — I. Budapest, Nagy-Várad. II. Pécs, Szt.-Márton. III. Beczkó. IV. Gáboltó, Czéke. VI. Mehádia. VII. Podsused, Medak.

Catopomorphus Aub.

32. *arenarius* Hampe. — IV. S.-A.-Ujhely. V. Szent-Erzsébet.

Sciodrepa Thoms.

33. *alpina* Gyll. — IV. Montes Szinnaikő et Hoverla. V. Montes Kerczenses, Brassó, Kőhalom, Segesvár.
34. *fumata* Sp. — III. Trencsén. IV. Torna. V. Segesvár. VI. Mehádia.
35. *Watsoni* Sp. — I. Budapest, Kalocsa, N.-Várad. II. Ács, Z.-Tapolcza. IV. S.-A.-Ujhely, Alsó-Bereczki, Varannó. V. N.-Szeben, N.-Csür, K.-Disznód, Montes Kerczenses, Szász-Régen. VI. Mehádia.

Catops Payk.

36. *umbrinus* Er. — II. P.-Vádé. IV. S.-A.-Ujhely. V. N.-Szeben, N.-Csür. VI. Herkulesfürdő.
37. *picipes* F. — I. Budapest, N.-Várad. II. P.-Vádé. III. Trencsén. IV. Bártfa, Homonna, Mons Szinnaikő, Máramaros-Sziget. V. Kis-Disznód. VI. Mehádia, Korniaréva. VII. Eszék.
38. *marginicollis* Luc. — I. Budapest. (Legit J. Frivaldszky.)
39. *flavicornis* Thoms. — I. Budapest: Zugliget. (Leg. D. Kuthy.)
40. *nigricans* Sp. — I. Budapest, Nagy-Várad. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely. Mons Balzatul. VI. Mehádia. VII. Fužine.
    v. *fuliginosus* Er. — I. Budapest. II. Visz. III. Beszterczebánya. VI. Mehádia.
41. *fuscus* Pz. — I. Budapest. IV. Varannó. V. Nagy-Szeben, Brassó, Sz.-Régen.
42. *longulus* Kelln. — IV. Antrum ad Jászó, Bártfa.
43. *morio* F. — I. Budapest. IV. M.-Sziget.
44. *coracinus* Kelln. — I. Budapest, Vácz, Nagy-Várad. III. Kis-Kálna. V. Nagy-Szeben. VI. Mehádia.
45. *nitidicollis* Kr. — II. Pécs. VI. Herkulesfürdő.
46. *grandicollis* Er. — I. Budapest, Kalocsa, Csongrád. III. K.-Kálna. V. Bereczk. VI. Ulma, Mehádia.
47. *affinis* Steph. — I. Budapest, Kalocsa. II. D.-Örs. IV. Olyka, Mons Hoverla. V. N.-Szeben, K.-Disznód. Nagy-Csür, Brassó. VI. Oravicza, Mehádia. VII. Medak.
48. *Kirbyi* Sp. — I. Budapest. IV. Bártfa. VI. Herkulesfürdő.
49. *neglectus* Kr. — IV. Bártfa. VI. Herkulesfürdő.
50. *tristis* Pz. — III. Trencsén. V. Nagy-Szeben, N.-Csür. VI. Mehádia.
    v. *ventricola* Weise. — V. Ad balneum Gyógy, N.-Szeben, Montes Kerczenses.
51. *chrysomeloides* Pz. — I. Budapest, Kalocsa. IV. Czéke. V. N.-Szeben, Holczmány, N.-Csür, Sz.-Régen.

Anemadus Reitt.

52. *strigosus* Kr. — I. Budapest. II. Visz. IV. Szőllőske. V. N.-Szeben, N.-Csür. VI. Herkulesfürdő. VII. Capella.

Nemadus Thoms.

53. *colonoides* Kr. — II. Ács. IV. S.-A.-Ujhely. V. Segesvár. VI. Oravicza, Mehádia.

Ptomaphagus Hellw.

54. *validus* Kr. — VI. Oravicza, Mons Domoglet, Rumunyest.
55. *varicornis* Rosh. — I. Montes Biharenses III. Zsolna. IV. Montes Vihorlat et Hoverla, Rahó. V. Ad balneum Valea Vinului, N.-Szeben. VI. Resicza.

56. *sericeus* Pz. — I. Budapest, Péczel. III. Zsolna, Putnok. IV. S.-A.-Ujhely, Varannó, Czéke, Gesztely, Tokaj. V. N.-Szeben, N.-Csür, Brassó, Sz.-Régen.

57. *sericatus* Chaud. — V. Nagy-Szeben. (Leg. A. Ormay, 264, p. 25.)

Colon Herbst.

58. *affine* Strm. — VI. N.-Bogsán (Lokája). V. N.-Szeben.

59. *murinum* Kr. — I. Budapest, Péczel. II. Nagy-Vázsony. III. Vallis Vrátna. IV. Montes Vihorlat et Hoverla.

60. *fuscicorne* Kr. — I. Budapest. II. Ács. III. K.-Kálna.

61. *angulare* Er. — I. Budapest. II. Ács, Pécs.

62. *latum* Kr. — IV. N.-Bocskó. V. Ad balneum Valea-Vinului, Vallis Lotrióra, N.-Szeben.

63. *dentipes* Sahlb. v. *Barnevillei* Kr. — I. Péczel. IV. Kőrösmező.

64. *brunneum* Latr. — I. Budapest. II. N.-Vázsony. III. Vallis Vrátna. V. N.-Szeben.

65. *appendiculatum* Sahlb. — III. V.-Mikola, Vallis Vrátna. VI. Resicza.

66. *calcaratum* Er. — III. Vallis Vrátna. IV. Mons Balzatul.

67. *serripes* Sahlb. — I. Budapest, Derékegyháza. III. Vallis Vrátna. IV. Czéke. V. N.-Csür.

68. *puncticolle* Kr. — I. Budapest. (Leg. D. Kuthy.)

69. *viennense* Hbst. — II. Ács. (Legit M. Hopffgarten.)

Necrophorus F.

70. *germanicus* L. — I. Budapest, Péczel, Peszér, Kalocsa, Szentes, M.-Kovácsháza. II. Győr, Kőszeg, Pécs. III. Beszterczebánya, Trencsén. IV. Sátoralja-Ujhely, Erdőbénye. V. Nagy-Szeben, Fogaras, Brassó, Prázsmár, Medgyes, Sz.-Régen. VI. Ulma, Mehádia.

v. *speciosus* Schulze. — I. Peszér, Kalocsa. II. Martonvásár. V. Brassó.

v. *bipunctatus* Kr. — V. Brassó. (Leg. L. Méhely, 245, p. 209.)

v. *apicalis* Kr. — I. Kalocsa. V. Brassó.

71. *humator* Goeze. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, N.-Várad. II. Z.-Tapolcza, Pécs. III. Trencsén, Beczkó, Rosnyó. IV. M.-Láborcz. V. N.-Csür, Montes Kerczenses, Brassó, Prázsmár, Segesvár, M.-Záh, Deés.

72. *interruptus* Steph. — I. Budapest, Kalocsa, Szeged, B.-Csaba, N.-Várad. IV. Tokaj. V. Hátszeg, Nagy-Szeben, Medgyes, Sz.-Régen. VI. Mehádia.

73. *investigator* Zett. — I. Budapest, Péczel, B.-Csaba, Szeged. IV. S.-A.-Ujhely, Mons Menczul. V. Montes Czódenses, Porumbák, Brassó, Sz.-Régen.

74. *sepultor* Charp. — IV. Nagy-Mihály, Mons Szinnaikő.

75. *vespilloides* Herbst. — I. Péczel. III. Trencsén, Á.-Váralja, Igló. IV. Bártfa, Varannó, Mons Szinnaikő, Vallis Vizér. V. Frequens.

76. *nigricornis* Fald. — VII. Fužine. VIII. Fiume.

77. *vespillo* L. — Communis.

78. *vestigator* Hersch. — I. Budapest, Péczel. Kalocsa, N.-Várad. II. Z.-Tapolcza. IV. Sátor-Alja-Ujhely, Mons Szinnaikő. V. Brassó, Medgyes, M.-Záh, Gyeke. VI. Grebenácz.

v. *antennatus* Reitt. — I. Péczel, Szombatság. V. Brassó.

Asbolus Voet.

79. *littoralis* L. — I. Bpest, Kalocsa. II. Z.-Tapolcza, Kőszeg. IV. Olyka. V. Nagy-Szeben, Nagy-Csür, Brassó, Medgyes.

Pseudopelta Voet.

80. *sinuata* F. — Communis.

81. *rugosa* L. — Ut prior.

82. *thoracica* L. — Frequens.

Blitophaga Reitt.

83. *Souverbiei* Fairm. v. *alpicola* Küst. — V. Montes Cibinenses, H.-Gyógy, Mons Szurul, Montes Felekenses, Lacus Girbova, Montes Kerczenses, Fogarasenses et Brassóenses, Mons Bucsecs. VI. Herkulesfürdő, Mons Szárko.

Aclypea Reitt.

84. *undata* Müll. — I. Bpest, Péczel, Kecskemét, Kalocsa. II. Kőszeg, Pécs. III. Selmecz, Pozsony, Beszterczebánya. IV. Kassa, Sátoralja-Ujhely, Tokaj, Varannó, Homonna. V. Frequens. VI. Csenej.

Xylodrepa Thoms.

85. *4-punctata* Schreb. — In toto regno occurrit.

Silpha L.

86. *lunata* F. — Frequens.

87. *oblonga* Küst. — I. M.-Kovácsháza, Mons Oncsásza. III. K.-Kálna. IV. Vallis Fajna. V. Hátszeg, Vizakna, N.-Szeben, N.-Csür, Szt.-Erzsébet, Medgyes, Segesvár, Kolozsvár, Mons Korongyos. VI. Temesvár, Korniaréva.

v. *alpestris* Kr. — VI. Herkulesfürdő, Korniaréva.

88. *obscura* L. — Communis.

orientalis Brull. — Hungaria (Cat. Col. Eur., 1891, p. 139.) *

89. *granulata* Thunb. — I. Kalocsa. II. Sopron. III. Zólyom, Koritnyicza, Tátrafüred. V. Mons Keresztényhavas.

90. *tyrolensis* Laich. v. *nigrita* Creutz. — III. Mons K.-Kriván, Tátra (Keresztfalu). V. Fogaras, Brassó.

Peltis Geoffr.

91. *atrata* L. — Frequens.
v. *brunnea* Herbst. — Simul cum stirpe.
v. *cassidea* Kr. — In regione VI. (Auctor, 208, p. 302.).

Ablattaria Reitt.

92. *laevigata* F. — I. Budapest, Kalocsa, Algyő, N.-Várad. II. Keszthely, Z.-Tapolcza, Pécs. III. Pozsony, Beszterczebánya, Trencsén. V. Szamos-Ujvár, Kolozsvár, N.-Szeben, Brassó, Medgyes, M.-Vásárhely.
v. *gibba* Kr. — In regione VI. (Reitter, 306, pag. 75.)

Pteroloma Gyll.

93. *Forsstroemi* Gyll. — III. Com. Trencsén: Mons Mincsol. (Leg. F. Buday.)

Necrophilus Latr.

94. *subterraneus* Dahl. — V. Præsbe, Montes Kerczenses, Lacus Bulea, Mons Negoi. VII. Capella.

Hadrambe Thoms.

95. *glabra* Payk. — III. Budatin (Leg. L. Udránszky).

Agyrtes Fröl.

96. *bicolor* Lap. — I. Budapest: Széchényi-hegy. (Leg. J. Frivaldszky.)

97. *castaneus* Fröl. — I. Budapest, Félegyháza, Kalocsa. II. D.-Örs. III. Trencsén. IV. Tokaj.

Sphaerites Duft.

98. *glabratus* F. — IV. Mons Vihorlat, Montes Beszkidenses, Mons Hoverla. V. Montes Radnaenses, Præsbe, Brassó, Mons Keresztényhavas. VI. Orsova, Mehádia.

Fam. ANISOTOMIDAE.

Hydnobius Schmidt.

1. *multistriatus* Gyll. — Etiam Hungariam in habitat (Reitter, 306, p. 93.)

* Species hæc ab E. Frivaldszky sub nomine multipunctata ex Asia minore (Brussa) descripta, apud nos hucusque non est inventa.

2. *punctatissimus* Steph. — I. Budapest. (Leg. E. Frivaldszky.)

3. *punctatus* Strm. — I. Budapest. III. Trencsén.

4. *intermedius* Thoms. — I. Budapest. (Legit E. Frivaldszky.)

5. *punctulatus* Hampe. — V. Secundum Bielz. VII. Zágráb.

Colenis Er.

6. *immunda* Strm. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Szeged, Székelyhid. II. Zircz, Soóly. III. Kis-Kálna, Zsolna. IV. Mons Szinnaikő, Czéke, A.-Bereczki, Mons Hoverla. V. Peér, N.-Szeben, N.-Csür, Sz.-Ujfalu, Veresmart, Vöröstorony, Brassó, Sz.-Régen. VI. Temesvár, Mehádia. VII. Eszék.

Agaricophagus Schmidt.

7. *cephalotes* Schmidt. — III. Tátra. VI. Resicza.

Liodes Latr.

8. *nitidula* Er. — III. Vallis Vrátna, Mons Kis-Kriván. IV. N.-Bocskó.

9. *nitida* Reitt. — IV. Mons Hoverla, Vallis Fajna.

10. *parvula* Sahlb. — II. Ács. VI. Mehádia.

11. *flavicornis* Bris. — I. Dabas. VI. Mehádia.

12. *rugosa* Steph. — VI. Resicza. (Leg. E. Merkl.)

13. *hybrida* Er. — III. Vallis ad Deménfalva. (Leg. J. Frivaldszky.)

14. *ciliaris* Schmidt. — I. Budapest, Peszér.

15. *cinnamomea* Panz. — I. Hagymádfalva. II. Zircz, Pécs. III. Zólyom, Tátrafüred. IV. Bártfa. V. Montes Cibinenses et ad fluvium Maros. VI. Mehádia.

16. *oblonga* Er. — VI. Herkulesfürdő. (Legit J. Frivaldszky.)

17. *obesa* Schmidt. — III. Koritnyicza, Tátrafüred. IV. Mons Vihorlat. V. Montes Cibinenses. VI. Mons Domoglet.

18. *dubia* Kug. — I. Budapest. II. Ács. III. Koritnyicza. IV. Tolcsva, Szomotor. V. Montes Kerczenses. VI. Mehádia.

19. *subglobosa* Reitt. — I. Horgos. (Legit Dr. G. Horváth.)

20. *badia* Strm. — IV. Bártfa, Mons Zsihovecz. V. Montes Kerczenses, Sz.-Régen.

21. *carpathica* Ganglb. — V. Montes Radnaenses: ad balneum Valea-Vinului. (Auctor, 399, pag. 181.)

22. *similata* Rey. — I. Dabas. (Leg. F. Metelka.)

23. *scita* Er. — II. Ács. (Leg. M. Hopffgarten.)

24. *ovalis* Schmidt. — III. Vallis Vrátna, Koritnyicza. IV. Bártfa, Mons Rabaszkala, Valje-Rjepede (Com. Marmaros).

25. *gallica* Reitt. — I. Budapest. (Leg. D. Kuthy.)
26. *brunnea* Strm. — I. Budapest, Parád. VI. Herkulesfürdő.
27. *calcarata* Er. — I. Budapest, Péczel, Hajós. II. Ács. V. Præsbe.
28. *curvipes* Schmidt. — I. Montes Biharenses. V. Szt-Erzsébet.
29. *rubiginosa* Schmidt. — I. Budapest, Péczel, Dabas.
30. *nigrita* Schmidt. — I. Budapest. III. Beczkó.
v. *bicolor* Brancsik. — III. Vallis Vrátna, Mons K.-Kriván.
31. *calcarifera* Reitt. — In regione VI. (Reitter, 308, p. 29.)
32. *curta* Fairm. — V. Szelindek. (Leg. A. Ormay, 264, p. 25.)
33. *lunicollis* Rye. — I. Péczel. (Leg. D. Kuthy.)
34. *Triepkei* Schmidt. — I. Dabas, Peszér. II. Nagy-Vázsony.
35. *rotundata* Er. — I. Budapest. II. D.-Örs.
36. *pallens* Strm. — I. Budapest, Kalocsa.

Cyrtusa Er.

37. *subtestacea* Gyll. — I. Budapest. II. Ács, Kapuvár.
38. *Fussi* Seidl. — V. Nagy-Szeben. (Auctor, 345, p. 322.)
39. *minuta* Ahr. — I. Budapest, Kalocsa. II. Ács. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely.
40. *latipes* Er. — I. Budapest, Péczel. III. Putnok. IV. S.-A.-Ujhely.

Xanthosphaera Fairm.

41. *Barnevillei* Fairm. — I. Budapest. III. Putnok.

Anisotoma Ill.

42. *humeralis* Kug. — I. Péczel, Kalocsa. II. Z.-Tapolcza. III. Trencsén. IV. Bártfa, Sátoralja-Ujhely. V. N.-Szeben, Mons Sánta, Volkány, Brassó. VI. Herkulesfürdő.
43. *axillaris* Gyll. — I. Péczel, Kalocsa. III. Tavarnok, Zsolna. IV. Bártfa, M.-Laborcz. V. Kis-Disznód, Volkány, Bükszád, Szász-Régen. VI. Resicza.
44. *castanea* Hbst. — III. Tavarnok, Beszterczebánya, Hermánd, Zsolna. IV. Bártfa, Mons Hoverla, Rahó. V. Ad balneum Valea-Vinului, Montes Kerczenses, Brassó, Sz.-Régen.
45. *glabra* Kug. — I. N.-Várad. IV. Mons Vihorlat. VI. Resicza, Ferenczfalva, Mehádia.
46. *orbicularis* Hbst. — III. Zsolna. IV. M. Hoverla, Rahó. V. Ad balneum Valea-Vinului, Marpód, Montes Kerczenses et Porumbákenses, Brassó, Sz.-Régen. VI. Ferenczfalva, Mehádia. VII. Pakrac.
47. *serricornis* Gyll. — VI. Ad balneum Marilla (Leg. A. Gammel.)

Amphicyllis Er.

48. *globus* F. — I. Budapest, Kalocsa, Nagy-Várad. II. N.-Vázsony, Zircz. III. Trencsén. IV. Czéke, M.-Sziget. V. Sztána. N.-Szeben, Montes Kerczenses, Brassó, Segesvár, Szász-Régen. VI. Temesvár, Mehádia. VII. Eszék.
49. *globiformis* Sahlb. — I. Budapest. II. Nagy-Vázsony, Visz. V. N.-Szeben.

Agathidium Ill.

50. *nigripenne* Kug. — I. Budapest, N.-Várad. IV. Mons Vihorlat. V. Ad balneum Valea-Vinului, K.-Disznód, Montes Kerczenses. VI. Resicza.
51. *atrum* Payk. — II. N.-Vázsony, Pécs. IV. Torna, Beregszász, Montes Hoverla et Menczul. V. Nagy-Disznód, Holczmány, Brassó, Prázsmár, Segesvár, Oláhfalu, Borszék. VI. Mehádia, Korniaréva. VII. Capella.
52. *seminulum* L. — I. N.-Várad. II. Sopron. III. Trencsén, Tátrafüred. IV. M.-Laborcz. V. Szász-Régen, Borszék. VI. Mehádia.
53. *laevigatum* Er. — I. Budapest, Kalocsa. II. N.-Vázsony, Mocsolád. III. Trencsén. IV. Czéke, Csap. V. N.-Szeben, Kőhalom. VI. Oravicza, Mehádia.
54. *badium* Er. — I. N.-Várad, Lunka. III. Trencsén. IV. Montes Szinnaikő et Vihorlat, Papina, Montes Hoverla et Menczul. V. Ad balneum Valea-Vinului, Praesbe.
55. *banaticum* Reitt. — VI. Resicza. (Auctor, 306, p. 113.)
56. *nudum* Hampe. — V. Teste Bielz. VII. Ljeskovac.
57. *aglyptoides* Reitt. — VII. Lika. (Auctor, 306, p. 119.)
58. *marginatum* Strm. — II. N.-Vázsony. V. Nagy-Csür.
59. *haemorrhoum* Er. — I. Remecz. (Fleischer, 89, p. 87.)
60. *pallidum* Gyll. — II. Pécs. IV. K.-Azar, Luhi. V. Præsbe, Montes Kerczenses.
61. *piceum* Er. — II. Pécs. V. Hátszeg. VI. Resicza.
62. *rotundatum* Gyll. — II. N.-Vázsony. III. Trencsén. IV. Mons Hoverla, Vallis Fajna. V. Præsbe, Montes Kerczenses. VI. Ferenczfalva.
63. *bescidicum* Reitt. — Teste Auctore in montibus Carpathicis. (306, p. 115.)
64. *mandibulare* Strm. — I. Remecz. IV. Bártfa, Sátoralja-Ujhely, Luhi, Rahó. V. Vallis Zsil,

Præsbe, Montes Cibinenses et Kerczenses, Fogaras, Brassó. VI. Mons Szemenik, Mehádia, Korniaréva.

65. *polonicum* Wanck. — V. Teste Seidlitz, (345, p. 316.)

66. *confusum* Bris. — II. Pécs. IV. Bártfa. V. Ad balneum Valea-Vinului. VI. Resicza. VII. Varasdin.

67. *plagiatum* Gyll. — II. Kőszeg. IV. Rahó. V. Valea-Vinului, Præsbe, Montes Kerczenses. VI. Resicza, Mehádia. VII. Varasdin.

68. *nigrinum* Strm. — I. Budapest. II. Zircz, Visz. IV. Czéke, Mons Szinnaikő. VI. Mehádia.

v. *rubicundum* Reitt. — IV. Bártfa, Mező-Laborcz, Rahó. VI. Mehádia.

69. *arcticum* Thoms. — IV. Mons Hoverla. (Leg. J. Frivaldszky.)

70. *discoideum* Er. — IV. Bártfa, Mons Hoverla, Rahó. V. K.-Disznód, Montes Kerczenses.

atomarium Strm. — V. N.-Szeben, Sz.-Régen. (Bielz, 27, p. 61.)

Fam. EUCINETIDAE.

Eucinetus Germ.

1. *haemorrhoidalis* Germ. — I. Budapest, Péczel, N.-Várad. IV. S.-A.-Ujhely. V. Nagy-Szeben, N.-Csür.

2. *Hopffgarteni* Reitt. — IV. Herkulesfürdő. (Leg. J. Pável.)

Fam. CLAMBIDAE.

Calyptomerus Redtb.

1. *alpestris* Redtb. — IV. Mons Hoverla, Luhi. V. Montes Kerczenses.

2. *dubius* Marsch. — II. Zircz. IV. Mons Hoverla. VII. Fužine.

Clambus Fisch.

3. *minutus* Strm. — III. Kékkő. IV. Kassa, Máramaros-Sziget, Mons Menczul. V. Vallis Lotrióra, Vöröstorony, Montes Kerczenses.

4. *punctulum* Beck. — I. Budapest, Kalocsa, Nagy-Várad. IV. Tolcsva.

5. *armadillo* Deg. — I. Budapest, Mons Pilis. II. Pécs. III. Beszterczebánya, Trencsén. IV. Sátoralja-Ujhely, A.-Bereczki, Tolcsva, K.-Helmecz, Mons Hoverla. V. N.-Szeben.

6. *pubescens* Redtb. — I. Budapest, Nagy-Várad. III. Putnok. V. Vöröstorony, ad ripam fluvii Olt.

Loricaster Muls.

7. *Viertli* Reitt. — II. Pécs. VI. Mehádia.

8. *testaceus* Muls. — VIII. Fiume. (Leg. J. Pável.)

Cybocephalus Er.

9. *pulchellus* Er. — I. Kalocsa, Péczel.

10. *festivus* Er. — Kalocsa. V. Tasnád.

11. *obliquestriatus* Reitt. — I. Budapest. (Auctor, 319, IX, p. 146.)

12. *politus* Germ. — I. Budapest. II. Ács, Pécs. IV. S.-A.-Ujhely. V. N.-Szeben, Holczmány, Fenyőfalva, N.-Sink. Sz.-Régen.

Fam. SPHAERIIDAE.

Sphaerius Waltl.

1. *acaroides* Waltl. — I. Budapest. VII. Švica.

Fam. CORYLOPHIDAE.

Parmulus Gundl.

1. *pusillus* Gyll. — I. Budapest, Nagy-Várad. III. Trencsén. IV. K.-Azar. V. Montes Kerczenses. VI. Ferenczfalva, Mehádia.

2. *brunneus* Bris. — I. Budapest, Nagy-Várad. IV. M.-Sziget. V. Vallis Lotrióra, Montes Kerczenses. VI. Ferenczfalva, Mehádia.

3. *orientalis* Reitt. — VII. Županje. (Auctor, 297, p. 56.)

4. *obscurus* Sahlb. — I. Budapest, Parád, Nagy-Várad. V. Vallis Lotrióra. VI. Herkulesfürdő.

Arthrolips Woll.

5. *humilis* Rosh. — I. Budapest. (Legit J. Frivaldszky.)

6. *piceus* Com. — III. Beczkó. V. Sec. Seidlitz.

Sericoderus Steph.

7. *lateralis* Gyll. — Frequens.

8. *Revelierei* Reitt. — I. Budapest, Péczel.

Corylophus Steph.

9. *cassidoides* Marsh. — I. Budapest. II. D.-Örs. IV. Sátoralja-Ujhely, Czigánd. V. Nagy-Szeben, N.-Csür.

Orthoperus Steph.

10. *punctatus* Wankow. — IV. Mons Hoverla, Rahó. V. Montes Kerczenses.

11. *brunnipes* Gyll. — I. N.-Várad. III. K.-Kálna. IV. Mons Hoverla. V. N.-Szeben. VI. Mehádia.

12. *pilosiusculus* Duv. — I. Budapest. IV. M.-Sziget. VI. Mehádia.

13. *picatus* Marsh. — I. Budapest. III. Zólyom. IV. M.-Sziget.

14. *anxius* Rey. — V. N.-Szeben, F.-Kercz.

15. *coriaceus* Rey. —IV. Szt.-Marja, Homonna. VII. V.-Gorica.

16. *punctum* Marsh. — VII. Ljeskovac. (Reitter, 297, p. 56.)

Rhypobius Lec.

17. *velox* Wollast. — I. Budapest, Kalocsa. II. Zircz. III. Putnok.

Fam. TRICHOPTERYGIDAE.

Nossidium Er.

1. *pilosellum* Marsch. — I. Budapest, Kalocsa. III. K.-Kálna. IV. N.-Bocskó, Rahó. V. N.-Szeben, N.-Talmács, Fogaras, Sz.-Régen. VI. Herkulesfürdő.

Ptenidium Er.

2. *Gressneri* Gillm. — I. Parád, Hagymádfalva. V. Montes Kerczenses.
3. *turgidum* Thoms. — I. Hagymádfalva. IV. Mons Szinnaikő, M.-Laborcz, N.-Bocskó. V. Nagy-Szeben, Montes Kerczenses.
4. *intermedium* Wank. — V et VII. Teste Flach, (87, p. 495.)
5. *fuscicorne* Er. — I. Budapest, Kalocsa, Nagy-Várad.
6. *myrmecophilum* Motsch. — V. Segesvár. (Leg. Dr. C. Petri, 269, p. 6.)
7. *pusillum* Gyll. — I. Budapest, Kalocsa, Nagy-Várad. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Sáros-Patak, N.-Bocskó. V. Sztána, N.-Szeben, Nagy-Csür, Montes Kerczenses, Szász-Régen. VIII. Fiume.
8. *nitidum* Heer *(pusillum* Er.) — V. Secundum Seidlitz (345, p. 306).

Euryptilium Matth.

9. *saxonicum* Gillm. — VII. Teste Flach (87, p. 505).

Ptiliolum Flach.

10. *Kunzei* Heer. — I. Budapest, Péczel, Remecz. III. Putnok. V. Fogaras, Brassó.
    v. *rugulosum* Allib. — IV. Mons Hoverla. (Leg. J. Frivaldszky.)
11. *oblongum* Gillm. — I. Budapest: Széchényi hegy. (Leg. E. Frivaldszky.)
12. *Hopffgarteni* Flach. — VII. Sec. Hopffgarten. (Auctor, 87, p. 101.)
13. *angustatum* Er. — I. Budapest. V. Segesvár.
14. *croaticum* Matth. — I. Remecz. VII. Teste Flach.

Actidium Matth.

15. *Boudieri* Allib. — VI. Temesvár. (Leg. Dr. V. Szmolay.)

Oligella Flach.

16. *foveolata* Allib. — I. Budapest. III. Putnok.

Ptilium Er.

17. *minutissimum* Ljungh. — I. Budapest, Kalocsa. III. Putnok. V. N.-Szeben.
18. *caesum* Er. — IV. Tolcsva. (Leg. Dr. C. Chyzer.)
19. *exaratum* Allib. — I. Budapest. IV. Tolcsva.
20. *myrmecophilum* Allib. — III. Trencsén (sec. J. Frivaldszky).

Neuglenes Thoms.

21. *apterus* Guér. — I. Budapest, Nagy-Várad. IV. Csap. V. N.-Szeben, Montes Kerczenses.
    v. *ratisbonensis* Gillm. — I. Budapest. (Leg. J. Frivaldszky.)
22. *tenellus* Er. — I. Budapest, Kecskemét, Szombatság. III. Putnok. IV. Csap.
    v. *biimpressus* Reitt. — II. Montes Bakonyenses. IV. Csap.

Aderces Thoms.

23. *suturalis* Heer. — I. Budapest. V. N.-Szeben, Montes Kerczenses.

Astatopteryx Perris.

24. *laticollis* Perris v. *hungarica* Reitt. — II. Pécs. VI. Ferenczfalva.

Nephanes Thoms.

25. *Titan* Newm. — I. Montes Biharenses. (Legit Dr. A. Fleischer.)

Trichopteryx Kirby.

26. *grandicollis* Maerkel. — I. Budapest, Kalocsa, N.-Várad. V. Szucsák. VI. Báziás. VIII. Fiume.
27. *Montandoni* Allib. — I. Budapest, Kecskemét, N.-Várad. II. Soóly. IV. S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Lelesz, Czigánd, Sztropkó. V. Vallis Lotrióra, N.-Szeben.
28. *thoracica* Waltl. — I. Montes Biharenses. IV. Sztropkó, Czigánd, Montes Hoverla et Menczul. V. Szucsák.
29. *atomaria* Deg. — I. Budapest, Kalocsa, Nagy-Várad. II. Soóly. III. Trencsén. IV. Sátoralja-Ujhely, Sztropkó, K.-Majtény, Szatmár. V. Peér, Pele, Nagy-Szeben, Mons Sánta, Montes Kerczenses, Oláhfalu, Szász-Régen. VI. Resicza, Mehádia.
30. *intermedia* Gillm. — I. Montes Biharenses. IV. Mons Rabaszkala.
31. *fascicularis* Hbst. — I. Budapest. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely. V. Brassó.

32. *brevipennis* Er. (*sericans* Gillm.) — I. Bpest. IV. S.-A.-Ujhely, Szatmár. V. Nagy-Szeben, Vallis Lotrióra, Brassó, Prázsmár, ad rivum Hortobágy, Sz.-Régen.
33. *Chevrolati* Allib. — I. Budapest. III. Putnok. V. Szucsák.
34. *sericans* Heer. — I. Budapest, Kalocsa. IV. K.-Helmecz.

Fam. SCAPHIDIIDAE.

Scaphidium Oliv.

1. *4— maculatum* Oliv. — In regionibus montanis frequens.

Scaphium Kirby.

2. *immaculatum* Oliv. — I. Budapest, Péczel, Gödöllő. II. Martonvásár, Sopron, Zircz. III. K.-Kálna. V. Præsbe, Montes Kerczenses.

Scaphosoma Leach.

3. *agaricinum* L. — Frequens.
4. *subalpinum* Reitt. — IV. Mons Hoverla, Rahó. V. Montes Czódenses et Kerczenses Brassó. VI. Mehádia, Rumunyest. VII. Capella.
5. *assimile* Er. — I. Kalocsa, Száldobágy, Nagy-Várad. IV. Mons Rabaszkala, Nagy-Bocskó. V. Montes Retyezát et Kerczenses. VI. Ferenczfalva.
6. *boleti* Pz. — I. Budapest, Kalocsa, M.-Kovácsháza. II. D.-Örs, Pécs. III. Zólyom, Putnok. IV. S.-A.-Ujhely, Tárkány. V. N.-Szeben, Brassó. VI. Szászka, Mehádia. VII. Crkvenica.
7. *limbatum* Er. — I. Rézbánya. III. Putnok. IV. S.-A.-Ujhely. V. Hátszeg, Nagy-Szeben, Mons Sánta, Montes Kerczenses, Brassó. VI. Resicza, Ferenczfalva, Mehádia. VII. Pakrac.

Baeocera Er.

8. *Schirmeri* Reitt. — I. Kalocsa. (Leg. F. Speiser, 349, p. 24.)

Fam. PHALACRIDAE.

Phalacrus Payk.

1. *grossus* Er. — I. Budapest. V. Szt-Erzsébet.
2. *hybridus* Flach. — In regione V. (Auctor, 86, pag. 61.)
3. *fimetarius* F. — Communis.
   v. *Humberti* Rye. — I. Budapest, Péczel. V. Brassó.
4. *substriatus* Gyll. — I. Budapest. VI. Stájerlak.
5. *caricis* Strm. — I. Kalocsa. V. Sz.-Ujvár.

Olibrus Er.

6. *aeneus* F. — I. Budapest, Kalocsa. II. Pécs. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely. V. Brassó (Czenk), Bodza. VI. Temesvár. VII. Eszék.
7. *millefolii* Payk. — I. Budapest, Peszér, Kalocsa. III. Trencsén. IV. Torna, N.-Bocskó. V. Szamos-Ujfalu, Medgyes. VI. Temesvár.
8. *bimaculatus* Küst. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. VII. Otačac.
9. *bicolor* F. — Frequens.
10. *bisignatus* Mén. v. *coccinella* Fl. — V. Szucsák. (Leg. Dr. E. Daday.)
11. *Gerhardti* Flach. — I. Kalocsa. (Leg. F. Speiser.)
12. *aenescens* Küst. — I. Budapest. V. Sz.-Ujvár.
13. *liquidus* Er. — I. Budapest, Péczel, Nyiregyháza, Peszér. III. Trencsén. IV. Torna, Bártfa. V. Hátszeg, Segesvár. VI. Resicza, Ferenczfalva, Krassova.
14. *affinis* Strm. — I. Budapest, Kalocsa, Parád. III. Zólyom, Hermánd, Putnok. V. Ad balneum Gyógy, Sz.-Sebes, Fogaras, Medgyes, Sz.-Régen, Mező-Záh.
15. *pygmaeus* Strm. — I. Péczel. (Leg. D. Kuthy.)
16. *flavicornis* Strm. — I. Kalocsa. (Leg. F. Speiser.)
17. *Reitteri* Flach. — In regione VII. (Auctor, 86, p. 63.)
18. *Heydeni* Flach. — I. Kalocsa. (Leg. F. Speiser.)
19. *corticalis* Pz. — II. Sopron (sec. E. Frivaldszky).

Stilbus Seidl.

20. *testaceus* Pz. — I. Budapest, Kalocsa, N.-Várad. III. K.-Kálna, Trencsén. IV. Velejte. V. Sz.-Ujfalu, Holczmány, Medgyes, Sz.-Régen.
   v. *unicolor* Flach. — I. Kalocsa. (Legit F. Speiser.)
21. *atomarius* L. — I. Bpest, Kecskemét, Kalocsa, Debreczen, N.-Várad, Érmihályfalva. II. Z.-Tapolcza. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj, Varannó, Homonna. V. Tasnád, Marpód, Prázsmár, Lacus ad Kiszék, B.-Nyires. VI. Temesvár, Grebenácz, Mehádia.
22. *oblongus* Er. — I. Budapest. V. N.-Szeben.

Fam. EROTYLIDAE.

Engis Payk.

1. *notata* Gmel. — III. Zólyom, Hermánd. IV. Bártfa. V. Hátszeg, N.-Szeben, Szt.-Erzsébet, Brassó, Sz.-Régen. VI. Ferenczfalva.
2. *rufifrons* F. — I. Kalocsa, Feketeerdő. II. Zircz. III. Trencsén, Putnok. IV. S.-A.-Ujhely. V. Vöröstorony, Kercz, Medgyes. VI. Mehádia. VII. Pakrac.

3. *bipustulata* Thunb. — Frequens.
v. *Jekeli* Reitt. — I. Kalocsa. (Leg. F. Speiser, 349, p. 24.)

Combocerus Bed.

4. *glaber* Schall. — I. Budapest, Péczel. III. K.-Kálna, Rosnyó. IV. N.-Mihály. V. Hátszeg, N.-Szeben, Szelindek. K.-Disznód, Brassó.

Loberogosmus Reitt.

5. *fasciatus* Kolen. —VI. Com. Temes. VII. Pakrac.

Triplax Payk.

6. *melanocephala* Latr. — I. Budapest: Zugliget. (Leg. D. Kuthy.)
7. *aenea* Schall. — I. Parád, Kalocsa, M.-Kovácsháza, N.-Várad. II. Zircz, Kőszeg. III. Zólyom, Trencsén. IV. A.-Bereczki, N.-Mihály, Szinna. V. Frequens. VI. Mehádia. VII. Raduč.
8. *elongata* Lac. — I. Budapest. V. Bodza.
9. *russica* L. — I. Budapest, N.-Várad. II. Zircz. III. K.-Kálna, Beszterczebánya, Beczkó, Koritnyicza. IV. Sátoralja-Ujhely, Erdőbénye, Mons Szinnaikő, Olyka. V. Hátszeg, Montes Retyezát et Kerczenses, Brassó, Montes ad fluvium Maros. VI. Stájerlak, Mehádia.
10. *Lacordairei* Crotch. —I. Budapest, Péczel. VII. Velebit.
11. *lepida* Fald. — I. Budapest, Péczel. III. K.-Kálna.
12. *rufipes* F. — I. Budapest, Parád, Kalocsa, Debreczen, N.-Várad, Kalota, Feketeerdő. II. Zircz. III. K.-Kálna. V. Hátszeg. Vallis Lotrióra, N.-Csür. VI. Báziás, Stájerlak, Mehádia. VII. Našice.
13. *bicolor* Gyll. — I. Debreczen, N.-Várad Székelyhid. II. Zircz. III. Beczkó. IV. Mons Szinnaikő. V. Montes Retyezát, Felekenses et Kerczenses, Brassó, Mons Nagykőhavas, Bodza, Montes ad fluv. Maros.
v. *scutellaris* Charp. — I. Montes Biharenses. V. Bisztratelep.
14. *carpathica* Reitt. — IV. Montes Marmarosenses. (Auctor, 319, XI, p. 388.)
15. *collaris* Schall. — I. Buudapest, N.-Várad. II. Zircz. V. Teste Bielz. VI. Mehádia.

Cyrtotriplax Crotch.

16. *bipustulata* F. — Frequens.
v. *binotata* Reitt. — I. Kalocsa. II. Pécs.
v. *dimidiata* Redtb. — I. Péczel, Kalocsa.

Aulacochilus Lac.

17. *violaceus* Germ. — VII. Capella, Velebit.

Fam. ENDOMYCHIDAE.

Dapsa Latr.

1. *denticollis* Germ. — I. Budapest, Péczel, Nagy-Várad. III. Kézsmárk. IV. Varannó, Szőllöske. V. Vallis Lotrióra, N.-Szeben, Szt-Erzsébet, N.-Disznód, K.-Disznód, Montes Kerczenses, Segesvár, Szász-Régen. VI. Ferenczfalva. VII. Diakovár.
v. *nigricollis* Gerst. — VI. Mehádia, Korniaréva.
2. *trimaculata* Motsch. — VI. Ferenczfalva. (Leg. E. Bodemeyer, 34, p. 271.)

Hylaia Redtb.

3. *rubricollis* Germ. — IV. Uj-Moldova, Mehádia.

Lycoperdina Latr.

4. *succincta* L. — In toto regno passim occurrit.
5. *crassicornis* Reitt. — V. Sec. Auctorem. (298, p. 97.)
6. *bovistae* F. — III. Trencsén (N.-Kubra). IV. Czéke.

Mycetina Muls.

7. *cruciata* Schall. — I. Hagymádfalva, Remecz. II. Zircz III. Zsolna, Koritnyicza, Á.-Váralja, Putnok. IV. Ránk, Olyka, Vallis Fajna, Mons Hoverla. V. Montes Retyezát, Vallis Lotrióra, N.-Szeben, Montes Fogarasenses et Kerczenses, Brassó, Tömös, Segesvár. VI. Stájerlak, Mehádia.
v. *calabra* Costa — I. Remecz. II. Zircz. IV. Vallis Fajna, Mons Hoverla. V. N.-Szeben, Montes Kerczenses, Brassó. VI. Stájerlak, Mehádia.

Endomychus Panz.

8. *coccineus* L. — In regionibus montanis frequens
v. *Biehli* Reitt. — IV. Montes Hoverla et Pietrosz. V. Teste Auctore.
9. *thoracicus* Charp. — I. N.-Várad, Lunka. V. Montes Retyezát, Hátszegenses et Cibinenses, Kis-Disznód, Præsbe, Montes Kerczenses et Fogarasenses, Brassó, Montes Bucsecs, Tészla et Dongókő, Bodza, Montes ad fluv. Maros. VI. Ferenczfalva Mehádia.

Myrmecoxenus Chevr.

10. *subterraneus* Chevr. — III. Beczkó. V. Segesvár.
11. *vaporariorum* Guér. — I. Budapest, M.-Káta, Kalocsa. V. Brassó.

Lithophilus Fről.

12. *connatus* Pz. — I. Budapest, Kalocsa.

Leiestes Redtb.

43. *seminigra* Gyll. — V. N.-Csür, Præsbe, Montes Kerczenses, Brassó. VI. Mehádia.

Pleganophorus Hampe.

14. *bispinosus* Hampe. — V. N.-Szeben (Fiatalerdő). VI. Mehádia (Mons Cserteg.).

Symbiotes Redtb.

15. *gibberosus* Luc. — I. Budapest, Kalocsa, Szombatság. II. Felsőlő. III. K.-Kálna. V. N.-Szeben. VI. Mehádia.

16. *armatus* Reitt. — VII. Zágráb. (Leg. H. Hampe; Reitter, 299, p. 227.)

Mycetaea Steph.

17. *hirta* Marsh. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Debreczen, N.-Várad. III. Putnok, Kézsmárk. IV. S.-A.-Ujhely, Tárkány, K.-Azar, Homonna. V. Hátszeg, Nagy-Szeben, Sz.-Ujfalu, Brassó, Segesvár, Szász-Régen. VI. Mehádia. VIII. Fiume.

Clemmys Hampe.

18. *troglodytes* Hampe. — I. Hagymádfalva. IV. Szőllőske. V. Nagy-Szeben. VI. Német-Bogsán, Mehádia. VII. Županje, V.-Gorica.

Mychophilus Friv.

19. *minutus* Friv. — I. Budapest. VI. Herkulesfürdő. VII. V.-Gorica.

Alexia Steph.

20. *glabra* Reitt. — V. Nagy-Szeben, Montes Kerczenses, Brassó. VI. Herkulesfürdő.

21. *globosa* Strm. — I. Budapest, Nagy-Várad. IV. H.-Olyka, Turkul, V. Vallis Zsil, Montes Kerczenses, Fogaras, Brassó, Sz.-Régen. VI. Oravicza, Mehádia. VII. Capella.

22. *punctata* Reitt. — I. Hagymádfalva. VI. Ferenczfalva, Mehádia. VII. Ljeskovac.

23. *carpathica* Reitt. — III. Jeraba IV. Mons Balzatul. V. Vallis Lotrióra, Præsbe, Montes Kerczenses, Brassó. VI. Mehádia.

24. *pilosa* Pz. — I. Budapest. IV. Montes Hoverla et Menczul. V. Montes Kerczenses, Brassó. VI. Mehádia. VII. Fužine. VIII. Fiume.

25. *Reitteri* Ormay (*pilosissima* Friv., *pubescens* Friv.) — V. Valles Lotrióra et Zsil, N.-Szeben, Vöröstorony, Montes Kerczenses, Brassó, Vallis Zajzon.

26. *pilifera* Müll. — VII. Teste Reitter. (304, p. 241.)

Fam. CRYPTOPHAGIDAE.

Diphyllus Steph.

1. *lunatus* F. — I. Remecz. V. Montes Cibinenses. VI. Herkulesfürdő. VIII. Pakrac.

2. *frater* Aub. — I. Szombatság. V. Zilah. VI. Mehádia. VII. Našice.

Diplocoelus Guér.

3. *fagi* Chevr. — I. Budapest, Parád. II. Zircz. IV. Torna. V. Vallis Lotrióra, Brassó. VI. Herkulesfürdő.

Telmatophilus Heer.

4. *sparganii* Ahr. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Debreczen. III. Beczkó. IV. A.-Bereczki, Szomotor, Varannó. V. Segesvár. VI. Temesvár, Mehádia.

5. *caricis* Oliv. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Nyiregyháza. III. Beczkó. IV. N.-Bocskó. V. Malomviz, N.-Szeben.

6. *brevicollis* Aub. — I. Budapest, Peszér, Kalocsa, Mező-Berény. II. Zircz, Nagy-Vázsony, Pécs. IV. Sátoralja-Ujhely, Bély, Tokaj. V. Hátszeg.

7. *typhae* Fall. — I. Budapest, Kalocsa. II. Keszthely. III. Agárd, Zólyom. IV. Sátoralja-Ujhely, Királyháza, Szatmár. V. Mojád, N.-Szeben, N.-Csür.

v. *pumilus* Reitt. — I. Kalocsa. (Leg. F. Speiser.)

8. *Schönherri* Gyll. — I. Budapest, Kalocsa. III. Zólyom. IV. S.-A.-Ujhely.

Leucohimatium Rosenh.

9. *elongatum* Er. — VIII. Fiume. (Leg. C. Kelecsényi.)

Antherophagus Latr.

10. *nigricornis* F. — I. Péczel. II. Sopron. III. Trencsén. IV. Luhi. V. Vallis Zsil, Montes Kerczenses, Sz.-Régen. VI. Oravicza.

11. *silaceus* Hbst. — I. Budapest, Péczel. III. Trencsén, V.-Mikola, Tátrafüred. V. Brassó.

12. *pallens* Oliv. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. N.-Vázsony, Sopron. III. K.-Kálna, Á.-Váralja. IV. Bártfa, Mons Simonka, Erdőbénye, Szőllőske, Visk. V. Montes Cibinenses, Vallis Czód. Brassó. VI. Mehádia.

Spaniophaenus Reitt.

13. *laticollis* Mill. — I. Budapest. V. Mons Szurul.

14. *lapidarius* Fairm. (*amplicollis* Bris.) — Etiam Hungariæ incola. (Reitter, 294, p. 175.)

Haplolophus Friv.

15. *robustus* Moraw. v. *neglectus* Friv. — I. Budapest (Sashegy, ó-budai hegyek).

Paramecosoma Curt.

16. *melanocephalum* Hbst. — III. Zólyom. IV. Varannó. V. N.-Szeben, Montes Cibinenses, Sz.-Régen.

Cryptophagus Herbst.

17. *simplex* Mill. — I. Péczel. II. Montes Bakonyenses.

18. *baldensis* Er. — I. Montes Biharenses. III. Mons K.-Kriván, Koritnyicza. IV. Mons Hoverla. V. Vallis Lotrióra, Montes Cibinenses et Kerczenses, Fogaras, Brassó. VI. Mehádia.

19. *croaticus* Reitt. — VII. Capella. (Auctor, 297, p. 51.)

20. *lycoperdi* Hbst. — I. Budapest, Kalocsa, II. Sopron, Soóly. III. K.-Kálna, Kékkő, Zólyom. IV. Tolcsva. V. Hátszeg.

21. *pilosus* Gyll. — I. Budapest, Kalocsa, N.-Várad. II. Pécs. III. Zólyom, Trencsén. V. N.-Szeben, Sz.-Régen. VI. Báziás, Resicza, Mehádia, Rumunyest.

v. *punctipennis* Bris. — I. Budapest. (Leg. E. Frivaldszky.)

22. *Schmidti* Strm. — I. Budapest, Kalocsa, N.-Várad.

23. *nitidulus* Mill. — I. Budapest. II. Pécs. IV. S.-Patak, Szőllőske. V. Nagy-Szeben, Brassó (Czenk). VI. Resicza.

24. *setulosus* Strm. — V. N.-Szeben. VI. Temesvár.

25. *inaequalis* Reitt. — IV. Rahó. (Detex. Auctor, 295, p. 53.)

26. *Milleri* Reitt. — I. Budapest. VIII. Fiume.

27. *affinis* Strm. — I. Budapest, Kalocsa, Nyiregyháza, N.-Várad. IV. N.-Mihály, V. N.-Szeben.

28. *cellaris* Scop. — I. Budapest, Kalocsa. II. Sopron. III. K.-Kálna, Nyitra, Putnok. IV. Sátoralja-Ujhely, Tolcsva, Terebes, Varannó, Ungvár. V. N.-Szeben, N.-Csür, Brassó. VI. Mehádia.

29. *acutangulus* Gyll. — I. Budapest, Kalocsa, Nyiregyháza. III. Zólyom, Trencsén. IV. Tárkány, Varannó. V. Hátszeg, Montes Kerczenses, Segesvár. VI. Mehádia. VII. Eszék.

30. *fumatus* Mars. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. Zircz. IV. Szőllőske. V. Hátszeg, Nagy-Szeben, N.-Csür, Montes Kerczenses, Medgyes.

31. *posticus* Reitt. — VI. Teste Auctore. (307, 1888, p. 425.)

32. *quercinus* Kr. — VI. Herkulesfürdő. VII. Capella.

33. *rufus* Bris. — VI. Krassova. (Leg. J. Frivaldszky.)

34. *badius* Strm. — I. Budapest, N.-Várad. II. Soóly. IV. Mező-Laborcz, Ungvár, Mons Hoverla. V. Montes Kerczenses, Brassó, Medgyes.

35. *Brisoûti* Reitt. — V. Montes Kerczenses. (Bielz, 27, p. 63.)

36. *axillaris* Reitt. — V. Secundum Auctorem. (311, p. 26.)

37. *fasciatus* Kr. — IV. S.-A.-Ujhely, Szomotor.

38. *distinguendus* Strm. — I. Budapest, Kalocsa. III. Tavarnok, Trencsén, Tátrafüred, Putnok. IV. Páczin. V. N.-Csür, Brassó.

39. *dorsalis* Sahlb. — V. Brassó. (Bielz, 27, p. 63.)

40. *fuscicornis* Strm. — I. Montes Biharenses. III. Vallis Vrátna. VI. Mehádia. VII. Capella.

41. *labilis* Er. — I. Budapest. IV. Montes Szinnaikő et Hoverla. V. Hátszeg. VI. Resicza, Mehádia. VII. Fužine.

42. *reflexicollis* Reitt. — IV. Mons Hoverla. V. K.-Disznód, Montes Kerczenses, Brassó. VI. Mehádia, Rumunyest.

43. *scutellatus* Newm. — I. Budapest. IV. Sztropkó. V. N.-Szeben, F.-Komána. VI. Mehádia.

44. *dentatus* Hbst. — I. Budapest, Kalocsa, Nagy-Várad. III. Trencsén, Tátrafüred. IV. Bártfa, Kassa, Sátoralja-Ujhely, Czéke, Páczin, Lelesz, Sztropkó, Mons Szinnaikő. V. Montes Kerczenses, Medgyes, Segesvár, Sz.-Régen.

45. *subvittatus* Reitt. — I. Budapest, Kalocsa. II. Zircz. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely. V. N.-Szeben, Montes Kerczenses, Sz.-Régen. VI. Mehádia.

46. *cylindrus* Kiesw. — V. Montes Kerczenses. (Bielz, 27, p. 63.)

47. *Thomsoni* Reitt. — I. Budapest, Kalocsa. III. Deménfalu. IV. Torna. VI. Ferenczfalva, Mehádia. VII. Capella.

48. *scanicus* L. — Frequens.

v. *hirtulus* Kr. — I. Budapest. VI. Mehádia. VII. Gospić.

49. *subdepressus* Gyll. — III. Tátra. (Leg. J. Frivaldszky.)

50. *pubescens* Strm. — I. Kalocsa. III. Deménfalu. IV. Luhi. V. Szt.-Erzsébet.

51. *bimaculatus* Pz. — I. Budapest, Kalocsa. IV. S.-A.-Ujhely, A.-Bereczki, K.-Bári, M.-Sziget. V. N.-Szeben.

52. *vini* Pz. — V. Montes Cibinenses, N.-Szeben.

53. *villosus* Heer. — IV. Vallis Fajna. VI. Temesvár.

54. *abietis* Payk. — III. Deménfalu, Tátrafüred. IV. Mármaros-Sziget, N.-Bocskó, Kőrösmező, Mons Pietrosz. V. Montes Cibinenses.

Pteryngium Reitt.

55. *crenatum* Gyll. — V. Rahó. (Leg. E. Reitter.)

Henoticus Thoms.

56. *serratus* Gyll. — I. Budapest, Remecz, Szombatság. IV. Bártfa, M.-Sziget, Mons Hoverla, Rahó. V. Vallis Czód, Montes Kerczenses. VI. Mons Domoglet.

Caenoscelis Thoms.

57. *Brisouti* Seidl. (*ferruginea* Bris., Reitt.) — I. Budapest, Kalocsa. V. Præsbe, Fogaras. VI. Resicza.

58. *Fleischeri* Reitt. — I. Hagymádfalva. IV. Bártfa.

Atomaria Steph.

59. *fimetarii* Hbst. — I. Budapest, Kalocsa. IV. Bártfa. VI. Temesvár, Mons Domoglet.

60. *Barani* Bris. — I. Budapest, Kalocsa. IV. Szerencs.

61. *carpathica* Reitt. — IV. Mons Hoverla. (Weise, 374, p. 361.)

62. *umbrina* Gyll. — I. Kalocsa, Hagymádfalva. IV. S.-A.-Ujely. V. K.-Disznód. VI. Herkulesfürdő.

63. *nigriventris* Steph. — I. Budapest, Kalocsa. Hagymádfalva. III. K.-Kálna, Kézsmárk. IV. Mons Menczul. V. N.-Szeben, Montes Kerczenses, Sz.-Régen. VI. Mehádia, Rumunyest.

v. *puncticollis* Thoms. — I. Székelyhid. (Leg. L. Biró.)

64. *linearis* Steph. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa, M.-Kovácsháza. II. Soóly. III. Trencsén, Putnok. IV. S.-A.-Ujhely. V. Pele, Tasnád, N.-Szeben, N.-Csür, Sz.-Régen. VI. Báziás.

65. *diluta* Er. — II. Boglár. V. N.-Csür, Montes Kerczenses. VI. Mehádia. VII. Fužine.

66. *alpina* Heer (*Herminae* Reitt., *elongatula* Er.) — I. Budapest. IV. Mons Hoverla. V. Nagy-Csür, Brassó. VI. Mons Szemenik, Mehádia.

v. *Wollastoni* Sharp. — V. Gyulafehérvár. (Bielz, 27, p. 63.)

67. *procerula* Er. — IV. Mons Hoverla. V. Montes Kerczenses.

68. *prolixa* Er. v. *atrata* Reitt. — VI. Resicza, Herkulesfürdő.

69. *fuscicollis* Mannh. — I. Budapest, Kalocsa, Hagymádfalva. IV. S.-A.-Ujhely, A.-Bereczki, Varannó, M.-Sziget. V. N.-Szeben, N.-Talmács, Prázsmár, F.-Venicze. VI. Resicza.

70. *impressa* Er. — IV. Bártfa, N.-Bocskó. V. Segesvár. VI. Temesvár.

71. *munda* Er. — I. Budapest, Kalocsa. IV. Bártfa. V. N.-Csür.

72. *unifasciata* Er. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. Pécs. IV. Gálszécs.

73. *mesomelas* Hbst. — I. Budapest, Péczel. II. Mohács. III. Trencsén. IV. Szomotor, Terebes, Czigánd, A.-Bereczki, Tolcsva, Beregszász. V. Fogaras.

74. *gutta* Steph. — I. Budapest, Kalocsa, Nyiregyháza. III. Putnok. IV. A.-Bereczki. V. N.-Csür.

75. *gravidula* Er. — III. Trencsén. IV. Kassa, Nagy-Mihály, Huszt, N.-Bocskó. V. N.-Csür.

76. *fuscata* Schönh. — I. Budapest, Kalocsa, Nyiregyháza, Hagymádfalva. III. K.-Kálna, Trencsén, Putnok. IV. Bártfa, Varannó, Lelesz, Huszt. V. Tasnád, N.-Szeben, Fogaras, Szász-Régen. VII. Eszék.

77. *atricapilla* Steph. — I. Budapest, P.-Poó, Hagymádfalva. IV. Sztropkó. V. N.-Szeben. VII. Eszék.

78. *berolinensis* Kr. — IV. Sztropkó. (Leg. Dr. C. Chyzer.)

79. *bicolor* Er. — VI. Buziás. (Leg. Dr. V. Szmolay, 365, p. 42.)

80. *atra* Hbst. — I. Budapest, Nyiregyháza. II. Baán. V. Peér.

81. *Zetterstedti* Zett. — II. Ács. IV. Szinna. V. Barót.

82. *peltata* Kr. — I. Budapest, Kalocsa. II. Baán. IV. A.-Bereczki, N.-Mihály. V. N.-Szeben, Nagy-Csür. VI. Mehádia Rumunyest.

83. *fuscipes* Gyll. — I. Budapest, Kóly. II. Soóly, Pécs. V. Tasnád, N.-Szeben. VI. Mehádia.

84. *pusilla* Schönh. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, P.-Poó, Makó. III. K.-Kálna, Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Sáros-Patak, Tolcsva, Szomotor, Velejte, Ladomér, M.-Sziget. V. Tasnád, Nagy-Szeben, N.-Csür, Sz.-Ujfalu, Brassó, Sz.-Régen. VI. Zlaticza, Mehádia. VIII. Fiume.

85. *nigripennis* Payk. — I. Budapest. IV. Bártfa. V. N.-Szeben, Kőhalom.

86. *morio* Kolen. — V. Præsbe. (Leg. A. Ormay, 266, p. 13.)

87. *frondicola* Reitt. — VI. Mehádia. VIII. Teste Auctore.

88. *ornata* Heer. — I. Budapest, Kalocsa, Hagymádfalva. II. Soóly, Baán.

89. *Attila* Reitt. — I. Budapest. IV. Rahó. VI. Mehádia.

v. *banatica* Reitt. — VI. Mehádia. (Auctor, 311, p. 48.)

90. *turgida* Er. — I. Montes Biharenses. III. Trencsén. IV. Mons Hoverla, Rahó. VI. Mehádia. VII. Fužine.

91. *apicalis* Er. — I. Budapest, Kalocsa, N.-Várad. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, A.-Bereczki, Tolcsva, Varannó, Mons Hoverla. V. Szucsák, N.-Szeben. N.-Csür, Brassó. VI. Mehádia.

92. *ruficornis* Marsh. — I. Budapest, Kalocsa,

P.-Poó, Nyiregyháza, Debreczen. IV. Szádellő, Bártfa, S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Huszt. V. Nagy-Szeben, N.-Csür, Gyeke. VI. Báziás.

93. *testacea* Steph. — I. Budapest, Peszér, Kalocsa. III. Kékkő, Trencsén. IV. Komjáti, S.-A.-Ujhely, Terebes, Lelesz. V. Peér, Tasnád, N.-Szeben, N.-Talmács. VI. Mehádia.

94. *formosa* Reitt. — VI. Herkulesfürdő. (Leg. J. Pável.)

95. *gibbula* Er. — I. Hagymádfalva. IV. Tolcsva, Mons Hoverla. V. N.-Szeben, N.-Csür, N.-Sink, Sz.-Régen. VI. Mehádia.

96. *rubricollis* Bris. — I. Budapest. V. N.-Csür. VI. Resicza, Mehádia, Rumunyest.

Sternodea Reitt.

97. *Baudii* Reitt. (*Weisei* Reitt.) — IV. Hoverla, Rahó.

Ephistemus Steph.

98. *nigriclavis* Steph. — I. Hagymádfalva. IV. S.-A.-Ujhely, Mons Hoverla. V. N.-Csür, Gyeke. VI. Temesvár, Mehádia.

99. *globulus* Payk. — I. Budapest, Kalocsa, Nyiregyháza, Debreczen. II. Soóly, Vilonya, Pécs. III. K.-Kálna, Trencsén, Putnok. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, Bély, Tárkány, Tolcsva, Varannó, Ungvár, Huszt. V. Nagy-Szeben Brassó. VI. Báziás, Mehádia.

v. *dimidiatus* Strm. — I. Kalocsa, N.-Várad. V. N.-Szeben, N.-Csür, Sz.-Régen. VI. Temesvár.

100. *exiguus* Er. — I. Budapest. III. Trencsén. Putnok. V. N.-Szeben. VI. Temesvár.

Fam. DERODONTIDAE.

Derodontus Lec.

1. *maculatus* Fuss. — II. Zircz. IV. Mons Szinnaikő. V. Montes Kerczenses. VII. Pakrac.

Fam. LATHRIDIIDAE.

Holoparamecus Curt.

1. *caularum* Aub. — I. Kalocsa, M.-Kovácsháza. III. V.-Mikola, K.-Kálna. V. N.-Szeben.

2. *Beloni* Reitt. — In regione VII. (Auctor, 310, p. 13.)

3. *Kunzei* Reitt. — VII. V.-Gorica. (Auctor, 297, p. 52.)

Anommatus Wesmael.

4. *12—striatus* Müll. — I. Budapest, Farkasd, Kalocsa, Debreczen, Hagymádfalva. II. Pécs. V. Malomviz, Dobra, Nagy-Csür, Sz.-Ujfalu. VI. Oravicza, Mehádia. VII. Capella.

5. *basalis* Reitt. — I. Budapest, Farkasd.

Dasycerus Brongn.

6. *sulcatus* Brongn. — II. Zircz, Kőszeg. III. Várna. V. Kolozsvár. VII. Fužine, Capella, Ljeskovac.

Lathridius Hbst.

7. *lardarius* Deg. — I. Montes Biharenses. III. Beszterczebánya, Zsolna. V. Mons Sánta.

8. *angusticollis* Gyll. — I. Budapest, Kalocsa. III. K.-Kálna, Zólyom, Trencsén, Tátrafüred. IV. S.-A.-Ujhely, Szomotor, Velejte, Terebes, Homonna, Mons Hoverla, Rahó. V. Tasnád, Nagy-Szeben, Nagy-Talmács, Fogaras. VI. Resicza, Oravicza, Mehádia. VII. Fužine. VIII. Fiume.

9. *Pandellei* Bris. — IV. Rahó, Mons Hoverla.

10. *alternans* Mannh. — I. Vaskóh. IV. Mons Hoverla, Rahó. V. Præsbe, Porcsesd, Mons Szurul. VI. Resicza, Ferenczfalva.

11. *rugicollis* Oliv. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. IV. Mons Hoverla. V. N.-Szeben, Holczmány, Sz.-Ujfalu, Fenyőfalva.

12. *constrictus* Gyll. — V. Oláhfalva, Segesvár.

Enicmus Thoms.

13. *hirtus* Gyll. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, N.-Várad. III. Koritnyicza. IV. Göncz, Szinna, Mons Hoverla. V. N.-Szeben, Præsbe, Montes Kerczenses, Fogaras, Rosnyó, Segesvár. VI. Kazán, Mehádia.

14. *minutus* L. — Frequens.

15. *consimilis* Mannh. — I. Szombatság. IV. Mons Hoverla. V. N.-Szeben, Montes Czódenses, Vallis Lotrióra, F.-Kercz, Brassó. VI. Resicza, Ferenczfalva, Mehádia.

16. *anthracinus* Mannh. (*carpathicus* Reitt.) — I. Szombatság. IV. Mons Hoverla. V. N.-Szeben, Montes Kerczenses. VI. Ferenczfalva, Mehádia. VII. Capella.

17. *testaceus* Steph. — I. Montes Biharenses. IV. Mons Hoverla. VI. Mehádia. VII. Capella.

18. *rugosus* Hbst. — I. N.-Várad. IV. S.-A.-Ujhely, Mons Hoverla, Nagy-Bocskó. V. Hátszeg, Nagy-Szeben, Montes Kerczenses, Brassó, Segesvár. VI. Oravicza, Mehádia. VII. Pakrac.

19. *fungicola* Thoms. — I. Budapest, Péczel.

20. *transversus* Oliv. — Communis.

21. *brevicornis* Mannh. — I. Budapest. VI. Herkulesfürdő.

Cartodere Thoms.

22. *elongata* Curt. — I. Budapest, Kalocsa, Nagy-

Várad. II. Villány. III. Trencsén. IV. Sátoralja-Ujhely, S.-Patak, Homonna. V. Peér, Nagy-Szeben, N.-Csür, Montes Kerczenses, Segesvár. VI. Mehádia.

23. *ruficollis* Marsh.—I. Kalocsa. IV. Ladomér, Mons Rabaszkala, Montes Beszkidenses. V. N.-Szeben.

24. *Argus* Reitt. — II. Pécs. (Leg. E. Kaufmann.)

25. *filiformis* Gyll. — I. Budapest. II. Pécs. III. Trencsén. V. Hátszeg, N.-Csür.

26. *filum* Aub. — I. Budapest. (Leg. Dr. M. Staub.)

Metophthalmus Wollast.

27. *hungaricus* Reitt. — VI. Herkulesfürdő. (Leg. J. Pável.)

Corticaria Marsh.

28. *pubescens* Gyll.—I. Budapest, Kalocsa, Szoboszló, N.-Várad. II. Sopron, Felsőlő. III. Hermánd, Zólyom, Putnok. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, S.-Patak, Varannó. V. Montes Retyezát, Hátszeg, Nagy-Csür, Montes Kerczenses. VI. Mehádia. VII. Eszék.

29. *crenulata* Gyll. — III. Zsolna. (Legit Dr. Car. Brancsik, 40, p. 27.)

30. *sylvicola* Bris. — V. Brassó. (Bielz, 27, p. 63.)

31. *fulva* Com. — I. Budapest. VIII. Fiume.

32. *umbilicata* Beck. — I. Budapest. II. Soóly. IV. S.-A.-Ujhely, Sáros-Patak, Tolcsva, Szomotor, K.-Azar, Parnó. V. Peér, Tasnád, Segesvár. VI. Zlaticza.

33. *denticulata* Gyll. — I. Budapest. V. Mons Sánta, Montes Cibinenses. VI. Mehádia. VII. Ljeskovac.

34. *longicornis* Hbst. — I. Budapest, Kalocsa. II. Ács. IV. Huszt. VI. Mehádia.

v. *badia* Mannh. — V. Vallis Lotrióra, Nagy-Szeben, Sz.-Régen.

35. *interstitialis* Mannh. — V. Montes Kerczenses. (Leg. A. Ormay, 264, p. 29.)

36. *Mannerheimi* Reitt. — V. Secundum Brisout. (50, p. 393.)

37. *linearis* Payk. — II. Boglár. III. Kékkő. V. Kercz.

38. *Eppelsheimi* Reitt. — VI. Herkulesfürdő. (Leg. J. Pável.)

39. *foveola* Beck. — V. Kercz. (Bielz, 27, p. 63.)

40. *lateritia* Mannh. — I. Hagymádfalva. IV. Szinna.

41. *longicollis* Zett. — I. N.-Várad. III. Kékkő. IV. Mons Hoverla, N.-Bocskó. V. Vallis Lotrióra, Præsbe, Kercz.

42. *Weisei* Reitt. — VI. Mehádia. (Leg. J. Pável.)

43. *serrata* Payk. — I. Budapest, N.-Várad. II. Baán, Soóly, Pécs. III. Kékkő. IV. Kassa, Sátoralja-Ujhely, Tolcsva, Szomotor, Párkány, N.-Bocskó. V. N.-Szeben, N.-Csür, Montes Kerczenses, Brassó, Földvár, Segesvár, Sz.-Régen. VI. Ferenczfalva, Mehádia.

44. *obscura* Bris. — I. Péczel. VI. Mehádia. VII. Capella, Ljeskovac.

45. *elongata* Gyll. — I. Budapest, Kalocsa. II. Pécs. III. Kékkő. IV. Sztropkó, Páczin. V. Hátszeg, Montes Kerczenses, Segesvár. VI. Mehádia. VIII. Fiume.

46. *ferruginea* Gyll. — I. Budapest. IV. Bártfa. V. Kercz. VI. Mehádia.

Melanophthalma Motsch.

47. *transversalis* Gyll. — I. Budapest, Peszér, Kecskemét, Kalocsa, N.-Várad. II. Baán, Soóly. III. Zólyom. IV. Kassa, S.-A.-Ujhely, S.-Patak, Alsó-Bereczki, Tolcsva, Varannó, Tokaj. V. Tasnád, Nagy-Szeben, Montes Kerczenses. VI. Temesvár, Ferenczfalva, Mehádia. VII. Eszék.

v. *crocata* Mannh. — I. Budapest, N.-Várad, Hagymádfalva, Szombatság, II. Ács. IV. Sátoralja-Ujhely, Szomotor, Tárkány, Nagy-Mihály, Varannó. V. N.-Szeben, Montes Kerczenses. VI. Mehádia.

v. *pallens* Mannh. — I. Hagymádfalva, Szombatság.

48. *sericea* Mannh. v. *albipilis* Reitt. — V. Gyeke. (Leg. L. Méhely, 247, p. 186.)

49. *distinguenda* Com. — I. Budapest, Peszér, Kalocsa, Debreczen, Szombatság. II. D.-Örs, Ács. IV. S.-A.-Ujhely, S.-Patak, A.-Bereczki, Tárkány. V. N.-Szeben, Montes Kerczenses. VI. Ferenczfalva, Mehádia. VIII. Fiume.

50. *fuscipennis* Mannh. — I. Budapest, Péczel. V. Montes Kerczenses. VI. Mehádia.

51. *gibbosa* Hbst. — Frequens.

52. *similata* Gyll. — I. Budapest, Péczel. III. Tátrafüred. IV. N.-Bocskó. V. N.-Szeben, Sz.-Régen. VI. Temesvár. VII. Eszék.

53. *fuscula* Humm. — Frequens.

v. *trifoveolata* Redtb. — V. Hátszeg, N.-Szeben.

54. *truncatella* Mannh. — I. Budapest, Kalocsa, N.-Várad. IV. Kassa, Lelesz. V. Hátszeg, Nagy-Szeben. VI. Oravicza.

55. *fulvipes* Com. — V. Montes Kerczenses. (Bielz, 27, p. 64.)

Migneauxia Duv.

56. *crassiuscula* Aub. — I. Budapest, M.-Berény.

Fam. TRITOMIDAE.

Pseudotriphyllus Reitt.

1. *suturalis* F. — II. Zircz. IV. Bártfa. V. N.-Szeben, Montes Cibinenses. VI. Resicza, Mehádia.

Triphyllus Latr.

2. *punctatus* F. — Frequens.

Litargus Er.

3. *connexus* Fourc. — In toto regno occurrit.

Tritoma Geoff.

4. *quadripustulata* L. — Communis.
v. *bipustulata* Schils. — V. Mons Kukuk, Tusnád.
v. *impustulata* Schils. — II. Zircz. V. Sósmező.
v. *erythrocephala* Er. — V. Segesvár, Zajzon.

5. *picea* F. — I. Budapest, Kalocsa, Makó, Kalota. III. K.-Kálna. IV. Rahó. V. Prázsmár, Segesvár. VII. Eszék.
v. *histrio* Sahlb. — I. Kalocsa, Hajós.
v. *salicis* Bris. — IV. S.-A.-Ujhely. (Leg. Dr. C. Chyzer.)

6. *decempunctata* F. — I. Péczel, N.-Várad. III. K.-Kálna. IV. Huszt. V. Hátszeg, N.-Szeben, Fogaras, Montes ad fluv. Maros. VI. Mehádia.

7. *atomaria* F. — I. Budapest, Kalocsa, Makó, Nagy-Várad. II. Szent-Márton. IV. Áj, Jászó, S.-A.-Ujhely, Mons Szinnaikő, Tárkány, Olyka, M.-Sziget. V. N.-Szeben, Felek, Montes Kerczenses, Bükszád, Medgyes, Segesvár, Szász-Régen. VI. Resicza, Stájerlak, Ferenczfalva, Mehádia. VII. Vrdnik.

8. *quadriguttata* Müll. — I. Budapest. II. Zircz. IV. S.-A.-Ujhely, A.-Bereczki, Tárkány, Nagy-Bocskó. V. Nagy-Szeben, Montes Kerczenses, N.-Sink, Brassó, Sz.-Régen.

9. *populi* F. — I. Budapest. IV. M.-Laborcz. V. N.-Szeben, Præsbe, Sz.-Régen.

10. *multipunctata* Hellw. — In regionibus montanis frequens.

11. *fulvicollis* F. — I. Montes Biharenses. II. Boglár. III. Trencsén. IV. Mons Szinnaikő. V. N.-Szeben, Præsbe, Sz.-Régen. VI. Mehádia, Korniaréva.
v. *Deubeli* Méhely. — V. Mons Surló. (Leg. Auctor, 246, p. 272.)

Typhaea Curt.

12. *fumata* L. — Frequens.

Fam. NITIDULIDAE.

Cercus Latr.

1. *pedicularius* L. — I. Budapest, Péczel, Debreczen. II. Sopron, Pécs. III. Zólyom, Hermánd, Trencsén. IV. Varannó, A.-Bereczki, N.-Mihály, Erdőbénye, S.-A.-Ujhely. V. M.-Záh. VI. Buziás, Janova.

2. *bipustulatus* Payk. — I. Budapest, Debreczen, Kalocsa. II. Pécs. IV. S.-A.-Ujhely. V. Segesvár. VI. Csenej.

3. *rufilabris* Latr. — V. Dobra. (Bielz, 27, p. 54.)

Heterhelus Duv.

4. *solani* Heer. — I. Budapest. III. Trencsén, Tátrafüred. V. N.-Szeben, Resinár, Montes Kerczenses, Brassó, Montes ad fluv. Maros. VII. Fužine.

5. *rubiginosus* Er. — III. Koritnyicza, Tátrafüred. IV. Bártfa, Mons Vihorlat, Varannó, Tokaj, Mons Hoverla, Cserna-Hóra, Mons Pietrosz. V. Mons Sánta, Bisztratelep, Montes Kerczenses. VI. Resicza.

Brachypterus Kug.

6. *gravidus* Ill. — Frequens.
v. *linariae* Steph. — IV. Tokaj. VI. Resicza.

7. *cinereus* Heer. — I. Budapest. III. V.-Mikola. V. Montes Cibinenses, Segesvár.

8. *quadratus* Strm. — I. Budapest, Péczel, Kecskemét, Kalocsa, Hajós. II. Pécs. VI. Temesvár, Csenej.

9. *glaber* Newm. — I. Budapest, Kalocsa, Szeged. VI. Csenej.

10. *unicolor* Küst. — II. Ács. (Leg. M. Hopffgarten, 175, p. 341.)

11. *urticae* F. — In toto regno frequens.

Carpophilus Leach.

12. *rubripennis* Heer. — I. Budapest, Szombatság. V. Tasnád. VI. Mehádia.

13. *hemipterus* L. — I. Budapest, Kalocsa.

14. *bipustulatus* Heer. — IV. Mező-Laborcz. VI. Stájerlak, Mehádia. VII. V.-Gorica. VIII. Fiume.

15. *sexpustulatus* F. — I. Budapest, Kalocsa, M.-Kovácsháza, Hagymádfalva. II. Boglár. III. Trencsén. IV. Varannó. V. Nagy-Szeben, Nagy-Csür, Holczmány.

Omosiphora Reitt.

16. *limbata* F. — I. Budapest, Kalocsa, M.-Kovácsháza. II. Sopron, Soóly. III. Trencsén. IV. Sátoralja-Ujhely, A.-Bereczki. V. Sztána, Nagy-Szeben, Resinár, N.-Csür, Holczmány, N.-Sink, Segesvár. VI. Mehádia.

Epuraea Er.

17. *decemguttata* F. — I. Budapest, Péczel, Szent-Lőrincz, Debreczen, Kalocsa. IV. S.-A.-Ujhely, K.-Azar, Szőllőske. V. Hátszeg, Præsbe, Nagy-Szeben, N.-Csür, Holczmány, N.-Sink, Fogaras, Brassó, Segesvár.

18. *silacea* Hbst. — IV. N.-Bocskó. V. Praesbe, N.-Szeben, Sz.-Ujfalu, Brassó, Rosnyó.
19. *aestiva* L. — Frequens.
v. *bisignata* Strm. — I. N.-Várad. II. Lacus Fertő. III. Trencsén. IV. Huszt. V. Præsbe, N.-Disznód, K.-Disznód, Szt.-Erzsébet, Sz.-Ujfalu, Montes Kerczenses. VI. Temesvár, Janova.
20. *melina* Er. — V. N.-Csür, Montes Kerczenses, Sz.-Régen. VI. Mehádia.
21. *deleta* Er. — I. Montes Biharenses. III. Zólyom. IV. Montes Vihorlat, Szinnaikő et Rabaszkala, O.-Ruszka. VI. Mehádia.
22. *fagi* Bris. — IV. Runyina. V. Mons Bucsecs. VI. Mehádia.
23. *terminalis* Mannh. — III. Tátrafüred. IV. Mons Hoverla, Vallis Vizér. V. Montes Sánta et Hargita.
24. *nana* Reitt. — IV. Mons Hoverla (sec. J. Frivaldszky).
25. *neglecta* Heer. — I. Budapest. III. Beszterczebánya, Beczkó. IV. Bártfa, S.-Patak, Mád, Mons Szinnaikő, Huszt. V. Hátszeg, N.-Szeben, Felek, Fogaras, Brassó. VI. Oravicza, Mehádia.
26. *rufomarginata* Steph. — V. Præsbe, Montes Kerczenses.
27. *castanea* Duft. — I. Hagymádfalva. IV. Mező-Laborcz, Mons Hoverla. V. Hátszeg, Segesvár. VI. Mehádia.
28. *variegata* Hbst. — II. Zircz. III. Trencsén, Koritnyicza. IV. S.-A.-Ujhely, Montes Szinnaikő et Hoverla. V. Hátszeg, N.-Szeben, Montes Cibinenses et Kerczenses. VI. Csenej, Oravicza, Mehádia.
29. *obsoleta* F. — I. Budapest, N.-Várad. II. Sopron. III. Trencsén. IV. M.-Laborcz, Rahó. V. Nagy-Szeben, Sz.-Ujfalu, N.-Talmács, Fogaras, Brassó, Prázsmár, Oláhfalu. VI. Mehádia. VII. Fužine.
30. *longula* Er. — I. N.-Várad. IV. M.-Laborcz, N.-Bocskó. V. Præsbe, N.-Szeben, Vöröstorony. VI. Mehádia.
31. *distincta* Grimm. — IV. Bártfa. (Legit Alex. Michalovics.)
32. *boreella* Zett. — IV. Mons Hoverla. V. Montes Cibinenses et Kerczenses, Segesvár.
33. *angustula* Er. — V. Præsbe. (Bielz, 27, p. 54.)
34. *pygmaea* Gyll. — III. Tátrafüred. IV. Rahó, Luhi, Vallis Vizér. V. Præsbe, Montes Cibinenses et Kerczenses, Brassó. VI. Janova, Rékas.
35. *carpathica* Reitt. — IV. Rahó. (Detex. J. Leder, Auctor, 295. p. 51.)
36. *pusilla* Ill. — I. Budapest, N.-Várad. III. Tátrafüred. IV. Vallis Vízér. V. Mons Hátszeg, Sz.-Ujfalu, Fenyőfalva, Præsbe, Kercz.
37. *parallela* Reitt. — I. Montes Biharenses. (J. Frivaldszky, 118, p. 512.)
38. *oblonga* Hbst. — III. Tátrafüred. V. Segesvár. VI. Janova, Rékas, Mehádia.
39. *Fussi* Reitt. — IV. Mons Balzatul. V. Vallis ad rivum Kiság (Montes Bodzaenses).
40. *florea* Er. — Frequens.

Micrurula Reitt.

41. *melanocephala* Marsh. — I. Budapest, Parád, Debreczen, N.-Várad. IV. Montes Szinnaikő et Hoverla. V. Montes Cibinenses et Kerczenses. VI. Grebenácz, Báziás, Oravicza, Mehádia, Rumunyest.

Nitidula Fabr.

42. *bipunctata* L. — Frequens.
43. *flavomaculata* Rossi. — IV. S.-A.-Ujhely. (Leg. Dr. C. Chyzer.)
44. *rufipes* L. — I. Budapest, Insula Csepel, Kalocsa. II. Zircz, Z.-Tapolcza, Pécs. III. Trencsén, Tátrafüred. IV. Bártfa, O.-Ruszka, N.-Bocskó. V. N.-Szeben, N.-Csür, Brassó, Medgyes, Szász-Régen, Besztercze. VI. Báziás.
45. *carnaria* Schall. — I. Budapest, Péczel, Kecskemét, Kalocsa. II. Zircz, Z.-Tapolcza, N.-Harsány, Pécs. IV. S.-A.-Ujhely. V. Hátszeg, N.-Szeben, N.-Csür. VI. Bázos. VIII. Fiume.

Stelidota Er.

46. *sexguttata* Sahlb. — IV. Mons Vihorlat. (Leg. Dr. C. Chyzer.)

Omosita Er.

47. *depressa* L. — II. Sopron. IV. S.-A.-Ujhely. V. N.-Csür, Sz.-Ujfalu, Volkány, N.-Sink, Brassó, Segesvár. VI. Janova.
48. *colon* L. — Frequens.
49. *discoidea* F. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. Sopron, Pécs. IV. Bártfa, Szinna. V. N.-Szeben, Sz.-Ujfalu, Brassó, Segesvár, Sz.-Régen. VI. Mehádia.

Soronia Er.

50. *punctatissima* Ill. — I. Budapest. II. Zirez. V. N.-Szeben, K.-Disznód, Montes Kerczenses et Fogarasenses.
51. *grisea* L. — I. Budapest, Péczel, Besnyő, Debreczen, Kalocsa. N.-Várad. II. Zircz, Pécs. III. Trencsén, Beczkó, Putnok. IV. S.-A.Ujhely, Tolcsva, A.-Bereczki, K.-Azar, N.-Bocskó. V. Hátszeg, Nagy-Szeben, Holczmány, N.-Sink, Brassó, Prázsmár, Segesvár, Sz.-Régen, M.-Záh, ad balneum Valea-Vinului. VI. Temesvár. VII. Eszék.

Amphotis Er.

52. *marginata* F. — In toto regno occurrit.

Ipidia Er.

53. *quadrinotata* F. — I. Kalocsa, N.-Várad, Monyásza. II. N.-Vázsony, P.-Vadé, Pécs. III. Beczkó, Á.-Váralja. IV. Tolcsva, Beregszász, Huszt. V. Montes Cibinenses, Kerczenses et Fogarasenses, Borszék, Gyergyó, Toplicza. VI. Stájerlak, Oravicza, Kazán, Mehádia. VII. Vrdnik.

54. *binotata* Reitt. — Hungaria. (Auctor, 289, p. 88.)

Pria Steph.

55. *dulcamarae* Scop. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Nyiregyháza. II. Ács, Pécs. III. Zsolna. IV. S.-A.-Ujhely, Czéke, Beregszász. V. Tasnád, Hátszeg, N.-Szeben, Szelindek. VI. Oravicza, Mehádia, Rumunyest.

Meligethes Steph.

56. *hebes* Er. — I. Budapest. III. Javorina. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, K.-Azar, Mons Szinnaikő, Tokaj, Mons Hoverla. V. N.-Szeben, Montes Cibinenses et Kerczenses, Gy.-Tölgyes. VI. Oravicza, Mehádia.

57. *rufipes* Gyll. — II. Sopron. III. Trencsén, Koritnyicza. VI. Csenej. VII. Eszék.

58. *lumbaris* Strm. — I. N.-Várad. V. Hátszeg. VI. Csenej, Stájerlak, Mehádia.

59. *epuraeoides* Reitt. — IV. Kassa. (Leg. L. Biró.)

60. *humerosus* Reitt. — In regione V. (Auctor, 286, p. 60.)

v. *subalpinus* Friv. — IV. Luhi, Mons Pietrosz.

61. *pumilus* Er. — I. N.-Várad. II. Ács. V. Holczmány, N.-Csür, Barót, Lacus ad Kisszék.

v. *decoloratus* Först. — V. Barót, Brassó.

62. *coracinus* Strm. — Frequens.

63. *subaeneus* Strm. — I. Budapest. III. Koritnyicza. V. Hátszeg, Szt.-Erzsébet, N.-Csür, Fogaras, Előpatak, Oláhfalu, Sz.-Régen.

64. *brassicae* Scop. — Communis.

v. *coeruleus* Marsh. — II. Pécs. IV. Jászó, Torna.

v. *dauricus* Motsch. — VII. Capella. (Reitter, 297, p. 51.)

65. *viridescens* F. — I. Mons Pilis, N.-Várad. III. Trencsén, Koritnyicza, Lacus Zöldtó dictus. IV. Áj, M.-Laborcz, Máramaros-Sziget, N.-Bocskó. V. K.-Disznód, N.-Talmács. VI. Temesvár, Mehádia.

66. *Czwalinai* Reitt. — VI. Herkulesfürdő. (Leg. J. Pável.)

67. *symphyti* Heer. — Frequens.

68. *corvinus* Er. — V. Előpatak, Segesvár.

69. *subrugosus* Gyll. — I. Montes Biharenses. III. Kézsmárk. IV. Luhi, V. N.-Szeben, Mons Sánta-K.-Torony, Kercz, Medgyes, Szász-Régen. VI. Mehádia, Korniaréva. VIII. Fiume.

70. *serripes* Gyll. — I. Budapest, Mons Pilis. V. Ad balneum Gyógy, K.-Torony, Brassó, Szász-Régen, Gyeke. VI. Csenej.

71. *Rosenhaueri* Reitt. — I. Debreczen (Leg. L. Biró.)

72. *nanus* Er. — I. B.-Csaba, Szeged. IV. Páczin. V. N.-Szeben. VI. Grebenácz.

73. *villosus* Bris. — II. Ács. (Leg. M. Hopffgarten 175, p. 341.)

74. *dalmatinus* Reitt. — I. Budapest. (Leg. J. Pável.)

75. *obscurus* Er. — II. Ács, N.-Vázsony. IV. Torna, S.-A.-Ujhely, Tolcsva. V. Előpatak, Oláhfalu. VII. Eszék.

v. *confusus* Bris. — II. Ács, N.-Vázsony.

76. *Hoffmanni* Reitt. — II. Pécs. (Leg. J. Pável.)

77. *parallelus* Reitt. — II. N.-Vázsony. V. Rosnyó.

78. *bidens* Bris. — I. Budapest. V. Montes Kerczenses, F.-Komána. VI. Báziás. VII. Eszék.

79. *umbrosus* Strm. — I. Budapest, Mons Pilis. III. Kézsmárk. IV. Torna, Bártfa, Szőllőske, N.-Mihály, Varannó, Nagy-Bocskó. V. Tasnád, N.-Szeben, Montes Kerczenses, Brassó, Kőhalom, Segesvár, Héviz, Oláhfalu. VI. Resicza, Krassova, Ferenczfalva, Oravicza, Mehádia. VIII. Fiume.

80. *ater* Bris. — V. Tasnád, Montes Kerczenses.

81. *maurus* Strm. — I. Budapest, Debreczen. II. Pécs. IV. Torna, Bártfa. V. Hátszeg, K.-Disznód, Brassó, Kőhalom. VI. Dognácska, Resicza, Mehádia. VIII. Fiume.

v. *calvus* Reitt. — V. N.-Csür. (Leg. C. Fuss.)

82. *incanus* Strm. — II. Ács, Zircz, Z.-Tapolcza. IV. Visk. V. Kőhalom, Oláhfalu.

83. *Gredleri* Reitt. — VI. Oravicza. (Legit Joan. Frivaldszky.)

84. *ovatus* Strm. — IV. Sátoralja-Ujhely, Mons Rabaszkala.

85. *brachialis* Er. — I. Budapest, Szendrő, Szeged. II. Ács, N.-Vázsony. IV. S.-A.-Ujhely. V. Nagy-Szeben.

86. *picipes* Strm. — I. Budapest, B.-Csaba, Nyiregyháza. IV. Homonna, N.-Mihály, Luhi, Kőrösmező. V. N.-Szeben, Oláhfalu.

87. *moestus* Heer. — IV. Czéke, Lasztócz. V. Balla, N.-Szeben, Sz.-Régen.

88. *flavipes* Strm. — I. Budapest, Nyiregyháza, Debreczen, Nagy-Várad. II. Ács, Nagy-Vázsony, Pécs. III. Kékkő. IV. S.-A.-Ujhely, Erdőbénye,

Páczin, Nagy-Bocskó. V. Nagy-Szeben, N.-Csür, K.-Torony, Montes Kerczenses.

89. *memnonius* Er.—V. Kőhalom. (Bielz, 27, p. 65.)

90. *ochropus* Strm. — IV. Torna, Bártfa, Sátoralja-Ujhely, Mons Vihorlat. V. N.-Szeben, Montes Cibinenses, Kőhalom, Medgyes.

91. *brunnicornis* Strm. — II. N.-Vázsony, Pécs. IV. Sztropkó, Mons Vihorlat. V. Kőhalom. VI. Resicza, Herkulesfürdő.

92. *angustatus* Küst. — V. Montes Kerczenses, Brassó.

93. *Diecki* Reitt. — I. Mons Pilis. (Legit E. Frivaldszky.)

94. *atramentarius* Först. — II. Ács. (Leg. M. Hopffgarten, 175, p. 341.)

95. *difficilis* Heer. — I. Mons Pilis, Makó. II. Pécs. III. Tátrafüred. IV. S.-A.-Ujhely, Sáros-Patak, Varannó, Nagy-Bocskó. V. Hátszeg, N.-Csür, K.-Torony, Oláhfalu. VII. Fužine. VIII. Fiume.

v. *Kunzei* Er. — V. Montes Cibinenses. (Bielz, 27, p. 65.)

96. *morosus* Er. — I. Montes Biharenses. III. Trencsén. V. N.-Csür, Kőhalom, Héviz, Mons Keresztényhavas, Brassó, Segesvár. Toplicza. VI. Mehádia.

97. *viduatus* Strm. — I. Budapest. II. N.-Vázsony. IV. Áj, Szőllőske, Mons Menczul. V. Sz.-Ujvár, Nagy-Szeben, N.-Csür, Montes Kerczenses. VII. Eszék.

98. *pedicularius* Gyll. — I. Nyiregyháza. II. Ács, Sopron. III. Zólyom, Tátrafüred. IV. Kassa, Bártfa, Czigánd. V. N.-Csür, Montes Kerczenses, Kőhalom. VI. Resicza.

99. *assimilis* Strm. — V. Segesvár, Barót, Gyeke.

100. *distinctus* Strm.—V. Oláhfalu. (Bielz, 27, p. 65.)

101. *lepidii* Mill. — I. Budapest, Csongrád. II. Z.-Tapolcza. V. N.-Csür, M.-Záh, Gyeke. VI. Resicza.

102. *discoideus* Er. — I. Budapest, Szentes. IV. M.-Sziget.

103. *rotundicollis* Bris. — VI. Mehádia. (Leg. J. Pável.)

104. *Krüperi* Reitt. — II. Ács. (Leg. M. Hopffgarten.)

105. *Frivaldszkyi* Reitt. — I. Budapest, Csongrád.

106. *tristis* Strm. — V. Bükszád, Oláhfalu, Segesvár. VI. Palics. VII. Eszék.

107. *planiusculus* Heer. — I. Budapest. II. Ács. IV. M.-Sziget. V. Nagy-Csür, Előpatak, Bükszád, Oláhfalu.

108. *lugubris* Strm. — II. N.-Vázsony. IV. Áj, Sátor-Alja-Ujhely, Czéke, Mons Rabaszkala, Beregszász. V. N.-Szeben, Mons Tészla, Barót, VI. Temesvár.

109. *gagatinus* Er. — I. Derékegyháza, Szentes. IV. S.-A.-Ujhely, N.-Mihály, Szerencs. V. Montes Kerczenses, Brassó (Czenk), F.-Komána, Barót. VI. Grebenácz.

110. *egenus* Er. — I. Horgos. II. Ács. IV. Tőrna, Bártfa, Kassa, Homonna, N.-Bocskó. V. Balla, N.-Csür, Fenyőfalva, Előpatak, Segesvár. VI. Mehádia. VII. Eszék, Podsused.

111. *exilis* Strm. — I. Mons Pilis. II. Ács, N.-Vázsony, Sopron. IV. Torna, S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Mons Vihorlat. V. Montes Kerczenses Oláhfalu.

112. *fumatus* Er. — V. Kercz, Sz.-Régen.

113. *punctatus* Bris. — II. N.-Vázsony. (Leg. M. Hopffgarten, 175, p. 339.)

114. *bidentatus* Bris. — I. Budapest. V. K.-Disznód, N.-Csür, Mons Sánta.

115. *erythropus* Gyll. — I. Budapest, Nyiregyháza, Debreczen. II. Pécs. IV. S.-A.-Ujhely, Czéke, M.-Sziget. V. N.-Szeben, Szelindek, F.-Komána, Barót. VI. Krassova, Mehádia. VII. Eszék.

116. *solidus* Strm. — I. Budapest. IV. S.-A.-Ujhely. V. Ad balneum Gyógy, N.-Szeben, Oláhfalu.

117. *brevis* Strm. — I. Budapest, Mons Pilis. V. Segesvár.

Thalycra Er.

118. *fervida* Oliv. — I. Budapest. II. Zircz. V. N.-Szeben, Segesvár. VI. Mons Domoglet.

Pocadius Er.

119. *ferrugineus* F. — I. Péczel, Rézbánya. II. Sopron, Visz. III. Zólyom, Trencsén, Tátrafüred. IV. Bártfa, Montes Szinnaikő et Vihorlat. V. Hátszeg, Szent-Erzsébet, N.-Csür, Resinár, Medgyes, Kőhalom, Segesvár.

120. *Wajdelota* Wank. — VII. V.-Gorica. (Reitt. 297, p. 51.)

Cychramus Kug.

121. *4-punctatus* Hbst. — I. Montes Biharenses. II. Sopron. III. Trencsén, Tátrafüred. IV. Montes Szinnaikő et Vihorlat, Kőrtvélyes, Montes Hoverla et Pietrosz. V. Præsbe, Montes Kerczenses, Fogaras, Brassó, Prázsmár, Lacus Annató dictus. VII. Pakrac.

122. *luteus* F. — In regionibus montanis frequens.

v. *fungicola* Heer (♂ *alutaceus* Reitt.) — Ut prior.

Cyllodes Er.

123. *ater* Hbst. — I. Budapest, Rézbánya, Monyásza. II. N.-Vázsony, Pécs. IV. S.-A.-Ujhely, Bánszka, Olyka. Montes Szinnaikő et Vihorlat. V. Frequens. VI. Resicza, Orsova, Mehádia, Rumunyest.

Cryptarcha Schuck.

124. *strigata* F. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa,

N.-Várad. II. Zircz, Pécs. III. K.-Kálna. IV. Szőllőske. V. Nagy-Szeben, N.-Csür, Fogaras, Brassó, Sz.-Régen. VII. Našice.

25. *imperialis* F. — I. Budapest, Debreczen, Péczel. II. Zircz, Pécs. III. K.-Kálna. IV. S.-A.-Ujhely, A.-Bereczki, Tolcsva, K.-Azar. V. Præsbe, K.-Disznód, Nagy-Szeben, N.-Csür, Holczmány, N.-Sink, Brassó, Sz.-Régen.

Glischrochilus Murr.

126. *quadripunctatus* Oliv. — I. Kalocsa. II. Zircz, Sopron. III. Trencsén, Lőcse. IV. Bártfa, Mező-Laborcz, N.-Bocskó. V. Malomviz.

127. *quadriguttatus* F. — I. Mons Pilis. II. Zircz. III. Beczkó. IV. Mons Vihorlat. V. Montes Kerczenses, Botfalu, Segesvár, Montes ad fluv. Maros. VI. Mehádia.

128. *quadripustulatus* L. — III. Zsolna, Koritnyicza. IV. Bártfa, Ungvár, Mons Hoverla. V. Frequens. VI. Stájerlak.

Pityophagus Schuck.

129. *quercus* Reitt. — I. Szombatság. II. Pécs. VI. Ulma.

130. *ferrugineus* L. — III. Beczkó, Koritnyicza, Tátra (Csorbai tó). V. Montes Biharenses, Mons Szurul, Montes Kerczenses, Brassó, Segesvár. VI. Resicza.

Rizophagus Herbst.

131. *grandis* Gyll. — III. F.-Bocza. (Leg. J. Weise, 392, p. 246.)

132. *depressus* F. — III. Trencsén. IV. Bártfa, M.-Sziget. V. Hosszufalu.

133. *cribratus* Gyll. — IV. Kassa, Bártfa, N.-Bocskó. V. Ad balneum Valea-Vinului, Nagy-Szeben, Montes Cibinenses, Fogaras, Gy.-Tölgyes. VI. Báziás.

134. *ferrugineus* Payk. — I. Budapest, Kalocsa, Száldobágy. II. Pécs. III. Zólyom, Hermánd. IV. S.-A.-Ujhely, Vallis Vizér. V. Hátszeg, Nagy-Szeben, N.-Csür, K.-Disznód, Montes Kerczenses. VI. Mehádia.

135. *perforatus* Er. — I. Budapest. IV. Bártfa. V. Bodza. VII. Mehádia.

136. *parallelocollis* Gyll. — I. Budapest, Kalocsa. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely. V. Hátszeg, Brassó (Czenk), M.-Sámsond.

137. *nitidulus* F. — I. Budapest, N.-Várad. III. Hermánd, Trencsén. IV. Mons Hoverla. V. Ad balneum Valea-Vinului, Fogaras. VI. Mehádia.

138. *dispar* Payk. — Frequens.

139. *bipustulatus* F. — Ut prior.

140. *politus* Hellw. — I. Budapest. IV. N.-Bocskó, Huszt. V. Hátszeg, Vöröstorony, Szász-Régen, Gy.-Tölgyes, Deés. VI. Resicza.

141. *puncticollis* Sahlb. — IV. Mons Hoverla, Montes Beszkidenses.

142. *aeneus* Richt. — III. Zsolna. IV. Bártfa, Mező-Laborcz. V. N.-Szeben. VI. Resicza, Mehádia.

143. *parvulus* Payk. — V. Vallis Zsil, Montes Cibinenses, K.-Disznód, Montes Kerczenses.

Fam. TROGOSITIDAE.

Nemosoma Latr.

1. *elongatum* L. — I. Budapest, Kalocsa. V. Nagy-csür, Berethalom, Szász-Régen. VI. Resicza, Orsova, Mehádia.

Trogosita Oliv.

2. *coerulea* Ol. — I. Budapest. II. Kőszeg. VI. Herkulesfürdő. VII. Ljeskovac.

Tenebroides Pill.

3. *mauritanicus* L. — Communis.

Calitys Thoms.

4. *scabra* Thunb. — V. Borszék. VI. Mons Domoglet.

Ostoma Laich.

5. *grossum* L. — I. Montes Biharenses. III. Beszterczebánya, Vallis Vrátna, Koritnyicza, Oravicz. IV. O.-Poruba, Olyka. V. Montes Kerczenses et Brassóenses, Mons Nagykőhavas, Bükszád, Borszék, Montes ad fluv. Maros, Sz.-Régen. VI. Stájerlak, Mehádia. VII. Teste J. Frivaldszky.

6. *ferrugineum* L. — I. Debreczen, Kalota. II. Felsőlő. III. Trencsén, Koritnyicza. IV. Bártfa, Vallis Vizér. V. Frequens.

7. *oblongum* L. — I. N.-Várad, Kalota. II. Szent-Márton. III. K.-Kálna, Beszterczebánya, Putnok. IV. Tolcsva, Szőllőske, N.-Mihály, Varannó, Nagy-Bocskó. V. Frequens. VI. Ferenczfalva, Mehádia.

Thymalus Latr.

8. *limbatus* F. — I. Vallis Jád. II. Zircz. III. Trencsén, Koritnyicza. IV. Mons Szinnaikő. V. Frequens. VI. Ferenczfalva, Mehádia. VII. Lipik.

Fam. COLYDIIDAE.

Diodesma Latr.

1. *subterranea* Er. — I. Budapest. II. Pécs. V. Montes Cibinenses. VI. Oravicza, Zlaticza. VII. Mrzla-Vodica.

Orthocerus Latr.

2. *muticus* L. — I. Budapest. II. Zircz, N.-Vázsony. III. Zólyom, Zsolna. IV. S.-A.Ujhely, Szerencs. V. Præsbe, Gy.-Tölgyes. VI. Mehádia.

3. *tereticornis* Er. — I. Budapest. (Leg. J. Kovács.)

Corticus Latr.

4. *diabolicus* Schauf. — I. Remecz, Tőtös. V. Montes Kerczenses. VI. Resicza, Stájerlak, Oravicza, Szászka, Mehádia.

5. *tuberculatus* Germ. — I. Belényes. IV. Montes Balzatul et Hoverla. V. Frequens. VI. Resicza, Stájerlak, Ferenczfalva, Mehádia.

Apistus Motsch.

6. *Rondanii* Villa. — IV. Tolcsva. V. Zilah, Hátszeg (Páros). VI. Mehádia. VII. Ljeskovac.

Dechomus Duv.

7. *sulcicollis* Germ. — I. N.-Várad. II. Pécs. V. Montes Kerczenses, F.-Sebes, Brassó. VI. Herkulesfürdő, Rumunyest.

Pycnomerus Er.

8. *terebrans* Ol. — I. Péczel, Ónod, Szombatság, Lunka. III. K.-Kálna. IV. Tolcsva, K.-Azar. V. Nagy-Szeben, Holczmány, Szász-Régen. VI. Ferenczfalva.

Coxelus Latr.

9. *pictus* Strm. — I. Com. Szabolcs. II. Zircz. VI. Herkulesfürdő.

Langelandia Aub.

10. *anophthalma* Aub. — I. Kalocsa. III. Sasvár. V. N.-Csür. VI. Pecsenyeska.

Synchita Hellw.

11. *juglandis* F. — I. Budapest, Kalocsa, Debreczen. IV. Szinna. V. N.-Szeben.

12. *separanda* Reitt. — V. Teste Reitter (300, p. 126).

Cicones Curt.

13. *variegatus* Hellw. — I. Debreczen. II. Zircz, N.-Vázsony, Pécs. IV. Varannó, N.-Bocskó. V. Montes Kerczenses. VI. Mehádia. VII. Diakovár.

14. *pictus* Er. — II. Zircz. V. Montes Cibinenses et Kerczenses. VI. Resicza, Mehádia.

Endophloeus Er.

15. *spinulosus* Latr. — I. Lunka. II. Zircz, Pécs. V. Præsbe, Montes Fogarasenses. VI. Orsova. VII. Vrdnik, Ljeskovac.

Colobicus Latr.

16. *marginatus* Latr. — I. Budapest, Szt.-Endre, Kalocsa. II. Zircz. III. K.-Kálna, Putnok. IV. S.-A.-Ujhely, S.-Patak, N.-Mihály. V. N.-Szeben, Nagy-Csür, Vöröstorony, Montes Kerczenses, Szász-Régen. VI. Janova, Orsova, Drenkova, Mehádia.

Ditoma Herbst.

17. *crenata* F. — Communis.

Colydium F.

18. *elongatum* F. — I. Péczel, Kalocsa, Debreczen, N.-Várad. II. Montes Bakonyenses. III. K.-Kálna, Trencsén. IV. K.-Azar, Mons Szinnaikő, Nagy-Bocskó. V. Tasnád, Hátszeg, Nagy-Szeben, Sz.-Ujfalu, K.-Disznód, N.-Csür, Montes Fogarasenses, Brassó, Tömös, Segesvár, Sz.-Régen. VI. Mehádia. VII. Našice.

19. *filiforme* F. — I. Budapest. II. Zircz, Z.-Tapolcza. III. Beczkó, Putnok. IV. S.-A.-Ujhely. V. Nagy-Szeben, Fogaras, Brassó. VI. Mehádia. VII. Lipik.

Aulonium Er.

20. *trisulcum* Fourc. — I. Kalocsa. (Leg. F. Speiser, 349, p. 27.)

21. *ruficorne* Ol. — II. Pécs. (Leg. Dr. E. Kaufmann.)

Aglenus Er.

22. *brunneus* Gyll. — I. Budapest, Kalocsa, Debreczen. IV. Göncz. V. N.-Szeben, Nagy-Csür, Sz.-Ujfalu. VI. Herkulesfürdő.

Oxylaemus Er.

23. *cylindricus* Pz. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Debreczen, Szombatság, Lunka. II. Pécs. V. Dobra, N.-Szeben. VI. Mehádia.

Teredus Schuck.

24. *opacus* Habelm. — V. Montes Cibinenses. (Bielz, 27, p. 66.)

Bothrideres Er.

25. *contractus* F. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. III. K.-Kálna. IV. Varannó. V. Hátszeg, Nagy-Szeben, Szent-Erzsébet, Nagy-Csür, Sz.-Ujfalu, Segesvár, Deés, M.-Záh. VI. Lippa, Ferenczfalva, Kazán, Mehádia. VII. Vrdnik.

Cerylon Latr.

26. *evanescens* Reitt.— I. Remecz. II. Ács, Montes Bakonyenses. IV. S.-A.-Ujhely. V. Kercz. VI. Resicza, Mehádia. VII. V.-Gorica.

27. *semistriatum* Perr. — I. Montes Biharenses. VI. Com. Krassó-Szörény.

28. *fagi* Bris. — Frequens.
29. *histeroides* F. — Communis.
30. *atratulum* Reitt. — IV. Mons Hoverla. (Weise, 374, p. 360.)
31. *ferrugineum* Steph. — Frequens.
32. *impressum* Er. — In toto regno occurrit.
33. *deplanatum* Gyll. — I. Budapest, Kalocsa, N.-Várad. IV. Komjáti, S.-A.-Ujhely, Szomotor, Mons Szinnaikő, Ladomér. V. Hátszeg, Porcsesd, Montes Kerczenses, Prázsmár, Segesvár, Sz.-Régen. VI. Mehádia.

Fam. RHYSODIDAE.

Rhysodes Dalm.

1. *exaratus* Serv. — II. Zircz, P.-Vadé. V. Brassó. VII. Lipik.
2. *sulcatus* F. — I. Parád, Remecz, Hagymádfalva. II. Zircz, Csurgó. IV. Bártfa, Mons Szinnaikő. VI. Montes Domoglet et Szárko. VII. Capella.

Clinidium Kirby.

3. *canaliculatum* Costa. — VII. Lukovo-Sugarje. (Leg. M. Padewieth.)

Fam. CUCUJIDAE.

Prostomis Latr.

1. *mandibularis* F. — I. Parád. III. Putnok. V. N.-Szeben, Gy.-Tölgyes. VI. Orsova, Mehádia.

Cucujus F.

2. *cinnabarinus* Scop. — I. Budapest, Kalocsa, Feketeerdő. II. Montes Bakonyenses. III. K.-Ujhely. IV. O.-Poruba, Mons Hoverla. V. Segesvár, Borszék, Montes Radnaenses. VI. Német-Bogsán, Mehádia, Mons Szárko.
3. *haematodes* Er. — V. Mons Kereszténvhavas, Tusnád. VII. Sugarje (Velebit).

Pediacus Schuck.

4. *depressus* Hbst. — V. Fogaras, Segesvár. VI. Mehádia, Rumunyest. VII. Montes Fruska-Góra.
5. *dermestoides* F. — I. Budapest. II. Mons Fekete (Bakony). III. Ónod, Putnok. IV. Bártfa, Mons Szinnaikő. V. Kolozsvár, Malomviz, K.-Disznód, N.-Csür, Sz.-Ujfalu, Szt.-Erzsébet, Montes Kerczenses, Brassó, Szász-Régen. VI. Resicza, Mehádia.
6. *fuscus* Er. — V. N.-Szeben. (Bielz, 27, p. 66.)

Phloeostichus Redtb.

7. *denticollis* Redtb. — VI. Resicza, Mehádia.

Laemophloeus Steph.

8. *monilis* F. — I. Budapest, Parád, Kalocsa, Nagy-Várad. II. Boglár, Pécs. III. K.-Kálna. IV. Bánszka, Homonna. V. Zilah, N.-Sink. VI. Német-Bogsán, Resicza, Orsova, Mehádia.
9. *castaneus* Er. — I. Péczel, M.-Kovácsháza. III. Beczkó.
10. *bimaculatus* Payk. — V. Holczmány. (Bielz. 27, p. 67.)
11. *testaceus* F. — I. Budapest, Kalocsa, N.-Várad. II. Boglár, Pécs. III. K.-Kálna. IV. Derenk, S.-A.-Ujhely, K.-Azar, Bánszka. V. Hátszeg, N.-Szeben, Szent-Erzsébet, Sz.-Ujfalu, Kercz, Brassó. VI. Resicza, Oravicza, Mehádia. VII. Eszék.
12. *duplicatus* Waltl. — I. Budapest, Kalocsa, M.-Kovácsháza, Száldobágy. III. Putnok. IV. K.-Azar. V. Tasnád, Hátszeg, N.-Csür, Szamos-Ujfalu, Segesvár. VI. Mehádia. VII. Eszék.
13. *pusillus* Schh. —V. N.-Szeben. (Bielz, 27, p. 67.)
14. *ferrugineus* Steph. — I. Budapest, Péczel, N.-Várad. III. Beczkó. V. Prázsmár, Segesvár. VI. Mehádia.
15. *ater* Ol. — V. N.-Szeben, N.-Csür, Præsbe, Sz.-Régen.
16. *juniperi* Grouv. — I. Kalocsa. (Leg. F. Speiser.)
17. *alternans* Er. — I. Montes Biharenses. VI. Mehádia.
18. *clematidis* Er. — I. Budapest, Péczel. III. Trencsén. V. Szt-Erzsébet, N.-Csür, N.-Talmács. VI. Mehádia.
19. *corticinus* Er. — V. N.-Szeben. (Bielz, 27, pag. 67.)

Lathropus Er.

20. *sepicola* Müll. — IV. M.-Sziget. V. Tasnád. VI. Herkulesfürdő.

Dendrophagus Schönh.

21. *crenatus* Payk. — I. Tőtös. V. Malomviz, Brassó. VI. Mehádia, Korniaréva.

Hyliota Latr.

22. *planatus* L. — Frequens.

Psammoecus Latr.

23. *bipunctatus* F. — I. Budapest, Péczel, Peszér, Kalocsa, Nyiregyháza. III. Agárd. IV. Sátoralja-Ujhely, Czigánd. VI. Temesvár, Titel.
v. *Boudieri* Luc. — V. Segesvár. (Legit Dr. C. Petri, 269, p. 10.)

Hypocoprus Motsch.

24. *lathridioides* Motsch. — I. Péczel. (Legit D. Kuthy.)

25. *quadricollis* Reitt. — I. Kalocsa. (Legit F. Speiser.)

Airaphilus Redtb.

26. *elongatus* Gyll. — VIII. Buccari. (Leg. L. Biró.)

Silvanus Latr.

27. *surinamensis* L. — I. Budapest. III. N.-Bélicz, Beszterczebánya, Trencsén. IV. N.-Bocskó. V. N.-Szeben. VII. Eszék.

28. *unidentatus* Ol. — Communis.

29. *bidentatus* F. — I. Budapest. II. Z.-Tapolcza. V. Nagy-Szeben, N.-Csür, Montes Kerczenses, Brassó, Medgyes. VI. Resicza, Mehádia. VII. Eszék.

30. *similis* Er. — I. Eger, Hagymádfalva. IV. Bártfa. VI. Resicza.

Cathartus Reiche.

31. *advena* Waltl. — I. Kalocsa. (Leg. F. Speiser.)

Monotoma Herbst.

32. *conicollis* Aub. (*angusticollis* Thoms.) — V. Segesvár. (Leg. Dr. C. Petri, 269, p. 10.)

33. *spinicollis* Aub. — I. Budapest, Kalocsa, Nyiregyháza, Debreczen. III. Kékkő. IV. Komjáti, Páczin. V. Hátszeg.

34. *quadrifoveolata* Aub. — I. Budapest, Debreczen. IV. Homonna. V. N.-Szeben, N.-Csür.

35. *quadriimpressa* Motsch. — I. Kalocsa. (Legit F. Speiser, 349, p. 27.)

36. *quadricollis* Aub. — I. Budapest. V. Hátszeg.
v. *quisquiliarum* Redt. — I. Budapest. VI. Báziás.

37. *picipes* Hbst. — Frequens.

38. *longicollis* Gyll. — I. Budapest. III. Zólyom. V. Szucsák, N.-Szeben. VI. Herkulesfürdő.

Fam. TRIXAGIDAE.

Trixagus Kug.

1. *fumatus* F. — In regionibus montanis frequens.

2. *tomentosus* Deg. — Ut prior.
v. *flavescens* Marsh. — V. K.-Disznód, Resinár.

Fam. DERMESTIDAE.

Dermestes L.

1. *vulpinus* F. — I. Budapest. V. N.-Szeben. VIII. Carlopago.

2. *Frischi* Kug. — Communis.

3. *murinus* L. — I. Budapest. II. N.-Vázsony, Felsőlő, Pécs. III. Rosnyó. IV. Kassa, Sátoralja-Ujhely.

4. *laniarius* Ill. — Frequens.

5. *mustelinus* Er. — I. Budapest. IV. N.-Mihály. VI. Mehádia.

6. *undulatus* Brahm. — I. Budapest, Szt-Endre, Peszér, Kecskemét, Kalocsa, Érmihályfalva. II. Z.-Tapolcza, Pécs. IV. Komjáti, S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Tárkány, Szöllőske. V. Tasnád, Nagy-Szeben, Fogaras, Brassó, Segesvár, Gyeke. VI. Temesvár, Báziás.

7. *atomarius* Er. — I. Budapest, Dabas, Kalocsa. II. Ács. III. K.-Kálna. IV. Torna, Komjáti, S.-A.-Ujhely, Tolcsva, A.-Bereczki. VI. Mehádia. VII. Fužine.

8. *tesselatus* F. — I. Budapest, Dabas, Peszér. II. Sopron, Z.-Tapolcza. III. K.-Kálna. V. Vizakna, Marpód, Medgyes. VI. Temesvár, Mehádia.

9. *bicolor* F. — I. Budapest, Kalocsa. III. Nyitra, Beczkó. V. N.-Szeben, Segesvár.

10. *lardarius* L. — Communis.

11. *ater* Ol. — II. N.-Vázsony. IV. Varannó. V. N.-Falu, Kolozsvár, Hátszeg, N.-Szeben, Szelindek, N.-Csür, Fogaras, Brassó, Sz.-Régen. VI. Temesvár.
v. *fuliginosus* Rossi. — I. Budapest, Péczel. VI. Mehádia.

Montandonia Jacquet.

12. *latissima* Bielz. — V. Mons Sánta (Montes Cibinenses), K.-Disznód, Vallis Czód, Præsbe, Porcsesd, Mons Szurul, Fogaras, Brassó. VI. Mons Domoglet.

Attagenus Latr.

13. *Schäfferi* Hbst. — III. Tátrafüred. V. Hátszeg, Rosnyó, Segesvár, Borszék.

14. *piceus* Ol. — Communis.

15. *marginicollis* Küst. — V. Mons Királykő. (Leg. L. Méhely, 247, p. 188.)

16. *pellio* L. — Communis.

17. *vigintiguttatus* F. — I. Budapest, Péczel, Nagy-Várad. II. Sopron, Felsőlő. IV. Bártfa, Sátoralja-Ujhely. V. N.-Szeben. VI. Grebenácz, Mehádia.

18. *pantherinus* Ahr. — V. Szt-Erzsébet, Kercz, Segesvár.

Megatoma Sam.

19. *undata* L. — I. Budapest, Isaszeg, Kalocsa. III. Beczkó, Koritnyicza. IV. Bártfa, N.-Bocskó. V. Hátszeg, Szt-Erzsébet, Nagy-Szeben, N.-Csür, Fenyőfalva, Holczmány, Nagy-Sink, Földvár, Gyeke. VI. Anina.

Globicornis Latr.

20. *marginata* Payk. — I. Budapest, Kalocsa. II.

Ács. III. Bohuszlavicz. IV. Szöllőske. V. Nagy-Szeben, Mons Kukuk.

21. *nigripes* F. — I. Kalocsa. V. N.-Szeben.

22. *picta* Küst. — VIII. Zengg. (Reitter, 297, p. 52.)

Trogoderma Latr.

23. *versicolor* Creutz. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa, Debreczen. IV. Bártfa, Páczin, Szerencs. V. Dobra. VI. Resicza.

v. *meridionale* Kr. — I. Kalocsa. (Legit F. Speiser, 349, p. 28.)

24. *megatomoides* Reitt. — I. Budapest. (Legit A. Gammel.)

25. *glabrum* Hbst. — V. N.-Szeben, Sz.-Régen.

26. *villosulum* Duft. — I. Budapest, Debreczen, Kalocsa.

Ctesias Steph.

27. *serra* F. — I. Péczel, Parád. III. Trencsén. IV. Bártfa, K.-Azar. V. N.-Szeben, Gyeke. VII. Našice.

Anthrenus Geoffr.

28. *pimpinellae* F. — I. Budapest, Debreczen, Kalocsa. II. Z.-Tapolcza. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Varannó, Tokaj. V. Pele, Hátszeg, Montes Cibinenses, Nagy-Szeben, Sz.-Ujfalu, Brassó, Sz.-Régen. VI. Mehádia. VII. Eszék, Diakovár.

v. *Goliath* Muls. — I. Kalocsa. (Leg. F. Speiser, 349, p. 28.)

29. *scrophulariae* L. — Communis.

30. *incanus* Friv. — VIII. Fiume, Buccari.

31. *verbasci* L. — Frequens.

32. *museorum* L. — Ut prior.

33. *fuscus* Latr. — I. Budapest, Péczel. II. Nagy-Harsány. III. Koritnyicza. IV. Jászó, Ungvár. V. Hátszeg, N.-Szeben, Segesvár.

Trinodes Latr.

34. *hirtus* F. — I. Budapest, Péczel. II. N.-Vázsony. III. Trencsén. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, Mád. V. Hátszeg, N.-Szeben. VII. Lipik.

Orphilus Er.

35. *niger* Rossi. — I. Budapest, Nagy-Várad. II. N.-Vázsony. IV. Tolcsva, K.-Azar. V. Vallis Czód, N.-Szeben. VII. Lipik.

Fam. CISTELIDAE.

Nosodendron Latr.

1. *fasciculare* Ol. — I. Budapest, Kalocsa, Mező-Kovácsháza. II. Zircz. IV. M.-Sziget. V. Szamos-Ujvár, Præsbe, Holczmány, Montes ad fluv. Maros.

Syncalypta Steph.

2. *setosa* Waltl. — I. Budapest. IV. Kassa, Bártfa. V. Montes Kerczenses.

3. *setigera* Ill. — III. Beszterczebánya, Beczkó. IV. Bártfa, A.-Bereczki, N.-Bocskó, Királyháza. V. Montes Radnaenses, N.-Csűr, Fogaras. VI. Herkulesfürdő.

4. *paleata* Er. — I. Budapest, Kalocsa. II. Ács. IV. Bártfa, Rahó. V. Hátszeg, Vöröstorony, ad ripam fluv. Olt, Segesvár. VI. Herkulesfürdő, Korniaréva.

5. *spinosa* Rossi. — I. Budapest, Kalocsa. III. Beczkó. IV. Komjáti, S.-A.-Ujhely, Perbenyik, K.-Azar, Varannó, Lelesz, Beregszász, Királyháza. V. Hátszeg, N.-Szeben, N.-Csűr, Fogaras, Segesvár. VI. Báziás. VII. Diakovár.

Curimus Er.

6. *petraeus* Gredl. — I. Hagymádfalva. (Legit Dr. C. Fleischer, 89, p. 89.)

7. *decorus* Steff. — IV. Mons Rabaszkala. V. Vallis Zsil, Dobra, Mons Sánta. VI. Resicza, Vallis Marilla, Ferenczfalva, Uj-Moldova, Mehádia, Korniaréva.

8. *hispidus* Er. — I. Parád. II. Zircz, Kőszeg. III. Koritnyicza. V. Bojcza. VI. Uj-Moldova.

9. *Erichsoni* Reitt. — III. Jeraba. V. Montes Radnaenses.

10. *lariensis* Villa. — III. Koritnyicza. (Legit J. Xántus.)

11. *erinaceus* Reitt. — In regione VII. (Brenske, 47, p. 17).

Porcinolus Muls.

12. *murinus* F. — I. Péczel, N.-Várad. II. Pécs. III. Zólyom, Mons Oroszlánkő. V. Peér, Felek, Kercz. VI. Resicza, Oravicza.

Seminolus Muls.

Byrrhus L.

13. *gigas* F. — II. Kőszeg. VII. Mons Bukova-Kusa.

14. *alpinus* Gory. — III. Montes Babia-Gura. (Legit H. Kiesenwetter.)

15. *signatus* Pz. — I. Comit. Bihar: Antrum ad Bánlaka. (Leg. A. Mocsáry, 256, p. 115.)

16. *ornatus* Pz. — III. Beszterczebánya, Hermánd, Mons K.-Kriván, Koritnyicza. IV. N.-Bocskó, Mons Pietrosz. V. Mont. Cibinenses et Fogarasenses, Brassó, Mons Királykő, Montes ad fluv. Maros. VI. Mons Domoglet, Korniaréva.

17. *luniger* Germ. — I. Montes Biharenses. III. Javorina. IV. Szádellő, Torna, Bártfa, Cserna-

Hóra, Mons Pietrosz. V. Montes Cibinenses, Hosszufalu.

18. *regalis* Steff. — I. Montes Biharenses. IV. Cserna-Hóra, Montes Tomnatek, Pop-Iván et Pietrosz. V. Frequens. VI. Mons Domoglet, Korniaréva.

19. *pilula* L. — Communis.
v. *auratopunctatus* Reitt. — V. Vallis Lotrióra, N.-Szeben, Szelindek, Vöröstorony.
v. *albopunctatus* F. — V. Brassó, Gyulafalva.
v. *aurofuscus* Reitt. — V. N.-Szeben. (Legit A. Ormay, 264, p. 31.)

20. *fasciatus* F. — In regionibus montanis frequ.
v. *arietinus* Steff. — II. Ács. III. Rozsnyó. V. Hátszeg, Szászváros. VI. Buziás.

21. *pustulatus* Forst. — I. Budapest, Mons Pilis. II. Kőszeg. III. Beszterczebánya, Zsolna, Rozsnyó. V. Dús, K.-Disznód, Præsbe, Brassó, Kraszna, Montes Radnaenses. VI. Mehádia, Korniaréva. VII. Fužine. VIII. Fiume.

Cistela Geoffr.

Cytilus Er.

22. *sericea* Forst. — Frequens.

Pedilophorus Steff.

23. *nitens* Pz. — Frequens.

24. *aeneus* F. — Ut prior.

25. *auratus* Duft. — I. Kalocsa. III. Trencsén, Koritnyicza, Javorina, Lacus Zöldtó dictus. V. Montes Retyezát, K.-Disznód, Præsbe, Montes Kerczenses et Fogarasenses, Brassó, Mons Bucsecs. VI. Resicza, Ferenczfalva, Mehádia. VII. Fužine, Velebit.

26. *transsylvanicus* Suffr. — III. Mons K.-Kriván, Deménfalu, Mons Chocs, Tátrafüred. IV. Cserna-Hóra, Mons Pietrosz. V. Montes Radnaenses, Mons Ünökő, Fogaras.

Simplocaria Marsh.

27. *metallica* Strm. — V. Hátszeg. VI. Resicza.

28. *maculosa* Er. — I. Budapest, Szeged. III. Tátrafüred. IV. Mons Hoverla. V. Montes Felekenses.

29. *semistriata* F. — I. Budapest. II. Vilonya. III. Zsolna, Mons K.-Kriván. IV. Tolcsva, Mernyik, N.-Bocskó. V. Mons Ünökő N.-Szeben, Montes Cibinenses, Brassó. VI. Grebenácz, Ferenczfalva, Mons Domoglet.

30. *acuminata* Er. — III. Mons K.-Kriván, Koritnyicza, Deménfalu, Tátrafüred, Királyhegy. IV. Mons Hoverla, Cserna-Hóra. V. Montes aRdnaenses, Vöröstorony. VII. Ljeskovac.

31. *carpathica* Hampe. — IV. Mons Hoverla. V. Præsbe. VI. Mons Szemenik, Mehádia.

Pelochares Muls.

32. *versicolor* Waltl. — Frequens.

Limnichus Latr.

33. *pygmaeus* Strm. — I. Budapest, M.-Káta, Kalocsa. V. Fogaras, Brassó.

34. *incanus* Kiesw. — IV. Királyháza. (Legit E. Reitter.)

35. *sericeus* Duft. — I. Budapest, Kalocsa. II. D.-Örs. III. Trencsén, ad rivum Béla, Putnok. IV. A.-Bereczki, Lelesz, Varannó, Királyháza. V. Hátszeg, N.-Szeben, Fogaras, Prázsmár, Segesvár. VI. Mehádia.

Fam. THORICTIDAE.

Thorictus Germ.

1. *laticollis* Motsch. (*hungaricus* Weise). — IV. Királyháza. (Leg. E. Reitter.)

Fam. HISTERIDAE.

Hololepta Payk.

1. *plana* Füss. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, N.-Várad. II. Sopron, N.-Vázsony, Pécs. III. Budatin, Putnok. IV. Bély. V. Montes Cibinenses, Brassó.

Platysoma Leach.

2. *frontale* Payk. — I. Budapest, Péczel, Debreczen, Kalota. III. Putnok. IV. S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Huszt. V. Hátszeg, N.-Csür, Montes Fogarasenses, Brassó, Borszék, Szász-Régen, Borgó. VI. Mehádia. VII. Eszék, Našice.

3. *compressum* Hbst. — Frequens.

4. *oblongum* F. — IV. Bártfa. V. K.-Talmács. VI. Mehádia.

5. *angustatum* Hoffm. — III. Zsolna. V. Borszék, Borgó.

Hister L.

6. *major* L. — I. M.-Kovácsháza. II. Martonvásár.

7. *inaequalis* Ol. — I. Budapest, Debreczen, Kalocsa, N.-Várad, Székelyhid. II. Z.-Tapolcza, Pécs. III. Pozsony. IV. Mons Jólesz, Körtvélyes, Tolcsva. V. Borzás, Nagy-Szeben, Szász-Régen, Brassó, Előpatak. VI. Temesvár. VIII. Fiume, Crkvenica, Carlopago.

8. *quadrimaculatus* L. — Communis.

9. *helluo* Truqui. — I. Kalocsa. V. Vallis Czód, Monte Kerczenses, Gy.-Tölgyes.

10. *unicolor* L. — Frequens.
11. *distinctus* Er. — III. Pozsony. V. N.-Szeben.
12. *merdarius* Hoffm. — Frequens.
13. *cadaverinus* Hoffm. — Communis.
14. *succicola* Thoms. (*striola* Sahlb.) — V. Montes Kerczenses, Brassó, Bereczk.
15. *terricola* Germ. — I. Kalocsa, N.-Várad. III. Pozsony. V. N.-Szeben, Deés.
16. *stercorarius* Hoffm. — Communis.
17. *fimetarius* Hbst. — Frequens.
18. *purpurascens* Hbst. — Ut prior.
v. *niger* Er. — I. Kalocsa. (Legit F. Speiser, 349, p. 28.)
19. *marginatus* Er. — I. Budapest, Kalocsa. III. Pozsony. IV. Luhi. V. Hátszeg, N.-Csür.
20. *ruficornis* Grimm. — V. Mons Bálványos (Torja). VI. Mehádia.
21. *neglectus* Germ. — I. Kalocsa. III. Pozsony, Beszterczebánya. V. Hátszeg, Nagy-Szeben, N.-Csür, Medgyes, Segesvár.
22. *ventralis* Marsh. — II. N.-Vázsony. V. Hátszeg.
23. *carbonarius* Illig. — In toto regno occurrit.
24. *quadrinotatus* Scriba. — Frequens.
25. *uncinatus* Ill. — Ut prior.
26. *lugubris* Truqui. — I. Kalocsa. VI. Grebenácz.
27. *sepulchralis* Er. — I. Budapest, Kalocsa. V. Szelindek, Krizba.
28. *funestus* Er. — I. Budapest. III. Pozsony. V. N.-Szeben, Szelindek, Krizba.
29. *bissexstriatus* F. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. V. Kercz, Sz.-Régen, Gy.-Tölgyes, Sz.-Ujvár. VI. Báziás, Mehádia. VII. Diakovár.
30. *Coquereli* Marsh. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa.
31. *duodecimstriatus* Schrnk. — I. Bpest, Kalocsa. II. Sopron. III. Pozsony, Beszterczebánya, Trencsén. V. N.-Szeben, Medgyes.
v. *quatuordecimstriatus* Gyll. — I. Budapest, Kalocsa, Debreczen. II. Sopron, Z.-Tapolcza. IV. S.-A.-Ujhely. V. Sz.-Ujvár, Segesvár. VI. Temesvár.
32. *bimaculatus* L. — I. Budapest, Kalocsa, Debreczen. II. Sopron. III. Trencsén, Rosnyó. IV. Kassa. V. Hátszeg, N.-Selyk, Prázsmár, Segesvár, Sz.-Régen, Deés, M.-Záh. VI. Temesvár. VII. Diakovár.
33. *praetermissus* Peyr. — I. Kalocsa. V. Segesvár.
34. *corvinus* Germ. — Communis.

Epierus Er.

35. *italicus* Payk. (*mundus* Hampe). — II. Zircz, P.-Vádé. V. Vöröstorony. VI. Uj-Moldova, Mehádia.
36. *comptus* Ill. — I. Hagymádfalva, Kalota. II. P.-Vadé, Pécs, N.-Harsány. VI. Uj-Moldova. VII. Vrdnik.
v. *russicus* Mars. — II. Pécs. (Legit L. Biró.)

Dendrophilus Leach.

37. *punctatus* Hbst. — Frequens.
38. *pygmaeus* L. — II. Sopron. V. Nagy-Szeben, Sz.-Régen.

Carcinops Mars.

39. *14-striata* Steph. — I. Péczel, Hagymádfalva. VI. Mehádia.

Paromalus Er.

40. *complanatus* Pz. — I. Budapest, Kalocsa. II. Zircz. IV. Bély. V. Hátszeg. VI. Mehádia. VII. Eszék.
41. *parallelopipedus* Herbst. — I. Montes Biharenses. III. Hermánd. IV. S.-A.-Ujhely, N.-Bocskó. V. N.-Csür, N.-Talmács, Sz.-Régen, Borgó.
42. *flavicornis* Hbst. — Frequens.

Satrapes Schmidt.

43. *Sartorii* Redtb. — I. Budapest (Gellérthegy, Farkasvölgy, Széchenyi-hegy, Zugliget, Kapáshegy).

Hetaerius Er.

44. *ferrugineus* Ol. — I. Budapest, Péczel. III. Kékkő V. Hátszeg.

Saprinus Er.

45. *semipunctatus* F. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa, Debreczen, B.-Csaba. II. Sopron, Z.-Tapolcza, Pécs. V. N.-Szeben, Sz.-Régen. VI. Csenej.
46. *furvus* Er. — I. Kalocsa. IV. Szerencs.
47. *concinnus* Motsch. — I. Szeged. V. N.-Szeben.
48. *nitidulus* Payk. — I. Budapest, Kalocsa, Debreczen, B.-Csaba. II. Sopron, Z.-Tapolcza, Pécs. III. Trencsén. IV. Komjáti, S.-A.-Ujhely, Olyka. V. Creber. VI. Janova. VII. Diakovár. VIII. Fiume.
49. *pulcherrimus* Web. — I. Budapest, Szt-Lőrincz, Debreczen, N.-Várad. IV. Komjáti. V. Hátszeg.
50. *immundus* Gyll. — I. Kalocsa, N.-Várad. III. Pozsony. IV. Komjáti. V. N.-Szeben, Fogaras. VI. Janova.
51. *aeneus* F. — Frequens.
52. *virescens* Payk. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. Ács. IV. Homonna.
53. *sparsutus* Solsky (*brunnensis* Fleisch.) — V. Segesvár. (Leg. Dr. C. Petri, 269, p. 10.)

54. *metallescens* Er. — I. Keczel. (Leg. F. Speiser, 349, p. 29.)
55. *amoenus* Er. — Ut prior.
56. *herbeus* Mars. — I. Budapest. (Leg. J. Frivaldszky.)
57. *rufipes* Payk. — I. Budapest, Kalocsa. V. Nagy-Szeben. VI. Csenej.
v. *antiquulus* Ill. — Hungariam inhabitat. (Schmidt, 338, p. 313).
v. *arenarius* Marsh. — I. Budapest, Kalocsa.
58. *conjungens* Payk. — Frequens.
59. *specularis* Mars. — VI. Báziás, Jeselnicza.
60. *quadristriatus* Hoffm. — I. Budapest, Kalocsa. III. Trencsén. IV. Bártfa. V. Szakadát.
61. *grossipes* Mars. — I. Budapest, Kalocsa. VI. Grebenácz.
62. *rugifrons* Payk. — I. Budapest, Peszér. V. N.-Talmács.
63. *metallicus* Hbst. — I. Budapest, Dabas, Kalocsa. II. Pécs.

Gnathoncus Duv.

64. *rotundatus* Kug. — I. Budapest, Kalocsa, Szeged. II. Sopron. IV. Bártfa. V. Hátszeg, Nagy-Szeben, Segesvár, Sz.-Régen, Gyeke.
65. *punctulatus* Thoms. — I. Kalocsa. (Leg. F. Speiser, 349, p. 29.)

Teretrius Er.

66. *picipes* F. — III. Nyitra, Beczkó. IV. Szőllőske, Ungvár. V. Dobra, N.-Csür.

Plegaderus Er.

67. *saucius* Er. — III. Hrabicsó, Várna.
68. *vulneratus* Pz. — IV. S.-A.-Ujhely, Ungvár, Csap, Mons Hoverla. V. Törcsvár, Borszék, Borgó. VII. Ljeskovac.
69. *caesus* Ill. — Frequens.
70. *dissectus* Er. — II. Montes Bakonyenses. IV. S.-A.-Ujhely, Mons Szinnaikő. V. Hátszeg, Fogaras. VI. Mehádia. VII. Ljeskovac.
71. *discissus* Er. — IV. Várna. (Leg. Dr. C. Brancsik, 40, p. 25.)
72. *pusillus* Rossi. — I. Hagymádfalva. (Leg Dr. A. Fleischer, 89, p. 90.)

Onthophilus Leach.

73. *globulosus* Ol. — I. Budapest. III. K.-Kálna.
74. *striatus* Forst. — I. Budapest, Péczel, Szombatság. II. Sopron. V. N.-Szeben, Sz.-Régen. VII. Gospić.
75. *affinis* Redtb. — I. Budapest, Kalocsa, Szombatság. II. Soóly.

Bacanius Lec.

76. *Soliman* Mars. — VII. Županje. (Leg. E. Reitter, 309, p. 273.)

Abraeus Leach.

77. *globulus* Creutz. — I. Budapest, Kalocsa, Szeged. III. Trencsén. IV. Kassa. V. Montes Kerczenses, N.-Selyk, Sz.-Régen. VI. Temesvár.
78. *granulum* Er. — I. Budapest. III. K.-Kálna. V. Montes Kerczenses. VI. Mehádia.
79. *globosus* Hoffm. — I. Budapest, Kalocsa, Kóly. II. Boglár, Kőszeg. III. K.-Kálna. IV. Szerencs, Mons Szinnaikő, Olyka. V. Vallis Lotrióra, Nagy-Szeben, Szelindek, Montes Kerczenses. VI. Mehádia, Korniaréva.

Acritus Lec.

80. *minutus* Hbst. — Frequens.
81. *rhenanus* Fuss. — V. Kercz. VI. Mehádia.
82. *Hopffgarteni* Reitt. — I. Budapest, Péczel, Szombatság.
83. *nigricornis* Hoffm. — I. Budapest, Kalocsa, Debreczen, Szombatság. III. Trencsén. IV. M.-Sziget. V. Pele, Hátszeg, N.-Szeben, Montes Kerczenses. VI. Báziás, Mehádia. VII. Ljeskovac.
84. *seminulum* Küst. — V. Teste Seidlitz. (345, p. 222.)
v. *microscopicus* Reitt. — V. Kercz. (Auctor, 293, p. 16.)

Aeletes Horn.

85. *atomarius* Aub. — I. Szombatság. VI. Mehádia. VII. Županje, V.-Gorica.

Fam. PLATYCERIDAE.

Platycerus Geoffr.

Lucanus Scop.

1. *cervus* L. — In quercetis frequens.
v. *capreolus* Fuessl. — Simul cum stirpe.

Dorcus Mac Leay.

2. *parallelepipedus* L. — Communis.

Systenocerus Weise.

3. *caraboides* L. — Frequens.

Ceruchus Mac Leay.

4. *chrysomelinus* Hochw. — I. Remecz. III. Hermánd, Vallis Vrátna. IV. Runyina, Mons Hoverla. V. Montes Kerczenses, Brassó, Hosszufalu, Bodza, Montes Görgényenses, Montes ad fluv. Maros. VI. Ferenczvalva, Mons Domoglet, Korniaréva. VII. Velebit. VIII. Carlopago.

Aesalus F.

5. *scarabaeoides* Pz. — I. Péczel, Isaszeg. III. Trencsén. IV. Mons Vihorlat. V. Nagy-Szeben, K.-Disznód, Vöröstorony, Brassó, Segesvár, Montes ad fluv. Maros. Sz.-Régen. VI. Mehádia. VII. Montes Fruska-Góra.

Sinodendron Hellwig.

6. *cylindricum* L. — I. Rézbánya, Parád. II. Pécs. III. Trencsén, Koritnyicza. IV. Olyka, Montes Szinnaikő et Rabaszkala. V. Creber. VI. Ferenczfalva, Szászka, Mehádia, Korniaréva.

Fam. SCARABAEIDAE.

Scarabaeus L.

1. *sacer* L. — I. Insula Csepel, Kecskemét, Kalocsa. VI. Grebenácz. VII. Fiume.
2. *pius* Ill. — I. Budapest, Csepel, Péczel, Isaszeg, Kalocsa, Debreczen, Csongrád. II. Pécs. IV. S.-A.-Ujhely, Szomotor. V. Láposbánya. VI. Grebenácz, Ulma. VIII. Fiume.
3. *variolosus* F. — VIII. Fiume, Meja, Crkvenica.

Sisyphus Latr.

4. *Schaefferi* L. — I. Budapest, Mons Pilis, Péczel, Kalocsa. II. Sopron, Keszthely, Pécs. III. Szirák, Pozsony, Beszterczebánya, Hermánd, Lietava, Lucska. V. Déva, N.-Szeben, N.-Csür, Medgyes, M.-Záh. VI. Temesvár, Csenej. VII. Lipik. VIII. Fiume, Meja, Crkvenica.

Gymnopleurus Ill.

5. *pilularius* L. — Frequens.
6. *Sturmi* Mac Leay. — V. Brassó. VIII. Fiume.
7. *cantharus* Er. — I. Budapest, Debreczen. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj, Barkó. VI. Csenej. VIII. Meja, Buccari.

Copris Geoffr.

8. *lunaris* L. — Communis.

Chironitis Lansb.

9. *hungaricus* Hbst. — I. Budapest, Péczel, Gödöllő, Kalocsa, Szeged, Debreczen. II. Pécs.

Onthophagus Latr.

10. *Amyntas* Ol. — I. Budapest, Kalocsa, Debreczen. II. Pécs. III. Léva. IV. S.-A.-Ujhely. V. Hátszeg, Déva, N.-Szeben, N.-Csür, Hosszufalu, Szász-Régen, Deés. VI. Grebenácz. VII. Diakovár.
11. *taurus* Schreb. — Communis.
v. *capra* Creutz. — V. Kőhalom. (Bielz, 27. p. 69.)
12. *verticicornis* Laich. — I. Budapest, Péczel. II. Pécs. III. Trencsén. V. Frequens. VI. Temesvár. VII. Diakovár.
13. *austriacus* Pz. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Debreczen. III. Rosnyó. IV. Kassa. V. Nagy-Szeben, Fogaras, Medgyes, Sz.-Régen, Deés. VII. Lipik.
14. *vacca* L. — Communis.
v. *medius* Pz. — I. Budapest, Szeged, M.-Kovácsháza, Csongrád. V. N.-Szeben, Medgyes, Brassó, Sz.-Régen, Deés.
15. *coenobita* Herbst. — In toto regno occurrit.
16. *fracticornis* Preyssl. — Ut prior.
17. *nuchicornis* L. — Communis.
18. *lemur* F. — Frequens.
19. *camelus* F. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. Felsőlő. III. Léva, Rosnyó. IV. Nagy-Mihály, Megyaszó. V. N.-Szeben, Sz.-Régen, M.-Záh. VI. Csenej.
20. *semicornis* Pz. — I. Budapest, Péczel. II. Z.-Tapolcza. III. Pozsony, Zólyom, Trencsén. V. Hátszeg, N.-Enyed, Déva, Vöröstorony, Szász-Régen. VI. Temesvár.
21. *furcatus* F. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. Ács, Pécs. IV. Szomotor. V. Hátszeg, Szt-Erzsébet, N.-Csür, Holczmány, Marpód, N.-Selyk, Sz.-Régen. VI. Grebenácz, Báziás, Mehádia.
22. *ovatus* L. — Communis.
23. *lucidus* Ill. — I. Szeged. VI. Csenej.
24. *Schreberi* L. — Creber.
25. *histeroides* Ménétr. — I. Szt-Miklós, Peszér, Kalocsa.

Oniticellus Serv.

26. *fulvus* Goeze. — Communis.
27. *pallipes* F. — I. Kalocsa, Szeged, Horgos, Makó.

Aphodius Ill.

28. *erraticus* L. — In toto regno occurrit.
29. *scrutator* Hbst. — I. Budapest, Péczel. II. N.-Vázsony, Sopron. IV. Torna. V. Frequens.
30. *subterraneus* L. — Creber.
31. *fossor* L. — Ut prior.
32. *haemorrhoidalis* L. — Frequens.
33. *sulcatus* F. — I. Budapest. II. Lacus Fertő, Z.-Tapolcza. IV. Szomotor. V. Hátszeg, Vöröstorony.
34. *conjugatus* Pz. — I. Budapest. II. N.-Vázsony. V. Déva, Szt.-Erzsébet, N.-Csür, Dolmány, Montes Kerczenses, N.-Sink, Brassó. VI. Lippa.
35. *foetens* F. — Communis.
36. *fimetarius* L. — Ut prior.
37. *scybalarius* F. — III. Trencsén. IV. Kassa, Bártfa, O.-Ruszka, N.-Bocskó. V. Borszék.

38. *granarius* L. — Frequens.
39. *constans* Duft. — V. Déva, Hátszeg, Bárczaság.
40. *ater* Deg. — I. Alpes Bohodej. II. Pécs. III. Lőcse, Tátrafüred. V. Frequens.
41. *piceus* Gyll. — III. Tátra. (Kiesenwetter, 196, p. 317.)
42. *putridus* Herbst. — II. Montes Bakonyenses. IV. Bártfa. V. N.-Szeben.
43. *sordidus* F. — I. Budapest, Debreczen. II. Z.-Tapolcza, Sopron. V. Zilah, Barót. VI. Temesvár.
44. *rufus* Moll. — I. Budapest. III. Trencsén, Tátrafüred. IV. Komjáti, Bártfa. V. N.-Szeben, Montes Kerczenses, Medgyes, Mons Hargita, Montes Kelemenenses, Sz.-Régen.
45. *lugens* Creutz. — I. Budapest, Debreczen. III. Pozsony. IV. Komjáti, Torna, Udvarnok, Körtvélyes. VI. Temesvár.
46. *hydrochaeris* F. — I. Kalocsa. II. Lacus Fertő.
47. *punctipennis* Er. — I. Debreczen, Csongrád. VI. Palics.
48. *nitidulus* F. — I. Csongrád, Debreczen. IV. Komjáti, Torna, Udvarnok, Körtvélyes. V. Nagy-Enyed, N.-Szeben, Brassó, Sz.-Régen. VI. Csenej.
49. *immundus* Creutz. — I. Budapest, Kalocsa, Csongrád, Debreczen. II. Ács, Z.-Tapolcza, Soóly, M.-Peterd. IV. Komjáti, Szilas. V. Hátszeg, N.-Szeben, Földvár. VI. Csenej, Resicza, Grebenácz.
50. *merdarius* F. — Communis.
51. *inquinatus* F. — Ut prior.
52. *melanostictus* Schmidt. — Frequens.
53. *sticticus* Pz. — I. Budapest, Kalocsa, Csongrád. II. Sopron. V. Sz.-Ujfalu, Szt-Erzsébet. Medgyes. VI. Báziás, Grebenácz, Resicza, Mehádia.
54. *pictus* Strm. — I. Budapest. III. Trencsén. V. Vöröstorony, Brassó. VI. Báziás.
55. *tessulatus* Payk. — II. N.-Vázsony. V. N.-Szeben, Sz.-Ujfalu.
56. *limbatus* Germ. — I. Budapest, Mező-Berény, M.-Kovácsháza, Csongrád. II. Lacus Fertő. IV. S.-A.-Ujhely.
57. *prodromus* Brahm. — Communis.
58. *punctatosulcatus* Strm. — Ut prior.
59. *pubescens* Strm. — I. Budapest. (Leg. D. Kuthy.)
60. *consputus* Creutz. — I. Budapest, Kalocsa. III. Beszterczebánya. IV. Sáros-Patak, Tolcsva. V. Medgyes.
61. *serotinus* Pz. — I. Budapest, N.-Várad. V. Hátszeg, Dolmány, Sz.-Régen.
62. *contaminatus* Hbst. — II. Sopron. VI. Temesvár.
63. *obliteratus* Pz. — I. Budapest, Kalocsa. II. N.-Vázsony. V. N.-Szeben, Sz.-Ujfalu, Medgyes. VI. Resicza, Ulma.
64. *obscurus* F. — V. Sz.-Ujvár, Montes Brassóenses, Mons Bucsecs.
65. *thermicola* Er. — IV. Torna, Komjáti. V. Sz.-Ujfalu. VI. Ulma.
66. *porcus* F. — I. Budapest. IV. Czigánd, Szomotor. V. Dolmány, Medgyes.
67. *scrofa* F. — I. Budapest, Péczel. II. D.-Örs. III. Trencsén. V. Medgyes. VI. Báziás.
68. *tristis* Pz. — I. Budapest, Kalocsa. IV. S.-A.-Ujhely, K.-Azar. V. Montes Cibinenses, Gy.-Tölgyes. VI. Grebenácz, Resicza.
69. *pusillus* Hbst. — III. Szliács. V. N.-Szeben, F.-Sebes, Medgyes, Gy.-Tölgyes, Gyeke, M.-Záh. VI. Mehádia.
70. *quadriguttatus* Hbst. — I. Budapest, Kalocsa. III. Beczkó. IV. Komjáti. V. F.-Sebes. VI. Temesvár.
71. *quadrimaculatus* L. — I. Budapest, M.-Berény. II. D.-Örs, Sopron, Keszthely. IV. Komjáti. V. Vöröstorony, F.-Sebes, N.-Selyk. VI. Mehádia.
72. *biguttatus* Germ. — I. Budapest, Palota. IV. Tokaj. V. N.-Szeben, Sz.-Régen. VI. Temesvár, Grebenácz.
v. *sanguinolentus* Pz. — II. Belovár. IV. Torna.
73. *lividus* Ol. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Nyiregyháza, Debreczen. II. Ács, Paks. IV. Tokaj, Szerencs. V. Hátszeg, Szt-Erzsébet, Fenyőfalva, Hosszufalu. VI. Buziás, Grebenácz.
74. *varians* Duft. — Frequens.
75. *niger* Pz. — I. Debreczen, Csongrád. IV. Sátor-Alja-Ujhely, S.-Patak, Szomotor, Mons Rabaszkala. V. Hátszeg, Sz.-Ujfalu, Montes Kerczenses, Fogaras, Brassó, Hosszufalu, Medgyes. VI. Grebenácz.
76. *plagiatus* L. — I. Budapest. II. Ács. V. Montes Cibinenses.
77. *Sturmi* Har. — V. Montes Cibinenses, Szász-Régen. VI. Oravicza.
78. *maculatus* Strm. — V. Montes Cibinenses, Kerczenses et Kelemenenses. VI. Jeselnicza, Mehádia.
79. *alpinus* Scop. — III. Mons K.-Kriván, Koritnyicza, Mons Chocs, Javorina, Lacus Zöldtó dictus. IV. Kőrösmező, Mons Pop-Iván. V. Montes Cibinenses, Mons Szurul, Montes Kerczenses, Árpásenses et Fogarasenses, Mons Bucsecs. VI. Mehádia, Mons Szárko. VII. Risnjak.
v. *rubens* Muls. — I. Montes Biharenses. V. Malomviz, Segesvár. VI. Mehádia.
80. *mixtus* Villa. — In regionibus subalpinis frequ.
81. *satellitius* Hbst. — I. Budapest, Kalocsa, Csongrád. II. Ács. III. Nyitra. IV. S.-A.-Ujhely. V. Kőhalom, Földvár, Besztercze. VI. Temesvár.

82. *bimaculatus* Laxm. — II. Z.-Tapolcza. (Leg. A. Rédl.)
83. *rufipes* L. — In regionibus montanis creber.
84. *depressus* Kug. — Ut prior.
v. *atramentarius* Er. — Simul cum stirpe.
85. *luridus* F. — Frequens.
v. *nigripes* F. — V. Brassó: Mons Czenk. (Leg. L. Méhely, 247, p. 188.)
86. *brevis* Er. — I. Budapest, Péczel. IV. Komjáti, Máramaros-Sziget. V. N.-Szeben, Szt-Erzsébet, N.-Talmács, Segesvár, Gyeke. VI. Resicza.
87. *gibbus* Germ. (*transsylvanicus* Küst.) — I. Budapest. III. Mons K.-Kriván. V. Frequens.
88. *corvinus* Er. — I. Parád. (Leg. J. Pável.)
89. *rhododactylus* Mrsh. — I. Budapest. II. Ács. III. Tátrafüred. IV. Gálszécs, S.-Patak. V. Segesvár.

Heptaulacus Muls.

90. *sus* Hbst. — I. Budapest, Péczel, M.-Káta, Kalocsa. III. Trencsén. IV. Udvarnok, Komjáti. V. Vallis Czód.
91. *porcellus* Friv. — I. Com. Pest. (Auctor, 111, p. 5.)
92. *testudinarius* F. — I. Budapest, Kalocsa. II. Sopron. III. Beczkó. IV. Komjáti.
93. *villosus* Gyll. — III. Vallis Vrátna. (Leg. Dr. C. Brancsik, 40, p. 29.)

Oxyomus Lap.

94. *sylvestris* Scop. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa, Csongrád. II. Z.-Tapolcza, Soóly, Baán. IV. Sátoralja-Ujhely, Tokaj, Czéke, Terebes, Varannó, Ladomér, M.-Sziget. V. Tasnád, Hátszeg, N.-Szeben, Szt-Erzsébet, Fogaras, Héviz, Prázsmár, Segesvár. VI. Oravicza, Mehádia. VIII. Fiume.

Pleurophorus Muls.

95. *caesus* Pz. — Frequens.
96. *sabulosus* Muls. — V. N.-Sink, Sz.-Régen.

Rhyssemus Muls.

97. *germanus* L. — Frequens.

Diastictus Muls.

98. *vulneratus* Strm. — I. Budapest. II. D.-Örs. V. N.-Szeben, Hosszufalu, Sz.-Régen. VI. Grebenácz, Báziás.

Psammodes Lap.

99. *sulcicollis* Ill. — Communis.

Glaresis Er.

100. *Frivaldszkyi* Westw. — I. Budapest, Dabas.

Aegialia Latr.

101. *sabuleti* Payk. — IV. Mons Hoverla (sec. J. Frivaldszky).

Chaetonyx Schaum.

102. *robustus* Schaum. VI. N.-Bogsán, Báziás, Uj-Moldova.

Codocera Fisch.

103. *ferruginea* Esch. — I. M.-Káta, Hajós, Prædium ad urbem Kisszállás. II. Csénye. VI. Csenej.

Ochodaeus Serv.

104. *chrysomeloides* Schrank. — I. Budapest, Palota, Dabas, Debreczen, Kalocsa. II. Ács, Z.-Tapolcza, Pécs. V. Segesvár. VI. Csenej.

Hybosorus Mac Leay.

105. *Illigeri* Reiche. — VI. Grebenácz. (Leg. E. Merkl.

Trox F.

106. *Eversmanni* Kryn. — I. Budapest, Kalocsa.
107. *perlatus* Goeze. — Secundum Küster etiam Hungariam incolit. (236, XVII, 55.)
108. *hispidus* Pont. — I. Budapest, Péczel. II. Belovár. III. Trencsén. IV. Komjáti, S.-A.-Ujhely, Szőllőske. V. N.-Falu, Hátszeg, Nagy-Szeben, Szelindek, Medgyes, Segesvár, M.-Záh. VI. Ulma, Resicza, Oravicza. VIII. Fiume.
109. *cadaverinus* Ill. — IV. N.-Mihály. (Leg. Dr. C. Chyzer.)
110. *sabulosus* L. — I. Budapest, Kalocsa, Debreczen. II. Kőszeg, Pécs. IV. N.-Mihály. V. Tasnád, Hátszeg, N.-Csür, Fogaras, Brassó. VI. Fehértemplom, Zlaticza.
111. *scaber* L. — I. Budapest, Kalocsa, Debreczen. II. Pécs. III. Trencsén. V. Hátszeg, N.-Szeben, Szt-Erzsébet, Brassó, Segesvár, Gyeke, M.-Záh. VI. Ulma, Resicza.

Bolboceras Kirby.

112. *unicorne* Schranck. — I. Budapest, Péczel, Dabas. II. Pécs. III. Pozsony. V. Szamos-Ujvár, N.-Szeben, N.-Ág, Medgyes.

Odontaeus Klug.

113. *armiger* Scop. — I. Budapest, Péczel, Dabas, Kalocsa, Debreczen. II. Z.-Tapolcza, Pécs. III. Zólyom, Hermánd. V. N.-Szeben, Brassó, Medgyes. VI. Resicza, Rumunyest. VII. Fužine.

Geotrupes Latr.

114. *stercorarius* L. — Communis.

115. *spiniger* Marsh. — I. Budapest, Kalocsa. V. Brassó, N.-Ajta. VI. Resicza.

116. *mutator* Marsh. — I. Budapest, Peszér, Kalocsa, Debreczen, Szeged. III. Beszterczebánya, Rosnyó. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj, Homonna. V. Szt-Erzsébet, Héviz, Brassó, Prázsmár. VI. Temesvár, Resicza.

117. *sylvaticus* Pz. — In regionibus montanis communis.

118. *vernalis* L. — Ut prior.

v. *autumnalis* Er. — I. Budapest. II. N.-Vázsony, Pécs. III. N.-Lipcse. V. Brassó, Tömös, Bodza, Mons Hargita, Montes Csikenses, Mons N.-Hagymás. VIII. Fiume.

v. *alpinus* Hagenb. — V. Montes Kerczenses, Bucsecs et Kereszténythavas, Tömös, Mons Nagykőhavas.

v. *splendens* Er. — VIII. Fiume, Carlopago.

119. *laevigatus* F. v. *Brullei* Jek. — VIII. Carlopago. (Leg. F. Ocskay.)

Lethrus Scop.

120. *cephalotes* Pall. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Debreczen, Szeged, Bánhegyes. II. Veszprém, Keszthely, Pécs. III. Nyitra, Beczkó. IV. S.-A.-Ujhely, S.-Patak, Tokaj. VI. Temesvár, Grebenácz. VII. Eszék.

Pentodon Hoppe.

121. *idiota* Hbst. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Debreczen, N.-Várad. II. Ács, Lacus Fertő, Szegzárd, Pécs. V. Beszterce, M.-Lápos. VI. Fehértemplom, Ulma, Grebenácz.

122. *punctatus* Villers. — VIII. Fiume, Vallis Draga, Buccari, Zengg.

Oryctes Ill.

123. *nasicornis* L. — Frequens.

124. *grypus* Ill. — V. Creber. VI. T.-Kubin. VIII. Fiume, Buccari, Crkvenica.

Rhizotrogus Latr.

125. *aequinoctialis* Hbst. — I. Budapest, Pomáz, Péczel, Kalocsa, Debreczen. II. Győr, Z.-Tapolcza, Pécs. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, S.-Patak, Tolcsva, Homonna, Szinna. V. Frequens. VI. Temesvár.

126. *vernus* Germ. — I. Budapest, Csongrád. II. Keszthely. IV. Szőllőske. V. Törcsvár, Brassó, Segesvár. VI. Ó.-Moravicza. VIII. Fiume, Buccari.

127. *aestivus* Ol. — I. Budapest, Kalocsa. II. Pécs, Z.-Tapolcza. III. Pozsony, Trencsén. IV. Sátor-Alja-Ujhely, S.-Patak, N.-Mihály, Varannó. V. Szt-Erzsébet, Berethalom.

128. *lautiusculus* Schauf. — VIII. Fiume. (Leg. L. Biró.)

129. *solstitialis* L. — Communis.

v. *ochraceus* Knoch. — II. Pécs. VI. Ulma, Báziás, Oravicza.

v. *Falleni* Gyll. — VI. Ulma. (Leg. J. Frivaldszky.)

130. *ruficornis* F. — V. Teste Seidlitz. (345, p. 158.)

131. *pilicollis* Gyll. — I. Budapest. VI. Grebenácz.

132. *assimilis* Hbst. — Frequens.

Haplidia Hope.

133. *transversa* F. — VI. Fehértemplom. VIII. Vallis Draga, Buccari, Crkvenica, Carlopago, Zengg.

Anoxia Lap.

134. *orientalis* Kryn. — I. Budapest, Péczel, Dabas, Kecskemét, Kalocsa. V. N.-Szeben, Brassó. VI. Ulma, Grebenácz, Ferenczfalva.

hungarica Desbr. — Hungaria. (Auctor, 67, p. 84.)

135. *pilosa* F. — I. Budapest, Péczel, Kecskemét, Kalocsa, Debreczen. II. D.-Örs, Pécs, Keszthely. III. V.-Mikola. V. Kolozsvár, Medgyes. VI. Grebenácz.

Polyphylla Harr.

136. *fullo* L. — I. Budapest, Péczel, Isaszeg, Kalocsa, Debreczen, Ny.-Bogát, H.-Pályi. II. Ács. IV. S.-A.-Ujhely, S.-Patak, Tolcsva, B.-Szerdahely, Tokaj, Gálszécs. V. Frequens. VI. Duplaj, Ulma, Grebenácz. VIII. Novi.

Melolontha F.

137. *hippocastani* F. — Frequens.

v. *nigripes* Com. — I. Budapest, Palota, Kecskemét. II. D.-Örs. III. Hermánd, Trencsén.

138. *vulgaris* F. — In regionibus montanis communis, in planitie vage occurrit.

v. *albida* Redtb. — I. Kecskemét, Kalocsa, Makó. II. Baán. IV. Tolcsva. V. N.-Szeben, Kolozsvár. VI. Baja, Ulma, Báziás. VIII. Fiume.

v. *lugubris* Muls. — VII. Perusič (Heyden, 170, p. 416.)

v. *ruficollis* Muls. — I. Budapest, Makó. VI. Ulma.

139. *pectoralis* Germ. — III. Zólyom, Trencsén. V. Sz.-Régen.

Serica Mac Leay.

140. *holosericea* Scop. — Frequens.

141. *brunnea* L. — I. Gödöllő, Debreczen. III. Hermánd, Beczkó, Koritnyicza, Oravicz, Tátrafüred. IV. Bártfa. V. Vallis Zsil, N.-Szeben, K.-Disznód, Vöröstorony, Brassó, Hosszufalu, Medgyes.

Homaloplia Steph.

142. *marginata* Füssl. (*pruinosa* Küst.) — VI. Szászka, Herkulesfürdő.

143. *ruricola* F. — Frequens.

144. *alternata* Küst. — VI. Herkulesfürdő. VIII. Fiume.

145. *spiraeae* Pall. — I. Budapest, Péczel, Dabas, Kecskemét. II. Boglár. IV. Szőllőske, Szomotor. VI. Grebenácz. VII. Ostrvica.

v. *limbata* Kryn. — I. Kalocsa. VI. Grebenácz.

146. *erythroptera* Friv. (*transsylvanica* Bielz). — V. Déva, Vallis Zsil, Rüsz, N.-Csür, Földvár, Szombat, Brassó, Segesvár. VI. Versecz, Ulma, Fehértemplom, Grebenácz, Deliblat, Báziás, Herkulesfürdő.

Triodonta Muls.

147. *aquila* Lap. — VI. Ulma, Grebenácz.

148. *latestriata* Reitt. — Hungaria. (Auctor, 815, p. 283.)

Hymenoplia Esch.

hungarica Blanch. — Secundum Auctorem solum Hungariæ incola. (Cat. 74.)*

Anomala Sam.

149. *aurata* F. — I. Montes Biharenses. V. Vöröstorony, K.-Disznód, Præsbe, Montes Kerczenses et Fogarasenses, Medgyes. VI. Herkulesfürdő.

150. *praticola* F. — VI. Grebenácz. (Leg E. Frivaldszky.)

151. *vitis* F. — I. Budapest, Vácz, Péczel, Monor, D.-Vecse, Apostag, Kecskemét, Csépa, H.-Vásárhely. II. R.-Egres, Z.-Tapolcza. Gércse. VI. Duplaj, Grebenácz, Fehértemplom.

v. *cupreonitens* Bau. — I. Monor, A.-Irsa.

152. *solida* Er. — VI. Ulma, Grebenácz, Orsova, Herkulesfürdő.

153. *aenea* Deg. — I. Budapest, Vácz, Peszér, Apostag, Kecskemét, Debreczen, N.-Várad, Csépa. IV. Kassa, Sátor-Alja-Ujhely, Tokaj, Szomotor, N.-Mihály, Homonna. V. Frequens.

v. *coeruleocephala* Ol. — Simul cum stirpe.

154. *oblonga* Er. — V. N.-Szeben, Vöröstorony, Medgyes.

v. *cyanicollis* Villa. — I. Budapest. VI. Grebenácz.

Phyllopertha Kirby.

155. *hirtella* Brull. — VI. Mons Domoglet. (Leg. E. Frivaldszky.)

156. *horticola* L. — Frequens.

* Teste Heyden species hæc = *strigosa* Ill., estque Galliæ et Hispaniæ incola; Hungariam non habitare videtur. (166, p. 378.)

Anisoplia Serv.

157. *segetum* Hbst. (*fructicola* F.) — I. Budapest, Péczel, Dabas, Kalocsa, Hajós, Kecskemét, Debreczen. II. Sopron. III. Nyitra, Pozsony. IV. S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Szomotor. V. Szombat, Fogaras, Brassó. VI. Ulma, Grebenácz, Herkulesfürdő.

158. *villosa* Goeze (*agricola* F.) — I. Budapest, Mons Pilis. IV. Kassa, Tolcsva. V. N.-Csür, Medgyes. VII. Fužine, Velebit.

159. *Erichsoni* Reitt. — In reg. VII. (Auctor, 316, p. 104.)

160. *bromicola* Germ. — III. V.-Mikola, Pozsony, Rosnyó. V. Montes Kerczenses, Gyeke, M.-Záh. VI. N.-Bogsán.

161. *austriaca* Hbst. — I. Budapest, Péczel, Dabas, Kalocsa, N.-Várad, N.-Szalonta, Bánhegyes. II. Zircz, Szt-György. III. Letkés. Z.-Ugrócz. V. Montes Kerczenses, Szombat, Sz.-Régen, Gyeke. VI. Temesvár, Ulma.

162. *tempestiva* Er. — I. Frequens. IV. Sátor-Alja-Ujhely, Tolcsva, Mád, K.-Azar, Szerencs. VI. Jaszenova.

163. *cyathigera* Scop. (*crucifera* Hbst.) — I. Budapest, Péczel, Dabas, Kalocsa, Dorog, Nagy-Várad. II. Ács, Pécs. III. Trencsén, Koritnyicza. IV. Szepsi, Szomotor, Szerencs, Homonna. V. Vizakna, Szelindek, Montes Kerczenses, Szombat, Sz.-Régen. VI. Ulma, Grebenácz.

164. *lata* Er. — I. Budapest, Péczel, Dabas, Kalocsa, Debreczen, N.-Várad. II. Pécs. IV. S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Mád. V. N.-Szeben, Hosszufalu, Gyeke, VI. Ulma, Grebenácz.

165. *flavipennis* Brull. (*adjecta* Er.) — I. Budapest. II. Z.-Tapolcza. IV. S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Mád, Czigánd. V. Gyeke.

166. *dispar* Er. — I. Budapest, Debreczen. V. Vizakna. VI. Herkulesfürdő.

167. *deserticola* Fisch. — VI. Grebenácz, Deliblat.

Hoplia Ill.

168. *praticola* Duft. — I. Budapest, Mons Pilis. II. Pécs. III. Beszterczebánya, Z.-Ugrócz. V. Fogaras, Medgyes, Berethalom, Segesvár, Sz.-Régen. VI. Mehádia.

169. *philanthus* Füssl. — I. Budapest, Isaszeg, Gödöllő, Kalocsa, N.-Várad. III. Beszterczebánya. V. Montes Cibinenses.

170. *farinosa* L. — V. K.-Disznód, Krizba, Nagy-Talmács, Medgyes, Segesvár, Sz.-Régen. VI. N.-Bogsán, Szászka, Oravicza, Herkulesfürdő. VII. Fužine. VIII. Fiume.

v. *fissa* Reitt. — VII. Velebit. VIII. Carlopago.

171. *graminicola* F. — I. Budapest, Kalocsa, Debreczen. II. Siófok. V. Szamos-Ujvár, N.-Enyed, N.-Szeben, Vöröstorony, Medgyes, Deés.

172. *hungarica* Burm. — I. Budapest, Göd, Péczel, Szt-Lőrincz, Kalocsa. II. Pécs. III. Zsolna. IV. Bártfa. V. Szamos-Ujvár, N.-Enyed, N.-Szeben, Brassó, Mons Bucsecs, Segesvár. VI. Herkulesfürdő.

173. *dilutipes* Reitt. — II. Pécs. V. Csik-Szent-Domokos. VI. Teste Reitter.

Epicometis Burm.

174. *squalida* Scop. — VIII. Fiume, Zengg.

175. *hirta* Poda. — Communis.

Leucocelis Burm.

176. *funesta* Poda. — Frequens.

177. *cinctella* Schaum. — VI. Jeselnicza. (Legit J. Pável.)

Cetonia F.

178. *aurata* L. — Communis.

v. *piligera* Muls. — Simul cum stirpe.

v. *purpurata* Heer. — Ut prior.

v. *lucidula* Fieb. — V. Brassó. (Leg. L. Méhely, 245, p. 215.)

v. *pisana* Dahl. — I. Hagymádfalva. (Leg. Dr. A. Fleischer, 89, p. 90.)

v. *praeclara* Muls. — In regione VII. (Reitter, 408, p. 244.)

v. *strigiventris* Burm. — Ut prior.

v. *tunicata* Reitt. — In regione VII. (Auctor, 408, p. 245.)

v. *prasiventris* Reitt. — In reg. VII. (Auctor, 408, p. 245.)

v. *valesiaca* Heer. — III. Trencsén. (Brancsik, 44, p. 85.)

Potosia Muls.

179. *marmorata* F. — I. Budapest, Kalocsa, Debreczen. II. Pécs. III. Nyitra, Beczkó, Koritnyicza. IV. S.-A.-Ujhely, Erdőbénye. V. Frequens. VI. Ulma.

180. *speciosissima* Scop. — I. Budapest, Kalocsa, Debreczen. II. Berhida, Sopron, Kőszeg, Z.-Tapolcza, Pécs. III. Nyitra, Rozsnyó. IV. Sátoraalja-Ujhely, S.-Patak, Tolcsva. Homonna. V. Creber. VII. Našice.

181. *affinis* And. — I. Budapest, Kalocsa, N.-Várad. II. Pécs. IV. S.-A.-Ujhely. V. Gyula-Fehérvár, Brassó. VIII. Fiume.

182. *floricola* Hbst. — Frequens.

v. *obscura* And. — Simul cum stirpe.

183. *metallica* F. — In toto regno occurrit.

v. *Fieberi* Kr. — V. Sósmező. (Legit L. Méhely, 247, p. 189.)

v. *cuprea* Gory. — II. Pécs. (Legit L. Biró.)

184. *angustata* Germ. — VIII. Fiume, Buccari, Crkvenica, Zengg.

v. *coerulescens* Schilsky. — VIII. Fiume, Zengg.

v. *Diocletiana* Reitt. — VIII. Carlopago, Zengg.

185. *hungarica* Hbst. — I. Budapest, Mons Pilis, Dabas, Kalocsa, Szoboszló, N.-Várad. II. Ács, Lacus Fertő, Berhida, Kőszeg. IV. S.-A -Ujhely, Tállya, Tokaj, Szerencs. V. Frequens. VI. Temesvár, Ulma, Jaszenova, Grebenácz, Herkulesfürdő.

Valgus Scriba.

186. *hemipterus* L. — Frequens.

Osmoderma Serv.

187. *eremita* Scop. — I. Parád, Kalocsa. II. Pécs, Kőszeg. III. D.-Jenő, Selmecz. IV. S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Szinna. V. Creber. VI. Herkulesfürdő.

Gnorimus Serv.

188. *variabilis* L. — I. Parád, Péczel. II. Z.-Tapolcza, Kőszeg. III. Hermánd. IV. Tolcsva, Szőllőske, Csap. V. Tasnád, Gy.-Fehérvár, N.-Szeben, N.-Csür, Prázsmár, Medgyes, Montes Csikenses, Sz.-Régen. VI. Temesvár, Mehádia. VII. Našice, Crni-Dabar, Gospić.

189. *nobilis* L. — In regionibus montanis frequens.

Trichius F.

190. *fasciatus* L. — In regionibus montanis communis.

191. *gallicus* Heer *(abdominalis* Mén.) — Frequ.

Fam. BUPRESTIDAE.

Chalcophora Sol.

1. *mariana* Lap. — I. Budapest. II. Kőszeg, Pécs. III. Pozsony, N.-Szombat, Trencsén, Illava. IV. Bártfa. V. K.-Talmács. VI. Herkulesfürdő. VII. Lipik.

Aurigena Lap.

2. *lugubris* F. — I. Budapest, Péczel, Szeged, N.-Várad. II. N.-Vázsony, Pécs. III. Agárd, Beczkó, Bosácz. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Tokaj, Gálszécs. V. Frequens. VI. Rékas, Ulma, Mehádia. VII. Vrdnik.

Capnodis Esch.

3. *cariosa* Pallas. — VIII. Carlopago (sec. Ocskay).

4. *tenebrionis* L. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa,

N.-Várad, Rézbánya. II. Pécs. III. Beczkó. IV. Bártfa, Sátoralja-Ujhely, Tolcsva, Tokaj. V. Frequens. VI. Zsombolya. VII. Našice. VIII. Buccari, Carlopago, Zengg.

5. *tenebricosa* Hbst. — VIII. Carlopago (sec. Ocskay).

v. *lugens* Küst. — Ut prior.

Dicerca Esch.

6. *aenea* L. — I. Budapest, Parád, Dabas, Kalocsa, Debreczen, N.-Várad. IV. Tolcsva, Runyina. V. Sz.-Sebes, Szerdahely, N.-Szeben, Vallis Czód, Kercz, Holczmány, Brassó. VI. Herkulesfürdő.

7. *berolinensis* Hbst. — Frequens.

v. *obscura* Schil. — VII. Velebit. VIII. Vallis Draga.

8. *alni* Fisch. — I. Péczel, Kecskemét. Z.-Tapolcza. III. Pozsony. V. Nagy-Szeben. VI. Resicza, Mehádia. VII. Diakovár.

9. *furcata* Thunb. — II. Kőszeg, Pécs. III. Szkala (Com. Trencsén). IV. Bártfa.

Poecilonota Esch.

10. *variolosa* Payk. — I. Dabas, Székelyhid. II. Kőszeg. IV. Ránk. V. Vallis Czód. VI. Herkulesfürdő.

11. *rutilans* F. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. Pécs. III. Beszterczebánya, Hermánd. IV. Ránk, S.-A.-Ujhely, N.-Mihály. V. Kolozsvár, Nagy-Szeben, Sz.-Ujfalu, Montes Kerczenses. VI. Herkulesfürdő. VII. Velebit.

12. *decipiens* Mannh. — I. Kalocsa, Remecz.

Buprestis L.

13. *splendida* Payk. — V. Montes Cibinenses. VI. Herkulesfürdő.

14. *rustica* L. — III. Zólyom, Hermánd, Trencsén, Lietava, Koritnyicza, Brankó, Csorba. IV. Tolcsva. V. Frequens.

v. *signaticeps* Fleisch. — III. Tátrafüred, Barlangliget. V. N.-Talmács.

15. *haemorrhoidalis* Hbst. — I. Budapest, Debreczen. II. Z.-Tapolcza. III. Beszterczebánya, Oravicz, Kézsmárk. IV. Bártfa, M.-Laborcz, V. Tasnád, Praesbe, N.-Talmács, Montes Kerczenses, Hosszufalu, Medgyes, Borszék, Montes ad fluv. Maros.

v. *inframaculata* Fleisch. — V. N.-Talmács, Medgyes, Borszék.

16. *novemmaculata* L. — II. Zircz. V. Bártfa.

17. *octoguttata* L. — II. Zircz. III. Bán. VI. Herkulesfürdő.

Eurythyrea Sol.

18. *austriaca* L. — II. Sopron, Pécs. III. Nyitra, Beszterczebánya, Hermánd. IV. Kassa, Sátoralja-Ujhely. V. Tasnád, Montes Radnaenses, Cibinenses et Kerczenses, Fogaras, Brassó, Tusnád, Montes ad fluv. Maros.

19. *scutellaris* Ol. — I. Budapest, Isaszeg, Szeged. II. Pécs. III. V.-Mikola. IV. Sátoralja-Ujhely, Tolcsva. V. N.-Szeben, Vallis Czód, Montes Kerczenses. VI. Berzászka, Herkulesfürdő. VII. Plešivica.

20. *micans* F. — V. N.-Talmács, Medgyes, Gy.-Tölgyes.

Melanophila Esch.

21. *decastigma* F. — I. Debreczen. VI. Fehértemplom, Grebenácz, Herkulesfürdő.

22. *acuminata* Deg. — IV. Mons Hoverla. V. Vallis Czód, Brassó, Gyulafalva.

Phaenops Lac.

23. *cyanea* F. — I. Isaszeg. III. Timorháza. IV. Kassa, Bártfa, M.-Laborcz. V. Kercz, Brassó, Hosszufalu, Prázsmár, Gyergyó, Montes ad fluv. Maros. VI. Herkulesfürdő.

Anthaxia Esch.

24. *hungarica* Scop. — I. Budapest. II. Sopron, Pécs. III. Pozsony. VI. Orsova, Herkulesfürdő.

scorzonerae Friv. — Hungaria (Cat. Coleop. Eur., 1891, p. 196).*

25. *diadema* Fisch. — VI. Mons Allion. (Leg. J. Pável.)

26. *Croesus* Vill. — I. Budapest, Péczel, Isaszeg. II. N.-Vázsony, Pécs. V. Szelindek. VI. Mons Szemenik.

27. *cichorii* Ol. — I. Budapest, Kalocsa, Debreczen, Bél, Tenke, Rév. II. Z.-Tapolcza, Kapuvár. III. Beczkó. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj, Homonna. V. Tasnád, Zilah, M.-Vásárhely, Nyárad, Szereda, Hátszeg, Veresmart, Segesvár. VI. Temesvár, Jeselnicza, Herkulesfürdő. VIII. Buccari.

28. *millefolii* F. — I. Budapest, Szt-Lőrincz, Dabas, Kalocsa, Debreczen. II. Z.-Tapolcza, Sopron. V. M.-Vásárhely, Nyárad, N.-Ápold. VII. Našice.

29. *umbellatarum* F. — I. Budapest, Péczel, Peszér. II. Visz. IV. Tokaj, Szőllőske. V. N.-Falu, N.-Ápold, Gy.-Tölgyes. VI. Herkulesfürdő. VII. Našice.

30. *aurulenta* F. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa,

* Species haec ab E. Frivaldszky ex montibus Balcanicis (Karlova) descripta, apud nos hucusque non est inventa.

Makó, N.-Várad. II. D.-Örs, Ács. III. K.-Kálna. IV. S.-A.-Ujhely. V. Déva. VI. Temesvár, Ulma.

31. *manca* L. — I. Budapest, Péczel, Isaszeg, Kalocsa. II. D.-Örs, Ács. III. K.-Kálna. IV. S.-A.-Ujhely. V. Déva. VI. Temesvár, Palánka, Ulma, Grebenácz.

32. *Hackeri* Friv. — I Budapest, Kalocsa.

33. *Kiesenwetteri* Mars. — VI. Mons Allion, Herkulesfürdő.

34. *candens* Pz. — I. Péczel, Kalocsa. II. Felsőlő. III. Bakabánya, Pozsony, Rozsnyó, Csetnek. IV. Tolcsva, M.-Sziget. VII. Lipik.

35. *lucens* Küst. — I. Budapest. VIII. Zengg.

36. *salicis* F. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Debreczen, N.-Várad, Belényes. II. N.-Vázsony, Pécs. IV. S.-A.-Ujhely, Erdőbénye. V. Tasnád, Pele, Valkó, N.-Szeben, N.-Csür, Brassó. VI. Temesvár, Palánka, Jeselnicza, Herkulesfürdő.

37. *semicuprea* Küst. — I. Budapest. II. Zircz.

38. *fulgurans* Schrank (*nitida* Rossi). — Frequ.

39. *grammica* Lap. — II. Pécs. III. Beczkó. V. N.-Csür. VI. Grebenácz, Oravicza, Herkulesfürdő. VII. Velebit.

40. *nitidula* L. — Frequens.

v. *signaticollis* Kryn. — Simul cum stirpe.

41. *funerula* Ill. — I. Budapest, Péczel. VI. Német-Bogsán, Jeselnicza, Drenkova.

42. *morio* F. — V. Mons Kereszténvhavas. (Leg. L. Méhely, 247, p. 189.)

43. *plicata* Kiesw. — V. Teste Bielz (27, p. 72).

44. *sepulchralis* F. — II. Pécs. III. Koritnyicza, Tátrafüred. IV. Bártfa. V. Kolozsvár. VI. Oravicza, Orsova. VII. Velebit.

v. *helvetica* Stierl. — III. Tátrafüred. (Legit A. Mocsáry.)

45. *quadripunctata* L. — In toto regno occurrit.

v. *Godeti* Lap. — IV. Bártfa. VI. Herkulesfürdő.

Ptosima Sol.

46. *11-maculata* Hbst. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, N.-Várad, Székelyhid. II. Kőszeg, Pécs. III. Bosácz. IV. S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Tokaj. V. Tasnád, N.-Szeben, Szt-Erzsébet, Medgyes, Sz.-Régen, M.-Záh. VI. Temesvár, Ulma, Herkulesfürdő. VII. Montes Fruska-Góra.

v. *sexmaculata* Hbst. — Simul cum stirpe.

Acmaeodera Esch.

47. *convolvuli* Waltl. — V. Fogaras. (Bielz, 27, pag. 72.)

48. *degener* Scop. — I. Kalocsa, Debreczen, Hagymádfalva. II. Z.Tapolcza, Pécs. IV. Erdőbénye, Tolcsva. V. N.-Falu, Peér, Pele, N.-Csür. Fenyőfalva, Montes Kerczenses, Fogaras, Medgyes, Sz.-Régen. VI. Rékas. VII. Diakovár.

v. *Frivaldszkyi* Lap. — II. Pécs (sec. J. Frivaldszky).

49. *quadrifasciata* Rossi. — Hungaria. (Marseul, 238, p. 279.)

50. *pilosellae* Bon. — V. Kolozsvár. VII. Našice.

51. *flavofasciata* Pill. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Rézbánya. II. P.-Vadé, Jász-Berény, Pécs. III. V.-Mikola. IV. Tolcsva, V. N.-Szeben, Veresmart, N.-Sink, Brassó, Prázsmár, Medgyes, Segesvár, Semesnye. VI. Orsova, Herkulesfürdő. VII. Našice.

Sphenoptera Sol.

52. *antiqua* Ill. — I. Budapest, Kalocsa. II. B.-Füred, Pécs. V. Hátszeg, Puj, Montes Kerczenses, Mons Czenk, Sz.-Régen. M.-Záh. VI. Grebenácz. VIII. Carlopago.

53. *metallica* F. — I. Budapest, Dabas, Kalocsa, Debreczen, Szeged. II. Pécs. IV. Szőllőske. VI. Jaszenova, Grebenácz.

Chrysobothrys Esch.

54. *chrysostigma* L. — III. Zsolna, Tátrafüred. IV. Mons Hoverla. V. Gyulafalva, Borgó. VI. Herkülesfürdő.

55. *affinis* F. — Frequens.

56. *Solieri* Lap. — III. Pozsony. V. Montes ad fluv. Maros.

Coroebus Lap.

57. *fasciatus* Villers. (*bifasciatus* Ol.) — I. Budapest, Péczel, Isaszeg, Bogács, Veresmart, Batka, Felnémet, Gyöngyös, Domoszló, Verpelét, Debreczen. VI. Ó-Moravicza.

58. *undatus* F. — I. Péczel, Isaszeg, Debreczen. II. Pécs. III. K.-Kálna. VII. Carlopago.

59. *rubi* L. — I. Budapest, Szt-Lőrincz, Kalocsa, N.-Várad. II. Z.-Tapolcza, Pécs. III. Besztercze-bánya, Hermánd. IV. S.-A.-Ujhely. VI. Temesvár, Jaszenova, Herkulesfürdő. VII. Plešivica, Fužine. VIII. Fiume, Buccari, Carlopago, Zengg.

60. *elatus* F. — I. Budapest, Péczel, Keczel, Hajós, Debreczen, N.-Várad. II. Z.-Tapolcza, Kőszeg, Pécs. III. Beczkó. IV. S.-A.-Ujhely, Tállya, Varannó. V. Tasnád, Déva, N.-Szeben, N.-Csür, Szamos-Ujfalu, Gyeke. VI. Ulma, Jaszenova, Grebenácz, Báziás, Oravicza, Herkulesfürdő, Rumunyest. VIII. Buccari.

61. *episcopalis* Mannh. — I. Budapest (sec. E. Frivaldszky).

62. *graminis* Pz. — I. N.-Várad. (Leg. A. Mocsáry.)

63. *aeneicollis* Villers. — I. Péczel, Kalocsa. II. Pécs. III. Putnok. VI. Báziás, Jeselnicza, N.-Bogsán.

64. *amethystinus* Ol. — I. M.-Kovácsháza. VI. Jeselnicza, Herkulesfürdő.

65. *violaceus* Kiesw. — VI. Mehádia. (Bodemeyer, 34, p. 264.)

Agrilus Curt.

66. *sexguttatus* Herbst. — I. Budapest, Csepel. Péczel, Kalocsa, Debreczen. III. Nyitra. IV. Jeszenő. V. N.-Ápold, N.-Csür, Brassó, Prázsmár, Medgyes, Segesvár, Sz.-Régen.

67. *biguttatus* F. (*pannonicus* Pill.) — I. Budapest, Péczel, Peszér, Debreczen. II. Z.-Tapolcza, Kőszeg, Pécs. III. Mons Szelecz (Com. Trencsén), Putnok. IV. S.-A.-Ujhely, A.-Bereczki, Szőllőske, Homonna, Varannó. V. N.-Szeben, Brassó, Hosszufalu, Prázsmár. VI. Ulma, Resicza Herkulesfürdő. VII. Montes Fruska-Góra.

68. *sinuatus* Ol. — I. Kalocsa. II. Z.-Tapolcza. V. N.-Enyed, Hátszeg, N.-Szeben, Szt-Erzsébet. VI. Resicza, Kazán, Herkulesfürdő. VII. Plešivica.

69. *mendax* Mannh. — Hungaria (Frivaldszky, 97, p. 112).

70. *subauratus* Gebl. — I. Budapest. V. Szent-Erzsébet.

71. *viridis* L. — Frequens.

v. *novicius* Ratzb. — I. Kalota. III. Koritnyicza, Lucsivna, Á.-Váralja. V. Montes Cibinenses, Segesvár. VI. Oravicza.

v. *fagi* Ratzb. — I. Budapest, Kalocsa, Hajós, Debreczen. V. N.-Szeben, Montes Bodzaenses. VI. Herkulesfürdő.

v. *salicis* Friv. — VI. Grebenácz. (Auctor, 104, p. 319.)

72. *auricollis* Kiesw. — III. Koritnyicza. (Legit J. Xántus.)

73. *lineola* Redtb. — I. Kalocsa. VI. Herkulesfürdő.

74. *coeruleus* Rossi. — I. Kalocsa. III. Beszterczebánya, Koritnyicza. IV. Szőllőske. V. Szent-Erzsébet, Vöröstorony. VIII. Carlopago.

75. *betuleti* Ratzb. — III. Pozsony (sec. Bolla).

76. *pratensis* Ratzb. — I. Budapest, Csepel, Peszér, Kalocsa, Hajós, Mező-Berény, Debreczen. II. N.-Vázsony. V. N.-Szeben.

77. *elongatus* Hbst. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Debreczen. II. Z.-Tapolcza, Pécs. V. Hátszeg, Montes Cibinenses, Fogaras, Brassó, Segesvár. VI. Ulma, Fehértemplom, Resicza. VII. Montes Fruska-Góra.

78. *angustulus* Ill. — Frequens.

v. *rugicollis* Ratzb. — I. Budapest. V. Dobra, N.-Szeben, Szelindek, Remete. VI. Jeselnicza, Herkulesfürdő.

79. *scaberrimus* Ratzb. — II. N.-Vázsony. (Legit M. Hopffgarten.)

80. *laticornis* Ill. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. VI. Oravicza, Herkulesfürdő.

81. *olivicolor* Kiesw. — I. Budapest, Péczel, Nagy-Várad. II. N.-Vázsony, Pécs. III. Beszterczebánya, Putnok. IV. Erdőbénye, Mád, Tokaj. VI. Báziás, Oravicza, Jeselnicza, Herkulesfürdő.

82. *hastulifer* Ratzb. — II. N.-Vázsony. III. Pozsony. IV. Barkó. VI. Báziás, Jeselnicza, Herkulesfürdő. VIII. Buccari.

83. *graminis* Lap. — I. Péczel, N.-Várad. II. Nagy-Vázsony. IV. Gálszécs. V. Teste Seidlitz.

84. *derasofasciatus* Lac. — I. Péczel, Kalocsa, N.-Várad. II. Kőszeg, Szegzárd. IV. Sátoralja-Ujhely, Munkács. V. Tasnád, N.-Csür, Fenyőfalva. VI. Janova, Resicza, Jeselnicza.

85. *litura* Kiesenw. — I. Budapest, Péczel. III. Putnok. VI. Herkulesfürdő.

86. *cinctus* Ol. — I. Budapest. II. Pécs. IV. Sátoralja-Ujhely, Tállya, Szőllőske. V. N.-Szeben. VI. Oravicza, Jeselnicza.

87. *convexifrons* Kiesw. — I. Péczel, Kalocsa, VI. Jeselnicza, Herkulesfürdő.

88. *sericans* Kiesw. — I. Hajós. V. Boncz-Nyires.

89. *albogularis* Gory. — I. Budapest, Dabas, Kecskemét, Keczel. II. Montes Bakonyenses.

90. *aurichalceus* Redtb. — I. Budapest, Hajós. II. N.-Vázsony, Pécs. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj, Jeszenő. VI. Grebenácz, Báziás, Resicza.

91. *convexicollis* Redtb. — I. Budapest, Kalocsa. III. Sasvár. VI. Herkulesfürdő.

92. *integerrimus* Ratzb. — II. N.-Vázsony. III. Tátrafüred. IV. Mons Menczul. VI. Oravicza.

93. *hyperici* Crtz. — I. Budapest, Kalocsa, Nyiregyháza, N.-Várad. II. Ács, N.-Vázsony, B.-Füred. IV. Sátoralja-Ujhely, Mád, Tokaj, Varannó, M.-Sziget. V. Montes Cibinenses, Szelindek, Gy.-Tölgyes. VI. Herkulesfürdő.

94. *roscidus* Kiesw. — I. Budapest, Kalocsa, Nagy-Várad. V. Vallis Czód. VI. Orsova, Herkulesfürdő.

95. *obscuricollis* Kiesw. — I. Péczel, Kalocsa. V. N.-Szeben.

96. *Reyi* Baud. — I. Kalocsa. (Leg. F. Speiser, 849, p. 32.)

Cylindromorphus Kiesw.

97. *subuliformis* Mannh. — I. Budapest, Péczel, Dabas, Hajós. II. N.-Vázsony, Szegzárd. IV. S.-A.-Ujhely, Tállya, Tokaj.

98. *filum* Gyll. — I. Budapest, Dabas, Kecskemét, Keczel, Hajós. II. Ács, N.-Vázsony. IV. Sátoralja-Ujhely.

Aphanisticus Latr.

99. *emarginatus* F. — I. Budapest, Hajós. III. V.-Mikola.

100. *pusillus* Ol. — I. Budapest. II. Ács. VI. Német-Bogsán, Jeselnicza.

Trachys F.

101. *minuta* L. — Frequens.

102. *corusca* Ponz. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. IV. Rónaszék. V. Vallis Czód, Zajzon. VI. Temesvár, Ság, Báziás, Orsova, Herkulesfürdő. VII. Diakovár.

103. *troglodytes* Gyll. — I. Budapest, Péczel, Keczel. IV. Bártfa. V. Ad balneum Gyógy, Hátszeg, N.-Szeben. VI. Temesvár. VII. Montes Fruska-Góra.

104. *pumila* Illig. — I. Budapest, Keczel, Hajós. II. Soóly. V. S.-Ujlak, Peér, Nagy-Szeben, K.-Torony, N.-Csür, Előpatak, Segesvár. VI. Herkulesfürdő.

v. *scrobiculata* Mars. — II. Pécs. VI. Resicza, N.-Bogsán.

v. *phlyctaenoides* Kolen. — I. Péczel. (Leg. D. Kuthy.)

105. *nana* Herbst. — I. Budapest. IV. Szinna, Máramaros-Sziget. V. Hátszeg, N.-Csür. VI. Herkulesfürdő. VII. Diakovár.

Fam. EUCNEMIDAE.

Throscus Latr.

1. *brevicollis* Bonv. — I. Szeged, N.-Várad. II. Pécs. IV. Bártfa. V. N.-Szeben, Montes Kerczenses.

2. *dermestoides* L. — I. Budapest, Kalocsa, Nagy-Várad. II. Kapuvár. III. Trencsén. IV. Bártfa, Gáboltó, Torna, K.-Azar, Montes Beszkidenses. V. Hátszeg, Nagy-Szeben, Szelindek, Brassó, Sz.-Régen. VI. Herkulesfürdő. VII. Diakovár, Gospić.

3. *carinifrons* Bonv. — I. M.-Káta, Kalocsa, Nyíregyháza. III. Trencsén. IV. Mons Menczul, Montes Beszkidenses. V. Hátszeg, N.-Szeben.

4. *elateroides* Heer. — I. Budapest. IV. Lelesz. V. Dobra, N.-Szeben, N.-Csür.

v. *Bonvouloiri* Desbr. (*modestus* Weise). — V. N.-Szeben. (Reitter, 293, p. 23.)

5. *exul* Bonv. — I. Kalocsa. II. Ács.

6. *Duvali* Bonv. — V. Boncz-Nyires. (Legit L. Méhely, 247, p. 189.)

7. *obtusus* Curt. — Frequens.

Drapetes Redtb.

8. *biguttatus* Pill. — Frequens.

v. *immaculatus* Fleisch. — I. Hagymádfalva. (Auctor, 89, p. 90.)

Cerophytum Latr.

9. *elateroides* Latr. — I. Élesd. (Legit E. Merkl.)

Melasis Oliv.

10. *buprestoides* L. — I. Parád. II. Z.-Tapolcza. III. Isztebnik, Zlatócz. V. Resinár, Vallis Czód, Præsbe, Vöröstorony, Kercz, Brassó, Medgyes. VI. Herkulesfürdő. VII. Našice.

Tharops Lap.

11. *melasoides* Lap. — II. Pécs. IV. Bánszka. V. Hátszeg. VI. Szászka, Herkulesfürdő, Rumunyest. VII. Lipik.

12. *nigriceps* Mannerh. — VI. Herkulesfürdő. VII. Plitvica.

Eucnemis Ahr.

13. *capucina* Ahr. — II. Zircz. III. Zsolna. V. N.-Csür. VI. Orsova, Herkulesfürdő. VII. Lipik.

Thambus Bonv.

14. *Frivaldszkyi* Bonv. — II. P.-Vadé. VI. Resicza, Szászka. VII. Županje.

Dromaeolus Kiesenw.

15. *barnabita* Villa. — I. Remecz. VI. Herkulesfürdő. VII. Vrdnik, Pakrac, Županje.

Dirrhagus Latr.

16. *lepidus* Rosh. — IV. Mons Rabaszkala, Visk. V. Vöröstorony. VI. Resicza, Szászka, Oravicza, Uj-Moldova, Herkulesfürdő, Korniaréva.

17. *pygmaeus* F. — II. Montes Bakonyenses, Z.-Tapolcza. V. Vöröstorony, Héviz, Borgó. VII. Našice.

18. *clypeatus* Hampe. — I. Montes Biharenses. IV. Mons Szinnaikő. V. Gyalu, Hátszeg. VI. Szászka, Herkulesfürdő.

19. *attenuatus* Mäkl. (*longicornis* Hampe). — V. N.-Szeben. (Bielz, 27, p. 73.)

20. *Sahlbergi* Mannh. — VI. Uj-Moldova. VII. Mons Papuk.

Hylochares Latr.

21. *dubius* Pill. — I. Parád. II. Vaiszló. VI. Mons Allion (Orsova).

Nematodes Latr.

22. *filum* F. — VI. Szászka, Herkulesfürdő.

Hypocoelus Lac.

23. *procerulus* Mannh. — IV. Bártfa. S.-A.-Ujhely.

V. Tihucza, Borgó. VI. Ferenczfalva, Herkulesfürdő. VII. Mrzla-Vodica.

Xylobius Latr.

24. *corticalis* Payk. (*alni* F.) — I. Budapest. III. Budatin. VI. Orsova, Herkulesfürdő.

Otho Kiesenw.

25. *sphondyloides* Germ. — VI. Mons Domoglet. VII. Verőcze.

Fam. ELATERIDAE.

Adelocera Latr.

1. *punctata* Hbst. — II. Pécs, Apáti. V. Kolozsvár, Sz.-Régen. VI. Temesvár, Herkulesfürdő.
2. *lepidoptera* Pz. — III. Körmöczbánya, Á.-Várallja, Tátrafüred. V. Montes Kerczenses,
3. *fasciata* L. — II. N.-Hajmás. III. K.-Kálna, Hermánd, Trencsén, Koritnyicza, Lucski, Tátrafüred, Igló. IV. S.-A.-Ujhely, Mons Hoverla. V. Frequens.
4. *quercea* Hbst. — I. Isaszeg, Feketeerdő. III. Tátrafüred. V. N.-Szeben, Szt-Erzsébet.

Archontas Gozis.

5. *murinus* L. — Communis.

Porthmidius Germ.

6. *austriacus* Schrank. — I. Budapest. II. N.-Vázsony, Zircz. III. Bohuszlavicz. IV. Vinna. V. Brassó (Mons Czenk). VI. Kazán, Herkulesfürdő. VII. Švica.

Anchastus Leconte.

7. *acuticornis* Germ. — V. N.-Szeben, Medgyes.

Drasterius Esch.

8. *bimaculatus* Rossi. — Communis
   v. *fenestratus* Küst. — VI. Jeselnicza, Herkulesfürdő.
   v. *quadrisignatus* Küst. — I. Kecskemét. IV. Tokaj.
   v. *binotatus* Rossi. — Simul cum. stirpe.

Elater L.

9. *cinnabarinus* Esch. — Frequens.
10. *sanguineus* L. — Ut prior.
11. *praeustus* F. — I. Péczel, N.-Káta, Kalocsa. II. Z.-Tapolcza. IV. Bártfa, N.-Mihály. V. N.-Falu, N.-Szeben, K.-Talmács, Montes Kerczenses, Mons Nagy-Kőhavas, Medgyes, Sz.-Régen. VII. Fužine.
12. *pomonae* Steph. — I. Budapest. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, S.-Patak, K.-Azar, Szinna, Nagy-Bocskó. V. Kercz, Brassó, Segesvár, Sz.-Régen, Deés. VI. Resicza, Ferenczfalva.
13. *sanguinolentus* Schrank. — Frequens.
   v. *ephippium* Ol. — Simul cum stirpe.
14. *ferrugatus* Lac. — Communis.
15. *elongatulus* F. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Debreczen, N.-Várad. II. Zircz, Pécs. III. Trencsén. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, N.-Mihály. V. Tasnád, Hátszeg, K.-Talmács, Vöröstorony, Segesvár, M.-Záh. VI. Mons Domoglet. VII. Diakovár.
16. *balteatus* L. — II. Kőszeg. III. Trencsén. V. Ad balneum Valea-Vinului, Praesbe, Borszék. VII. Fužine.
17. *crocatus* Lac. — Frequens.
18. *4-signatus* Gyll. — II. Kőszeg. III. Tavarnok. VI. Herkulesfürdő.
19. *elegantulus* Schönh. — I. Budapest, Kalocsa, N.-Várad. II. Pécs. IV. Bártfa, Mons Vihorlat. V. Hátszeg, Vöröstorony, Montes Kerczenses. VI. N.-Bogsán, Mons Domoglet.
20. *sinuatus* Germ. — I. Budapest, Péczel, N.-Várad. II. Ács, N.-Vázsony. III. Trencsén. IV. Vinna, Mons Vihorlat. V. Déva, N.-Ápold. VI. Resicza, Herkulesfürdő. VII. Švica, Medak.
   v. *cuneiformis* Hampe. — VII. Vinkovcze, V.-Gorica.
21. *erythrogonus* Müll. — II. Zircz. III. Tátrafüred. IV. Bártfa, Mons Hoverla. V. K.-Talmács, Fenyőfalva, N.-Csür, Hosszufalu, Borgó, Görgény. VII. Mrzla-Vodica.
22. *tristis* L. — I. Szeged. V. Borszék.
23. *ruficeps* Muls. — V. Nagy-Szeben. (Leg. C. Fuss.)
24. *Megerlei* Lac. — I. Budapest, Kalocsa. IV. S.-A.-Ujhely, A.-Bereczki, Homonna. V. Nagy-Szeben, Resinár, Mons Keresztényhavas.
25. *nigrinus* Payk. — III. Vallis Vrátna, Koritnyicza, Putnok. IV. Mons Hoverla, Luhi, Mons Pietrosz, V. Lacus Bulea, K.-Disznód, Papolcz. VI. Mons Szemenik. VII. Fužine.
26. *nigerrimus* Lac. — I. Isaszeg, Nagy-Várad. III. Trencsén, Oravicz, Tátra (Marmotahegy). IV. Mons Balzatul. V. N.-Szeben, Præsbe, Montes Sebesenses et Kerczenses. VI. Herkulesfürdő.
27. *aethiops* Lac. — I. Montes Biharenses. III. Vallis Vrátna, Putnok, Tátrafüred. IV. Mons Pietrosz. V. Ad balneum Valea-Vinului, N.-Szeben, Præsbe, Montes Czódenses, Girku, Montes Kerczenses et Porumbákenses, Mons Bucsecs. VIII. Fiume.

Ischnodes Germ.

28. *sanguinicollis* Pz. — I. Budapest, Isaszeg. III. Tavarnok. IV. Mons Vihorlat. V. N.-Csür, Szent-Erzsébet. VI. Mons Domoglet.

Megapenthes Kiesw.

29. *tibialis* Lac. — I. Budapest. II. Pécs. III. Tavarnok, Trencsén. IV. Bártfa, Tolcsva, Varannó, N.-Mihály, N.-Bocskó. V. Tasnád, Peér, Deés, Hátszeg, N.-Szeben, Brassó. VI. Báziás, Resicza, Mons Domoglet.

30. *lugens* Redtb. — III. K.-Kálna, Pozsony. V. N.-Szeben. VI. Mons Domoglet.

Betarmon Kiesw.

31. *bisbimaculatus* Schh. — I. Péczel, Kalocsa. II. Pécs. V. Nagy-Szeben, Montes Cibinenses et Fogarasenses, Segesvár, Sz.-Régen.

32. *picipennis* Bach. — III. Tátrafüred. V. Rozsnyó. VI. Herkulesfürdő. VII. Fužine, Capella.

v. *axillaris* Kiesw. — III. Tátrafüred. VI. Herkulesfürdő.

33. *scapulatus* Cand. — VI. Herkulesfürdő (sec. J. Frivadszky.).

Hypnoidus Steph.

34. *riparius* F. — I. Alpes Bohodej. III. Mons K.-Kriván, N.-Lipcse, Koritnyicza, Lacus Zöldtó dictus. V. Montes Kerczenses.

35. *rivularis* Gyll. —VI. Herkulesfürdő, Korniaréva.

36. *frigidus* Kiesw. — III. Tátrafüred. IV. Cserna-Hóra, Mons Pietrosz. V. Montes Ünökő et Szurul.

37. *maritimus* Curt. — III. Trencsén, Tátrafüred.

38. *gracilis* Cand. — III. Budatin, Mons K.-Kriván, Tátrafüred.

39. *4-pustulatus* F. — V. Hátszeg, N.-Sink, Törcsvár, Sz.-Régen.

40. *pulchellus* L. — I. Mons Királyhágó. III. Beczkó, Tátra (Bélapatak). IV. Mons Szinnaikő. V. Hátszeg, Fogaras, Brassó, Medgyes. VI. Temesvár, N.-Bogsán. VII. Lipik.

41. *sabulicola* Boh. — I. Kalocsa. IV. O.-Puruba. V. Vöröstorony, ad ripam fluv. Olt. VI. Ó-Palánka.

42. *4-guttatus* Lap. — III. Beczkó, Á.-Váralja. IV. Mons Szinnaikő, M.-Sziget, Királyháza. V. Ad balneum Valea-Vinului, Dobra, Kákova, Nagy-Szeben, Zajzon, Tömös. VI. Dognácska. VIII. Fiume.

43. *dermestoides* Hbst. — IV. Bártfa, M.-Laborcz, Királyháza. V. Ad balneum Valea-Vinului, Hátszeg, Vöröstorony, Montes Kerczenses, Brassó, Prázsmár, Sz.-Régen.

44. *meridionalis* Lap. — III. Ad fluvium Árva. IV. Mons Szinnaikő. V. Hátszeg, Vöröstorony, Porumbák, Sz.-Régen.

45. *minutissimus* Germ. — I. Budapest, N.-Várad. II. Szt-Márton, Szegzárd. III. Trencsén. IV. Somod, S.-A.-Ujhely, Tolcsva, L.-Bénye. V. Frequens. VI. Dognácska, Jeselnicza, Herkulesfürdő. VII. Diakovár.

Cardiophorus Esch.

46. *gramineus* Scop. — I. Budapest, Debreczen, N.-Várad, Élesd. II. Z.-Tapolcza, Szántó, Kőszeg. III. Trencsén. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Varannó, Szinna, Nagy-Bocskó. V. Frequens. VI. Janova, Resicza.

47. *discicollis* Hbst. — I. Budapest, Péczel, Keczel. II. N.-Vázsony, IV. Szádellő. VII. Našice.

48. *ruficollis* L. — I. Budapest, Kalocsa. V. Sz.-Ujvár, Déva, N.-Ápold.

49. *rufipes* Goeze. — I. Budapest, Péczel, Hajós, Debreczen, N.-Várad, Székelyhid. II. Z.-Tapolcza. III. Trencsén. IV. Sátor-Alja-Ujhely, Tokaj, M.-Sziget. V. Déva, Nagy-Szeben, Medgyes. VI. Grebenácz, Báziás, Herkulesfürdő.

50. *vestigalis* Er. — V. N.-Szeben, M.-Vásárhely.

51. *nigerrimus* Er. — I. Budapest, Péczel. III. Trencsén. V. Vöröstorony.

52. *ebeninus* Germ. — I. Budapest. (Leg. D. Kuthy.)

53. *atramentarius* Er. — I. Budapest, Kalocsa. V. Medgyes. VI. Orsova, Herkulesfürdő.

54. *musculus* Er. — I. Budapest, Eger, Kalocsa, N.-Várad. III. Trencsén. VI. Herkulesfürdő.

55. *asellus* Er. — I. Budapest, Debreczen. II. Felsőlő.

56. *cinereus* Hbst. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa, Debreczen, N.-Várad. III. Trencsén. IV. Szomotor. V. Sz.-Ujfalu, Fogaras, Medgyes, Segesvár. VI. Báziás, Herkulesfürdő.

v. *testaceus* F. — I. Budapest, Dabas, Kecskemét, Kalocsa, Debreczen, N.-Várad. V. Hátszeg. VI. Herkulesfürdő.

57. *equiseti* Hbst. — I. Budapest, Kecskemét, Nyiregyháza, Debreczen, H.-Vásárhely. V. Mons Dongókő, Nagy-Szeben. VI. Grebenácz, Mons Domoglet.

58. *rubripes* Germ. — I. Budapest, Peszér, Kecskemét, Kalocsa, Alpár, Debreczen, Szeged, H.-Vásárhely. II. Boglár, Pécs. III. Trencsén. IV. Torna, S.-A.-Ujhely, Tokaj, Gálszécs. V. Brassó. VI. Grebenácz, Herkulesfürdő. VII. Eszék.

Melanotus Esch.

59. *niger* F. — Communis.

60. *brunnipes* Germ. — I. Budapest, Kalocsa, Deb-

reczen. II. Kőszeg, Pécs. IV. Sátor-Alja-Ujhely, Tolcsva, Terebes. V. Montes Kerczenses, Előpatak, Medgyes, Sz.-Régen. VI. Ulma, Báziás, Oravicza, Herkulesfürdő. VII. Fužine. VIII. Fiume.

61. *castanipes* Payk. — Frequens.

62. *rufipes* Hbst. — Ut prior.

63. *monticola* Mén. — V. Rozsnyó. (Leg. L. Méhely, 247, p. 189.)

64. *crassicollis* Er. — I. N.-Várad. IV. Szádellő. V. Sz.-Régen, Deés. VI. Herkulesfürdő.

65. *dichrous* Er. — I. Isaszeg. V. Deés.

66. *aemulus* Er. — VI. N.-Bogsán. (Leg. E. Merkl.)

Limonius Esch.

67. *pilosus* Leske. — Communis.

68. *aeruginosus* Ol. — Ut prior.

69. *minutus* L. — Frequens.

70. *parvulus* Pz. — Creber.

71. *quercus* Ol. v. *lythrodes* Germ. — I. Budapest. V. Zilah, Vöröstorony, Porcsesd. VI. Herkulesfürdő. VII. Lipik.

72. *aeneoniger* Deg. — I. Kalocsa. II. Kőszeg. III. Trencsén, Tátrafüred. IV. Montes Szinnaikő, Vihorlat et Turkul. V. Hátszeg, Montes Cibinenses, Kerczenses et Felekenses, Lacus Girbova, Montes Fogarasenses.

Athous Esch.

73. *impressifrons* Hampe. — VII. Zágráb. (Auctor, 153, p. 373.)

74. *rufus* Deg. — II. Feketehegy (Bakony), Kőszeg. VIII. Carlopago.

75. *rhombeus* Ol. — I. Isaszeg. II. Pécs. III. Nyitra, Maninhegy (Com. Trencsén). V. Brassó, Oláhfalu, O.-Láposbánya. VI. Mons Domoglet. VII. Trnovac.

76. *niger* L. — Communis.

77. *scrutator* Hbst. — Frequens.

v. *alpinus* Redtb. — I. Montes Biharenses III. Zólyom, Hermánd, Trencsén. IV. Kassa, Bártfa, Mons Vihorlat, N.-Mihály, Olyka, Nagy-Bocskó, Mons Hoverla. V. Creber. VI. Mons Domoglet, Rumunyest.

78. *haemorrhoidalis* F. — Frequens.

79. *vittatus* F. — Frequens.

v. *dimidiatus* Drap. — IV. Bártfa, Dargó, Vinna, Montes Beszkidenses. V. Brassó. VI. Oravicza.

v. *Ocskayi* Kiesw. — V. Brassó. (Bielz, 27, p. 74.)

80. *longicollis* Ol. — Frequens.

81. *undulatus* Deg. — III. Beczkó, F.-Bocza, Sz.-Béla. IV. Bártfa, Montes Menczul et Hoverla. V. Valea-Vinului, Montes Kerczenses et ad fluvium Maros. VI. Mons Domoglet, Korniaréva. VII. Ljeskovac.

v. *bifasciatus* Gyll. — IV. Kassa. V. Mons Galbina, Præsbe, Vallis Czód.

82. *Sacheri* Kiesw. — V. Oláhfalu, Vallis Strimbul. VI. Herkulesfürdő.

83. *subfuscus* Müll. — Frequens.

84. *transsylvanicus* Friv. — In reg. V. (Legit H. Herbst; Auctor, 111, 1888, p. 160.)

85. *Zebei* Bach. — IV. Szádellő. V. N.-Csür, Montes Kerczenses, Medgyes.

86. *pallens* Muls. — IV. Szinna. VI. Szekul. VII. Crni-Dabar, Gospić

87. *montanus* Cand. — V. Mons Keresztényhavas. (Méhely, 246, p. 276.)

88. *circumductus* Mén. — I. N.-Várad. III. Hermánd, Trencsén. IV. N.-Mihály, Mons Breczkul. V. Vallis Zsil, N.-Szeben, Gy.-Tölgyes. VI. Fehértemplom, Ferenczfalva, Herkulesfürdő. VII. Fužine.

89. *circumscriptus* Cand. — IV. Szinna, Mons Zsihovecz, Vallis Fajna, Nagy-Bocskó. V. Montes Kerczenses, Mons Keresztényhavas. VI. Resicza, Mons Domoglet. VII. Fužine, Medak, Velebit.

90. *mollis* Reitt. — I. Montes Biharenses. IV. Com. Marmaros V. Mons Tészla.

91. *difformis* Lac. — VIII. Carlopago (sec. Ocskay).

92. *cavus* Germ. — VI. Mons Domoglet, Korniaréva. VIII. Zengg.

93. *Dejeani* Lap. — V. Kolozsvár. (Bielz, 27, p. 74.)

Ludius Esch.

94. *virens* Schrank (*aulicus* Pz.) — III. Hermánd, Vallis Vrátna. V. Ad balneum Valea-Vinului.

v. *signatus* Pz. — III. Hermánd, Vallis Vrátna, Tátrafüred, Sz.-Béla. V. Montes Cibinenses, Præsbe, Montes Kerczenses, Brassó, Segesvár, Oecsém. VI. Herkulesfürdő, Korniaréva.

95. *pectinicornis* L. — In regionibus montanis frequens.

96. *Heyeri* Sax. — V. Ad balneum Valea-Vinului, Montes Retyezát.

97. *cupreus* F. — III. Montes Vrátnaenses, Kézsmárk. V. Mons Korongyos, K.-Disznód, Brassó, Montes ad fluv. Maros.

v. *aeruginosus* F. — In regionibus subalpinis frequens.

98. *purpureus* Poda. — In reg. montanis occurrit.

99. *haemapterus* Ill. — IV. Com. Marmaros. V. Remete, Mons Sánta, Vöröstorony, Mons Korongyos, Montes Radnaenses.

100. *castaneus* L. — II. Sopron, Pécs. III. Rozsnyó. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, Erdőbénye, N.-Mihály. V. Ad balneum Valea-Vinului.

101. *sulphuripennis* Grm. — V. Montes Kerczenses, Medgyes, Segesvár. (Bielz, 27, p. 74.)

102. *sjaelandicus* Müll. — In regionibus montanis frequens.

v. *assimilis* Gyll. — V. N.-Szeben, N.-Disznód, Sz.-Ujfalu, Medgyes.

103. *serraticornis* Payk.—V.Valea-Vinului, Papolcz. VI. Korniaréva.

104. *montivagus* Rosenh. — III. Mons K.-Kriván. V. Valea Vinului, Montes Kerczenses et Árpásenses. VI. Teste E. Frivaldszky.

105. *affinis* Payk. — I. Montes Biharenses. III. Trencsén, Tátrafüred. IV. Vallis Fajna. V. Ad balneum Valea-Vinului, Mons Sánta, Montes Kerczenses. VI. Mons Domoglet, Korniaréva.

106. *quercus* Gyll. — VI. Ferenczfalva, Orsova, Herkulesfürdő.

107. *insitivus* Germ. — I. Budapest, Péczel, Gyömrő. Dabas, Farkasd, Kecskemét, Keczel, Debreczen. II. Berhida, Pécs. III. Zlatócz, Putnok. IV. Tokaj. V. Montes Sebesenses, N.-Szeben, Medgyes, Segesvár, Sz.-Régen. VI. Palánka, Ulma, Herkulesfürdő. VIII. Carlopago.

108. *tesselatus* L. — Frequens.

v. *bifasciatus* Küst. — V. Montes Kerczenses. (Bielz, 27, p. 74).

109. *chrysocomus* Germ. — II. Pécs VI. Herkulesfürdő.

110. *impressus* F. — III. Beszterczebánya, Tátrafüred. V. Kolozsvár, Gy.-Tölgyes.

111. *nigricornis* Panz. — I. Kalocsa, N.-Várad. IV. S.-A.-Ujhely. V. Dobra, N.-Szeben. VII. Lipik.

amplicollis Germ. — V. Brassó. (Bielz, 27, p. 74.)

112. *aeneus* L. — In regionibus montanis frequens.

v. *germanus* L. — Simul cum stirpe.

113. *latus* F. — Communis.

114. *cruciatus* L. — IV. Bártfa, Szerencs. V. Gyeke, M.-Záh.

115. *alpestris* Mén. (*globicollis* Germ.) — I. Budapest: Hárshegy. (Leg. D. Kuthy.)

116. *bipustulatus* L. — I. Budapest, Dabas, Kalocsa, Debreczen. III. Apátfalu. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Velejte, N.-Mihály, Mons Simonka. V. Pele, N.-Szeben, Szt-Erzsébet, Fogaras, Brassó, Prázsmár, Kőhalom, Segesvár. VI. Resicza. VII. Mrzla-Vodica.

v. *flavescens* Schilsky. — I. Péczel, Isaszeg.

117. *cinctus* Payk. — I. Hagymádfalva. III. Mons Sztrazsov (Com. Trencsén). V. Deés. VII. Fužine.

118. *guttatus* Germ. — IV. Mons Pietrosz, Csernahóra, Mons Pop-Iván. V. Montes Radnaenses, Præsbe, Montes Kerczenses, Árpásenses et Fogarasenses. VI. Korniaréva.

Dima Esch.

119. *elateroides* Charp. — V. K.-Disznód, Kercz. VI. N.-Bogsán, Stájerlak, Ferenczfalva, Herkulesfürdő. VII. Fužine.

120. *dalmatina* Küst. — VII. Fužine, Vagan.

Steatoderus Esch.

121. *ferrugineus* L. — I. Kalocsa, Nagy-Várad. II. Kőszeg, Pécs. III. Tavarnok, Beczkó. IV. Kassa, Sátor-Alja-Ujhely, Tolcsva, Olyka. M.-Sziget. V. Zilah, Nagy-Szeben, K.-Torony, Montes Kerczenses, Brassó. VI. Lugos.

Agriotes Esch.

122. *aterrimus* L. — V. N.-Csür, Brassó.

123. *turcicus* Cand. — VII. Velebit (sec. J. Frivaldszky).

124. *pilosus* Pz. — Frequens.

125. *Laichartingi* Grdl. — I. Kalocsa. (Leg. F. Speiser, 349, p. 34.)

126. *ustulatus* Schall. — Communis.

127. *sputator* L. — Ut prior.

128. *lineatus* L. — Creber.

v. *proximus* Schwarz. — Hungaria. (Auctor, 341, p. 112.)

129. *obscurus* L. — In toto regno occurrit.

130. *sordidus* Ill. — V. Montes Kerczenses. (Bielz, 27, p. 74.)

131. *modestus* Kiesenw.— I. Kalocsa. II. Lacus Fertő.

132. *sobrinus* Kiesenw. — I. Budapest. V. Szelindek, Brassó. VI. Oravicza, Herkulesfürdő.

133. *pallidulus* Ill. — I. Budapest. III. N.-Lipcse, Koritnyicza, Deménfalu. IV. N.-Mihály, A.-Bereczki. V. Montes Cibinenses, Brassó (Mons Czenk).

134. *gallicus* Lac. — V. Segesvár, Döblény, F.-Tömös.

Dolopius Esch.

135. *marginatus* L. — Frequens.

Sericus Esch.

136. *brunneus* L. — I. Montes Biharenses. III. Trencsén, Koritnyicza, Javorina. IV. Bártfa. V. Montes Radnaenses, Præsbe, N.-Csür, Montes Kerczenses. VI. Ferenczfalva, Herkulesfürdő, Korniaréva.

137. *subaeneus* Redtb. — III. Zsolna, Koritnyicza. V. Segesvár.

Synaptus Esch.

138. *filiformis* F. — Frequens.
v. *unguliserris* Gyll. — I. N.-Várad. II. Ács. III. Beszterczebánya. V. Brassó. VI. Grebenácz.

Silesis Cand.

139. *terminatus* Er. — VI. Resicza, Oravicza, Báziás, Jeselnicza, Herkulesfürdő.

Adrastus Esch.

140. *limbatus* F. — Frequens.
141. *axillaris* Er. — III. Montes Klakenses (Com. Trencsén), Koritnyicza, Tátrafüred. IV. Szádellő, Áj, Bártfa, Jászó, Homonna, Tokaj, Mons Hoverla. V. Vöröstorony, Bodza, Segesvár.
142. *pallens* F. — I. Budapest, Kalocsa. IV. Szádellő, Áj, Vinna. V. Montes Cibinenses, Fogaras, Kőhalom, Bodza, Segesvár. VI. Resicza, Jeselnicza.
143. *lacertosus* Er. — III. Budatin, Tátrafüred. IV. Mons Hoverla. V. Montes Kerczenses, Bodza. VI. Herkulesfürdő.
144. *nanus* Hbst. — I. Budapest, Kalocsa. IV. Bártfa, Huszt. V. Ad balneum Gyógy, Nagy-Szeben, Montes Kerczenses, Segesvár. VI. Krassova, Herkulesfürdő.
145. *humilis* Er. — I. Budapest. II. Pécs. III. Szliács. IV. S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Zombor, Erdőbénye, Szőllőske. V. Ad balneum Gyógy, Szelindek, N.-Csür, Segesvár. VI. Csenej, Resicza, Oravicza, Herkulesfürdő.

Denticollis Pill.

146. *rubens* Pill. — I. Parád, Remecz. III. Beszterczebánya, Hermánd, Mons K.-Kriván, Oravicz. IV. Bártfa, Mons Vihorlat, O.-Ruszka, Nagy-Bocskó. V. Montes Radnaenses, Cibinenses, Kerczenses et Fogarasenses, Brassó, Montes ad fluv. Maros. VI. Ferenczfalva, Herkulesfürdő. VII. Mons Bukova-Kusa.
147. *linearis* L. — In regionibus montanis frequens.

Fam. DASCILLIDAE.

Dascillus Latr.

1. *cervinus* L. — In reg. montanis occurrit.

Helodes Latr.

2. *minuta* L. — I. Budapest, Hajós, Nagy-Várad. II. Zircz, Pécs. III. Beszterczebánya, Trencsén, Tátrafüred. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Szomotor, Velejte, Montes Simonka, Szinnaikő et Rabaszkala. VI. Herkulesfürdő.
3. *flavicollis* Kiesw. — I. Budapest. II. Z.-Tapolcza. III. Beszterczebánya, Hermánd, Vallis Vrátna. IV. Mons Menczul.
4. *Hausmanni* Gredl. — II. Zircz, N.-Vázsony. IV. Bártfa.
5. *marginata* F. — III. Deménfalu. (Legit E. Frivaldszky.)

Microcara Thoms.

6. *testacea* L. — I. Hajós. II. Zircz, Pécs. IV. S.-A.-Ujhely. V. K.-Disznód, Mons Keresztényhavas, Sz.-Régen.

Cyphon Payk.

7. *variabilis* Thunb. — Communis.
8. *pallidulus* Boh. — I. Hajós. (Legit F. Speiser, 349, p. 34.)
9. *padi* L. — I. Budapest, Péczel, Dabas, Kalocsa, Nyiregyháza, N.-Várad. IV. Körtvélyes, Sátoralja-Ujhely, Bély. V. Brassó, Gyeke, M.-Záh.
10. *coarctatus* Payk. — Frequens.
v. *palustris* Thoms. — Simul cum stirpe.
11. *Paykulli* Guér. (*nitidulus* Thoms.) — II. Zircz. IV. Jászó, Áj. V. Ad balneum Valea-Vinului.

Prionocyphon Redtb.

12. *serricornis* Müll. — I. Budapest, Péczel. II. Zircz, Pécs. III. Vallis Vrátna, Zlieho. V. Brassó (Mons Czenk). VI. Herkulesfürdő.

Hydrocyphon Redtb.

13. *deflexicollis* Müll. — I. Budapest. III. Vallis Vrátna, ad ripam fluv. Árva. IV. Szinna.

Scirtes Ill.

14. *hemisphaericus* L. — I. Péczel. II. Zircz, Kőszeg, Pécs. III. Beszterczebánya, Hermánd, Trencsén. IV. Torna, Komjáti. V. Hátszeg, N.-Szeben, N.-Csür.
15. *orbicularis* Panz. — In regione VI. (Legit E. Frivaldszky).

Eubria Latr.

16. *palustris* Germ. — I. Péczel, Lunka. II. Zircz. III. Trencsén. IV. Bártfa, Luhi. V. N.-Szeben, N.-Csür, Előpatak, Medgyes, Montes Bodzaenses. VI. Herkulesfürdő.

Fam. CANTHARIDAE.

Homalisus Geoffr.

1. *Fontisbellaquei* Fourc. (*suturalis* Ol.) — In regionibus montanis frequens.

Dictyopterus Muls.

2. *Aurora* Hbst. — III. Trencsén, Tátrafüred. IV. Bártfa, Mons Rabaszkala, N.-Mihály. V. Ad balneum Valea-Vinului, Montes Cibinenses et Kerczenses, Brassó, Mons Kereszténvhavas, Gy.-Tölgyes. VII. Velebit.

3. *rubens* Gyll. — III. Tátrafüred. IV. Bártfa, N.-Bocskó. V. Vöröstorony, N.-Csür, Brassó, Mons Kereszténvhavas. VI. Mons Domoglet. VII. Mons Bukova-Kusa.

Pyropterus Muls.

4. *affinis* Payk. — II. Montes Bakonyenses. III. Tátrafüred. IV. Mons Hoverla. V. Montes ad Kovászna (Szélkapu).

Platycis Thoms.

5. *Cosnardi* Chevr. — II. Z.-Tapolcza, Pécs. IV. Bártfa, Mons Vihorlat. V. Montes Cibinenses et Radnaenses. VI. Herkulesfürdő.

6. *minuta* F. — III. Vallis Bisztra (Com. Árva), Tátrafüred. V. Bisztratelep, Mons Szurul, Borszék. VI. Mons Domoglet, Korniaréva.

Lygistopterus Muls.

7. *sanguineus* L. — In regionibus montanis frequens.

Lampyris Geoffr.

8. *noctiluca* L. — Communis.

9. *Zenkeri* Germ. — VIII. Buccari, Novi, Crkvenica, Porto-Re, Carlopago.

Lamprohiza Motsch.

10. *splendidula* L. — Frequens.

Phosphaenus Lap.

11. *hemipterus* Goeze. — I. Hagymádfalva. II. Keszthely. III. Trencsén, Tátrafüred. IV. Bártfa, Radvány, S.-A.-Ujhely, Bánszka, Mons Vihorlat, V. Montes Cibinenses et Kerczenses, Sz.-Régen. VI. Oravicza, Herkulesfürdő.

Luciola Lap.

12. *mingrelica* Mén. (*mehadiensis* Fald.) — V. Hátszeg, Mons Tészla, Brassó. VI. Fehértemplom, Oravicza, Dognácska, Ferenczfalva, Szt-Heléna, Herkulesfürdő. VII. Vrdnik.

v. *caucasica* Motsch. — Hungaria mer. (Olivier, 763, p. 50.)

Podabrus Westw.

13. *alpinus* Payk. — In regionibus alpinis et subalpinis occurrit.

v. *annulatus* Fisch. — I. Remecz, Alpes Bohodej. III. Deménfalu, Tátrafüred.

v. *lateralis* Er. — III. Zólyom. V. Montes Kerczenses.

Cantharis L.

14. *abdominalis* F. — III. Vallis Vrátna, Lőcse. IV. Bártfa.

v. *cyanipennis* Bach. — III. Hermánd. V. Brassó, Előpatak.

v. *occipitalis* Rosenh. — VI. Comitatus Krassó-Szörény. (Legit E. Frivaldszky.)

15. *violacea* Payk. — I. Remecz, Alpes Bohodej. III. Tátrafüred, Lubló. IV. Mons Hoverla. V. Mons Kereszténvhavas, Bodza, Gyulafalva.

16. *Erichsoni* Bach. — I. Remecz, Alpes Bohodej. III. Beszterczebánya, Rózsahegy, Lucski, Koritnyicza, F.-Bocza, Tátrafüred. IV. Szádellő, Áj, Vallis Lazescsina. V. Montes Kerczenses. VI. Mons Domoglet, Korniaréva.

17. *fusca* L. — Communis.

18. *rustica* F. — III. Zólyom, Hermánd, Vallis Vrátna, Mons K.-Kriván, Tátrafüred. V. Montes Retyezát et Kerczenses. VI. Herkulesfürdő, Korniaréva.

19. *tristis* F. — III. Zólyom, Hermánd, Vallis Vrátna, Mons K.-Kriván, Tátrafüred. V. Montes Retyezát, F.-Kercz. VI. Herkulesfürdő, Korniaréva.

20. *obscura* L. — Communis.

21. *pulicaria* F. — Frequens.

22. *fibulata* Märk. — III. Tátrafüred. (Legit E. Frivaldszky.)

23. *nigricans* Müll. — I. Budapest, Mons Pilis, Remecz, Debreczen. III. Beszterczebánya, Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, S.-Patak, Valles Fajna et Suliguli. V. Frequens. VI. Mons Domoglet.

24. *hospes* Rosh. — I. Budapest, Parád, Péczel. III. Koritnyicza. IV. Bártfa. VI. Oravicza.

25. *pellucida* F. — I. Debreczen. III. K.-Tapolcsány, Koritnyicza. IV. Montes Simonka et Vihorlat. V. Pele, Valkó, Hátszeg, Sz.-Ujfalu, Fogaras, Héviz, Brassó. VI. Grebenácz, Mons Domoglet.

26. *livida* L. — Communis.

v. *scapularis* Redt. — V. Prázsmár. (Bielz, 27, pag. 75.)

v. *rufipes* Herbst. — Simul cum stirpe.

27. *longicollis* Kiesw. — II. Felsőlő. III. Beszterczebánya. IV. N.-Bocskó. V. Montes Kerczenses. VI. Báziás, Ferenczfalva, Mons Domoglet.

28. *assimilis* Payk. — II. Z.-Tapolcza, Pécs. III. Vallis Vrátna. IV. Bártfa, Gáboltó, M.-Laborcz, Runyina. V. Montes Radnaenses: Valea-Vinului, Remete, Praesbe, Mons Kereszténvhavas, Hoszszufalu, Segesvár.

29. *sudetica* Letz. — IV. Áj, Mons Vihorlat. V. Montes Kerczenses et Fogarasenses. VI. Báziás, N.-Bogsán, Resicza, Uj-Moldova, Korniaréva.
30. *rufa* L. — I. Kecskemét, Kalocsa, N.-Várad. III. Trencsén, Tátrafüred. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely. V. Nagy-Szeben, Montes Kerczenses, Héviz, Brassó.
v. *pallida* Goeze. — I. Remecz. V. Fogaras.
31. *pagana* Rosh. — VI. Oravicza (Auctor, 328, p. 20.)
32. *fulvicollis* F. — Frequens.
33. *bicolor* Hbst. — I. Péczel, N.-Várad. II. D.-Örs, Zircz. III. Trencsén. IV. Bártfa, Imreg, Varannó, Szobráncz. V. Fogaras, Brassó, Medgyes, Borszék.
34. *paludosa* Fall. —V. Kolozsvár. (Bielz, 27, p. 76.)
35. *lateralis* L. — Frequens.

Metacantharis Fauv.

36. *discoidea* Ahr. — I. Budapest. II. Pécs. III. K.-Tapolcsány, Koritnyicza, Vallis Bisztra (Com. Árva), Tátrafüred. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, Czéke. V. N.-Szeben, Szelindek, Brassó.
37. *haemorrhoidalis* F. — Frequens.

Rhagonycha Esch.

38. *pilosa* Payk. — I. Parád, Montes Biharenses. III. Koritnyicza, Vallis Bisztra, Tátrafüred. IV. Bártfa, Montes Simonka, Vihorlat et Rabaszkala, O.-Ruszka, N.-Bocskó, Mons Pietrosz. V. Bogdánháza, Brassó, Deés. VI. Mons Domoglet, Korniaréva.
39. *prolixa* Märk. — I. Remecz. IV. Montes Lungacsász, Turkul et Breczkul. V. Montes Sebesenses, Mons Keresztényhavas, Brassó, Deés.
40. *rufotestacea* Letz. — V. Ad balneum Valea-Vinului, Montes Bodzaenses.
41. *signata* Germ. — VII. Mons Bukova-Kusa. VIII. Fiume.
42. *translucida* Kryn. — III. Mons K.-Kriván, Koritnyicza, Tátrafüred. IV. Szádellő, Bártfa, Nagy-Bocskó. V. Segesvár.
43. *nigriceps* Waltl. — I. Montes Biharenses. IV. Ránk, Bártfa, Montes Rabaszkala et Vihorlat, O.-Ruszka, Mons Simonka, V. Montes Radnaenses et Cibinenses, K.-Disznód, Montes Kerczenses. VI. Montes Szemenik et Domoglet.
44. *fuscicornis* Ol. — I. N.-Várad, Belényes. IV. S.-A.-Ujhely, Czéke.
v. *Märkeli* Kiesw. — III. Zsolna, Trencsén.
45. *fulva* Scop. — Communis.
v. *usta* Gemm. — III. Beszterczebánya, Hermánd, Vallis Vrátna, Koritnyicza. V. Segesvár.
46. *opaca* Muls. — IV. S.-A.-Ujhely, Sáros-Patak, Mons Vihorlat. V. Brassó.
47. *maculicollis* Märk. — IV. Mons Vihorlat. V. Sz.-Ujvár, Hátszeg, N.-Szeben, K.-Disznód. VI. Alpes Krassó-Szörényenses.
48. *testacea* L. — Frequens.
49. *limbata* Thoms. — V. Brassó: Csigahegy. (Legit L. Méhely, 246, p. 277.)
50. *femoralis* Brull. — I. Peszér, Kalocsa. V. Montes Radnaenses et Kerczenses, Mons Keresztényhavas, Brassó, Segesvár. VI. Mons Domoglet. VII. Našice. VIII. Fiume.
v. *nigripes* Redtb. — I. Remecz. III. Hermánd, Vallis Vrátna, Tátrafüred. IV. Luhi, Vallis Fajna, Montes Breczkul et Pop-Iván. V. Montes Radnaenses: Valea-Vinului, Montes Cibinenses, Præsbe, Montes Kerczenses, Brassó. VI. Ferenczfalva, Mons Domoglet, Korniaréva.
51. *pallipes* F. — Frequens.
v. *fugax* Mannh. — I. Peszér. III. Tátrafüred. IV. S.-A.-Ujhely, Lelesz, Velejte, M.-Sziget.
52. *straminea* Kiesw. — V. Mons Sánta (Montes Cibinenses), Szelindek.
53. *banatica* Rosh. — V. Déva, N.-Szeben, Montes Kerczenses, Brassó, Medgyes, Borszék. VI. Janova, Rékas, Báziás, Resicza, Herkulesfürdő.
54. *viduata* Küst. — V. N.-Szeben. VI. Mons Domoglet.
55. *rorida* Kiesw. — I. Montes Biharenses. III. Tátrafüred. V. N.-Szeben, Brassó (Mons Czenk). VI. Herkulesfürdő, Rumunyest.
56. *carpathia* Ganglb. — IV. Cserna-Hóra. V. Montes Radnaenses (Auctor, 399, p. 183).
57. *elongata* Fall. — I. Szőlős, Szt-Márton. III. Hermánd, Trencsén. IV. Luhi. V. Hátszeg, Montes Cibinenses, N.-Szeben, Fogaras, Brassó, Segesvár.
58. *atra* L. — I. Budapest, Hajós, Szőlős. II. Keszthely, Pécs. III. Tátrafüred. IV. Bártfa, Tokaj. V. Frequens. VI. Janova, Rékas, Herkulesfürdő.

Pygidia Muls.

59. *distinguenda* Baudi (*laricicola* Kiesw.) — IV. Rahó (sec. J. Frivaldszky).
60. *denticollis* Schumm. — III. Beszterczebánya, Hermánd, Mons K.-Kriván, Koritnyicza. IV. Montes Lungacsász et Breczkul. V. Montes Biharenses, Kolozsvár, N.-Szeben. Montes Kerczenses.

Silis Latr.

61. *nitidula* F. — I. Budapest, Mons Pilis, Parád, Hajós, N.-Várad, Fonácza. II. Z.-Tapolcza. III. Vallis Vrátna, Tátrafüred. IV. Bártfa, Velejte,

Mons Vihorlat, N.-Bocskó. V. Frequens. VI. Mons Domoglet.

62. *ruficollis* F. — I. Peszér. V. N.-Csür.

Malchinus Kiesw.

63. *demissus* Kiesw. — I. Budapest. V. Teste Seidlitz.)

64. *sinuatocollis* Kiesw. — I. N.-Várad. II. Pécs. V. N.-Szeben, Montes Kerczenses. VI. Lugos, Jeselnicza, Mons Domoglet.

65. *nigrinus* Schauf. — IV. Mons Zsihovecz. V. Brassó.

Malthinus Latr.

66. *biguttulus* Payk. — III. Beszterczebánya, Hermánd, Trencsén, Tátrafüred. IV. Bártfa, Mons Gutin. V. Borszék. VI. Oravicza, Mons Szemenik, Herkulesfürdő.

67. *punctatus* Fourc. — Frequens.

68. *seriepunctatus* Kiesenw. — II. Kőszeg. VI. Jeselnicza, Herkulesfürdő.

69. *fasciatus* Ol. — I. Budapest, N.-Várad. IV. Bártfa, Mons Vihorlat. V. K.-Disznód, Montes Kerczenses. VI. Temesvár, Herkulesfürdő.

70. *balteatus* Suffr. — IV. Bártfa. VI. Herkulesfürdő.

71. *glabellus* Kiesw. — I. Budapest. IV. Bártfa. V. N.-Szeben. VI. Herkulesfürdő. VII. Eszék.

72. *frontalis* Marsh. — I. N.-Várad. V. Szent-Erzsébet, Volkány, Montes Kerczenses, Brassó.

Malthodes Kiesw.

73. *marginatus* Latr. — I. Budapest, Parád, Kalocsa, N.-Várad, Élesd. II. Pécs. III. Tavarnok. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj, N.-Bocskó. V. Nagy-Szeben, N.-Csür, Sz.-Ujfalu. VI. Resicza.

74. *guttifer* Kiesw. — III. Trencsén, Csetnek. IV. Montes Vihorlat et Gutin. VI. Herkulesfürdő.

75. *mysticus* Kiesw. — I. Kalota. III. Trencsén, Deménfalu. IV. Homonna, Mons Hoverla. VI. Ferenczfalva, Oravicza.

76. *trifurcatus* Kiesw. — III. Trencsén. V. Nagy-Szeben, Fogaras.

77. *brevicollis* Payk. — I. Budapest. III. Deménfalu, Putnok. IV. Tokaj. V. Montes Kerczenses. VI. Oravicza, Herkulesfürdő. VII. Diakovár.

78. *spretus* Kiesw. — I. N.-Várad. IV. S.-A.-Ujhely. VI. Ferenczfalva, Oravicza. VII. Fužine. VIII. Fiume.

79. *pulicarius* Redtb. — I. Budapest, Kalocsa. II. Ács. III. Trencsén. IV. K.-Azar. V. N.-Csür.

80. *misellus* Kiesw. — I. Montes Biharenses. III. Trencsén, Koritnyicza, Tátrafüred. V. N.-Csür. VI. Herkulesfürdő.

81. *maurus* Lap. — I. Budapest. IV. M.-Sziget. V. N.-Szeben.

82. *fibulatus* Kiesw. — V. Brassó (Czenk).

83. *hexacanthus* Kiesw. — III. Tátrafüred. VI. Ferenczfalva, Mons Domoglet.

84. *fundator* Weise. — In regione V. (Auctor, 385, p. 56.)

85. *pellucidus* Kiesw. — III. Trencsén, Tátrafüred. IV. Bártfa.

86. *flavoguttatus* Kiesw. — I. Montes Biharenses. II. Pécs. III. Koritnyicza, Tátrafüred. IV. Bártfa, Montes Zsihovecz et Hoverla. VI. Herkulesfürdő, Rumunyest.

87. *dispar* Germ. — II. Pécs. III. Beszterczebánya, Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Imreg, Parnó, Vallis Fajna. V. N.-Szeben, N.-Csür, Montes Kerczenses et Rozsnyóenses VI. Herkulesfürdő.

88. *ruficollis* Latr. — I. Budapest, Csongrád. IV. A.-Bereczki. V. Kolozsvár. VII. Eszék.

89. *lautus* Kiesw. — Hungaria. (Auctor, 197, 1874, p. 48.)

90. *debilis* Kiesw. — V. Montes Bodzaenses. (Leg. L. Méhely, 247, p. 190.)

prodigiosus Kiesw. — Hungaria. (Auctor, 197, 1872, p. 392.) *

Drilus Ol.

91. *concolor* Ahr. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. Z.-Tapolcza, Pécs. III. V.-Mikola, Tavarnok. V. Zilah, N.-Csür, Brassó. VI. Rumunyest. VIII. Fiume.

Atelestus Er.

92. *brevipennis* Lap. — VIII. Fiume. (Leg. L. Biró.)

Troglops Er.

93. *albicans* L. — I. Budapest, N.-Várad. II. Kőszeg. III. Trencsén. IV. Bártfa, Erdőbénye, Szinna, Ladomér. V. Frequens. VI. Jeselnicza, Herkulesfürdő.

Charopus Er.

94. *concolor* F. — I. Budapest, Kalocsa. II. Pécs. III. Trencsén. IV. N.-Mihály, Varannó. V. Frequens. VI. Pancsova, Krassova, Báziás, Jeselnicza, Herkulesfürdő.

95. *docilis* Kiesw. — I. Budapest. (Leg. J. Frivaldszky.)

96. *pallipes* Ol. — V. Hátszeg, N.-Szeben, Holczmány, Előpatak, Sz.-Régen.

97. *plumbeomicans* Goeze (*flavipes* Payk.) — I. Besnyő, Szeged. III. Trencsén. IV. Bártfa, Mons

* Secundum J. Frivaldszky Asiam minorem et non Hungariam inhabitat.

Vihorlat,, Ladomér, Mező.-Laborcz. V. Montes Biharenses, Kolozsvár, Fogaras.

98. *thoracicus* Moraw. — I. Budapest. (Leg. J. Frivaldszky.)

Hypebaeus Kiesenw.

99. *flavipes* F. — V. Sz.-Sebes, Bárczaság, Medgyes. VI. Jeselnicza, Herkulesfürdő. VII. Diakovár.

Ebaeus Er.

100. *coerulescens* Er. — V. Nagy-Csür. VI. Resicza, Oravicza, Dognácska, Jeselnicza, Herkulesfürdő.

101. *mediterraneus* Ab. — V. Rozsnyó. (Leg. L. Méhely, 247, p. 190.)

102. *appendiculatus* Er. — I. Budapest, Kalocsa. II. Pécs. III. Szliács, Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely. V. N.-Szeben, Sz.-Ujfalu, Szt-Erzsébet, Sz.-Régen. VI. Csenej, Oravicza.

103. *ater* Kiesw. — I. Budapest, Szeged. IV. Szomotor, Szőllőske. VI. Báziás, Herkulesfürdő.

104. *pediculatius* Schrank. — Frequens.

105. *flavicornis* Er. — I. Budapest. II. Pécs. III. Tavarnok. V. Szt-Erzsébet, Előpatak. VI. Báziás, Oravicza, Jeselnicza, Herkulesfürdő.

Antholinus Rey.

106. *analis* Pz. — I. Budapest. II. Pécs. IV. Sátor-Alja-Ujhely, Tolcsva. V. Frequens. VI. Jeselnicza, Herkulesfürdő. VIII. Fiume.

Sphinginus Rey.

107. *coarctatus* Er. — I. Budapest, Péczel. V. Brassó, Segesvár.

Attalus Er.

108. *dalmatinus* Er. — VIII. Fiume. (Leg. L. Biró.)

Axinotarsus Motsch.

109. *ruficollis* Ol. — I. Budapest, Kalocsa, Debreczen, Nagy-Várad, Rév, Beél. II. Pécs. V. Sz.-Ujfalu. VI. Resicza, Krassova. VII. Eszék.

110. *pulicarius* F. — Frequens.

111. *marginalis* Lap. — Ut prior.

Cerapheles Rey.

112. *ruficollis* F. — I. Budapest, Dabas, Peszér. II. Dinnyés. V. Szt-Gothárd.

Anthocomus Er.

113. *rufus* Herbst. — I. Budapest. IV. H.-Németi. V. Szt-Erzsébet, N.-Csür.

114. *equestris* F. — Communis.

115. *fasciatus* L. — I. Budapest, Kalocsa. II. Pécs. III. Trencsén. V. Frequens. VI. Oravicza, Kazán, Herkulesfürdő, Rumunyest. VII. Eszék.

Malachius F.

116. *rufus* Ol.. — I. Debreczen. IV. Tárkány. VI. Herkulesfürdő.

117. *scutellaris* Er. — I. Nagy-Várad. IV. Bártfa, N.-Bocskó. V. Montes Biharenses, N.-Szeben, Segesvár, Kőhalom.

118. *Mariae* Abeille.—Hungaria. (Auctor, I, p. 261.)

119. *rubidus* Er. — II. Z.-Tapolcza. V. K.-Talmács.

120. *aeneus* L. — Communis.

121. *marginellus* F. — Ut prior.

122. *dilaticornis* Germ. — I. N.-Várad. V. N.-Ápold, Szt-Erzsébet, Brassó, Fogaras.

123. *bipustulatus* L. — Frequens.

124. *parilis* Er.— Etiam Hungariam incolit. (Peyron, 274, p. 107.)

125. *elegans* Geoffr. — I. Kalocsa. II. Szegzárd. V. Peér, Nagy-Szeben, Szt-Erzsébet, Vöröstorony. VI. Fehértemplom, Oravicza, Herkulesfürdő.

126. *falcifer* Abeille. — V. Rozsnyó, A.-Tömös. (Leg. L. Méhely, 247, p. 190.)

127. *geniculatus* Germ. — Frequens.

v *ambiguus* Peyr. — Hungaria. (Abeille, 1, p. 262.)

128. *affinis* Mén. — I. Budapest. V. Hátszeg, Oláhfalu. VI. Jeselnicza, Herkulesfürdő.

129. *viridis* F. — Frequens.

130. *spinipennis* Germ. — V. Hátszeg, Montes Retyezát, N.-Szeben, Fogaras. VI. Jeselnicza.

131. *spinosus* Er. — V. Brassó. VI. Báziás, Herkulesfürdő.

132. *inornatus* Küst. — Hungaria. (Abeille, 1, p. 263.)

Apalochrus Er.

133. *femoralis* Er. — I. Budapest, Kalocsa, Szeged. III. Pozsony.

Henicopus Steph.

134. *pilosus* Scop. — Frequens.

Dasytes Payk.

135. *alpigradus* Kiesw.—I. N.-Várad. III. Beszterczebánya, Hermánd, Mons K.-Kriván, Koritnyicza, Mons Chocs, Tátrafüred. IV. Montes Simonka et Hoverla. V. N.-Szeben, Petrozsény, Brassó. VII. Risnjak.

136. *dalmatinus* Baudi. — I. Kalocsa. (Leg. F. Speiser.)

137. *niger* L. — Communis.

v. *montanus* Gredl. — I. Montes Biharenses. (Frivaldszky, 118, p. 513.)

138. *buphthalmus* Baudi. — II. Pécs (sec. J. Frivaldszky.)

139. *obscurus* Gyll. — In regionibus montanis frequens.

140. *rugipennis* Thoms. — V. Tömös, Bálványos. (Leg. L. Méhely, 247, p. 190.)

141. *coeruleus* Deg. — Ut prior.

142. *flavipes* (Ol.) Muls. — I. Budapest. VI. Janova, Herkulesfürdő. VII. Fužine.

143. *plumbaeus* Müll. — Frequens.

144. *aerosus* Kiesw. — I. Budapest, Szeged. II. Pécs. V. Brassó.

145. *aeneiventris* Küst. — I. Kalocsa. II. Lacus Fertő. VII. Fužine. VIII. Fiume.

146. *fusculus* Ill. — I. Nagy-Várad. II. Z.-Tapolcza. III. Trencsén. V. N.-Szeben, Brassó. VI. Resicza, Herkulesfürdő.

147. *subaeneus* Schönh. — I. Budapest. V. Szelindek, Fenyőfalva, Montes Kerczenses, Fogaras, Gyeke. VIII. Carlopago.

Psilothrix Redtb.

148. *femoralis* Moraw. — I. Budapest. VI. Grebenácz.

Dolichosoma Steph.

149. *lineare* Rossi. — I. Budapest, Mons Pilis, Péczel, Kecskemét, Szeged, N.-Várad. II. Apáti, Boglár. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Sáros-Patak, Szomotor. V. Frequens. VI. Fehértemplom, Báziás, Resicza, Oravicza, Herkulesfürdő.

Haplocnemus Steph.

150. *pulverulentus* Küst. — VI. Csenej, Orsova, Herkulesfürdő. VII. Lipik.

151. *tarsalis* Sahlb. — I. Montes Biharenses. VI. Jeselnicza, Herkulesfürdő. VIII. Buccari.

152. *impressus* Marsh. — I. Budapest, Kalocsa, N.-Várad. II. Pécs. III. Trencsén. IV. Bély. V. N.-Szeben, Mons Czenk. VI. Resicza, Herkules-Fürdő.

v. *serratus* Redtb. — I. Budapest, Péczel, Nagy-Várad.

153. *nigricornis* F. — I. Budapest, Kalocsa. III. Trencsén. VI. Herkulesfürdő, Korniaréva. VIII. Fiume.

154. *chalconatus* Germ. — VII. Velebit. VIII. Fiume.

155. *basalis* Küst. — I. Kalocsa. VII. Com. Krassó-Szörény.

156. *alpestris* Kiesw. — III. Lacus ad Felka. (Legit J. Weise, 392, p. 247.)

157. *serbicus* Kiesw. — VI. Herkulesfürdő (sec. J. Frivaldszky).

Trichoceble Thoms.

158. *floralis* Ol. — I. Budapest, Hajós. III. Tátrafüred. IV. S.-A.-Ujhely, Cserna-Hóra. V. Nagy-Ápold, Segesvár, Borszék.

Dasytiscus Kiesenw.

159. *rufitarsis* Luc. — V. N.-Csür, Szelindek.

Cerallus Duval.

160. *rubidus* Gyll. — I. Budapest. VI. Mons Domoglet.

Danacaea Lap.

161. *pallipes* Pz. — Frequens.

162. *nigritarsis* Küst. — I. Budapest, Hajós. II. Z.-Tapolcza, Pécs. IV. M.-Sziget. V. N.-Szeben, N.-Csür, Szelindek, Fogaras, Kőhalom, M.-Záh. VI. Herkulesfürdő. VII. Velebit.

163. *cervina* Küst. — III. Deménfalu (sec. J. Frivaldszky).

164. *marginata* Küst. — I. Budapest, N.-Várad. VI. Oravicza, Jeselnicza, Herkulesfürdő.

165. *macrocephala* Schauf. — VIII. Zengg. (Proch., 404, p. 22.)

166. *serbica* Kiesw. — I. Budapest, Kalocsa, Szeged. II. Pécs. III. Tavarnok. V. N.-Szeben, Gyeke. VI. Báziás, Ferenczfalva, Herkulesfürdő.

167. *D. Reyi* Tourn. — Habitat etiam in Hungaria. (Procházka, 404, p. 27.)

Phloeophilus Steph.

168. *Edwardsi* Steph. — I. Budapest. III. Tavarnok. VI. Resicza.

Fam. CLERIDAE.

Denops Steven.

1. *albofasciata* Charp. — I. Peszér. III. Jobbágyi. V. N.-Szeben, Szt-Erzsébet, N.-Csür.

Tillus Oliv.

2. *elongatus* L. — Frequens.

3. *unifasciatus* F. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Debreczen. II. D.-Örs, Pécs. III. V.-Mikola. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Velejte, Varannó, M.-Sziget. V. Frequens. VI. Herkulesfürdő. VII. Diakovár.

4. *pallidipennis* Bielz. — V. N.-Sink, A.-Szombat, Segesvár, Montes Csikenses.

Opilo Latr.

5. *mollis* L. — Frequens.

6. *domesticus* Strm. — I. Budapest. III. Beszterczebánya, Hermánd. V. Fogaras, Brassó, Mons Keresztényhavas, Hosszufalu.
7. *pallidus* Ol. — I. Budapest, Dabas, Kalocsa. II. Pécs. VI. Ulma, Grebenácz, Herkulesfürdő.
8. *taeniatus* Klug. — I. Kalocsa, Hajós.

Clerus Geoffr.

9. *mutillarius* F. — Frequens.
10. *formicarius* L. — Ut prior.
11. *rufipes* Brahm v. *femoralis* Zett. (*pectoralis* Fuss). — IV. Mons Zsihovecz (Com. Marmaros). V. Montes Czódenses, Præsbe, Montes Kerczenses.

Tarsostenus Spin.

12. *univittatus* Rossi. — V. Szt-Erzsébet, Sz.-Régen. VI. Herkulesfürdő.

Trichodes Herbst.

13. *apiarius* L. — Communis.
v. *subtrifasciatus* Spin. — I. Rákos-Keresztur, Péczel, Peszér. VI. Grebenácz, Herkulesfürdő.
14. *favarius* Ill. — I. Budapest, Péczel. II. Keszthely, Kőszeg. V. Tasnád, Zilah, Sólyomkő, Montes Csikenses. VI. Orsova. VII. Rakovica.
15. *irkutensis* Laxm. — IV. Mons Zsihovecz. V. Montes Sebesenses et Gyergyóenses, Radna.

Dermestoides Schäffer.

16. *sanguinicollis* F. — IV. Tolcsva, Vinna. V. Tasnád, Kolozsvár, Gyalu, N.-Szeben, Fogaras, Brassó, Medgyes. VI. Herkulesfürdő, Orsova. VII. Našice.

Corynetes Hbst.

17. *coeruleus* Deg. — III. Trencsén. IV. Sátoralja-Ujhely, Tolcsva, Olyka, Mons Vihorlat. V. N.-Csür, Veresmart, Brassó, Mons Keresztényhavas.
18. *ruficornis* Strm. — I. Kalocsa. II. Pécs. III. Trencsén. IV. N.-Bocskó. V. N.-Selyk, Héviz, Medgyes, Segesvár. VI. Herkulesfürdő. VII. Eszék.

Necrobia Latr.

19. *ruficollis* F. — I. Budapest. III. Budatin. V. Teste Bielz. VIII. Carlopago.
20. *violacea* L. — Communis.
21. *rufipes* Deg. — I. Budapest, Kalocsa. II. Pécs. V. Kolozsvár, Szász-Sebes. VI. Grebenácz, Resicza, Oravicza, Dognácska, Herkulesfürdő. VII. Našice.
Konowi Hoffm. — VIII. Fiume. (Auctor, 173, p. 96; sec. Reitter species importata.)

Opetiopalpus Spin.

22. *scutellaris* Panz. — I. Budapest, Péczel, Isaszeg Kecskemét, Kalocsa, Debreczen, Hadház. III. Beczkó. IV. Szinna, Szerencs, Ungvár. V. Nagy-Csür, Deés. VI. Jeselnicza, Herkulesfürdő. VIII. Fiume.

Elateroides Schäff.

23. *dermestoides* L. — I. Parád, Montes Biharenses. II. Bakony: Feketehegy, Sopron, Pécs. III. Pozsony, Beszterczebánya, Rozsnyó. IV. Szádelló, Bártfa, Tolcsva, N.-Bocskó. V. Frequens. VI. Resicza, Herkulesfürdő. VII. Fužine.
v. *morio* F. — V. Brassó. (Leg. L. Méhely, 247, p. 190.)

Lymexylon F.

24. *navale* L. — IV. Bánszka. V. N.-Szeben, Kis-Disznód, Vallis Czód, N.-Sink, Brassó, Segesvár. VI. Báziás. VII. Diakovár.

Fam. BRUCHIDAE.

Gibbium Scop.

1. *psylloides* Czemp. — I. Budapest. II. Sopron. V. Kolozsvár, Vizakna, N.-Szeben, Szt-Erzsébet.

Mezium Curt.

2. *affine* Boield. — VIII. Fiume. (Legit J. Pável.)

Niptus Boield.

3. *hololeucus* Fald. — I. Budapest. III. Tátrafüred.

Bruchus Geoffr.

Ptinus Linné.

4. *Capellae* Reitt. — VII. Gospić. (Auctor, 297, p. 52.)
5. *lichenum* Marsh. — V. Vallis Lotrióra, Montes Cibinenses.
6. *coarcticollis* Strm. — I. Isaszeg. VI. Herkulesfürdő.
7. *rufipes* F. — I. Budapest, Péczel, Peszér, Kalocsa, Debreczen. II. D.-Örs, Sopron, Pécs. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Montes Beszkidenses, M.-Sziget. V. Tasnád, Hátszeg, N.-Csür, Montes Kerczenses, Medgyes, Segesvár, Sz.-Régen. VI. Herkulesfürdő. VII. Lipik.
8. *fur* L. — Communis.
9. *bicinctus* Strm. — I. Kalocsa. V. Nagy-Szeben, Segesvár. VI. Herkulesfürdő.
10. *latro* F. — I. Budapest, Kalocsa. III. Pozsony, Beszterczebánya. IV. S.-A.-Ujhely, Tolcsva. V. Frequens. VI. Temesvár.
11. *brunneus* Duft. — I. Budapest, Kalocsa. V. Hátszeg, N.-Szeben, Vöröstorony.

v. *testaceus* Boield. — I. Budapest. III. K.-Tapolcsány, Putnok. VI. Báziás, Resicza, Herkulesfürdő.

12. *villiger* Reitt. — I. Budapest, Kalocsa. IV. Bártfa, Ungvár. V. N.-Szeben, Montes Kerczenses.

13. *perplexus* Muls. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, N.-Várad. IV. Czéke. V. N.-Szeben, K.-Ápold. VII. Velebit.

14. *pilosus* Müll. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. Szt-Márton. III. Beczkó. IV. Bártfa, Sátoralja-Ujhely, S.-Patak, Tolcsva, Czéke, Sztropkó, M.-Sziget, Beregszász. V. Peér, Hátszeg, Kis-Ápold.

15. *subpilosus* Strm. — I. Budapest, Kalocsa, Nyiregyháza, Nagy-Várad. V. Nagy-Szeben, Montes Kerczenses, Brassó. VI. Mehádia, Korniaréva.

16. *dubius* Strm. — II. Ács, Sopron. III. Beszterczebánya, Hermánd, Trencsén. V. N.-Csür, Medgyes.

17. *basicornis* Reitt. — VIII. Zengg (Auctor, 299, p. 222).

18. *sexpunctatus* Panz. — I. Kalocsa. III. Nyitra, Rozsnyó. IV. Szinna. V. N.-Szeben, Kőhalom, Segesvár.

19. *variegatus* Rossi. — I. Budapest, Kalocsa. II. Z.-Tapolcza. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely. V. Kolozsvár, Sz.-Régen. VI. Temesvár, Herkulesfürdő.

20. *raptor* Strm. — I. Kalocsa. II. Zircz, Kőszeg. III. Tátrafüred. IV. Bártfa. V. Sánta, N.-Szeben, N.-Disznód, Fogaras, Brassó, Hosszufalu Segesvár. VI. Temesvár.

21. *Schlerethi* Reitt. — I. Parád. V. N.-Szeben.

22. *bidens* Ol. — IV. Torna, Tolcsva, Beregszász. V. Peér.

23. *nitidus* Duft. — I. Budapest. II. Ács. IV. Komjáti.

Fam. BYRRHIDAE.

Dryophilus Chevr.

1. *pusillus* Gyll. — II. Zircz. III. Zsolna, Deménfalu, Vallis Bisztra. V. Montes Kerczenses. VI. Korniaréva.

Priobium Motsh.

2. *castaneum* F. — II. Sopron (sec. F. Ocskay).

Episernus Thoms.

3. *angulicollis* Thoms. — III. F.-Bocza. (Legit J. Weise, 392, p. 248.)

4. *striatellus* Bris. — VII. Fužine. (Miller, 253, pag. 6.)

Gastrallus Duv.

5. *laevigatus* Ol. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. N.-Harsány. III. Zólyom, Hermánd. V. Nagy-Szeben, N.-Csür. VI. Jeselnicza, Herkulesfürdő. VII. Diakovár.

6. *immarginatus* Müll. — I. Péczel, II. Pécs.

Byrrhus Geoffr.

Aulobium Fabr.

7. *denticollis* Panz. — IV. S.-A.-Ujhely. V. Ad balneum Gyögy, Montes Kerczenses, Sz.-Régen. VI. Herkulesfürdő.

8. *pertinax* L. — In regionibus montanis frequens.

9. *emarginatus* Duft. — IV. Ungvár. VI. Jeselnicza, Herkulesfürdő.

10. *striatus* Ol. — Communis.

11. *fagi* Muls. — I. Kalocsa. III. Montes Szoblahóenses. (Com. Trencsén.) V. Brassó, Montes Bodzaenses. VI. Herkulesfürdő. VII. Fužine.

12. *fulvicornis* Strm. — I. Budapest, Kalocsa. II. Zircz, Pécs. IV. A.-Bereczki, Mons Vihorlat, Zboj. V. Tasnád, Kolozsvár, Montes Kerczenses, Fogaras. VI. Resicza, Ferenczfalva, Herkulesfürdő.

v. *rufipennis* Duft. — V. K.-Disznód. (Legit A. Ormay, 264, p. 36).

13. *nitidus* Hbst. — V. Vöröstorony. (Leg. A. Ormay, 264, p. 36.)

14. *rufipes* F. — I. Kalocsa. III. Trencsén. IV. Bártfa. V. N.-Szeben, N.-Csür, Fogaras, Montes Rozsnyóenses, Medgyes, Gy.-Tölgyes. VII. Našice.

15. *hirtus* Ill. — VIII. Buccari. (Leg. L. Biró.)

16. *paniceus* L. — Communis.

Oligomerus Redtb.

17. *Reyi* Bris. — V. N.-Szeben. (Legit A. Ormay, 264, p. 36.)

18. *brunneus* Strm. — I. Péczel, Peszér, N.-Várad. II. Pécs. IV. Mons Vihorlat. V. Hátszeg, Nagy-Szeben, Szt-Erzsébet, Præsbe, Brassó. VI. Herkulesfürdő.

Xestobium Motsch.

19. *rufo-villosum* Deg. — Frequens.

20. *plumbeum* Ill. — I. Budapest. II. Pécs. IV. Erdőbénye, O.-Ruszka. V. Brassó (Czenk). VI. Resicza, Ferenczfalva.

Ernobius Thoms.

21. *abietinus* Gyllh. — V. Mons Sánta (Montes Cibinenses), Brassó, Borszék.

22. *abietis* F. — III. Tátrafüred. V. Mons Sánta. VII. Fužine.

23. *reflexus* Muls. — III. V.-Mikola. (Leg. M. Hopffgarten, 175, p. 343.)
24. *mollis* L. — II. Sopron, Pécs. V. Montes Cibinenses, Sz.-Régen.
25. *parens* Muls. — II. Pécs. (Legit Dr. E. Kaufmann.)
26. *crassiusculus* Muls. — I. Insula Csepel. III. Tátrafüred. IV. Bártfa. V. Fogaras.
27. *angusticollis* Ratzb. — III. Tátrafüred (sec. J. Frivaldszky).
28. *pini* Muls. — V. Teste Seidlitz. (345, p. 535.)
29. *nigrinus* Strm. — I. Budapest. VI. N.-Bogsán. VII. Fužine.
30. *longicornis* Strm. — IV. Com. Marmaros: Mons Menczul. (Legit J. Frivaldszky.)

Hedobia Strm.

31. *pubescens* F. — I. Budapest, Isaszeg. II. Zircz. VI. Herkulesfürdő.
32. *imperialis* L. — I. Budapest, Kalocsa, Debreczen. II. Sopron. III. V.-Mikola, Hermánd, Trencsén, Putnok. IV. S.-A.-Ujhely, S.-Patak, Varannó, N.-Mihály, Mons Szinnaikő, Ungvár. V. Pele, Kolozsvár, K.-Disznód, Segesvár. VI. Báziás, Herkulesfürdő. VII. Diakovár
33. *regalis* Duft. — I. Budapest, Kalocsa. III. V.-Mikola, Trencsén. IV. S.-Patak, Varannó, Szőllőske. V. Nagy-Csür, Brassó, Zernest. VI. Jeselnicza, Herkulesfürdő.

Trypopitys Redtb.

34. *carpini* Hbst. — I. Budapest, Isaszeg, Kalocsa, Makó. II. Boglár. III. K.-Kálna, Várna, Beczkó, Tátrafüred. IV. Bártfa, Szinna. V. Vallis Czód, Segesvár, Deés. VI. Janova, Rumunyest.

Ptilinus Geoffr.

35. *pectinicornis* L. — Frequens.
36. *costatus* Gyllh. — I. Budapest, Kalocsa. III. Budatin. IV. Bártfa, Mons Szinnaikő. V. Hátszeg, Præsbe, Montes Kerczenses, Brassó.
37. *fissicollis* Reitt. — I. Budapest. VI. Montes Szörényenses.

Ochina Steph.

38. *Latreillei* Bon. — I. Budapest. V. Kolozsvár.

Xyletinus Latr.

39. *ornatus* Germ. — I. Budapest. IV. M.-Sziget.
40. *ater* Pz. — I. Budapest, Mons Pilis, Kalocsa, Hajós, N.-Várad. II. Z.-Tapolcza. IV. Sátoralja-Ujhely, K.-Azar, Szőllőske. V. N.-Csür, Vörös-torony, Segesvár. VI. MonsDomoglet.
41. *maculatus* Kiesw. — V. Hátszeg. VI. Mons Opesata (Herkulesfürdő).
42. *ruficollis* Gebl. — I. Budapest. VI. Deliblat.
43. *pectinatus* F. — I. Budapest. II. Sopron, Pécs. IV. Szinna. V. Pele, N.-Szeben, N.-Sink, Szász-Régen. VI. Resicza.
44. *laticollis* Duft. — I. Budapest, Péczel. II. Nagy-Vázsony, Pécs. III. Trencsén. V. Szelindek. VI. Jeselnicza, Mons Domoglet.

Lasioderma Steph.

45. *obscurum* Solsk. — I. Debreczen, N.-Várad.
46. *haemorrhoidale* Illig. — III. V.-Mikola. (Legit M. Hopffgarten, 175, p. 343.)
47. *Redtenbacheri* Bach. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. IV. S.-A.-Ujhely.

Mesocoelopus Duv.

48. *niger* Müll. — III. Putnok. (Leg. E. Frivaldzky.)

Dorcatoma Hbst.

49. *dresdensis* Hbst. — I. Isaszeg, Hajós. II. Pécs. IV. Bártfa, N.-Bocskó. V. Vallis Zsil, Petrozsény, Fogaras. VI. Mons Domoglet.
50. *serra* Panz. —VI. Herkulesfürdő. (Leg. J. Pável.)
51. *chrysomelina* Strm. — II. Pécs. V. N.-Szeben, Szt-Erzsébet. VI. Herkulesfürdő.
52. *flavicornis* F. — II. N.-Vázsony. V. N.-Szeben, Holczmány.

Coenocara Thoms.

53. *bovistae* Hoffm. — I. Budapest, Isaszeg. II. N.-Vázsony. IV. Huszt. V. Fogaras.
54. *affinis* Strm. — I. Kalocsa. III. Kis-Kálna, Trencsén.

Fam. SPHINDIDAE.

Sphindus Chevr.

1. *dubius* Gyll. — I. Isaszeg, Montes Biharenses. II. Zircz. V. Montes Kerczenses. VI. Herkulesfürdő.
2. *grandis* Hampe. — V. Kolozsvár. VII. Teste Auctore.

Aspidiphorus Latr.

3. *orbiculatus* Gyll. — Frequens.
4. *Lareynii* Duv. — I. Isaszeg. VI. Herkulesfürdő.

Fam. LYCTIDAE.

Lyctus Fabr.

1. *unipunctatus* Herbst. — Frequens
2. *pubescens* Pz. — III. Budatin. V. Hátszeg, Mon-

tes Retyezát, Segesvár, Gyeke. VI. Resicza, Herkulesfürdő.

3. *impressus* Com. — I. Kalocsa. VI. Herkulesfürdő.

Fam. BOSTRYCHIDAE.

Psoa Herbst.

1. *viennensis* Herbst. — I. Budapest, Kalocsa, Debreczen, N.-Várad. II. I.-Berény, Keszthely. III. Pozsony, Putnok. IV. Almás, S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Tokaj. V. N.-Falu, Pele, Peér, Tasnád, T.-Szántó, N.-Szeben, Szt-Erzsébet, N.-Csür, Medgyes. VI. Herkulesfürdő.

2. *dubia* Rossi. — Hungaria. (Kiesenwetter, 198, p. 9.)

Sinoxylon Duft.

3. *bispinosum* Ol. — I. Budapest, Péczel, Gödöllő, Debreczen. II. Lacus Fertő, Kőszeg, Z.-Tapolcza. III. Putnok. IV. Szőllőske. V. Kolozsvár, Segesvár. VI. Orsova.

4. *sexdentatum* Ol. — II. Z.-Tapolcza. (Leg. A. Rédl.)

Bostrychus Geoffr.

5. *capucinus* L. — Communis.

6. *varius* Ill. — I. Budapest. II. Montes Bakonyenses. IV. Varannó. VI. Orsova, Korniaréva. VII. Lipik.

Xylopertha Guér.

7. *retusa* Ol. — I. Budapest, Isaszeg, Peszér, Kalocsa, Debreczen, N.-Várad. II. Z.-Tapolcza. V. Tasnád, Remete, Hátszeg, Szt-Erzsébet, N.-Csür, Medgyes. VI. Herkulesfürdő.

8. *pustulata* F. — VI. Orsova, Herkulesfürdő.

Stephanopachys Wat.

9. *substriatus* Payk. — III. Tátrafüred. V. Nagy-Szeben, Vallis Czód, Præsbe, N.-Talmács, Mons Kereszténvhavas, Brassó.

Hendecatomus Muls.

10. *reticulatus* Hbst. — I. Mons Pilis. V. Teste Seidlitz.

Fam. CIIDAE.

Xylographus Mell.

1. *bostrychoides* Dufour. — III. Vallis Vrátna. VI. Herkulesfürdő. VII. Velebit.

Cis Latr.

2. *elongatulus* Gyll. — I. M.-Berény. VI. Herkulesfürdő.

3. *nitidus* Herbst — I. Kalocsa, Remecz. II. Boglár, Pécs. III. Beszterczebánya, Hermánd. IV. Mons Szinnaikő, Runyina, Mons Hoverla. V. Montes Kerczenses, Brassó, Montes Bodzaenses. VI. Herkulesfürdő.

4. *Jaquemarti* Mell. — I. Budapest, Péczel, Remecz, M.-Kovácsháza. IV. Mons Szinnaikő, Runyina, Mons Hoverla. V. Montes Kerczenses, Brassó. VI. Ferenczfalva, Jeselnicza, Herkulesfürdő.

5. *glabratus* Mell. — I. Budapest, Péczel, Remecz. II. Pécs. III. Kékkő, Vallis Vrátna. IV. Mons Szinnaikő, Runyina, Montes Vihorlat, Hoverla et Pop-Iván. V. Mons Fettifői, Vallis Lotrióra, Montes Czódenses et Kerczenses. VI. Herkulesfürdő.

6. *lineatocribratus* Mell. — I. Remecz. IV. Kuszin, Montes Vihorlat et Hoverla, N.-Bánya. V. Montes Kerczenses.

7. *boleti* F. — Communis.

8. *caucasicus* Mén. (*rugulosus* Mell.) — VI. Herkulesfürdő.

9. *setiger* Mell. — I. Budapest, Debreczen. III. Koritnyicza. IV. Mons Szinnaikő, Runyina, Mons Hoverla, Rahó. V. N.-Szeben.

10. *micans* Hbst. — I. Budapest, Kalocsa, Hagymádfalva. II. Z.-Tapolcza. III. K.-Kálna. IV. Komjáti, Áj, Jászó, S.-A.-Ujhely, S.-Patak, Homonna. V. Frequens. VI. Herkulesfürdő.

11. *hispidus* Gyll. — Frequens.

12. *striatulus* Mell. — I. Remecz. IV. Ráhó. V. Montes Kerczenses.

13. *comptus* Gyll. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Debreczen, Hagymádfalva. III. Zsolna. IV. S.-A.-Ujhely, Mons Szinnaikő. V. Montes Kerczenses. VI. Ferenczfalva, Herkulesfürdő.

14. *quadridens* Mell. — IV. Mons Hoverla. V. Montes Kerczenses. VI. Herkulesfürdő.

15. *fissicornis* Mell. — IV. Mons Hoverla. V. Montes Kerczenses. VI. Montes Szörényenses.

16. *fissicollis* Mell. — IV. Mons Hoverla. V. Brassó. VI. Resicza. VII. Ljeskovac.

17. *bidentatus* Ol. — I. N.-Várad. IV. Mons Vihorlat, Runyina, Montes Hoverla et Pop-Iván. V. Resinár, Montes Kerczenses, Brassó. VI. Herkulesfürdő.

18. *dentatus* Mell. — I. Feketeerdő. V. Mons Sánta (Montes Cibinenses.) VII. Ljeskovac.

19. *Perrisi* Abeille. — II. Zircz, Boglár. V. Teste Bielz. VI. Ferenczfalva.

20. *punctulatus* Gyll. — I. Kalocsa. (Leg. F. Speiser.)

21. *tomentosus* Mell. — VI. Herkulesfürdő. (Leg. J. Frivaldszky.)

22. *alni* Gyll. — I. Isaszeg, Kalocsa, Remecz, II. Pécs. III. Hermánd, Vallis Vrátna, Putnok. IV. Homonna, M.-Sziget. V. Vallis Lotrióra, Nagy-Szeben, Sz.-Ujfalu, Montes Kerczenses. VI. Herkulesfürdő. VII. Lipik.
23. *reflexicollis* Abeille. — I. Budapest. IV. M.-Sziget, Montes Beszkidenses.
24. *castaneus* Mell. — I. Budapest, Kalocsa. IV. Mons Szinnaikő, Runyina. V. Hátszeg, Brassó, Segesvár. VI. Ferenczfalva, Herkulesfürdő.
25. *festivus* Panz. — IV. Tárkány, Szerencs, Rahó, Mons Hoverla. V. Montes Kerczenses. VI. Herkulesfürdő.
26. *vestitus* Mell. — V. Kercz. VI. Herkulesfürdő.
27. *oblongus* Mell. — II. Zircz. V. Brassó.
28. *bicornis* Mell. — IV. Montes Beszkidenses. VII. Ljeskovac.
29. *Merkli* Abeille.—VI. Resicza. (Detex. E. Merkl.)

Rhopalodontus Mell.

30. *perforatus* Gyll. — I. Budapest, N.-Várad. II. Pécs. III. D.-Jenő, Kékkő. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, Mons Szinnaikő, Montes Beszkidenses. V. Præsbe, Montes Kerczenses. VI. Herkulesfürdő.
31. *Baudueri* Abeille. — I. Budapest. VI. Mons Szemenik.
32. *fronticornis* Pz. — I. Kalocsa, Nagy-Várad. III. Beczkó. IV. Montes Szinnaikő et Vihorlat, Mád, Rahó. V. Hátszeg, Resinár, N.-Csűr, Fogaras. VI. Herkulesfürdő.
valachiae Reitt. — V. Teste Bielz. (27, p. 79.)

Ennearthron Mell.

33. *affine* Mell. — I. Budapest, Nagy-Várad. III. K.-Kálna, Putnok. IV. Bártfa, Sátoralja-Ujhely, Mons Szinnaikő, N.-Bocskó. V. Vallis Lotrióra, Montes Kerczenses, Brassó, Bükszád. VI. Oravicza, Ferenczfalva, Herkulesfürdő.
34. *cornutum* Gyll. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. Villány. V. N.-Szeben, N.-Csür, F.-Sebes, Montes Kerczenses. VI. Herkulesfürdő.
35. *filum* Abeille. — I. Szombatság. (Reitter, 293, p. 25.)
36. *pruinosulum* Perr. — In montibus Carpathicis. (Reitter, 295, p. 56.)
37. *laricinum* Mell. — V. Segesvár. (Bielz, 27, p. 79.)
38. *Wagae* Wank. — IV. Rahó. V. Montes Kerczenses. VI. Herkulesfürdő.

Diphyllocis Reitt.

39. *opaculus* Reitt. — IV. M.-Sziget. VII. Županje.

Octotemnus Mell.

40. *mandibularis* Gyll. — III. Trencsén. V. Montes Cibinenses, Kercz, Brassó, Segesvár, Borszék. VI. Resicza.
41. *glabriculus* Gyll. — Frequens.

Fam. TENEBRIONIDAE.

Tentyria Latr.

1. *Frivaldszkyi* Krtz. — VI. Grebenácz, Deliblat, Duplaj.

Dichillus Duv.

2. *minutus* Sol. — VI. Herkulesfürdő. (Leg. J. Pável.)

Gnaptor Sol.

3. *spinimanus* Pall. — I. Budapest, Pomáz, Torbágy, Hajós, Szeged. II. B.-Füred, Simontornya, Pécs. III. Vallis Bosácz. VI. Lippa, Báziás, Uj-Moldova, Orsova, Herkulesfürdő.

Blaps F.

4. *longicollis* Stev. — I. Budapest, Keczel, Nagy-Várad. IV. S.-A.-Ujhely, S.-Patak, Varannó. V. Brassó. VI. Temesvár, Grebenácz.
5. *gigas* L.—VIII. Fiume, Buccari, Carlopago, Zengg.
6. *abbreviata* Mén. — I. Budapest, Péczel. II. Pécs. IV. S.-A.-Ujhely.
7. *mortisaga* L. — Communis.
8. *reflexicollis* Fisch. — I. Budapest, Kalocsa, Debreczen. II. Ad lacum Fertő. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj, Homonna.
9. *parvicollis* Esch. — Hungaria (Allard, 3, 1882, p. 117.)
10. *similis.* Latr. — Frequens.
11. *subquadrata* Brll. — In regione V. (Cat. Col. Eur., 1891, p. 241.)
12. *mucronata* Latr. — I. Kalocsa. II. Sopron. V. N.-Szeben, Sz.-Régen. VI. Temesvár.

Asida Latr.

13. *sabulosa* Goeze. — VIII. Fiume, Buccari, Crkvenica.
14. *fascicularis* Germ. — VIII. Fiume, Buccari.
15. *lineatocollis* Küst. — VIII. Fiume, Carlopago, Zengg.
16. *banatica* Friv. — VI. Orsova, Herkulesfürdő.

Crypticus Latr.

17. *quisquilius* L. — Communis.

Platyscelis Latr.

18. *polita* Strm. — I. Hadház, Debreczen. IV. Szerencs, Tarczal.

19. *gages* Fisch. — I. Budapest, Péczel, Dabas. II. Sopron, Felsőlő. III. K.-Kálna, Putnok. IV. Szádellő, S.-A.-Ujhely, Gálszécs, Krivosecsány.
20. *hungarica* Friv. — I. Keczel, Debreczen, P.-Poó, Szarvas, P.-Csabacsüd, K.-Tarcsa, P.-Szt-Tornya, M.-Kovácsháza.

Dendarus Latr.

21. *tristis* Rossi. — VIII. Fiume, Carlopago.
22. *emarginatus* Germ. — VIII. Fiume, Zengg.

Pedinus Latr.

23. *helopioides* Ahr. — V. Brassó. VI. Temesvár. VIII. Carlopago.
24. *fallax* Muls. — IV. S.-A.-Ujhely. (Leg. Dr. C. Chyzer.)
25. *femoralis* L. — Communis.
26. *Ullrichi* Seidl. — I. Budapest, M.-Kovácsháza. V. Medgyes. VI. Grebenácz, Báziás, Herkulesfürdő, Rumunyest. VIII. Fiume.
27. *hungaricus* Seidl. — Hungaria septentrionalis. (Seidlitz, 346, p. 372.)

Opatrum F.

28. *verrucosum* Germ. — VIII. Fiume. (Leg. J. Pável.)
29. *sabulosum* L. — Communis.

Gonocephalum Muls.

30. *pygmaeum* Stev. v. *pesthiense* Küst. — I. Budapest, Péczel, Kecskemét.
v. *Sturmi* Küst. — Secundum Auctorem in Hungaria. (236, XVI. 62.)
31. *pusillum* F. (*viennense* Duft.) — I. Budapest, Mons Pilis, Péczel, Dabas, Kecskemét, Kalocsa, Debreczen, N.-Várad. II. Keszthely. III. Beszterczebánya. IV. S.-A.-Ujhely, S.-Patak, Tokaj, Szerencs, N.-Bocskó. VI. Herkulesfürdő, Rumunyest.

Penthicus Fald.

punctulatus Brull. — V. Alsó-Szombat. (Bielz, 27, p. 79.)

Microzoum Redtb.

32. *tibiale* F. — Frequens.

Lichenum Blanch.

33. *pictum* F. — I. Budapest, Palota, Peszér, Keczel, Hajós. IV. Szomotor. V. Szt-Erzsébet,

Cnemeplatia Costa.

34. *Atropos* Costa. — I. Budapest. (Leg. J. Frivaldszky.)

Bolitophagus Ill.

35. *reticulatus* L. — I. Kalota, Feketeerdő, Monyásza. II. Zircz. III. Bosácz. IV. N.-Mihály, Mons Simonka, Szinna, Montes Szinnaikő et Hoverla. V. Frequens. VI. Szászka, Herkulesfürdő. VIII. Fiume.
36. *interruptus* Ill. — I. Hagymádfalva. IV. Mons Szinnaikő. V. Montes Retyezát et Kerczenses. VI. Orsova, Herkulesfürdő. VII. Fužine, Capella.
37. *armatus* Pz. — I. Hagymádfalva. II. Montes Bakonyenses (Zircz, Pálihálás, Tábornokerdő), Boglár. VI. N.-Bogsán, Herkulesfürdő.

Eledona Latr.

38. *agaricola* Herbst. — Frequens.

Diaperis Geoffr.

39. *boleti* L. — Frequens.
v. *quercana* Baudi. — In regione VII. (Auctor, 12, p. 228.)

Hoplocephala Lap.

40. *haemorrhoidalis* F. — I. Rézbánya. II. Montes Bakonyenses (Zircz, Tábornokerdő), Boglár. III. Montes Szoblahóenses (Com. Trencsén). IV. Mons Szinnaikő. V. Montes Cibinenses et Kerczenses. VI. Stájerlak, Szászka. VII. Našice.

Scaphidema Redtb.

41. *metallica* F. — Frequens.

Amarantha Motsch.

42. *azurea* Waltl. — II. Com. Somogy: P.-Vadé. (Leg. J. Pável.)

Platydema Lap.

43. *violacea* F. — I. Budapest, Isaszeg, Remecz. II. N.-Vázsony, Zircz. IV. Körtvélyes, N.-Mihály. V. Vallis Lotrióra, N.-Csür. VI. Temesvár, Oravicza, Herkulesfürdő. VII. Našice.
44. *Dejeani* Lap. — I. Hagymádfalva, Remecz, Monyásza. II. Zircz. III. V.-Mikola, IV. Mons Szinnaikő, Huszt. V. Frequens. VI. Orsova, Herkulesfürdő. VII. Našice.

Alphitophagus Steph.

45. *bifasciatus* Say. — I. Budapest, Kalocsa, Hagymádfalva. III. Zólyom. IV. Tárkány. V. Nagy-Szeben, Montes Kerczenses. VI. Herkulesfürdő.

Pentaphyllus Latr.

46. *chrysomeloides* Rossi. — I. Budapest, Kalocsa, N.-Várad, Szombatság. II. Zircz. IV. Királyháza. VII. Našice.

47. *testaceus* Hellw. — I. Budapest, M.-Káta, Nagy-Károly, Debreczen, Szombatság. II. Szt-Márton, Pécs. III. K.-Kálna. V. Tasnád, Hátszeg, Nagy-Szeben.

Tribolium Mac Leay.

48. *ferrugineum* F. — I. Budapest, Kalocsa, Miskolcz. N.-Abony, N.-Várad. III. N.-Bélicz. V. N.-Szeben, Vallis Czód, Fogaras, Sz.-Régen.

49. *madens* Charp. — I. Budapest, Gödöllő, Szeged. II. Karád. III. Beczkó, Felka. IV. Szőllőske.

50. *confusum* Duv. — I. Budapest, Miskolcz, Szombatság, Makó.

Palorus Duv.

51. *depressus* F. — I. Budapest, Péczel N.-Abony, Kalocsa. II. Boglár, Apáti, Pécs. III. Zólyom. IV. S.-A.-Ujhely, A.-Bereczki, K.-Azar. V. Hátszeg, N.-Szeben, Montes Cibinenses et Kerczenses. VI. Mons Domoglet. VII. Vrdnik, Diakovár.

Corticeus Pill.

52. *castaneus* F. — Frequens.

53. *fraxini* Kug. — V. Tihucza, Montes Borgóenses.

54. *pini* Panz. — V. Montes Retyezát, Borszék, Borgó.

55. *suturalis* Payk. v. *bivittatus* Reitt. — IV. Mons Hoverla. V. Teste Bielz.

56. *rufulus* Rosenh. — I. Hagymádfalva. VI. Herkulesfürdő.

57. *bicolor* Ol. — I. Budapest, Kalocsa, M.-Kovácsháza, Monyásza. IV. S.-A.-Ujhely, A.-Bereczki, Bély. V. Nagy-Szeben, N.-Csür, Szt-Erzsébet, Sz.-Ujfalu, Fogaras, Brassó. VI. Szászka, Herkulesfürdő.

58. *fasciatus* F. — I. Budapest, Péczel, Debreczen. III. K.-Kálna. IV. K.-Azar. V. Hátszeg, Nagy-Szeben, N.-Csür. VI. Jeselnicza, Herkulesfürdő.

59. *versipellis* Baudi — I. Szombatság. (Reitter, 293, p. 26.)

60. *linearis* F. — III. Sziklatelep (Com. Zólyom). V. Brassó.

Echocerus Horn.

61. *cornutus* F. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa. VI. Báziás.

Adelina Woll.

62. *turcica* Reitt. — VI. Herkulesfürdő. (Leg. J. Pável.)

Uloma Steph.

63. *culinaris* L. — In regionibus montanis frequens.

64. *Perroudi* Muls. — II. Z.-Tapolcza. V. Kercz, K.-Talmács, Zernest, Gyimes.

Alphitobius Steph.

65. *diaperinus* Panz. — I. Budapest. II. Apáti. V. Kolozsvár. VI. Herkulesfürdő.

66. *gracilipes* Baudi — I. Budapest, Hagymádfalva. II. Keszthely. VI. Herkulesfürdő. VII. Eszék.

67. *chrysomelinus* Hbst. — I. Budapest, Kalocsa. II. I.-Berény, Visz, Baán, Pécs. III. Fülek, Putnok. V. Zilah, Hátszeg, Montes Cibinenses et Csikenses. VI. Temesvár. VII. Našice.

Anthracias Redtb.

68. *cornutus* Fisch. — I. B.-Sebes. II. Zircz, P.-Vádé, Pécs. VI. Herkulesfürdő. VII. Našice.

Iphthimus Truqui.

69. *croaticus* Truqui. — In regione VII. (Auctor, 372, p. 272.)

Menephilus Muls.

70. *cylindricus* Hbst. — I. Parád, B.-Sebes. II. N.-Vázsony, Zircz. III. Putnok. IV. Tolcsva. V. N.-Csür, Szt-Erzsébet, N.-Talmács, Bükszád, Gyeke. VI. Herkulesfürdő. VII. Našice.

Tenebrio L.

71. *opacus* Duft. — V. Montes Retyezát, Volkány.

72. *obscurus* F. — Frequens.

73. *molitor* L. — Communis.

74. *picipes* Hbst. — In toto regno occurrit.

Boros Herbst.

75. *Schneideri* Panz. — V. Montes Czódenses, Brassó. VI. Stájerlak.

Laena Latr.

76. *viennensis* Strm. — I. Budapest. II. Felsőlő. V. Hátszeg, N.-Disznód, K.-Disznód, Brassó. VII. Fužine, Gospić.

77. *Ormayi* Reitt. — V. Ad balneum Gyógy, Nagy-Szeben, Bungárd, N.-Disznód, K.-Disznód, Vallis Lotrióra, Vöröstorony, F.-Orbó, Buzamező.

78. *Reitteri* Weise. — I. Kóly. IV. Mons Szinnaikő, Bánszka, Tavarna, Czéke, Szőllőske, Olyka, M.-Sziget, Beregszász. V. Zilah, K.-Disznód, Montes Kerczenses, Mons Királykő, Brassó, Tömös. VI. Resicza, Ferenczfalva, Uj-Moldova.

79. *Hopffgarteni* Weise. — V. Montes Kerczenses. VI. Oravicza, Uj-Moldova, Zlaticza, Herkulesfürdő.

Acanthopus Latr.

80. *caraboides* Petag. — II. N.-Vázsony. V. Hátszeg, Déva, Montes Kerczenses, N.-Sink, Szász-Régen. VI. Báziás, Orsova, Berszászka, Her-

kulesfürdő, Rumunyest. VII. Vrdnik, Raduč. VIII. Fiume, Carlopago.

Helops F.

81. *coeruleus* L. — VI. Oravicza, Orsova, Herkulesfürdő. VII. Velebit. VIII. Fiume.

82. *Rossii* Germ. — VI. Orsova (Mons Allion). VIII. Fiume.

interstitialis Küst. — Hungaria. (Cat. Col. Eur., 1891, p. 251.) *

rufipes All. — Hungaria. (Cat. Col. Eur., 1891, p. 251.) **

83. *subrugosus* Duft. — I. Budapest, Péczel. VI. Versecz, Ulma.

v. *damascenus* Küst. — Simul cum stirpe.

84. *strigicollis* Seidl. — I. Derékegyháza. (Detexit Dr. G. Horváth.)

85. *tenebricosus* Brull. — VI. Báziás : Vallis Ribiz. (Leg. J. Frivaldszky.)

86. *quisquilius* F. — Frequens.

87. *convexus* Küst. — II. N.-Kapornak. (Leg. F. Speiser.)

88. *picipes* Küst. — I. Budapest. VI. N.-Bogsán (Lokája), Herkulesfürdő. VIII. Fiume.

89. *caraboides* Panz. — V. Hátszeg, N.-Csür, Marpód, Medgyes, Deés.

90. *lanipes* L. — Frequens.

91. *incurvus* Küst. — V. Nagy-Szeben, N.-Csür, N.-Talmács, Medgyes. VI. Ferenczfalva, Herkulesfürdő. VIII. Fiume.

92. *arboreus* Germ. (*tarsatus* Küst.) — Hungaria. (Küster, 236, XXI, 29.)

93. *exaratus* Germ. — VI. Ferenczfalva. VIII. Fiume.

v. *asphaltinus* Küst. — VI. Herkulesfürdő (Pecsenyeska).

94. *badius* Küst. — V. Brassó. VI. Resicza, Herkulesfürdő.

95. *gratus* Friv. — VI. Herkulesfürdő, Szkit.

Fam. ALLECULIDAE.

Allecula F.

1. *morio* F. — I. Péczel. III. K.-Kálna, Beczkó. IV. Bártfa, Varannó, Nagy-Mihály, Nagy-Bocskó. V. Tasnád, Nagy-Szeben, Montes Kerczenses, Fogaras. VI. Lippa, Herkulesfürdő, Korniaréva.

2. *aterrima* Küst. — II. Felsőlő, Pécs. V. Nagy-Szeben, Vallis Czód, N.-Sink, Brassó. VI. Orsova, Herkulesfürdő. VII. Velebit.

Eryx Steph.

3. *ater* F. — I. Palota, Péczel, Parád, Dabas, Debreczen. II. N.-Vázsony, Kőszeg. III. Beszterczebánya, Montes Szoblahóenses. IV. Tolcsva, Erdőbénye. V. Tasnád, Vallis Czód, Sz.-Régen. VI. Ulma, Herkulesfürdő. VII. Montes Fruska-Góra et Velebit.

4. *laevis* Küst. — I. Péczel, Kalocsa. II. Kőszeg. V. Rátosnya, Montes ad fluv. Maros. VI. Stájerlak, Herkulesfürdő. VII. Montes Fruska-Góra et Velebit.

Hymenalia Muls.

5. *rufipes* F. — Frequens.

6. *amplicollis* Lind. — I. Budapest (Gellérthegy Kecskehegy). Péczel, Kalocsa.

Gonodera Muls.

7. *Luperus* Hbst. — In toto regno occurrit.

v. *ferruginea* F. — Simul cum stirpe.

8. *ceramboides* L. — I. Debreczen. V. N.-Enyed, Volkány, Montes Kerczenses, Fogaras, Tömös, Predeál, Sz.-Régen. VI. Herkulesfürdő, Korniaréva. VII. Lipik, Raduč.

v. *serrata* Chevr. — I. Budapest, Péczel, Parád, Kalocsa, Debreczen. III. Beszterczebánya. IV. Ránk, Bártfa, S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Varannó. V. Predeál, Hosszufalu, Tusnád, Mons Büdös. VI. Herkulesfürdő.

9. *antennata* Pz. — I. Budapest, Péczel. II. Pécs, Z.-Tapolcza. V. Brassó. VI. Herkulesfürdő.

10. *murina* L. — Frequens.

v. *maura* F. — Simul cum stirpe.

v. *thoracica* F. — I. Budapest, Péczel, Keczel. V. Brassó. VI. Herkulesfürdő.

v. *evonymi* F. — I. Budapest, Péczel, Hajós, Debreczen. II. Pécs. III. Beszterczebánya, Hermánd. V. Malomviz. VI. Herkulesfürdő.

Mycetochara Berth.

11. *axillaris* Payk. — I. Budapest, Parád. V. Kercz, Fogaras, Brassó. VI. Herkulesfürdő. VII. Našise.

12. *flavipes* F. — Frequens.

13. *bipustulata* Ill. — I. Parád, Debreczen, Nagy-Várad. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Erdőbénye, Szőllőske, K.-Azar. V. Creber. VI. Ferenczfalva, Herkulesfürdő, Rumunyest. VII. Našice.

14. *4-maculata* Latr. — VI. Uj-Moldova. VII. Teste Reitter.

15. *linearis* Ill. — Frequens.

* Teste Auctore habitat in Hispania et non in Hungaria. (236, XXI, 25.)

** Secundum Auctorem solum Turciæ incola. (4,p. 86.)

Podonta Muls.

16. *nigrita* F. — Communis.
17. *dalmatina* Baudi. — VII. Mali-Halan. VIII. Zengg.

Cteniopus Sol.

18. *flavus* Scop. — Frequens.
v. *bicolor* F. — V. Brassó: Csigahegy. (Leg. L. Méhely, 247, p. 191.)
19. *sulphuripes* Germ. — I. Budapest, Péczel, Dabas, Kecskemét. II. Ács, Martonvásár, Z.-Tapolcza, Veszprém, Pécs. IV. Tokaj. V. Szováta, Vöröstorony, Brassó. VI. Herkulesfürdő.

Omophlus Sol.

20. *armillatus* Brull. — VI. Orsova, Herkulesfürdő.
21. *picipes* F. — II. Keszthely. V. Teste J. Frivaldszky.
21. *Amerinae* Curt. — I. Budapest, Kalocsa. III. Rajecz.
v. *picipes* Redtb. — I. Budapest, Péczel, Márton-Káta, Kalocsa, Debreczen. II. D.-Örs. III. Beczkó. IV. S.-A.-Ujhely, S.-Patak.
23. *dispar* Costa. — VI. Fehértemplom. (Legit E. Merkl.)
24. *betulae* Hbst. (*lepturoides* F.) — Frequens.
25. *rugosicollis* Brull. — I. Kalocsa, N.-Várad. II. N.-Vázsony, ad lacum Fertő. V. N.-Csür, Szent-Erzsébet, K.-Talmács, F.-Komána, Deés.
26. *dilatatus* Fald. v. *longicornis* Bert. — I. Budapest, M.-Káta, Kalocsa, Szeged. II. Ács. IV. S.-A.-Ujhely, S.-Patak.

Fam. LAGRIIDAE.

Lagria Fabr.

1. *atripes* Muls. — I. Debreczen. II. Z.-Tapolcza, Pécs. V. Sz.-Ujvár, N.-Szeben, Deés.
2. *hirta* L. — Communis.

Agnathus Germ.

3. *decoratus* Germ. — I. B.-Sebes. IV. M.-Laborcz. V. Tasnád, Hátszeg.

Fam. MELANDRYIDAE.

Tetratoma F.

1. *fungorum* F. — II. Szt-Márton. IV. Mons Szinnaikő, M.-Laborcz. V. Praesbe, Montes Cibinenses et Fogarasenses, Sz.-Régen, M.-Felek. VI. Herkulesfürdő. VII. Lipik.
2. *ancora* F. — I. Budapest. IV. O.-Ruszka, Mons Hoverla. V. Praesbe, Porcsesd, Mons Szurul, Montes Kerczenses, Brassó, Segesvár. VI. Resicza, Herkulesfürdő. VII. Vagan.

Mycetoma Muls.

3. *suturalis* Pz. — II. Zircz. III. Tavarnok. IV. Mons Szinnaikő.

Eustrophus Latr.

4. *dermestoides* F. — I. Csepel, Kecskemét, Kalocsa. II. Zircz. III. Zsolna. IV. Varannó. V. Nagy-Szeben, Montes Cibinenses, Fogaras, Segesvár, Vallis ad Görgény. VI. Osztrova, Herkulesfürdő.

Hallomenus Panz.

5. *binotatus* Quens. — VI. Orsova (Mons Allion), Herkulesfürdő. VII. Breznica.
6. *fuscus* Gyll. — V. Montes Cibinenses. VI. Herkulesfürdő (Mons Cserteg).

Orchesia Latr.

7. *acicularis* Reitt. — IV. Rahó (Reitter, 308, 1886, p. 349).
8. *micans* Panz. (*picea* Reitt.) — III. K.-Kálna. IV. M.-Laborcz. V. Montes Cibinenses, Szamos-Ujfalu, Brassó, Segesvár. VI. Resicza, Herkulesfürdő. VII. Capella.
9. *luteipalpis* Muls. — VI. Herkulesfürdő: Mons Domoglet. (Leg. J. Frivaldszky.)
10. *blandula* Brancsik. — I. Hagymádfalva, Vallis Vrátna, Montes K.-Kriván et Oroszlánkő, Rajecz, F.-Bocza. IV. M.-Sziget, Cserna-Hóra. V. Montes Radnaenses, Malomviz, Montes Kerczenses, Brassó. VI. Resicza, Vallis Marilla, Herkulesfürdő.
v. *transsylvanica* Reitt. — V. Ad balneum Gyógy, Vöröstorony, Montes Cibinenses et Kerczenses. VI. Alpes Szörényenses.
v. *carpathica* Reitt. — IV. M.-Sziget, Mons Hoverla.
11. *sepicola* Rosenh. — IV. M.-Laborcz, Mons Hoverla. V. Montes Cibinenses. VI. Herkulesfürdő (Domoglet, Cserteg).
12. *grandicollis* Rosh. — V. Kercz, Brassó. VII. Capella, Velebit.
13. *fasciata* Payk. — I. Budapest, Péczel. V. Kis-Disznód, Lacus Annató dictus. VI. Herkulesfürdő. VII. Breznica.
14. *undulata* Kr. — I. Péczel, Tőtös, Hagymádfalva, Remecz. IV. Mons Hoverla. V. Montes Bodzaenses. VI. Ferenczfalva, Herkulesfürdő. VII. Montes Fruska-Góra.

Abdera Steph.

15. *quadrifasciata* Curt. — V. Brassó. VI. Herkulesfürdő (Montes Domoglet et Opesata, Vallis Cserna).

16. *affinis* Payk. — I. Budapest. V. N.-Szeben. VII. Eszék.

17. *flexuosa* Payk. — IV. M.-Sziget. V. Rozsnyó, Montes Cibinenses.

Anisoxya Muls.

18. *fuscula* Ill. — I. Péczel. II. P.-Vadé. III. Beczkó. IV. Mons Hoverla. V. N.-Szeben. VI. Herkulesfürdő.

Dircaea F.

19. *Vaudoueri* Muls. *(tenuis* Hampe). — I. Budapest, Parád. III. K.-Kálna. VI. Herkulesfürdő.

20. *rufipes* Gyll. — I. Remecz. III. N.-Kubra (Com. Trencsén). IV. Ráhó. V. Montes Kerczenses.

21. *australis* Fairm. — I. Budapest. IV. Mons Vihorlat.

22. *4-guttata* Payk. — V. Oláhfalu, O-Láposbánya.

Xylita Payk.

23. *laevigata* Hell. — I. N.-Várad. III. Montes Mincsol (Com. Trencsén) et Prasiva. V. Kolozsvár. VII. Našice.

24. *livida* Sahlb. — III. Vallis Vrátna, Rózsahegy. IV. Mons Hoverla. VI. Alpes Szörényenses.

25. *Parreyssi* Muls. — VII. Velebit (sec. J. Frivaldszky).

Serropalpus Hell.

26. *barbatus* Schall. — In regionibus montanis frequens.

Hypulus Payk.

27. *quercinus* Quens. — I. Péczel, Kalocsa, Nagy-Várad. II. N.-Vázsony. V. N.-Szeben, Szamos-Ujfalu, K.-Disznód, N.-Sink, Segesvár. VI. Szt-Heléna.

28. *bifasciatus* F. — I. Budapest, Mons Pilis, Parád. III. Trencsén. IV. Körtvélyes, Varannó, Nagy-Bocskó. V. N.-Szeben, N.-Csür, Volkány, Resinár, N.-Sink, Brassó. VI. Zlaticza, Herkulesfürdő.

Marolia Muls.

29. *variegata* Bosc. — V. Montes Cibinenses, Kercz. VI. Herkulesfürdő.

Zilora Muls.

30. *Eugeniae* Ganglb. — V. Brassó. (Detexit F. Deubel.)

Melandrya F.

31. *caraboides* L. — In regionibus montanis occurrit.

32. *dubia* Schall. — Ut prior.

33. *rufibarbis* Schall. — III. Mons K.-Kriván, Tátrafüred. V. K.-Disznód.

Phryganophilus Sahlb.

34. *ruficollis* F. — V. Montes Kerczenses. VI. Báziás, Mons Szemenik. VII. Mons Papuk, Capella.

Conopalpus Gyll.

35. *testaceus* Ol. — I. Péczel, Isaszeg. II. Pécs. IV. Mons Gutin. VI. Herkulesfürdő.

v. *flavicollis* Gyll. — I. Isaszeg. II. Pécs. VI. Herkulesfürdő.

Osphya Illig.

36. *bipunctatus* F. — I. Budapest, Péczel, S.-Lád, Kalocsa. II. N.-Vázsony. IV. S.-A.-Ujhely, S.-Patak, Montes Vihorlat et Szinnaikő. V. Peér, Kolozsvár, K.-Disznód, Brassó, Medgyes. VII. Mons Bukova-Kusa.

v. *clavipes* Ol. — I. Budapest, Péczel, S.-Lád, Kalocsa.

Fam. MORDELLIDAE.

Scraptia Latr.

1. *dubia* Oliv. — I. Budapest. VI. Herkulesfürdő.

2. *fuscula* Müll. — I. Budapest, Isaszeg. IV. Tarczal. V. Tasnád, Kolozsvár, Nagy-Szeben, Sebeshely, Holczmány, Szt-Erzsébet.

3. *ferruginea* Kiesw. — IV. Szinna. VI. Herkulesfürdő.

Tomoxia Costa.

4. *biguttata* Gyll. — I. Budapest, Péczel, Isaszeg, N.-Várad. III. Hermánd, Trencsén, Koritnyicza. IV. Bártfa, Mons Vihorlat. V. N.-Csür, Montes Kerczenses, Brassó, Mons Büdös. VI. Ferenczfalva, Orsova, Herkulesfürdő. VII. Pakrac.

Mordella L.

5. *12-punctata* Rossi. — I. Kecskemét, Kalocsa, T.-Bura. II. Nagy-Vázsony. III. Beczkó. IV. Trebusa. V. Montes Rozsnyóenses, Gyulafalva.

v. *perlata* Sulz. — I. Budapest, Kalocsa. III. Beczkó. VII. Pakrac.

v. *6-punctata* Hbst. — I. Montes Biharenses. (Leg. J. Frivaldszky.)

6. *maculosa* Naez. — III. Beszterczebánya, Trencsén, Budatin, Strecsnó, Vallis Bisztra. V. N.-Szeben, N.-Csür, K.-Torony, N.-Sink.

7. *bisignata* Redtb. — I. Budapest, Kalocsa, Debreczen. IV. Sátoralja-Ujhely, M.-Sziget. V. Tasnád, N.-Szeben, N.-Csür, Kőhalom, Montes Bodzaenses.

8. *aurofasciata* Com. — V. Nagy-Csür, Barót. VI. Oravicza. Jeselnicza, Herkulesfürdő. VII. Velebit.
9. *sulcicauda* Muls. — III. Beszterczebánya. (Leg. A. Mocsáry.)
10. *fasciata* F. — Frequens.
v. *interrupta* Costa. — I. Budapest, Péczel.
v. *coronata* Costa. — I. Budapest. (Legit J. Pável.)
11. *villosa* Schrank. — III. Beczkó. IV. Mád, Tokaj.
12. *aculeata* L. — Communis.
v. *vestita* Em. — I. Kalocsa, Makó. V. Sz.-Ujvár, Gyeke, Deés. VI. Herkulesfürdő.
v. *viridiscens* Costa. — I. N.-Várad. VI. Montes Szörényenses.
v. *velutina* Em. — II. Apáti. V. Malomviz. VI. Herkulesfürdő.

Conalia Muls.

13. *Baudii* Muls. — I. Montes Biharenses. IV. Bártfa. VII. Velebit.

Stenalia Muls.

14. *testacea* F. v. *brunnipennis* Muls. — Incolit etiam Hungariam (Emery, 72, p. 77.).

Mordellistena Costa.

15. *Milleri* Em. — IV. Runyina, N.-Bocskó. VI. Jeselnicza, Herkulesfürdő.
16. *abdominalis* F. — I. Kalocsa, Nagy-Várad. III. Trencsén, Koritnyicza. IV. Bártfa, Sáros-Patak, Luhi. V. Malomviz, Mons Sánta, Montes Kerczenses, Fogaras, Brassó (Czenk), Mons Királykő, Sz.-Régen. VI. Mons Domoglet.
17. *Neuwaldeggiana* Pz. (*brunnea* F.) — I. Budapest, Keczel, Debreczen. II. Szegzárd, Pécs. IV. Kassa, Jászó, Sátoralja-Ujhely. V. Tasnád, Nagy-Csür, Fogaras, Medgyes. VI. Temesvár, Herkulesfürdő.
18. *humeralis* L. — IV. Áj, Torna, Olyka. V. Vallis Czód, Porcsesd, Montes Kerczenses, Fogaras. VI. Mons Domoglet, Rumunyest, Korniaréva.
v. *lateralis* Ol. — I. Budapest. II. Pécs. IV. Szőllőske. V. Tasnád, Zilah, Fenyőfalva, Marpód, Brassó. VI. Herkulesfürdő.
19. *nana* Motsch. — I. Nagy-Várad. V. Sz.-Ujfalu, Medgyes. VI. Herkulesfürdő.
20. *parvula* Gyll. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Hajós, N.-Várad. II. Pécs. IV. Derenk. V. Ad balneum Gyögy, N.-Szeben, Sz.-Ujfalu, Medgyes. VI. Buziás, Herkulesfürdő.
v. *inaequalis* Muls. — V. Kolozsvár. (Bielz, 27, p. 82.)
21. *episternalis* Muls. — I. Budapest. V. Brassó. (Czenk.)
22. *brevicauda* Boh. — I. Budapest, Kalocsa, Hajós. II. Pécs. III. Vallis Vrátna. IV. Bártfa, Homonna, Barkó, N.-Bocskó. V. Hátszeg. VI. Herkulesfürdő. VII. Velebit.
23. *micans* Germ. — I. Budapest, Hajós, Debreczen, N.-Várad. II. Boglár, Pécs. III. Szliács, Putnok. V. Vizakna, Hátszeg. VI. Grebenácz, Báziás, Herkulesfürdő, Rumunyest.
24. *pumila* Gyll. — I. Kalocsa. III. Szliács. IV. Komjáti, Bártfa, Sátoralja-Ujhely, Szomotor, Homonna, Mons Vihorlat, Szobráncz, Luhi. V. Hátszeg, N.-Szeben, N.-Csűr, Medgyes, Brassó, Hosszufalu. VI. Buziás, Jeselnicza. VIII. Fiume.
25. *Perroudi* Muls. — V. Malomviz. (Leg. J. Pável.)
26. *stenidea* Muls. — I. Budapest. II. Pécs. V. N.-Csűr, Szelindek, Medgyes.
27. *confinis* Costa. — I. Budapest. III. Putnok. VIII. Buccari.
28. *humerosa* Rosh. — II. Piszke. VI. Herkulesfürdő.

Pentaria Muls.

29. *badia* Rosh. — I. Budapest, Szeged. III. Trencsén. IV. Mons Szinnaikő, Tolcsva, Tokaj. V. P.-Szarvad, Hátszeg, Montes Cibinenses.

Cyrtanaspis Em.

30. *phalerata* Germ. — I. Budapest, Péczel. VI. Oravicza.

Anaspis Geoffr.

31. *maculata* Fourc. — I. Debreczen. (Legit J. Török.)
32. *frontalis* L. — Communis.
v. *lateralis* F. — I. Budapest, Kalocsa, Nagy-Várad, Székelyhid. IV. Sátoralja-Ujhely, Mons Vihorlat. VI. Temesvár, Janova.
33. *thoracica* L. — I. Budapest, Peszér, Debreczen. II. Pécs. III. Trencsén. IV. Áj, N.-Bocskó. VI. Csenej, Herkulesfürdő.
34. *ruficollis* F. — I. Budapest, Kalocsa, N.-Várad, Feketeerdő. II. Pécs. III. Tátrafüred. IV. Somodi. V. Montes Cibinenses, Szt-Erzsébet, Prázsmár. VI. Mons Domoglet.
35. *pulicaria* Costa. — I. Budapest, Kalocsa, Nagy-Várad, Feketeerdő. II. Pécs. III. Koritnyicza. IV. O.-Ruszka, Luhi. V. Hátszeg, N.-Szeben. VI. Herkulesfürdő. VIII. Fiume.
36. *Kiesenwetteri* Em. — III. Koritnyicza, Tátrafüred. V. Mons Sánta.
37. *flava* L. — Frequens.
v. *thoracica* Em. — I. Budapest, Peszér, Kalocsa.

II. Kőszeg, Pécs. IV. S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Tokaj. V. Creber. VI. Herkulesfürdő.

38. *melanostoma* Costa. — I. Budapest, Parád. III. Koritnyicza. IV. Kuszin, Mons Vihorlat. VI. Herkulesfürdő.

39. *rufilabris* Gyll. — Communis.

40. *subtilis* Hampe. — I. Budapest, Kalocsa, Debreczen. III. Pozsony. V. Teste Bielz.

41. *brunnipes* Muls. — I. Budapest, Péczel. IV. Szobráncz. V. Malomviz, N.-Csűr, Medgyes. VII. Velebit. VIII. Buccari.

42. *varians* Muls. — I. Budapest. II. Apáti, Pécs. III. Trencsén. V. Fogaras, Brassó. VI. Báziás, Oravicza, Dognácska, Herkulesfürdő.

Fam. RHIPIPHORIDAE.

Pelecotoma Fisch.

1. *fennica* Payk. — II. Zircz. III. Vallis Bosácz, N.-Podhrágy. IV. Homonna, Ladomér. V. Kolozsvár, Gyalu, Zernest. VI. Mons Opesata, Korniaréva. VII. Gospić.

Evaniocera Guér.

2. *Dufouri* Latr. — I. Budapest: Sashegy. (Leg. J. Frivaldszky.)

Rhipiphorus F.

3. *paradoxus* L. — I. Budapest, Mátra, Debreczen. II. Pécs. III. Beszterczebánya. IV. Bártfa. V. Brassó, Mons Kereszténvhavas. VI. Resicza.

Emenadia Lap.

4. *larvata* Schrank. — I. Budapest, Csepel, Péczel, Szt-Lőrincz, Peszér. VI. Grebenácz.

Fam. MELOIDAE.

Meloë L.

1. *proscarabaeus* L. — Communis.

2. *violaceus* Marsh. — Frequens.

3. *autumnalis* Ol. — I. Budapest, II. P.-Marót. III. K.-Kálna, Trencsén. V. Sz.-Ujvár, N.-Szeben, Szt-Erzsébet, Sz.-Ujfalu, Hosszufalu, Medgyes.

4. *hungarus* Schrk. — I. Budapest, Dabas, Kalocsa. III. Trencsén. V. Remete, Vizakna, N.-Szeben, Szt-Erzsébet, Medgyes, Torda, Gyeke.

5. *uralensis* Pall. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa, Szeged, Szentes, N.-Várad, Nagy-Szalonta. III. K.-Kálna. IV. Tokaj. V. Vizakna, Montes Cibinenses.

6. *decorus* Brandt. — I. Budapest, Márton-Káta, Kalocsa, N.-Várad. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj. V. Peér, Sz.-Ujvár, Hátszeg, N.-Szeben, Præsbe, Sz.-Ujfalu, Montes Fogarasenses, Földvár.

7. *cicatricosus* Leach. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Debreczen, N.-Várad, Székelyhid. III. Budatin. IV. Sátoralja-Ujhely, Tokaj, Szinna, Varannó, Nagy-Bocskó. V. N.-Csűr, Sz.-Ujfalu, Sz.-Régen. VI. Buziás.

8. *coriarius* Brandt. — I. Budapest, Kalocsa. II. Z.-Tapolcza. V. Szt-Erzsébet, Resinár, Krizba, Brassó, Étfalva.
   v. *rufiventris* Germ. — I. Budapest, Szt-Endre, Kalocsa.

9. *variegatus* Donov. — In toto regno occurrit.

10. *tuccius* Rossi. — I. Isaszeg, Kerepes, Kalocsa. II. Ad lacum Fertő. VI. Temesvár.

11. *erythrocnemus* Pall. — VIII. Fiume, Zengg.

12. *rugosus* Marsh. — I. Budapest, Kalocsa. IV. Bártfa, A.-Bereczki, N.-Bocskó. V. Frequens. VI. Resicza.

13. *scabriusculus* Brdt. — I. Budapest, Kalocsa, N.-Várad, Élesd. IV. S.-A.-Ujhely. V. Szamos-Ujvár, Szelindek, Præsbe, Volkány, Brassó, Segesvár.

14. *brevicollis* Pz. — Frequens.

Cerocoma Geoffr.

15. *Schreberi* F. — I. Budapest, Péczel, Peszér, Félegyháza, Kalocsa, B.-Csaba. II. Apáti, Pécs. IV. A.-Bereczki, Szőllőske, Kövesd, Kaponya, Tokaj. V. N.-Falu, Tasnád, N.-Csűr. VI. Ulma, Grebenácz.

16. *Schäfferi* L. — I. Kalocsa. II. Z.-Tapolcza, Sopron, Pécs. V. Szent-Erzsébet, Nagy-Csűr, Sz.-Ujfalu, Fogaras, Medgyes.

17. *Mühlfeldi* Gyll. — I. Budapest, Kalocsa. II. Apáti, Pécs. III. Sirák, K.-Kálna. IV. Sátoralja-Ujhely, Sáros-Patak. VI. Rakovicza, Ulma, Grebenácz.
   v. *Kunzei* Friv. — V. Kolozsvár (Bielz, 27, pag. 82.).

Zonabris Har.

Mylabris F.

18. *variabilis* Pall. — I. Budapest, Péczel, Isaszeg, Kalocsa, Makó. II. Z.-Tapolcza. IV. Szomotor. V. Szelindek, Nagy-Csűr. VI. Perjámos. VIII. Fiume.

19. *floralis* Pall. — Frequens.
   v. *spartii* Germ. — V. N.-Csűr (sec. Bielz). VII. Mons Bukova-Kusa. VIII. Buccari.
   v. *Dahli* Baudi (*tenera* Germ.) — I. Budapest, Isaszeg, Dabas, Peszér, Hajós, Nagy-Várad. II. Pécs. V. N.-Csűr. VI. Ulma.

20. *flexuosa* Oliv. — Etiam Hungariæ incola. (Marseul, 240, p. 101.)
21. *crocata* Pall. — I. Budapest, Csepel, M.-Káta, Monor, Peszér, Kecskemét, Hajós, Szeged.

Oenas Latr.

22. *crassicornis* Ill. — I. Budapest, Kecskemét, Félegyháza, Szeged, M.-Berény, Székelyhid. II. Karancs. IV. Szerencs. VI. Zsombolya.

Lydus Latr.

23. *europaeus* Escher. — I. Gödöllő, Kalocsa.
24. *trimaculatus* F. — I. Budapest. II. Martonvásár, Sopron, Pécs. IV. Szerencs. V. N.-Szeben, Sz.-Ujfalu, Semesnye. VI. Deliblat.

Halosimus Muls.

25. *syriacus* L. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa, Szeged, Debreczen, N.-Várad, Székelyhid. II. Z.-Tapolcza, Pécs. VI. Janova, Ulma.
chalybaeus Tausch. — V. Gyeke. (Bielz, 27, pag. 83.)
26. *collaris* F. — V. N.-Csűr: Szelindeki hegyek. (Fuss. 183, p. 438.)

Lytta F.

27. *vesicatoria* L. — Communis.
v. *dibapha* Reitt. — VII. Gospić. (Legit M. Padewieth.)

Epicauta Redtb.

28. *verticalis* Ill. *(dubia* Ol.) — I. Budapest, Péczel, Isaszeg, Monor. III. Vallis Bosácz. V. Medgyes. VI. Jeselnicza, Ulma, Grebenácz, Deliblat, Herkulesfürdő.
29. *sibirica* Pall. — VII. Lukovo (Velebit). VIII. Carlopago.

Zonitis F.

30. *immaculata* Ol. *(mutica* Scriba). — I. Budapest, Péczel. V. Medgyes. VI. Jeselnicza, Herkulesfürdő.
31. *fenestrata* Pall. *(praeusta* F.) — I. Budapest, Péczel, Dabas. II. Apáti, Keszthely, N.-Harsány. VII. Diakovár.
32. *sexmaculata* Oliv. — I. Budapest. V. N.-Csűr.
33. *fulvipennis* F. — I. Budapest, Péczel, Monor, Dabas, Peszér, Hajós, N.-Várad. V. Kolozsvár. VI. Duplaj, Ulma, Herkulesfürdő. VII. Ruma.
v. *funeraria* Fairm. — I. Budapest, Péczel.
34. *auricoma* Escher. — I. Budapest, Péczel, Monor, Szeged. VI. Herkulesfürdő.
35. *bifasciata* Swartz. — I. Budapest, Kecskemét. VI. Ulma, Deliblat.
v. *Korbi* Escher. — VI. Ulma. (Leg. J. Frivaldszky.)
v. *atra* Swartz. — II. Ács. VI. Ulma.

Stenodera Esch.

36. *caucasica* Pall. — V. N.-Csűr, Szt-Erzsébet, Brassó, Sz.-Régen, N.-Czég, M.-Záh. VI. Duplaj, Deliblat.

Hapalus F.

37. *bipunctatus* Germ. — I. Budapest. II. D.-Örs, Pécs. III. V.-Mikola, Putnok. IV. Almás, Tolcsva. V. Sz.-Ujvár, Kolozsvár, Medgyes. VI. Temesvár, Herkulesfürdő.
38. *bimaculatus* L. — I. Uj-Pest, Makó. II. Keszthely. V. Sz.-Ujvár, N.-Enyed, Sz.-Régen.
39. *necydaleus* Pall. — I. Peszér. V. Segesvár.
v. *inornatus* Proch. — I. Dabas. (Leg. E. Frivaldszky.)
creticus Friv. — V. Sz.-Régen (sec. Bielz, 27, pag. 83).

Sitaris Latr.

40. *muralis* Forst. — I. Kalocsa, Rézbánya. II. Pécs. IV. Királyháza. V. Tasnád, Medgyes. VI. Temesvár, Utvin.
41. *apicalis* Latr. — I. Budapest, Szent-Lőrincz, Peszér, Kalocsa. VI. Grebenácz.
v. *picicollis* Escher. — I. Peszér. (Legit J. Frivaldszky.)

Fam. PYROCHROIDAE.

Pyrochroa Geoffr.

1. *coccinea* L. — Frequens.
2. *serraticornis* Scop. *(rubens* Schall.) — I. Nagy-Várad, Székelyhid. II. Zircz, Keszthely. III. Beczkó. IV. Kassa, S.-A.-Ujhely, N.-Bocskó. V. Frequens. VI. Herkulesfürdő. VII. Diakovár.
3. *pectinicornis* L. — I. Montes Biharenses. III. Vallis Vrátna, Mons K.-Kriván. IV. Bártfa, Runyina, Montes Beszkidenses. V. Montes Radnaenses: Valea-Vinului, Montes Retyezát, Cibinenses et Kerczenses, Mons Keresztényhavas, Segesvár. VI. Mons Domoglet.

Fam. ANTHICIDAE.

Phytobaenus Sahlb.

1. *amabilis* Sahlb. *(bisbimaculatus* Hampe). — V. Kolozsvár, Gyalu. VI. Resicza, Uj-Moldova. VII. Montes Fruska-Góra.

Euglenes Westw.

2. *pruinosus* Ksw. — I. Budapest, Péczel, Kecs-

kemét, Kalocsa, Makó. II. Ács, Soóly. IV. Tolcsva, Tokaj, A.-Bereczki. V. Tasnád, Hátszeg. VI. Buziás.

3. *oculatus* Gyll. — II. Ács. V. N.-Szeben, Montes Cibinenses. VI. Herkulesfürdő.

4. *pygmaeus* Gyll. *(serricornis* Reitt.) — I. Péczel, Isaszeg. II. Ács. III. Beczkó. IV. Tolcsva, Bély, Terebes, K.-Azar, Homonna. V. Nagy-Szeben, Montes Cibinenses. VI. Herkulesfürdő, Korniaréva.

5. *populneus* Panz — I. Budapest, Mons Pilis, Péczel, Dabas, Kalocsa, N.-Várad, Kóly. II. Ács. III. Beczkó. V. N.-Szeben, Montes Cibinenses, Segesvár. VI. Temesvár. VIII. Fiume.

Macratria Newm.

6. *Leprieuri* Rche. *(hungarica* Hampe). — II. Kanizsa. VII. Pakrac, Kutina.

Notoxus Geoffr.

7. *brachycerus* Fald. — I. Budapest, Csepel. III. K.-Kálna. V. N.-Szeben, K.-Torony, Fogaras, Brassó, Montes Rozsnyóenses, Medgyes.

8. *monoceros* L. — Frequens.

9. *trifasciatus* Rossi. — Ut prior.

10. *miles* Schmidt. — V. Lacus Szt-Annató dictus. VI. Orsova, Herkulesfürdő.

Mecynotarsus Laferté.

11. *serricornis* Panz. — I. Budapest, Kalocsa, Keczel, Horgos. V. N.-Szeben, Holczmány.

Formicomus Laferté.

12. *pedestris* Rossi. — Communis.

Tomoderus Laferté.

13. *dalmatinus* Reitt. — VII. Velebi'. (Leg. J. Pável.)

Anthicus Payk.

14. *longipilis* Bris. — I. Budapest, Derékegyháza. V. Buzamező. VI. Herkulesfürdő.

15. *humilis* Germ. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa, Szeged, Debreczen. II. Ács, Lacus Fertő. IV. S.-A.-Ujhely, Czéke, Terebes, N.-Mihály. V. Déva, Vizakna, Fogaras, Brassó, Hosszufalu, Medgyes, Segesvár. VI. Temesvár.

16. *floralis* F. — Frequens.

17. *gracilis* Panz. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Nyiregyháza. II. Lacus Fertő, Apáti. III. Agárd. IV. Szomotor. V. N.-Szeben, M.-Záh. VI. Herkulesfürdő.

18. *Schmidti* Rosenh. — I. Budapest, Kalocsa. II. Ács.

19. *transversalis* Villa (*longicollis* Schmidt). — Teste Küster etiam Hungariæ incola. (236, XVIII. 62.)

20. *hispidus* Rossi. — I. Budapest, Péczel, Kecskemét, Kalocsa, Nyiregyháza, Debreczen, Lunka. II. Ács, Baán, Soóly. IV. S.-A.-Ujhely, Szőllőske, Tokaj. V. Hátszeg, Vizakna, Fogaras, Segesvár. VI. Báziás, Stájerlak, Herkulesfürdő. VII. Diakovár. VIII. Martinšćica.

21. *antherinus* L. — Frequens.

22. *bifasciatus* Rossi. — I. Budapest, Kalocsa, Nyiregyháza. II. D.-Örs. IV. Gálszécs. V. Hátszeg, Sz.-Ujfalu, N.-Sink, Segesvár, Sz.-Régen. VI. Herkulesfürdő.

23. *quadrioculatus* Laf. — III. Beczkó. (Leg. Dr. C. Brancsik, 40, p. 35.)

24. *ater* Panz. — I. Péczel. (Leg. D. Kuthy.)

25. *fenestratus* Schmidt. — V. N.-Szeben. (Bielz, 27, p. 82.)

26. *flavipes* Pz. — I. Budapest, N.-Várad. II. Ács. V. Vöröstorony, ad fluvium Olt. VI. Herkulesfürdő.

27. *axillaris* Schmidt. — Frequens.

28. *bimaculatus* Illig. — I. Budapest, Kalocsa.

29. *sellatus* Pz. — I. Kalocsa, Foktő. IV. S.-A.-Ujhely, Szőllőske.

30. *nectarinus* Pz. — I. Budapest. (Leg. L. Biró.)

31. *Lederi* Mars. — VII. Velebit (sec. J. Frivaldszky).

32. *unicolor* Schmidt. — I. Budapest, Péczel. II. Ács, Szegzárd. IV. Tarczal. V. N.-Csür, Sz.-Régen.

33. *Frivaldszkyi* Laf. — Secundum Marseul est solum Hungariæ incola. (241, p. 231.)

Ochthenomus Schmidt.

34. *tenuicollis* Rossi. — I. Budapest, N.-Várad. IV. Tolcsva, ad fluvium Olt. V. Fogaras. VI. Temesvár, Grebenácz. VII. Diakovár.

Fam. OEDEMERIDAE.

Calopus Fabr.

1. *serraticornis* L. — I. Budapest. V. Kis-Somlyó, Gyergyó. VI. Herkulesfürdő.

Sparedrus Serv.

2. *testaceus* And. — I. Budapest, Péczel. II. Pécs. III. V.-Mikola, Trencsén. V. N.-Ápold. VI. Herkulesfürdő. VII. Švica.

Ditylus Fisch.

3. *laevis* F. — III. Hermánd, Sztrecsnó (Vallis Ozhora).

Xanthochroa Schmidt.

4. *carniolica* Gistl. — III. Szitnya (Com. Hont). VI. Herkulesfürdő.
5. *gracilis* Schmidt. — VII. Capella. (Leg. E. Reitter, 297, p. 224.)

Nacerdes Schmidt.

6. *melanura* L. — I. N.-Várad. IV. N.-Bocskó. V. Hátszeg.
7. *rufiventris* Scop. — I. Kalocsa, Montes Biharenses. III. Beszterczebánya, Trencsén, T.-Szent-Márton, Koritnyicza, Putnok. IV. Vallis Fajna, Luhi. V. Dobra, Montes Kerczenses, Borgó, Deés. VI. Herkulesfürdő, Rumunyest.
8. *ustulata* F. — I. Budapest, Dabas, Kecskemét. II. Keszthely. III. Hermánd, Vallis Vrátna, Koritnyicza, Tátrafüred, Kézsmárk. IV. Körtvélyes. V. K.-Talmács, Sz.-Régen. VI. Ulma, Herkulesfürdő. VII. Fiume.
9. *fulvicollis* Scop. — I. Kalocsa. III. Hermánd, Vallis Vrátna, Mons K.-Kriván, Koritnyicza, Tátrafüred. IV. Luhi. V. Dobra.
10. *ruficollis* F. — I. Kalocsa. (Leg. F. Speiser, 349, p. 39.)
11. *viridipes* Schmidt. — I. Budapest, Csepel, Szent-Lőrincz, Peszér, Szeged.
12. *austriaca* Ganglb. — Hungaria. (Leg. E. Frivaldszky.)
13. *adusta* Panz. — II. Zákány. III. Beczkó. V. N.-Szeben, N.-Csür, Vöröstorony, Montes Kerczenses, Medgyes, Borszék, Sz.-Régen, Kolozsvár. VI. Herkulesfürdő. VII. Diakovár.

Asclera Schmidt.

14. *sanguinicollis* F. — I. Rézbánya. III. Hermánd, Mons K.-Kriván. IV. Bártfa, Montes Rabaszkala et Vihorlat. V. Montes Kerczenses, Fogaras, Brassó (Czenk), Gyulafalva. VI. Mons Domoglet.
15. *coerulea* L. — Frequens.

Opsimea Mill.

16. *quadrinervosa* Reiche (*ventralis* Mill.) — VII. Capella. (Reitter, 297, p. 225.)

Oncomera Steph.

17. *femorata* F. — II. Keszthely, N.-Harsány III. Hermánd, ad ripam fluvii Poprád. V. Szelindek, Bisztratelep, Bölön. VI. N.-Bogsán, Herkulesfürdő.

Oedemera Oliv.

18. *podagrariae* L. — Communis.
19. *penicillata* Schmidt. — VI. Grebenácz. (Leg. J. Frivaldszky.)
20. *flavescens* L. — Communis.
21. *subulata* Ol. — I. Montes Biharenses. III. Tavarnok, Mons K.-Kriván, Koritnyicza, Tátrafüred. IV. Almás, Szádellő. V. N.-Csür, Vöröstorony, Oláhfalu. VI. Herkulesfürdő, Rumunyest. VII. Velebit.
    v. *vittata* Friv. — III. Koritnyicza. VI. Szászka.
22. *lateralis* Schmidt. — I. Budapest. VI. Ulma.
23. *tristis* Schmidt. — III. Vallis Vrátna, Zsolna. V. Montes Radnaenses: ad balneum Valea-Vinului.
24. *cyanescens* Schmidt. — VIII. Fiume. (Miller, 253, p. 6.)
25. *nobilis* Scop. — VIII. Fiume, Crkvenica, Carlopago.
26. *flavipes* F. — I. Budapest. II. Pécs. III. Tátrafüred. IV. Torna, Sátor-Alja-Ujhely, S.-Patak, Tolcsva, Tokaj. VI. Oravicza, Herkulesfürdő, Rumunyest. VIII. Fiume, Buccari.
27. *annulata* Germ. — VI. Báziás, Orsova, Herkulesfürdő, Rumunyest. VII. Lukovo (Velebit).
28. *croceicollis* Gyll. — I. N.-Várad. II. Ács. III. Borosznó, Tátrafüred. V. N.-Csür.
29. *virescens* L. — Communis.
30. *lurida* Marsh. — Ut prior.

Chrysanthia Schmidt.

31. *viridissima* L. — I. Mons Pilis. III. Beszterczebánya, Hermánd, Vallis Vrátna, Koritnyicza, Tátrafüred. V. Montes Fogarasenses, Szász-Régen, Gyergyó.
32. *viridis* Schmidt. — III. Vallis Vrátna, Tátrafüred. IV. Homonna, A.-Bereczki. V. Frequens. VI. Ferenczfalva.

Fam. PYTHIDAE.

Pytho Fabr.

1. *depressus* L. — V. Vallis Czód, Præsbe, Montes Felekenses et Kerczenses, Brassó, Segesvár, Vallis ad Görgény, Montes ad fluv. Maros.

Lissodema Curt.

2. *4-pustulatum* Mrsh. — I. Budapest. II. N.-Vázsony, Apáti. III. Beczkó. VI. Ferenczfalva, Herkulesfürdő.
3. *cursor* Gyll. — I. Budapest. IV. M.-Sziget. V. N.-Szeben.

Salpingus Gyll.

4. *ater* Payk. — IV. Czéke. (Leg. Dr. C. Chyzer.)
5. *mutilatus* Beck. — I. Parád. (Leg. J. Pável.)
6. *foveolatus* Ljungh. — III. Zsolna, Tátrafüred. V. Fogaras.

Rhinosimus Latr.

7. *viridipennis* Latr. — I. Budapest, Péczel. II. Z.-Tapolcza, Pécs. III. Vallis Vrátna. IV. Torna, Varannó, Mons Hoverla. V. N.-Csür, Sz.-Ujfalu, Segesvár. VI. Ferenczfalva, Herkulesfürdő.
8. *ruficollis* L. — I. Budapest, Montes Biharenses. II. Zircz. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, Varannó, Mons Hoverla. V. N.-Csür, Sz.-Ujfalu, Zernest, Mons Nagykőhavas, Segesvár, VI. Herkulesfürdő.
9. *planirostris* F. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. IV. Gálszécs. Mons Szinnaikő. V. N.-Csür, K.-Disznód, Montes Kerczenses, Brassó, Segesvár. VI. Oravicza, Ferenczfalva, Herkulesfürdő.
10. *aeneus* Oliv. — I. Budapest. (Leg. J. Pável.)

Mycterus Oliv.

11. *curculionoides* F. — II. Felsőlő. IV. S.-Patak. V. Kolozsvár, Sz.-Régen. VII. Vrdnik, Rakovica.
12. *umbellatarum* F. — I. Budapest, Szeged, Nagy-Várad. IV. S.-A.-Ujhely, Tolcsva. V. Sz.-Régen, K.-Talmács, Medgyes, Gy.-Tölgyes. VII. Diakovár.

Fam. CURCULIONIDAE.

Otiorrhynchus Germ.

1. *inflatus* Gyll. — I. Budapest, Eger, Dabas, Nagy-Várad. II. Pécs. III. Vallis Vrátna, Mons K.-Kriván, T.-Teplicz, Mons Chocs, Felka, Tátrafüred. VI. Herkulesfürdő. VII. Velebit.
   v. *salebrosus* Boh. — I. Kalocsa, Hajós. VII. Montes Fruska-Góra, Diakovár.
2. *lauri* Stierl. — VII. Fužine. (Leg. L. Biró.)
   Heydeni Stierl. — Hungaria. (Auctor, 250, p. 39.)
3. *pulverulentus* Germ. — I. Remecz. III. K.-Poruba. IV. Mons Hoverla. V. Ad balneum Valea-Vinului, V.-Hunyad, Vallis Zsil, Fogaras, Brassó. VI. Uj-Moldova, Jeselnicza, Herkulesfürdő. VII. Fužine. VIII. Fiume.
   v. *Hopffgarteni* Tourn. — III. Com. Trencsén: Montes Vrátnaenses. (Leg. Dr. C. Brancsik, 42, p. 67.)
   v. *periscelis* Gyll. — I. Montes Biharenses. V. Bisztratelep, Montes Czódenses (Porkovicza) et Kerczenses, Brassó (Czenk), Segesvár, Hosszufalu. VI. Oravicza, Szászka, Uj-Moldova, Herkulesfürdő. VII. Velebit.
   v. *adumbratus* Stierl. — I. Montes Biharenses. VI. Herkulesfürdő. VII. Fužine, Risnjak. VIII. Carlopago.
   v. *rumicis* Apfelb. — V. In reg. alpinis. (Auctor, 8, p. 643.)
   v. *conspurcatus* Stierl. — I. Montes Biharenses. IV. Mons Simonka, Montes Beszkidenses. V. Mons Keresztényhavas, Brassó. VI. Herkulesfürdő.
4. *geniculatus* Germ. — I. Remecz. III. Trencsén, Putnok. V. Brassó, O.-Láposbánya.
5. *contractus* Stierl. — I. Montes Biharenses. V. Veresmart, Montes Kerczenses. VI. Herkulesfürdő.
6. *Moldovensis* Apfb. — VI. Moldova. (Detexit E. Merkl; Auctor, 8, p. 654.)
7. *obsoletus* Stierl. — VI. Herkulesfürdő, Mons Szárko.
   v. *aethiops* Apfelb. — VI. Karansebes. (Auctor, 8, p. 649.)
8. *dalmatinus* Gyll. — VIII. Fiume. (Leg. L. Biró.)
9. *pruinosus* Germ. — II. Pécs. VII. Mrzla-Vodica. VIII. Fiume, Martinšćica, Buccari.
   v *turgidus* Germ. — VII. Teste Apfelbeck. (8, p. 635.)
10. *mastix* Oliv. — I. Kalocsa, Hajós, N.-Várad. II. Z.-Tapolcza, Kőszeg, N.-Harsány, Pécs. VI. Herkulesfürdő. VII. Mons Bukova-Kusa, VIII. Fiume, Carlopago.
11. *cardiniger* Host. — VIII. Fiume, Martinšćica, Buccari, Carlopago.
12. *truncatus* Stierl. — VII. Mons Bukova-Kusa, Fužine, Ljeskovac.
13 *sensitivus* Scop. — VII. Risnjak, Fužine, Mrzla-Vodica.
14. *latipennis* Boh. — VII. Fužine, Capella. VIII. Fiume.
15. *sabulosus* Gyll. — VI. Secundum Schönher. VII. Velebit.
16. *latissimus* Stierl. — V. Mons Keresztényhavas, Brassó.
17. *scabripennis* Gyll. v. *obsitus* Gyll. — VIII. Fiume, Buccari.
18. *multipunctatus* F. — II. Pécs. III. Zsolna, Koritnyicza, Tátrafüred. V. Montes Cibinenses. VI. Brassó.
19. *sulphurifer* Oliv. — Teste Schönher colit etiam Hungariam. (339, VII, p. 260.)
20. *bisulcatus* F. — II. Z.-Tapolcza. IV. Jeszenő, N.-Bocskó. V. Déva, N.-Ápold, Fogaras, Mons Keresztényhavas, Brassó, Segesvár. VI. Oravicza, Mons Domoglet.
   v. *longicollis* Gyll. — V. Brassó: Mons Czenk. (Leg. L. Méhely, 246, p. 279.)
21. *griseopunctatus* Boh. — V. Frequens.
   v. *clavipes* Boh. — V. Brassó. (Leg. L. Méhely, 245, p. 279.)
22. *irritans* Herbst. — Creber.

23. *tenebricosus* Herbst. — V. Mons Keresztényhavas, Brassó.
24. *hungaricus* Germ. — I. Budapest, Peszér. II. Pécs. III. K.-Kálna. IV. Vallis Visó. V. Frequens. VIII. Fiume.
25. *niger* F. — III. Benyus, Mihálytelek, Benesháza, Karám, Dobrocs, Mons K.-Kriván, N.-Lipcse, Koritnyicza, Tátrafüred. IV. Montes Simonka et Hoverla, Vallis Fajna. V. Montes Czódenses, Szelistye, Montes Kerczenses, Fogaras, Brassó, Hosszufalu, Borszék, Montes ad fluv. Maros.
v. *villosopunctatus* Gyll. — I. Budapest, Montes Biharenses. III. Vallis Vrátna, Koritnyicza. IV. Mons Hoverla. V. Montes Kerczenses, Borszék.
v. *montanus* Boh. — III. Mons K.-Kriván, Koritnyicza, Mons Prasiva, Tátrafüred. IV. Mons Hoverla. V. Montes Kerczenses, Montes Bucsecs et Királykő, Segesvár.
v. *coecus* Germ. — V. Montes Cibinenses. (Bielz, 27, p. 84.)
26. *fuscipes* Ol. — In regionibus subalpinis creber.
v. *fagi* Gyll. — V. Montes Cibinenses, Brassó.
27. *laevigatus* F. — Frequens.
28. *concinnus* Gyll — Teste Schönher etiam Hungariæ incola. (339, VII, p. 282.)
29. *nobilis* Germ. — V. N.-Szeben. (Leg. C. Fuss.)
30. *morio* F. (*unicolor* Hbst.) — III. Várna, Zsolna, Lucski, F.-Bocza, Á.-Váralja, Mons Chocs. IV. Montes Rabaszkala, Hoverla et Pietrosz. V. Mons Ünökő, Vallis Zsil, Montes Kerczenses, Mons Tészla, Montes ad fluv. Maros.
v. *ebeninus* Gyll. — III. Mons K.-Kriván, Koritnyicza, Mons Chocs, Tátrafüred. V. Montes Kerczenses, Montes Királykő, Keresztényhavas et Bucsecs, Segesvár. VI. N.-Bogsán, Szulicza, Korniaréva.
v. *memnonius* Gyll. — V. Mons Bucsecs. (Bielz, 27, p. 84.)
31. *plumipes* Germ. — VII. Fužine, Velebit.
32. *crinipes* Mill. (*valachiae* Fuss.) — III. Trencsén, T.-Teplicz. V. Tömös.
33. *Kelecsényii* Friv. — III. Tavarnok. VI. Drenkova.
34. *cribrosus* Germ. — VII. Fužine, Plitvica.
35. *arrogans* Friv. — II. Pécs. (Detexit J. Pável.)
36. *repletus* Boh. — IV. Szinna, Mons Vihorlat.
37. *raucus* F. — Frequens.
38. *perdix* Oliv. — III. Beszterczebánya, Hermánd, Vallis Vrátna, Mons K.-Kriván, Tátrafüred. V. Montes Retyezát, K.-Talmács, Vöröstorony, Montes Felekenses, Mons Sánta, Montes Kerczenses et Árpásenses, Fogaras, Brassó. VI. Herkulesfürdő, Korniaréva. VIII. Fiume.
39. *banaticus* Stierl. — VI. Orsova, Herkulesfürdő.
40. *remotegranulatus* Stierl. — Hungaria. (Detex. A. Ormay; Auct., 264, p. 270.)
41. *chrysomus* Boh. — V. Zilah, Kolozsvár. VI. Jeselnicza, Herkulesfürdő, Karansebes.
42. *intercalaris* Boh. — Secundum Schönher incolit regionem VI. (339, VII, p. 313.)
43. *necessarius* Stierl. — VI. Herkulesfürdő. VII. Medak.
44. *plebejus* Stierl. — VII. Teste Hampe. (Auctor, 350, p. 142.)
45. *conspersus* Germ. — I. Budapest, Dabas, Peszér, Kalocsa, Hajós, N.-Várad. II. Pécs. V. N.-Csür, Berethalom.
46. *rugosostriatus* Goeze. — I. Budapest. II. Apáti. VI. Herkulesfürdő. VIII. Fiume.
47. *Ormayi* Stierl. — V. Montes Porumbákenses. (Detex. A. Ormay, 264, p. 38.)
48. *argenteus* Stierl. — VI. Herkulesfürdő, Korniaréva.
49. *mandibularis* Redtb. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Szeged. III. V.-Mikola, Montes Babia-Gura. VI. Grebenácz.
v. *granulosus* Boh. — I. Budapest, Palota, Péczel, Debreczen. III. V.-Mikola. V. Kolozsvár. VI. Grebenácz, Korniaréva.
50. *tatricus* Reitt. — III. Tátra. (Auctor, 323, p. 105.)
51. *scaber* L. — II. Kőszeg. III. Montes K.-Kriván et Chocs, Tátrafüred. IV. Bártfa, N.-Bocskó, Mons Hoverla, Luhi. V. Frequens.
52. *Kuenburgi* Stierl. — IV. Mons Hoverla, Rahó. V. Montes Brassóenses, Mons Királykő.
53. *obtusus* Boh. — In regione V. (Leg. E. Frivaldszky.)
54. *Troyeri* Stierl. — In reg. VII. (Auctor, 354, p. 464.)
55. *costipennis* Rosh. — V. Præsbe, Montes Cibinenses, Cibinjézer, Montes Kerczenses et Árpásenses.
56. *antennatus* Stierl. — V. Montes Paring et Surian, Montes Sebesenses, Cibinjézer, Montes Kerczenses, Fogarasenses et Brassóenses. VI. Korniaréva.
57. *proximus* Stierl. — III. Mons K.-Kriván, Koritnyicza, Mons Chocs. IV. Montes Pietrosz et Turkul. V. Montes Korongyos et Ünökő, Montes Felekenses, Lacus Girbova, Montes Kerczenses, Mons Negoi, Lacus Bulea.
58. *hypsibatus* Ganglb. — V. Montes Radnaenses: Mons Korongyos. (Auctor, 399, p. 184.)
59. *lasius* Germ. — VII. Capella. (Reitter, 295, p. 54.)

60. *nodosus* F. — III. Trencsén, Koritnyicza, Mons Chocs, Tátra (Zöldtó). IV. Cserna-Hóra, Luhi, Mons Pop Iván. V. Mons Sánta. (Montes Cibinenses.)
v. *comosellus* Boh. — I. Montes Biharenses. III. Tátrafüred. IV. Mons Breczkul. (Com. Marmaros.)
61. *alpinus* Richter. — III. Trencsén, Koritnyicza, Tátrafüred. IV. Cserna-Hóra, Mons Tomnatek (Com. Marmaros). VI. Herkulesfürdő.
62. *patruelis* Stierl. — Hungaria. (Auctor, 350, p. 175.)
63. *lithanthracius* Boh. — V. Montes Cibinenses. (Bielz, 27, p. 84.)
64. *denigrator* Boh. — IV. Montes Breczkul et Lungacsász. V. Hátszeg, Cibinjézer, Mons Negován.
v. *Ocskayi* Srierl. — VI. Herkulesfürdő. (Mons Moldoven.)
65. *praecellens* Stierl. — Hungaria mer. (Auctor, 357, p. 282.)
politus Gyll. — Hungaria. (Cat. Col. Eur., 1891, p. 274.)*
66. *glabratus* Stierl. — III. Szecsa, Mons Oroszlánkő (Com. Trencsén). IV. Szádellő. V. Frequens.
67. *singularis* L. — I. Budapest. III. Lőcse.
68. *labilis* Stierl. — In regione V. (Auctor, 354, p. 483.)
69. *Milleri* Stierl. — In reg. VII. (Auctor, 354, p. 488.)
70. *duinensis* Germ. VII. Fužine, Gospić.
71. *signatipennis* Gyll. — II. Pécs. VI. Diakovár. VII. Fužine, Gospić.
72. *illyricus* Stierl. — VII. Capella, Gospić.
73. *inductus* Gyll. — VII. Teste Stierlin. (350, p. 336.)
74. *seductor* Stierl. — V. Secundum Bielz. (27, p. 84.)
75. *Kollari* Gyll. — I. Montes Biharenses. III. Beszterczebánya, Hermánd, Rajecz, Mons K.-Kriván, Vallis Bisztra (Com Árva). IV. Luhi, Mons Pietrosz. V. Præsbe, Montes Felekenses et Kerczenses, Mons Kereszténvhavas, Brassó, Montes Bodzaenses, Balánbánya, Borszék.
v. *Bielzi* Küst. — V. Præsbe, Montes Felekenses, Kerczenses, Fogarasenses, Brassóenses et ad fluvium Maros.
v. *Küsteri* Stierl. — IV. N.-Bocskó. V. Montes Kerczenses et Brassóenses.
76. *Deubeli* Ganglb. — V. Montes Radnaenses: ad balneum Valea-Vinului. (Auctor, 399, p. 185.)
77. *Schaumi* Stierl. — IV. Mons Hoverla, Vallis Suliguli, Mons Turkul. V. Montes Kerczenses et Árpásenses, Mons Kereszténvhavas, Montes Bodzaenses, Borszék, Balánbánya, Mons Ünökő.
78. *equestris* Richter. — II. Pécs. III. Mons Mincsol, Ruttka, Koritnyicza, Vallis Bisztra, Mons Chocs, Tátrafüred, Javorina. IV. Montes Szinnaikő et Rabaszkala, Visk. V. Teste Bielz. VI. Karansebes.
v. *regularis* Stierl. — III. Mons Prasiva. (Leg. J. Pável.)
79. *austriacus* F. — In regionibus subalpinis occurrit.
v. *carinatus* Gyll. — III. Tátrafüred. V. Kolozsvár.
80. *Méhelyi* Stierl. V. Brassó: Mons Kereszténvhavas. (Auctor, 414, p. 300.)
81. *costatus* Stierl. — VII. Vrhovine, Perušic.
82. *croaticus* Stierl. — VII. Teste Hampe. (Auctor, 350, p. 258.)
83. *graniventris* Mill. — III. Hermánd, Mons K.-Kriván, Koritnyicza, Mons Chocs, Tátra (Bélapatak). V. Balánbánya Oecsém, N.-Hagymás.
84. *longiventris* Küst. — V. Montes Cibinenses, Cibinjézer, Mons Szurul, Montes Felekenses, Kerczenses, Árpásenses, Fogarasenses, Brassóenses et ad fluv. Maros.
85. *Riessi* Fuss. — V. Lacus Bulea, Montes Brassóenses, Mons Bucsecs, Montes Csikenses.
86. *lavandus* Germ. — I. Budapest, Kalocsa. VI. Uj-Moldova. VII. Kamenica.
87. *corruptor* Host. — V. Brassó (sec. Bielz). VII. Mons Bukova-Kusa. VIII. Fiume, Buccari, Carlopago, Zengg.
88. *polycoccus* Gyllh. — V. Balánbánya (Vigyázókő). VI. Uj-Moldova, Herkulesfürdő, Korniaréva.
89. *infernalis* Germ. — VII. Risnjak, Fužine, Raduč, Ljeskovac. VIII. Fiume.
90. *curvipes* Stierl. — V. Teste Bielz. (27, p. 84.)
91. *rugosus* Humm. — V. Brassó. (Bielz, 27, p. 84.)
92. *squameus* Boh. — Secundum Schönher solum Hungariæ incola. (339, VII, p. 291.)
93. *alpigradus* Mill. — III. Mons Djumbir (Com. Liptó). IV. Mons Tomnatek (Com Marmaros). V. Borszék, Montes Cibles et Ünökő.
94. *granicollis* Boh. — V. Montes Fogarasenses, Mons Királykő, Montes Brassóenses. VI. Korniaréva.
95. *Kratteri* Boh. — III. Benyus, Koritnyicza. IV. Áj, Mons Rabaszkala, O.-Ruszka, Mons Hoverla, Luhi, Montes Pietrosz et Pop-Iván. V. Montes Kerczenses, Brassó, Gy.-Tölgyes, Montes Radnaenses. VIII. Fiume.
96. *egregius* Mill. — IV. Cserna-Hóra, Mons Pietrosz. V. Montes Fogarasenses et Brassóenses, Mons Kereszténvhavas.

* Secundum Stierlin non Hungariæ sed Sibiriæ occidentalis incola. (351, p. 374.)

97. *confinis* Friv. – IV. Montes Pietrosz et Pop-Iván. (Auctor, 111, 1888, p. 162.)
98. *corvus* Boh. — III. Mihálytelek, Benesháza, Karám, Dobrocs, Hermánd, Mons K.-Kriván, N.-Lipcse, Koritnyicza, Deménfalu, Árva-Váralja, Tátrafüred. IV. Mons Simonka, Szinna, O.-Ruszka, N.-Bocskó. V. Görgény. VI. Herkulesfürdő. VIII. Fiume.
99. *obsidianus* Boh. — I. Montes Biharenses. IV. Mons Rabaszkala, O.-Ruszka, Szinna, Montes Szinnaikő, Vihorlat et Simonka, N.-Bocskó, Vallis Fajna, Mons Pop-Iván.
100. *montigena* Friv. — V. Montes Görgényenses. (Auctor, 111, 1888, p. 161.)
101. *asplenii* Mill. — IV. Cserna-Hóra, Montes Breczkul et Pietrosz. V. Szováta, Mons Hargita, Montes Radnaenses.
102. *lugens* Germ. — VII. Fužine. (Miller, 253, p. 6.)
103. *gemmatus* Scop. — II. Kőszeg. VII. Mons Bukova-Kusa, Fužine.
v. *chlorophanus* Boh. — VII. Fužine. (Miller, 253, p. 6.)
104. *Brusinae* Stierl. — In regione VII. (Auctor, 359, p. 9.)
105. *Fussi* Küst. — I. Vallis Jád (Com. Bihar), Remecz. V. Kolozsvár, Mons Sánta, Vallis Zsil, K.-Disznód, Montes Kerczenses, Brassó, Montes Keresztényhavas et Nagykőhavas, Borszék, Montes ad fluv. Maros, Borgó.
106. *dives* Germ. — I. Montes Biharenses. V. Frequens. VI. Ferenczfalva, Herkulesfürdő.
107. *cymophanus* Germ. — V. Montes Cibinenses et Kerczenses, O.-Láposbánya. VI. Oravicza, Anina, Ferenczfalva, Mons Domoglet, Rumunyest.
108. *opulentus* Germ. — IV. N.-Bocskó, Cserna-Hóra, Vallis Fajna, Luhi, Mons Pop-Iván. V. Ad balneum Gyögy, Mons Sánta, Præsbe, K.-Disznód, A.-Grohot, O.-Láposbánya.
109. *sulcatus* F. — II. Z.-Tapolcza. V. Segesvár.
110. *Kraatzi* Stierl. — Hungaria. (Auctor, 350, p. 222.)
111. *populeti* Boh. — I. Budapest, Kecskemét. V. Montes Kerczenses. VI. Báziás, Stájerlak, Langenfeld, Oravicza, Herkulesfürdő.
112. *auricapillus* Germ. — I. Mons Pilis. V. Montes Biharenses.
113. *angustior* Rosenh. — VI. Oravicza. (Stierlin, 350, p. 231.)
114. *tristis* Scop. — II. Z.-Tapolcza. V. Kolozsvár, Sz.-Ujvár, Miriszló, Szt-Erzsébet.
115. *velebiticus* Stierl. — VII. Velebit. (Auctor, 363, p. 56.)
116. *globus* Boh. — Secundum Schönher habitat etiam in Hungaria. (339, VII, p. 386.)
117. *alpicola* Boh. v. *binominatus* Fauv. (*Brancsiki* Stierl.)— III. Montes K.-Kriván, Prasiva et Chocs.
v. *aterrimus* Boh. — V. Mons K.-Kriván. (Brancsik, 40, p. 37.)
118. *squamosus* Mill. — III. Trencsén. (Leg. J. Frivaldszky.)
v. *squamulatus* Stierl. — In regione V. (Cat. Col. Eur., 1891, p. 276.) *
119. *lepidopterus* F. — III. Árvaváralja, Rozsnyó, Tátra (Marmotahegy). IV. Montes Hoverla, Pietrosz et Pop-Iván. V. Mons Sánta, Præsbe, Montes Sebesenses, Borgó, Görgény, ad balneum Valea-Vinuli.
120. *Apfelbecki* Stierl. — In reg. VII. (Auctor, 358, p. 390.)
121. *tenuicornis* Mill. — V. Teste Seidlitz. (345, p. 629.)
122. *auricomus* Germ. — III. Mons Mincsol (Com. Trencsén). V. Teste E. Frivaldszky.
123. *Reichei* Stierl. — I. Rézbánya. V. Tinód, Vallis Czód.
124. *crataegi* Germ. — VII. Gospić. VIII. Fiume.
125. *fusciventris* Fuss. — V. Montes Brassóenses, Mons Bucsecs.
v. *Scribae* Clement. — V. Mons Bucsecs (Bielz, 27, p. 84.).
126. *rufomarginatus* Stierl. — In regione V. (Auctor, 354, p. 526.)
127. *Hampei* Stierl. — V. Teste Hampe (Auctor, 350, p. 200.).
128. *elegantulus* Germ. — VII. Zágráb, Károlyváros, Fužine, Mons Sveto-Brdo, Gospić. VIII. Fiume.
129. *rugicollis* Germ. — IV. N.-Mihály. V. Teste Bielz.
130. *pachyscelis* Stierl. — VI. Szászka, Herkulesfürdő.
131. *tumidipes* Stierl. — VII. Gospić. (Legit L. Biró.)
132. *marmota* Stierl. — I. Montes Biharenses. V. Montes Paring et Karsia. VI. Herkulesfürdő, Korniaréva.
133. *pinastri* Hbst. — VII. Mons Bukova-Kusa. (Leg. J. Pável.)
134. *multicostatus* Stierl. — VII. Mons Bukova-Kusa, Gospić. VIII. Fiume.
135. *horridus* Stierl. — In regione VII. (Cat. Col. Eur., 1891, p. 276.).

* Teste Auctore inhabitat Styriam et non Hungariam. (350, p. 211.)

136. *Sequensi* Reitt. — VII. Gospić. (Leg. J. Pável).
137. *rugifrons* Gyll. — V. Oláhfalu (Bielz, 27, pag. 84.).
v. *impoticus* Boh. — VI. Korniaréva (sec. J. Frivaldszky.).
138. *chrysocomus* Germ. — V. Vallis Czód, Mons Sánta, Præsbe, Montes Kerczenses. VI. Mons Domoglet, Korniaréva.
139. *ligustici* L. — Communis.
v. *agnatus* Gyll. — I. Budapest, Insula Csepel. V. A.-Tömös.
140. *edentatus* Seidl. — V. Előpatak, Segesvár.
141. *subrotundatus* Stierl. — III. Zsolna. V. Brassó (Czenk).
142. *cuprifer* Stierl. — In regione VI. (Auctor, 350, p. 270.).
143. *alutaceus* Germ. — VI. Uj-Moldova. VII. Raduč. VIII. Fiume, Carlopago.
v. *punctatissimus* Gyll. — VII. Fužine. (Legit J. Pável.)
144. *orbicularis* Herbst. — Frequens.
145. *petrensis* Boh. — Solum Hungariam incolit. (Stierlin, 360, p. 229.)
146. *gyraticollis* Stierl. — VII. Raduč. (Leg. J. Pável.)
147. *cribricollis* Gyll. — V. Balánbánya. (Legit C. Fuss.)
148. *humilis* Germ. — Hungaria. (Cat. Col. Eur., 1891, p. 277.)
149. *velutinus* Germ. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. Ács.
150. *Desbrochersi* Stierl. — In montibus Carpathicis. (Auctor, 415, p. 44.)
151. *fullo* Schrank. — I. Budapest, Mons Pilis, Péczel. II. N.-Vázsony, Pécs. III. Tavarnok. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj, Szinna. V. Vallis Zsil, N.-Csűr, Szt-Erzsébet, Brassó, Medgyes, Szász-Régen.
152. *coarctatus* Stierl. — III. Rozsnyó. IV. Torna, Jászó, S.-A.-Ujhely, Körtvélyes. V. Kolozsvár, N.-Szeben, Vöröstorony, Mons Keresztényhavas, Brassó (Czenk). VI. Kazán, Herkulesfürdő.
153. *scopularis* Hochh. — VIII. Fiume, Buccari.
154. *pauxillus* Rosh. — I. Montes Biharenses. III. F.-Bocza, Tátra (Lersch villa). IV. Bártfa, Mont. Szinnaikő et Lungacsásza. V. Frequens. VI. Resicza, Uj-Moldova, Herkulesfürdő, Korniaréva, Karansebes.
v. *rugirostris* Stierl. — III. Vallis Turó (Com. Trencsén), Koritnyicza, F.-Bocza. VI. Grebenácz, Resicza, Herkulesfürdő.
155. *subsetulosus* Stierl. — In reg. V. (Detexit A. Ormay; Auct, 362, p. 270.)
156. *maxillosus* Gyll. — I. Budapest. II. Veszprém. V. Kolozsvár. VII. Velebit.
157. *imitatus* Tourn. — V. Montes Kerczenses. (Bielz, 27, p. 84.)
158. *bidentatus* Stierl. — V. Segesvár. (Legit Dr. C. Petri, 269, p. 10.)
159. *gibbicollis* Boh. — V. Brassó. (Legit L. Méhely, 245, p. 226.)
160. *glabellus* Rosh. — VII. Raduč, Vagan, Mons Sveto-Brdo.
161. *transsylvanicus* Stierl. — In regione V. (Auctor, 359, p. 320.)
162. *ovatus* L. — Frequens.
163. *chrysops* Herbst. — VIII. Fiume, Carlopago.
164. *Hopffgarteni* Tourn. — VI. Teste Hopffgarten. (176, p. 98.)
165. *anophthalmus* Schmidt. — VII. Velebit. (Leg. E. Reitter, 299, p. 226.)

Stomodes Schönh.

166. *gyrosicollis* Boh. — I. Budapest, Kalocsa, Csongrád. II. Nagy-Vázsony, Baán, Pécs. III. Tavarnok, Zsolna, Trencsén. IV. Komjáti, S.-A.-Ujhely, Tokaj, Szinna. V. Vallis Zsil, N.-Szeben, N.-Csűr, Sz.-Ujfalu, Sz.-Régen. VII. Mons Sveto-Brdo.
v. *gracilior* Brancsik. — III. Beczkó: Vallis Lasid. (Detex. Auctor, 40, p. 37.)

Peritelus Germ.

167. *hirticornis* Hbst. — I. Budapest. II. Zircz, Keszthely, Sopron. III. Trencsén.
168. *leucogrammus* Grm. — I. Budapest, Dabas, Kalocsa. II. Pécs. V. Kolozsvár, Szt-Erzsébet.
169. *familiaris* Boh. — I. Budapest, Mons Pilis, Péczel, Peszér, Kecskemét, Alpár, Csépa, Csongrád, Debreczen, Nyiregyháza, Uj-Fehértó, Dorog. II. Ács, Sopron, Lelle, Csurgó, Pécs. IV. S.-A.-Ujhely, Szomotor. V. Brassó. VI. Grebenácz, Herkulesfürdő.
170. *noxius* Boh. — Teste Schönher etiam Hungariæ incola. (339, VII, p. 150.)

Elytrodon Schönh.

171. *bidentatus* Stev. — I. N.-Várad. VI. Temesvár, N.-Bogsán, Herkulesfürdő.

Mylacus Schönh.

172. *globulus* Boh. — I. Budapest, Peszér, Kecskemét, Kalocsa. II. Pécs. VI. Grebenácz.
173. *rotundatus* F. — I. Budapest, Mons Pilis,

Peszér, Kecskemét, Kalocsa, Szeged, N.-Várad. III. Tavarnok, Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely. V. Szelindek, N.-Csűr, Fogaras, Brassó, Medgyes, Segesvár, Gyeke, M.-Záh. VI. Palánka.

174. *seminulum* F. — I. Budapest, Peszér, Keczel, Hajós. II. Apáti. III. Nyitra, Beczkó. IV. Sátoralja-Ujhely, S.-Patak. V. Fogaras, Kőhalom, Brassó, Prázsmár. VI. Grebenácz, Jeselnicza, Orsova.

Ptochus Schönh.

175. *bisignatus* Germ. — I. Kalocsa. IV. K.-Azar. V. Kolozsvár. VIII. Fiume, Buccari.

176. *subsignatus* Boh. — V. Gyeke. (Legit. L. Méhely, 247, p. 192.)

177. *periteloides* Fuss. — II. Pécs. V. T.-Szántó, N.-Szeben, N.-Csűr, Marpód, M.-Záh.

Phyllobius Schönh.

178. *glaucus* Scop. — Communis (in coniferis).

179. *urticae* Deg. *(Gyllenhali* Tourn.) — I. Nagy-Várad. III. Tátrafüred, Rozsnyó. IV. Visó, Mons Hoverla. V. Frequens. VI. Janova.

180. *transsylvanicus* Stierl. — V. Teste Deubel. (Auctor, 364, p. 115.)

181. *pilicornis* Desbr. — V. Vallis Lotrióra. VI. Herkulesfürdő. VII. Eszék.

182. *hungaricus* Stierl. — V. Mons Keresztényhavas, Brassó.

183. *piri* L. — Communis.

184. *artemisiae* Desbr. — I. Budapest. VI. Teste Reitter.

185. *contemptus* Stev. — V. Fogaras. (Bielz, 27, pag. 85.)

186. *incanus* Gyll. — I. Budapest, Dabas. II. Z.-Tapolcza, Pécs. III. Hermánd, Trencsén. V. N.-Szeben, N.-Csűr, Medgyes. VI. Herkulesfürdő. VII. Diakovár.

187. *scutellaris* Redtb. — I. Budapest, Kalocsa. III. V.-Mikola. V. Kolozsvár. VI. Grebenácz.

188. *montanus* Mill. — I. Budapest: Farkasvölgy. (Leg. J. Pável.)

189. *argentatus* L. — Communis.

190. *maculicornis* Grm. — I. Budapest, Kalocsa. III. Pozsony. IV. Mons Vihorlat. V. Montes Kerczenses, Fogaras, Mons Keresztényhavas, Montes Bodzaenses. VII. Fužine.

191. *Heydeni* Stierl. — In regione VII. (Auctor, 355, p. 42.)

192. *pineti* Rdtb. — II. Felsölő. III. Hermánd.

193. *psittacinus* Grm. — Frequens (in coniferis).

194. *croaticus* Stierl. — In regione VII. (Auctor, 355, p. 42.).

195. *Apfelbecki* Stierl. — III. Tátra. (Auctor, 359, pag. 13.)

196. *fulvipilis* Desbr. — I. Kalocsa, Hajós. VI. Herkulesfürdő.

197. *aurifer* Boh. — I. Mons Pilis. V. Brassó (Czenk).

198. *lateralis* Reiche *(smaragdifer* Kiesw.) — VI. Oravicza, Herkulesfürdő. VII. Velebit.

199. *betulae* F. — I. Budapest, Mons Pilis, Kalocsa, Debreczen. II. Z.-Tapolcza, Sopron. III. Agárd. IV. Homonna, Tokaj. V. Hátszeg, Szász-Régen, Deés.

v. *trivialis* Boh. — V. Brassó: Mons Czenk. (Leg. L. Méhely, 246, p. 279.)

200. *oblongus* L. — Communis.

201. *pictus* Stev. — II. Z.-Tapolcza. V. Kolozsvár.

202. *sulcirostris* Boh. — II. Ács. V. Segesvár.

v. *cinereus* Gyll. — IV. N.-Mihály. (Leg. Dr. C. Chyzer.)

203. *viridicollis* F. — I. Kalocsa. III. Beszterczebánya, Deménfalu. V. Montes Korongyos et Sánta, Praesbe, Montes Kerczenses, Brassó (Czenk). VI. Báziás, Mons Szemenik, Herkulesfürdő.

204. *brevis* Gyll. *(Emgei* Stierl.) — I. Péczel. II. Zircz, Z.-Tapolcza. VI. Mons Domoglet. VII. Perušic.

205. *ophthalmicus* Stierl. — In regione VI. (Auctor, 359, p. 12.)

206. *pomonae* Oliv. — I. Budapest, Keczel. III. Trencsén. IV. Komjáti, S.-A.-Ujhely, K.-Azar, N.-Mihály. V. Vöröstorony, Veresmart, Fogaras, Brassó, Medgyes. VII. Fužine.

v. *cinereipennis* Gyll. — III. Beczkó. (Legit Dr. C. Brancsik, 40, p. 37.)

207. *virideaeris* Laich. — I. Budapest, Kecskemét, Debreczen. V. Montes Cibinenses. VII. Eszék.

208. *cinerascens* F. — I. Kalocsa. II. Sopron. III. Nyitra, Trencsén. IV. Bártfa. V. Montes Cibinenses, Segesvár.

209. *sinuatus* F. — I. Budapest, Kalocsa. II. Sopron. III. Beczkó, Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Gálszécs, A.-Bereczki, Szomotor. VI. Herkulesfürdő.

Polydrusus Germ.

210. *bellus* Kr. *(cephalotes* Desbr.) — Hungaria (Desbrochers, 66, p. 232.)

211. *impar* Gozis. *(mollis* Germ.) — I. Kalocsa. III. K.-Tapolcsány, Trencsén, Koritnyicza, Árva-Váralja, Tátrafüred. IV. Mons Rabaszkala, O.-Ruszka. V. Frequens. VII. Fužine.

212. *atomarius* Oliv. — III. Beszterczebánya, Trencsén, Tátrafüred. VII. Fužine.

213. *marginatus* Steph. — I. Mons Pilis. II. Sopron, Z.-Tapolcza, Kőszeg, Pécs. III. Nyitra, Trencsén.
214. *paradoxus* Stierl. — III. Deménfalu, Mons Chocs, Tátrafüred.
215. *carpathicus* Brancsik. — III. Mons K.-Kriván. (Detexit Auctor, 40, p. 65.)
216. *amoenus* Germ. — III. Trencsén, Tátrafüred. IV. Vallis Fajna, Cserna-Hóra. V. Montes Czódenses et Kerczenses, Mons Hargita, Szováta. VI. Mons Szemenik, Korniaréva.
217. *tibialis* Gyll. — I. Kalocsa. (Leg. F. Speiser, 349, p. 40.)
218. *pauper* Stierl. — Secundum Auctorem solum Hungariam incolit. (361, p. 244.)
219. *mollis* Stroem *(micans* F.) — Frequens.
220. *lateralis* Gyll. —VII. Fužine. (Miller, 253, p. 6.)
221. *sericeus* Schall. — Communis.
222. *Merkli* Kauffm. — I. Kalocsa. II. Pécs, Zákány. III. Mons Chocs. VI. Báziás, Szászka, Krassova, Herkulesfürdő, Korniaréva. VII. Diakovár. VIII. Crkvenica. (Auctor, 193, p. 170.)
223. *flavipes* Deg. — I. Kalocsa, N.-Várad. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely. V. Nagy-Szeben, Montes Cibinenses, Szász-Régen. VI. Csenej, Herkulesfürdő.
224. *impressifrons* Gyll. — I. Keczel. (Legit F. Speiser, 349, p. 40.)
v. *flavovirens* Gyll. — I. Budapest. III. Trencsén.
chrysomela Oliv. — V. Kolozsvár. (Bielz, 27, pag. 85.)*
225. *confluens* Steph. *(chrysomela* Gyll.) — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Hajós, Debreczen. II. Ács, Pécs. III. Tavarnok, Trencsén. V. Nagy-Szeben, Szelindek, Sz.-Ujfalu, Medgyes, Segesvár. VI. Grebenácz, Oravicza.
226. *cervinus* L. — Frequens.
v. *maculosus* Herbst. — I. Hajós. V. Brassó (Czenk), Mons Kereszténythavas.
v. *melanotus* Steph. — IV. Mons Hoverla. V. Szelindek, Montes Bodzaenses.
227. *pilosus* Gredl. — III. Tátrafüred. V. Zilah, Brassó (Czenk). VI. Herkulesfürdő.
228. *tereticollis* Deg. — Frequens.
229. *ruficornis* Bonsd. — III. Trencsén. IV. Mons Rabaszkala, Cserna-Hóra. V. Brassó (Czenk), Plaju-Fói (Com. Fogaras). Montes Bodzaenses.
230. *picus* F. — Communis.
231. *pterygomaticus* Boh. — I. Budapest, Kalocsa. II. Keszthely. III. Kézsmár.k IV. N.-Bocskó. V. Frequens. VI. Oravicza, Dognácska, Herkulesfürdő.
232. *coruscus* Germ. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa, Szeged, Csongrád, N.-Várad. II. Szegzárd. IV. Komjáti, Bártfa, S.-A.-Ujhely. V. Hátszeg, N.-Szeben, N.-Csűr, Montes Kerczenses, Brassó, Medgyes, Segesvár, Szász-Régen. VI. Grebenácz, Moravicza. VIII. Fiume.
233. *viridicinctus* Gyllh. — I. Budapest, Péczel. II. Veszprém, Z.-Tapolcza, Kőszeg, Pécs. V. Hátszeg, N.-Szeben, Szt-Erzsébet, Vöröstorony, Brassó. VI. Oravicza, Dognácska, Zlaticza, Herkulesfürdő. VII. Diakovár.

Scythropus Schönh.

234. *mustela* Herbst. — I. Budapest. III. Trencsén, Tátrafüred. II. Pécs. V. K.-Talmács, Montes Cibinenses, Segesvár.

Chiloneus Schönh.

235. *asperatus* Bonsd. *(muricatus* F.) — Frequens.
236. *maculatus* Hampe. — VII. Zágráb. (Auctor, 153, 1870, p. 335.)

Stasiodis Gozis.

237. *parvulus* F. — V. Felső-Komána. (Legit L. Méhely, 247, p. 192.)
238. *squalidus* Gyll. — I. Péczel, Kalocsa. II. Pécs. V. Torda, N.-Lak, Remete, Medgyes. VI. Oravicza, Mons Domoglet.

Sciaphilus Steph.

239. *caesius* Hamp. — I. N.-Várad, Hagymádfalva. II. Z.-Tapolcza, Pécs. V. Ad balneum Gyógy, Deés. VI. Temesvár, Grebenácz, Herkulesfürdő.
240. *barbatulus* Germ. — III. Nyitra. V. Hátszeg.
241. *setulosus* Germ. — V. N.-Csűr, Fenyőfalva, Marpód, Gyeke. VI. Temesvár. VIII. Fiume.
242. *scitulus* Germ. — II. Zircz, Pécs. VIII. Fiume.
243. *rubi* Gyll. *(ninguidus* Germ.) — Hungaria. (Stierlin, 306, p. 87.)
costulatus Kiesw. — V. Teste Bielz. (27, p. 85.)

Paophilus Faust.

244. *Hampei* Seidl. — I. Budapest, Debreczen, N.-Várad. III. Léva. IV. S.-A.-Ujhely, N.-Mihály. V. Frequens.
245. *afflatus* Boh. — III. V.-Mikola. (Leg. M. Hopffgarten.)

Brachysomus Steph.

246. *aurohirtus* Seidl. — V. N.-Szeben. (Leg. A. Ormay, 264, p. 39.)
247. *setiger* Gyll. — I. Budapest, Mons Pilis, Kalocsa. II. Pécs. III. V.-Mikola, Trencsén. IV.

* Secundum opinionem J. Frivaldszky forsan = *chrysomela* Gyll.

Varannó. V. Vallis Lotrióra, Brassó, Montes Brassóenses. VI. Zlaticza.

248. *villosulus* Germ. — I. Budapest. II. N.-Vázsony. V. N.-Csűr, Szt-Erzsébet.

249. *echinatus* Bonsdorff. — Frequens.

250. *hispidus* Rdtb. — I. Budapest, Parád, Kalocsa. N.-Várad. III. Pozsony. V. Montes Retyezát, N.-Csűr, Szt-Erzsébet.VI. Oravicza, Uj-Moldova, Zlaticza, Herkulesfürdő. VIII. Fiume.

251. *Frivaldszkyi* Reitt. — VI. Herkulesfürdő. (Auctor, 305, p. 129.)

252. *subnudus* Seidl. — I. Hagymádfalva. II. Kőszeg. III. Trencsén. IV. Mons Vihorlat.

253. *hirtus* Boh. — I. Budapest, Kalocsa. II. Pécs, ad balneum Gyógy, Nagy-Szeben, Nagy-Csür, Marpód, Brassó.

254. *transsylvanicus* Seidl. — V. Pele, Vallis Lotrióra, Nagy-Szeben, N.-Disznód, Fogaras, Brassó (Czenk). VI. Rumunyest.

Foucartia Duv.

255. *squamulata* Herbst. — I. Budapest, Torbágy, Kecskemét, Kalocsa, Szeged, N.-Várad. II. Szegzárd, Pécs. III. Trencsén. IV. Tarczal. V. Kolozsvár, F.-Zsuk, N.-Szeben. VI. Grebenácz, Fehértemplom, Plavisevicza.

256. *ptochoides* Bach. — I. Mező-Kovácsháza. II. Nagy-Vázsony.

257. *liturata* Stierl. — I. Péczel, Isaszeg. IV. Nagy-Bocskó.

Barypithes Duv.

258. *globus* Seidl. — V. Kolozsvár, N.-Szeben, Vöröstorony.

v. *sphaeroides* Seidl. — V. Teste Seidlitz (345, p. 646.)

259. *virguncula* Seidl. — VII. Capella, Vagan.

260. *liptoviensis* Weise. — III. Felső-Bocza. (Detex. Auctor.)

261. *Chevrolati* Boh. — Frequens.

262. *pellucidus* Boh. — III. Trencsén. IV. S.-Patak.

263. *styriacus* Seidl. — IV. S.-A.-Ujhely. VI. Ferenczfalva, Herkulesfürdő. VII. V.-Gorica, Ljeskovac.

264. *araneiformis* Schrk. — IV. Mármaros-Sziget. (Reitter, 295. p. 61.)

265. *carpathicus* Reitt. — IV. Com. Mármaros, Csap. (Auctor, 307, 1887, p. 388.)

266. *mollicomus* Ahr. — I. Budapest, Péczel, Parád. II. Sopron, Boglár, Kőszeg. V. Brassó.

267. *tener* Boh. — II. Zircz. (Legit D. Kuthy.)

Omias Schönh.

268. *Hanáki* Friv. — IV. Bártfa, O.-Ruszka, Montes Vihorlat et Simonka, Rahó, Montes Balzatul, Turkul, Lungaczásza et Menczul, Cserna-Hóra, Montes Pietrosz et Pop-Iván. V. Borszék.

269. *mollinus* Boh. — I. Montes Biharenses. VI. Oravicza.

270. *forticornis* Boh. — II. Kőszeg. III. Beczkó, Trencsén. VII. Capella.

maxillosus Petri. — V. Segesvár. (Auctor, 269, pag. 21.)

271. *Viertli* Weise. — VI. Herkulesfürdő. (Detex. A. Viertl.)

272. *biharicus* Reitt. — I. Hagymádfalva. V. Montes Retyezát. VI. Herkulesfürdő.

273. *Hopffgarteni* Tourn. — IV. Bártfa. V. Kercz.

Strophosomus Steph.

274. *coryli* F. — Frequens.

275. *ocularis* Chevr. — Secundum Auctorem solum Hungariam incolit. (56, p. 139.)

276. *faber* Herbst. — I. Budapest, Péczel, Dabas, Kecskemét, Kalocsa, Nyiregyháza, Debreczen. II. D.-Örs, Z.-Tapolcza, Boglár, Sopron.

277. *lateralis* Payk. — V. N.-Szeben, Nagy-Csür, Brassó.

Eusomus Germ.

278. *Beckeri* Tourn. — VI. Temesvár. (Seidlitz, 345, p. 649.)

279. *ovulum* Germ. — Frequens.

Brachyderes Schönh.

280. *incanus* L. — I. Budapest. II. Sopron, Zánka, Pécs. III. Trencsén.

Mesagroecus Schönh.

281. *obscurus* Boh. — I. Parád, N.-Várad. II. Pécs. III. V.-Mikola, Putnok. IV. Csécs, S.-A.-Ujhely, K.-Azar, Gálszécs, K.-Kövesd, Tokaj, Szobráncz. V. Frequens. VII. Diakovár.

Sitona Germ.

282. *subcostatus* Allard. — Teste Auctore habitat etiam in Hungaria. (2, p. 340.)

283. *regensteinensis* Hbst. — V. Kőhalom, Bükszád.

284. *cambricus* Steph. — I. Budapest, Péczel. II. Ács, Lacus Fertő. V. Sz.-Ujfalu. VI. Resicza.

285. *Waterhousei* Waltl. — I. Budapest, Kalocsa. II. Ács. VI. Resicza, Herkulesfürdő.

286. *crinitus* Herbst. — Communis.

287. *tibialis* Herbst. — Frequens.

v. *ambiguus* Gyll. — I. Budapest. II. Pécs. III. Tátrafüred. VI. Báziás, Oravicza, Herkulesfürdő.

v. *brevicollis* Sahlb. — I. Kalocsa. IV. Visk. V. N.-Szeben, N.-Csűr, Segesvár. VII. Diakovár.

288. *hispidulus* F. — Frequens.
v. *tibiellus* Gyll. — Simul cum stirpe.
289. *puncticollis* Steph. — I. Budapest, Szeged, B.-Csaba, N.-Várad. III. Beczkó. V. N.-Csűr, Gyeke. VI. Temesvár. VII. Eszék.
290. *longulus* Gyll. — Etiam Hungariæ incola. (Allard, 2, p. 344.)
291. *flavescens* Marsh. — Frequens.
v. *cinnamomeus* All. — V. Lacus ad Kisszék. (Legit L. Méhely, 247, p. 192.)
292. *callosus* Gyll. *(tenuis* Rosh.) — III. Trencsén. (Leg. Dr. C. Brancsik, 40, p. 37.)
293. *lineellus* Bonsd. — Frequens.
294. *humeralis* Steph. — Ut prior.
v. *discoideus* Gyll. — Cum stirpe.
v. *maculatus* Motsch. — V. Brassó: Mons Czenk. (Leg. L. Méhely, 247, p. 192.)
295. *inops* Schönh. — I. Budapest, Mende, B.-Csaba, N.-Várad. II. Pécs. III. Trencsén. IV. Sátoralja-Ujhely, Homonna, Terebes. V. Gyeke, M.-Záh.
296. *bicolor* Fahrs. — IV. Runyina. (Legit Dr. C. Chyzer.)
297. *cylindricollis* Fahrs. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. III. N.-Rőcze. IV. Homonna.
298. *lateralis* Gyll. — I. Budapest, Mons Pilis, Péczel, Kalocsa. II. Z.-Tapolcza. III. Kézsmárk. IV. S.-A.-Ujhely. V. Hátszeg, N.-Szeben, Szent-Erzsébet, Fogaras, Brassó, Előpatak. VI. Báziás, Uj-Moldova, Herkulesfürdő.
299. *lineatus* L. — Frequens.
v. *geniculatus* Fahrs. *(viridifrons* Motsch.) — V. Nagy-Szeben, Szelindek, Szent-Erzsébet, Kereszténysziget.
300. *suturalis* Steph. — I. Budapest, Mons Pilis, Szeged, M.-Berény. IV. N.-Mihály, Mons Vihorlat, Szinna. VI. Grebenácz, Fehértemplom, Ferenczfalva, Rumunyest.
301. *sulcifrons* Thunb. — Communis.
v. *campestris* Ol. — V. N.-Szeben. (Legit A. Ormay, 264, p. 39.)

Trachyphloeus Germ.

302. *parallelus* Seidl. — I. Péczel, Debreczen. V. Segesvár.
303. *alternans* Gyll. — I. Budapest, Péczel, Mende, Farkasd, Kalocsa, Szeged. II. Pécs. V. Nagy-Szeben, N.-Csűr, Holczmány. VI. Resicza, Dubova, Orsova, Herkulesfürdő.
304. *spinimanus* Germ. — I. Budapest, Péczel, Bugyi, Szeged. II. Vilonya. III. Pozsony. IV. S.-A.-Ujhely. V. N.-Szeben, Brassó, Berethalom.
305. *scabriusculus* L. *(scaber* Schönh., *setarius* Gyll., *vivera* Herbst, *Frivaldszkyi* Kuthy). — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. III. Tátra (Poprádpart). V. Vallis Lotrióra, N.-Szeben, N.-Csűr, Vöröstorony, Fogaras, Sz.-Régen. VI. Német-Bogsán.
306. *ventricosus* Germ. — I. Budapest, Péczel, Isaszeg, Kalocsa, Hajós. II. Zánka. VI. Dubova, Báziás.
307. *ypsilon* Seidl. — VI. Orsova, Herkulesfürdő.
308. *bifoveolatus* Beck. — I. Budapest. III. Trencsén. V. N.-Csűr, Szt-Erzsébet, Kőhalom, Segesvár, Sz.-Régen. VIII. Buccari.
309. *aristatus* Gyll. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, N.-Várad. III. Pozsony, Trencsén. IV. Sátoralja-Ujhely, Kőrösmező. V. N.-Szeben, Praesbe, N.-Csűr, Holczmány, K.-Torony, Porumbák.
310. *spinosus* Goeze. — I. Budapest, Kalocsa. V. N.-Szeben. VI. Herkulesfürdő.
311. *inermis* Boh. — I. Budapest, Kalocsa, Hajós, Szeged. III. V.-Mikola, Trencsén.

Psalidium Illig.

312. *maxillosum* F. — I. Budapest, Péczel, Isaszeg, Dabas, Kecskemét, Kalocsa, Szeged. II. Sopron, Zánka, Pécs. IV. Tokaj, Szerencs. V. Déva, N.-Szeben, N.-Csűr, Medgyes, Kőhalom, M.-Záh. VI. Grebenácz, Báziás.

Cneorrhinus Schönh.

313. *plagiatus* Schall. — II. Z.-Tapolcza. (Legit A. Rédl.)

Liophloeus Germ.

hungaricus Tourn. — Teste Auctore in regione VI. (369, p. 10.)
314. *tessellatus* Müll. — Frequens.
v. *aquisgranensis* Först. — V. Mons Keresztényhavas, Brassó, Segesvár. VI. Herkulesfürdő.
315. *Herbsti* Gyllh. *(obsequiosus* Gyllh., *gibbus* Boh.) — I. N.-Várad, Székelyhid. II. D.-Örs. III. Hermánd, Montes K.-Kriván et Chocs, Tátrafüred. IV. Bártfa, Velejte, N.-Mihály, Mons Vihorlat, N.-Bocskó, Luhi, Mons Pop-Iván. V. Frequens. VI. N.-Bogsán, Herkulesfürdő.
v. *amplipennis* Tourn. — V. Brassó: Mons Czenk. (Leg. L. Méhely, 247, p. 192.)
v. *chrysopterus* Boh. — I. Feketeerdő. IV. Mező-Laborcz, Mons Hoverla.
v. *lentus* Germ. — I. N.-Várad. III. Besztercebánya, Trencsén. IV. Bártfa, Erdőbénye. V. Hátszeg, Montes Retyezát, K.-Torony, N.-Csűr, Fogaras Brassó, Prázsmár, Medgyes, Deés. VI. Herkulesfürdő, Korniaréva.
v. *Schmidti* Boh. — V. Segesvár, Homoród.

316. *liptoviensis* Weise. — III. Felső-Bocza. (Detex. Auctor.)

Barynotus Germ.

317. *obscurus* F. — In regionibus montanis frequ.

318. *alternans* Boh. — VI. Herkulesfürdő. (Leg. J. Frivaldszky.)

hungaricus Tourn. — Secundum Auctorem solum Hungariam incolit (Cat. Coleopt. Europ., 1891, p. 291.)

Thylacites Germ.

319. *pilosus* F. — I. Budapest, Péczel, Kecskemét, Keczel, Debreczen, Érmihályfalva. II. Z.-Tapolcza, Sopron, Pécs. III. Beczkó. IV. Szomotor. V. Szt-Erzsébet, Sz.-Régen. VI. Grebenácz, Resicza.

320. *fritillum* Panz. — VI. Herkulesfürdő. (Legit E. Frivaldszky.)

Chlorophanus Germ.

321. *viridis* L. — In regionibus montanis occurrit.

322. *gibbosus* Payk. (*polinosus* F.) — I. Budapest, Kalocsa. II. Zákány. III. Pozsony, Trencsén. V. Segesvár.

323. *dorsiger* Faust. — IV. Mons Vihorlat, Vinna. VI. Herkulesfürdő.

324. *salicicola* Germ. — I. Kalocsa, Apátfalu. III. Trencsén. V. Frequens. VI. Rumunyest. VII. Eszék.

325. *excisus* F. — II. Ács. VI. Herkulesfürdő.

326. *fallax* Sahlb. — I. Budapest. Peszér, Keczel. II. Ács. VI. Orsova.

327. *graminicola* Schönh. — I. Budapest, Csepel, Kalocsa, B.-Csaba, Szeged, Debreczen, N.-Várad. II. D.-Örs, Sopron, Pécs, Zákány. V. N.-Szeben, Brassó, Segesvár, N.-Ajta.

328. *voluptificus* Gyll. — IV. Vinna. (Legit Dr. C. Chyzer.)

Tanymecus Schönh.

329. *palliatus* F. — Communis.

330. *vittiger* Gyll. — I. Kalocsa, Kecskemét, Szeged, Szentes, Csongrád. II. Sopron, Pécs. IV. M.-Sziget. VI. Grebenácz, Báziás, Herkulesfürdő.

Brachycerus Oliv.

331. *algirus* F. — VII. Fužine. VIII. Fiume.

332. *cinereus* Ol. v. *lutosus* Gyll. — VI. Báziás, Uj-Moldova. VIII. Fiume.

33 *undatus* F. — VII. Fužine. VIII. Fiume, Buccari, Carlopago.

334. *foveicollis* Gyll. — I. Budapest, Kalocsa, Szeged. II. D.-Örs, Sopron, Neszmély, Keszthely. V. Gyeke, M.-Záh. VI. Apatin, Ulma.

335. *junix* Lichtenst. v. *sinuatus* Oliv. — Hungaria. (Bedel, 16, p. 202.)

Cleonus Schönh.

336. *punctiventris* Germ. — I. Budapest, Péczel, Gödöllő, Kalocsa, Dabas, Szeged, Mezőhegyes, Debreczen. II. Böny, Zircz, Szegzárd, Pécs. III. Léva, G.-Ujfalu, Nyir, Diószeg, Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj. V. Déva, Vizakna, Brassó, Deés, M.-Záh.

337. *albicans* Gyll. — V. Kolozsvár, Sz.-Régen.

338. *crinipes* Fahrs. — I. Budapest. V. N.-Szeben, N.-Csür.

339. *nigrosuturatus* Goeze (*obliquus* F.) — I. Budapest, Torbágy, Kalocsa. II. D.-Örs, Sopron. III. Beszterczebánya. IV. Kassa, Tolcsva, Szinna. V. Sz.-Sebes, Nagy-Szeben, Fogaras, Brassó, Gyeke, M.-Záh. VI. Ulma. VIII. Fiume, Carlopago.

340. *excoriatus* Gyll. — I. Budapest. V. N.-Szeben, N.-Csür, Szt-Erzsébet, Fogaras.

341. *glaucus* F. v. *turbatus* Fahrs. — I. N.-Várad. IV. Szerencs. V. Fogaras, Segesvár.

tetragrammus Pall. (*concinnus* Gyll.) — Hungaria. (Cat. Col. Eur., 1891, p. 294.) *

342. *microgrammus* Gyll. — I. Budapest. V. Kolozsvár. VI. Herkulesfürdő.

343. *fasciatus* Müll. (*albidus* F.) — I. Budapest, Palota, Péczel, Dabas, Kecskemét, Kalocsa, Szeged, B.-Csaba, Debreczen, Nagy-Várad. II. Sopron, Keszthely, Pécs. IV. Tolcsva, Homonna, Szomotor. V. Peér, Hátszeg, Sz.-Sebes, Nagy-Szeben, N.-Csür, Fogaras, Brassó, Sz.-Régen, M.-Záh. VI. Temesvár, Fehértemplom.

344. *declivis* Oliv. — I. Budapest, Gödöllő, Kecskemét, Keczel, Hajós, N.-Várad. II. Pécs.

345. *alternans* Herbst. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa. II. Sopron, Keszthely, Pécs. III. Beszterczebánya, Trencsén, Putnok. IV. Torna, Bártfa. V. N.-Szeben, Fogaras, Medgyes, Szász-Régen. VII. Mons Bukova-Kusa. VIII. Fiume.

346. *coenobita* Oliv. — I. Budapest. IV. S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Czéke, Varannó. V. Szt-Erzsébet.

347. *cinereus* Schrank (*costatus* F.) — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa, Szeged, B.-Csaba, Debreczen, N.-Várad. II. Sopron, Kőszeg. III. Trencsén. IV. Tokaj, Varannó, V. Peér, Sz.-Sebes,

* Secundum Schönher Podoliam Armeniamque et non Hungariam incolit. (339, II, p. 186.)

N.-Szeben, N.-Csür, Medgyes, Sz.-Régen. VI. Janova, Fehértemplom. VII. Mons Bukova-Kusa. VIII. Fiume.

348. *grammicus* Panz. — I. Budapest. V. Segesvár.

349. *Fabricii* Gemm. (*roridus* F.) — I. Kalocsa, N.-Várad. II. Zircz, Sopron, Keszthely, Villány, Pécs. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely. V. Hátszeg, N.-Szeben, Kőhalom.

350. *piger* Scop. (*sulcirostris* L.) — Communis.

351. *trisulcatus* Hbst. — I. Parád. III. Nyitra. IV. M.-Laborcz, Szinna, V. Nagy-Szeben, Montes Kerczenses, Mons Királykő, Segesvár. VI. Temesvár.

v. *adumbratus* Gebl. — I. Szeged. (Leg. J. Vánky.)

352. *tigrinus* Panz. — Frequens.

353. *achates* Fahrs. * — I. Budapest, Peszér, Kalocsa. IV. S.-A.-Ujhely, Tolcsva. V. Brassó. VI. Deliblat, Resicza.

354. *pedestris* Poda (*ophthalmicus* Rossi). — Frequens.

355. *madidus* Oliv. (*segnis* Germ.) — I. Budapest, Péczel, Kecskemét, Debreczen. V. N.-Csür, Gyeke, M.-Záh. VI. Oravicza.

356. *mixtus* F. — I. Budapest, Isaszeg. II. Pécs. VI. Oravicza.

v. *varius* Herbst. — I. Kalocsa. VIII. Fiume, Carlopago.

Lixus F.

357. *paraplecticus* L. — I. Budapest, Kalocsa, Debreczen, N.-Várad. II. Pécs, Mindszent. III. Nyitra. IV. S.-A.-Ujhely. V. N.-Szeben, Fogaras, Brassó, Gyeke, M.-Záh. VI. Temesvár.

358. *iridis* Oliv. — I. Budapest, Kalocsa, B.-Csaba, Debreczen, N.-Várad. II. Sopron, Keszthely, Pécs. III. Putnok. IV. S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Szerencs. V. N.-Falu, Pele, Kolozsvár, Hátszeg, Nagy-Szeben, N.-Csür, Szt-Erzsébet, Fogaras, Segesvár. VI. Janova, Rékas.

359. *canescens* Fisch. — V. Szt-Erzsébet, N.-Csür.

360. *cylindrus* F. — I. Budapest. V. Szt-Erzsébet, N.-Szeben. VI. Mons Domoglet.

361. *sanguineus* Ross. — I. Budapest. II. Zircz. V. Remete (Com. Alsó-Fehér). VI. Herkulesfürdő. VIII. Buccari.

362. *subtilis* Boh. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa, Horgos, Szeged, B.-Csaba, N.-Várad, II. Felsőlő. VI. Fehértemplom, Jeselnicza, Herkulesfürdő.

363. *difficilis* Cap. — I. Budapest, Isaszeg, Dabas, Kalocsa, Szeged, M.-Kovácsháza, Debreczen. II. Z.-Tapolcza. IV. S.-A.-Ujhely

364. *brevipes* Bris. — Hungaria. (Capiomont, 53, p. 44.)

365. *Ascanii* L. — I. Budapest, Peszér, Kecskemét, Kalocsa, Szeged, Nagy-Várad. II. Sopron, Pécs. III. Nyitra, Beszterczebánya, Trencsén, IV. Szádellő, Komjáti, Somodi, Tolcsva, Erdőbénye, S.-A.-Ujhely, Tarczal. V. Déva, N.-Csür, Brassó, Deés. VI. Szabadka, Temesvár, Fehértemplom. VII. Eszék.

v. *albomarginatus* Boh. — Sec. Schönher est solum Hungariæ incola. (339, VII, p. 435.)

v. *lateralis* Bris. — IV. S.-A.-Ujhely. (Leg. Dr. Chyzer.)

366. *elegantulus* Boh. — I. Budapest, Péczel, Dabas, Peszér, Kalocsa. VI. Grebenácz, Báziás, Herkulesfürdő.

367. *myagri* Ol. — I. Budapest, Péczel, Kecskemét, Kalocsa. IV. Tokaj, Sáros-Patak, S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Szomotor, Vinna. V. Sz.-Sebes, Nagyszeben, Holczmány. VI. Deliblat. VII. Eszék. VIII. Fiume, Carlopago.

v. *punctirostris* Boh. — I. Budapest, Isaszeg, Debreczen, N.-Várad. IV. Szerencs. VI. Herkulesfürdő.

368. *algirus* L. (*angustatus* F.) — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, N.-Várad. II. Sopron, Pécs. III. Beszterczebánya, Putnok. IV. Komjáti, S.-A.-Ujhely, Tolcsva, N.-Mihály, N.-Károly. V. N.-Szeben, N.-Csür, Fogaras, Brassó, Segesvár, Sz.-Régen, Deés, Gyeke. VI. Ulma, Moravicza, N.-Bogsán.

369. *euphorbiae* Cap. — I. Dabas, P.-Vacs.

370. *punctiventris* Bh. — I. Budapest, Parád, Szeged. IV. S.-A.-Ujhely, Páczin. V. Holczmány. VII. Eszék.

371. *cylindricus* Hbst. (*bardanae* F.) — I. Budapest, Kalocsa, Szeged. III. Putuok.

372. *irresectus* Boh. — Hungaria (Capiomont, 53, p. 267.)

constrictus Boh. — Hungaria. (Cat. Col. Eur., 1891, p. 296.) *

373. *fasciculatus* Boh. — I. Nagy-Várad. V. Kolozsvár.

374. *vilis* Rossi (*bicolor* Ol.) — I. Budapest, Dabas, Kalocsa. II. Pécs. III. V.-Mikola. IV. Komjáti. VI. Ulma. VIII. Carlopago.

375. *scolopax* Boh. — IV. N.-Mihály. (Leg. Dr. C. Chyzer.)

376. *cardui* Oliv. — I. Budapest, Kecskemét, Ka-

* Apud nos sub nomine *morbillosus* F. vulgatus.

* Secundum Schönher incolit Tauriam et non Hungariam. (339, III, p. 78.)

locsa, Szeged, N.-Várad. II. Z.-Tapolcza, Pécs. IV. S.-A.-Ujhely, Szerencs, Szomotor. V. Hátszeg, N.-Szeben, N.-Csür, Sz.-Ujfalu, Medgyes, Segesvár, Gyeke. VI. Temesvár, Grebenácz. VII. Eszék.

377. *elongatus* Goeze (*filiformis* F.) — Frequens.

378. *flavescens* Boh. — I. Budapest, Kalocsa. V. Sz.-Sebes, Sz.-Ujfalu.

379. *cribricollis* Boh. (*ferrugatus* Ol.) — I. Debreczen. II. Keszthely. IV. Kassa.

380. *transsylvanicus* Tourn. — V. Montes Kerczenses. (Bielz, 27, p. 87.)

381. *costirostris* Seidl. — V. N.-Szeben. (Auctor, 345, p. 664.)

Larinus Germ.

382. *brevis* Hbst. — I. Budapest, Dabas. IV. Sátoralja-Ujhely. V. Nagy-Szeben, Porcsesd, Mons Szurul.

383. *cynarae* F. — V. Kolozsvár, Brassó, Szász-Régen.

384. *latus* Herbst (*cardui* Rossi). — I. Budapest, Dabas, Kalocsa, Szeged. II. Pécs. V. Fogaras. VI. Apatin, Temesvár.

385. *canescens* Gyll. (*cinerascens* Cap.) — I. Budapest (Széchényihegy, Sashegy).

386. *flavescens* Germ. — IV. Tállya. (Leg. Dr. C. Chyzer.)

387. *obtusus* Gyll. — I. Budapest, Dabas, Kalocsa, Makó, Monyásza, Beél. II. Sopron. III. Nyitra. IV. Mons Gutin (Com Marmaros). V. Frequens. VII. Diakovár. VIII. Buccari.

388. *australis* Cap. — Hungaria. (Auctor, 52, p. 304.)

389. *turbinatus* Gyll. — I. Budapest, Peszér, Kalocsa. II. Pécs. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Szomotor, Varannó, M.-Sziget. V. N.-Falu, Magyarpatak, Borzás, Szt-Erzsébet, Sz.-Ujfalu, M.-Záh. VI. Rumunyest.

390. *sturnus* Schall. — Frequens.

391. *planus* F. (*carlinae* Ol.) — I. Budapest, Péczel, Dabas, Kalocsa. II. Z.-Tapolcza, III. Koritnyicza. IV. Varannó, Szinna, S.-A.-Ujhely, O.-Ruszka, M.-Sziget. V. N.-Szeben, Sz.-Régen. VI. Mons Domoglet.

392. *jaceae* F. — I. Budapest, Péczel, Peszér, Nagy-Várad. II. Pécs. III. Szliács, Trencsén. IV. Kassa, S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Tokaj, N.-Károly. V. N.-Szeben, Szt-Erzsébet, Holczmány, Marpód, Segesvár, Gyeke, M.-Záh. VI. Janova, Jaszenova, Herkulesfürdő. VIII. Draga-Gornja.

393. *longirostris* Gyll. — V. Sz.-Ujvár, Sz.-Ujfalu, Medgyes, Deés.

Stolatus Muls.

394. *crinitus* Boh. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, M.-Kovácsháza, Nagy-Várad. II. Kapuvár. IV. Szőllőske. V. Teste Bielz. VI. Fehértemplom, Jeselnicza, Orsova.

Rhinocyllus Germ.

395. *conicus* Froelich. — I. Budapest, Péczel, Kecskemét, Kalocsa, Nyiregyháza, N.-Várad. II. Z.-Tapolcza, Sopron, Pécs. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Szinna, Szomotor, Varannó. V. Hátszeg, Nagy-Szeben, Szt.-Erzsébet, Fogaras, N.-Selyk, Medgyes. VI. Jeselnicza.

Tropiphorus Schönh.

396. *obesus* Fauv. — V. Montes Kerczenses, Fogarasenses, Bucsecs.

397. *micans* Boh. — III. Trencsén. IV. Jászó. VI. Német-Bogsán (Lokája), Resicza, Oravicza, Anina.

398. *carinatus* Müll. (*elevatus* Hbst.) — II. Z.-Tapolcza. III. Valles Vrátna et Bisztra, Tátrafüred. IV. Bártfa, Mons Simonka, Nagy-Bocskó. V. Frequens.

399. *tomentosus* Marsh. (*cinereus* Boh.) — III. Tátrafüred. IV. Mons Rabaszkala, M.-Laborcz. VIII. Fiume.

400. *obtusus* Bonsd. — In. regione V. (Seidlitz, 345, p. 667.)

401. *globatus* Herbst. — VI. Teste Heyden. VII. Fužine.

ochraceosignatus Boh. — Secundum Ocskay in regione VII.

402. *cucullatus* Fauv. — In reg. VII. (Auctor, 93, p. 167.)

403. *styriacus* Bed. — V. Montes Kerczenses. VII. Velebit.

Minyops Schönh.

404. *carinatus* L. — I. Kalocsa. V. M.-Záh.

v. *variolosus* F. — Frequens.

Gronops Schönh.

405. *lunatus* F. — IV. Gálszécs, Varannó. V. Zilah.

Dichotrachelus Stierl.

406. *Kimakowiczi* Flach. — V. Mons Korongyos, Montes Cibinenses.

Alophus Schönh.

407. *triguttatus* F. — Frequens.

408. *Stierlini* Reitt. — V. Montes Porumbákenses. (Leg. A. Ormay, 264, p. 40.)

409. *Kaufmanni* Stierl. — I. Budapest, Péczel. II. Z.-Tapolcza, Pécs. IV. Szinna. V. Peér. VII. Eszék. VIII. Martinšćica.

Lepyrus Germ.

410. *palustris* Scop. (*colon* L.) — Communis.
v. *Herbichi* Zavadszky. — V. Montes Bodzaenses, Barót.

411. *rugicollis* Desbr. — I. Szeged. IV. Homonna, Bártfa. V. Deés, K.-Torony, Medgyes. VI. Dognácska, Ferenczfalva.

412. *dorsalis* Reitt. — Habitat in Hungaria media. (Auctor, 319, XI, p. 146.)

413. *capucinus* Schall. (*binotatus* F.) — Frequens.

Hylobius Schönh.

414. *piceus* Deg. (*pineti* F.) — III. Beszterczebánya, Koritnyicza, F.-Bocza, Tátrafüred. IV. Szádellő, Montes Balzatul et Menczul. V. Montes Biharenses, Cibinenses et Fogarasenses, Mons Keresztényhavas, Montes ad fluv. Maros, Borgó.

415. *abietis* L. — I. Budapest. II. Kőszeg, Pécs. III. Beszterczebánya, Trencsén, G.-Lubohna, Árva-Váralja, Lubló, Tátrafüred. IV. Bártfa, Sátoralja-Ujhely, Com Marmaros: Valles Vizér et Fajna, Mons Pietrosz. V. Frequens. VI. O.-Bisztra. VII. Fužine.

416. *pinastri* Gyll. — VII. Kosinj-Gornji. (Anonymus, 6, p. 27.)

417. *fatuus* Rossi. — In toto regno occurrit.
v. *rugicollis* Mannh. — V. M.-Vásárhely, Nagy-Szeben.

Anisorrhynchus Schönh.

418. *monachus* Grm. — VII. Mons Bukova-Kusa. VIII. Fiume, Crkvenica.

Liparus Oliv.

419. *dirus* Herbst. — I. Budapest. II. Sopron, Pécs. III. Putnok. IV. Torna, Tolcsva. V. Vallis Zsil. Montes Cibinenses, N.-Csür, Brassó, Montes ad fluv. Maros. VIII. Fiume.

420. *glabrirostris* Küst. (*carinaerostris* Küst.) — III. Beszterczebánya, Trencsén. IV. Frequens. V. Montes Retyezát et Kerczenses, Brassó, Hosszufalu.

421. *germanus* L. — I. N.-Várad, Feketeerdő. II. Pécs, Kőszeg. IV. S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Tokaj, Valles Vizér et Fajna, Mons Lungacsásza. V. Teste Bielz. VI. Mons Domoglet, Korniaréva. VII. Mons Bukova-Kusa.

422. *transsylvanicus* Petri. — V. Brassó, Segesvár. VII. Teste Auctore.

423. *illyricus* Gyll. — In regione VII. (Reitter, 410, p. 223.)

424. *coronatus* Goeze — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Szőllős. II. B.-Nána, Felsőlő, Z.-Tapolcza, Pécs. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely. V. Montes Cibinenses, Segesvár, Előpatak. VIII. Fiume.

Plinthus Germ.

425. *Parreyssi* Boheм. — I. Bánlaka, Mons Királyhágó. V. Brassó. VI. Herkulesfürdő, Korniaréva.
v. *Gerli* Boh. — VII. Teste Schönher (339, VI., p. 319.).
v. *Elekesi* Ormay. — V. Sz.-Ujvár, Montes Cibinenses: Remete.

426. *Megerlei* Panz. — VI. Herkulesfürdő. VII. Varasd.

427. *Findeli* Boh. (*Illigeri* Germ.) — V. Felső-Sebes (sec. Fuss). VI. Orsova.
v. *styrianus* Boh. — VI. Orsova. (Petri 403, pag. 15.)

428. *Tischeri* Germ. (*anceps* Boh., *transsylvanicus* Reitt., *negoianus* Reitt.) — III. Valles Vrátna et Bretkovicza. IV. Montes Hoverla et Lungacsásza. V. Montes Radnaenses: ad balneum Valea-Vinului, Montes Cibinenses, Mons Galbina, Montes Kerczenses et Fogarasenses, Mons Keresztényhavas, Brassó, Segesvár. VI. Mons Domoglet.

429. *Sturmi* Germ. — I. Montes Biharenses. III. Beszterczebánya, Vallis Vrátna, N.-Lipcse, Koritnyicza, Bretkovicza. IV. Montes Lungacsásza, Hoverla et Pietrosz. V. Montes Radnaenses, Hátszeg, Mons Paring, Montes Kerczenses et Fogarasenses, Brassó. VI. Ferenczfalva, Herkulesfürdő, Korniaréva. VII. Fužine.

430. *tigratus* Rossi. — III. Bártfa. V. Montes Cibinenses et Fogarasenses, Brassó, Sz.-Régen. VI. N.-Bogsán, Zlaticza, Herkulesfürdő.
v. *porcatus* Panz. — II. Sopron, Pécs.

Liosoma Steph.

robustum Seidl. — V. Mons Hargita. (Bielz, 27, p. 87.)*

431. *deflexum* Panz. — IV. Bártfa, M.-Laborcz. V. Kolozsvár, Montes Retyezát, Praesbe, Fogaras, Brassó, Sz.-Régen. VI. Resicza. VII. Zágráb, Fužine.

432. *Hopffgarteni* Stierl. — In regione V (Auct., 359, p. 19.).

433. *oblongulum* Boh. — V. Montes Radnaenses:

* Specimen Fussianum Musaei Nationalis Hungarici ex Hispania oritur.

ad balneum Valea-Vinului (Ganglbauer, 399, p. 186.).

434. *muscorum* Bris. — V. Rahó. (Reitter, 295, p. 61.)

435. *cribrum* Gyll. — II. Pécs. III. Montes K.-Kriván et Chocs, Tátra (Lersch villa). IV. Bártfa, M.-Sziget. V. Brassó, Mons Nagykőhavas. VI. Resicza.

436. *concinnum* Boh. — I. Remecz, Mons Oncsásza. IV. Mons Hoverla, Luhi, Mons Menczul. V. Montes Radnaenses (Valea-Vinului).

Aparopion Hampe.

437. *costatum* Fahrs. — I. Hagymádfalva. V. Vallis Lotrióra, K.-Disznód, Montes Kerczenses et Porumbákenses. VI. Resicza, Oravicza, Ferenczfalva, Herkulesfürdő. VII. Capella.

Adexius Schönh.

438. *scrobipennis* Gyll. — III. Trencsén, R.-Teplicz. IV. M.-Laborcz, Mons Hoverla, Rahó. V. Vöröstorony, Brassó. VI. Resicza. VII. Zágráb, Podsused, Capella.

Trachodes Germ.

439. *hispidus* L. — IV. Rahó. V. Vallis Lotriórа, Nagy-Szeben, Praesbe, Szt-Erzsébet, Montes Kerczenses, Volkány, Brassó, Borszék, Szász-Régen. VI. Resicza, Oravicza, Szekul.

440. *Heydeni* Stierl. — V. Brassó. VII. Secundum Heyden.

Cotaster Motsch.

441. *uncipes* Boh. — III. Vallis Vrátna. VI. Resicza. VII. Plitvicza.

Microcopes Faust.

442. *pilosus* Motsch. (*uncatus* Friv). — VI. Resicza, Herkulesfürdő. VII. Fužine.

Hypera Germ.

443. *Kraatzi* Cap. — I. Budapest, Kalocsa. VI. Herkulesfürdő. VII. Ruma.

444. *cyrta* Germ. — I. Budapest. II. Pécs. III. Kézsmárk.

445. *intermedia* Boh. — I. Budapest. V. Montes Kerczenses et Porumbákenses, M.-Záh. VI. Oravicza, Báziás, Herkulesfürdő. VIII. Fiume.

v. *marmorata* Cap. — III. Beszterczebánya, Montes K.-Kriván et Djumbir (Com. Liptó). IV. Torna, Bártfa. V. Montes Cibinenses. VI. Herkulesfürdő. VII. Ruma.

446. *oxalidis* Herbst. — I. N.-Várad. III. Beszteczebánya, Koritnyicza, Tátra (Mliniczavölgy). IV. Szőllőske, Veresmart (Com. Mármaros), Luhi, Rahó, N.-Bánya. V. Ad balneum Valea-Vinului, Præsbe, Montes Kerczenses, Fogaras, Brassó (Czenk). VI. Herkulesfürdő.. VII. Fužine, Velebit.

v. *ovalis* Boheм. — III. Vallis Vrátna, Montes K.-Kriván, Mincsol et Oroszlánkő. V. Montes Cibinenses, Kerczenses, Mons Királykő, Brassó (Czenk). VI. Herkulesfürdő.

447. *tesselata* Herbst. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. Kőszeg, Pécs. III. Kézsmárk. IV. K.-Helmecz. V. Hátszeg, Brassó.

448. *palumbaria* Germ. — I. Kalota. III. Beszterczebánya. IV. Torna, Szádellő, Bártfa. V. Frequens. VI. Herkulesfürdő.

449. *segnis* Cap. — V. Montes Cibinenses. VI. Herkulesfürdő.

450. *comata* Boh. — I. Montes Biharenses. III. Brankó, Tátrafüred. IV. Rahó, Mons Hoverla, Cserna-Hóra. V. Ad balneum Valea-Vinului, Montes Retyezát, Montes Sánta et Keresztényhavas, Brassó, Segesvár.

451. *velutina* Boh. — I. Montes Biharenses. III. N.-Lipcse, Koritnyicza. IV. O.-Ruszka, Mons Rabaszkala, Szinna, N.-Bocskó. VII. Mons Bukova-Kusa.

oblonga Boheм. — V. Vallis Zsil. (Bielz, 27, p. 86.)

452. *salviae* Schrk. — I. N.-Várad. IV. Jászó. V. Montes Retyezát. VI. Korniaréva.

453. *elegans* Boh. — I. N.-Várad. V. N.-Szeben, Montes Cibinenses, Segesvár. VI. Báziás, Mons Domoglet. VII. Virovica.

454. *punctata* F. — Frequens.

455. *fasciculata* Herbst. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa. II. Zánka, Pécs. III. Beszterczebánya. V. Boicza, Máda.

456. *alternans* Steph. — VI. Herkulesfürdő: Mons Cserteg. (Leg. J. Frivaldszky.)

457. *arundinis* Payk. — I. Budapest, Dabas, Kalocsa. V. Dobra.

458. *adspersa* F. (*pollux* F.) — Frequens.

v. *histrio* Boh. — IV. Czigánd. V. Segesvár.

459. *rumicis* L. — Communis.

460. *contaminata* Herbst. — I. M.-Kovácsháza, N.-Várad. II. Sopron. III. Nyitra. V. Montes Cibinenses. VI. Grebenácz.

461. *pustulata* Friv. — V. Vallis Zsil, Medgyes. VI. N.-Bogsán, Herkulesfürdő.

462. *striata* Boh. — V. Fogaras. VI. et VII. Teste Capiomont.

463. *meles* F. — I. Budapest, M.-Berény, N.-Várad.

II. Pécs. IV. Bártfa, Sátoralja-Ujhely. V. Ad balneum Gyógy, Vallis Lotrióra, N.-Szeben. VI. Ulma, Krassova, Dognácska, Rumunyest. VIII. Fiume.

464. *pastinacae* Rossi. — I. Kalocsa. (Leg. F. Speiser. 349, p. 42.)

v. *tigrina* Boh. — I. Budapest, Péczel, D.-Pataj. VI. Palics.

465. *carinicollis* Stierl. — V. Montes Kerczenses. (Leg. A. Ormay, 264, p. 40.)

466. *arator* L. (*polygoni* L.) — Frequens.

467. *Rogenhoferi* Ferr. — VI. Temesvár, Grebenácz.

468. *elongata* Payk. — I. Budapest, Nyiregyháza. III. Koritnyicza, Tátrafüred. IV. O.-Ruszka. V. Vallis Zsil, Kereszténysziget, Brassó, Mons Bucsecs.

469. *pedestris* Payk. (*suspiciosa* Herbst). — Frequ.

470. *murina* F. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. Z.-Tapolcza. IV. Homonna, S.-A.-Ujhely, Szomotor. V. Peér, Hátszeg, N.-Csür. VI. Rumunyest. VIII. Fiume.

471. *variabilis* Herbst. — Communis.

v. *postica* Gyll. — V. N.-Szeben, Kereszténysziget, Fogaras.

472. *plantaginis* Deg. — I. Péczel, Keczel, B.-Csaba, N.-Várad. II. Sopron, Keszthely. III. Tavarnok, Trencsén. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, N.-Mihály, Homonna, Szomotor. V. Kolozsvár, Hátszeg, N.-Szeben, Fogaras, Segesvár, Sz.-Régen. VI. Mons Szemenik, Rumunyest.

473. *denominanda* Cap. — I. Budapest, Kecskemét. V. N.-Csür.

474. *trilineata* Marsh. (*plagiata* Redtb.) — I. Budapest, Keczel. II. N.-Vázsony, Zircz. IV. Bártfa, Szobráncz, M.-Sziget. V. Nagy-Szeben, Szt-Erzsébet, Fogaras. VI. Báziás, Herkulesfürdő.

475. *nigrirostris* F. — I. Budapest, Kalocsa, B.-Csaba, N.-Várad. II. D.-Örs, Z.-Tapolcza, Sopron, Pécs. III. Tavarnok, Trencsén. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, Varannó, Gálszécs, Mons Vihorlat. V. Hátszeg, N.-Szeben, Veresmart, Fogaras, Segesvár, Sz.-Régen.

476. *constans* Boh. — III. Beczkó. (Brancsik, 40, pag. 39.)

477. *viciae* Gyll. — I. Budapest. II. Pécs. III. Beczkó. IV. S.-A.-Ujhely, Szerencs. V. Szamos-Ujfalu, Sz.-Régen. VI. Fehértemplom. VII. Diakovár.

Limobius Schönh.

478. *borealis* Payk. (*dissimilis* Hbst.) — I. Budapest, Péczel, Debreczen, Kalocsa, N.-Várad. II. Zircz, Pécs. IV. Szőllőske, Czigánd. V. Nagy-Szeben, N.-Csür, Sz.-Ujfalu. VI. Herkulesfürdő.

479. *Hampei* Cap. — V. Montes Cibinenses, Mons Szurul.

Coniatus Germ.

480. *splendidulus* F. — V. Gy.-Tölgyes. (Legit A. Ormay, 264, p. 40.)

Acentrus Schönh.

481. *histrio* Boh. — V. N.-Csür. (Legit C. Fuss.)

Pissodes Germ.

482. *piceae* Ill. — III. Benyus, Koritnyicza, Beneshäza, Tátrafüred. IV. Bártfa. V. Montes Czódenses, Mons Nagykőhavas, Héviz, Besztercze. VI. Korniaréva. VII. Fužine.

483. *pini* L. — II. Kőszeg. III. Kézsmárk, Tátrafüred. IV. Bártfa, Homonna. V. Montes Kerczenses. VII. Koszinj-Gornji, Fužine.

484. *notatus* F. — I. Budapest. II. Kőszeg. III. Trencsén, Koritnyicza. V. Montes Fogarasenses, Brassó. VII. Fužine.

485. *validirostris* Gyll. — V. N.-Szeben, Præsbe, K.-Talmács.

486. *harcyniae* Herbst. — III. Tátrafüred. IV. Mons Menczul (Com. Mármaros.)

487. *piniphilus* Herbst. — IV. Kassa. (Legit J. Frivaldszky.)

488. *scabricollis* Mill. — III. Mons Djumbir (Com. Liptó). V. Præsbe.

Grypidius Steph.

489. *equiseti* F. — I. Budapest, Péczel. II. Sopron, Zircz. III. Trencsén. IV. Bártfa, N.-Mihály. V. Hátszeg, Nagy-Szeben, Vöröstorony, Marpód, Fogaras, Segesvár, Sz.-Régen, Gy.-Tölgyes.

490. *brunneirostris* F. — III. Bohuszlavicz. (Legit Dr. C. Brancsik, 42, p. 67.)

Pachytychius Jekel.

491. *sparsutus* Ol. (*pernix* Gyll.) — I. Budapest, Fót, Kalocsa. II. Ács. IV. S.-Patak. V. Ad balneum Gyógy, Szt.-Erzsébet, K.-Disznód. VI. Grebenácz, Báziás, Herkulesfürdő. VII. Zimony.

v. *obesus* Boh. — I. Budapest. VI. Grebenácz.

depressipennis Tourn. — Hungaria (Auctor, 366, p. 459.).

Erirrhinus Schönh.

492. *festucae* Hbst. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, S.-Lád. II. Pécs. V. N.-Csür, M.-Záh. VI. Báziás.

493. *Nereis* Payk. — I. Peszér. IV. S.-Patak. V. N.-Szeben.

494. *scirrhosus* Gyll. — II. N.-Vázsony, Z.-Tapolcza. V. N.-Szeben.

Notaris Steph.

495. *bimaculatus* F. — I. Budapest. II. Komárom, Sopron. V. N.-Szeben, Szt-Erzsébet, Fogaras, M.-Záh. VI. Báziás.

v. *Frivaldszkyi* Tourn. — I. Budapest. II. Ács. IV. Bártfa.

496. *scirpi* F. — Frequens.

497. *acridulus* L. — Communis.

v. *montanus* Tourn. — IV. Luhi. V. Præsbe.

498. *Maerkeli* Boh. — I. Budapest, Montes Biharenses. III. Zsolna.

499. *aterrimus* Hampe (*Brancsiki* Tourn.) — III. Mons K.-Kriván. IV. Bártfa, Mons Szinnaikő. V. Mons Korongyos, Kolozsvár, Vallis Czód, N.-Talmács, Brassó, Tömös. VI. Resicza, Herkulesfürdő, Mons Szárko. VII. Velebit.

500. *Merkli* Stierl. — In regione VI. (Detexit E. Merkl.)

Icaris Tourn.

501. *sparganii* Gyll. — I. Budapest, Péczel, Fót, Peszér, Szeged, Debreczen. II. Ács, Lacus Fertő. V. Sz.-Magyaros, Segesvár.

502. *globicollis* Fairm. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa, Szeged. VI. Grebenácz, Báziás, Herkulesfürdő.

Dorytomus Steph.

503. *longimanus* Forst. (*vorax* F., *Frivaldszkyi* Tourn.) — Frequens.

v. *macropus* Redtb. — Simul cum stirpe.

v. *ventralis* Steph. — III. Tavarnok. V. Nagy-Szeben.

504. *tremulae* Payk. — In toto regno occurrit.

505. *tortrix* L. — I. Budapest, Kalocsa. II. Komárom, Z.-Tapolcza, Sopron. III. Beszterczebánya, Trencsén. T.-Szt.-Márton. IV. Bártfa, Homonna. V. Kolozsvár, Hátszeg. VI. Herkulesfürdő.

506. *nebulosus* Gyll. — IV. Vallis Fajna. (Leg. J. Frivaldszky.)

507. *minutus* Gyll. — I. Budapest, Kalocsa. IV. Tokaj. V. Sz.-Ujvár, Montes Czódenses. VI. Herkulesfürdő.

508. *validirostris* Gyll. — Frequens.

509. *flavipes* Panz. — Creber.

510. *filirostris* Gyll. — I. Budapest, Kalocsa. II. Pécs. III. Beczkó. IV. Bártfa. V. Fogaras, Segesvár. VI. Herkulesfürdő.

511. *Dejeani* Faust. — I. Budapest, Kalocsa. II. Szegzárd. III. Tavarnok, Trencsén. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, Bély, M.-Laborcz. V. Zilah, Déva, Nagy-Szeben, Deés. VI. Temesvár, Herkulesfürdő.

512. *taeniatus* F. — I. Budapest, Kalocsa. II. Ács, Pécs. III. Trencsén. IV. Bártfa, Körtvélyes. V. N.-Szeben, Brassó. VI. Csenej, Resicza.

513. *affinis* Payk. — Frequens.

514. *occalescens* Gyll. — I. Budapest, Hajós. II. Ács, Keszthely. III. Beszterczebánya, Zsolna.

515. *melanophthalmus* Payk. (*agnatus* Boh.) — Frequens.

v. *clitellarius* Boh. — I. Budapest. II. Ács, Szegzárd, Zákány. III. Vallis Vrátna. IV. Sátoralja-Ujhely. V. N.-Szeben.

516 *majalis* Payk. — III. Ács, Keszthely. III. Trencsén.

517. *puberulus* Boh. — I. Kalocsa. VI. Teste Faust. VII. Eszék.

518. *salicinus* Gyll. — III. Kézsmárk. (sec. J. Frivaldszky.)

519. *villosulus* Gyll. — I. Budapest, Kalocsa. II. Pécs. IV. Bártfa, Varannó, Tokaj, N.-Bocskó. V. N.-Szeben, N.-Csür. VI. Herkulesfürdő.

520. *rufulus* Bed. (*pectoralis* Gyll.) — I. Kalocsa. II. Sopron. III. Kézsmárk. IV. Bártfa, Homonna. V. Kolozsvár, Hátszeg, N.-Szeben.

v. *plagiatus* Gyll. — I. Kalocsa. (Legit F. Speiser.)

521. *dorsalis* L. — III. Tátrafüred. IV. Mons Vihorlat. V. Segesvár.

Smicronyx Schönh.

522. *cyaneus* Gyll. — I. Budapest. (Legit E. Frivaldszky.)

523. *Reichi* Gyll. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa.

524. *jungermanniae* Reich (*cicur* Gyll.) — Frequ.

525. *striatipennis* Tourn. — I. Budapest. II. Nagy-Vázsony, Pécs.

526. *coecus* Reich. (*politus* Boh.) — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. IV. Torna. V. Sz.-Sebes, Segesvár.

Brachonyx Schönh.

527. *pineti* Payk. — III. Kézsmárk. IV. Bárfa, Széphalom, Szőllőske, Varannó, Nagy-Mihály. VI. Herkulesfürdő.

Anoplus Schönh.

528. *plantaris* Naezfn. — II. Sopron. III. Trencsén. IV. Bártfa, Montes Rabaszkala et Hoverla. V. Vallis Lotrióra. N.-Szeben, Mons Sánta, Vörös-torony, K.-Disznód, Montes Kerczenses, Büdös, Segesvár. VI. Herkulesfürdő.

529. *roboris* Suffr. — III. Vallis Vrátna. IV. Bártfa, Mons Hoverla.

Tanysphyrus Germ.

530. *lemnae* Payk. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Nyiregyháza. II. Zircz, Pécs. IV. S.-A.-Ujhely, Szatmár. V. Nagy-Szeben, Fogaras, Brassó.

Dicranthus Motsch.

531. *elegans* F. — I. Budapest, Kalocsa, M.-Kovácsháza. VI. Báziás.

Bagous Schönh.

532. *petro* Herbst. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Alpár. IV. S.-A.-Ujhely. VI. Báziás.

533. *biimpressus* Fahrs. — III. Trencsén. (Brancsik, 40, p. 39.)

534. *cylindrus* Payk. — I. Budapest, Mező-Túr, M.-Kovácsháza, Nyiregyháza. III. Trencsén. V. Hátszeg, N.-Szeben, Brassó. VI. Palics.

535. *Frivaldszkyi* Tourn. — IV. Jászó. VI. Palics.

536. *rotundicollis* Boh. — I. S.-Patak. VI. Báziás.

537. *binodulus* Herbst. — I. Budapest, Péczel, Peszér, Kecskemét, Kalocsa. IV. S.-A.-Ujhely, N.-Mihály, Tokaj. V. Sz.-Ujvár. VI. Báziás.

538. *nodulosus* Gyll. — I. Budapest, Kalocsa. II. Ács. V. Brassó.

539. *frit* Hbst. — Frequens.

540. *claudicans* Boh. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, M.-Kovácsháza.

541. *diglyptus* Boh. — I. Kalocsa. (Leg. F. Speiser, 349, p. 43.)

542. *lutulosus* Gyll. — I. Budapest, Kalocsa, Nyiregyháza. II. Pécs. IV. Jászó. V. Hátszeg, Szent-Erzsébet.

543. *tempestivus* Hbst. — I. Budapest, Kalocsa, N.-Várad. III. Beczkó. IV. Jászó, Szomotor, N.-Mihály. V. Segesvár.

544. *limosus* Gyll. — I. Budapest. VI. Báziás. VII. Diakovár.

545. *pilipes* Desbr. — Habitat solum in Hungaria. (Auctor, 397. p. 103.)

546. *lutosus* Gyll. — I. Budapest, Kalocsa, Nagy-Várad. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj. V. N.-Szeben, Barót.

547. *glabrirostris* Hbst. *(Collignensis* Hbst.) — I. Budapest Péczel, Dabas, Kalocsa, Szeged, M.-Kovácsháza, Nyiregyháza. IV. Jászó, Szinna. Tokaj. V. Brassó. VI. Báziás, Resicza, Szekul, Herkulesfürdő.

548. *subcarinatus* Gyll. — I. Budapest, Kalocsa, M.-Kovácsháza. IV. Szőllőske. V. Mezőség.

549. *validus* Rosh. — I. Budapest, Kalocsa, Szeged. II. Ács, Piszke. VI. Báziás.

550. *argillaceus* Gyll. — I. Budapest, Péczel, M.-Káta, Kecskemét, Kalocsa, Szeged. II. Ács, Lacus Fertő. VI. Palics, Titel, Grebenácz, Báziás.

Hydronomus Schönh.

551. *alismatis* Marsh. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, M.-Kovácsháza. II. Zircz. III. Nyitra. V. Hátszeg, Nagy-Szeben, Nagy-Csür, Montes Kerczenses.

Pseudostyphlus Tourn.

552. *Pilumnus* Gyll. — I. Budapest, Kalocsa. IV. S.-A.-Ujhely, N.-Mihály. V. Sz.-Ujvár. Nagy-Szeben.

553. *pilifer* Gredl. — I. Budapest, Szolnok, Szöreg. IV. Bártfa.

Orthochaetes Germ.

554. *setiger* Beck. — III. Hermánd, Várna, Tátra (Marmotahegy). V. Vallis Zsil, N.-Csür. VII. Risnjak.

Echinocnemus Schönh.

555. *efferus* Faust. — Secundum Auctorem est solum Hungariæ incola. (84, p. 188.)

Dryophthorus Schönh.

556. *corticalis* Payk. *(lymexylon* F.) — I. Péczel, Parád, Kalocsa. II. Boglár. III. Trencsén. IV. Tolcsva. V. Tasnád, Montes Cibinenses. VI. Resicza, Herkulesfürdő.

Cossonus Clairv.

557. *linearis* F. — I. Budapest, Kalocsa. II. D.-Örs. III. Trencsén. IV. Tolcsva. V. Tasnád, Montes Cibinenses. VI. Resicza, Herkulesfürdő.

558. *planatus* Bed. *(linearis* Boh.) — I. Budapest, Kalocsa. II. Sopron.

559. *cylindricus* Sahlb. — I. Budapest, Kalocsa, N.-Várad. II. Sopron. III. Montes Szoblahóenses (Com. Trencsén). IV. Bártfa, Varannó. V. Hátszeg, Segesvár. VI. Herkulesfürdő.

Codiosoma Bed.

560. *spadix* Hbst. — I. M.-Kovácsháza, N.-Várad. II. Esztergom. VIII. Fiume.

Eremotes Wollast.

561. *planirostris* Panz. *(elongatus* Gyll.) — I. Budapest, N.-Várad. IV. Montes Beszkidenses.

V. Præsbe, Montes Kerczenses. VI. Ferenczfalva, Oravicza, Herkulesfürdő.

562. *ater* L. — I. Debreczen. III. Beszterczebánya, Trencsén, Mons Szmrekovicza. IV. Mons Rabaszkala, Vallis Fajna. V. Præsbe, K.-Disznód, Montes Kerczenses, Brassó, Oláhfalu. VI. Ferenczfalva, Herkulesfürdő. VII. Mrzla-Vodica.

563. *punctatulus* Boh. — I. Budapest, N.-Várad. VII. Montes Fruska-Góra.

564. *reflexus* Boh. — I. Budapest, N.-Várad. II. Boglár. III. Kékkő, K.-Kálna. V. Montes Cibinenses, Sz.-Régen. VI. Herkulesfürdő.

Brachytemnus Wollast.

565. *porcatus* Germ. — II. D.-Örs. III. Trencsén. IV. Kassa, Bártfa, Tolcsva, Szőllőske. V. Peér, N.-Szeben, Montes ad fluv. Maros.

Rhyncolus Steph.

566. *culinaris* Germ. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, N.-Várad. II. Sopron. IV. Bártfa. V. Hátszeg, N.-Szeben, Brassó.

567. *truncorum* Germ. — I. Budapest, Péczel, Parád, Kalocsa, Hadház, N.-Várad. II. Kőszeg, Boglár, Pécs. III. Agárd. IV. Bártfa. V. Szent-Erzsébet, Fogaras, Borszék.

568. *lignarius* Marsh. — I. Budapest, Kalocsa. II. Boglár. III. Trencsén. V. Montes Cibinenses. VI. Herkulesfürdő, Rumunyest.

569. *cylindricus* Boh. — I. Parád. II. N.-Vázsony. IV. Bártfa. V. Montes Kerczenses, Sz.-Régen, Borszék. VI. Báziás, Herkulesfürdő.

570. *turbatus* Schönh. — V. Brassó. (Bielz, 27, pag. 91.)

Camptorrhinus Schönh.

571. *statua* Rossi. — I. Budapest, Budakesz. IV. Szőllőske. V. Csáki-Gorbó. VI. Herkulesfürdő.

572. *simplex* Seidl. — I. Péczel. II. N.-Vázsony.

Gasterocercus Lap.

573. *depressirostris* F. — I. Budapest, Isaszeg, K.-Kartal, Debreczen, N.-Várad. IV. M.-Sziget. V. N.-Szeben. VI. Temesvár.

Cryptorrhynchus Ill.

574. *lapathi* L. — Frequens.

Acalles Schönh.

575. *denticollis* Germ. — I. Budapest, Péczel. Hagymádfalva. II. Pécs. III. Beczkó, Putnok. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, Szerencs, Velejte, Bánszka, Mons Hoverla. V. Pele, Zilah, Hátszeg, N.-Szeben, N.-Csür, Szt-Erzsébet, Vallis Czód, Fogaras, Brassó. VI. Ferenczfalva, Herkulesfürdő.

576. *camelus* F. — I. Budapest, Budakesz. III. Vallis Vrátna, R.-Teplicz. IV. Torna, Sátoralja-Ujhely, Szomotor, Montes Simonka et Hoverla. V. Montes Cibinenses, Medgyes. VI. Uj-Moldova. VII. Ljeskovac.

577. *variolosus* Stierl. — V. Brassó, Prázsmár, Hosszufalu, Bodza (Kraszna).

578. *Aubei* Boheм. — VI. Orsova, Herkulesfürdő. VII. Fužine.

579. *validus* Hampe. — I. Hagymádfalva. V. Montes Retyezát, N.-Szeben, N.-Csür, Brassó (Czenk). VI. Uj-Moldova, Herkulesfürdő, Rumunyest.

580. *pyrenaeus* Boheм. — IV. Mons Hoverla.

581. *croaticus* Bris. — IV. Mons Hoverla. VII. Teste Auctore.

582. *roboris* Curt. — I. Budapest. V. Hátszeg, Præsbe, Mons Sánta, Montes Kerczenses et Porumbákenses, Brassó, Borszék. VII. Fužine, Ljeskovac. VIII. Fiume.

583. *lemur* Germ. — I. Budapest. II. Kőszeg. III. Trencsén. IV. A.-Bereczki, Czéke, Lelesz. V. Ad balneum Gyógy, Vöröstorony, Brassó, Sz.-Régen, Bükszád. VI. Herkulesfürdő.

584. *echinatus* Germ. (*turbatus*, *misellus* et *parvulus* Boh.). — Frequens.

585. *ptinoides* Marsh. — II. Pécs. IV. S.-Patak. V. Mons Sánta, Montes Cibinenses et Kerczenses. VI. Ferenczfalva. VII. Capella, Ljeskovac.

586. *hypocrita* Boh. — In toto regno occurrit.

587. *variegatus* Boh. — V. Brassó. VI. Herkulesfürdő.

Myorrhinus Schönh.

588. *albolineatus* F. — I. Budapest, Péczel, Dabas, Hajós, Szeged. II. D.-Őrs. IV. Szomotor. VI. Grebenácz. VII. Fiume.

Mononychus Germ.

589. *punctum-album* Hbst. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, M.-Kovácsháza, N.-Várad. II. Pécs. IV. S.-A.-Ujhely. V. Pele, K.-Disznód, Montes Kerczenses, N.-Sink. VI. Herkulesfürdő.

590. *salviae* Germ. — I. Kalocsa, M.-Kovácsháza. II. Pécs. IV. Varannó. VI. Grebenácz.

Coeliodes Schönh.

591. *dryados* Gmel. — I. Budapest, Péczel. II. Sopron. III. Trencsén. IV. Homonna, Mons Vihorlat. V. N.-Szeben, K.-Ápold, Szt-Erzsébet, Brassó.

592. *trifasciatus* Bach. — I. Péczel, Isaszeg. III. Beczkó. V. N.-Szeben.
593. *ruber* Marsh. — I. Budapest, Péczel, Isaszeg, Debreczen. II. Pécs. III. Felka. IV. Bártfa, Szobráncz. V. N.-Szeben, Szt-Erzsébet, Sz.-Régen.
594. *proximus* Schultze. — In regione VI. (Auct., 411, p. 422.).
595. *erythroleucus* Gmel. — I. Budapest, Péczel, Isaszeg, Kalocsa, Hajós, Debreczen. II. Pécs. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Erdőbénye. V. Pele, N.-Szeben.
596. *Hoffmanni* Weise. — VIII. Fiume. (Detex. A. Hoffmann.)
597. *rubicundus* Herbst. — III. Gbellán. IV. Tátrafüred. V. N.-Szeben, Brassó.
598. *cardui* Herbst. — Frequens.
599. *fuliginosus* Marsh. — Ut prior.
600. *epilobii* Payk. — I. Péczel, Isaszeg. IV. M.-Sziget. V. Montes Cibinenses. VI. Ferenczfalva, Herkulesfürdő.
601. *quadrimaculatus* L. — Communis.
602. *lamii* F. — I. Budapest, Haraszti, Péczel. II. Sopron, Pécs. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely. V. K.-Ápold, Montes Kerczenses, Sz.-Régen. VII. Diakovár.
603. *affinis* Payk. — I. Budapest. IV. Bártfa, Homonna, Vallis Fajna. V. N.-Szeben, Fogaras, Mons Keresztényhavas, Brassó, Bodza.
604. *exiguus* Ol. — I. Budapest. IV. M.-Laborcz. VI. Rezsicza, Herkulesfürdő. VII. Diakovár.

Scleropterus Schönh.

605. *serratus* Germ. *(carpaticus* Brancs.) — III. Vallis Vrátna, Montes K.-Kriván et Mincsol, Zsolna, Trencsén, Mons Chocs. IV. Bártfa, Mons Vihorlat, O.-Ruszka, Mons Hoverla. V. Montes Korongyos et Sánta, F.-Sebes, Montes Kerczenses. VI. Mons Domoglet, Korniaréva. VII. Mrzla-Vodica.
606. *offensus* Boh. — IV. Bártfa, Mons Szinnaikő, M.-Laborcz, Montes Hoverla et Menczul. V. Montes Kerczenses, Brassó.
607. *globulus* Herbst, — I. Budapest, Mons Pilis, Monor, Keczel, Kalocsa. III. Mons K.-Kriván. IV. Mons Vihorlat. V. Malomviz, ad balneum Gyógy, N.-Talmács, Montes Kerczenses et Fogarasenses, Brassó, Segesvár. VI. Resicza. VII. Fužine.
608. *Reitteri* Weise. — IV. Cserna-Hóra, Mons Balzatul (Com. Marmaros).

Marmaropus Schönh.

609. *Besseri* Gyll. — V. Felső-Orbó. VI. Jeselnicza, Orsova.

Rhinoncus Steph.

610. *Castor* F. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, B.-Csaba, Debreczen. II. Sopron, Pécs. IV. S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Szomotor. V. Montes Retyezát, N.-Szeben, F.-Komána. VI. Herkulesfürdő. VII. Medak.
611. *bruchoides* Herbst. — Frequens.
612. *inconspectus* Herbst. — Ut prior.
613. *pericarpius* L. — Communis.
614. *perpendicularis* Reich. — Frequens.
615. *albicinctus* Gyll. — I. Budapest, Kalocsa, Szentes. II. Pécs. V. N.-Szeben.

Phytobius Schönh.

616. *velaris* Gyll. — I. Budapest, Kalocsa. II. Ács. III. Beczkó. IV. A.-Bereczki. V. N.-Csür. VI. Osztrova.
617. *canaliculatus* Fahrs. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. Ács. V. N.-Szeben. VI. Palics.
618. *Waltoni* Boh. — I. Budapest, Péczel. II. Ács. IV. Homonna. V. Malomviz, N.-Szeben.
619. *comari* Herbst. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. Pécs. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, Beregszász. V. N.-Szeben. VII. Diakovár.
620. *4-tuberculatus* F. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Csongrád, Nyiregyháza, Nagy-Várad. II. Ács. III. Beczkó. IV. Terebes, N.-Mihály, Varannó, Szobráncz, Vallis Fajna, V. N.-Talmács, Montes Cibinenses.
621. *granatus* Gyll. — I. Budapest, Kalocsa. III. Beczkó. V. Montes Cibinenses. VI. Petrovoszelló, Báziás. VII. Eszék.
622. *4-nodosus* Gyll. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. Ács. III. Beczkó. V. N.-Szeben, Montes Kerczenses.
623. *denticollis* Gyll. — I. Budapest, Palota. IV. S.-A.-Ujhely. VI. Stájerlak.
624. *4-cornis* Gyll. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. IV. S.-Patak, A.-Bereczki, Varannó, Homonna, Mons Szinnaikő. V. Vöröstorony, Fenyőfalva. VI. Gombos.
625. *leucogaster* Marsh. — I. Budapest, Mons Pilis, Haraszti, Péczel, Kalocsa, Hajós, Hadház. IV. Jászó. VI. Grebenácz.
626. *velatus* Beck. — V. N.-Csür. (Bielz, 27, p. 90.)

Amalus Schönh.

627. *haemorrhous* Herbst *(scortillum* Herbst). — Frequens.

Ceuthorrhynchidius Duv.

628. *horridus* Panz. — I. Budapest, Kalocsa. II. Z.-Tapolcza. V. Szt-Erzsébet, Kőhalom, Szász-Régen, Gyeke. VI. Herkulesfürdő.

629. *troglodytes* F. — Frequens.
630. *rufulus* Duft. (*frontalis* Bris.) — I. Budapest: Farkasvölgy. (Leg. D. Kuthy.)
631. *Barnevillei* Gren. — V. Gyergyó-Szent-Miklós. (Leg. Dr. G. Horváth.)
632. *terminatus* Herbst. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. Ács. III. Beczkó. V. Nagy-Szeben. K.-Torony.
633. *nigrinus* Marsh. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, B.-Csaba, M.-Kovácsháza. II. Ács, Zircz. IV. Czéke, Tarczal. V. Brassó (Czenk), Segesvár.
634. *melanarius* Steph. — I. Budapest, Kalocsa, Szeged. III. Beczkó. VI. Resicza.
635. *quercicola* Payk. — I. Budapest, Kalocsa, B.-Csaba, M.-Kovácsháza. VI. Grebenácz, Herkulesfürdő.
636. *floralis* Payk. — Frequens.
637. *pyrrhorhynchus* Marsh. — I. Budapest, Kalocsa, Szeged, M.-Kovácsháza. IV. Bártfa, Sátoralja-Ujhely. V. N.-Szeben, K.-Torony. VI. Herkulesfürdő.
638. *pulvinatus* Gyll. — I. Budapest, Péczel, Isaszeg, Szeged, M.-Kovácsháza, M.-Berény. II. Boglár. III. Beczkó. VI. Zlaticza.
639. *Hampei* Bris. — V. Kőhalom. VI. Jeselnicza, Herkulesfürdő.
640. *posthumus* Germ. (*pumilio* Gyll., *asperulus* Boh.) — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Nyíregyháza. III. Beczkó. IV. S.-A.-Ujhely, Lelesz. V. Tasnád.

Ceuthorrhynchus Germ.

641. *topiarius* Germ. — I. Budapest, Péczel, Mező-Kovácsháza. II. Martonvásár, Z.-Tapolcza. III. Verebély, V. N.-Csür. VI. Báziás, Orsova.
642. *viduatus* Gyll. — II. Ács. III.-Vámos-Mikola. V. Kolozsvár, N.-Szeben.
643. *signatus* Gyll. — I. Budapest, Péczel, Farkasd, Keczel, Hajós, Szeged, Derékegyháza. II. D.-Örs. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, Szinna, Tolcsva. V. Hátszeg, Sz.-Sebes, N.-Szeben, N.-Csür, Marpód, Előpatak, Oláhfalu, Segesvár.
644. *pubicollis* Gyll. — I. Budapest, Péczel, M.-Káta, Keczel, Debreczen, N.-Várad. II. Pécs. V. Frequens. VI. Jeselnicza, Herkulesfürdő. VII. Diakovár.
645. *Sahlbergi* Boh. — VI. Herkulesfürdő. (Leg. J. Pável.)
646. *symphyti* Bed. — I. Budapest, Péczel, Ócsa, Dabas, Kalocsa. II. D.-Örs. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, S.-Patak, Varannó. V. N.-Szeben, Fenyőfalva, Felek. VI. Báziás, Herkulesfürdő.
647. *abbreviatulus* F. — I. Budapest, Csepel, Kalocsa, N.-Várad. II. Zirz, Sopron. III. Trencsén, Kézsmárk. IV. N.-Mihály. V. N.-Csür, Marpód, Kercz, Fogaras. VI. Temesvár, Buziás.
borraginis F. — V. N.-Szeben, N.-Csür, Marpód, Szász-Régen. (Bielz, 27, p. 90.)
648. *albosignatus* Gyll. — I. Budapest, Péczel, Keczel, H.-Vásárhely, N.-Várad. VI. Herkulesfürdő.
v. *Kaufmanni* Stierl. — I. Hajós. (Detex. E. Kaufmann.)
649. *aratridens* Schultze. — Habitat solum in Hungaria. (Auctor, 413, p. 276.)
650. *austriacus* Bris. — I. Budapest, Haraszti, Péczel, Isaszeg, Keczel, Hajós, M.-Kovácsháza. II. Boglár. V. N.-Csür, Holczmány.
651. *Frivaldszkyi* Schultze (*Brisouti* Friv.) — I. Budapest. (Detexit, D. Kuthy.)
652. *geographicus* Goeze. — I. Budapest, Isaszeg, Kalocsa. II. Sopron. III. Trencsén. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, Tolcsva. V. Rüsz, Szt-Erzsébet, Előpatak, Bükszád, Medgyes, Sz.-Régen.
653. *radula* Germ. — I. Budapest, Kalocsa. V. Kolozsvár, Brassó.
654. *asperifoliarum* Gyll. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Debreczen.
655. *urticae* Boh. (*stachydis* Faust, *Karamani* Reitt.) — V. N.-Csür. (Leg. C. Fuss.)
656. *pallidicornis* Bris. — Hungaria. (Cat. Col. Eur., 1891, p. 313.)
657. *crucifer* Oliv. — I. Budapest, Péczel, Isaszeg, Kalocsa, N.-Várad. II. D.-Örs. V. Nagy-Szeben, Sz.-Régen.
658. *amplipennis* Schultze. — I. Budapest. II. Zircz.
659. *angulicollis* Schultze. — V. Secundum Ganglbauer. (Auctor, 413, p. 268.)
Aubei Boh. — V. N.-Szeben, N.-Csür, Marpód. (Bielz, 27, p. 90.)
660. *Javeti* Bris. — I. Budapest, Péczel, Isaszeg, Peszér, Kalocsa, Nagy-Várad. II. Z.-Tapolcza, Pécs. III. Beczkó. IV. Páczin. VI. Jeselnicza, Herkulesfürdő.
661. *T-album* Gyll. — I. Budapest, Debreczen. VI. Herkulesfürdő.
662. *larvatus* Schultze — I. Budapest, Péczel. V. N.-Csür, Segesvár. VI. Ulma.
663. *gibbicollis* Schultze. — Incolit etiam Hungariam. (Auctor, 413, p. 275.)
664. *ornatus* Gyll. — I. Budapest, Péczel. V. Segesvár. VI. Ulma.
665. *dimidiatus* Friv. — I. Budapest, Péczel, Isaszeg, Dabas, Kalocsa.

666. *litura* F. — I. Budapest, Kalocsa, Szeged. III. Tátrafüred. IV. Bártfa. V. N.-Szeben, Segesvár. VI. Ulma.

667. *trimaculatus* F. — I. Péczel, Hajós. II. Sopron. IV. Bártfa, Ladomér, N.-Bocskó. V. N-Szeben, Szt-Erzsébet. VI. Herkulesfürdő.

668. *trisignatus* Gyll. — I. Budapest, Parád, Péczel, Isaszeg, Hajós, Kalocsa, N.-Várad. II. Pécs. III. Vallis Vrátna.

669. *Diecki* Bris. — V. N.-Szeben. (Legit C. Fuss.)

670. *hungaricus* Bris. — I. Péczel, Isaszeg, Keczel.

671. *Kraatzi* Bris. — V. N.-Szeben. VII. Teste Auctore.

672. *variegatus* Ol. — Frequens.

673. *edentulus* Schultze. — I. Budapest, N.-Várad. II. Pécs.

674. *molitor* Gyll. — II. N.-Vászony. VI. Resicza.

675. *triangulum* Boh. — I. Péczel. (Leg. Dr. D. Kuthy.)

676. *chrysanthemi* Germ. — V. Volkány, Brassó (Bielz, 27, p. 90.)

v. *figuratus* Gyll. — V. Fogaras. (Bielz, 27, p. 90).

677. *rugulosus* Herbst. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, N.-Várad. II. Pécs. IV. Bártfa, Sátor-Alja-Ujhely, Beregszász. V. Fogaras, Brassó. VI. Herkulesfürdő.

678. *arquatus* Herbst. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Hajós, Szeged. II. Ács, Zircz, Sopron, Pécs. IV. Szőllőske. V. Segesvár. VI. Báziás.

679. *melanostictus* Marsh. — I. Budapest, Keczel. III. Beczkó. IV. Bártfa. V. Mons Keresztényhavas, Brassó. VI. Csenej, Jeselnicza.

680. *euphorbiae* Bris. — I. Budapest, Fót, Péczel, Kalocsa. II. Zircz, Pécs.

681. *quadridens* Panz. — Frequens.

682. *macula-alba* Herbst. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Debreczen. II. Ács, Boglár, Sopron. III. Nyitra, N.-Lénárd. V. Tasnád, N.-Szeben, Brassó, Sz.-Régen.

683. *4-punctatus* Stierl. — I. Hajós. (Auctor, 364, p. 121.)

684. *marginatus* Payk. — I. Budapest, Haraszti, Péczel, Kalocsa, Nyiregyháza. II. Sopron, Pécs. III. Putnok. IV. Torna, S.-Patak, Mons Vihorlat. V. Nagy-Szeben, Szelindek, N.-Csür, Marpód. Montes Kerczenses, Segesvár. VI. Herkulesfürdő.

685. *Mölleri* Thoms. — Etiam in Hungaria habitat. (Schultze, 412, p. 434.)

686. *puncliger* Gyll. — I. Budapest, Péczel, M.-Kovácsháza. III. Beczkó. V. Szt-Erzsébet, N.-Csür, Fenyőfalva, K.-Torony. VI. Oravicza, Herkulesfürdő.

v. *rufitarsis* Gyll. — I. M.-Kovácsháza, N.-Várad.

687. *Ragusae* Bris. — I. Budapest, Péczel. VI. Herkulesfürdő.

688. *rotundatus* Bris. — II. Boglár. VII. Vrdnik.

689. *Lethierryi* Bris. — I. Péczel. VI. Herkulesfürdő.

690. *pilosellus* Gyll. — I. Budapest, Kalocsa, M.-Kovácsháza.

691. *inhumeralis* Schultze. — V. N.-Csür, Vörös-torony, Szt-Gothárd.

692. *denticulatus* Schrk. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. Ács, Z.-Tapolcza. VI. Jeselnicza, Herkulesfürdő. VIII. Fiume.

693. *pollinarius* Forst. — I. Budapest, Haraszti, Péczel, Kalocsa, M.-Kovácsháza, N.-Várad. II. Ács, Pécs. III. Beczkó. V. N.-Csür, Gyeke. VI. Temesvár.

694. *angulosus* Boh. — I. Budapest, Kalocsa, Hajós, V. N.-Szeben, N.-Csür. VI. Palics.

695. *obsoletus* Gyll. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. Ács, Zircz, Pécs. V. N.-Szeben, Brassó. VI. Temesvár, Uj-Moldova.

696. *faeculentus* Gyll. — I. Budapest, Péczel, M.-Káta, M.-Kovácsháza, Hagymádfalva. II. Zircz, Boglár. IV. Velejte. V. N.-Szeben.

697. *picitarsis* Gyll. — I. Budapest, Haraszti, Péczel, M.-Káta, Kalocsa, M.-Berény, Csongrád, Makó. II. Szegzárd. VI. Buziás, Zlaticza.

698. *pleurostigma* Marsh. — Communis.

699. *dubius* Bris. — I. Péczel, Isaszeg. V. Teste J. Frivaldszky.

700. *griseus* Bris. — I. Budapest, Kalocsa. II. Zircz. IV. Kassa.

701. *rapae* Gyll. — I. Budapest, Péczel. II. Boglár. IV. M.-Sziget. V. N.-Szeben, Kercz, Volkány, M.-Záh. VI. Báziás, Herkulesfürdő.

702. *puncticollis* Boh. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. Ács. V. N.-Szeben. VI. Herkulesfürdő.

703. *napi* Gyll. — I. Budapest, Haraszti, Péczel, Kalocsa. II. D.-Örs, Z.-Tapolcza. III. Trencsén.

704. *sophiae* Stev. — I. Budapest, Péczel, Parád, M.-Káta, Kalocsa. II. Boglár. III. K.-Kálna.

705. *validirostris* Gyll. (*Speiseri* Friv.) — I. Kalocsa, Makó.

706. *coarctatus* Gyll. — I. Budapest, Péczel, Szeged. II. Ács, Zircz. V. Teste Bielz.

707. *uniformis* Gyll. — VI. Grebenácz. (Leg. E. Merkl.)

708. *sulcicollis* Payk. (*cyanipennis* Germ.) — I. Budapest, Péczel, M.-Káta, Nyiregyháza, M.-Kovácsháza. II. Boglár. III. Tavarnok. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, N.-Mihály, Homonna, Tolcsva, M.-Sziget. V. N.-Csür, K.-Disznód, K.-Ápold, Sz.-Ujfalu, Brassó, Gyeke. VI. Orsova.

709. *timidus* Weise. — I. Budapest. VII. Teste Reitter.

710. *hirtulus* Germ. — I. Budapest, Haraszti, Péczel, M.-Káta, Kalocsa, M.-Berény, M.-Kovácsháza, N.-Várad. IV. Bártfa, Mons Menczul. V. Szent-Erzsébet. VI. Grebenácz, Herkulesfürdő, Karansebes.

711. *pectoralis* Weise. — VI. Karansebes. (Legit E. Merkl.)

712. *chalybaeus* Germ. *(coerulescens* Gyll.) — I. Budapest, Péczel, Isaszeg, M.-Berény. IV. Bártfa.

713. *carinatus* Gyll. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Derékegyháza, M.-Berény.

714. *canaliculatus* Bris. (*Kuthyi* Friv.) — I. Budapest, Péczel, Isaszeg. V. Teste Auctore.

715. *aeneicollis* Germ. — I. Budapest, Kalocsa. II. Ács. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj. V. N.-Szeben. VI. Jeselnicza, Herkulesfürdő.

716. *scapularis* Gyll. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, B.-Csaba. IV. N.-Mihály, V. N.-Szeben, VI. Herkulesfürdő.

717. *erysimi* F. — Communis.

718. *contractus* Marsh. — Ut prior.

719. *Pandellei* Bris. — VI. Mons Szemenik. (Leg. E. Merkl.)

720. *barbareae* Suffr. — I. Péczel, Isaszeg. V. N.-Szeben, Segesvár.

721. *ignitus* Germ. — I. Péczel, Szabolcs.

722. *laetus* Rosh. (*smaragdinus* Bris.) — I. Budapest, Péczel, Isaszeg. II. Ács, Komárom. VI. Herkulesfürdő.

723. *albolineatus* Friv. — I. Budapest. (Detex. J. Langert.)

724. *albovittatus* Germ. — I. Budapest, Péczel, Isaszeg, Kecskemét, Félegyháza, Kalocsa. II. D.-Örs, Ács, Keszthely. III. Beczkó. V. Hátszeg, N.-Szeben, Brassó, Medgyes, Segesvár, M.-Záh. VI. Palics, Temesvár, Buziás. VII. Eszék.

725. *suturalis* F. — I. Péczel, Kalocsa. V. Sz.-Ujfalu, N.-Csür, Medgyes.

726. *querceti* Gyll. — V. N.-Szeben. VI. Jeselnicza.

727. *consputus* Germ. *(alboscutellatus* Gyll.) — IV. Szobráncz. (Leg. A. Mocsáry.)

728. *arator* Gyll. — I. Isaszeg, Kalocsa. II. Kőszeg. IV. S.-A.-Ujhely, Varannó. V. Præsbe, N-Csür, Szt-Erzsébet, Kercz.

729. *inaffectatus* Gyll. — VI. Ulma, Herkulesfürdő.

730. *syrites* Germ. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Csongrád, Szentes, Szeged. II. Pécs. IV. Torna, Bártfa, Érmihályfalva. V. Kolozsvár, Szt-Erzsébet, Szelindek. VI. Herkulesfürdő.

731. *assimilis* Payk. — I. Budapest, Haraszti, Péczel, Csongrád, Szegvár, Derékegyháza, Makó, M.-Kovácsháza, Ó.-Paulis. II. Ács, Boglár. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Varannó, Homonna, N.-Mihály, N.-Bocskó. V. Tasnád, N.-Szeben, Brassó, Gy.-Tölgyes. VI. Grebenácz. VII. Diakovár.

732. *atomus* Boh. — IV. Bártfa. (Leg. A. Michalovics.)

733. *cochleariae* Gyll. — I. Mons Pilis, Péczel, Kalocsa. IV. Mons Vihorlat, M.-Sziget. V. Előpatak. VI. Buziás.

734. *Schönherri* Bris. — I. Budapest, Péczel, M.-Kovácsháza.

735. *parvulus* Bris. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, M.-Kovácsháza. II. Ács. III. Trencsén.

736. *constrictus* Marsh. — I. Budapest, Péczel, Dabas, Kalocsa. IV. Bártfa.

737. *nanus* Gyll. — I. Budapest, Péczel, M.-Káta, Kalocsa, M.-Kovácsháza, Nagy-Várad. II. Ács, Zircz. IV. Sáros-Patak, Beregszász. V. N.-Csür, Mons Kereszténvhavas.

738. *bicollaris* Schultze. — In regione VI. (Auctor, 413, p. 282.)

739. *nigritulus* Schultze. — I. Kalocsa. (Leg. F. Speiser, Auctor, 413, p. 286.)

740. *sphaerion* Boh. (*veronicae* Friv.) — Péczel. V. K.-Torony.

741. *Paszlavszkyi* Kuthy. — I. Budapest, Péczel. VI. Báziás.

Poophagus Schönh.

742. *robustus* Faust. — VI. N.-Bogsán. (Leg. E. Merkl.)

743. *sisymbrii* F. — I. Budapest, Péczel, Kecskemét, Kalocsa, Szeged, Hadház, N.-Várad. II. Zircz. V. Peér, N.-Szeben, Szt-Erzsébet. VI. Resicza. VII. Eszék.

744. *Hopffgarteni* Tourn. — III. V.-Mikola. (Detex. M. Hopffgarten; Auctor, 367, p. 189.)

Tapinotus Schönh.

745. *sellatus* F. — I. Csepel, Dabas, Kecskemét, Kalocsa, Szeged. III. Beczkó. IV. Homonna, Körtvélyes. V. N.-Szeben.

Orobitis Mannerh.

746. *cyaneus* L. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Hajós. III. Várna. IV. S.-A.-Ujhely. V. Kolozsvár, N.-Szeben, K.-Torony, N.-Csür, Szt-Erzsébet, Oláhfalu. VI. Herkulesfürdő. VII. Diakovár.

747. *nigrinus* Reitt. — VII. Velebit. VIII. Vallis Draga.

Coryssomerus Schönh.

748. *capucinus* Begk. — I. Budapest, Péczel, Kecskemét, Kalocsa, Szeged, Nagy-Várad. II. Z.-Ta-

polcza. III. Nyitra. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, N.-Mihály. V. N.-Csür, Brassó, Medgyes. VII. Diakovár.

Baris Germ.

749. *morio* Boh. — I. Budapest. VI. Temesvár.

750. *artemisiae* Herbst. — I. Budapest, Péczel, Kecskemét, N.-Várad. II. Z.-Tapolcza, Sopron. III. V.-Mikola. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely. V. Hátszeg, N.-Csür, K.-Torony, Fenyőfalva, Fogaras, Medgyes, Sz.-Régen, Gyeke. VI. Csenej, Grebenácz, Moravicza, Herkulesfürdő.

751. *sulcata* Bohem. — V. Kolozsvár, Sz.-Ujvár.

752. *atricolor* Bohem. — I. Rév. (Leg. A. Mocsáry.)

753. *laticollis* Marsh. — I. Budapest, Péczel, Isaszeg, Dabas, Kalocsa, Hajós, Nyiregyháza. II. Ács, Sopron. III. Beszterczebánya. V. Szent-Erzsébet, Medgyes.

754. *dalmatina* Bris. — I. Budapest, Péczel.

755. *timida* Rossi (*nitens* F.) — I. Budapest, Kalocsa, N.-Várad. II. D.-Örs. III. Putnok. IV. Tokaj. V. Gyeke. VI. Grebenácz, Jeselnicza, Uj-Moldova, Herkulesfürdő.

756. *carbonaria* Boh. — I. Péczel, Farkasd, Kalocsa, Makó. V. Tasnád, N.-Csür, Szt-Erzsébet.

757. *atramentaria* Boh. — I. Budapest, Péczel, Keczel, Hajós, Debreczen. II. Pécs.

758. *angusta* Brull. — I. Budapest, Péczel, Peszér, Kecskemét, Hajós, M.-Beréuy. II. Ács. VI. Grebenácz.

759. *janthina* Boh. — I. Budapest. III. K.-Kálna. V. Hátszeg, N.-Csür.

760. *cuprirostris* F. — III. Beszterczebánya, Beczkó. IV. Jászó, Bártfa.

761. *lepidii* Germ. — Frequens.

762. *picicornis* Marsh. — I. Budapest, Péczel, Kecs-Kemét, Kalocsa. III. Trencsén. V. N.-Csür, Brassó. VI. Herkulesfürdő.

763. *coerulescens* Scop. — I. Budapest, Péczel, Kecskemét, Kalocsa, B.-Csaba Debreczen. II. Sopron, Pécs. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Terebes, Homonna. V. Kákova, Nagy-Szeben, Sz.-Sebes, Veresmart, K.-Disznód, Brassó, Segesvár, Sz.-Régen, Gyeke, M.-Záh.

v. *chloris* F. — I. Budapest, Szent-Endre, P.-Poó, Török-Szent-Miklós. II. Esztergom. III. Putnok. IV. Szamosköz. VI. T.-Becse, Temesvár, Resicza.

764. *chlorisans* Germ. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. Sopron. III. Trencsén. IV. Varannó. V. N.-Csür, Szt-Erzsébet, Fogaras. VI. Temesvár, Fehértemplom.

765. *Villae* Com. — I. Budapest, Kalocsa, M.-Kovácsháza. II. Pécs. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely. V. Hátszeg, N.-Csür, K.-Torony. VI. Resicza Herkulesfürdő.

766. *analis* Oliv. — I. Budapest, Hajós. II. Ács. III. V.-Mikola, Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely. V. Hátszeg, Nagy-Szeben, Szt-Erzsébet, Vallis Czód. Segesvár.

767. *scolopacea* Germ. — I. Budapest, Péczel, Szent-Lőrincz, Kalocsa, Szeged, B.-Csaba, N.-Várad, Beél. IV. Sáros-Patak. V. Kolozsvár, N.-Selyk, Segesvár.

Limnobaris Bed.

768. *T-album* L. — I. Budapest, Haraszti, Fót, Péczel, Kalocsa, Nyiregyháza. II. Z.-Tapolcza, Sopron. IV. S.-A.-Ujhely, Lelesz, Varannó. V. Tasnád, Hátszeg, N.-Szeben, N.-Csür, Szelindek, Gyeke.

Sphenophorus Schönh.

769. *piceus* Pall. — I. Budapest, Hajós, Szeged, Algyő, Debreczen. II. Velencze, Lacus Fertő. III. V.-Mikola. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj, Páczin. V. M.-Záh.

770. *abbreviatus* F. — I. Budapest, Mons Pilis, Péczel, Kecskemét, Kalocsa. II. Sopron, Kőszeg, Pécs. III. Agárd, Beszterczebánya, Trencsén, Tátrafüred, Putnok. IV. Tokaj, N.-Mihály. V. Sz.-Ujvár, Hátszeg, Nagy-Szeben, Brassó, Medgyes, Berethalom, Segesvár, Sz.-Régen, Gyeke, M.-Záh. VIII. Fiume.

771. *striatopunctatus* Goeze (*mutilatus* Laich.) — I. Budapest, Péczel, Kecskemét, Kalocsa, Szeged, N.-Várad. II. Keszthely. III. Szliács. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, Tokaj, N.-Mihály, Nagy-Bocskó. V. Hátszeg, Brassó, Héviz, Barót.

costipennis Horn. V. Vöröstorony. (Leg. A. Ormay; species ex America importata, 266, p. 51.)

Calandra Clairv.

772. *granaria* L. — Communis.

oryzae L. — I. Budapest, Kalocsa. V. N.-Szeben. VI. Temesvár, Herkulesfürdő. (Species adlata.)

Balaninus Germ.

773. *elephas* Gyll. — I. Budapest, Isaszeg. IV. Torna. V. Hátszeg, N.-Szeben. VI. Deliblat.

774. *pellitus* Boh. — V. Segesvár. (Leg. Dr. C. Petri, 269, p. 11.)

775. *venosus* Grav. (*glandium* Desbr.) — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Hajós, Nagy-Várad. III. Trencsén. IV. Szádellő, Vinna, Ungvár, Nagy-Bocskó. V. Hátszeg, N.-Csür, Sz.-Ujfalu, Fogaras, Brassó, Segesvár, Szász-Régen, Deés. VI. Ulma, N.-Bogsán.

776. *nucum* L. — Communis.
777. *turbatus* Gyll. — Ut prior.
778. *villosus* F. — Frequens.
779. *betulae* Steph. — V. N.-Szeben. VI. Herkulesfürdő.

Balanobius Jekel.

780. *crux* F. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. Sopron. III. Trencsén. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, Sáros-Patak, Tokaj, Ladomér, Erdőbénye, Luhi. V. Frequens. VI. Herkulesfürdő. VII. Fužine.
781. *salicivorus* Payk. *(brassicae* F.) — In toto regno occurrit.
782. *pyrrhoceras* Marsh. — Ut prior.

Anthonomus Germ.

783. *varians* Payk. — I. Kalocsa. II. Sopron. III. Koritnyicza, Deménfalu, Tátrafüred. IV. Vallis Fajna (Com. Marmaros). V. Hátszeg.
v. *perforator* Herbst. — V. Ad balneum Gyógy. VI. Ferenczfalva.
784. *rubi* Herbst. — Frequens.
785. *rubripes* Gyll. — I. Budapest, Debreczen. II. Ács, Zircz. IV. Tolcsva. VI. Orsova, Herkulesfürdő.
786. *pubescens* Payk. — III. Tátrafüred. IV. Torna, Kőrösmező, Mons Pietrosz. V. Mons Sánta, Montes Cibinenses, Borszék.
787. *Chevrolati* Desbr. — II. Nagy-Vázsony, Zircz. IV. Bártfa.
788. *cinctus* Kollar *(piri* Boh.) — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. Z.-Tapolcza. III. Putnok. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, A.-Bereczki, Varannó.
789. *pedicularius* L. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Derékegyháza. IV. Bártfa, Tolcsva, Mons Menczul. V. N.-Szeben, N.-Csür, Resinár, Szelindek, Brassó (Czenk). VI. Resicza, Herkulesfürdő. VII. Diakovár.
790. *rufus* Gyll. — I. Budapest, Péczel. III. V.-Mikola. IV. Tolcsva, M.-Sziget.
791. *spilotus* Redtb. — I. Budapest, Péczel. III. V.-Mikola.
792. *pomorum* L. — Frequens.
v. *piri* Kollar. — I. Budapest, Péczel.
793. *humeralis* Panz. — I. Budapest, Péczel, Peszér. III. Tátrafüred. IV. Bártfa. V. N.-Szeben, Szász-Régen. VI. Orsova.
794. *rectirostris* L. — I. Budapest, Kalocsa, Belényes. II. Sopron, Felsőlő. III. Beszterczebánya, Trencsén. IV. Bártfa, A.-Bereczki, Varannó. V. Ad balneum Gyógy, N.-Ág, Brassó (Fellegvár). VI. Herkulesfürdő.

Bradybatus Germ.

795. *elongatulus* Boh. — I. Budapest, Péczel.
796. *Creutzeri* Germ. — I. Budapest, N.-Várad. II. N.-Vázsony. III. Vallis Vrátna. V. N.-Szeben, K.-Disznód, Brassó (Czenk). VI. Német-Bogsán, Herkulesfürdő.
797. *tomentosus* Desbrochers. — Teste Auctore est solum Hungariæ incola (68, p. 117).
798. *Kellneri* Bach. — I. Budapest, Kalocsa. II. Nagy-Vázsony. IV. Homonna. VII. Diakovár.
v. *subfasciatus* Gerst. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, N.-Várad. II. N.-Vázsony. IV. Velejte, N.-Bocskó. V. Brassó (Czenk). VI. Herkulesfürdő. VII. Diakovár.

Acalyptus Schönh.

799. *carpini* Herbst. — I. Budapest, Kalocsa, Szeged. II. Sopron. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, A.-Bereczki, Zboj. V. Szelindek, Fogaras, Segesvár. VI. Resicza. VII. Diakovár.
v. *sericeus* Gyll. — I. Kalocsa. IV. Bártfa, A.-Bereczki. V. Segesvár. VI. Zlaticza.
800. *alpinus* Villa. — I. Szeged. III. Trencsén. IV. Bártfa, Körtvélyes, N.-Bocskó. V. Sztána, N.-Szeben, N.-Csür, Szt-Erzsébet, Marpód, Fogaras, Segesvár. VI. Szekul.

Elleschus Steph.

801. *scanicus* Payk. — I. Budapest, Kalocsa, Nagy-Várad. III. Beczkó. IV. Mons Szinnaikő, Luhi. V. Sz.-Ujvár, N.-Szeben, Segesvár.
802. *bipunctatus* L. — I. Budapest, Péczel. II. Pécs. III. Beczkó. IV. Vidrány. V. Szelindek, Brassó (Czenk), Segesvár. VI. Rumunyest.
803. *infirmus* Hbst. *(salicis* Petri). — I. Budapest, Kalocsa, Szolnok, Szőreg. II. N.-Vázsony. IV. Bártfa.

Lignyodes Schönh.

804. *enucleator* Panz. *(rudesquamosus* Frm.) — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, N.-Várad, Makó. IV. Tolcsva. V. N.-Szeben.
805. *Muerlei* Ferr. — I. Budapest: Orczykert. (Leg. D. Kuthy.)

Tychius Germ.

806. *quinquepunctatus* L. — Frequens.
v. *tauni* Frick. — V. Deés. (Leg. L. Méhely, 247, p. 193.)
807. *polylineatus* Germ. — I. Budapest, Péczel, Hajós, Szendrő. IV. Beregszász. V. Szt.-Erzsébet, Fenyőfalva, Vöröstorony. VI. Jeselnicza. VII. Diakovár.

808. *lineatulus* Steph. — I. Budapest. V. N.-Csűr.
809. *arietatus* Tourn. — I. Budapest, N.-Várad. IV. S.-A.-Ujhely. VI. Herkulesfürdő.
cuprinus Rosh.—V. N.-Szeben (Bielz, 27, p. 89.)*
810. *Schneideri* Herbst. — I. Budapest, Péczel, Keczel. III. Beczkó. V. Szt-Erzsébet, Fenyőfalva. VI. N.-Bogsán.
811. *subsulcatus* Tourn. — I. Budapest, Péczel, Isaszeg. II. Ács. VI. Rakovicza.
812. *flavicollis* Steph. — I. Budapest, Péczel, Keczel, M.-Kovácsháza, N.-Várad. II. Ács, Boglár, Pécs. IV. Szőllőske, Tokaj, Szobráncz. V. Boncz-Nyires, Segesvár. VI. Jeselnicza. VIII. Cirkvenica.
813. *cinnamomeus* Kiesw. — I. Budapest, Hajós, Debreczen.
814. *venustus* F. v. *genistae* Boh. — I. Budapest, Csepel. II. Pécs. V. Segesvár.
815. *striatulus* Gyll. — I. Hajós. (Leg. F. Speiser, 349, p. 47.)
816. *crassirostris* Kirsch. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, N.-Várad.
817. *aureolus* Kiesw. — I. Budapest, Péczel, Keczel. II. Zircz. V. Segesvár. VI. Herkulesfürdő.
v. *medicaginis* Bris. — I. Budapest, Péczel, Keczel, Hajós, Szeged. II. Zircz. V. N.-Csűr, Medgyes. VI. Palics, Grebenácz, Báziás, Oravicza.
818. *femoralis* Bris. — I. Budapest, N.-Várad. II. Boglár, Pécs. V. Segesvár.
819. *difficilis* Tourn. — I. Budapest, Péczel, Keczel, M.-Kovácsháza. V. Brassó (Czenk).
820. *junceus* Reich (*curtus* Bris.) — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Szeged, N.-Várad. II. Pécs. IV. S.-A.-Ujhely, Velejte, K.-Azar, Varannó, Mons Vihorlat. V. Ad balneum Gyögy, Nagy-Szeben, Szelindek, N.-Csűr, Medgyes, M.-Záh.
821. *meliloti* Steph. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Szeged, N.-Várad. II. Pécs. V. Marpód, Segesvár. VII. Diakovár.
822. *tibialis* Boh. — I. Péczel, Keczel. II. Pécs. VI. Grebenácz, Herkulesfürdő.
823. *pusillus* Germ. — V. Borszék. (Leg. A. Ormay, 266, p. 13.)
824. *tomentosus* Herbst. — Frequens.
825. *picirostris* F. — Ut prior.
826. *cuprifer* Panz. — I. Budapest, Péczel, M.-Káta, Kecskemét, Kalocsa, N.-Várad. II. Pécs. III. Trencsén, Rosnyó, Putnok. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj, Varannó, Homonna, Szobráncz. V. Hátszeg, N.-Szeben, N.-Csűr, Fenyőfalva, Segesvár. VI. Buziás, Grebenácz, Moravicza, Oravicza, Herkulesfürdő. VII. Diakovár.

Sibinia Germ.

827. *Hopffgarteni* Tourn. — I. Budapest, Péczel, Keczel. II. N.-Vázsony. VI. Grebenácz.
828. *unicolor* Fahr. — I. Budapest, Péczel. II. Ács. VI. Grebenácz, Zlaticza.
829. *carpathica* Tourn. — II. Ács. (Leg. M. Hopffgarten.)
830. *fugax* Germ. — I. Budapest, Péczel, Peszér, Keczel. N.-Várad. II. Ács, Sopron, Keszthely, Pécs. V. N.-Csűr. VI. Herkulesfürdő.
831. *primita* Herbst. — I. Budapest, Keczel, Hadház. II. Sopron, Zircz. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Tolcsva, N.-Mihály. V. N.-Szeben, N.-Csűr. VII. Diakovár. VIII. Martinšćica, Carlopago.
v. *phalerata* Stev. — I. Budapest, Fót, Péczel, Dabas, Kecskemét, Kalocsa. III. Trencsén. IV. Szádellő, Tolcsva.
832. *femoralis* Germ. — I. Budapest, Kalocsa, Szeged.
833. *vittata* Germ. — I. Budapest, Peszér, Keczel. V. Fenyőfalva. VI. Grebenácz, Jeselnicza, Német-Bogsán, Herkulesfürdő.
834. *pellucens* Scop. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, N.-Várad. II. Sopron, Pécs. IV. S.-A.-Ujhely, Homonna. V. N.-Szeben, Szt-Erzsébet, Brassó. VI. Ulma, Herkulesfürdő.
v. *Emeryi* Tourn. — V. Nagy-Szeben. (Leg. A. Ormay, 264, p. 42.)
835. *abdominalis* Tourn. — Teste Auctore est solum Hungariæ incola (366, p. 520.)
rudepilosa Tourn. — Hungaria (Cat. Col. Eur., 1891, p. 320.)*
836. *tibialis* Gyll. — I. Budapest, Keczel, Szeged.
837. *viscariae* L. — I. Budapest, Péczel, Hajós, Szeged. II. Sopron, Pécs. V. Nagy-Szeben. VI. Herkulesfürdő. VII. Lipik.
838. *potentillae* Germ. — V. N.-Szeben, K.-Disznód, Medgyes, Szász-Régen. VI. Jeselnicza, Herkulesfürdő.

Orchestes Ill.

839. *quercus* L. — Frequens.
840. *rufus* Schrk. — I. Kalocsa. IV. A.-Bereczki.
841. *alni* L. — I. Budapest, Isaszeg, Kalocsa. II. Ács. IV. S.-A.-Ujhely.
842. *Quedenfeldti* Gerh. — I. Derékegyháza, Mező-Kovácsháza, Kóly.

* Hispaniam meridionalem, et non Hungariam incolit.

* Secundum Auctorem Turciam et non Hungariam incolit (366, p. 520).

843. *pilosus* F. *(ilicis* F.) — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. D.-Őrs, Sopron, Pécs. IV. A.-Bereczki, Erdőbénye. V. N.-Szeben, Præsbe. VI. Herkulesfürdő. VIII. Buccari.

844. *sparsus* Fahrs. — I. Péczel, N.-Várad. V. Hátszeg. VII. Diakovár.

845. *subfasciatus* Gyll. — I. Budapest, Péczel, Mező-Kovácsháza.

846. *jota* F. — I. Keczel. II. Sopron. VI. Herkulesfürdő.

847. *fagi* L. — Frequens.

848. *Sequensi* Stierl. — In reg. VII. (Auctor, 364, p. 123).

849. *testaceus* Müller. — Communis.

v. *carnifex* Germ. — IV. Mons Menczul, Cserna-Hóra.

v. *semirufus* Gyll. — V. Felső-Venicze, Brassó.

v. *pubescens* Stev. — I. Budapest, Péczel.

v. *atratus* Preller. — IV. S.-Patak. (Leg. Dr. C. Chyzer.)

850. *lonicerae* Herbst. — III. Vallis Vrátna, (Com. Trencsén.) IV. Szádellő, Bártfa. VII. Capella.

851. *rusci* Herbst. — I. Budapest. III. V.-Mikola, Zsolna, Felka. IV. Erdőbénye. V. Hátszeg, Nagy-Szeben, Montes Cibinenses. VI. Ferenczfalva.

852. *avellanae* Donov. — I. Budapest, Péczel, Peszér, Keczel. II. N.-Harsány, Pécs. V. Hátszeg, N.-Szeben, Szt-Erzsébet, Brassó. VI. Kazán, Herkulesfürdő. VIII. Buccari.

853. *populi* F. — Creber.

854. *pratensis* Germ. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. Szegzárd. IV. S.-A.-Ujhely, Velejte, Kőrösmező. V. N.-Szeben, K.-Torony, Oláhfalu. VI. Herkulesfürdő. VIII. Buccari.

855. *cinereus* Fahrs. — I. Budapest. V. Hátszeg.

856. *decoratus* Germ. — I. N.-Várad. II. Pécs. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely. V. Hátszeg, N.-Szeben.

857. *rufitarsis* Germ. — I. N.-Várad, Beél. IV. Bártfa, Szobráncz. V. Nagy-Szeben, Fogaras, Brassó, Segesvár.

858. *salicis* L. — I. Budapest, Péczel, Hajós, Szeged, Szőreg, Szentes, N.-Várad, Tenke, Beél, Belényes. II. Sopron. III. Trencsén. IV. Varannó. V. Vizakna, N.-Szeben, Fogaras, Brassó.

859. *stigma* Germ. — Frequens.

860. *foliorum* Müller *(saliceti* F.) — I. Budapest. III. Beszterczebánya, Kézsmárk. IV. Bártfa, Luhi. V. Zilah, Segesvár, Sz.-Régen. VI. Ferenczfalva. VII. Diakovár.

Rhamphus Clairv.

861. *pulicarius* Herbst. — Frequens.

862. *subaeneus* Ill. — I. Hajós. II. Zircz, Kapuvár. IV. Szomotor.

Mecinus Germ.

863. *pyraster* Herbst. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa, Nyiregyháza, M.-Kovácsháza. II. Boglár, Soóly, Szegzárd, Pécs. III. Trencsén. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, Tokaj, Varannó, M.-Sziget. V. Hátszeg. N.-Csűr, Szt-Erzsébet, Nagy-Talmács, Montes Kerczenses, Fogaras, Szász-Régen. VI. Moravicza, Herkulesfürdő.

864. *collaris* Germ. — I. Budapest, Hajós. III. Mons Prasiva. IV. S.-A.-Ujhely, Szobráncz. V. Hátszeg, Vallis Lotrióra, Nagy-Szeben, Nagy-Csűr, Szt-Erzsébet, Medgyes.

865. *janthinus* Germ. — I. Budapest, Keczel, Debreczen. VI. Mons Domoglet.

866. *Heydeni* Wencker. — I. Budapest: Sashegy. (Leg. D. Kuthy.)

867. *circulatus* Marsh. — I. Budapest, V. Szucsák, Szt-Erzsébet, Fenyőfalva.

Gymnetron Schönh.

868. *pascuorum* Gyll. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Szeged. II. Pécs. III. Szliács. IV. Torna. VI. Palics, Herkulesfürdő.

v. *bicolor* Gyll. — I. Budapest, Hajós. II. Pécs.

869. *plantaginis* Eppelsh. — I. Budapest. (Leg. J. Frivaldszky.)

870. *ictericum* Gyll. — I. Budapest, Péczel, Kecskemét, Kalocsa, Szeged, Debreczen, Ér-Mihályfalva.

871. *villosulum* Gyll. — I. Budapest, Péczel, Peszér, Kalocsa. IV. Varannó, Lasztócz. V. Hátszeg, N.-Szeben.

872. *beccabungae* L. — Frequens.

v. *veronicae* Germ. — Simul cum priori.

873. *labile* Herbst. — I. Budapest, Péczel, Peszér, Kalocsa. III. Beczkó. IV. S.-A.-Ujhely, Homonna, Szomotor, Szobráncz. V. Tasnád, Hátszeg, N.-Szeben, N.-Csür, Fenyőfalva, Marpód, Fogaras. VI. Jeselnicza, Rumunyest. VII. Diakovár.

874. *Pirazzolii* Stierl. — I. Budapest, Péczel, Dabas, Keczel. II. Ács. VI. Palics.

875. *stimulosum* Germ. — I. Budapest, Péczel, Hajós. II. Zircz. VI. Jeselnicza.

876. *rostellum* Herbst. — I. Budapest, Péczel, Nagy-Várad. II. Zircz, Boglár, Pécs. IV. Torna. V. T.-Szántó. VII. Diakovár.

877. *melanarium* Germ. — I. Budapest, Mons Pilis, Péczel, Peszér, Keczel, Debreczen. II. Zircz. V. Segesvár.

878. *asellus* Grav. — I. Budapest, Mons Pilis, Péczel, Kalocsa, Debreczen. II. Z.-Tapolcza, Pécs. III. Szliács, Trencsén. IV. Tállya. V. Hátszeg, Sz.-Ujfalu, Gyimes, Sósmező. VI. Jeselnicza.

v. *plagiatum* Gyll. — I. Peszér. III. V.-Mikola. IV. S.-A.-Ujhely. V. Hátszeg, Sz.-Ujfalu, Szent-Erzsébet.

879. *thapsicola* Germ. — I. Budapest, Hajós.

880. *netum* Germ. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Szeged, N.-Várad. II. Boglár, Keszthely. III. R.-Teplicz. IV. Torna, Komjáti. V. Sz.-Ujfalu, Sz.-Régen.

881. *fuliginosum* Rosh. — I. Kalocsa. V. N.-Szeben, N.-Csür. VI. Jeselnicza, Herkulesfürdő.

882. *bipustulatum* Rossi. — I. Budapest, Kalocsa. III. Tavarnok. V. N.-Szeben. VI. Grebenácz, Resicza.

v. *aterrimum* Schilsky. — In regione V. (Auctor, 336, p. 157).

883. *spilotum* Germ. — I. Budapest, Kalocsa. II. Pécs. III. Beczkó. V. Nagy-Csür, Sz.-Ujfalu, Segesvár, M.-Záh.

884. *melas* Boh. — II. Ács. (Leg. M. Hopffgarten, 175, p. 341).

885. *collinum* Gyll. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Szeged. III. V.-Mikola. IV. Szőllőske, Tokaj. V. Segesvár.

886. *linariae* Panz. — Frequens.

887. *tetrum* F. — I. Budapest, Pomáz, Péczel, Kecskemét, Kalocsa, Debreczen, Nagy-Várad. II. Boglár, Sopron. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely. V. Ad balneum Gyógy, N.-Szeben, Segesvár, Szász-Régen. VI. Buziás, Grebenácz, Oravicza. VII. Diakovár.

v. *plagiellum* Gyll. — I. Budapest, Mons Pilis, Péczel, Debreczen. II. Z.-Tapolcza, Pécs. IV. Vinna. V. Sz.-Ujfalu.

v. *antirrhini* Germ. — I. Budapest, Péczel, Peszér, Kalocsa, M.-Kovácsháza, Debreczen, Nagy-Várad. II. Z.-Tapolcza, Sopron, Pécs. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Erdőbénye. V. Segesvár.

888. *littoreum* Bris. — I. Budapest, Peszér, N.-Várad.

889. *noctis* Herbst. — I. Budapest, Péczel, M.-Káta, Pestere (Com. Bihar). II. Z.-Tapolcza. IV Torna, Komjáti, Varannó. VI. Oravicza, Zlaticza, Herkulesfürdő. VII. Diakovár. VIII. Buccari.

890. *herbarum* Bris. — I. Budapest, Kalocsa.

891. *pilosum* Gyll. — I. Budapest. (Leg. E. Frivaldszky.)

892. *haemorrhoum* Rosensch. — V. Nagyszeben, Előpatak, Sz.-Régen.

Miarus Steph.

893. *longirostris* Gyll. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. Vaiszló, Pécs. IV. Sátoralja-Ujhely, Jeszenő. V. N.-Szeben, Fogaras, Brassó. VI. Jeselnicza, Herkulesfürdő.

894. *scutellaris* Bris. — I. Budapest, Szt-Lőrincz, Péczel. II. Pécs. IV. Szőllőske. VI. Báziás, Jeselnicza. VII. Diakovár.

895. *graminis* Gyll. — I. Budapest. II. Sopron, Keszthely. V. Ad balneum Gyógy, Hátszeg, K.-Torony, Sz.-Ujfalu, Fogaras, Kőhalom, Segesvár.

896. *campanulae* L. — Frequens.

897. *micros* Germ. — I. Budapest, Debreczen. II. Pécs. IV. Mons Zsihovecz. VI. N.-Bogsán. VII. Diakovár.

898. *plantarum* Germ. — I. Kalocsa. II. Szegzárd. VI. Herkulesfürdő.

Cionus Clairv.

899. *scrophulariae* L. — Frequens.

900. *tuberculosus* Scop. — Ut prior.

901. *Olivieri* Rossch. — I. Budapest, Péczel, Dabas, Kalocsa, Debreczen. IV. Zombor. V. Hátszeg, Holczmány, Brassó, Bükszád. VI. Grebenácz.

v. *Clairvillei* Boheм. — I. Budapest, Péczel, Peszér, Kalocsa, N.-Várad. III. Beczkó. V. Bükszád, Segesvár. VI. Grebenácz, Dognácska.

902. *thapsi* F. (*similis* Gemm.) — I. Mons Pilis, Péczel, Kalocsa, M.-Kovácsháza, Debreczen, N.-Várad. II. Sopron. V. Frequens. VI. Temesvár, Grebenácz, Báziás, Oravicza, Dognácska.

903. *hortulanus* Fourc. — In toto regno occurrit.

904. *olens* F. — I. Kecskemét, Kalocsa. III. Beczkó. V. Holczmány.

905. *alauda* Herbst (*blattariae* F.) — I. Budapest, Isaszeg, Kalocsa, Debreczen. II. Sopron, Pécs. III. Budatin. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, Erdőbénye, Homonna. V. Hátszeg, N.-Szeben, Segesvár, Oláhfalu, Sz.-Régen. VI. Oravicza, Dognácska.

906. *pulverosus* Gyll. — II. Pécs. (Leg. J. Pável.)

907. *pulchellus* Herbst. — IV. Bártfa. (Leg. A. Michalovics.)

908. *solani* F. — I. Péczel, Kecskemét, N.-Várad, Keczel. III. Beszterczebánya. V. Holczmány, Marpód.

909. *fraxini* Deg. — I. Budapest, Szeged, Derékegyháza, M.-Kovácsháza. II. Szegzárd. VII. Diakovár.

Nanophyes Schönh.

910. *hemisphaericus* Oliv. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. III. K.-Kálna. VI. Dognácska.

v. *ulmi* Germ. — I. Budapest, Kalocsa, Monyásza. II Sopron, Pécs. III. K.-Kálna. IV. S.-A.-Ujhely, A.-Bereczki, Ladomér. VI. Temesvár, Ság.

911. *globulus* Germ. — I. Péczel, Kalocsa. III.

V.-Mikola, Beczkó. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Szomotor, Mons Vihorlat. V. Hátszeg, N.-Szeben, Fogaras. VI. Herkulesfürdő.

912. *gracilis* Redtb. — I. Kalocsa, Keczel. V. Hátszeg.

913. *brevis* Boh. — I. M.-Kovácsháza. (Leg. D. Kuthy.)

914. *Sahlbergi* Sahlb. — I. Budapest, Péczel, Peszér, Szeged. III. K.-Kálna. VI. Herkulesfürdő.

915. *nitidulus* Gyll. (*Chevrieri* Boh.) — I. Budapest, Péczel, Peszér, Szeged. III. K.-Kálna. VI. Herkulesfürdő.

916. *marmoratus* Goeze (*lythri* F.) — Frequens.

Magdalis Germ.

917. *memnonia* Gyll. — I. Isaszeg: Fenyves. (Leg. A. Kis.)

918. *phlegmatica* Herbst. — II. Kőszeg. III. F.-Bocza, Kézsmárk. V. Berethalom.

919. *rufa* Germ. — II. Pécs. (Leg. Dr. E. Kaufmann.)

920. *nitida* Gyll. — III. Trencsén, Mons Prasiva, Kézsmárk. V. N.-Szeben. VI. Montes Szörényenses.

921. *violacea*. L. — III. Trencsén. V. N.-Szeben, Montes Cibinenses, Sz.-Régen. VI. Herkulesfürdő.

922. *frontalis* Gyll. — V. Kolozsvár, Volkány, Zerneszt.

923. *duplicata* Germ. (*punctipennis* Küst.) — I. Isaszeg. III. Hermánd, Trencsén. IV. Bártfa, Mons Menczul. V. N.-Szeben.

924. *exarata* Bris. — I. Kalocsa. II. Zircz. III. Tavarnok. IV. N.-Bocskó.

925. *barbicornis* Latr. — I. Budapest, Kalocsa, Debreczen. II. Sopron, Pécs. III. Trencsén. IV. Erdőbénye.

926. *ruficornis* L. (*pruni* L.) — Communis.

927. *nitidipennis* Boh. — I. Budapest, Hajós. II. Keszthely, Pécs.

928. *aterrima* L. — Frequens.

929. *asphaltina* Boh. — III. Tátrafüred. V. Kolozsvár.

930. *cerasi* L. — Frequens.

931. *flavicornis* Gyll. — I. Budapest, Kalocsa. II. Pécs. IV. Erdőbénye.

932. *quercicola* Weise. — I. Debreczen. VII. Diakovár.

Apion Herbst.

933. *Pomonae* F. — Communis.

934. *opeticum* Bach. — V. Segesvár. (Leg. Dr. C. Petri, 269, p. 11.)

935. *craccae* L. — Communis.

936. *cerdo* Gerst. — I. Budapest, Keczel, N.-Várad. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Sáros-Patak, A.-Bereczki, Tokaj. V. Sz.-Ujvár, Hátszeg, Nagy-Szeben, Montes Kerczenses, Felek, Héviz, Sz.-Magyaros, Előpatak.

937. *subulatum* Kirb. — I. Budapest. IV. Bártfa. V. Vallis Lotrióra, Brassó. VI. Herkulesfürdő.

938. *ochropus* Germ. — IV. Torna. V. Hátszeg, Segesvár, Borszék. VI. Temesvár.

939. *rugicolle* Germ. — I. Budapest (Széchényi hegy, Ó-Buda).

940. *carduorum* Kirb. — Frequens.

941. *penetrans* Germ. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. Boglár. III. Beczkó. IV. Varannó, Kövesd. V. Hátszeg, K.-Torony, Előpatak.

942. *onopordi* Kirb. — In toto regno occurrit.

943. *stolidum* Germ. — I. Budapest, Mons Pilis, Péczel, Kalocsa, N.-Várad. IV. S.-A.-Ujhely. V. Hátszeg, N.-Csür, Fogaras, Oláhfalu. VI. Csenej.

944. *confluens* Kirb. — I. Budapest, Csepel, Péczel, Kalocsa. IV. S.-A.-Ujhely, Tolcsva. V. Hátszeg, N.-Csür, Marpód. VI. Janova. VII. Diakovár.

945. *holosericeum* Gyll. — I. Péczel, Keczel. II. Zircz, Szt-Márton, Pécs. IV. Ungvár. V. Ad balneum Gyógy, K.-Ápold, Medgyes. VI. Zlaticza. VII. Zágráb. VIII. Fiume.

946. *vicinum* Kirb. — I. Budapest, Kalocsa. V. Hátszeg, N.-Csür, Fenyőfalva, Fogaras.

947. *atomarium* Kirb. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. Szegzárd. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely. V. N.-Talmács, N.-Csür, Holczmány, Héviz, Bükszád, Oláhfalu. VII. Raduč. VIII. Meja.

948. *cineraceum* Wenck. (*millum* Bach). — I. Kalocsa, Hagymádfalva.

949. *flavimanum* Gyll. — IV. Torna. V. Sz.-Ujvár, N.-Szeben, N.-Talmács, Oláhfalu. VI. Grebenácz, Resicza, Szekul.

950. *venustulum* Wenck. — I. Budapest. (Leg. D. Kuthy.)

951. *serpyllicola* (Wenck.) Gemm. — I. Budapest. V. N.-Talmács.

952. *Hookeri* Kirb. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, N.-Várad. II. Zircz. III. Trencsén. IV. Torna, Bártfa, S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Velejte, Homonna, Szobráncz, M.-Sziget. V. Fenyőfalva, Marpód, Kereszténysziget, Mons Királykő, Brassó (Czenk), Barót.

953. *difficile* Herbst. — Frequens.

954. *hungaricum* Desbr. — Secundum Auctorem habitat solum in Hungaria. (69, p. 44.)

955. *Kiesenwetteri* Desbr. — Ut prior. (65, p. 204.)

956. *bivittatum* Gerst. — V. Malomviz, K.-Torony. VI. Moravicza, Jeselnicza.

957. *genistae* Kirb. — I. Budapest, N.-Várad. II. N.-Harsány, Pécs. V. Hátszeg, Sz.-Sebes, Torda. VI. Herkulesfürdő.
958. *pallipes* Kirb. — IV. Tokaj. V. Hátszeg, Montes Porumbákenses. VI. Buziás, Rékas.
959. *flavofemoratum* Herbst. — V. Ad balneum Gyógy. (Leg. A. Ormay, 264, p. 44.)
960. *urticarium* Herbst. — Communis.
961. *rufescens* Gyll. — II. Ács. (Leg. M. Hopffgarten, 175, p. 341.)
962. *aeneum* F. — I. Budapest, Dabas, Kalocsa, N.-Várad. II. Boglár, Kőszeg. III. Trencsén. IV. Bártfa. V. N.-Szeben. N.-Talmács, Holczmány, Fogaras. VI. Temesvár. VII. Diakovár.
963. *validum* Germ. — I. Budapest, Kalocsa, Nagy-Várad. II. Ács. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Mons Szinnaikő. V. Peér, Sz.-Ujfalu, Medgyes, Segesvár, Sz.-Régen, Gyeke. VII. Eszék.
964. *radiolus* Marsh. — Frequens.
965. *saeculare* Gozis (*astragali* Payk.). — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. Ács, Szegzárd. III. Putnok. IV. Szőllőske. V. Hátszeg, N.-Csür.
966. *elegantulum* Germ. — I. Budapest, Keresztur, Péczel, Kalocsa. V. Zilah Hátszeg, N.-Csür, Előpatak, Oláhfalu.
967. *facetum* Gyll. — III. Putnok. (Leg. E. Frivaldszky.)
968. *curvirostre* Gyll. — I. Budapest, Péczel. II. Keszthely. V. Algyógy, N.-Szeben, N.-Csür. VI. Jeselnicza, Herkulesfürdő.
969. *striatum* Marsh. — V. K.-Disznód, Segesvár. VI. Szekul.
970. *immune* Kirb. — V. K.-Disznód. (Leg. C. Fuss.)
971. *pubescens* Kirb. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. Sopron. III. Putnok. IV. Torna, Bártfa. V. Hátszeg, N.-Szeben, Medgyes, Kőhalom, Oláhfalu. VI. Dognácska. VII. Diakovár.
972. *simile* Kirb. — I. Budapest. V. N.-Szeben.
973. *seniculus* Kirb. — Frequens.
974. *elongatum* Germ. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Debreczen. III. Trencsén. V. N.-Szeben, Marpód.
975. *fulvirostre* Gyll. — I. Budapest, Kalocsa, Dabas, Nagyvárad. II. Ács, Mohács. IV. Tokaj, Szobráncz.
976. *rufirostre* F. — I. Insula Csepel, N.-Várad. II. Z.-Tapolcza. V. Hátszeg, N.-Szeben, N.-Csür, Fogaras, Segesvár, M.-Záh. VI. Jeselnicza, Orsova.
977. *longirostre* Oliv. — I. Budapest, Péczel, Dabas, Kecskemét, Hajós, Szentes, N.-Várad. II. Keszthely, Pécs. IV. S.-A.-Ujhely. V. Déva, N.-Szeben, N.-Csür, Sz.-Régen, Gyeke.
978. *viciae* Payk. — Frequens.
979. *difforme* Germ. — IV. Tokaj. (Leg. Dr. C Chyzer.)
980. *dissimile* Germ. — I. Budapest, Péczel, Hajós. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj. V. Hátszeg, Holczmány.
981. *Schönherri* Boh. — VI. Báziás, Oravicza, Herkulesfürdő.
982. *ononicola* Bach. — I. Kalocsa. IV. Homonna. Szinna. V. F.-Komána, Segesvár. VI. Grebenácz. VII. Diakovár. VIII. Buccari.
983. *varipes* Germ. — Frequens.
984. *apricans* Herbst (*fagi* Kirb.) — Communis.
v. *encaustum* Wnck. — VI. Grebenácz. (Leg. E. Merkl.)
985. *assimile* Kirb. — Frequens.
986. *trifolii* L. — Ut prior.
v. *ruficrus* Germ. — I. Budapest, Péczel. IV. Körtvélyes. V. Hátszeg, N.-Csür, Vöröstorony, Fenyőfalva, Kőhalom, Segesvár, Szász-Régen, Gyeke. VI. Herkulesfürdő.
987. *dichroum* Bed. (*flavipes* Payk.) — Communis.
988. *nigritarse* Kirb. — Ut prior.
989. *ebeninum* Kirb. — I. Budapest, Kalocsa. III. Trencsén, Tátrafüred. IV. Bártfa, M.-Sziget. V. N.-Disznód, Fogaras, Kőhalom. VI. Oravicza, Rumunyest.
990. *tenue* Kirb. — Frequens.
991. *sulcifrons* Herbst. — I. Budapest, Kalocsa. V. Déva, N.-Csür.
992. *punctigerum* Payk. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Debreczen, Nagyvárad. II. Pécs. IV. Mád. V. Peér, Zilah, N.-Csür, Brassó, Medgyes. VI. Fehértemplom, Báziás, Oravicza, Herkulesfürdő, Lugos. VII. Diakovár. VIII. Fiume.
993. *punctirostre* Gyll. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. Ács. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj. V. Hátszeg, N.-Csür.
994. *amethystinum* Mill. — I. Kalocsa. (Leg. F. Speiser.)
995. *virens* Herbst. — Frequens.
996. *unicolor* Kirb. — III. Trencsén. IV. Velejte M.-Sziget. V. Zilah, Brassó (Czenk). VIII. Fiume.
997. *Gyllenhali* Kirb. — I. Budapest, Kalocsa. III. Putnok. IV. M.-Laborcz. V. Hátszeg, N.-Csür, Fogaras, Segesvár. VI. Jeselnicza.
998. *ervi* Kirb. — Frequens.
999. *ononis* Kirb. — I. Hajós. IV. M.-Sziget. V. Zilah, ad balneum Gyógy, N.-Szeben, Montes Kerczenses, Marpód, Sz.-Magyaros, Előpatak.
1000. *filirostre* Kirb. — I. Budapest. IV. Homonna. V. N.-Csür, Kőhalom, Oláhfalu.
1001. *minimum* Herbst. — In toto regno occurrit.
1002. *pisi* F. — Ut prior.

v. *cyanipenne* Gyll. — I. Budapest, Kalocsa. V. Előpatak.

1003. *aethiops* Hrbst. — I. Budapest, Kalocsa. III. Trencsén. IV. Terebes, Homonna. V. Szent-Erzsébet, Fogaras. VI. Temesvár.

1004. *gracilicolle* Gyll. — I. Kalocsa. (Leg. F. Speiser.)

1005. *laevigatum* Payk. — Frequens.

1006. *meliloti* Kirb. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. Ács, Boglár, Pécs. III. Szliács. IV. Tokaj, Szinna. V. Marpód, Kőhalom. VI. Herkulesfürdő.

1007. *loti* Kirb. (*angustatum* Kirb.) — Frequens.

1008. *oblongum* Gyll. — I. Debreczen. (Leg. J. Frivaldszky.)

1009. *columbinum* Germ. — Creber.

1010. *alcyoneum* Germ. — I. Budapest. III. Putnok. V. Nagy-Szeben, Nagy-Csür. VI. Herkulesfürdő.

1011. *Spencei* Kirb. — I. Budapest, Kalocsa. II. Sopron. III. Putnok. V. Hátszeg, Fogaras, Oláhfalu.

1012. *vorax* Herbst. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Nagyvárad. IV. Sáros-Patak, K.-Azar, Varannó. V. Peér, N.-Csür, Fenyőfalva, Oláhfalu. VII. Diakovár. VIII. Fiume.

1013. *pavidum* Germ. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Debreczen, Derékegyháza. III. Trencsén, Kézsmárk. IV. Torna, Tokaj, Tolcsva, Homonna, Bánszka, N.-Bocskó. V. Tasnád, Zilah, Hátszeg, N.-Szeben, N.-Csür, K.-Torony, Marpód.

1014. *compactum* Desbr. — V. Szent-Erzsébet, Marpód.

1015. *reflexum* Gyll. — V. K.-Torony, N.-Csür, Szt-Erzsébet, Fenyőfalva, Marpód, Kőhalom.

1016. *aeneomicans* Wnck. — I. Budapest, Kalocsa. VI. Herkulesfürdő. VII. Fužine.

1017. *miniatum* Germ. — Communis.

1018. *frumentarium* L. — Frequens.

1019. *cruentatum* Walt. — V. Segesvár. (Leg. Dr. C. Petri, 349, p. 11.)

1020 *rubens* Steph. — IV. Körtvélyes Szobráncz.

1021. *sanguineum* Deg. — IV. Bártfa. V. Fenyőfalva, Montes Bodzaenses, F.-Komána.

1022. *malvae* F. — I. Budapest, Péczel, Dabas, Kalocsa. III. Trencsén. IV. Sátoralja-Ujhely, Tolcsva, Szobráncz. V. Tasnád, Déva, Nagy-Szeben, Segesvár. VI. Herkulesfürdő, Rumunyest.

1023. *brevirostre* Herbst. — I. Budapest, Péczel, Hajós, Debreczen. III. Putnok. V. Tasnád, N.-Szeben, N.-Csür, K.-Torony. VI. Herkulesfürdő.

1024. *sedi* Germ. — I. Budapest, Kalocsa. V. K.-Torony.

1025. *aciculare* Germ. — I. Budapest, Péczel. II. Pécs. III. Putnok. V. Zilah.

v. *pulchellum* Mill. — V. N.-Csür. (Legit C. Fuss.)

1026. *violaceum* Kirb. — Communis.

hydrolapathi Kirb. — V. Hátszeg, Fogaras. (Bielz, 27, p. 92.)

1027. *aterrimum* L. — I. Budapest. II. Zircz. III. Nyitra. IV. S.-Patak, Varannó. V. N.-Szeben, Montes Kerczenses.

1028. *affine* Kirb. — V. Buzamező. VI. Lugos.

1029. *curtirostre* Germ. — I. Budapest, Mons Pilis, Kalocsa, Debreczen. IV. Sátoralja-Ujhely. V. N.-Szeben, Fenyőfalva, Előpatak. VI. Herkulesfürdő.

1030. *simum* Germ. — I. Budapest, Péczel, Debreczen. IV. Bártfa. V. N.-Szeben, K.-Torony, Segesvár. VI. Rumunyest.

1031. *orientale* Kirsch. — V. Felső-Kercz. (Bielz, 27, p. 92.)

Auletes Schönh.

1032. *basilaris* Gyll. — V. N.-Szeben, N.-Csür, Montes Kerczenses. VI. Herkulesfürdő.

Rhynchites Schneid.

1033. *betulae* L. — I. Budapest, Fót, Péczel, Kalocsa, Szeged. III. Trencsén, T.-Szt-Márton, Rosnyó, Putnok. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, S.-Patak, Czéke, Montes Vihorlat et Szinnaikő. V. Frequens. VI. Bjelareka. VII. Pitomača.

1034. *tristis* F. — I. Budapest, Péczel. II. Z.-Tapolcza. III. Szliács. V. Tömös. VI. Herkulesfürdő. VII. Capella.

1035. *Mannerheimi* Humm. (*megacephalus* Germ.) — II. Felsőlő. III. Beszterczebánya. V. N.-Szeben, Segesvár.

1036. *coeruleocephalus* Schall. — V. Segesvár. (Bielz, 27, p. 92.)

1037. *olivaceus* Gyll. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. V. Déva.

1038. *pubescens* F. — I. Budapest, Péczel. II. Sopron. IV. N.-Károly. V. N.-Enyed, N.-Csür, Sz.-Régen. VII. Diakovár.

1039. *praeustus* Bohem. — II. Csáktornya, Pécs. VII. Našice.

1040. *sericeus* Herbst. — I. Budapest, Mons Pilis, Péczel, Debreczen. II. Keszthely, Pécs. V. Déva, Szelindek, Segesvár, Sz.-Régen. VI. Herkulesfürdő. VII. Našice.

1041. *tomentosus* Gyll. — I. Kalocsa. V. Montes Bodzaenses (Agárka), Prázsmár.

1042. *nanus* Payk. *(planirostris* F.) — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Szeged, Csongrád. II. Zircz, Kőszeg. III. Trencsén, Zsolna. IV. Bártfa. Tokaj. V. Frequens. VI. Herkulesfürdő.

1043. *germanicus* Herbst. — In toto regno occurrit.

1044. *interpunctatus* Steph. *(alliariae* Seidl.) — I. Kalocsa. II. Keszthely, Pécs. IV. K.-Azar. V. Sz.-Ujvár, N.-Szeben, N.-Csür, Marpód, Sz.-Régen. VI. Orsova, Herkulesfürdő.

1045. *pauxillus* Germ. — I. Budapest, Farkasd, Kalocsa, Szeged, Derékegyháza. II. D.-Örs. III. Putnok. IV. Bártfa, Sátoralja-Ujhely, Tolcsva, Tokaj, Czéke, N.-Mihály. V. Déva, N.-Szeben. Sz.-Ujfalu, N.-Csür, Brassó (Czenk), Segesvár, Sz.-Régen, M.-Záh. VI. Kazán (Jeselnicza).

1046. *aeneovirens* Marsh. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II.-Sopron, Z.-Tapolcza. III. Putnok. IV. Bártfa. V. Hátszeg, N.-Szeben, N.-Csür, Segesvár, Deés. VIII. Martinšcica, Fiume.

1047. *purpureus* L. *(aequatus* L.) — Frequens.

1048. *cupreus* L. — I. Kalocsa. II. Sopron. III. Bakabánya, Deménfalu. IV. Bártfa. V. Szamos-Ujfalu, Medgyes, Segesvár. Sz.-Régen.

1049. *aethiops* Bach. — I. Budapest, Péczel. II. Sopron, Pécs. V. Szelindek. Prázsmár. VI. Herkulesfürdő. VII. Velebit.

1050. *parellinus* Gyll. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. V. Veresmart. VI. Herkulesfürdő. VIII. Buccari.

1051. *coeruleus* Deg. *(conicus* Ill.) — I. Budapest, Péczel, Besnyő, Kecskemét, Kalocsa, M.-Kovácsháza. II. Zircz, Sopron, Pécs. III. Putnok. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Tokaj, Varannó, Gesztely. V. N.-Csür, Szelindek, Brassó, Segesvár, Sz.-Régen. VI. Orsova. Herkulesfürdő.

1052. *giganteus* Kryn. — I. Budapest, Kalocsa, N.-Várad. IV. Gálszécs.

1053. *auratus* Scop. — Frequens.

1054. *Bachus* L. — I. Budapest. Péczel, Isaszeg, Kecskemét, Farkasd, Kalocsa, Szeged. II. Sopron, Felsőlő, Kőszeg, Pécs. III. Beszterczebánya, Trencsén, Putnok. IV. S.-A.-Ujhely, S.-Patak, Czéke, Mons Vihorlat. V. Frequens. VI. Fehértemplom. Oravicza.

1055. *hungaricus* Herbst. — I. Budapest, Mons Pilis, Szeged, N.-Várad. II. Z.-Tapolcza, Pécs. III. Putnok. IV. Almás, S.-A.-Ujhely, Tolcsva. V. Kolozsvár. VI. Resicza. VII. Našice. VIII. Zengg.

Rhinomacer Geoffr.

1056. *betulae* L. — In toto regno occurrit.

1057. *populi* L. — Frequens.

Cyphus Thunb.

1058. *nitens* Scop. — I. Budapest. Szent-Endre, Péczel, Keczel, Debreczen, Nagy-Várad. II. Sopron, Pécs. III. Trencsén, Bakabánya. IV. Kassa, Sátoralja-Ujhely, Tolcsva, K.-Azar. V. Creber.

Attelabus L.

1059. *coryli* L. — I. Budapest, Péczel. II. Sopron, Kőszeg. III. Beszterczebánya, Trencsén, Putnok, Rozsnyó. IV. Almás, Szádellő, Bártfa, S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Szinna, N.-Bocskó. V. Frequens. VI. Herkulesfürdő.

v. *collaris* Scop. — V. Brassó: Pojána. (Legit L. Méhely, 247, p. 194.)

1060. *erythropterus* Gmel. — V. Montes Kerczenses, Fogaras, Oláhfalu, O.-Láposbánya.

Fam. NEMONYCHIDAE.

Nemonyx Redtb.

1. *lepturoides* F. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Szeged, M.-Kovácsháza. II. N.-Vázsony, Boglár, Keszthely, Pécs. III. Nyitra. IV. Görgő, Torna, Szerencs, Homonna. V. Kolozsvár, Gyeke. VI. Grebenácz.

Cimberis Gozis.

2. *attelaboides* F. — II. Ács. III. Koritnyicza. V. Montes Kerczenses.

Diodyrrhynchus Schönh.

3. *austriacus* Ol. — III. Hermánd, Trencsén.

Fam. ANTHRIBIDAE.

Platyrrhinus Clairv.

1. *resinosus* Scop. *(latirostris* F.) — I. Budapest, H.-Száldobágy. II. Zircz, Z.-Tapolcza, Kőszeg, Pécs. IV. Bártfa, Erdőbénye, Mons Vihorlat, Homonna. V. Frequens. VI. Resicza, Ferenczfalva, Herkulesfürdő, Korniaréva. VII. Našice.

Tropideres Schönh.

2. *bilineatus* Germ. — I. Montes Biharenses. II. Z.-Tapolcza, N.-Harsány, Pécs. III. T.-Teplicz. IV. Bánszka. V. Montes Cibinenses, Szent-Erzsébet, Montes Felekenses et Kerczenses. VI. N.-Bogsán, Oravicza, Szászka, Orsova, Herkulesfürdő. VII. Našice.

3. *albirostris* Herbst. — I. Budapest, Kalocsa. II. Z.-Tapolcza. III. Putnok. IV. Bártfa. V. Frequens. VI. Ferenczfalva.

4. *dorsalis* Thunb. — V. Brassó. VI. Herkulesfürdő.

5. *marchicus* Herbst. — I. Budapest, Kalocsa, N.-Várad. II. Sopron. III. Trencsén. IV. Bártfa, Szerencs, Szinna, Ladomér, Mons Rabaszkala. V. N.-Szeben, Szent-Erzsébet, Kercz. VI. Moravicza, Ferenczfalva, Uj-Moldova, Herkulesfürdő.
6. *curtirostris* Muls. — I. Kalocsa. VI. Herkulesfürdő.
7. *niveirostris* F. — I. Kalocsa. II. Z.-Tapolcza, Sopron, N.-Harsány, Pécs. III. Zsolna. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, S.-Patak. Varannó, Mons Rabaszkala. V. N.-Csür, Præsbe, Medgyes. VI. Herkulesfürdő.
8. *sepicola* F. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. Pécs. III. Zsolna. IV. Bártfa. VI. Herkulesfürdő.
v. *ephippium* Boh. — I. Budapest. (Legit J. Frivaldszky.)
9. *pudens* Gyll. — Hungaria (Cat. Col. Eur., 1891., p. 330).
10. *undulatus* Panz. — I. Péczel, Kalocsa. III. Beczkó. VI. Ferenczfalva, Herkulesfürdő.
11. *hilaris* Fahrs. — I. Budapest. II. Zircz.
12. *oxyacanthae* Bris. — V. N.-Szeben. (Bielz, 27, p. 92.)

Phaenotherion Friv.

13. *Pulszkyi* Friv. — VI. Oravicza, Herkulesfürdő.

Platystomus Schneid.

14. *albinus* L. — In regionibus montanis frequens.

Anthribus Geoffr.

15. *fasciatus* Forst. — Frequens.
16. *variegatus* Fourc. (*varius* F.) — Ut prior.
17. *tesselatus* Boh. — IV. M.-Laborcz. V. Kolozsvár.
18. *nebulosus* Küst. — V. N.-Szeben. (Bielz. 27, p. 93.)

Araeocerus Schönh.

fasciculatus Deg. (*coffeae* F.) — I. Budapest. VIII. Zengg. (Species importata.)

Choragus Kirby.

19. *Sheppardi* Kirb. — I. Kalocsa. IV. M.-Sziget. VI. Uj-Moldova, Herkulesfürdő.
20. *piceus* Schaum. — III. Beczkó. VI. Herkulesfürdő.

Urodon Schönh.

21. *suturalis* F. — I. Budapest, Péczel, Farkasd. II. Szegzárd. III. Beczkó. IV. Tarczal. V. Sz.-Sebes.
22. *conformis* Suffr. — I. Szeged, Horgos.
23. *pygmaeus* Gyll. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Farkasd, Csongrád. III. Beczkó. V. Kolozsvár. VI. Csenej, Grebenácz, Oravicza, Ferenczfalva.
24. *rufipes* Ol. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. III. Szliács. IV. Tarczal.

Fam. MYLABRIDAE.

Mylabris Geoffr.

Bruchus L.

1. *pisorum* L. — Communis.
2. *brachialis* Fahrs. — I. Budapest, Péczel, Nagy-Várad. II. Z.-Tapolcza, Pécs. IV. Bártfa, Nagy-Bocskó. VI. Ferenczfalva, Oravicza, Herkulesfürdő. VII. Diakovár.
3. *pallidicornis* Boh. — I. Budapest. V. Hátszeg, N.-Szeben, Szelindek.
v. *signaticornis* Gyll. — I. Szabolcs. (sec. J. Frivaldszky.)
4. *lentis* Boh. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, N.-Várad. IV. S.-A.-Ujhely, N.-Bocskó. VI. Oravicza.
5. *tristicula* Fahrs. — V. N.-Csür, Fenyőfalva.
6. *sertata* Ill. — I. Budapest, Péczel. II. Z.-Tapolcza, Sopron, Szegzárd.
7. *rufipes* Herbst. — I. Budapest, Kalocsa, Nagy-Várad. IV. Bártfa. V. Nagy-Csür, Holczmány, Brassó (Czenk). VI. Báziás, Ferenczfalva, Oravicza, Herkulesfürdő.
8. *luteicornis* Ill. — Frequens.
9. *griseomaculata* Gyll. — I. Budapest, Debreczen. III. Putnok. VI. Grebenácz, Báziás, Oravicza. VII. Eszék.
10. *venusta* Fahr. — I. Budapest. V. N.-Csür.
11. *affinis* Froelich. — I. Budapest, Mons Pilis, Péczel, Kalocsa, Szentes, M.-Berény. II. Pécs. IV. Bártfa, Erdőbénye, Zombor, Homonna. V. N.-Szeben, Montes Kerczenses. VI. Grebenácz, Rumunyest.
12. *viciae* Ol. — I. Péczel. II. Pécs. V. Gyeke. M.-Záh. VI. Resicza, Oravicza, Jeselnicza.
13. *rufimana* Boh. — I. Budapest, Nagy-Várad. II. Keszthely. III. Trencsén. IV. Sátoralja-Ujhely, Tolcsva, K.-Azar, Mons Szinnaikő. V. N.-Csür, Szt-Erzsébet, Fenyőfalva. VII. Diakovár.
14. *atomaria* L. (*granaria* L.) — I. Budapest, Péczel, N.-Várad. V. N.-Szeben, N.-Csür. VI. Resicza. VII. Diakovár.
15. *loti* Payk. — II. Pécs. V. Hátszeg, N.-Szeben, Fenyőfalva, Marpód. VI. Herkulesfürdő. VII. Diakovár.
16. *astragali* Boh. — Hungaria. (Baudi, 14, p. 56.)
17. *seminaria* L. — I. Budapest, Mons Pilis, Péczel. II. Z.-Tapolcza, Sopron, Pécs. IV. Kassa. V. N.-Csür, Fenyőfalva, Marpód, Fogaras, Brassó, Prázsmár, Segesvár, Gyeke, Mező-Záh. VI. Ferenczfalva, Oravicza, Herkulesfürdő.
v. *picipes* Germ. — I. Budapest, Nagy-Várad, Szeged. VI. Herkulesfürdő.
v. *femoralis* Gyll. — I. Budapest. VI. Herkulesfürdő.

18. *pusilla* Germ. — I. Budapest, Péczel, N.-Várad. IV. S.-A.-Ujhely. V. N.-Talmács. VII. Diakovár.
19. *olivacea* Germ. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. III. Putnok. V. N.-Szeben, K.-Torony, N.-Csür, Marpód.
20. *cinerascens* Gyll. — I. Budapest, Csepel, Péczel, Kalocsa. VI. Jeselnicza, Herkulesfürdő.
21. *cisti* F. — I. Budapest. II. Sopron, Pécs. III. Trencsén. IV. Kassa. V. N.-Szeben, Brassó (Czenk). VI. Herkulesfürdő. VII. Velebit.
22. *debilis* Gyll. — I. Budapest. (Leg. L. Biró.)
23. *marginalis* F. — I. Budapest, Péczel, M.-Káta, Kalocsa. II. Zircz, Sopron, Pécs. IV. Varannó. V. N.-Csür, Fenyőfalva, Marpód. VI. Oravicza, Báziás, Jeselnicza, Herkulesfürdő.
24. *nana* Germ. — V. N.-Csür. (Leg. C. Fuss.)
25. *dispar* Germ. — I. Budapest, Mons Pilis, Péczel. II. Pécs. VI. Grebenácz, Herkulesfürdő, Korniaréva. VII. Diakovár.
v. *albescens* All. — II. Pécs. (Leg. J. Pável.)
v. *braccata* Gyll. — II. N.-Vázsony. (Legit M. Hopffgarten, 175, p. 340).
26. *bimaculata* Ol. — I. Budapest, Kalocsa. V. Fogaras. VI. Petrovoszelo, Herkulesfürdő.
v. *dispergata* Gyll. — I. Budapest. II. Zircz. IV. M.-Sziget. V. N.-Szeben, N.-Csür. VI. Herkulesfürdő.
27. *varia* Ol. — I. Budapest, Szt-Endre, Mons Pilis, Péczel, Kalocsa. II. Zircz, Pécs. V. Hátszeg, N.-Szeben. VI. Oravicza, Rumunyest. VII. Diakovár.
v. *tarsalis* Gyll. — V. Fenyőfalva. VI. Herkulesfürdő.
28. *imbricornis* Panz. — I. Budapest, Péczel, Isaszeg, Kalocsa. IV. A.-Bereczki, Szomotor, Máramaros-Sziget. V. Pele, N.-Csür, Fenyőfalva, Marpód Fogaras. VI. Temesvár, Grebenácz, Jeselnicza, Herkulesfürdő. VII. Diakovár.
29. *tibiella* Gyll. — I. Budapest. VI. Grebenácz, Oravicza.
30. *sericata* Germ. — VI. Herkulesfürdő. (Legit J. Frivaldszky.)
31. *villosa* F. — I. Budapest. II. Pécs. IV. S.-Patak. V. N.-Szeben, Fenyőfalva, Fogaras. VI. Grebenácz, Oravicza.
v. *pubescens* Germ. — I. Budapest. II. Sopron. V. Brassó (Czenk). VI. Jeselnicza.

Spermophagus Stev.

32. *cardui* Boheм. — Frequens.
33. *variolosopunctatus* Gyll. — I. Szeged. II. Vaiszló. V. N.-Szeben. VI. Báziás, Herkulesfürdő. VII. Diakovár.

Fam. BRENTIDAE.

Amorphocephalus Schönh.

1. *coronatus* Germ. — VII. Lukovo. (Legit M. Padewieth.)

Fam. SCOLYTIDAE.

Hylastes Er.

1. *ater* Payk. — I. Péczel, Kalocsa, Vallis Jád (Com. Bihar). III. Nyitra, Trencsén, Tátrafüred. IV. Mons Turkul, Vallis Fajna (Com. Marmaros). V. Montes Retyezát, Szász-Régen, Borszék, Gyeke.
2. *brunneus* Er. — V. Montes Cibinenses. (Bielz, 27, p. 93.).
3. *cunicularius* Er. — III. Trencsén, Tátrafüred, Montes Hoverla et Turkul. V. Montes Cibinenses et Kerczenses, Brassó, Segesvár. Tömös, Gy.-Tölgyes. VII. Fužine.
4. *linearis* Er. — II. Zircz. IV. Mons Hoverla.
5. *attenuatus* Er. — II. Zircz. IV. N.-Bocskó. V. K.-Talmács.
6. *angustatus* Herbst. — II. Zircz, Sopron, Pécs. IV. Bártfa. V. Brassó.
7. *opacus* Er. — IV. Bártfa, N.-Bocskó.
8. *glabratus* Zett. — IV. Montes Hoverla et Menczul, Vallis Vizér. V. Mons Sánta, Præsbe, Brassó, Mons Bucsecs.
9. *palliatus* Gyll. — III. Tátrafüred. IV. Bártfa, M.-Sziget, N.-Bocskó, Montes Hoverla et Menczul. V. N.-Szeben, Præsbe, Brassó (Czenk), Mons Bucsecs, Borszék. VII. Skare.
10. *trifolii* Müll. — I. Budapest, Kalocsa. II. Zircz.

Hylurgus Latr.

11. *piniperda* L. — II. Mátyásdomb (Com. Vas), Szegzárd. III. Trencsén, Tátra (Poprádvölgy). IV. Bártfa, N.-Mihály, N.-Bocskó. V. K.-Talmács, Brassó, Montes ad fluv. Maros.
12. *minor* Hartig. — IV. Mons Pop-Iván. (Leg. L. Biró.)

Dendroctonus Er.

13. *micans* Kug. — III. Tátrafüred, Kézsmárk.

Kissophagus Chap.

14. *hederae* Schmidt. — III. Tátrafüred. (Legit E. Polinszky.)
15. *pilosus* Ratzeb. — III. Trencsén. V. Mons Sánta.

Polygraphus Er.

16. *polygraphus* L. (*pubescens* F.) — II. Felsőlő. III. Sziklatelep (Com. Zólyom), Zsolna, Tátra-

füred. IV. Mons Hoverla, Liszsza-Hóra, Mons Pop-Iván. V. Montes Sebesenses.

Phloeosinus Chap.

17. *thujae* Perr. — I. Mátra. III. Trencsén.

Hylesinus F.

18. *crenatus* F. — I. Budapest. II. Z.-Tapolcza. V. Montes Cibinenses. VI. Oravicza, Herkulesfürdő.

19. *oleiperda* F. *(Esau* Gredl.) — VI. Jeselnicza, Herkulesfürdő.

20. *fraxini* Panz. — Frequens.

21. *vittatus* F. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. III. Pozsony. IV. Ungvár. V. Montes Cibinenses, Segesvár, Sz.-Régen.

22. *Kraatzi* Eichh. — I. Budapest, Peszér, Kalocsa, M.-Kovácsháza. II. Boglár. VII. Diakovár. VIII. Zengg.

Phloeophthorus Wollast.

23. *rhododactylus* Marsh. — V. Montes Kerczenses: Felső-Kercz.

24. *spartii* Nördl. — I. Budapest. (Leg. L. Biró.)

Phthorophloeus Rey.

25. *spinulosus* Rey. *(crenatus* Guilleb.) — Habitat in Hungaria septentrionali (Gillebeau, 149, p. 64).

Scolytus Geoffr.

26. *scolytus* F. *(destructor* Oliv.) — I. Budapest, Kalocsa, M.-Kovácsháza. II. Boglár. V. Brassó.

27. *Ratzeburgi* Janson *(destructor* Ratzeb.) — I. Kalocsa. II. Boglár.

28. *pygmaeus* F. *(noxius* Ratzeb.) — I. Kalocsa, M.-Kovácsháza, N.-Várad. III. Vallis Vrátna. V. N.-Szeben, N.-Csür, Szt-Erzsébet, Brassó, Bodza.

29. *carpini* Ratzeb. — II. Sóoly. IV. K.-Azar, Tárkány. VI. Szászka, Kazán.

30. *pruni* Ratzeb. — I. Remecz. IV. N.-Mihály. V. N.-Szeben, Szt-Erzsébet, N.-Csür, Sz.-Ujfalu, Fogaras, Sz.-Régen. VI. Resicza.
v. *piri* Ratzeb. — I. Remecz. IV. N.-Mihály.
v. *castaneus* Ratzeb. — II. Kőszeg. IV. Bártfa, Tárkány, Mons Szinnaikő, Montes Beszkidenses. V. N.-Csür, Sz.-Ujfalu. VI. Herkulesfürdő.

31. *intricatus* Ratzeb. — I. Budapest. II. Zircz, Keszthely. III. Trencsén. IV. Bártfa, Sátoralja-Ujhely. V. N.-Szeben, K.-Torony. VI. Resicza, Herkulesfürdő.

32. *rugulosus* Ratzeb. — Frequens.

33. *multistriatus* Marsh. — I. Budapest, Kalocsa. II. Z.-Tapolcza, Keszthely. V. N.-Szeben, Segesvár. VI. Herkulesfürdő. VII. Montes Fruska-Góra.
v. *ulmi* Redtb. — III. Pozsony. V. Montes Kerczenses, Brassó.

Crypturgus Er.

34. *pusillus* Gyll. — III. Trencsén, Tátrafüred. IV. Bártfa, Hoverla. V. N.-Talmács, Montes Cibinenses.

35. *cinereus* Hbst. — IV. Mons Menczul (Com. Marmaros). V. Brassó, Montes Bodzaenses.

Hypoborus Er.

36. *ficus* Er. — VIII. Fiume, Buccari, Zengg.

Cryphalus Er.

37. *piceae* Ratzb. — III. Tátrafüred. IV. Bártfa. V. Kercz.

38. *abietis* Ratzb. — III. Selmecz. V. Montes Cibinenses.

39. *tiliae* Panz. — V. N.-Szeben, N.-Csür, Berethalom.

40. *fagi* F. — I. Remecz. II. Zircz. IV. Sátoralja-Ujhely. V. K.-Disznód. VI. Herkulesfürdő.

41. *granulatus* Ratzb. — I. Budapest. IV. Bártfa.

42. *asperatus* Gyll. *(binodulus* Ratzb.) — I. Kalocsa. III. Trencsén. V. Kercz.

43. *Hampei* Ferr. — V. Teste Bielz (27, p. 93.).

Pityophthorus Eich.

44. *ramulorum* Perr. — III. Com. Trencsén: Vallis Vrátna. (Leg. Dr. C. Brancsik, 40, p. 41.)

45. *micrographus* L. *(pityographus* Ratzb.) — III. Sziklatelep (Com. Zólyom). IV. Ó.-Bisztra, Vallis Lazescsina, Kőrösmező. V. Montes Cibinenses et Kerczenses. VII. Skare.

Pityogenes Bed.

46. *chalcographus* L. — III. Sziklatelep, Trencsén, Tátrafüred. IV. Bártfa, F.-Bustyaháza, F.-Visó, Kőrösmező, Cserna-Hóra. V. Mons Sánta, Præsbe, Montes Kerczenses, Fogaras, Brassó, Gy.-Tölgyes, Montes ad fluv. Maros.

47. *bidentatus* Herbst. — IV. Bártfa. V. Montes Cibinenses, Mons Negován, Brassó, Segesvár, Montes ad fluv. Maros.

Xyloclepteś Ferrari.

48. *bispinus* Duft. — I. Budapest, Péczel, Besnyő, Farkasd, Kalocsa. II. Zircz, Pécs. III. Trencsén, Putnok. IV. N.-Bocskó. V. N.-Csür, N.-Talmács, Berethalom, Segesvár. VI. Herkulesfürdő. VIII. Fiume, Orehovica.

Ips Deg.

Tomicus Latr.

Bostrychus F.

49. *sexdentatus* Boerner. — II. Felsőlő, Mocsolád. III. Zsolna. IV. Bártfa, Kőrösmező. VI. Herkulesfürdő.

50. *amitinus* Eichh. — III. Koritnyicza, Mons Chocs, Vallis Poprád, Tátrafüred. IV. Kőrösmező. V. Montes Kerczenses. VII. Fužine.

51. *typographus* L. — Communis (in coniferis).

52. *acuminatus* Gyll. — IV. Bártfa. (Legit A. Michalovics.)

53. *erosus* Wollast. *(rectangulus* Eichh.) — VII. Teste Wachtl (373, p. 14).

54. *proximus* Eichh. — IV. N.-Bocskó. VII. Secundum Auctorem (71, p. 388.).

55. *laricis* F. — Frequens.

56. *suturalis* Gyll. *(nigritus* Gyll.) — IV. Mons Hoverla. V. K.-Talmács, Gy.-Tölgyes.

57. *curvidens* Germ. — Communis.

58. *longicollis* Gyll. *(oblitus* Perr.) — III. Vallis Vrátna. (Leg. Dr. C. Brancsik, 40, p. 41.)

Taphrorychus Eichhoff.

59. *bicolor* Herbst. — I. Budapest, Gödöllő, Kalocsa, Remecz, Monyásza. II. Zircz, Pécs. III. Trencsén. IV. Derenk, Komjáti, Szomotor. V. Vöröstorony, Vallis Czód. VI. Resicza, Herkulesfürdő. VII. Našice.

60. *villifrons* Duf. *(Bulmerincqui* Kol.) — I. Budapest, Gödöllő, Kalocsa. III. Fülek. IV. Bártfa. VI. Herkulesfürdő.

Thamnurgus Eichh.

61. *Kaltenbachi* Bach. — I. Budapest, Mons Pilis.

Dryocoetes Eichh.

62. *autographus* Ratzeb. — III. Trencsén, Koritnyicza, Mons Chocs, Tátrafüred. IV. Bártfa, Sátoralja-Ujhely, N.-Bocskó, Montes Turkul et Hoverla. V. Montes Cibinenses et Kerczenses, Fogaras, Brassó, Mons Bucsecs, Montes ad fluv. Maros, Gy.-Tölgyes, Gyulafalva.

63. *villosus* F. — I. Budapest, Péczel. III. Trencsén. V. Præsbe, Montes Kerczenses, Brassó.

64. *coryli* Perr. — I. Budapest. IV. M.-Sziget. VI. Herkulesfürdő.

Xyleborus Eichh.

65. *cryptographus* Ratzeb. — III. Beczkó. (Legit Dr. C. Brancsik, 40, p. 41.)

66. *eurygraphus* Ratzb. — III. Vallis Vrátna (Com. Trencsén). V. Papolcz, Brassó (Czenk).

67. *Pfeili* Ratzb. — III. Tátrafüred. IV. Tokaj.

68. *Saxeseni* Ratz. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. Zircz. III. Vallis Vrátna, Putnok. IV. Bártfa, O.-Ruszka, M.-Sziget. V. N.-Csür, Szt-Erzsébet, Holczmány, Resinár, Porcsesd, Brassó, Segesvár. VI. Herkulesfürdő.

69. *dryographus* Ratzeb. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, N.-Várad. II. Zircz. III. Trencsén. IV. A.-Bereczki. V. Kercz, Holczmány, Felek. VI. Grebenácz, Herkulesfürdő. VII. Vrbanja, Drenovci, Podgajci. Rajevoselo, Soljani.

70. *monographus* F. — I. Budapest, Péczel, Parád, Kalocsa, Debreczen, Monyásza. II. Zircz, Sopron, Pécs. III. K.-Kálna, Trencsén, Putnok. IV. Szinna, Bikszád. V. N.-Szeben, Szt-Erzsébet, Sz.-Ujfalu, Botfalu, Montes ad fluv. Maros. VI. Temesvár. VII. Rajevoselo, Županje, Jamena, Rača, Strošinci, Nemci, Vrbanja, Drenovci.

71. *dispar* F. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. Csákvár, Z.-Tapolcza. III. Palást, Putnok. IV. Bártfa, Mons Rabaszkala. V. Tasnád, K.-Talmács, Vöröstorony, Montes ad fluv. Maros, Gy.-Tölgyes.

Xyloterus Er.

Trypodendron Steph.

72. *domesticus* L. — I. Montes Biharenses. III. Beszterczebánya, Hermánd, Trencsén. IV. Homonna, Sztavna, Mons Hoverla. V. Montes Retyezát, Cibinenses et Kerczenses, Brassó, Segesvár. VI. Herkulesfürdő.

73. *signatus* F. *(quercus* Eichh.) — IV. Mons Hoverla. V. Hátszeg, N.-Szeben.

74. *lineatus* Ol. — III. F.-Garam, Óhegy, Trencsén, Koritnyicza, Tátrafüred. IV. Bártfa, Sztropkó, Vallis Fajna, Kőrösmező, Mons Hoverla. V. Hátszeg, Montes Retyezát, N.-Szeben, Vallis Czód, Montes Kerczenses, Brassó, Gy.-Tölgyes. VI. Ohaba-Bisztra. VII. Fužine, Lokve.

Platypus Herbst.

75. *cylindrus* F. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Monyásza. II. Zircz, Kőszeg, Pécs. III. Szaláncz, Vallis Bosácz. IV. Kassa, Erdőbénye, Szőllőske. V. Hátszeg, Petrozsény, N.-Szeben, Sz.-Ujfalu, Brassó, Botfalu, Szász-Régen, Csáki-Gorbó, Gy.-Tölgyes. VI. Resicza, Herkulesfürdő. VII. Našice.

Fam. CERAMBYCIDAE.

Spondylis F.

1. *buprestoides* L. — I. Kalocsa. II. Kőszeg, Pécs. III. Pozsony, Trencsén, Lucsivna, Tátrafüred, Keresztfalu, Thurzófüred. IV. Bártfa, S.-A.-Uj-

hely. V. N.-Disznód, Bükszád, Borszék. VI. Herkulesfürdő.

Prionus Geoffr.

2. *coriarius* L. — In regionibus montanis frequens.

Ergates Serv.

3. *faber* L. — I. Kalocsa. II. Kőszeg. III. Znió-Váralja.

Aegosoma Serv.

4. *scabricorne* Scop. — I. Budapest, Péczel, Kecskemét, N.-Abony, Kalocsa, Debreczen, Nagy-Várad. II. Boglár, Kőszeg, Pécs. III. Beczkó. IV. Komjáti, Tolcsva, Tokaj, Mád, Tállya, Nagy-Mihály, Szatmár. V. Déva, Hátszeg. VI. T.-Kubin, Ulma, Herkulesfürdő. VII. Eszék.

Rhagium F.

5. *sycophanta* Schrk. — In regionibus montanis frequens.

6. *mordax* Deg. *(inquisitor* Panz.) — Ut prior.

7. *bifasciatum* F. — I. Budapest. II. Kőszeg. III. Z.-Váralja. V. Kolozsvár, Brassó. VII. Mons Bukova-Kusa, Velebit.

8. *inquisitor* L. *(indagator* F.) — II. Pécs. III. Trencsén, Koritnyicza, Tátrafüred, Igló. IV. Bártfa, N.-Bocskó, Kőrösmező. V. Frequens. VI. Ferenczfalva. VII. Mons Bukova-Kusa.

Rhamnusium Latr.

9. *bicolor* Schrk. — In toto regno passim occurrit.

Xylosteus Friv.

10. *Spinolae* Friv. — V. Mons Tészla, Præsbe, Mons Kereszténythavas, Brassó, Zajzon, Montes Görgényenses. VI. Mons Szemenik, Herkulesfürdő, Korniaréva.

Leptorrhabdium Kr.

11. *gracile* Kr. — VII. Vagan. (Leg. L. Biró.).

Oxymirus Muls.

12. *cursor* L. — I. Montes Biharenses. III. Beszterczebánya, Zsolna, Koritnyicza, Tátrafüred, Javorina, Igló. IV. Bártfa, N.-Bocskó. V. Montes Retyezát, Cibinenses et Kerczenses, Fogaras, Brassó, Montes ad fluv. Maros. VI. Herkulesfürdő, Korniaréva.

v. *Verneuili* Muls. *(testaceus* Gredl.) — I. Remecz. V. Gyulafalva.

Toxotus Serv.

13. *meridianus* L. — In regionibus montanis frequens.

14. *quercus* Goeze. — I. Budapest, Péczel, Isaszeg, N.-Várad, Székelyhid. II. Z.-Tapolcza, Kőszeg, Pécs. V. N.-Falu, Bürgezd, N.-Ápold, N.-Csür, Szent-Erzsébet, Sz.-Ujfalu, Brassó, Medgyes, Segesvár, Sz.-Régen.

Acimerus Serv.

15. *Schäfferi* Laich. — II. Pilis-Marót. (Leg. E. Vadászfy).

Pachyta Steph.

16. *lamed* L. — I. Koritnyicza, F.-Bocza, Tátrafüred. Sz.-Béla. V. Bisztratelep, Montes Kerczenses, Fogarasenses et Brassóenses, Bükszád, Montes Csikenses, Gyergyó.

17. *quadrimaculata* L. — I. Feketeerdő, Kristyór. II. Kőszeg. III. Hermánd, Mons K.-Kriván, Trencsén, Koritnyicza. V. Montes Cibinenses, Brassó.

Brachyta Fairm.

18. *interrogationis* L. — III. Tátrafüred, Kézsmárk.

19. *clathrata* F. — I. Fonácza. III. Beszterczebánya, Hermánd, Vallis Vrátna, Mons K.-Kriván, Rózsahegy, Koritnyicza, Vallis Bisztra, Com. Árva, Tátrafüred, Kézsmárk. IV. O.-Ruszka. V. Montes Retyezát et Cibinenses, Præsbe, Montes Felekenses, Fogarasenses et Brassóenses, Hosszufalu. VI. Herkulesfürdő, Korniaréva.

v. *brunnipes* Muls. *(nigrescens* Gredl.) — V. Præsbe, Montes Brassóenses.

Acmaeops Lec.

20. *pratensis* Laich. — III. Tátrafüred. V. Montes Sebesenses et Cibinenses.

21. *septentrionis* Thoms. — V. Gyulafalva. (Leg. L. Méhely, 247, p. 194.)

22. *collaris* L. — In regionibus montanis frequens.

v. *nigricollis* Muls. — Simul cum stirpe.

Gaurotes Lec.

23. *virginea* L. — In regionibus subalpinis communis.

24. *excellens* Brancsik. — III. Óhegy (Com. Zólyom), Vallis Vrátna (Com. Trencsén), Koritnyicza, K.-Poruba.

Cortodera Muls.

25. *humeralis* Schall. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Debreczen, N.-Várad. II. Z.-Tapolcza, Pécs. III. Trencsén, Tátrafüred. IV. Mons Vihorlat. V. N.-Falu, Déva, Malomviz. VI. Resicza, Herkulesfürdő.

v. *suturalis* F. — I. Budapest, Péczel, Érmihályfalva. VI. Herkulesfürdő.

26. *holosericea* F. — I. Budapest, Mons Pilis. II. Pécs. III. V.-Mikola, Tátrafüred. IV. S.-Patak, K.-Azar. V. Kolozsvár.

27. *Frivaldszkyi* Kr. — I. Budapest. VI. Ferenczfalva.

Pidonia Muls.

28. *lurida* F. — In reg. subalpinis frequens.
v. *Ganglbaueri* Ormay. — V. Montes Cibinenses et Kerczenses, Mons Bucsecs, Montes Bodzaenses.

Nivellia Muls.

29. *sanguinosa* Gyll. — III. Mons K.-Kriván. IV. N.-Bocskó, Mons Hoverla.

Leptura L.

30. *rufipes* Schall. — I. Budapest, Péczel, Parád, Debreczen. II. Zircz, Pécs. III. Beszterczebánya. IV. N.-Mihály. V. N.-Csür, Szt-Erzsébet, Kercz, Brassó, Medgyes, M.-Záh.

31. *sexguttata* F. — I. Budapest, Isaszeg, Parád. II. Zircz, Keszthely, Kőszeg, Pécs. V. Brassó. VI. Báziás, Herkulesfürdő. VII. Našice.
v. *exclamationis* F. — V. N.-Szeben, Sz.-Ujfalu, Sz.-Régen.

32. *rufiventris* Gyll. v. *nigroflava* Fuss. — V. Dús. (Bielz, 27, p. 94.)

33. *unipunctata* F. — I. Budapest, Péczel, Verseg, Dabas, Kecskemét, Kalocsa, Nagy-Várad. II. Keszthely, Pécs. IV. Tokaj. V. Fogaras, Montes Csikenses, Szász-Régen. VI. Ulma, Báziás, Herkulesfürdő.

34. *Steveni* Sperk (*adusta* Kr.) — I. Budapest, Csepel, Nagy-Káta, Monor, Peszér, Kalocsa. II. N.-Vázsony, Pécs.

35. *imitatrix* Daniel. — VII. Mons Sveto-Brdo (Auctor, 63, p. 25.)

36. *rufa* Brull. — V. Montes Kerczenses. VI. Herkulesfürdő.

37. *livida* F. — Frequens.
v. *bicarinata* Arnold. — V. Szt-Erzsébet, Tömös.

38. *fulva* Deg. — V. Mons Bucsecs. VI. Herkulesfürdő. VII. Mons Bukova-Kusa.

39. *pallens* Brull. — VI. Herkulesfürdő. (Leg. J. Frivaldszky.)

40. *maculicornis* Deg. — III. Selmecz, Beszterczebánya, Rajecz, Koritnyicza, Tátrafüred, Igló. IV. Bártfa, Mons Rabaszkala, N.-Bocskó. V. Montes Cibinenses et Fogarasenses, Brassó, Montes ad fluv. Maros. VI. Oravicza, Herkulesfürdő.

41. *tesserula* Charp. — IV. Bártfa, O.-Ruszka. V. Horgospataka (Com. Szolnok-Doboka). VI. Oravicza, Herkulesfürdő, Korniaréva.

42. *rubra* L. — In regionibus subalpinis frequens.

43. *erythroptera* Hagenb. — II. Pécs. V. Montes Czódenses, Szováta, Montes Csikenses, Szász-Régen. VI. Oravicza, Szászka, Herkulesfürdő.

44. *cordigera* Füssl. — VII. Velebit. VIII. Fiume.

45. *scutellata* F. — In regionibus montanis occurrit.

46. *virens* L. — In reg. subalpinis frequens.

47. *dubia* Scop. — Ut prior.

48. *sanguinolenta* L. — In reg. montanis communis.

49. *cerambyciformis* Schrk. — Ut prior.

50. *erratica* Dalm. (*7-signata* Küst.) — I. Budapest, Péczel, Parád, Kalocsa, Békés-Csaba. II. Z.-Tapolcza, Pécs. V. Montes Cibinenses, Szelindek, Montes Kerczenses, Brassó, Medgyes, Sz.-Régen. VI. Ferenczfalva, Herkulesfürdő.
v. *erythrura* Küst. — I. Kalocsa. (Leg. F. Speiser, 349, p. 51.)

51. *sexmaculata* L. — III. Tátrafüred. V. N.-Falu, Montes Sebesenses, Brassó, Gyulafalva.

52. *nigripes* Deg. — III. Rozsnyó. V. Kolozsvár, Balán.

53. *thoracica* Creutz. — VI. Herkulesfürdő. (Leg. J. Pável.)

54. *aurulenta* F. — I. Budapest. II. Zircz, Boglár, Kőszeg, Pécs. III. Beczkó, Isztebnik. IV. S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Szinna, Mons Rabaszkala. V. Montes Cibinenses, Kerczenses et Fogarasenses, Brassó, Mons Dongókő, Bükszád, Segesvár, Oláhfalu. VI. Ferenczfalva, Herkulesfürdő.

55. *quadrifasciata* L. — Frequens.

56. *maculata* Poda. — In regionibus montanis creber.

57. *arcuata* Panz. — III. Mons Smrekovicza (Com. Liptó). IV. Bártfa, O.-Ruszka, N.-Bocskó, Mons Gutin (Com. Marmaros). V. N.-Falu, Præsbe, N.-Talmács. Montes Kerczenses, Brassó, Bükszád, Medgyes, Oláhfalu, Montes ad fluv. Maros.

58. *aethiops* Poda. — I. M.-Káta, Debreczen. III. Vallis Vrátna. IV. Ránk, Bártfa, N.-Bocskó. V. Nagy-Szeben, N.-Csür, Montes Kerczenses, Brassó, Medgyes, Montes ad fluv. Maros.

59. *revestita* L. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, N.-Várad. IV. S.-A.-Ujhely, S.-Patak. V. Nagy-Ápold. VI. Ulma.

60. *pubescens* F. — III. Hermánd, Mons K.-Kriván, F.-Bocza. V Montes Cibinenses, Prázsmár. VI. Herkulesfürdő.

61. *melanura* L. — Frequens.
v. *tibialis* Friv. — VI. Dognácska. (Leg. J. Pável; Auctor, 104, p. 335.)

62. *bifasciata* Müll. — Communis.

63. *septempunctata* F. — Frequens.
v. *quinquesignata* Küst. — I. Budapest, Péczel. II. Pécs. VI. Herkulesfürdő.
v. *suturata* Reiche. — VII. Mons Sveto-Brdo. (Leg. L. Biró.)
64. *nigra* L. — Creber.
65. *attenuata* L. — Ut prior.

Allosterna Muls.

66. *tabacicolor* Deg. — Frequens.

Grammoptera Serv.

67. *ustulata* Schall. — I. Budapest, Péczel, Isaszeg, Peszér, Kalocsa, Hajós. II. Zircz. IV. Bártfa, N.-Mihály. V. N.-Disznód, K.-Disznód.
68. *ruficornis* F. — Communis.
69. *variegata* Germ. (*femorata* Muls.) — I. Budapest, Péczel, Dabas, Hajós. V. Kolozsvár.

Letzneria Kr.

70. *lineata* Letrn. — III. Com. Liptó: Mons Szmrekovicza. (Leg. J. Pável.)

Necydalis L.

71. *major* L. — II. Pécs. III. Gács. V. Nagy-Csür, Sz.-Régen.
72. *ulmi* Chevr. (*Panzeri* Harold). — II. Pécs. IV. Bártfa, Luhi. V. Gyulafehérvár, Vizakna, N.-Szeben, Fogaras, Brassó. VI. Versecz.

Caenoptera Thoms.

73. *minor* L. — In regionibus montanis frequens.
74. *umbellatarum* Schreb. — Ut prior.
75. *Kiesenwetteri* Muls. — I. Dabas, Kalocsa, Nagy-Várad. IV. Homonna, M.-Sziget. V. Sz.-Ujfalu, Fenyőfalva, Segesvár. VI. Grebenácz, Oravicza, Herkulesfürdő.

Stenopterus Steph.

76. *flavicornis* Küst. — I. Hajós, N.-Várad. II. Zircz, Veszprém. V. Kolozsvár, Sz.-Sebes. VI. Ulma, Grebenácz, Báziás, Herkulesfürdő. VII. Pakrac.
77. *rufus* L. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. Keszthely, Pécs. III. Szliács, Beczkó. IV. S.-A.-Ujhely, Erdőbénye. V. N.-Falu, N.-Csür, Szent-Erzsébet, Remete, Brassó, Segesvár. VI. Fehértemplom, Báziás, Orsova, Szászka, Herkulesfürdő.
78. *ater* L. (*praeustus* F.) — V. N.-Szeben, Brassó.

Callimoxys Kr.

79. *gracilis* Brull. — VI. Herkulesfürdő. VII. Diakovár.

Dilus Serv.

80. *fugax* Ol. — V. N.-Szeben, N.-Ápold, N.-Csür, K.-Disznód. VI. Orsova, Herkulesfürdő. VII. Našice. VIII. Fiume.

Callimus Muls.

81. *angulatus* Schrk. — I. Budapest, Péczel, Isaszeg. II. Kőszeg. III. V.-Mikola, Lőcse. V. N.-Szeben, Montes Cibinenses et Csikenses, Balánbánya. VI. Herkulesfürdő.

Obrium Curt.

82. *cantharinum* L. — I. Kalocsa, Debreczen. III. Beczkó. V. Ad balneum Zovány, Barót. VI. Herkulesfürdő.
83. *brunneum* F. — I. Montes Biharenses. II. Zircz. III. Hermánd, Mons K.-Kriván, Trencsén, Koritnyicza, Tátrafüred. IV. Bártfa, Vallis Fajna, Luhi, Mons Hoverla. V. Kolozsvár, Héviz, Brassó. VI. N.-Bogsán, Oravicza.
84. *bicolor* Kr. — VIII. Fiume.

Gracilia Serv.

85. *minuta* F. — I. Budapest, N.-Várad. IV. Aszaló. VI. Korniaréva.

Axinopalpus Redtb.

86. *gracilis* Kryn. — I. Budapest, Péczel. II. Ács, Pannonhalma. III. V.-Mikola, Trencsén. VI. Resicza, Herkulesfürdő. VIII. Buccari.

Cerambyx L.

87. *veluntinus* Brullé. — I. Parád. II. Nagy-Várad. III. Diós-Jenő. VII. Diakovár. VIII. Carlopago.
88. *carinatus* Küst. — VII. Velebit. VIII. Zengg.
89. *cerdo* L. (*heros* Scop.) — In quercetis frequens.
90. *miles* Bon. — I. Parád, N.-Várad, Száldobágy. II. Keszthely. V. N.-Szeben, N.-Ápold. VI. Rékas, N.-Bogsán, Fehértemplom, Orsova.
91. *nodulosus* Germ. — VIII. Zengg (Leg. M. Padewieth.)
92. *Scopolii* Füssl. (*cerdo* Scop.) — Creber.

Hesperophanes Muls.

93. *cinereus* Villers. — II. Nagy-Vázsony. (Leg. M. Hopffgarten).
94. *pallidus* Ol. — I. Budapest, Debreczen. II. Pécs. VII. Diakovár.

Stromatium Serv.

95. *fulvum* Villers. — II. Pécs. (Leg. M. Májer).

Saphanus Serv.

96. *piceus* Laich. — I. Hagymádfalva, Rézbánya. II. Kőszeg. V. K.-Disznód, Montes Kerczenses, Brassó. VI. Oravicza, Ferenczfalva, Herkulesfürdő.

Criocephalus Muls.

97. *rusticus* L. — I. Isaszeg, M.-Káta. II. Kőszeg. III. Z.-Ugrócz, Illava, Tátra (Keresztfalu). IV. Bártfa, Homonna, Bresztó. V. Nagy-Talmács, Montes Brassóenses, Bükszád, Oláhfalu, Montes ad fluv. Maros. VIII. Carlopago.

Asemum Eschsch.

98. *striatum* L. — II. Kőszeg. III. Beszterczebánya, Trencsén, Mons Szmrekovicza. IV. Bártfa. V. Hátszeg, N.-Talmács, Brassó, Montes ad fluv. Maros.

v. *agreste* F. — III. Selmecz, Com. Trencsén.

Tetropium Kirby.

99. *castaneum* L. — III. Hermánd, Turcsek, Koritnyicza, Tátrafüred, Putnok. IV. Bártfa, Vallis Vizér, Mons Pietrosz. V. Frequens.

v. *aulicum* F. — III. Turcsek, Koritnyicza, Tátrafüred. IV. Montes Hoverla et Menczul. V. Bisztratelep, Montes Cibinenses, Præsbe, Montes Sebesenses, Kerczenses, Brassóenses et ad fluvium Maros.

v. *fulcratum* F. — III. Beszterczebánya, Trencsén, Koritnyicza, Tátrafüred. IV. Montes Hoverla et Menczul. V. Vallis Czód, Montes Kerczenses, Mons Keresztényhavas, Brassó, Montes Bodzaenses, Gyulafalva, Görgény, Rátosnya.

100. *fuscum* F. — III. Hermánd, Koritnyicza, Tátrafüred. V. Resinár, Negoi, Gyulafalva.

Anisarthron Redtb.

101. *barbipes* Schrnk. — I. Budapest. II. Kőszeg. III. Beczkó. IV. Mons Gutin. V. Vöröstorony. VI. Orsova, Herkulesfürdő.

Phymatodes Muls.

102. *Kollari* Redtb. — I. Budapest, Péczel, Isaszeg. VI. Herkulesfürdő.

103. *angustus* Krichb. — V. Montes Czódenses, Bereczk, Tusnád, Borszék.

104. *glabratus* Charp. — I. Kalocsa. V. Kolozsvár. VI. Ulma, Herkulesfürdő.

105. *puncticollis* Muls. — VI. Herkulesfürdő (in Musæo aulico Viennensi).

106. *pusillus* F. (*abdominalis* Bon.) — I. Isaszeg. II. Pécs. III. V.-Mikola, Putnok. V. Szt-Erzsébet, Kőhalom. VI. Orsova, Herkulesfürdő.

107. *lividus* Rossi (*melancholicus* F.) — III. Beczkó. (Brancsik, 40, p. 42.)

108. *testaceus* L. — Communis.

v. *variabilis* L. — Ut prior.

v. *fennicus* F. — I. Kalocsa, Debreczen. V. Sz.-Ujvár, N.-Szeben. VI. Herkulesfürdő.

v. *melanocephalus* Ponza. — I. Budapest, Kecskemét. II. Pécs. IV. Bártfa. V. Medgyes. VI. Ulma, Fehértemplom.

v. *praeustus* F. — I. Budapest, Kalocsa, B.-Csaba. IV. Bártfa. V. Brassó.

109. *fasciatus* Villers. — I. Budapest. II. Z.-Tapolcza, Pécs. VI. Herkulesfürdő.

110. *alni* L. — Frequens.

111. *rufipes* F. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. Z.-Tapolcza. III. V.-Mikola, Putnok. IV. Bártfa, K.-Szeben. V. Zilah, Nagy-Szeben, Nagy-Csür, Præsbe, Fogaras, Kőhalom, Brassó, Segesvár. VI. Herkulesfürdő.

Pyrrhidium Fairm.

112. *sanguineum* L. — Communis.

Callidium F.

113. *aeneum* Deg. (*dilatatum* Payk.) — III. Tátrafüred. IV. Bártfa. V. Montes Cibinenses, Brassó, Segesvár, Gyulafalva.

114. *violaceum* L. — II. Z.-Egerszeg, Pécs. III. Hermánd, Trencsén, Koritnyicza, Tátrafüred, Javorina, Kézsmárk, Igló. IV. Torna, Bártfa, S.-A.-Ujhely, S.-Patak, Homonna, Sztropkó, Mons Vihorlat. V. Communis.

115. *coriaceum* Payk. — III. Tátrafüred. V. Præsbe, Brassó (Czenk), Segesvár.

Semanotus Muls.

116. *undatus* L. — II. Pécs. V. Montes Kerczenses, Mons Keresztényhavas, Brassó, Segesvár.

117. *russicus* F. — II. Pécs. VI. N.-Bogsán.

Hylotrupes Serv.

118. *bajulus* L. — Communis.

Rhopalopus Muls.

119. *hungaricus* Herbst. — III. Beszterczebánya, Hermánd, Deménfalu. IV. Mons Vihorlat. V. Kolozsvár, Vallis Czód. VII. Velebit.

120. *insubricus* Germ. — I. Budapest, Kalocsa. II. Keszthely, Pécs. VI. Jeselnicza, Orsova, Herkulesfürdő. VII. Crni-Dabar. VIII. Carlopago.

121. *clavipes* F. — Frequens.

122. *macropus* Germ. — I. Parád, Kalocsa, M.-Kovácsháza, N.-Várad. II. D.-Örs, Pécs. III.

Trencsén, Illava, Tátrafüred. IV. Bártfa, Nagy-Bocskó. V. Creber.

123. *femoratus* L. — V. N.-Disznód. (Leg. C. Fuss.)

124. *spinicornis* Abeille. — I. Budapest, Péczel. IV. Homonna.

Rosalia Serv.

125. *alpina* L. — In regionibus subalpinis frequ.

Aromia Serv.

126. *moschata* L. — Communis.

Purpuricenus Fisch.

127. *budensis* Goeze. — I. Budapest, Csepel, Péczel, Isaszeg, Csömör, Dabas, Debreczen. IV. Mád. VI. Fibis, Temesvár. VII. Raduč. VIII. Carlopago.

v. *affinis* Brull. — Kalocsa. (Legit F. Speiser, 349, p. 52.)

v. *hungaricus* Herbst. — I. Budapest, Csepel, Péczel, Csömör. IV. Tarczal.

128. *Koehleri* L. — I. Budapest, Kalocsa, Debreczen. II. Mindszent, Keszthely, Pécs. III. V.-Mikola, Pozsony, Beszterczebánya, Beczkó, Vallis Bosácz. IV. Kassa, Bártfa, S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Erdőbénye. V. Szászváros, N.-Csür, Szt-Erzsébet, Szamos-Ujfalu, K.-Disznód, Fogaras, Medgyes, Segesvár, Sz.-Régen. VI. Grebenácz, Herkulesfürdő. VII. Mons Bukova-Kusa. VIII. Fiume, Buccari.

v. *globulicollis* Dej. — I. Csömör. VI. Báziás, Herkulesfürdő.

Plagionotus Muls.

129. *detritus* L. — In toto regno occurrit.

130. *arcuatus* L. — Ut prior.

v. *connatus* Mors. — I. Budapest, Kalocsa.

v. *Reichei* Thoms. — I. Kalocsa. (Leg. F. Speiser, 349, p. 32.)

v. *apicalis* Hampe. — VI. Herkulesfürdő. (Auctor, 152, p. 289.)

131. *floralis* Pall. — Frequens.

v. *basicornis* Reitt. — Simul cum priori.

v. *variabilis* Motsch. (*abruptus* Kr.) — I. Budapest, K.-Kartal.

Xylotrechus Chevr.

132. *rusticus* L. — I. Budapest, Péczel, Parád, Kecskemét, Kalocsa, Hagymádfalva. II. Kőszeg, Pécs. IV. Bártfa, Páczin, K.-Azar, Mons Rabaszkala, A.-Bereczki. V. K.-Disznód, Præsbe, Volkány, Montes Kerczenses, Brassó, Szász-Régen, Gyeke. VI. Ferenczfalva, Herkulesfürdő.

133. *arvicola* Ol. — II. N.-Vázsony. IV. Sátoralja-Ujhely. V. Hátszeg, Montes Cibinenses. VII. Velebit.

v. *Ganglbaueri* Padewieth. — VII. Velebit. (Detex. Auctor.)

134. *antilope* Zett. — I. Budapest, Péczel, Gödöllő, Debreczen. IV. S.-A.-Ujhely, S.-Patak, Tolcsva. V. Lompért, Mons Kereszténvhavas, Montes Brassóenses.

Clytus Laich.

135. *tropicus* Panz. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Debreczen, N.-Várad. V. N.-Szeben, Sz.-Ujfalu, Sz.-Régen, Fancsal.

136. *arietis* L. (*gazella* F.) — Frequens.

137. *lama* Muls. — III. Mons Szmrekovicza, Tátrafüred, Thurzófüred. IV. Bártfa. V. Mons Sánta, Papolcz, Mons Kereszténvhavas. VI. Oravicza.

138. *rhamni* Germ. (*temesiensis* Germ.) — I. Budapest, Péczel, Dabas, Kecskemét, N.-Várad. II. Keszthely, Pécs. III. Beszterczebánya. V. Frequ. VI. Jeselnicza, Herkulesfürdő. VII. Mons Bukova-Kusa. VIII. Fiume, Buccari, Carlopago.

Cyrtoclytus.

139. *capra* Germ. — III. Vallis Vrátna. IV. N.-Bocskó. V. Kolozsvár, Vallis Zsil, N.-Szeben, N.-Csür, Vallis Czód, Montes Kerczenses, Mons Kereszténvhavas. Zerneszt. VI. Temesvár, Herkulesfürdő, Korniaréva.

Neoclytus Thoms.

erythrocephalus F. — VIII. Fiume, Buccari, Portoré. (Species importata.)

Clytanthus Thoms.

140. *varius* F. (*verbasci* L.) — Frequens.

141. *Herbsti* Brahm (*verbasci* F., *sulphureus* Schaum). — I. Debreczen, N.-Várad, Beél, Hagymádfalva. II. Keszthely. III. Vallis Vrátna. IV. Bártfa, Homonna, O.-Ruszka. V. Frequens. VI. Grebenácz, Orsova, Herkulesfürdő, Rumunyest.

142. *pilosus* Forst. v. *glabromaculatus* Goeze. — VI. Orsova. VIII. Carlopago.

143. *trifasciatus* F. — I. Budapest, Péczel, Kecskemét. VI. Grebenácz.

144. *hungaricus* Seidl. (*nigripes* Ganglb.) — I. Budapest: Sashegy, Ó-Buda. VII. Vrdnik.

145. *sartor* F. (*massiliensis* L.) — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. Kőszeg, Keszthely. III. Trencsén. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Mád, Tállya, Tokaj, Szinna, N.-Mihály. V.

Frequens. VI. Temesvár, Jeselnicza, Herkulesfürdő. VIII. Fiume, Buccari, Carlopago.

146. *figuratus* Scop. *(plebejus* F.) — Frequens.

147. *speciosus* Schneid. *(semipunctatus* F.) — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, M.-Kovácsháza, Debreczen, N.-Várad, Székelyhid. II. Keszthely, Pécs. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Tokaj, Mád, M.-Sziget. V. Creber. VI. Temesvár, Csenej, Herkulesfürdő. VIII. Fiume, Carlopago.

Anaglyptus Muls.

148. *mysticus* L. — Frequens.

v. *hieroglyphicus* Hbst. — I. Budapest, Péczel, Parád, Peszér, N.-Várad. III. Trencsén. IV. Bártfa, N.-Bocskó. V. K.-Disznód, Brassó. VI. Resicza.

Parmena Serv.

149. *balteus* L. — VI. Herkulesfürdő. VIII. Fiume, Carlopago.

Dorcadion Dalm.

150. *aethiops* Scop. — Frequens.

151. *fulvum* Scop. — Ut prior.

v. *Cervae* Friv. — I. Dömsöd. (Detex. F. Cerva; Kraatz, 220, p. 299.)

152. *Scopolii* Herbst *(lineatum* F., *smyrnense* L.) — I. Budapest, Péczel, Kecskemét, Kalocsa, Szeged, Algyő, Szegvár, Szentes, Debreczen, N.-Várad. II. Keszthely, Pécs. III. Agárd, Putnok. IV. Sátoralja-Ujhely, Tolcsva, Szomotor, Tokaj. V. Creber. VI. Temesvár, Ulma.

v. *convexicolle* Küst. — I. Kalocsa. (Legit F. Speiser, 349, p. 53.)

153. *decipiens* Germ. *(cinerarium* F.) — I. Budapest, Monor, Dabas, Kecskemét, Keczel, Szeged. IV. Páczin, Szinna. V. Hátszeg.

154. *Murrayi* Küst. — V. Frequens. VI. N.-Bogsán, Herkulesfürdő.

155. *arenarium* Scop. *(pedestre* F.) — VII. Velebit. VIII. Fiume, Novi.

v. *abruptum* Germ. — VII. Risnjak, Capella, Velebit. VIII. Communis.

nudum Küst. — Hungaria. (Auctor, 236, XXV, 93.)

156. *pedestre* Poda *(rufipes* F.) — Communis.

v. *austriacum* Ganglb. *(molitor* Redtb.) — I. Kalocsa. III. Beszterczebánya. IV. Sátoralja-Ujhely, Tolcsva. V. N.-Falu, Zilah, N.-Csür, Szt-Erzsébet, Segesvár, Sz.-Régen.

157. *equestre* Laxm. v. *transsylvanicum* Ganglb. — V. N.-Szeben, Vöröstorony.

Neodorcadion Ganglb.

158. *bilineatum* Germ. — I. Hajós, Szeged, Csongrád. V. Frequens. VI. Temesvár, Rékas, Grebenácz, Fehértemplom, Herkulesfürdő.

Dorcatypus Thoms.

159. *tristis* F. *(funestus* F.) — II. Kőszeg, Pécs. VI. Herkulesfürdő. VII. Mons Bukova-Kusa, Fužine. VIII. Fiume, Carlopago.

Morimus Serv.

160. *funereus* Muls. *(tristis* F.) — I. Budapest, Kalocsa, N.-Várad. II. Zircz, Keszthely, Pécs. III. Bosácz. VI. Temesvár, Báziás, Herkulesfürdő. VII. Diakovár, Fužine.

asper Sulz. *(lugubris* F.) — V. Gyulafehérvár. (Bielz, 27, p. 97.)

Lamia F.

161. *textor* L. — Frequens.

Monohammus Steph.

162. *sartor* F. — I. N.-Várad. II. Zircz, Z.-Tapolcza. III. Zsolna, Koritnyicza, Á.-Váralja. IV. Bártfa, Mons Zsihovecz, Vallis Lazesesina, Kőrösmező. V. Frequens.

163. *Mulsanti* Seidlitz. — In regione V. (Auctor. 345, p. 841.)

164. *sutor* L. — II. Pécs. III. Beszterczebánya, Hermánd, Zsolna, Koritnyicza, Tátrafüred, Javorina. IV. Bártfa, Vallis Lazesesina. V. Creber.

165. *saltuarius* Gebl. — V. Bisztratelep, Borszék, Gyergyó.

Acanthoderes Serv.

166. *clavipes* Schrank *(varius* F.) — In regionibus montanis frequens.

Acanthocinus Steph.

Astynomus Steph.

167. *aedilis* L. — II. Kőszeg, Pécs. III. Beszterczebánya, Trencsén, Koritnyicza, Lucsivna, Tátra (Keresztfalu), Igló. IV. Bártfa, Tolcsva. V. Frequens.

168. *reticulatus* Razum. *(aedilis* F.) — III. Beszterczebánya. IV. Bártfa. V. Gyulafalva.

169. *griseus* F. — III. Zsolna. IV. Mons Menczul (Com. Marmaros). V. Medgyes, Gyulafalva, Görgény, Montes ad fluv. Maros.

Liopus Serv.

170. *nebulosus* L. — Creber.

Hoplosia Muls.

171. *fennica* Payk. — I. Budapest. III. Mons Manin (Com. Trencsén). IV. Bártfa. V. Brassó (Czenk). VI. Báziás. VII. Oštarije.

Exocentrus Muls.

172. *adspersus* Muls. (*Clarae* Muls.) — I. Isaszeg, Dabas, Kalocsa, Hagymádfalva. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, Szinna. V. Malomviz, Fogaras, Héviz, Sz.-Régen.

173. *lusitanus* L. — In regionibus montanis frequ.

174. *Stierlini* Ganglb. — V. Segesvár. (Legit Dr. C. Petri, 269, p. 11.)

175. *punctipennis* Muls. — I. Kalocsa, Péczel, Isaszeg. VIII. Novi.

Pogonochaerus Gemm.

176. *hispidulus* Pill. (*hispidus* F.) — I. Budapest. II. Z.-Tapolcza, Pécs. III. Beszterczebánya. IV. Sátoralja-Ujhely, Varannó, N.-Mihály, Mons Menczul. V. Kolozsvár. VI. Ferenczfalva, Herkulesfürdő.

177. *hispidus* L. (*pilosus* F.) Frequens.

178. *fasciculatus* Deg. — I. Budapest, Kalocsa, Dabas. III. Lucsivna. IV. Montes Szinnaikő et Menczul. V. N.-Szeben, Montes Cibinenses et Csikenses, Fogaras, Mons Keresztényhavas, Brassó, Medgyes, Gyulafalva, Deés. VI. Mons Domoglet, Korniaréva. VII. Fužine.

179. *ovatus* Goeze. — I. Budapest. III. Trencsén. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely. VII. Fužine.

Deroplia Rosh.

180. *Genei* Arag. — I. Budapest, Szt-Endre, Péczel, Isaszeg. II. Pécs. V. N.-Szeben, K.-Disznód.

Haplocnemia Steph.

Mesosa Serv.

181. *curculionoides* L. — Frequens.

182. *nebulosa* F. — Ut prior.

Anaesthetis Muls.

183. *testacea* L. — Frequens.

Calamobius Guér.

184. *filum* Rossi. — I. Budapest. V. Kolozsvár, N.-Talmács, Fenyőfalva. VI. Ulma. VII. Našice.

Agapanthia Serv.

185. *Kirbyi* Gyll. — I. Gödöllő, Szent-Lőrincz, Kalocsa, Debreczen.

186. *asphodeli* Latr. — I. Budapest, Peszér, Székelyhid. V. N.-Szeben Szent-Erzsébet, Fogaras.

187. *Dahli* Richt. (*cardui* F.) — I. Budapest, Péczel, Dabas, Kecskemét, Kalocsa, Debreczen, Nagy-Várad. II. Ács, Pécs. IV. S.-A.-Ujhely, S.-Patak, Tolcsva, Szerencs, Terebes. V. Kolozsvár, Sz.-Ujvár, Gyeke, Sz.-Régen. VI. Duplaj, Ulma, Herkulesfürdő.

188. *cynarae* Germ. — I. Budapest. II. Pécs. IV. Kassa. VI. Grebenácz. VIII. Fiume, Carlopago.

189. *villosoviridescens* Deg. (*angusticollis* Gyll.) — Frequens.

190. *maculicornis* Gyll. — I. Budapest. III. Hermánd. IV. Bártfa. V. Brassó. VII. Mons Bukova-Kusa, Fužine.

191. *cardui* L. (*suturalis* F.) — I. Budapest, Parád. II. Pécs. IV. Kassa, Erdőbénye. V. Pele. VI. Temesvár. VII. Diakovár.

192. *violacea* F. — I. Budapest, Visegrád, Péczel, Kecskemét, Kalocsa, M.-Berény, N.-Várad. II. Ács, Veszprém. IV. Bártfa, Szinna. V. N.-Falu, Malomviz, Miriszló, N.-Csür, N.-Sink, Brassó, Medgyes, Segesvár, Sz.-Régen. VI. Janova, Ulma, Báziás, Oravicza, Herkulesfürdő. VII. Eszék.

193. *leucaspis* Stev. — I. Budapest, Kalocsa. II. Z.-Tapolcza. IV. Tarczal. V. Kolozsvár. VI. Ulma.

Saperda F.

194. *carcharias* L. — I. Budapest, Monor, Debreczen, N.-Várad. II. Kőszeg, Pécs. IV. Sátoralja-Ujhely, N.-Bánya. V. Sz.-Ujvár, Nagyág, Nagy-Szeben, Nagy-Disznód, Kis-Disznód, N.-Sink. Brassó, Medgyes, Sz.-Régen. VI. Rékas.

195. *similis* Laich. — I. Budapest. II. Pécs.

196. *populnea* L. — Frequens.

197. *quercus* Charp. — VI. Orsova: Mons Allion. (Leg. E. Frivaldszky).

198. *scalaris* L. — I. N.-Várad. III. Beszterczebánya, Zsolna, Tátrafüred, Kézsmárk, Igló. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, Mons Rabaszkala. V. Creber. VI. Grebenácz, Resicza, Herkulesfürdő, Korniaréva.

199. *perforata* Pall. — I. Budapest, Dabas, Kalocsa, Debreczen, Székelyhid. V. Kolozsvár, Fogaras, Segesvár, Sz.-Régen.

200. *8—punctata* Scop. (*tremulae* F.) — Budapest, Kalocsa, Székelyhid. II. Kőszeg, Pécs. V. N.-Szeben, Sz.-Régen. VI. Resicza, Herkulesfürdő. VII. Eszék.

201. *punctata* L. — I. Kalocsa. III. Nyitra. VI. Janova, Herkulesfürdő. VII. Eszék.

Menesia Muls.

202. *bipunctata* Zoubk. — V. Zilah, Kolozsvár, Szent-Erzsébet, Medgyes, Szász-Régen. VI. Herkulesfürdő, Korniaréva.

Tetrops Steph.

203. *praeusta* L. — Frequens.
v. *Starcki* Chevrl. — V. Nagy-Szeben. (Leg. C. Fuss.)

Stenostola Muls.

204. *ferrea* Schrank. — I. Budapest. II. Pécs. III. Beszterczebánya, Kézsmárk. V. Montes Retyezát, N.-Csür, Brassó, Herkulesfürdő. VII. Našice.

Pilemia Fairm.

205. *hirsutula* Fröl. — I. Budapest, Péczel, Dabas, Kalocsa, Debreczen. II. Pécs. V. Deés, Gyeke, M.-Záh. VI. Ulma, Grebenácz.

206. *tigrina* Muls. — I. M.-Kovácsháza. II. Pécs. V. Kolozsvár, Torda, Déva. VI. Palánka, Ulma, Báziás.

Phytoecia Muls.

207. *scutellata* F. — I. Budapest, Péczel. II. Pécs. V. N.-Enyed, N.-Szeben, Szt-Erzsébet, Gyeke, M.-Záh.

208. *Argus* Fröl. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. III. Beczkó. IV. S.-A.-Ujhely. V. Sz.-Sebes, Veresmart, Szt-Erzsébet, Brassó. VIII. Fiume.

209. *affinis* Harrer. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa. II. Kőszeg, Pécs. III. Beszterczebánya. IV. Bártfa, N.-Mihály. V. Frequens, VI. Resicza, Herkulesfürdő. VIII. Buccari.

210. *virgula* Charp. — I. Budapest, Mons Pilis, Dabas, Kalocsa, N.-Várad. IV. S.-A.-Ujhely. V. Hátszeg, N.-Csür, Medgyes, Gyeke, M.-Záh. VI. Temesvár, Janova, Resicza, Herkulesfürdő. VII. Diakovár. VIII. Fiume.

211. *pustulata* Schrank (*lineola* F.) — I. Budapest, Mons Pilis, Péczel, Dabas, Kalocsa, M.-Berény, N.-Várad. II. Z.-Tapolcza, Pécs. III. Trencsén. V. Malomviz, Nagy-Szeben, Nagy-Csür, Gyeke, M.-Záh. VI. Resicza, Herkulesfürdő. VIII. Fiume.

212. *rufimana* Schrank. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Szentes, M.-Berény, Debreczen. II. D.-Örs, Ács, Martonvásár, Pécs. III. V.-Mikola. IV. Tokaj. V. Kolozsvár, Gyeke, M.-Záh, Malomviz. VI. Buziás, Ulma. VII. Eszék.

213. *ephippium* F. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Nyiregyháza. II. Veszprém, Kőszeg, Keszthely, Boglár, Pécs. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Varannó, Tokaj, Tállya. V. Frequens. VI. Temesvár, Ulma, Grebenácz, Herkulesfürdő.

214. *cylindrica* L. — I. Budapest, Péczel, Dabas, Kalocsa, Szeged. II. Zircz, Z.-Tapolcza. IV. Tokaj, Tolcsva, H.-Rokitó, N.-Mihály. V. Frequens. VI. Plavisevicza, Oravicza, Báziás, Herkulesfürdő. VII. Eszék.

215. *nigricornis* F. — I. Budapest, Kalocsa, Nagy-Várad. III. Putnok. IV. Tokaj. V. N.-Ápold, Prázsmár, Medgyes, Segesvár.
v. *solidaginis* Bach. — I. Péczel, Nagy-Várad. VI. Herkulesfürdő.

216. *coerulescens* Scop. (*virescens* F.) — Frequens.

217. *uncinata* Redtb. — I. Budapest. IV. Körtvélyes. V. Sz.-Ujfalu, Medgyes.

218. *molybdaena* Dalm. — I. Budapest. IV. S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Varannó, Vihorlat. V. Toroczkó-Szt-György, Sz.-Ujfalu, Medgyes, Segesvár, M.-Záh. VI. Ulma, Báziás, Herkulesfürdő.

Oberea Muls.

219. *pupillata* Gyll. — III. Koritnyicza. V. Kolozsvár, M.-Záh, Fogaras, Brassó.

220. *pedemontana* Chvrl. (*melanura* L.) — I. Kalocsa. VI. Temesvár. VII. Ribnik.

221. *oculata* L. — I. Budapest, Péczel, Dabas, Kalocsa, Debreczen. II. Z.-Tapolcza, Pécs. III. Pozsony, Zsolna, Koritnyicza, Tátrafüred. IV. Bártfa, Szinna, Nagy-Mihály, Mons Vihorlat. V. Hátszeg, Montes Kerczenses, Fogaras, Brassó, Medgyes, Segesvár.

222. *linearis* L. — I. Budapest, Péczel, Hajós, Keczel. II. Pécs, Zánka. V. Sz.-Sebes, N.-Szeben, N.-Csür, Szt-Erzsébet, N.-Sink, Segesvár.

223. *euphorbiae* Germ. — I. Dabas, Kecskemét, Kalocsa. II. Pécs. V. N.-Ápold, Marpód.

224. *erythrocephala* Schrank. — I. Budapest, Péczel, Parád, M.-Káta, Dabas, Kecskemét, Keczel. II. Pécs. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, Erdőbénye. V. Hátszeg, Fenyőfalva, Brassó. VI. Ulma, Grebenácz, Báziás, Oravicza.
v. *nigriceps* Muls. — I. Budapest, Péczel, Dabas, Kalocsa.

Fam. CHRYSOMELIDAE.

Orsodacne Latr.

1. *cerasi* L. — Frequens.
v. *lineola* Lac. — VI. Oravicza. (Leg. J. Frivaldszky).
v. *limbata* Ol. — I. Budapest, Péczel. IV. Bártfa. V. Segesvár, Héviz. VI. Herkulesfürdő.
v. *glabrata* Panz. — I. Haraszti. IV. Bártfa. V. Montes Cibinenses, Brassó (Czenk).
v. *cantharoides* F. — I. Budapest, Péczel. V. Segesvár.
v. *Duftschmidi* Ws. — I. Budapest, Mons Pilis, Péczel, Kalocsa. V. Montes Keresztényhavas et Nagykőhavas. VI. Oravicza, Krassova.

2. *lineola* Panz. — I. Budapest, Mons Pilis, Péczel, Isaszeg, Kalocsa. II. Z.-Tapolcza. V. Kolozsvár, N.-Szeben, N.-Csür, Medgyes.
v. *nigricollis* Oliv. — I. Budapest, Mons Pilis, Péczel, Isaszeg, Kalocsa. II. Zircz, Z.-Tapolcza, III. Nyitra, Putnok. V. Pele, Tasnád, N.-Szeben, N.-Csür, Brassó, Medgyes. VI. Herkulesfürdő.
v. *humeralis* Latr. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. Zircz, Pécs. VI. Herkulesfürdő.
v. *coerulescens* Duft. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. Z.-Tapolcza. III. Putnok. IV. S.-A.-Ujhely. V. N.-Szeben, Medgyes. VI. N.-Bogsán, Herkulesfürdő.
v. *croatica* Weise. — I. Budapest, Mons Pilis. V. Medgyes. VII. Teste Auctore.

Haemonia Latr.

3. *appendiculata* Panz. — I. Szabolcs. (Leg. A. Miketz.)

Donacia F.

4. *crassipes* F. — I. Péczel, Kalocsa. V. Sz.-Régen.
5. *dentata* Hoppe. — I. Kecskemét, Kalocsa, Nyiregyháza, N.-Várad. V. N.-Szeben.
6. *versicolorea* Brahm (*cincta* Germ.) — V. Nagy-Szeben. (Bielz, 27, p. 98).
7. *aquatica* L. (*dentipes* F.) — I. Budapest. II. Keszthely, Pécs. III. Beczkó, T.-Szt-Márton. IV. Jászó, S.-A.-Ujhely, Szőllőske.
8. *sparganii* Ahr. — III. Beczkó. (Leg. Dr. C. Brancsik, 44, p. 86.)
9. *limbata* Panz. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Nyiregyháza, Nagy-Várad. II. Z.-Tapolcza. III. Kis-Tapolcsány, Putnok. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj, Páczin, Varannó. V. N.-Szeben, N.-Csür, Prázsmár, Medgyes. VI. Ulma, Herkulesfürdő, Rumunyest.
v. *unicolor* Westh. — VI. Temesvár, Herkulesfürdő, Rumunyest.
10. *bicolora* Zschach (*sagittariae* F.) In toto regno occurrit.
11. *obscura* Gyll. — I. Nyíregyháza. V. Brassó (Czenk), Medgyes.
12. *thalassina* Germ. — I. Budapest, Kalocsa, Nagy-Várad. III. Beszterczebánya, Beczkó, Putnok. IV. S.-A.-Ujhely. V. N.-Szeben, N.-Csür.
v. *porphyrogenita* Westh. — V. N.-Csür. (Leg. C. Fuss.)
13. *brevicornis* Ahr. — I. Kalocsa. III. Beszterczebánya. V. N.-Szeben.
14. *impressa* Payk. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Nyiregyháza, Konyár. III. Trencsén. V. Medgyes, Sz.-Régen.
15. *antiqua* Kunze. — V. Teste Seidlitz. VI. Ulma.
16. *clavipes* F. (*menyanthidis* Gyll.) — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Nyiregyháza, Debreczen, Konyár, N.-Várad, Székelyhid. II. Keszthely, Pécs.
17. *fennica* Payk. — I. Budapest, Kalocsa. III. S.-Lád. IV. N.-Mihály, Ungvár, Bátyu. V. Peér.
v. *Malinovskyi* Ahr. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Nyiregyháza. III. Putnok.
18. *semicuprea* Panz. — I. Budapest, Pilis, Péczel, Kalocsa, N.-Várad. II. D.-Örs, Ács, Keszthely. III. Putnok. IV. S.-A.-Ujhely, Szinna, K.-Azar, Tokaj, Páczin. V. Frequens. VI. Temesvár.
19. *vulgaris* Zschach. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. Keszthely. IV. Körtvélyes. V. Szamos-Ujvár, N.-Szeben, N.-Csür, Medgyes.
20. *simplex* F. — I. Budapest, Kalocsa. II. Z.-Tapolcza. IV. S.-A.-Ujhely. V. N.-Szeben, N.-Csür.
21. *cinerea* Herbst. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Nyiregyháza. V. Vallis Czód, Sz.-Régen, Gyeke.
22. *tomentosa* Ahr. — I. Peszér, Kalocsa. IV. Nagy-Mihály, Szomotor. VI. Oravicza.

Plateumaris Thoms.

23. *sericea* L. — Frequens.
v. *festucae* F. — I. Kalocsa. (Leg. F. Speiser.)
v. *armata* Payk. — I. Budapest, Kalocsa.
v. *nymphaeae* F. — VI. Teste Heyden (168, p. 209).
24. *discolor* Panz. — II. Keszthely. IV. S.-A.-Ujhely, S.-Patak, A.-Bereczki, Lelesz, Varannó, Luhi, Vallis Fajna. V. Brassó, Zerneszt, Segesvár, Gyeke.
25. *braccata* Scop. — I. Budapest, Péczel, Konyár. II. Pécs. V. Kolozsvár. VI. Ulma.
26. *consimilis* Schrank. — Communis.
v. *variabilis* Kunze. — V. Vallis Vidombák (Mons Bucsecs), Montes Bodzaenses.
27. *rustica* Kunze. — I. Kalocsa. (Leg. F. Speiser, 349, p. 54.)
28. *abdominalis* Ol. (*affinis* Kunze). — I. Budapest, Kalocsa, Nyiregyháza. II. Ács. III. Beczkó. IV. S.-A.-Ujhely. V. Kolozsvár, N.-Szeben, Szász-Régen. VI. Temesvár, Ság.

Zeugophora Kunze.

29. *scutellaris* Suffr. — I. Budapest, Kalocsa, Szentes, N.-Várad.
30. *subspinosa* F. — I. Budapest. III. Beczkó. IV. Varannó. V. Peér, Kolozsvár, Fenyőfalva, Szász-Régen.
31. *flavicollis* Marsh. — I. N.-Várad. III. Borosznó, Beczkó. IV. Jászó, Bártfa, Szomotor, M.-Sziget. V. Hátszeg, Sz.-Sebes, N.-Csür, Brassó, Segesvár, Sz.-Régen.

Lema Lac.

32. *cyanella* L. — Communis.

33. *Erichsoni* Suffr. — I. Budapest, Debreczen. IV. Ungvár, Kőrösmező. V. Hátszeg, Vallis Zsil, Nagy-Szeben, Brassó (Czenk). V. Német-Bogsán, Rumunyest.

34. *lichenis* Voet. — Communis.

35. *flavipes* Suffr. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Szeged. II. D.-Örs, Pécs. IV. Szomotor, Kövesd. V. N.-Szeben, K.-Torony, Hosszufalu. VIII. Fiume.

36. *melanopus* L. — In toto regno communis.

v. *atrata* Waltl. — V. Brassó: Mons Czenk, (Legit F. Deubel; Méhely, 246, p. 285.)

Crioceris Geoffr.

37. *lilii* Scop. — I. Budapest, Palota, Péczel, Kalocsa. II. Zánka, Keszthely, Pécs. III. Tátrafüred. V. Zilah, N.-Szeben, Fogaras, Brassó, Prázsmár, Medgyes, Segesvár, Héviz, Sz.-Régen. VII. Fužine.

38. *merdigera* L. — Frequens.

v. *rufipes* Herbst. — II. Pécs. III. Tátrafüred. V. N.-Csür, Medgyes.

v. *collaris* Lac. — I. Debreczen. (Legit Dr. J. Török.)

39. *12-punctata* L. — Frequens.

v. *dodecastigma* Suffr. — I. Dabas, Kecskemét, Kalocsa. II. Kaposvár. VIII. Fiume.

40. *14-punctata* Scop. — Communis.

41. *5-punctata* Scop. — I. Budapest, Péczel, Hajós, Keczel, Debreczen, N.-Várad. II. Szombathely. IV. Abos, Tokaj. V. Kolozsvár, Nagy-Szeben, K.-Torony, Ujegyház, Hosszufalu, Medgyes, Segesvár, Sz.-Régen. VI. Temesvár.

42. *paracenthesis* L. — VIII. Martinšćica, Novi.

43. *asparagi* L. — I. Budapest, Péczel, Szt-Lőrincz, Keczel, Kalocsa. II. Kaposvár, Kőszeg, Pécs. III. Beczkó, Lucski. IV. Bártfa, Tolcsva, Varannó.

Labidostomis Lac.

44. *tridentata* L. — III. Trencsén. V. Nagy-Szeben, Brassó. VI. Temesvár.

v. *Kluczyckii* Now. — Simul cum stirpe.

45. *humeralis* Schneid. — I. Budapest, Palota, Péczel, Kalocsa, B.-Csaba, N.-Várad. II. Pécs. V. Kolozsvár, Déva, N.-Ápold, N.-Csür, Medgyes, Borszék, Gyeke, M.-Záh. VI. Temesvár, Fehértemplom, Herkulesfürdő.

46. *lucida* Germ. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. Ács, Zircz, Pécs. V. Ad balneum Gyógy, Zajzon, Segesvár. VI. Ulma.

v. *axillaris* Lac. — I. Budapest, Kalocsa. II. Pécs. V. Dobra, Fogaras.

47. *longimana* L. — Frequens.

48. *pallidipennis* Gebl. v. *pilicollis* Lac. — I. Budapest, Péczel, Iklad, Dabas, Keczel. II. Ács, Zircz, Lacus Fertő. V. Kolozsvár. VI. Grebenácz, Herkulesfürdő.

49. *cyanicornis* Germ. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa II. Ács, Zircz, Keszthely. III. V.-Mikola, Hermánd, Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Tokaj. V. Brassó, Segesvár. VI. Grebenácz, Jeselnicza, Herkulesfürdő. VIII. Crkvenica.

Macrolenes Lac.

50. *ruficollis* F. — VIII. Fiume, Buccari, Crkvenica.

Tituboea Lac.

51. *sexmaculata* F. — Secundum Lefèvre in reg. V. (237, p. 121.).

52. *macropus* Illig. — I. Budapest, T.-Bálint, Dabas, Keczel. II. Ács, Felsőlő, Pécs. V. Kolozsvár, N.-Csür. VI. Ulma, Herkulesfürdő. VIII. Crkvenica.

Lachnaea Lac.

53. *sexpunctata* Scop. (*longipes* F.) — I. Budapest, Kalocsa. II. Keszthely, Szegzárd, Pécs. III. Trencsén, Szilicze. IV. Tolcsva, Szőllőske. V. Pele, Sz.-Ujvár, Deés, Kolozsvár, Tinód, Fogaras, Medgyes, Sz.-Régen. VI. Lippa. VIII. Buccari, Crkvenica.

Clytra Laich.

valerianae Mén. — Habitat etiam in Hungaria (Lefèvre, 237, p. 146.).

54. *quadripunctata* L. (*4-signata* Märkel). — I. Budapest, Parád. II. Keszthely, Kőszeg. III. R.-Szombat. IV. Komjáti, N.-Mihály. V. Frequ. VI. Temesvár, Herkulesfürdő.

55. *appendicina* Lac. — I. Budapest, Kalocsa. II. Keszthely. V. Brassó, Gyeke, M.-Záh. VI. Herkulesfürdő.

56. *laeviuscula* Ratzeb. — Frequens.

Gynandrophthalma Lac.

57. *chloris* Lac. — VI. Herkulesfürdő. (Legit J. Frivaldszky.)

v. *banatica* Weise. — VI. Herkulesfürdő: Mons Domoglet. (Leg. J. Frivaldszky.)

58. *hypocrita* Lac. — VI. Herkulesfürdő, Korniaréva.

59. *tibialis* Brull. — II. Pécs. (Legit. A. Viertl; Weise, 390, p. 384.)

60. *salicina* Scop. — Frequens.

61. *transsylvanica* Friv. — Secundum Auctorem in reg. V.

62. *flavicollis* Charp. — III. Hermánd. IV. Luhi. V. Montes Bodzaenses (Döblény). VI. Dognácska, Herkulesfürdő, Korniaréva.
63. *graeca* Lef. — VI. Herkulesfürdő. (Leg. J. Frivaldszky.)
64. *aurita* L. — I. Budapest, Péczel, Parád, Kalocsa. II. Ács, Keszthely. IV. S.-A.-Ujhely, S.-Patak, K.-Azar. V. Kercz, Mons Keresztényhavas, Brassó, Medgyes, Segesvár. VI. Herkulesfürdő.
65. *affinis* Hellw. — Frequens.
66. *xanthaspis* Germ. — Ut prior.

Chilotoma Lac.

67. *musciformis* Goeze. — I. Budapest, Szt-Lőrincz, Kecskemét, Hajós, Debreczen. II. Pécs. IV. S.-A.-Ujhely, Tállya. V. Peér, Zilah, Deés, M.-Záh.

Coptocephala Lac.

68. *chalybaea* Germ. — I. Budapest, Kalocsa, Hajós, N.-Várad, Hagymádfalva. V. T.-Szántó, Déva, Sz.-Sebes, N.-Csür, Veresmart, Marpód.
69. *unifasciata* Scop. — Frequens.
v. *4-maculata* Lac. — I. Keczel, Hajós. V. Nagy-Ajta.
v. *femoralis* Kr. — V. N.-Csür (Bielz, 27, p. 98.)
70. *scopolina* L. — I. Budapest, B.-Csaba, Makó. II. Pécs. III. Trencsén, Rimaszombat. IV. Torna, Komjáti, Mád, Tállya, Varannó. V. N.-Szeben, Sz.-Sebes, Marpód, Brassó. VI. Temesvár. VII. Zimony. VIII. Martinšćica.
71. *rubicunda* Laich. — I. Hajós. V. Kolozsvár.

Cryptocephalus Geoffr.

72. *coryli* L. — Communis.
v. *temesiensis* Suffr. — I. Budapest, M.-Kovácsháza, N.-Várad. IV. Ránk, Bártfa. V. N.-Szeben, Brassó, Medgyes. VI. Herkulesfürdő.
73. *cordiger* L. — Frequens.
74. *octopunctatus* Scop. — In toto regno occurrit.
75. *sexpunctatus* L. — Ut prior.
76. *signatus* Laich. — I. Szeged, Feketeerdő. II. Felsőlő. III. Koritnyicza, Tátrafüred. IV. Montes Menczul et Balzatul. V. N.-Talmács, Mons Sánta, (Montes Cibinenses), Brassó (Czenk), Medgyes, Segesvár. VI. Jeselnicza, Herkulesfürdő.
77. *distinguendus* Schneid. — III. Trencsén. V. Hátszeg.
78. *albolineatus* Suffr. — V. Fogaras. (Bielz, 27, p. 99.)
79. *laevicollis* Gebl. — VI. Jeselnicza. (Leg J. Frivaldszky).
sexmaculatus Ol. — Secundum Küster habitat etiam in Hungaria. (236, II. 93.)
80. *imperialis* Laich. — I. Budapest, Péczel. Kalocsa. II. Zánka. IV. S.-A.-Ujhely. V. N.-Ápold. VI. Herkulesfürdő. VIII. Buccari.
81. *trimaculatus* Rossi (*salicis* F.) — I. Péczel. VI. Duplaj, Herkulesfürdő. VIII. Carlopago.
82. *bipunctatus* L. — Communis.
v. *sanguinolentus* Scop. (*lineola* F.) — III. Hermánd, Tátrafüred. IV. Szőllőske, N.-Bocskó. V. Fogaras, Mons Keresztényhavas, Brassó, Balánbánya, Oecsém, Gy.-Szt.-Miklós, N.-Ajta.
v. *Thomsoni* Weise. — I. Montes Biharenses. (Fleischer, 89, p. 94.)
83. *biguttatus* Scop. (*bipustulatus* F.) — I. Budapest, N.-Várad. II. Zircz, Z.-Tapolcza, Sopron. III. Beszterczebánya, Teplicska. IV. S.-A.-Ujhely, Varannó. V. Frequens. VI. Herkulesfürdő. VIII. Buccari.
84. *14-maculatus* Schneid. (*coloratus* Suffr.) — I. Budapest, Hajós. VIII. Buccari.
v. *Pilleri* Schrank. — I. Budapest, Kalocsa.
v. *coloratus* F. — I. Budapest, Kalocsa. V. Kolozsvár. VI. Com. Temes. VIII. Buccari.
85. *Reitteri* Weise. — In regione VII. (Auctor, 291, p. 172.)
86. *gamma* H.-Schäff. — I. Dabas, Peszér, Kalocsa, Hajós, Szeged. V. Boncz-Nyires.
87. *bohemius* Drap. — I. Budapest, Kalocsa, Keczel. VI Grebenácz.
88. *apicalis* Gebl. — I. Budapest, Montes Pilis, Péczel, Parád, B.-Csaba, M.-Kovácsháza, Nagy-Várad. II. Ács. III. Hermánd, Putnok. IV. S.-A.-Ujhely, S.-Patak, Szinna. V. Dobra. VI. Ulma. VII. Ruma.
89. *laetus* F. — I. Budapest, Palota, Szt-Lőrincz, Péczel, Isaszeg, M.-Káta, Kalocsa, Szeged, Debreczen. VI. Palics.
90. *Schäfferi* Schrank. — Frequens.
91. *cyanipes* Suffr. — V. Mons Keresztényhavas. (Leg. L. Méhely, 247, p. 195.)
92. *villosulus* Suffr. — III. Pozsony. V. Sz.-Sebes, Nagy-Ápold, Mons Keresztényhavas, Brassó (Czenk), Fogaras.
93. *sericeus* L. — Communis.
94. *aureolus* Suffr. — Frequens.
v. *coerulescens* Schilsky. — V. Mons Czenk, Tömös.
95. *hypochoeridis* L. — Communis.
v. *cyanescens* Ws. — V. Brassó : Sztehil. (Legit L. Méhely, 247, p. 195.)
96. *violaceus* Laich. — In toto regno occurrit.
97. *virens* Suffr. — I. Budapest. II. Zircz. V. Hátszeg, M.-Záh. VI. Grebenácz, Jeselnicza, Herkulesfürdő.

98. *elongatus* Germ. — I. Budapest, Kalocsa. II. Zircz, Z.-Tapolcza. III. Vallis Vrátna. IV. Jászó. V. Déva, Krassova.

99. *marginellus* Ol. — III. Gbellán. (Legit Dr. C. Brancsik, 42, p. 68.)

100. *nitidulus* F. — Frequens.

101. *nitidus* L. — I. Budapest, Péczel, Hajós, Debreczen, N.-Várad. II. Z.-Tapolcza, Sopron. Pécs. III. Gbellán. V. Nagy-Szeben, N.-Csür Szász-Régen. VI. Jeselnicza, Herkulesfürdő, VII. Eszék. VIII. Fiume.

102. *punctiger* Payk. — III. Vallis Vrátna. IV. Szobráncz.

103. *janthinus* Germ. — I. Dabas, Kalocsa, Makó, Nagy-Várad. V. N.-Csür. VI. Herkulesfürdő, Rumunyest.

104. *parvulus* Müll. — I. Budapest. Kalocsa, Debreczen. II. Zircz, Sopron. V. Sz.-Ujfalu, Montes Kerczenses, Prázsmár, Sz.-Régen. VI. Grebenácz, Resicza.

105. *coerulescens* Sahlb. — VI. Herkulesfürdő. (Leg. J. Pável.)

106. *concinnus* Suffr. — II. Pécs. VI. Herkulesfürdő.

107. *marginatus* F. — II. Sopron, Pécs. III. Beszterczebánya. IV. Mons Szinnaikő. V. N.-Talmács, K.-Talmács, Vöröstorony. VI. Herkulesfürdő, Korniaréva.

108. *5-punctatus* Harrer. — I. Péczel, Dabas. II. P.-Marót. IV. Szőllőske.

v. *testaceus* Villa. — I. Péczel. (Leg. D. Kuthy.)

109. *pini* L. — I. Belényes. II. Pécs. III. Trencsén, Lucski. VI. Herkulesfürdő. VII. Risnjak.

110. *10-maculatus* L. — I. Hajós. (Legit Dr. E. Kauffmann; Speiser, 349, p. 55.)

v. *ornatus* Herbst. — III. Tátrafüred. (Legit E. Polinszky.)

111. *frenatus* Laich. — I. Kalocsa, Szeged, B.-Csaba. IV. Bártfa, Olyka, Szinna, Szerencs, Vallis Lazescsina. V. N.-Szeben, Montes Kerczenses, Sz.-Magyaros, Fogaras, Brassó, Mons Bucsecs, Medgyes, Segesvár. VI. Herkulesfürdő, Korniaréva.

v. *callifer* Suffr. — I. Kalocsa, Szeged.

v. *flavescens* Schneid. — I. Szeged, B.-Csaba, M.-Kovácsháza, Debreczen, Nagy-Várad. V. Malomviz, N.-Ápold, Nagy-Szeben, Medgyes, Segesvár. VI. Temesvár, Herkulesfürdő, Korniaréva.

v. *seminiger* Weise. — I. Szeged. V. N.-Szeben. VI. Herkulesfürdő.

112. *4-guttatus* Richter. — I. Budapest. III. Koritnyicza, Putnok. V. Frequens.

v. *maurus* Suffr. — I. N.-Várad. III. Beszterczebánya, Koritnyicza. IV. Almás, S.-A.-Ujhely, M.-Sziget.

113. *4-pustulatus* Gyll. — III. Tátrafüred. (Legit J. Frivaldszky.)

v. *rhaeticus* Heyd. — III. Deménfalu, Tátrafüred.

v. *aethiops* Weise. — I. Montes Biharenses (Fleischer, 89, p. 94.)

114. *flavipes* F. — Communis.

v. *signatifrons* Suffr. — I. Kalocsa. (Legit F. Speiser, 349, p. 55.)

115. *chrysopus* Gmel. — I. Budapest, Péczel, Peszér, Kalocsa, Derékegyháza. II. Sopron, Keszthely. IV. S.-A.-Ujhely, N.-Mihály, Szinna, M.-Sziget. V. Zilah, Hátszeg, Szász-Sebes, Nagy-Szeben, N.-Csür, Veresmart, Szt-Erzsébet, Fenyőfalva, Medgyes, Szász-Régen. VI. Temesvár. VII. Diakovár. VIII. Fiume.

116. *frontalis* Marsh. — I. Budapest. II. Pécs. V. N.-Szeben.

117. *ocellatus* Drap. — Communis.

118. *carpathicus* Friv. — III. Koritnyicza, Deménfalu, F.-Bocza, Tátrafüred.

119. *querceti* Suffr. — V. Kőhalom. (Seidlitz, 345, p. 764.)

120. *labiatus* L. — Frequens.

v. *digrammus* Suffr. — I. Kalocsa. V. Előpatak, Mons Büdös.

121. *exiguus* Schneid. — I. Kalocsa. (Legit F. Speiser.)

122. *Moraei* L. — Communis.

v. *vittiger* Mars. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, N.-Várad. II. Pécs. VI. Resicza, Herkulesfürdő.

v. *bivittatus* Gyll. — I. Budapest, N.-Várad. II. Pécs. III. Szliács. V. Malomviz, Szász-Sebes, N.-Csür. VI. Oravicza, Ferenczfalva, Dognácska.

v. *arquatus* Weise. — I. N.-Várad. II. Pécs. V. Rozsnyó. VI. Resicza, Oravicza.

123. *6-pustulatus* Ross. — Frequens.

v. *oneratus* Weise. — I. Kalocsa. (Legit F. Speiser, 349, p. 55.)

124. *vittatus* F. — I. Monyásza. II. Zircz. III. Tátrafüred. IV. Szinna, Montes Gutin et Zsihovecz, N.-Bocskó. V. Malomviz, Hátszeg, N.-Szeben, N.-Talmács, Marpód, Porcsesd, Fogaras, Előpatak, Bükszád, Borszék, Oláhfalu, N.-Ajta. VI. Ferenczfalva, Herkulesfürdő.

125. *bilineatus* L. — I. Péczel, Kalocsa, N.-Várad. II. Sopron. III. Zsolna. IV. Torna, Szobráncz. V. Hátszeg, Szász-Sebes, Nagy-Csür, Marpód, Fogaras, Medgyes, Sz.-Régen. VI. Krassova. VII. Diakovár.

v. *armeniacus* Fald. — I. Budapest, Isaszeg, Kalocsa, Monyásza. IV. Ungvár. V. Ad balneum Gyógy, N.-Csür, Medgyes. VI. Krassova, Báziás, Herkulesfürdő.

126. *elegantulus* Grav. — I. Budapest, Péczel. II. Pécs. III. Tátrafüred. IV. Kassa, S.-A.-Ujhely, S.-Patak. V. Kolozsvár, Béva, N.-Csür. VI. Krassova, Herkulesfürdő. VII. Diakovár. VIII. Fiume.

127. *strigosus* Germ. — I. Budapest, Kalocsa, Nagy-Várad. IV. Torna. VI. Temesvár, Oravicza, Dognácska, Kazán, Herkulesfürdő. VII. Diakovár.

128. *pygmaeus* F. — I. Budapest, Péczel. II. Boglár. V. Ad balneum Gyógy, N.-Talmács, K.-Disznód.

v. *amoenus* Drap. — I. Kalocsa, Nagy-Várad. II. Nagy-Vázsony, Zircz. III. Szliács. IV. Mons Vihorlat. V. Vallis Zsil. N.-Csür. VI. Oravicza.

129. *connexus* Ol. — I. Budapest, Péczel, M.-Káta, Kalocsa, Horgos, Szeged, Szőreg, Debreczen, Nagy-Várad. II. Ács, N.-Vázsony. IV. Torna, S.-A.-Ujhely, S.-Patak, A.-Bereczki, Tokaj. V. Kolozsvár, ad balneum Gyógy, Hátszeg, Nagy-Talmács, Fenyőfalva, Fogaras. VI. Herkulesfürdő. VII. Zimony. VIII. Martinšćica, Buccari.

v. *subconnexus* Weise. — I. Kalocsa. (Leg. F. Speiser, 349, p. 55.)

v. *arenarius* Weise. — VI. Palics. (Leg. Dr. G. Horváth.)

130. *signaticollis* Suffr. VII. Jablanac. (Leg. L. Biró.)

131. *fulvus* Goeze. — Frequens.

v. *fulvicollis* Suffr. — I. Kalocsa. (Leg. F. Speiser.)

132. *planifrons* Weise. — I. Kalocsa. VI. Herkulesfürdő.

133. *populi* Suffr. — I. Budapest, Csepel, Kalocsa, N.-Várad. V. Fogaras, Rosnyó. VI. Herkulesfürdő.

134. *pusillus* F. — I. Péczel. III. Trencsén. IV. Varannó. V. Sz.-Ujfalu, Kercz, Szász-Régen. VI. Herkulesfürdő. VIII. Fiume.

v. *Marshami* Weise. — I. Kalocsa. VI. Oravicza, Krassova.

135. *rufipes* Goeze. — I. Péczel. II. Sopron. III. T.-Teplicz. IV. Kassa, Czéke. V. Zilah, Hátszeg, Hosszufalu, Prázsmár. VI. Csenej, Oravicza.

Pachybrachys Suffr.

136. *hieroglyphicus* Laich. — Frequens.

v. *ictericus* Wse. — I. Kalocsa. (Leg. F. Speiser.)

v. *tristis* Laich. — III. Tátrafüred. IV. S.-A.-Ujhely, N.-Mihály. V. Brassó, Prázsmár.

137. *haliciensis* Mill. — I. B.-Csaba, N.-Várad. III. Deménfalu. IV. Mons Zsihovecz, Luhi, M.-Sziget. V. N.-Csür, Vidombák, Prázsmár, F.-Tömös, Medgyes. VI. Báziás, Herkulesfürdő.

138. *hippophaës* Suffr. — III. Trencsén, Deménfalu. V. Fogaras, Brassó.

139. *tesselatus* Ol. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Nagy-Várad. II. Sopron, Pécs. III. V.-Mikola, Pozsony, Bohuszlavicz. IV. S.-A.-Ujhely, Tállya. V. Hátszeg, Vizakna, Nagy-Szeben, Nagy-Csür, Sz.-Ujfalu, Volkány, Fogaras, Brassó, Medgyes, Sz.-Régen, Deés. VI. Resicza, Báziás, Herkulesfürdő.

140. *picus* Ws. *(histrio* Redtb.) — V. Teste Seidlitz (345, p. 767).

141. *limbatus* Ménétr. — V. N.-Szeben. (Bielz, 27, p. 99.)

142. *fimbriolatus* Suffr. — I. Budapest, Mons Pilis, Péczel, Kalocsa, N.-Várad. II. Pécs. III. Tátra-Füred. IV. S.-A.-Ujhely, N.-Mihály, Ungvár. V. Hátszeg, Szelindek, N.-Csür, Fenyőfalva, Marpód, Gyeke, M.-Záh. VI. Grebenácz.

v. *pteromelas* Mars. — I. Budapest, Péczel. IV. S.-A.-Ujhely.

Lamprosoma Kirby.

143. *concolor* Sturm. — I. Budapest, Montes Biharenses. III. Hermánd, Beczkó. IV. Jászó, Bártfa, Bánszka. V. Ad balneum Gyógy, Montes Kerczenses, Héviz, Brassó, Segesvár. VI. Resicza, Mons Domoglet. VII. Zágráb, Podsused.

Pachnephorus Redtb.

144. *pilosus* Rossi *(arenarius* Panz.) — I. Budapest, Péczel, Kecskemét, Kalocsa. II. Ács, Sopron, III. Szirák, ad ripam fluvii Vág (Com. Trencsén). IV. Jászó, Bártfa, Varannó, Tárkány. V. Ad balneum Gyógy, Nagyág, Fogaras, Sz.-Magyaros, Segesvár. VI. Jeselnicza. VII. Fužine.

145. *tesselatus* Duft. — I. Budapest, Péczel, Kecskemét, Kalocsa. II. D.-Örs, Zircz. III. Pozsony. IV. Szomotor, Királyháza. V. Hátszeg, Nagy-Szeben, Fogaras, Segesvár.

v. *sabulosus* Gebl. — V. Hátszeg, N.-Szeben, Nagy-Csür, Porumbák, Kőhalom, Medgyes, Segesvár.

v. *villosus* Redtb. — I. Kalocsa. V. Fogaras, Brassó.

146. *villosus* Duft. *(rugaticollis* Mill.) — I. Budapest, Szeged, Csongrád, Nyiregyháza, Debreczen, Nagy-Várad. II. D.-Örs, Ács, Zircz. V. Peér. VI. Ulma. VII. Diakovár. VIII. Fiume.

Adoxus Kirby.

147. *obscurus* L. — Frequens.
v. *vitis* F. — I. Budapest, Szt-Endre, Pomáz, Ráczkeve, Sződ, Péczel, Parád, P.-Monostor. II. Esztergom, Sopron, Pápa, Kercseliget (Com. Somogy), Kenyeri. III. Turcsek, Budatin, Putnok. IV. Rákó (Com. Torna), S.-A.-Ujhely, Tállya, Tokaj, K.-Azar, Mons Vihorlat, Szinna, Mons Szinnaikő, N.-Bocskó. V. N.-Szeben, N.-Csür, Szt-Erzsébet, Medgyes, Segesvár, Sz.-Régen. VI. Ferenczfalva, Herkulesfürdő

Chrysochus Redtb.

148. *pretiosus* F. — Frequens.

Eupales Lefèv.

149. *ulema* Germ. — I. N.-Várad. II. Pécs. V. Peér, Nagy-Ápold. VI. Temesvár, Pancsova, Báziás, Szászka, Krassova, Herkulesfürdő.

Colaphus Redtb.

150. *sophiae* Schall. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Szentes, Debreczen, Nagy-Várad. II. Z.-Tapolcza, Sopron. III. Trencsén, Putnok. IV. Kassa, S.-A.-Ujhely, S.-Patak, Tolcsva, Tokaj, Szomotor. V. Frequens. VI. Janova.

Gastroidea Hope.

151. *viridula* Deg. — I. Beél. III. Beczkó. IV. Bártfa, Vallis Lazescsina, Montes Hoverla, Pietrosz et Pop-Iván. V. Frequens. VI. Herkulesfürdő.

152. *polygoni* L. — Communis.

Entomoscelis Chevr.

153. *adonidis* Pall. — I. Budapest, Péczel, Hatvan, Csány, Török-Szt-Miklós, Mező-Berény, Gerla-Portelek, B.-Ujváros, Debreczen, Nagy-Várad, N.-Szalonta. II. Sopron, Kőszeg. III. V.-Mikola, Putnok. IV. S.-A.-Ujhely, S.-Patak, Tárkány, Kövesd, N.-Mihály. V. Frequens. VI. N.-Zsám, Temesvár.

154. *sacra* L. — I. Budapest, Péczel. II. Sopron, Keszthely, Pécs. III. Beczkó. IV. Tokaj. V. Czege, Kolozsvár, N.-Czég, Gyeke, M.-Záh, Segesvár, Medgyes.

Timarcha Latr.

155. *tenebricosa* F. — I. Budapest. II. Szegzárd. III. Beszterczebánya. V. Brassó, Segesvár. VII. Našice.

156. *venosula* Weise. — VIII. Fiume, Buccari, Zengg.

157. *pratensis* Duft. — II. Felsölő. V. Sz.-Ujvár, Hátszeg, Vallis Zsil, Remete, Szelindek, K.-Disznód, Vöröstorony, Fogaras, Medgyes, Segesvár. VIII. Fiume, Buccari, Carlopago.

158. *violaceonigra* Deg. (*coriaria* Laich.) — I. Budapest, Kalocsa, M.-Kovácsháza, Debreczen. II. Sopron, Keszthely, Pécs. III. Beszterczebánya. Putnok. IV. Torna, Komjáti, Körtvélyes, Kassa, S.-A.-Ujhely, Tállya, Tokaj, Szinna. V. Nagy-Szeben, Szt-Erzsébet, Fogaras, Brassó, Medgyes, Segesvár, Sz.-Régen, M.-Záh, Deés. VI. Temesvár, Herkulesfürdő. VII. Eszék.

159. *rugulosa* H. Schäff. — IV. Nagy-Bocskó. V. Frequens. VI. Krassova, Herkulesfürdő.
v. *Lomnickii* Mill. (*globata* Fairm.) — III. Mons K.-Kriván. V. Montes Radnaenses, Porcsesd, Mons Szurul, Brassó.

160. *metallica* Laich. — I. Montes Biharenses, Nagy-Várad. II. Kőszeg. III. Hermánd, Mons K.-Kriván, Zsolna, N.-Lipcse, Lucski, Mons Chocs, Tátra-Füred, Rosnyó. IV. Szádellő, Mons Jólesz, Varannó, Montes Vihorlat et Szinnaikő. V. Frequens. VI. Báziás, N.-Bogsán, Ferenczfalva, Herkulesfürdő.

161. *gibba* Hoppe. — I. Montes Biharenses. V. Montes Kerczenses. VI. Montes Szörényenses.

162. *angulata* H. Schäff. — VI. Mons Domoglet. (Heller, 159, p. 188.)
janthinipes Fairm. — Hungaria (Cat. Col. Eur., 1891, p. 366.*)

Chrysomela L.

163. *fimbrialis* Küst. — I. Mons Pilis. II. Pécs. III. Vallis Szecsa (Com. Trencsén), Tátrafüred. IV. Szádellő. V. Hátszeg. VII. Velebit. VIII. Fiume.
v. *hungarica* Fuss. — I. Budapest, N.-Várad. II. Z.-Tapolcza, Kőszeg. III. Trencsén. IV. Kassa, Tállya. V. Deés, Sz.-Ujvár, Kolozsvár, Nagy-Enyed, N.-Szeben, Montes Kerczenses, Brassó, Mons Bucsecs.

164. *cribrosa* Ahr. — V. Gyeke (sec. Bielz). VIII. Fiume, Zengg.

165. *Milleri* Ws. — VII. Teste Reitter (Auctor, 382, p. 163.)

166. *Weisei* Friv. — V. Montes Cibinenses, Præsbe, Fogaras, Brassó. VI. Herkulesfürdő.

167. *coerulea* Ol. — I. Parád, N.-Várad, Feketeerdő, Belényes, Monyásza. II. Pécs. IV. Szádellő, S.-A.-Ujhely, Erdőbénye, Montes Vihorlat et Szinnaikő. V. Communis. VI. Szászka, Ferenczfalva, Herkulesfürdő. VII. Raduč. VIII. Fiume.

* Secundum Marseul solum Portugaliam incolit. (243, p. 97.)

168. *globipennis* Suffr. — IV. M.-Laborcz, Mons Vihorlat, N.-Bocskó, Veresmart, Mons Hoverla, Vallis Fajna, N.-Bánya. V. Præsbe, Montes Kerczenses, Előpatak.

169. *lichenis* Richt. — III. Tátrafüred, Lacus ad Felka, Kézsmárk. V. Montes Fogarasenses, Mons Bucsecs.

v. *nigerrima* Ws. — V. Montes Fogarasenses et Brassóenses.

v. *islandica* Germ. — III. Montes Babia-Gura, Tátrafüred. V. Mons Bucsecs.

v. *carpathica* Fuss. — IV. Luhi. V. Mons Ünökő, Szurul, Montes Felekenses, Kerczenses, Fogarasenses et Brassóenses, Mons Bucsecs.

v. *Hopffgarteni* Ws. — V. In regionibus alpinis. (Auctor, 386, p. 30.)

170. *Schneideri* Ws. — III. Tátra. (Auctor, 391, p. 349.)

171. *rufa* Duft. *(Dahli* Suffr.) — I. D.-Győr. III. Hermánd, Mons K.-Kriván, Zsolna, R.-Teplicz, N.-Lipcse, Koritnyicza, F.-Bocza, Mons Chocs, Tátrafüred, Keresztfalu. IV. Szádellő, Montes Rabaszkala et Simonka, Luhi. V. Frequens. VI. Ferenczfalva, Báziás, Herkulesfürdő.

172. *marcasitica* Germ. — III. Mons K.-Kriván, Tihucza, F.-Bocza, Tátrafüred. IV. Torna, Szédellő, Áj, N.-Mihály, Montes Rabaszkala et Vihorlat. V. Montes Retyezát et Cibinenses, Præsbe, Montes Kerczenses et Fogarasenses, Montes Kereszténvhavas et Bucsecs, Oláhfalu, Borgó. VI. N.-Bogsán, Korniaréva.

v. *turgida* Ws. — V. Mons Korongyos, Montes Fogarasenses et Brassóenses.

v. *pannonica* Ws. — I. Vallis Jád (Com. Bihar). V. Montes Fogarasenses et Brassóenses.

173. *purpurascens* Germ. — III. Mons Prasiva (Com. Liptó). IV. Bártfa, N.-Bocskó. VI. Báziás, Herkulesfürdő.

174. *crassimargo* Germ. — I. Mons Pilis. III. Mons K.-Kriván. IV. Vallis Lopuszánka (Com. Marmaros). V. Montes Cibinenses et Fogarasenses, Brassó, Mons Bucsecs. VI. Korniaréva.

v. *viridis* Ws. — Simul cum stirpe.

175. *hemisphaerica* Germ. — III. Trencsén, Rozsnyó. V. Præsbe, Montes Kerczenses, Vöröstorony, Montes Fogarasenses, Brassó, A.-Borgó. VI. Báziás, Herkulesfürdő.

176. *crassicollis* Suffr. — I. Montes Biharenses. III. Beszterczebánya. V. Montes Sebesenses, Præsbe, Montes Fogarasenses, Mons Kereszténvhavas, Montes Brassóenses, Mons Bucsecs. VI. Báziás.

177. *olivacea* Suffr. — I. N.-Várad, Monyásza. III. Mons K.-Kriván. IV. Bártfa, M.-Laborcz, Mons Menczul. V. Frequens.

178. *globosa* Panz. — V. Mons Sánta. VI. Mons Domoglet, Korniaréva. VII. Fužine.

179. *vernalis* Brull. — V. Montes Fogarasenses, Brassó.

v. *Heri* H. Schäff. — V. Hátszeg, Montes Fogarasenses.

180. *atrovirens* Friv. — V. Malomviz. VI. Báziás.

181. *haemoptera* L. — I. Péczel, Parád, Kalocsa, N.-Várad. II. Sopron, Z.-Tapolcza, Pécs. III. Beszterczebánya, Trencsén, Koritnyicza, Tátrafüred, Putnok. IV. Komjáti, Kassa, Sátoraljaújhely, Tokaj. V. Frequens. VI. Jeselnicza. VII. Raduč, Mons Sveto-Brdo. VIII. Fiume.

182. *rossia* Ill. — I. Budapest, Ács. III. Kézsmárk.

183. *goettingensis* L. — Frequens.

v. *sturmi* Westh. — V. Montes Fogarasenses et Brassóenses.

v. *polonica* Ws. — V. Montes Kerczenses. Bielz, 27, p. 100.)

184. *limbata* F. — In toto regno occurrit.

v. *Findeli* Suffr. — VII. Raduč. VIII. Zengg.

185. *lurida* L. — I. Budapest, Péczel, Dabas, Keczel. II. Keszthely, Soóly. V. Hátszeg, Remete, Vizakna, Szt-Erzsébet, Nagy-Szeben, N.-Csür, Medgyes, Sz.-Régen. VI. Ulma, Grebenácz.

186. *staphylea* L. — Communis.

187. *gypsophilae* Küst. — I. Budapest, Péczel, Peszér, Keczel, B.-Csaba. IV. Montes Beszkidenses. V. Déva, Sz.-Ujfalu, N.-Szeben, Szent-Erzsébet. VI. Fehértemplom.

v. *lucidicollis* Küst. — I. Peszér, Farkasd.

188. *sanguinolenta* L. — Frequens.

189. *marginalis* Duft. — I. Budapest, Péczel, Hajós. II. Zircz, Pécs. III. Beszterczebánya. IV. Torna, S.-A.-Ujhely, Tokaj. V. Hátszeg, Nagy-Szeben, Brassó (Czenk), M.-Záh.

190. *carnifex* F. — V.-Sz.-Ujvár, N.-Szeben, Vöröstorony, Gy.-Tölgyes.

191. *cinctipennis* Har. *(circumducta* Suffr.) — I. Budapest, Monor, Peszér, Kecskemét.

192. *marginata* L. — Communis.

193. *analis* L. *(schach* F.) — I. Mons Pilis. II. Sopron. III. Beszterczebánya, Trencsén, Mons Oroszlánkő, N.-Lipcse, Koritnyicza, Mons Chocs, Tátra (Keresztfalu).

v. *lomata* Herbst. — Simul cum stirpe.

194. *orichalcia* Müll. v. *lamina* F. — I. Debreczen. II. Sopron, Kőszeg, Keszthely, Pécs. III. Beszterczebánya, Tátrafüred, Putnok. IV. Torna, Bártfa, Körtvélyes (Com. Zemplén). V.

Nagy-Szeben, N.-Csür, Szt-Erzsébet, Segesvár, Sz.-Régen. VI. Herkulesfürdő. VIII. Fiume.

v. *laevicollis* Ol. — I. Budapest, Péczel, Nagy-Várad. III. Putnok.

195. *morio* Kryn. — I. Budapest. III. K.-Kálna. V. Sz.-Ujfalu. VI. Jeselnicza, Orsova, Herkulesfürdő.

196. *chalcites* Germ. — I. Budapest, Szt-Lőrincz, Péczel, Kalocsa. II. Ad lacum Fertő. V. Brassó.

197. *brunsvicensis* Grav. — III. Beszterczebánya. IV. Rahó. V. Kolozsvár.

198. *geminata* Payk. — I. Budapest, Szt-Lőrincz, Péczel. II. Zircz, Pécs. III. Vallis Vrátna, Koritnyicza. IV. Jászó, S.-A.-Ujhely, N.-Bocskó. V. Remete, Mons Sánta, N.-Csür, Montes ad fluv. Maros. VI. Oravicza, Mons Domoglet. VIII. Fiume.

v. *cuprina* Duft. — V. Brassó, Vidombák, Mons Keresztényhavas.

199. *quadrigemina* Suffr. *(gemellata* Rossi). — V. Mons Sánta. (Leg. A. Ormay, 264, p. 49.)

200. *hyperici* Forst. — Frequens.

v. *ambigua* Ws. — I. Kalocsa. (Leg. F. Speiser, 349, p. 56.)

201. *didymata* Scriba. — I. N.-Várad. IV. Sátoralja-Ujhely, Sáros-Patak, Tolcsva, Szerencs, Szomotor. V. Tasnád, Pele, Peér.

202. *salviae* Germ. — III. Tavarnok. IV. Sátoralja-Ujhely, Tolcsva. VIII. Fiume, Zengg.

americana L. — V. Kolozsvár, Brassó. (Bielz, 27, p. 100.)

203. *cerealis* L. — II. Veszprém, Sopron. III. Zsolna, Rozsnyó, Tátrafüred. IV. Torna, Komjáti, Mons Jólesz, S.-A.-Ujhely. V. Vizakna, N.-Csür, Vallis Czód, Fogaras, Brassó, Medgyes.

v. *alternans* Panz. *(Megerlei* F.) — Frequens.

v. *ornata* Ahr. *(laminula* H. Schäff.) — IV. Szádellő. V. Vizakna, N.-Csür, Fogaras. VIII. Fiume.

v. *mixta* Küst. *(violacea* Schall.) — V. Toroczkó, Montes ad fluv. Maros, Remete, N.-Talmács, Montes Fogarasenses.

204. *aurichalcea* Mannh. v. *asclepiadis* Villa. — IV. Szádellő. V. Brassó, Rosnyó, Előpatak, Segesvár.

v. *eurina* Friv. — I. Rézbánya. V. Montes Biharenses. VI. Herkulesfürdő.

205. *coerulans* Scriba *(violacea* Pz.) — Frequens.

206. *fastuosa* Scop. — Communis.

207. *graminis* L. — I. Budapest, Csepel, Peszér, Kecskemét, Szeged, Mező-Berény, Debreczen, N.-Várad, Bakabánya. III. Hermánd, Trencsén, Á.-Váralja, Kézsmárk. IV. Komjáti. V. Nagy-Szeben, Medgyes, M.-Záh. VI. Herkulesfürdő, Korniaréva.

v. *fulgida* F. — VIII. Fiume, Carlopago.

208. *menthastri* Suffr. — Communis.

v. *rugicollis* Weidb. — I. Kalocsa. V. Fogaras, Brassó.

v. *croatica* Ws. — VIII. Buccari, Zengg.

209. *varians* Schaller. — Frequens.

v. *centaura* Herbst. — V. Mons Sánta, Fogaras, Brassó, Gy-Tölgyes.

v. *pratensis* Ws. — V. Fogaras, Brassó.

v. *aethiops* F. — V. Segesvár. (Legit Dr. C. Petri, 269, p. 11.)

210. *polita* L. — Communis.

Orina Chevr.

211. *tristis* F. *(luctuosa* Ol.) — III. Tátrafüred, Rozsnyó. IV. Mons Vihorlat, Montes Beszkidenses. V. Montes Cibinenses, Mons Galbina, Montes Kerczenses, Mons Keresztényhavas, Brassó, Montes Radnaenses. VI. Ferenczfalva, Oravicza, Herkulesfürdő.

v. *smaragdina* Ws. — V. Balánfalva, Deés.

212. *rugulosa* Suffr. — III. Koritnyicza, F.-Bocza. IV. Olyka, Mons Gutin. V. Mons Retyezát et Cibinenses, Montes Galbina et Keresztényhavas, Montes Radnaenses, Mons Ünökő. VI. Ferenczfalva.

213. *intricata* Germ. — I. Kristyór. III. Hermánd, Mons K.-Kriván, Koritnyicza, Á.-Váralja, Tátrafüred, Barlangliget. IV. Montes Vihorlat et Rabaszkala, Olyka, Brusnyicza, Mons Hoverla. V. Montes Korongyos et Ünökő, Montes Kerczenses, Mons Keresztényhavas, Héviz, Segesvár, Gy.-Tölgyes, Borszék, Borgó. VI. Herkulesfürdő.

v. *Anderschi* Duft. — III. Trencsén. V. Frequ. VI. Herkulesfürdő.

214. *alpestris* Schumm. — I. Rézbánya. III. Hermánd, Vallis Vrátna, Montes K.-Kriván et Sztrazsov, N.-Lipcse, Koritnyicza, Á.-Váralja, Tátrafüred, Javorina, Barlangliget. IV. Mons Rabaszkala, Montes Beszkidenses. V. Montes Kerczenses, Brassó, Tihucza, Borszék, Montes Radnaenses. VI. Korniaréva. VII. Velebit.

v. *punctatissima* Suffr. — I. Vallis Jád. IV. Vallis Fajna, Mons Balzatul (Com. Marmaros). V. Mons Szurul. VI. Korniaréva.

v. *rivularis* Ws. — V. Montes Fogarasenses, Montes Dongókő et Keresztényhavas, Brassó.

v. *fontinalis* Ws. — V. Montes Korongyos et Ünökő, Kercz, Montes Fogarasenses, Mons Keresztényhavas, Montes Brassóenses.

v. *bicolora* Ws. — V. Fogaras, Montes Brassóenses.

v. *banatica* Ws. — VI. In regionibus alpinis et subalpinis (Auctor, 391, p. 447.)

v. *polymorpha* Kr. *(speciosa* Suffr.) — V. Montes Biharenses et Brassóenses, Borszék.

215. *gloriosa* F. — V. Montes Fogarasenses. VII. Mons Bukova-Kusa, Velebit.

v. *pretiosa* Suffr. — III. Tátrafüred. V. Montes Radnaenses: Mons Ünökő.

v. *venusta* Suffr. — III. Trencsén, Tátrafüred. IV. Luhi, Mons Menczul. V. Montes Cibinenses, Mons Galbina, Montes Kerczenses et Brassóenses. VI. Korniaréva.

216. *variabilis* Ws. — V. Montes Fogarasenses et Brassóenses.

217. *vittigera* Suffr. — V. Montes Cibinenses, Mons Galbina, Montes Radnaenses, Mons Ünökő.

218. *bifrons* F. *(monticola* Duft.) — V. Montes Biharenses. (Bielz, 27, p. 100.)

v. *decora* Richt. — V. Montes Árpásenses. (Leg. A. Ormay, 264, p. 49.)

219. *viridis* Duft. — III. Trencsén, Tátrafüred. IV. Körtvélyes, Mons Hoverla. V. Montes Cibinenses, Dús, Cibinjézer, Montes Brassóenses.

v. *lugubris* Ws. — V. Feketehalom. VI. Herkulesfürdő.

v. *Merkli* Ws. — V. Hátszeg. VI. Herkulesfürdő.

v. *transsylvanica* Wse. — III. Tátra (Vallis Mlinicza). V. Teste Merkl. VI. Herkulesfürdő.

220. *virgulata* Germ. — I. Remecz. III. Tavarnok, Vallis Vrátna, Koritnyicza, Tátrafüred. V. Montes Korongyos, Ünökő et Sánta, Bisztratelep, Montes Felekenses, Kerczenses et Czódenses, Mons Keresztényhavas, Héviz, Borgó. VI. Herkulesfürdő, Korniaréva.

v. *serena* Ws. — V. Montes Fogarasenses et Brassóenses.

v. *candens* Ws. — V. Præsbe, Montes Kerczenses.

v. *praefica* Ws. — V. Montes Fogarasenses et Kerczenses.

221. *melanocephala* Duft. — III. Mons Mincsol (Com. Trencsén). V. Montes Brassóenses et Csikenses, Oecsém, N.-Hagymás.

222. *plagiata* Suffr. *(melanocephala* Fuss). — III. Vallis Vrátna, Koritnyicza, Montes Babia-Gura, Tátrafüred. IV. Mons Lungacsásza. V. Frequens. VI. Korniaréva.

v. *distinctissima* Ulanowski. — III. Á.-Váralja. IV. Mons Hoverla.

223. *cacaliae* Schrnk. — I. Rézbánya. III. Vallis Vrátna. IV. Tolcsva. V. Creber. VI. Korniaréva.

v. *sumptuosa* Redtb. — III. Vallis Vrátna. V. Montes Retyezát, Montes Galbina et Keresztényhavas. VI. Mons Domoglet, Korniaréva.

v. *senecionis* Schumm. — I. Montes Biharenses. III. Hermánd, Vallis Vrátna, Mons K.-Kriván, N.-Lipcse, Deménfalu, Á.-Váralja, Tátrafüred. IV. Nagy-Bocskó, Mons Breczkul. V. Montes Retyezát, Mons Galbina, Bisztratelep, Montes Cibinenses et Kerczenses, Mons Tészla, Borszék. VI. Mons Szemenik, Herkulesfürdő.

v. *tristicula* Ws. — V. Montes Fogarasenses et Brassóenses.

v. *fraudulenta* Ws. — Simul cum priori.

224. *speciosissima* Scop. — I. Rézbánya. III. Vallis Vrátna, Mons Sztrazsov (Com. Trencsén). IV. Luhi, Mons Lungacsásza. V. Montes Keresztényhavas et Tészla, Borszék. VI. Herkulesfürdő, Korniaréva.

v. *Letzneri* Weise. — III. Mons K.-Kriván. (Leg. Dr. C. Brancsik, 46, p. 153.)

v. *juncorum* Suffr. — V. Frequens. VI. Karansebes.

v. *carpathica* Kr. — V. Montes Fogarasenses et Brassóenses, Mons Bucsecs. VI. Herkulesfürdő.

Phytodecta Kirby.

Gonioctena Redtb.

225. *viminalis* L. — III. Trencsén, Tátrafüred, Rozsnyó. IV. Szádellő, Mező-Laborcz, Mons Vihorlat, Vallis Fajna. V. Communis. VI. Grebenácz. VII. Fužine.

v. 10—*punctata* L. — III. Koritnyicza, Tátra-Füred. IV. M.-Laborcz, N.-Bocskó. V. Kercz, Brassó, Medgyes, Deés. VI. Szászka.

v. *Baaderi* Panz. — III. Tátrafüred. IV. Mező-Laborcz. V. Brassó.

v. *cincta* Ws. — III. Tátrafüred. (Leg. E. Polinszky.)

226. *rufipes* Deg. — I. Budapest, Kalocsa. III. Trencsén, Tátrafüred. IV. Áj, Szádellő, Mons Szinnaikő, N.-Bocskó. V. N.-Szeben, Veresmart, Brassó, Medgyes, Segesvár, Deés. VI. Rumunyest.

227. *flavicornis* Suffr. — IV. M.-Laborcz, Nagy-Bocskó. V. N.-Szeben, Rátosnya.

228. *Linnaeana* Schrank. — I. Székelyhid. III. Beszterczebánya, Hermánd, Tátrafüred. IV. Vallis Fajna. V. Felek (Rakovicza), Brassó.

v. *decastigma* Duft. — IV. Mező-Laborcz, M.-Sziget, N.-Bocskó.

v. *Kraatzi* Westh. — V. Rátosnya (Leg. C. Fuss.)

v. *Satanas* Westh. — IV. Mező-Laborcz, Kőrösmező.

229. *fornicata* Brüggm. — Communis.

230. *olivacea* Forst. v. *litura* F. — I. Mons Pilis. II. Boglár.

231. *5—punctata* F. — II. Felsőlő. III. Mons K.-Kriván, Koritnyicza, Deménfalu, Tátrafüred.

v. *obscura* Grimmer. — IV. Montes Hoverla et Pietrosz.

232. *pallida* L. — III. Beszterczebánya, Hermánd, Zsolna, Mons Chocs, Tátrafüred. IV. Montes Vihorlat, Szinnaikő, Hoverla et Menczul, Vallis Fajna. V. Frequens.

v. *nigripennis* Ws. — IV. Mons Lungacsásza. V. Mons Nagykőhavas.

Phyllodecta Kirby.

233. *vulgatissima* L. — II. Sopron, Felsőlő. III. Trencsén, Tátrafüred. IV. S.-A.-Ujhely, Mons Szinnaikő. V. Hátszeg, N.-Szeben, Montes Kerczenses, Fogaras, Brassó, Előpatak, Segesvár, Gy.-Tölgyes. VI. Herkulesfürdő.

234. *tibialis* Suffr. — VI. Herkulesfürdő, Szkit.

v. *Cornelii* Ws. — I. N.-Várad, Koritnyicza. V. Krizba, Brassó, Barót.

235. *vitellinae* L. — Frequens.

v. *nigrica* Motsch. — I. Debreczen. III. Koritnyicza. IV. Vallis Lazescsina. (Com. Marmaros.)

236. *laticollis* Suffr. — V. Brassó, Segesvár.

237. *atrovirens* Cornel. — I. Szentes, Debreczen. IV. M.-Sziget, Rahó, Mons Hoverla. V. Brassó (Csigahegy).

Hydrothassa Thoms.

238. *aucta* F. — Frequens.

v. *glabra* Herbst (*egena* Gyll.) — III. Zsolna, Tátrafüred. V. N.-Szeben, N.-Csür, Szelindek, K.-Torony, Montes Kerczenses.

239. *marginella* L. — I. N.-Várad. II. Felsőlő. III. Vallis Vrátna, Mons K.-Kriván, Koritnyicza, Deménfalu, Tátrafüred. V. N.-Szeben, N.-Csür, K.-Disznód, Kercz, Gyeke. VI. Temesvár.

240. *hannoverana* F. v. *germanica* Ws. — V. Nagy-Szeben. (Leg. A. Ormay, 264, p. 49.)

Prasocuris Latr.

241. *phellandrii* L. — Frequens.

242. *junci* Brahm. — I. Budapest, Péczel, N.-Várad. II. Z.-Tapolcza. III. Vallis Vrátna. V. N.-Szeben, Nagy-Csür, Szt-Erzsébet, Sz.-Ujfalu, Medgyes, Sz.-Régen. VI. Rumunyest.

vicina Luc. — V. Kolozsvár, K.-Disznód (Bielz, 27, p. 101.)

Sclerophaedon Weise.

243. *carpathicus* Ws. — IV. Luhi, Mons Menczul. V. Montes Radnaenses.

v. *Kenderesyi* Kiesw. — V. Hátszeg, Mons Retyezát.

244. *carniolicus* Germ. — III. Beszterczebánya, Hermánd, Vallis Vrátna, Mons Mincsol, Koritnyicza, Tátrafüred. IV. Montes Vihorlat, Szinnaikő et Hoverla. V. Frequens. VI. Ferenczfalva, Korniaréva.

v. *transsylvanicus* Fuss. — I. Remecz, Vallis Jád. IV. M.-Laborcz, Luhi, Mons Menczul. V. Montes Radnaenses, Mons Sánta, Vallis Czód, Montes Kerczenses, Mons Keresztényhavas, Montes Brassóenses, Mons Bucsecs, Parajd, Oláhfalu.

245. *orbicularis* Suffr. — IV. Rahó, Luhi, Mons Menczul. V. Hátszeg, Héviz. VI. Csenej.

Phaedon Latr.

246. *segnis* Ws. — I. Kalocsa. VI. Grebenácz, Herkulesfürdő.

v. *obscurus* Ws. — IV. Montes Hoverla et Pietrosz. V. Montes Radnaenses.

247. *pyritosus* Rossi. — I. Hajós, N.-Várad. V. Miriszló, N.-Szeben, N.-Csür, Segesvár, Sz.-Régen. VI. Moravicza, Grebenácz, Herkulesfürdő.

248. *laevigatus* Duft. (*sabulicola* Suffr.) — I. Budapest, Szentes, N.-Várad. II. D.-Örs, Pécs. III. K.-Kálna, Mons K.-Kriván, Beczkó, Trencsén, R.-Teplicz. IV. S.-A.-Ujhely, Varannó, Tárkány. V. Sz.-Ujfalu, Segesvár. VI. Báziás, Herkulesfürdő.

249. *grammicus* Duft. — III. Tátrafüred. V. Nagy-Szeben. VI. Herkulesfürdő.

250. *cochleariae* F. — Frequens.

v. *neglectus* Sahlb. — V. Kolozsvár (Bielz, 27, p. 101.)

v. *hederae* Suffr. — I. Budapest. II. Pécs. III. Vallis Vrátna. IV. Mons Hoverla. VI. Báziás.

v. *obesus* Ws. — V. N.-Csür, Sz.-Ujfalu, Montes Kerczenses.

251. *armoraciae* L. — I. N.-Várad. III. Vallis Vrátna. Koritnyicza, Tátrafüred. V. M.-Záh, Gy.-Tölgyes.

v. *salicinus* Heer. — IV. Mons Hoverla. V. Nagy-Szeben. VI. Herkulesfürdő.

252. *tatricus* Mars. — III. Tátra (Auctor, 243, p. 400.)

253. *Szmolayi* Mars. — In regione VI. (Detexit Dr. V. Szmolay; Auctor, 243, p. 401.)

Plagiodera Redtb.

254. *versicolora* Laich. (*armoraciae* F.) — Communis.

Melasoma Steph.

Lina Redtb.

255. *aenea* L. — I. Parád. II. Felsőlő, Kőszeg, Pécs. III. Hermánd, Budatin, Tátrafüred. IV. Varannó, Ungvár, N.-Bocskó. V. Frequens. VI. N.-Bogsán, Mons Domoglet, Rumunyest.
v. *haemorrhoidalis* L. — V. Montes Kerczenses, Buzamező.

256. *cuprea* F. — I. Parád. II. Sopron, Pécs. III. Hermánd, Zlatócz, Z.-Ugrócz. IV. Jászó, Körtvélyes, Mons Szinnaikő, Nagy-Bocskó. V. Ad balneum Gyógy, Hátszeg, N.-Szeben, Veresmart, Brassó, Medgyes, Sz.-Régen. VI. Herkulesfürdő.

257. *lapponica* L. — III. Tátrafüred. IV. Sz.-Olyka.
v. *bulgharensis* F. — I. Budapest: ad rivum Rákos. (Leg. D. Kuthy.)

258. *20—punctata* Scop. — I. Budapest, Kalocsa, N.-Várad, Székelyhid. II. Sopron, Keszthely, Pécs. III. Beszterczebánya, Hermánd, Trencsén, Putnok. IV. Torna, Körtvélyes, S.-A.-Ujhely, N.-Mihály, Olyka, Mons Vihorlat, Nagy-Bocskó. V. N.-Szeben, N.-Csür, Montes Kerczenses, Brassó, Medgyes, Segesvár, Szász-Régen. VI. Grebenácz.

259. *collaris* L. — I. Budapest, Isaszeg, Peszér, Kecskemét, N.-Várad. IV. Ránk, Nagy-Bocskó. V. Frequens. VI. Herkulesfürdő.

260. *populi* L. — Communis.

261. *tremulae* F. *(longicollis* Suffr.) — III. Trencsén, T.-Szt-Márton. IV. M.-Sziget.

262. *saliceti* Ws. *(tremulae* Suffr.) — Communis.

Agelastica Rdtb.

263. *alni* L. — Frequens.

Phyllobrotica Redtb.

264. *quadrimaculata* L. — I. Budapest, Parád, Kalocsa, Debreczen. II. Zircz, Sopron, Keszthely, Pécs. III. Trencsén. IV. Szinna, N.-Bocskó. V. N.-Szeben, Sz.-Régen.

265. *adusta* Creutz. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, N.-Várad. II. Sopron, Z.-Tapolcza, Pécs. III. Agárd, Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj. V. Frequens. VI. Grebenácz, Báziás, Oravicza, Szászka, Herkulesfürdő.

Luperus Geoffr.

266. *nigrofasciatus* Goeze. — I. Budapest, Fót, Péczel, N.-Várad. II. Sopron, Keszthely, Szegzárd, Pécs. III. Bohuszlavicz. IV. S.-A.-Ujhely, S.-Patak, Tolcsva, Tokaj, Szinna. V. Zilah, Hátszeg, Sz.-Sebes, N.-Talmács, K.-Disznód, Sz.-Régen. VI. Oravicza.

267. *pinicola* Duft. — III. Hermánd, Trencsén, Koritnyicza, Tátrafüred. IV. Nagy-Bocskó. V. Hátszeg. VI. Herkulesfürdő.

268. *xanthopus* Schrank. — I. Budapest, Szeged, Debreczen. II. N.-Vázsony, Z.-Tapolcza, Kőszeg, Pécs. IV. Sátoralja-Ujhely, Sáros-Patak, Tokaj, Varannó. V. Tasnád, Hátszeg, N.-Szeben, Brassó, Segesvár. VI. Ferenczfalva, Herkulesfürdő.

269. *saxonicus* Gmel. *(rufipes* F.) — I. Budapest, Debreczen. II. Zircz, Sopron. III. Trencsén. V. Volkány. VI. Rékas, Buziás, Herkulesfürdő.

270. *rugifrons* Ws. — V. N.-Szeben. VI. N.-Bogsán, Herkulesfürdő.

271. *longicornis* F. — III. Hermánd. V. N.-Szeben, N.-Csür, Holczmány. VI. Ferenczfalva, Báziás.

272. *flavipes* L. — I. Budapest, Kalocsa. II. Z.-Tapolcza, Kőszeg. III. Beszterczebánya, Tátrafüred, Putnok. IV. Bártfa, Montes Simonka et Rabaszkala. V. N.-Csür, Montes Kerczenses, Fogaras, Brassó, Prázsmár, Szász-Régen. VI. Herkulesfürdő.

273. *viridipennis* Germ. — II. Kőszeg. IV. Montes Breczkul et Balzatul. V. Malomviz, Mons Paring, Brassó, Prázsmár. VI. Herkulesfürdő.

Lochmaea Weise.

274. *capreae* L. — Frequens.

275. *suturalis* Thoms. — V. Barót. (Legit L. Méhely, 247, p. 196.)

276. *crataegi* Forst. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. III. Beszterczebánya, Trencsén. IV. Sátoralja-Ujhely, Tokaj, N.-Mihály. V. N.-Szeben, Vörös-torony, Sz.-Ujfalu, Brassó, Medgyes, Segesvár, Sz.-Régen, Deés. VI. Ulma.

277. *pallida* Joan. — VI. Ulma. (L. E. Frivaldszky.)

Galerucella Crotch.

278. *viburni* Payk. — I. Budapest. III. Bohuszlavicz, T.-Szt.-Márton. IV. Homonna. V. Hátszeg, Nagy-Szeben, N.-Disznód, K.-Disznód, Brassó, Medgyes, Segesvár, Borszék.

279. *nymphaeae* L. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Szeged, Szentes, M.-Berény. II. Komárom. III. Putnok. V. Brassó. VII. Eszék.

280. *lineola* F. — Frequens.

281. *luteola* Müll. *(crataegi* Bach). — In toto regno occurrit.

282. *calmariensis* L. — Ut prior.

283. *pusilla* Duft. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. V. Gyeke. VI. Herkulesfürdő.

284. *tenella* L. — I. Budapest. II. Keszthely. III. Trencsén. IV. Kőrösmező. VI. Jeselnicza, Herkulesfürdő.

Galeruca Geoffr.

285. *tanaceti* L. — Communis.

286. *circumdata* Duft. — I. Budapest, R.-Palota. VI. Herkulesfürdő.

v. *oelandica* Boh. (*hungarica* Friv.) — VI. Grebenácz. (Leg. J. Frivaldszky.)

287. *littoralis* F. — VII. Mons Bukova-Kusa. VIII. Fiume, Carlopago.

288. *rugosa* Joan. — VII. Velebit. (Leg. L. Biró.)

289. *Pomonae* Scop. (*rustica* Schall.) — Frequ.

290. *Dahli* Joan. — I. Budapest, Peszér. V. Brassó. VI. Ulma.

291. *rufa* Germ. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Algyő, B.-Csaba. IV. Erdőbénye. V. Tasnád, N.-Lak, Sz.-Sebes, Medgyes, Brassó. VI. Temesvár, Ulma.

292. *melanocephala* Ponza (*aptera* Bon.) — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, B.-Csaba, Debreczen. V. Hátszeg, Örményszékes, Nagy-Csür, Medgyes, Gyeke, Deés. VI. Temesvár.

Euluperus Weise.

293. *xanthopus* Duft. — I. Budapest, Nagy-Várad. V. Nagy-Szeben, N.-Csür, Holczmány, Vörös-torony, Brassó, Segesvár.

294. *cyaneus* Joan. — V. Mons Kereszténybavas, Brassó.

Podagrica Foudr.

295. *fuscipes* L. — I. Kalocsa, Debreczen. II. Ács. V. Sz.-Ujvár, Hátszeg, N.-Szeben, Holczmány.

296. *malvae* Illig. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, M.-Berény, B.-Csaba, M.-Kovácsháza, Debreczen. II. Z.-Tapolcza, Mohács. III. K.-Kálna, Nyitra. IV. S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Szerencs, N.-Károly. V. N.-Szeben, N.-Csür, A.-Szombat, Fogaras, Segesvár, Sz.-Régen. VI. Temesvár, Herkulesfürdő. VII. Zimony.

297. *fuscicornis* L. — Frequens.

v. *meridionalis* Ws. — I. M.-Kovácsháza, Nagy-Várad. II. Boglár.

298. *discedens* Boield. — I. Péczel, Peszér. II. Komárom. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely. VI. Herkulesfürdő.

Derocrepis Weise.

299. *rufipes* L. — Frequens.

Crepidodera Chevr.

300. *femorata* Gyll. — IV. Mons Hoverla, Luhi.

301. *transsylvanica* Fuss. — IV. Mons Rabaszkala, Luhi, Montes Pop-Iván et Pietrosz. V. Montes Korongyos et Ünökő, Præsbe, Vallis Lotrióra Montes Kerczenses.

302. *corpulenta* Kutsch. — II. Ács. IV. O.-Ruszka, V. Mons Paring, Præsbe, Porcsesd, Mons Szurul, Montes Felekenses, Kerczenses et Árpásenses. VI. Herkulesfürdő.

303. *melanostoma* Redtb. — V. Montes Biharenses, Kolozsvár.

304. *cyanescens* Duft. — III. Mons K.-Kriván, Trencsén. IV. Luhi, Vallis Lazecsina, Mons Pietrosz. V. Montes Felekenses, Lacus Girbova, Montes Kerczenses et Bodzaenses.

305. *cyanipennis* Kutsch. — V. Montes Kerczenses. (Leg. A. Ormay, 264, p. 50.)

306. *transversa* Marsh. — I. Budapest. III. Kis-Kálna, Trencsén. IV. Bártfa, Homonna. V. Hátszeg, K.-Torony, Nagy-Szeben, Nagy-Csür. VI Grebenácz.

307. *impressa* F. — I. Budapest, Kalocsa, N.-Várad. II. Pécs. IV. Torna, Kassa, Olyka. V. Ad balneum Gyógy, Mons Sánta, Nagy-Szeben, Fogaras.

308. *ferruginea* Scop. — Frequens.

Ochrosis Foudr.

309. *ventralis* Ill. — III. Trencsén. (Legit Dr. C. Brancsik, 42, p. 68.)

310. *salicariae* Payk. — I. Budapest, Kalocsa, N.-Várad. IV. Sátoralja-Ujhely, Sáros-Patak, A.-Bereczki. V. Sz.-Ujfalu, Marpód, Segesvár.

Epitrix Foudr.

311. *pubescens* Koch. — Frequens.

v. *ferruginea* Wse. — I. Budapest, Kalocsa.

312. *atropae* Foudr. — I. Budapest, Mons Pilis, Péczel, Debreczen. III. Mons Manin (Com. Trencsén). VI. Oravicza, Herkulesfürdő. VII. Našice.

Chalcoides Foudr.

313. *nitidula* L. — V. Sánta, N.-Szeben, Szent-Erzsébet, N.-Csür, Fogaras, Brassó, Prázsmár, Medgyes, Sz.-Régen.

314. *metallica* Duft. — V. Szamos-Ujvár, Oláhfalu, N.-Szeben.

315. *splendens* Ws. — I. Budapest, Kalocsa. II. Kőszeg, Pécs. IV. Bártfa. V. Papolcz. VI. Resicza, Herkulesfürdő.

v. *laeta* Ws. — I. Kalocsa. V. Buzamező. VI. Oravicza.

v. *gaudens* Steph. — I. Budapest, Kalocsa, M.-Kovácsháza, N.-Várad. VI. Herkulesfürdő.

316. *helxines* L. (*smaragdina* Foudr.) — I. Kecskemét, F.-Abony. II. Ács, Keszthely. III. Hermánd, Trencsén. IV. Beregszász. V. Frequens. VI. Gombos.

v. *fulvicornis* F. — V. Segesvár. (Bielz, 27, p. 102.)

v. *cyanea* Marsh. — I. N.-Várad. IV. Bártfa. V. Segesvár.

317. *aurata* Marsh. (*versicolor* Kutsch.) — Frequ.

v. *pulchella* Steh. — I. Kalocsa. V. Medgyes. VI. Oravicza, Velebit.

318. *chloris* Foudr. — I. Budapest, Kalocsa, Szeged. II. Keszthely. IV. Czéke. V. N.-Csür, Medgyes.

v. *Foudrasi* Ws. — I. Kalocsa. (L. F. Speiser.)

Hippuriphila Foudr.

319. *Modeeri* L. — Frequens.

320. *nigritula* Gyll. — I. Budapest, N.-Várad. III. Beszterczebánya, Mons K.-Kriván, Putnok. IV. Montes Szinnaikő et Hoverla. V. Ad balneum Gyögy, N.-Disznód. VI. Resicza.

Orestia Germ.

321. *puncticollis* Reitt. — V. Felső-Kercz. (Auctor, 297, p. 55.)

322. *Hampei* Mill. — VII. Capella. (Reitter, 297, p. 54.)

323. *alpina* Germ. — V. Mons Surian, Præsbe, Montes Kerczenses, Mons Hargita, Borszék. (Bielz, 27, p. 102.)

324. *Aubei* All. — I. Parád, Fonácza, Hagymádfalva, Remecz. V. Ad balneum Gyögy, Valles Zsil et Lotrióra, Montes Kerczenses. VI. Báziás, Herkulesfürdő. VII. Ljeskovac.

325. *arcuata* Mill. — III. Montes K.-Kriván, Oroszlánkő et Chocs, Tátrafüred. IV. Montes Vihorlat, Rabaszkala, Szinnaikő, Hoverla et Pop-Iván. V. Montes Korongyos et Ünökő, Montes Kerczenses, Brassó (Czenk).

326. *carpathica* Reitt. — IV. Kőrösmező, Mons Turkul, Cserna-Hóra.

327. *Páveli* Friv. — VI. Herkulesfürdő. (Detex. J. Pável.)

Hypnophila Foudr.

328. *obesa* Waltl. — I. Parád, Monyásza. III. Mons K.-Kriván, Koritnyicza, Mons Chocs, Tátrafüred. IV. Mons Vihorlat, Nagy-Bocskó, Mons Pietrosz. V. Montes Korongyos et Ünökő, Montes Retyezát, Vallis Zsil, Mons Sánta, N.-Disznód, K.-Disznód, Vallis Lotrióra, Præsbe.

329. *impunctícollis* All. — VI. Resicza. (Leg. E. Merkl.)

Hopffgarteni Epph. — V. Montes Kerczenses. (Bielz, 27, p. 102.)

Mantura Steph.

330. *obtusata* Gyll. — III. Trencsén. IV. Mons Hoverla. V. Hátszeg. VI. Herkulesfürdő. VII. Fužine.

331. *chrysanthemi* Koch. — III. Tátrafüred. V. Hátszeg.

v. *Crotchi* All. — III. Tátrafüred. (Legit A. Mocsáry.)

332. *rustica* L. — Frequens.

Chaetocnema Steph.

333. *major* Duv. — I. Szeged. (Leg. J. Vánky.)

334. *chlorophana* Duft. — I. Budapest, Péczel, N.-Várad. IV. Beregszász. V. Tasnád, Peér.

335. *Scheffleri* Kutsch. — I. Budapest, M.-Berény, Derékegyháza, Csongrád, M.-Kovácsháza. VI. Grebenácz.

336. *semicoerulea* Koch. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. III. Trencsén. IV. N.-Mihály, Homonna. V. Hátszeg, A.-Szombat, Fogaras, Sz.-Régen. VI. Grebenácz, Herkulesfürdő.

337. *concinna* Marsh. — Frequens.

338. *tibialis* Ill. — I. Budapest, Dabas, Kalocsa, Szeged, M.-Kovácsháza, M.-Berény. II. Ad lacum Fertő. IV. Homonna, Vallis Lazecsina. VI. Palics, N.-Szeredistye, N.-Zsám, K.-Zsám, Klopodia.

339. *conducta* Motsch. — I. Budapest, Kalocsa, Szeged, M.-Kovácsháza, Derékegyháza, Mező-Berény, Debreczen. II. Zircz. IV. Torna.

340. *compressa* Letz. — I. Péczel, Isaszeg, Derékegyháza, M.-Kovácsháza,

341. *meridionalis* Foudr. — I. Budapest. II. Ács, N.-Vázsony. IV. S.-A.-Ujhely, M.-Sziget. V. Hátszeg, N.-Szeben, N.-Csür, Fenyőfalva. VI. Grebenácz, Báziás.

342. *Mannerheimi* Gyll. — I. Budapest, Kalocsa. IV. Torna. V. Hátszeg, N.-Csür, Fenyőfalva. VI. Gombos, Báziás.

343. *arenacea* All. — I. Budapest, Kalocsa, Mező-Berény, M.-Kovácsháza. III. Trencsén. IV. Bártfa.

344. *aridula* Gyll. — I. Budapest, Péczel, Mező-Berény, Debreczen. IV. M.-Sziget. V. Hátszeg, N.-Szeben, N.-Csür, Marpód, Brassó, Előpatak, Segesvár, Oláhfalu.

345. *Sahlbergi* Gyll. — I. Budapest, Kalocsa.

346. *hortensis* Fourc. — Frequens.

347. *aerosa* Letz. — I. Budapest, Nyiregyháza. IV. S.-Patak, M.-Sziget.

Psylliodes Latr.

348. *cucullata* Ill. — IV. M.-Sziget. V. Kolozsvár, Oecsém.

349. *Frivaldszkyi* Ws. — III. Tátra. IV. Mons

Turkul (Com. Marmaros). V. Montes Korongyos et Ünökő. VI. Herkulesfürdő.

350. *glabra* Duft. — III. Kékkő, Montes K.-Kriván et Oroszlánkő. IV. Montes Hoverla, Pop-Iván et Pietrosz. VI. Herkulesfürdő.

351. *subaenea* Kutsch. — IV. Cserna-Hóra. VI. Resicza, Oravicza.

352. *latifrons* Ws. — VIII. Fiume. (Leg. J. Pável).

353. *attenuata* Koch. — Frequens.

354. *cupreata* Duft. — V. Veresmart, Felek, Szt-Erzsébet, Sz.-Régen.

355. *chrysocephala* L. — I. Budapest, Péczel, M.-Káta, Farkasd, M.-Berény, Orosháza, Makó, N.-Várad. II. Keszthely, Szegzárd. IV. Páczin, Varannó, Homonna. V. Szamosujvár, Hátszeg, N.-Szeben, Segesvár.

356. *cyanoptera* Ill. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Szentes. II. Ács. V. N.-Szeben, K.-Disznód, Fogaras.

v. *tricolor* Ws. — I. Kalocsa. (Leg. F. Speiser.)

357. *napi* F. — I. Budapest. II. Ács. III. Koritnyicza. IV. S.-A.-Ujhely, M.-Sziget. V. Tasnád, Nagy-Szeben, Szent-Erzsébet, Montes Kerczenses, Sz.-Régen. VI. Herkulesfürdő.

358. *picipes* Redtb. — V. Brassó. VIII. Fiume.

359. *thlaspis* Foudr. — I. Péczel. IV. Bártfa, Sátoralja-Ujhely. V. N.-Szeben. VI. Uj-Moldova.

360. *obscura* Duft. — VI. Resicza. (Leg. E. Merkl).

361. *cuprea* Koch. — IV. Szerencs, S.-A.-Ujhely. V. Veresmart, Felek, Sz.-Régen.

362. *instabilis* Foudr. — I. Budapest. II. Pécs. III. Trencsén.

363. *aerea* Foudr. — VI. Herkulesfürdő. (Legit J. Pável.)

364. *affinis* Payk. — I. Budapest. IV. Bártfa, Sztropkó. V. Hátszeg, Szamos-Ujfalu, Brassó, Medgyes.

365. *circumdata* Redtb. — I. Kalocsa. IV. Bánszka. VI. Orsova, Herkulesfürdő.

v. *integra* Ws. — I. Kalocsa. (Leg. F. Speiser.)

366. *dulcamarae* Koch. — I. Budapest, Péczel, Szeged. II. Keszthely. V. N.-Csür.

367. *hyoscyami* L. — I. Budapest. II. Pécs. V. N.-Csür.

v. *chalcomera* Ill. — I. Budapest, Péczel. II. N.-Harsány. IV. Bártfa. V. N.-Csür.

368. *luteola* Müll. — I. Budapest. V. Szucság, N.-Szeben, Szt-Erzsébet, Előpatak, Oláhfalu.

369. *picina* Marsh. — V. Kolozsvár. (Bielz, 27, p. 102.)

v. *melanophthalma* Duft. — I. Kalocsa. V. K.-Disznód, Fogaras, Sz.-Régen.

370. *laevifrons* Kutsch. — VI. Resicza. (Leg. E. Merkl.)

Haltica Geoffr.

371. *quercetorum* Foudr. *(erucae* Ol.) — I. Márton-Káta, M.-Kovácsháza, N.-Várad. V. N.-Szeben, Brassó, Segesvár.

v. *brevicollis* Foudr. *(ampelophaga* Leesb.) — I. Hagymádfalva. II. Esztergom. VIII. Fiume.

372. *lythri* Aub. — I. Kalocsa. V. Hátszeg, Nagy-Szeben.

373. *tamaricis* Schrank. — I. Hajós. II. Keszthely, Pécs. IV. Jászó, Luhi, Bogdán. V. Hátszeg, Vallis Lotrióra, N.-Szeben, Gyeke, M.-Záh. VI. Palics, Báziás.

374. *fructicola* Ws. — II. Esztergom, Csopak. VII. Čerević.

375. *carduorum* Guér. — IV. S.-A.-Ujhely, Ungvár.

376. *oleracea* L. — Communis.

v. *lugubris* Ws. — I. Szeged. IV. Ungvár. VII. Zimony.

377. *pusilla* Duft. — I. Péczel. (Leg. D. Kuthy.)

Hermaeophaga Foudr.

378. *mercurialis* F. — I. Budapest, Montes Biharenses. II. Kőszeg. IV. M.-Sziget. V. Vallis Zsil, K.-Disznód, Brassó (Czenk).

Batophila Foudr.

379. *rubi* Payk. — In regionibus montanis frequens.

Phyllotreta Foudr.

380. *armoraciae* Koch. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. IV. N.-Bocskó. V. Sz.-Sebes, N.-Csür.

381. *exclamationis* Thunb. *(brassicae* Ill.) — I. Budapest, Péczel, M.-Berény. III. Rozsnyó. IV. Bártfa. V. Hátszeg, Nagy-Szeben, N.-Csür, Sz.-Régen. VI. N.-Bogsán (Lokája).

382. *ochripes* Curt. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Szeged, Derékegyháza Nagy-Várad. II. Zircz, Boglár, Zákány. IV. Czigánd, Tokaj, N.-Bocskó. V. Hosszufalu, Prázsmár, Segesvár.

v. *cruciata* Ws. — VI. Resicza, Herkulesfürdő.

383. *tetrastigma* Com. — IV. Torna. V. N.-Szeben.

384. *flexuosa* Ill. — V. Szt-Erzsébet, Holczmány, Brassó (Czenk), Segesvár, Sz.-Régen.

385. *sinuata* Steph. — III. Javorina. IV. Bártfa, Varannó. V. Hátszeg, N.-Csür, Fogaras, Brassó, Segesvár.

386. *lativittata* Kutsch. — IV. Velejte. (Leg. Dr. C. Chyzer.)

387. *undulata* Kutsch. — Frequens.

388. *vittula* Redtb. — Ut prior.

389. *nemorum* L. — Communis.

390. *atra* F. — In toto regno occurrit.

391. *cruciferae* Goeze. — I. Budapest, Péczel, Nyiregyháza, Kalocsa, Szeged, Csongrád. III. Trencsén, Koritnyicza. IV. Czigánd, K.-Majtény. V. Tasnád, Holczmány, Gyeke. VI. Grebenácz.

392. *aerea* All. — I. Montes Biharenses. (Leg. J. Frivaldszky.)

393. *diademata* Foudr. — I. Kalocsa. (Leg. F. Speiser.)

394. *nodicornis* Marsh. — I. Budapest, Kalocsa, Nyiregyháza. III. Trencsén. V. Sz.-Ujvár.

395. *procera* Redtb. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Szeged. II. Szegzárd. III. Tátrafüred. V. Nagy-Szeben.

396. *nigripes* F. — I. Budapest, Kalocsa. II. Vilonya. III. Trencsén. V. N.-Csür, M.-Záh. VI. Herkulesfürdő.

Aphthona Chevr.

397. *cyparissiae* Koch. — I. Budapest, Péczel, Gödöllő, Kalocsa, Debreczen, Nagy-Várad. II. Z.-Tapolcza, M.-Peterd, Pécs. III. Szliács, Trencsén. IV. Páczin. V. Oecsém, Segesvár. VI. Grebenácz, Oravicza, Herkulesfürdő.

398. *abdominalis* Duft. — I. Budapest, Horgos, Szőreg, Derékegyháza, M.-Berény. IV. Alsó-Bereczki. V. Hátszeg.

399. *pallida* Bach. — I. Budapest. IV. Bártfa. V. N.-Csür, Brassó (Czenk).

400. *lutescens* Gyll. — I. Budapest, Haraszti, Szeged, Derékegyháza. IV. Torna, A.-Bereczki, Szőllőske, Tokaj. V. Tasnád.

401. *pseudacori* Marsh. — I. Budapest, Kalocsa, N.-Várad. III. Trencsén. IV. Bártfa. V. N.-Csür, Marpód.

402. *venustula* Kutsch. *(euphorbiae* All.) — I. Budapest, Péczel, Parád, Kalocsa, Derékegyháza, H.-Vásárhely. IV. M.-Sziget. V. Hátszeg, N.-Szeben, Præsbe, Fenyőfalva.

403. *pygmaea* Kutsch. — I. Budapest, Szt-Endre, M.-Kála, Kalocsa. III. Agárd. IV. N.-Mihály, Sztropkó, Mons Szinnaikő. V. S.-Ujlak. VI. N.-Bogsán, Resicza, Herkulesfürdő.

v. *nigella* Kutsch. — IV. Mons Szinnaikő. (Leg. Dr. C. Chyzer.)

404. *cyanella* Redtb. *(atrocoerulea* All.) — I. Budapest, Péczel, Parád, Csongrád, Debreczen. II. Boglár. III. Szliács. V. N.-Csür, Fenyőfalva, Marpód.

405. *coerulea* Fourc. *(nonstriata* Harold). — I. Budapest, Mons Pilis, Kalocsa, Hajós, Csongrád, Szentes, N.-Várad. II. Zircz, Pécs. IV. Szőllőske, S.-A.-Ujhely. V. Tasnád, N.-Szeben, Sz.-Ujfalu, N.-Csür, Marpód, Sz.-Régen. VI. Báziás.

406. *euphorbiae* Schrank *(hilaris* All.) — I. Budapest, Péczel, Keczel, Debreczen, Rév. III. Thurzófüred. IV. Torna, Mons Szinnaikő, Tokaj. V. Nagy-Csür, Præsbe, Sz.-Magyaros, Segesvár. VI. Szekul, Herkulesfürdő.

407. *semicyanea* All. — I. Budapest, Makó. IV. Tállya.

408. *ovata* Foudr. *(euphorbiae* Redtb.) — III. Trencsén. V. Prázsmár.

409. *atrovirens* Först. — I. Budapest. III. Trencsén. IV. Kőrösmező.

410. *atratula* All. — V. Brassó. (Bielz, 27, p. 103.)

411. *herbigrada* Curt. — I. Budapest. III. Kis-Kálna. V. Ad balneum Gyögy, Segesvár, Mons Büdös.

412. *lacertosa* Rosenh. — I. Budapest, Péczel, Hajós, N.-Várad. II. Zircz, Pécs. III. Trencsén. IV. Torna, Tolcsva, Homonna. V. Frequens. VI. Grebenácz, Báziás, Herkulesfürdő, Rumunyest.

Longitarsus Latr.

413. *echii* Koch. — I. Budapest, Péczel, M.-Berény. V. N.-Szeben, K.-Torony, Sz.-Régen, Gyeke. VI. Ulma.

v. *coerulescens* Ws. — I. Budapest. (Legit J. Frivaldszky.)

v. *dimidiatus* All. — VI. Resicza. (Legit E. Merkl.)

414. *Linnaei* Duft. — VI. N.-Bogsán : Lokája. (Leg. E. Bodemeyer.)

v. *fallax* Weise. — VI. Teste Merkl (Auctor, 391, p. 929.).

415. *aeneus* Kutsch. — IV. Tolcsva. (Leg. Dr. C. Chyzer.)

416. *anchusae* Payk. *(ater* Laich.) — I. Budapest, Kalocsa. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely. V. Hátszeg, Sz.-Ujfalu, Vallis Lotrióra, Medgyes, Segesvár, M.-Záh. VI. Herkulesfürdő. VII. Diakovár.

v. *punctatissimus* Foudr. — Simul cum stirpe.

417. *pulex* Schrank. — I. Budapest. IV. Tolcsva.

418. *obliteratus* Rosenh. — I. Budapest. II. Piszke.

419. *niger* Koch. — I. Budapest. III. Tátrafüred. IV. S.-A.-Ujhely, Tolcsva. V. N.-Szeben. VI. Resicza.

420. *rectilineatus* Foudr. — I. Budapest. (Weise, 391, p. 941.)

421. *parvulus* Payk. — I. Budapest, Kalocsa. II. Boglár. III. Beszterczebánya, T.-Szt-Márton. IV. S.-A.-Ujhely. V. Peér, Hátszeg, N.-Csür.

422. *holsaticus* L. — I. Budapest, Haraszti, Péczel, Kalocsa, M.-Berény. IV. Torna, Bártfa, Tolcsva, N.-Mihály, Varannó. V. N.-Szeben, Holczmány.

423. *quadriguttatus* Pomtopp. — III. Szliács. IV. M.-Laborcz. V. Brassó, Segesvár.

424. *apicalis* Beck. — I. Budapest. III. Trencsén. IV. Torna, Bártfa, Ladomér, Luhi. V. N.-Csür, Vallis Lotrióra, Héviz, Oláhfalu.

425. *brunneus* Duft. — I. Montes Biharenses. IV. Mons Pietrosz. V. Montes Retyezát, Nagy-Szeben.

426. *rubellus* Foudr. *(gravidulus* Kutsch.) — IV. Montes Rabaszkala, Hoverla et Pietrosz. VI. Herkulesfürdő. VII. Zágráb.

427. *luridus* Scop. — Frequens.

v. *nigricans* Ws. — I. Budapest. VI. N.-Bogsán.

v. *cognatus* Ws. — V. Mons Czenk, Deés.

v. *4—signatus* Duft. — I. Budapest, N.-Várad. V. N.-Csür, Felső-Venicze.

428. *pallidicornis* Kutsch. — IV. Mons Pietrosz (Reitter, 295, p. 62.)

429. *minusculus* Foud. — I. Budapest (Leg. J. Frivaldszky.)

430. *lateripunctatus* Rosh. — I. Budapest. VI. Herkulesfürdő.

v. *personatus* Ws. — Simul cum stirpe.

431. *nasturtii* F. — I. Budapest. II. Duna-Örs. IV. Bártfa, Czigánd. V. Nagy-Szeben, Sz.-Sebes, Fogaras, Brassó.

432. *suturalis* Marsh. — I. Budapest, Péczel. II. Zircz. IV. Homonna. V. Tasnád, N.-Csür, Fenyőfalva, Sz.-Régen. VI. Herkulesfürdő.

433. *atricillus* L. — I. Budapest, Nyiregyháza, M.-Berény. IV. Bártfa.

v. *declivis* Ws. — I. Budapest (Leg. J. Frivaldszky.)

434. *suturellus* Duft. — I. Budapest, Péczel, Peszér, Csongrád, N.-Várad. III. Koritnyicza. IV. S.-A.-Ujhely, Homonna, M.-Sziget, Mons Pietrosz. V. Kolozsvár, Vallis Lotrióra, Montes Kerczenses. VI. Gombos, N.-Bogsán, Báziás, Herkulesfürdő. VII. Ljeskovac.

v. *paludosus* Ws. — I. Peszér. IV. Bártfa, M.-Sziget, Hoverla.

435. *piciceps* Steph. — IV. Királyháza. V. N.-Csür, Medgyes.

436. *viduus* All. — V. N.-Szeben, N.-Csür.

v. *discolor* Ws. — V. Nagy-Szeben, Nagy-Csür. VI. N.-Bogsán.

437. *curtus* All. — I. Budapest, M.-Kovácsháza. V. Gyeke. VI. Herkulesfürdő.

v. *monticola* Kutsch. — I. Budapest, Kalocsa. IV. Vallis Lazescsina (Com. Marmaros.)

438. *melanocephalus* Deg. *(atricapillus* Duft.) — I. Budapest, Szeged. III. Trencsén. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely, S.-Patak. V. Szucság, Hátszeg, Nagy-Szeben, Montes Cibinenses, Brassó. VI. Resicza.

439. *longipennis* Kutsch. — I. Beél. IV. Torna. VII. Velebit.

440. *exoletus* L. — III. Zsolna. IV. Tokaj. V. Nagy-Szeben.

441. *pectoralis* Foudr. — V. Hátszeg, N.-Szeben, Montes Kerczenses, Mező-Záh. VI. Resicza, Herkulesfürdő.

442. *verbasci* Panz. *(tabidus* Waterh.) — I. Budapest, Debreczen. IV. Torna. V. Tasnád, Nagy-Szeben, Holczmány, Fogaras, Medgyes, Segesvár.

443. *lateralis* Ill. — III. Trencsén. IV. Jászó. VI. Herkulesfürdő.

444. *lycopi* Foudr. *(abdominalis* All.) — I. Budapest, Szentes, M.-Kovácsháza. II. Zircz, Pécs. IV. Torna, Tolcsva. VI. N.-Bogsán, Herkulesfürdő.

445. *pratensis* Panz. *(pusillus* Gyll.) — I. Budapest, Péczel, Nyiregyháza, N.-Várad. IV. Bártfa. V. N.-Szeben, Vidombák, Sz.-Régen. VI. Uj-Moldova, Herkulesfürdő.

v. *collaris* Steph. — I. Budapest, Tolcsva. II. N.-Gencs.

446. *ballotae* Marsh. — I. Budapest, Szeged. II. Nagy-Gencs, Pécs. IV. S.-Patak, Lelesz, Nagy-Mihály, M.-Laborcz, Mons Szinnaikő.

447. *juncicola* Foudr. — I. Budapest. (Leg. J. Frivaldszky.)

448. *tabidus* F. *(jacobaeae* Waterh.) — I. Budapest. III. Trencsén. IV. Szőllőske, Szerencs. V. Kolozsvár, N.-Szeben, N.-Csür, Fogaras, Medgyes, Segesvár, Sz.-Régen.

449. *aeruginosus* Foudr. — V. Kolozsvár, Kis-Torony.

450. *succineus* Foudr. — V. Kolozsvár, N.-Csür.

451. *rubiginosus* Foudr. — IV. Bártfa. V. Nagy-Csür.

452. *ochroleucus* Marsh. — I. Montes Biharenses. IV. S.-A.-Ujhely, Szomotor. V. Nagy-Szeben, Segesvár.

453. *pellucidus* Foudr. — I. Budapest, Szeged. III. Szliács, Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely. V. Szamosfalva, N.-Csür, Holczmány, Medgyes. VI. Orsova, Herkulesfürdő. VII. Zágráb, Podsused.

454. *albineus* Foudr. — I. Budapest. (Leg. J. Frivaldszky.)

455. *canescens* Foudr. — II. N.-Vázsony, Zircz. IV. Com. Marmaros. V. N.-Szeben. VI. Báziás.

456. *vitreus* Kutsch. — Pécs. (Leg A. Viertl; Weise, 391, p. 992.)
457. *ordinatus* Foudr. — II. N.-Vázsony. (Leg. M. Hopffgarten.)
458. *nanus* Foudr. — I. Kalocsa. (Leg. F. Speiser, 349, p. 58.)
459. *Apfelbecki* Ws. — VII. Zágráb. (Detexit V. Apfelbeck.)

Dibolia Latr.

460. *femoralis* Redtb. — I. Kalocsa. II. Vilonya. III. Trencsén. IV. Torna, Tokaj, Nagy-Mihály. V. M.-Záh.
461. *occultans* Koch. — I. Mons Pilis, Kalocsa. IV. Szinna, Ungvár. V. N.-Szeben.
462. *Försteri* Bach. — I. Mons Pilis. VI. Grebenácz.
463. *depressiuscula* Letzn. — I. Budapest. IV. Luhi. V. Hátszeg, Fenyőfalva.
464. *cynoglossi* Koch. — I. Budapest, Derékegyháza. II. Ács. V. Ad balneum Gyógy, Nagy-Szeben, N.-Csür, Szelindek, Sz.-Régen.
465. *rugulosa* Redtb. — I. Budapest. II. N.-Vázsony. V. Nagy-Szeben, K.-Torony. VI. Jeselnicza, Herkulesfürdő.
466. *Schillingi* Letzn. — I. Budapest, Péczel. II. Z.-Tapolcza. IV. Tállya. V. Hátszeg, N.-Csür, Szelindek. VI. Orsova, Herkulesfürdő.
467. *timida* Ill. — I. Budapest. VI. Herkulesfürdő.
468. *orientalis* Ws. — Hungaria mer. (Auctor, 391, p. 1029.)
469. *carpathica* Weise. — IV. Com. Marmaros. V. N.-Szeben.

Apteropoda Chevrol.

470. *globosa* Ill. — V. N.-Csür. VIII. Fiume.
471. *orbiculata* Marsh. — III. Com. Árva. V. Kercz. VI. Herkulesfürdő.

Mniophila Steph.

472. *muscorum* Koch. — I. Mons Oncsásza. III. Trencsén, Koritnyicza, Jeraba, Tátrafüred. IV. Montes Vihorlat, Szinnaikő et Rabaszkala, Olyka, M.-Sziget, Kőrösmező, Luhi. V. Vallis Zsil, Montes Cibinenses et Kerczenses, Segesvár. VI. Herkulesfürdő.

Sphaeroderma Steph.

473. *testaceum* F. — III. Trencsén, Koritnyicza. IV. Luhi. V. Sz.-Sebes, Felek.
474. *rubidum* Graëlls. — VIII. Fiume. (Leg. J. Pável.)
475. *cardui* Gyll. — I. Budapest, Kalocsa. II. Keszthely, Szinna. V. Sz.-Sebes, Felek, Mons Keresztényhavas, Brassó, Deés.

Argopus Fisch.

476. *bicolor* Fisch. — I. Kalocsa, Hajós. II. Pécs. III. V.-Mikola. V. Tasnád, Kolozsvár. VI. Grebenácz.
477. *nigritarsis* Gebl. — I. Budapest. (Leg. J. Frivaldszky.)
478. *Ahrensi* Germ. — I. Budapest, Kalocsa. II. Z.-Tapolcza. III. Beczkó. IV. S.-A.-Ujhely, Homonna. V. N.-Csür, N.-Szeben, K.-Disznód, K.-Torony. Brassó, Sz.-Régen.

Hispa L.

479. *atra* L. — In toto regno occurrit.

Cassida L.

480. *viridis* L. — Frequens.
481. *canaliculata* Laich. (*austriaca* F.) — I. Budapest, Péczel, N.-Várad. II. Pécs. III. Beszterczebánya. V. Kolozsvár, M.-Záh, Sz.-Sebes. VI. Ulma, Herkulesfürdő.
482. *fastuosa* Schall. (*vittata* F.) — I. Budapest, Peszér, Kalocsa, Hajós, Makó, Nagy-Várad. II. Pécs. V. Hátszeg, Nagy-Szeben, Sz.-Sebes, Nagy-Disznód, Fenyőfalva, Kercz, Sz.-Régen. VI. Ulma, Herkulesfürdő. VII. Eszék.
483. *murraea* L. — Frequens.
v. *maculata* L. — I. Kalocsa. (Leg. F. Speiser.)
484. *sanguinosa* Suffr. — V. Hátszeg, Holczmány, Szász-Régen, M.-Vásárhely, Gyeke. M.-Záh. VI. Oravicza.
485. *rubiginosa* Müll. — Frequens.
486. *vibex* L. (*liriophora* Kirby). — Frequens.
v. *pannonica* Suffr. — I. Budapest, Debreczen, N.-Várad. II. Keszthely. V. Szt-Erzsébet, Zajzon, Deés. VI. Báziás, Oravicza.
487. *ferruginea* Goeze (*thoracica* Fourc.) — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. IV. Varannó, Ungvár, Mons Hoverla. V. Hátszeg, N.-Szeben, N.-Csür, Fenyőfalva, Fogaras, Előpatak, Segesvár, Sz.-Régen. VI. Jeselnicza, Herkulesfürdő.
488. *deflorata* Suffr. — I. Budapest. V. N.-Szeben.
489. *inquinata* Brull. — I. N.-Várad. VI. Resicza.
490. *chloris* Suffr. — I. Budapest, Péczel, Parád, M.-Berény, Debreczen, N.-Várad. III. Szliács, Hermánd. IV. S.-A.-Ujhely. V. Kolozsvár, Nagy-Szeben, Zajzon, Segesvár. VI. Jeselnicza.
491. *stigmatica* Suffr. — I. Hajós, B.-Csaba, Nagy-Várad. II. Iványi. III. Trencsén. V. N.-Szeben, K.-Ápold, Gy.-Tölgyes, M.-Vásárhely, Gyeke. VI. Báziás.
492. *rufovirens* Suffr. — III. Beszterczebánya. V. N.-Szeben, N.-Csür, Fenyőfalva.
493. *denticollis* Suffr. — I. Kalocsa. II. Komárom. V. Malomviz.

494. *rosea* Boh. — I. B.-Csaba. IV. Kassa.
495. *sanguinolenta* Müll. — Frequens.
496. *ornata* Creutz. — I. Budapest, Hajós, Nagy-Várad. V. N.-Csür. VI. Dognácska.
v. *lucida* Suffr. — III. Beszterczebánya. V. Prázsmár.
497. *lineola* Creutz. — I. Budapest, Péczel, Dabas, Peszér. VI. Grebenácz.
498. *nebulosa* L. — Communis.
499. *subferruginea* Schrank. — Ut prior.
500. *flaveola* Thunb. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. IV. M.-Sziget. V. Hátszeg, N.-Szeben, Szt-Erzsébet, N.-Csür, Brassó, Zajzon, Szász-Régen.
501. *berolinensis* Suffr. — I. Budapest, Péczel. II. Komárom.
502. *atrata* F. — I. Budapest, Péczel, Hajós, Nagy-Várad. II. Z.-Tapolcza. III. Rozsnyó. IV. Runyina. V. Hátszeg, N.-Szeben, Szt-Erzsébet, N.-Csür.
503. *vittata* Villers. — I. Péczel, Kalocsa. IV. Mernyik. V. N.-Szeben, Sz.-Régen.
504. *nobilis* L. — Communis.
v. *viridula* Payk. — II. Komárom, Keszthely.
505. *margaritacea* Schall. — I. Budapest, Péczel, Peszér, Keczel, N.-Várad. V. Hátszeg, Nagy-Szeben, K.-Talmács, Holczmány. VI. Jeselnicza, Herkulesfürdő.
506. *subreticulata* Suffr. — I. Budapest, Peszér, Keczel. II. Pécs. IV. N.-Mihály, Hátszeg, Nagy-Szeben, Sz.-Ujfalu, Holczmány, K.-Torony.
v. *splendidula* Suffr. — I. Budapest. VI. Jeselnicza, Herkulesfürdő.
507. *hemisphaerica* Herbst. — I. Budapest, Péczel, Peszér, Hajós, Nagy-Várad. II. Z.-Tapolcza. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely. Varannó. V. N.-Szeben, N.-Csür, N.-Talmács, Segesvár.
508. *tincta* Ws. — Habitat etiam in Hungaria (Auctor, 389, p. 205.)

Fam. COCCINELLIDAE.

(PHYTOPHAGAE.)

Epilachna Redtb.

1. *chrysomelina* F. — III. Beczkó. (Leg. Dr. C. Brancsik, 40, p. 47.)
2. *Argus* Fourc. — I. Budapest, Vácz, Parád. IV. S.-A.-Ujhely, Gálszécs.

Subcoccinella Huber.

3. *24—punctata* L. — Communis.
v. *meridionalis* Motsch. — I. Budapest, Dabas, Kalocsa, Szentes, Debreczen, N.-Várad. IV. S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Mád, Varannó. V. Brassó (Czenk), Zajzon. VII. Mons Sveto-Brdo.

Cynegetis Redtb.

4. *impunctata* L. (*aptera* Payk.) — I. Budapest, Kalocsa, Debreczen, N.-Várad. II. Pécs. III. Putnok. IV. S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Szinna, Velejte. V. Hátszeg, N.-Szeben, Sz.-Ujfalu, Vallis Czód, Brassó, Segesvár. VI. Temesvár.
v. *palustris* Redtb. — I. Kalocsa, B.-Csaba, N.-Várad. II. Pécs. V. K.-Torony.

(APHIDIPHAGAE.)

Hippodamia Muls.

5. *tredecimpunctata* L. — Frequens.
v. *signata* Fald. — I. Budapest. (Leg. D. Kuthy.)
6. *7—maculata* Deg. — II. Pécs. III. Trencsén. V. Sz.-Ujfalu, Fenyőfalva, Brassó.
v. *rubra* Ws. — In montibus Carpathicis (Auctor, 383, p. 12.)

Adonia Muls.

7. *variegata* Goeze (*mutabilis* Scriba). — Communis.
v. *immaculata* Gmel. — I. Budapest, Péczel.
v. *quinquemaculata* F. — V. N.-Szeben. (Leg. A. Ormay, 264, p. 51.)
v. *constellata* Laich. — I. Budapest, Szeged. II.-Vásárhely, Szentes, Szegvár, Derékegyháza. II. Keszthely. III. Koritnyicza. V. N.-Szeben, Montes Kerczenses, Brassó, Montes Bodzaenses.
v. *carpini* Fourc. (*biconstellata* Sajó). — I. Budapest, Veresegyháza, Szeged. II. Keszthely. IV. Homonna. V. N.-Szeben. VI. Oravicza. VII. Zimony, Mons Sveto-Brdo.
v. *neglecta* Ws. — I. Budapest, Kalocsa. V. Brassó, B.-Nyires, M.-Sámsond.
v. *ustulata* Ws. (*confluens* Sajó). — I. Veresegyháza. VI. N.-Bogsán.
v. *maculigera* Ws. — V. Nagy-Szeben. (Leg. A. Ormay, 264, p. 51.)

Anisosticta Duponch.

8. *19—punctata* L. — I. Budapest, Kalocsa, Nyiregyháza. II. Duna-Örs. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj, Erdőbénye, Luhi. V. Nagy-Szeben, N.-Csür, Kőhalom, Brassó, Fenyőfalva, Bölön, Deés, Gyeke, M.-Záh.
9. *strigata* Thunb. v. *Dohrniana* Muls. — Solum Hungariam incolit (Weise, 383, p. 15.)

Semiadalia Crotch.

10. *notata* Laich. — III. Vallis Bretkovicza (Com. Liptó). V. Sz.-Ujfalu, Porcsesd, Borszék.

11. *undecimnotata* Schneid. — I. Budapest, Kalocsa. II. Keszthely, IV. Varannó. V. Vörös-torony, N.-Szeben, Brassó, Rosnyó.

v. *graminis* Ws. *(bipunctata* et *hungarica* Sajó). — I. Kis-Szt-Miklós. (Leg. C. Sajó, 335, p. 273.)

v. *novempunctata* Fourc. — I. Debreczen. V. Nagy-Szeben, Medgyes, Barót, Borszék, Gyeke, B.-Nyires.

Adalia Muls.

12. *obliterata* L. — III. Hermánd, Trencsén, Á.-Váralja, Tátrafüred. IV. Homonna. V. Præsbe, Montes Kereszténvhavas et Nagykőhavas, Brassó, Prázsmár.

v. *livida* Deg. — V. Præsbe, Mons Sánta, Brassó.

v. *sexnotata* Thunb. — III. Tátrafüred. V. Montes Sánta et Kereszténvhavas.

13. *bothnica* Payk. — III. Zsolna, Tátrafüred. V. N.-Szeben.

v. *decas* Beck. — III. Tátrafüred. (Leg. J. Frivaldszky.)

v. *encausta* Ws. — Ut prior.

14. *bipunctata* L. — Communis.

v. *Herbsti* Ws. — V. Montes Bodzaenses (246, p. 287.)

v. *unifasciata* F. — V. Brassó: Czenk. (Leg. F. Deubel; Méhely, 245, p. 239.)

v. *annulata* L. — I. Budapest, Péczel. IV. S.-A.-Ujhely. V. Montes Kerczenses.

v. *pantherina* L. — I. Ujpest. V. Brassó.

v. *semirubra* Ws. — I. Budapest. (Leg. F. Cerva.)

v. *6-pustulata* L. — I. Budapest, Péczel, Nagy-Várad. IV. Mons Hoverla. V. Brassó (Czenk). VI. Grebenácz, Krassova.

v. *4-maculata* Scop. — I. Budapest, Szeged. II. Pécs. IV. Homonna. V. Brassó (Czenk), Besztercze, Medgyes, Deés.

v. *sublunata* Ws. — I. Kalocsa. (Leg. F. Speiser, 349, p. 59.)

v. *lugubris* Ws. — Ut prior.

15. *alpina* Villa. — III. Beszterczebánya, Kézsmárk. V. Montes Felekenses, Segesvár, Oláhfalu.

16. *Revelierei* Muls. — V. Brassó: Mons Czenk. (Leg. L. Méhely, 247, p. 196.)

Coccinella L.

17. *7-punctata* L. — Communis.

18. *5-punctata* Muls. — I. Kalocsa. III. Trencsén, Koritnyicza, Tátrafüred. IV. Gálszécs, Varannó, M.-Sziget. V. Frequens.

v. *Rossii* Ws. — I. Kalocsa. VI. Karánsebes.

19. *undecimpunctata* L. — I. Budapest, Dabas. IV. Gercsely.

v. *tripunctata* L. — I. Peszér. IV. N.-Bocskó.

v. *novempunctata* L. — V. Medgyes. (Leg. C. Fuss.)

20. *distincta* Fald. v. *magnifica* Redtb. — I. Budapest, Debreczen, N.-Várad. IV. S.-A.-Ujhely. V. Porcsesd, Mons Szurul.

v. *domiduca* Ws. — V. Brassó. (Leg. L. Méhely, 247, p. 196.)

21. *hieroglyphica* L. v. *flexuosa* F. — V. Nagy-Szeben. (Leg. C. Fuss.)

22. *decempunctata* L. — Frequens.

v. *lutea* Rossi. — I. Debreczen. III. Koritnyicza.

v. *4-punctata* L. — I. Budapest, Kalocsa. II. Keszthely. IV. Ungvár. V. N.-Szeben. VI. Nagy-Bogsán.

v. *6-punctata* L. *(8-punctata* Müll., *13-maculata* Forst., *14-punctata* Müll.) — V. Nagy-Szeben, Brassó (Czenk), Mons Bucsecs. VI. Krassova.

v. *humeralis* Schall. — I. Budapest. IV. Gesztely, Szinna. V. N.-Szeben, Mons Sánta.

v. *austriaca* Schrank. — I. Budapest, Péczel.

v. *Scribae* Ws. — I. Ujpest, Keczel, Hajós.

v. *bimaculosa* Hbst. — V. Brassó: Csigahegy. (Leg. L. Méhely, 246, p. 288.)

v. *10-pustulata* L. — I. Budapest, Parád. V. Sz.-Ujvár, N.-Szeben, N.-Csür, Mons Kereszténvhavas, Brassó (Czenk).

v. *guttatopunctata* L. — I. Kalocsa, B.-Csaba, V. Montes Kerczenses, Brassó.

v. *bimaculata* Pont. *(bipustulata* Hbst.) — I. Budapest. III. T.-Szt-Márton. V. N.-Szeben, Montes Kerczenses, Brassó, Medgyes.

23. *4-punctata* Pont. *(marginepunctata* Schall.) — I. Budapest, Kalocsa. II. Z.-Tapolcza. IV. Nagy-Mihály. V. N.-Szeben, Fogaras. VI. N.-Bogsán.

v. *sordida* Ws. — I. Budapest, Ujpest.

24. *conglobata* L. — Communis.

v. *gemella* Hbst. — V. Brassó: Mons Czenk. (Leg. L. Méhely, 246, p. 288.)

v. *impustulata* L. — I. Budapest, Debreczen. III. Trencsén, S.-A.-Ujhely, A.-Bereczki, Rahó. V. Nagy-Csür, Brassó, Prázsmár, Medgyes, Segesvár, Besztercze, Deés.

v. *caucasica* Motsch. *(viridula* Hampe). — I. Péczel, Dabas, Peszér, Debreczen. V. Teste Bielz.

25. *14-pustulata* L. — Frequens.

26. *sinuatomarginata* Fald. — II. Pécs. V. N.-Csür. VI. Herkulesfürdő.
27. *lyncea* Ol. *(agnata* Rosh.) — I. Budapest. II. Pécs.
v. *12-pustulata* Ol. — Simul cum stirpe.

Bulaea Muls.

Lichatschovi Humm. *(19-notata* Gebl.) — Hungaria (Cat. Col. Eur., 1891, p. 388.)*

Micraspis Redtb.

28. *sedecimpunctata* L. v. *12-punctata* L. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. Keszthely. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely. V. Frequens. VI. Grebenácz, Herkulesfürdő.

Mysia Muls.

29. *oblongoguttata* L. — II. Z.-Tapolcza. III. Beszterczebánya, Hermánd, Tátrafüred. IV. Bártfa. V. Montes Surián et Sánta, Præsbe, K.-Talmács, Montes Felekenses, Mons Kereszténvhavas, Brassó.

Anatis Muls.

30. *ocellata* L. — III. Hermánd, Trencsén, T.-Szt-Márton, Koritnyicza, Tátrafüred. IV. Bártfa, Vallis Fajna. V. Kolozsvár, Borszék, N.-Szeben, Oecsém, Mons Szurul, Brassó.

Halyzia Muls.

31. *sedecimguttata* L. — Frequens.
32. *18-guttata* Poda. — I. Budapest, Kalocsa, B.-Csaba. II. Keszthely. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj, Erdőbénye, Szobráncz. V. Ad balneum Gyógy, Dobra, N.-Csür, Vöröstorony, Fogaras, Brassó, Segesvár. VI. N.-Bogsán, Herkulesfürdő.
33. *decemguttata* L. — I. Keczel. III. Tátrafüred. V. Brassó.
v. *imperfecta* Muls. — IV. N.-Bocskó. (Leg. V. Seyfert.)
34. *15-guttata* F. — I. Kalocsa. II. Keszthely. IV. M.-Sziget. V. Nagy-Szeben, Fogaras, Brassó, Medgyes, Segesvár, Sz.-Régen, Besztercze. IV. Herkulesfürdő.
35. *14-guttata* L. — Frequens.
36. *vigintiguttata* L. — IV. Nagy-Bocskó. V. Nagy-Szeben.
v. *tigrina* L. — III. Beszterczebánya, Hermánd, Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Mernyik. V. Fogaras, Brassó, Deés. VI. Herkulesfürdő.

* Teste Mulsant Russiam, Turciam, Persiam, Aegyptum et non Hungariam incolit. (261, p. 69.)

v. *Linnei* Ws. — V. N.-Szeben. (Leg. A. Ormay, 264, p. 51.)
37. *18-guttata* L. — I. Budapest. II. Z.-Tapolcza. III. Trencsén.
38. *22-punctata* L. — Frequens.
v. *27-punctata* Mot. V. Szucsák. (Leg. Dr. E. Daday.)
v. *20-punctata* F. —V. Brassó (Bielz, 27, p. 104.)
39. *14-punctata* L. *(conglobata* Ill.) — Communis.
v. *tetragonata* Laich. (*angularis* et *palustris* Sajó). — I. Budapest, Péczel, Kis-Szt-Miklós. II. Pécs. IV. N.-Bocskó. V. Besztercze. VI. Báziás, Ferenczfalva, Krassova, Oravicza.
v. *parumpunctata* Sajó. — I. K.-Szt-Miklós. V. Gyeke.
v. *conglomerata* F. *(Frivaldszkyi* Sajó). — I. Montes Biharenses. V. N.-Szeben, Besztercze.
v. *fimbriata* Sulz. — I. Budapest, Kalocsa, Derékegyháza, Nagy-Várad. IV. S.-A.-Ujhely, Homonna, Szobráncz. V. Nagy-Csür, Brassó (Czenk), Medgyes, Barót, Borszék, Gyeke, M.-Sámsond, Deés.

Chilocorus Leach.

40. *renipustulatus* Scriba *(similis* Har.) — I. Kalocsa. IV. Bártfa. V. Nagy-Szeben, N.-Csür, N.-Talmács, Prázsmár, Sz.-Régen.
41. *bipustulatus* L. — Frequens.

Exochomus Redtb.

42. *4-pustulatus* L. — In toto regno occurrit.
v. *distinctus* Brull. — I. Montes Biharenses. VI. Herkulesfürdő.
v. *floralis* Motsch. — I. Budapest. VI. Temesvár.
43. *flavipes* Thunb. — I. Budapest, Kalocsa, Nagy-Várad. II. Pécs. IV. S.-A.-Ujhely. V. Hátszeg, N.-Szeben, Sz.-Régen. VI. Grebenácz, Báziás, Resicza.
v. *collaris* Küst. — Hungaria (Auctor, 236, XXVII, 100.).

Platynaspis Redtb.

44. *luteorubra* Goeze. — Communis.

Oxynychus Lec.

45. *erythrocephalus* F. — I. Kun-Szent-Miklós, Hartyán, Veresegyháza, Hajós.

Hyperaspis Redtb.

46. *reppensis* Herst. — Frequens.
v. *femorata* Motsch. *(4-maculata* Redtb.) — I. Budapest, Kalocsa, N.-Várad. VI. Dognácska, Herkulesfürdő.

47. *campestris* Hbst. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, N.-Várad. II. Z.-Tapolcza. III. Trencsén. V. Déva, Hátszeg, N.-Szeben, M.-Záh. VI. N.-Bogsán, Herkulesfürdő.
v. *concolor* Suffr. — I. N.-Várad. IV. Sátoralja-Ujhely. V. Hátszeg, N.-Szeben. VI. Temesvár, Dognácska.

Coccidula Kug.

48. *scutellata* Hbst. — Communis.
49. *rufa* Hbst. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, N.-Várad. II. D.-Örs. III. Agárd, Beczkó. V. N.-Szeben, N.-Csür, Sz.-Hermány, M.-Záh.

Rhizobius Steph.

50. *litura* F. — I. Budapest, Péczel, Keczel. II. Pécs. III. Á.-Váralja. IV. M.-Sziget. V. Déva.

Scymnus Kug.

51. *ferrugatus* Moll. (*analis* F.) — I. Montes Biharenses. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely. V. Sz.-Ujvár, Nagy-Szeben, N.-Csür, K.-Torony, Brassó, Segesvár, Sz.-Régen.
52. *haemorrhoidalis* Hbst. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Szeged, Nyiregyháza. II. Pécs. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Rahó. V. Sz.-Ujvár, N.-Szeben, N.-Talmács, Brassó. VI. Herkulesfürdő.
53. *minimus* Rossi (*capitatus* F.) — I. Budapest, Péczel, Parád, Peszér, Kalocsa, Debreczen. II. Pécs. III. Beszterczebánya. IV. S.-A.-Ujhely, A.-Bereczki, Tolcsva. V. Hátszeg, N.-Szeben, Szent-Erzsébet, Prázsmár, Segesvár. VI. Herkulesfürdő. VII. Diakovár.
54. *subvillosus* Goeze (*fasciatus* Fourc.) — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Szeged, N.-Várad. II. Ács, Z.-Tapolcza, Pécs. IV. S.-A.-Ujhely, Tolcsva, N.-Bocskó. V. Hátszeg, Szt-Erzsébet, Segesvár, Gyeke. VI. Temesvár, Buziás, Német-Bogsán.
v. *pubescens* Panz. — V. Brassó: Mons Czenk. (Leg. L. Méhely, 247, p. 197.)
55. *globosus* Ws. — Hungaria (Auctor, 833, p. 71.).
v. *piceus* Ws. — In regione VII. (Auctor, 383, p. 72.)
56. *suturalis* Thunb. (*discoideus* Ill.) — I. Budapest, Péczel, Debreczen, N.-Várad. III. Tátrafüred. IV. S.-A.-Ujhely, Sáros-Patak, Terebes, Szinna. V. Nagy-Szeben, N.-Csür, N.-Talmács, Prázsmár. Segesvár. VI. Herkulesfürdő. VII Eszék.
57. *celer* Ws. (*ater* Kug.) — I. Budapest, Kalocsa. III. Trencsén. V. N.-Szeben. VI. Herkulesfürdő.
58. *arcuatus* Rossi. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, N.-Várad. VIII. Fiume.
v. *Hausmanni* Gr. — I. Kalocsa. (Legit F. Speiser.)
59. *punctillum* Ws. (*minimus* Payk.) — Frequens.
60. *ater* Thunb. (*nigrinus* Kug.) — I. Budapest. II. N.-Vázsony, Zircz. III. Trencsén. IV. Sátoralja-Ujhely, Homonna. V. N.-Csür, Medgyes, Szász-Régen. VI. Janova. VII. Diakovár.
61. *abietis* Payk. — II. Zircz. III. Trencsén, Koritnyicza. IV. Homonna, Cserna-Hóra. V. Montes Cibinenses et Kerczenses, Segesvár.
62. *rubromaculatus* Goeze. — Frequens.
63. *frontalis* F. — Communis.
v. *4-pustulatus* Hbst. — Simul cum stirpe.
v. *Suffriani* Ws. — I. Szeged. II. Pécs. VI. Herkulesfürdő.
v. *immaculatus* Suffr. — I. Montes Biharenses. (Fleischer, 89, p. 94.)
64. *Apetzi* Muls. — I. Budapest, Péczel. II. Pécs. III. Trencsén. IV. Mons Zsihovecz. V. Nagy-Szeben, Fenyőfalva, Brassó, Gyeke. VI. Herkulesfürdő. VII. Diakovár, Mons Sveto-Brdo.
65. *interruptus* Goeze. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. III. K.-Kálna, Trencsén, Putnok. IV. S.-Patak, Homonna, Nagy-Bocskó. V. Hátszeg, Nagy-Csür, Montes Kerczenses, Hosszufalu, Prázsmár. VI. Herkulesfürdő, Diakovár.
66. *pulchellus* Hbst. — I. Budapest, Kalocsa. IV. S.-A.-Ujhely Tolcsva, Ungvár. V. N.-Szeben, N.-Csür, K.-Ápold.
67. *bipunctatus* Kug. — I. Budapest, Péczel. II. Zircz. III. Trencsén. V. N.-Szeben.
68. *Redtenbacheri* Muls. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, N.-Várad. V. N.-Csür, Segesvár. VI. Palics. VII. Diakovár.

Conspectus familiarum, generum et specierum.

(Varietates, species dubiosæ et importatæ non sunt adnumeratæ.)

Familia	Genus	Species
1. Cicindelidæ	1	11
2. Carabidæ	88	593
3. Dytiscidæ	24	111
4. Gyrinidæ	3	11
5. Hydrophilidæ	26	117
6. Georyssidæ	1	4
7. Parnidæ	9	30
8. Heteroceridæ	1	16
9. Staphylinidæ	153	980
10. Micropeplidæ	1	5
11. Pselaphidæ	15	97
12. Clavigeridæ	1	3
13. Scydmænidæ	11	65
14. Silphidæ	29	98
15. Anisotomidæ	9	70
16. Eucinetidæ	1	2
17. Clambidæ	4	12
18. Sphæriidæ	1	1
19. Corylophidæ	6	17
20. Trichopterygidæ	7	34
21. Scaphidiidæ	4	8
22. Phalacridæ	3	22
23. Erotylidæ	6	17
24. Endomychidæ	14	26
25. Cryptophagidæ	15	100
26. Derodontidæ	1	1
27. Lathridiidæ	10	56
28. Tritomidæ	5	12
29. Nitidulidæ	23	143
30. Trogositidæ	6	8
31. Colydiidæ	20	33
32. Rhysodidæ	2	3
33. Cucujidæ	14	38
34. Trixagidæ	1	2
35. Dermestidæ	10	35
36. Cistelidæ	10	35
37. Thorictidæ	1	1
38. Histeridæ	18	85
39. Platyceridæ	6	6
40. Scarabaeidæ	47	191
41. Buprestidæ	19	105
42. Eucnemidæ	14	25
43. Elateridæ	24	147
44. Dascillidæ	8	16
45. Cantharidæ	61	168
46. Cleridæ	12	24
47. Bruchidæ	4	23
48. Byrrhidæ	17	54
49. Sphindidæ	2	4
50. Lyctidæ	1	3
51. Bostrychidæ	6	10
52. Ciidæ	6	41
53. Tenebrionidæ	39	95
54. Alleculidæ	8	26
55. Lagriidæ	2	3
56. Melandryidæ	12	36
57. Mordellidæ	9	42
58. Rhipiphoridæ	4	4
59. Meloidæ	12	41
60. Pyrochroidæ	1	3
61. Anthicidæ	9	34
62. Oedemeridæ	10	32
63. Pythidæ	5	12
64. Curculionidæ	123	1060
65. Nemonychidæ	3	3
66. Anthribidæ	8	24
67. Mylabridæ	2	33
68. Brentidæ	1	1
69. Scolytidæ	23	75
70. Cerambycidæ	80	224
71. Chrysomelidæ	68	508
72. Coccinellidæ	22	68
	1222	6043

Summa

Familiarum	72
Generum	1222
Specierum	6043

INDEX GENERUM.

Corrigenda.

Pag. 12 Col. 2 Nr. Pro Daptus vittatus Fisch. lege *D. pictus* Fisch.

« 14 « 1 « 18 Bielz leg. Bielz.

« 14 « 2 « 48 Brissout leg. Brisout.

« 16 « 1 « 142 Ganglb. Cerambycidæ. Verhandl. der zool.-bot. Gesellsch. in Wien, 1883, Bd. XXIII, pag. 437, recte *1882, Bd. XXXI, p. 681; 1883 Bd. XXXIII, p. 437.*

« 22 « 1 « 10 Carabus violaceus L. var. cyaneolimbatus Kr. pertinet ad var. *Méhelyi* Ganglb.

« 24 « 2 « 37 VI. Mons Pietrosz recte IV. Mons Pietrosz.

« 24 « 2 « 46 Carlopago recte VIII. Carlopago etc.

« 25 « 1 « 55 Nebria livida L. *et in regione* V.

« 33 « 2 « 341 Montes Cibinenses recte V. Montes Cibinenses etc.

« 55 « 2 Falagria lævigata Epp. adnotatio asteristica subtus delenda.

« 97 « 1 Rizophagus Hbst. leg. *Rhizophagus.*

« 104 « 1 « 73 Pro Onthophilus globulosus Oliv. leg. *sulcatus* F.

« 113 « 1 « 71 Agrilus viridis L. v. novicius Ratzb. leg. v. *nocivus* Ratzb.

« 124 « 1 « 141 Ut prior, recte *Communis.*

« 153 « 2 « 453 Virovica leg. *Virovitica.*

« 161 « 2 « 735 Pro Ceuthorrhynch. parvulus Bris leg. *C. similis* Bris.

« 173 « 1 « 25 Gillebeau leg. Guillebeau.

« 180 « 2 « 160 Morimus funereus Muls. *et in regione V.*

« 184 « 1 « 33 V. Német-Bogsán recte VI. Német-Bogsán etc.

Emanserunt.

« 27 « 1 Ante genus Bembidion:

Limnaeum Steph.

Kočae Reitt. — VII. Jankovač. (Auctor, Wiener Ent. Zeit., 1895, p. 199.)

Pag. 33 Col. 2 Nr. *Pterostichus incommodus* Schaum. I. Budapest. (Legit F. Wachsmann; prope *hungaricus* Dej.)

« 79 « 2 Ante gen. Apropeus:

Spelaeodromus Reitt.

Pluto Reitt. — VII. Velebit.

« 98 « 1 Ante gen. Endophlœus:

Xylolaemus Redtb.

fasciculosus Gyll. — VI. Herkulesfürdő. (Annal Hof-Mus. Wien, 1895, Bd. XI, Heft 1.)

« 124 « 2 *Danacaea hypoleuca* Kiesw. — II. Pápa. VI. Teste Reitter (pr. *D. marginata* Küst.).

« 132 « 2 *Mycetochara sulcipennis* Reitt. — IV. Comit. Marmaros. (Wiener Ent. Zeit. 1876, p. 76; pr. *M. axillaris* Payk.)

« 163 « 1 *Anthonomus inversus* Bed. (*cinctus* Thoms.) — I. Budapest, Péczel, M.-Kovácsháza. II. Pécs. (Pr. *A cinctus* Kollar.)

Delenda.

« 29 « 2 « 206 *Trechus parengensis* Ganglb. nom. in litt.

« 132 « 1 « 90 *Helops lanipes* L. secundum Seidlitz Galliam, Italiam et Germaniam incolit, specimina hungarica pertinent ad speciem *incurvus* Küst.

« 148 « 1 « 293 *Sitona lineellus* Bonsd. Hungariam non inhabitat.

« 160 « 2 « 687 *Ceuthorrhynchus Ragusae* Bris. in Hungaria nondum inventa.

Ordo. HYMENOPTERA.

Auctore Alexandro Mocsáry.

Magyarország hártyásszárnyú rovarainak faunája a legújabb időkig csaknem egészen ismeretlen volt. A külföld hírneves íróinak munkáiban nagyon kevés adatot találunk, mert nem volt, ki hazánk ez érdekes állatait velök megismertette volna.

Első, ki a hártyásszárnyú rovarok rendjéből Magyarországra vonatkozó adatokat is említ, Scopoli J. A. tiroli eredetű selmeczi akadémiai, később páviai egyetemi tanár volt, ki életéből tíz évet (1766—1776) mint a chémia és növénytan tanára Selmeczen töltvén, Hymenopterákat is gyüjtött, s ezeket munkáiban (1770—1772) megismertette (11 faj). Ez adatokat a német születésű Christ jeles munkájában (1791) fölvette s még hat újabb adattal meg is toldotta. Sajnos, hogy ez állatok egy részét fölismerni nem lehet, s neveik a tudományra nézve elvesztek.

Fabricius «Systema Piezatorum» (1804) című munkájában csupán három fajt említ föl Magyarországból, Germar pedig (1817) tizenhetet Fiume vidékéről. A legtöbb magyarországi adattal még Klug dolgozataiban (1808—1818) találkozunk, ki a berlini múzeum gyüjteményéből leírt magyar eredetű levél- és fadarázsokat Dahl bécsi rovarkereskedőtől kapta; szintén elég számos Ichneumonidát (36 faj), ugyancsak jobbára Dahl adatai nyomán, Gravenhorst (1829) ismertetett meg.

Ez időtől fogva hazánkra vonatkozólag a külföld irodalmában alig találunk egyes elszórt adatokat egész Wesmael-ig (1844—57) és Dahlbom-ig (1845—54), kik szintén írtak le nehány fajt Magyarországból.

1851-ben Frivaldszky János küldött ki magyarországi és kisázsiai Hymenopterákat Tischbein-nak és Förster-nek meghatározás végett, kik ez adatokat dolgozataikban megemlítették és az új fajokat leírták.

A legelső terjedelmesebb ismertetéseket Mayr Gusztáv, akkori pesti főreáliskolai, most nyugalmazott bécsi tanár írta 1856. és 1857-ben a magyar-

Fauna Hungariæ hymenopterologica ad novissima usque tempora fere incognita delituit. Apud celeberrimos auctores exteros raro inveniuntur indicia hungarica, cum non esset, qui eos de memorabilibus his patriæ nostræ thesauris edoceret.

Primus, qui de Insectis ex Hungaria ortis mentionem facit, J. A. Scopoli, origine tirolensis, primum in Academia Selmecziensi, dein in Universitate Papiensi professor. Is decem vitæ annos (1766—1776) in urbe Selmecz chimiam et botanicam professus, præter alia etiam Hymenoptera collegit, quæ deinde in operibus suis (1770—1772) divulgavit (11 species). Easdem species complexus est Christ, origine germanus, earumque numerum sex aliis auxit. Dolendum sane, horum Insectorum partem agnosci non posse ac nudis nominibus designari.

In Systemate Piezatorum (1804) Fabricius tres solummodo species enumerat Hungariæ incolas, E. F. Germar vero (1817) septendecim e regione fiumana. Plurima, si in tanta indiciorum paucitate ea voce uti licet, invenies in elucubrationibus Klugii (1808—1818), qui Tenthredinidas et Siricidas ex musæo berolinensi descriptas a Dahlio, mercatore Insectorum viennensi acceperat; Ichneumonidas sat multas (36 species) maximam partem ab eodem Dahlio subministratas J. L. C. Gravenhorst typis evulgavit.

Ab eo tempore usque ad Wesmael (1844—1857) et Dahlbom (1845—1854) vix sparsa quædam indicia faunæ hungaricæ invenias apud scriptores exteros. Auctores modo commemorati aliquot species hungaricas descripserunt.

Anno 1851. Joannes Frivaldszky Hymenoptera in Hungaria et Asia minore lecta transmisit Tischbeinio et Förstero, ut ea nominibus insignirent, qui eadem in suis elucubrationibus commemorarunt et, quæ novæ erant species descripserunt.

Primus, qui ampliore tractatu res hungaricas complexus est, fuit Gustavus Mayr, tunc temporis in schola reali maiore Budapestini, dein Viennæ

országi hangyákról, melyet 1868-ban Frivaldszky János magyar nyelven is megismertetett.

Néhány magyarországi új fajt Kovács Gyula dr. gyüjtései utján a franczia születésü bécsi orvos, Giraud írt volt le (1857) Budapestről; később pedig Brischke és Zaddach is említenek több magyarországi fajt.

Midőn 1874-ben, nemrég elhunyt főnököm, Frivaldszky János ösztönzésére kiválólag a hártyásszárnyú rovarok gyüjtésére és tanulmányozására adtam magamat, a Nemzeti Múzeum ilynemű gyüjteménye is aránytalanul szegény volt. Nem is állott egyébből, mint ama példányokból, melyeket Frivaldszky János az ország különböző részeiben csak mellékesen gyüjtött, s azokból a kevés számúakból, melyeket Frivaldszky Imré-nek lepke- és bogárgyüjtői Bulgáriából és Törökországból küldöttek. Ez időtől fogva, 18 éven át, a magyar állam különböző részeiben tett gyüjtésem, valamint Pável János múzeumi gyüjtő s részben Frivaldszky János-nak ujabb gyüjtései által a gyüjtemény annyira fejlődött, hogy midőn Friese Henrik, a jeles méhész, leírásaim és csere-küldeményeim által szerfölött érdekes faunánkra figyelmessé levén, 1886-ban tanulmány és gyüjtés végett hazánkba jött, itt már meglehetősen szép és nagyrészt meghatározott gyüjteményt talált. De tíz havi ittléte alatt ő maga is sokban hozzájárult faunánk ismeretéhez, a méhfélékre vonatkozólag számos új és érdekes adatot gyüjtvén hazánk különböző részeiben.

Ez időtől fogva, sőt már néhány évvel megelőzőleg is napjainkig, hazánk lelkes búvárai részben másféle gyüjteseik mellett a Hymenopterákra is figyelemmel voltak s nem csekély adattal járultak ilynemű faunánk ismeretéhez, méltókká tevén magukat arra, hogy neveik itt örök emlékül hálásan fölemlíttessenek. E lelkes búvárok a következők: Abafi-Aigner Lajos, Anker Rudolf, Biró Lajos, Brancsik Károly dr., Cerva Frigyes, Chyzer Kornél dr., Chyzer Kornélné urhölgy, Daday Jenő dr., Dahlström Gyula, Dietl Ernő, Emich Gusztáv dr., Friese Henrik, Frivaldszky János, Henrich Károly, Herman Ottó, Horváth Géza dr., Jablonowski József, Kelecsényi Károly, Kenderessy Dénes, Kertész Kálmán dr., zilahi Kiss Endre, Kohaut Rezső, Korlević Antal, Kovács Gyula dr., Kuthy Dezső, Kuthy Dezső dr., Langhoffer A. dr., Madarassy László, Madarász Gyula dr., Mann József, Méhely Lajos, Merkl Ede, Metelka professor, qui modo merita fruitur quiete. Is annis 1856 et sequenti scripsit de Formicidis hungaricis; opus idem anno 1868 Joannes Frivaldszky idiomate patrio commentatus est.

Species aliquot hungaricas novas, a Dre Julio Kovács in regione Budapestinensi lectas, descripsit anno 1857. Giraud, medicus Viennensis, origine gallus; paulo post Brischke et Zaddach et ipsi complures species Hungariæ incolas commemorarunt.

Cum anno 1874, suadente simul et impellente Joanne Frivaldszky, tunc mihi præposito, ad Hymenoptera colligenda et excolenda me converti, collectio quam dicimus hymenopterologica Musæi Nationalis Hungarici plus æquo exigua fuit, quippe illa tantum exemplaria continebat, quæ Joannes Frivaldszky in diversis regni partibus quasi casu et aliud agendo collegerat, nec non illa, quæ viri ab Emerico Frivaldszky Coleopteris et Lepidopteris colligendis destinati ex Bulgaria et Turcia transmiserant. Ex eo tempore, per octodecim annos in diversis regni Hungariæ partibus ipse collegi Hymenoptera, collegerunt etiam Joannes Pável, in Musæo Nationali Hungarico legendis Insectis destinatus, nec non Joannes Frivaldszky; quo factum est, ut Henricus Friese, Apidarum cultor celeberrimus, cum descriptionibus meis et Hymenopteris commutandi gratia ultra citroque missis animum ad faunam nostram per se eximiam advertisset, anno 1886. studii et colligendi causa in Hungariam veniens, apud nos satis pulchram et maxima ex parte nominibus insignitam invenerit collectionem. Idem ipse decem, quibus apud nos commoratus est mensibus, non parum contulit ad faunam nostram illustrandam, et quod Apidas attinet, multis iisque novis et per se eminentibus indiciis eandem ampliavit.

Ex eo tempore, imo vero iam ab aliquot retro annis usque ad nostra tempora viri, qui apud nos historiam naturalem præcipuo studio coluere, etiam ad Hymenoptera colligenda animum adiecerunt et faunam hymenopterologicam non parum illustrarunt, digni propterea, quorum nomina gratitudinis ergo perenni memoriæ celebranda hic referuntur. Hi viri sunt: L. Abafi-Aigner, R. Anker, L. Biró, Dr. C. Brancsik, Fr. Cerva, Dr. C. Chyzer, domina C. Chyzer, Dr. E. Daday, J. Dahlström, E. Dietl, G. Emich, H. Friese, Joan. Frivaldszky, C. Henrich, O. Herman, Dr. G. Horváth, J. Jablonowski, C. Kelecsényi, D. Kenderessy, Dr. C. Kertész, A. Kiss de Zilah, R. Kohaut, A. Korlević, Dr. J. Kovács, D. Kuthy, Dr. D. Kuthy, Dr. A. Langhoffer, L. Madarassy, Dr. J. Madarász, J. Mann, L. Méhelÿ, E. Merkl, F. Metelka, M. Padewieth, J. Paszlavszky,

Ferencz, Padewieth M., Paszlavszky József, Pável János, Pruzsinszky József, Pungur Gyula, Redl Gusztáv, Riess Károly, lovag Sacher Károly, Sajó Károly, Stipanics József, Szépligeti Győző, Szilády Zoltán, Thalhammer János, Török József dr., Uhryk Nándor dr., Vangel Jenő dr., Vánky József, Vellay Imre, Vidra Ferdinánd, Wachsmann Ferencz s János és Xántus János.

A legelső nagyobb Hymenoptera-gyüjtemény hazánkban Koy Tóbiás budai kamarai pénztári tisztviselőé volt, ki (Alphabetisches Verzeichniss meiner Insectensammlung. Ofen, 1800) Budapest környékéről 136 faj Hymenopterát említ; de ha tekintetbe veszszük, hogy ez időben a nálunk előforduló fajoknak a legnagyobb része még ismeretlen volt s csak később írták le őket: biztosan állíthatjuk, hogy Koy gyüjteménye igen tekintélyes lehetett s legnagyobb része meghatározatlan és a tudományra nézve új volt. — A második nagyobb gyüjtemény az vala, melyet a jelen század elején (1803—1806) egy nevéről ismeretlen lengyel természetbúvár szerzett Magyarország területéről, mely jelenleg a varsói múzeum tulajdona, miként azt Radoszkovszky O. orosz tüzértábornok, a nemrég elhunyt jeles hymenopterologus, 1886-ban Budapesten létekor nekünk elbeszélte. (Rovartani Lapok. III. 1886, pag. 213.)

A Nemzeti Múzeum gyüjteményén kívül most nagyobb gyüjteményök van még magyarországi Hymenopterákból: 1. Brancsik Károly dr.-nak Trencsénmegyéből; 2. Chyzer Kornél dr. miniszteri tanácsosnak, ki kiváló szorgalommal kutatta és ismertette Zemplénmegye rovarvilágát; 3. Friese Henrik-nek, jelenleg Innsbruckban, ki mint említettem, tíz hónapig időzött és gyüjtött Magyarországon; 4. Korlević Antal, előbb fiumei, most zágrábi tanárnak, ki kiváló érdemeket szerzett a magyar tengerpart Hymenopteráinak a meggyüjtésével és közzétételével; 5. Paszlavszky József tanárnak, ki a magyarországi Cynipidák ismeretét vitte előbbre; 6. Szépligeti Győző budapesti tanárnak, ki nagy szorgalommal gyüjtötte és tanulmányozta a Braconidákat és Cynipidákat. Végre fölemlítendő itt 7. a Biró-féle, több ezer példányból álló Hymenoptera-gyüjtemény az ország legkülönbözőbb vidékeiről, mely jelenleg a Nemzeti Múzeum tulajdona. Ezeken kívül többeknek van kisebb gyüjteményök.

Az itt említettek gyüjteményeiket vagy legalább azok egy részét irodalmilag is közzétették s ez által

J. Pável, J. Pruzsinszky, J. Pungur, G. Redl, C. Riess, C. Sacher, C. Sajó, J. Stipanics, V. Szépligeti, Z. Szilády, J. Thalhammer, Dr. J. Török, Dr. J. Uhryk, Dr. E. Vangel, J. Vánky, E. Vellay, F. Vidra, F. et J. Wachsmann et J. Xántus.

Collectio Hymenopterorum prima originis hungaricæ peculiaris Tobiæ Koy, ad excelsam Cameram Regiam Hungarico-Aulicam generalium cassarum officialis propria erat, qui in sua enumeratione (Alphabetisches Verzeichniss meiner Insectensammlung. Ofen, 1800) 136 species Hymenopterorum e regione Budapestinensi adfert; sed si respiciamus circumstantiam illam, quod tempore illo Hymenopterorum terram Hungariæ colentium maxima pars adhuc indescripta fuerat: iure affirmandum, collectionem Koyi satis egregiam eiusque maximam partem nominibus non signatam ac pro scientia novam fuisse. — Collectio altera satis pulchra erat illa, quam initio huius seculi (1803—1806) ignoti nominis polonus in Hungaria sibi comparavit, quæ modo in musæo varsoviensi asservatur, teste O. Radoszkovszky, supremi in Russia rei tormentariæ præfecti, qui cum anno 1886. Budapestini degeret, rem nobis enarravit. (Rovartani Lapok. III. 1886, pag. 213.)

Inter homines privatos, qui ampliores Hymenopterorum collectiones nunc possident, commemorandi sunt: 1. Dr. Carolus Brancsik, qui in Comitatu Trencséniensi legit Hymenoptera; 2. Dr. Cornelius Chyzer, consiliarius ministerii, qui eximia diligentia faunam Zempléniensem exploravit; 3. Henricus Friese, modo in urbe Innsbruck degens, qui ut diximus decem menses in Hungaria versatus Hymenopterorum collectioni operam dedit; 4. Josephus Paszlavszky, professor budapestinensis, qui multum contulit ad Cynipidas hungaricas melius cognoscendas; 5. Antonius Korlević, prius fiumensis, nunc zagrabiensis professor, qui de fauna hymenopterologica regionis adriaticæ optime meritus est; 6. Victor Szépligeti, professor budapestinensis, qui magno studio dedit operam Braconidis et Cynipidis explorandis. Denique prætereundus non est 7. Ludovicus Biró, cuius thesauri hymenopterologici modo ad Musæum Nationale Hungaricum pertinentes plura millia exemplarium complectuntur, ex omnibus fere Hungariæ regionibus collectorum. — Plures alii pauciora possident.

Quos modo commemoravimus, thesauros suos vel saltem aliquam eorum partem typis vulgarunt eoque non parum contulerunt ad cognitionem faunæ nostræ promovendam.

Summis vero laudibus efferendi sunt ac maximo cum grati animi testimonio nominandi scriptores

is hozzájárultak faunánk ismeretéhez. De hálásan, a legmélyebb köszönettel kell itt megemlékeznünk ama kiváló külföldi szakférfiakról is, kik újabb időben faunánk állatainak meghatározása és megismertetése körül hervadhatatlan érdemet szereztek, kiknek a Múzeum gyüjteménye és saját typusaim mindenkor rendelkezésökre állottak és segítettek abban, hogy ilynemű faunánkat összeállítani lehetett. E kiváló szakférfiak a következők: André E., Brauns S., Friese H., Handlirsch A., Kohl Fr. Fr., Konow F., Kriechbaumer J., Mayr G., Morawitz F., Schletterer A. és Schmiedeknecht O., a Hymenopterologia elsőrendű tekintélyei és mívelői.

A mi már most az eddigi meghatározások és az alább közlött adatok alapján Magyarország hártyásszárnyú rovarai gazdag faunájának a jellemét illeti, az mintegy keveréke a középeurópai, földközi-tenger melléki (mediterrán) és délkeleti faunának, túlnyomólag délkeleti jellemmel és számos önálló sajátos fajjal (melyeket illető helyeiken megjelöltem), a nélkül azonban, hogy a nyugati fauna állatai is egészen hiányoznának, a melyhez egy ország állatvilága sem hasonlítható s joggal lenne nevezhető *magyar faunának;* a mit különben már Magyarország nagy kiterjedése és növényzetének változatossága is eléggé igazol. Már maga a központ, Budapest vidéke, a legnagyobb változatosságot nyujtja; mert a Duna jobb partja jobbára a dombos vagy hegyes vidékek állatait táplálja; a bal partja pedig, innen a magyar Alföldre mélyen lenyúló, sok helyen homokos talaj Erdélyen át túlnyomóan délkeleti jellemű. Állataink egy része innen Dél-Oroszországon, a Kaukázus és Turkesztán felé terjed; mások ellenben Dél-Franciaországon és Spanyolországon át Algirban is megtalálhatók.

Faunistikai tekintetben bizonyára a legérdekesebb a központi nagy síkság és Mehádia vagyis Herkulesfürdő környéke; továbbá a zemplénmegyei Szomotor s a delibláti homoksivatag, melyeken a déloroszországi futóhomokon lakó állatok is élnek.

A tudomány mai állásának megfelelőleg, az alább közlött adatok bizonyítják, hogy Magyarország Hymenoptera-faunája már meglehetősen ki van kutatva, s az egyes családokból csak kevés ujabb adatot gyüjthetni; ellenben igen tág és háladatos tér kinálkozik még azoknak, kik egykor az Ichneumonidák, Proctotrupidák és Chalcididák tanulmányozására adják magukat.

Budapesten, 1897. október hó 1-én.

exteri, Hymenopterologiæ peritissimi, qui novissimis temporibus faunæ nostræ animalia determinando eorumque cognitionem promovendo gloriam non perituram sibi compararunt, qui etiam thesaŭris Musæi Nationalis Hungarici meisque exemplaribus typicis, quandocunque voluissent, usi sunt idque auxilio suo effecerunt, ut eiusmodi Hungariæ faunam colligere et elencho complecti potuerim. Hi porro Hymenopterologiæ cultores spectatissimi sunt: E. André, S. Brauns, H. Friese, G. Handlirsch, Fr. Fr. Kohl, F. Konow, J. Kriechbaumer, G. Mayr, F. Morawitz, A Schletterer et O. Schmiedeknecht.

Quod vero ad faunam Hungariæ hymenopterologicam attinet per se ditissimam eiusque characterem ac naturam ex indiciis hucusque cognitis et inferius referendis perspicuam, iure quis affirmaverit in ea mixtam reperiri faunam mediæ Europæ, mediterraneam et australem, in qua tamen natura faunæ australis primas habeat partes ac plurimæ species propriæ occurrant (quas suis locis annotavimus), quin tamen Insecta ad faunam occidentalem pertinentia omnino absint; faunam porro eam esse, cui similem in nullo regno invenias ideoque merito *faunae hungaricae* nomine designandam; quod etiam Hungariæ amplitudo plantarumque summa varietas apprime confirmat. Iam ipsa media Budapestini regio summa gaudet varietate; ad dexteram Danubii ripam animalia degunt, quæ colles vel montes præcipue colunt; ad ripam vero sinistram latissimus protenditur campus, multis in locis sabulosus, qui usque ad extremos Transsylvaniæ fines regionis australis habitu gaudet. Insectorum Hungariæ pars una per Russiam meridionalem, Caucasiam usque ad Turkestaniam sedes suas protendunt; alia vero in Gallia meridionali et Hispania ad fines usque Algeriæ invenias.

Maximam per se attentionem merentur planissimi ac vastissimi campi, qui in media Hungaria protenduntur ac regio thermarum Herculis (Mehádia); nec minorem Szomotor Comitatus Zempléniensis ac arenæ deliblatenses, in quibus Insecta nidificant, quæ vastissimas Russiæ meridionalis solitudines incolunt.

Pro ea, quae modo obtinet, disciplinæ huius conditione, quæ inferius referemus, clare ostendunt, faunam Hungariæ hymenopterologicam satis esse exploratam ac in singulis familiis pauca tantum restare indaganda; latissimum vero campum patere iis ac feracissimum, qui Ichneumonidarum, Proctotrupidarum et Chalcididarum studio operam dare voluerint.

Budapestini, die 1. Octobris 1897.

LITTERATURA.

1. Ahrens, A. *Fauna Insectorum Europae.* Fasc. I—II. Continuata per Franciscum Germar. Fasc. XII—XXIV. Halæ, 1812—17.
2. André, Edmund et Ernest: *Spécies des Hyménoptères d'Europe et d'Algérie.* Vol. I. *Tenthredinidae, Cephidae* et *Siricidae* (Mouches à scie), par Edmund André. Beaune (Côte-d'Or), 1879—82.—Vol. II. *Formicidae* (Les Fourmis), par Ernest André. Vespidæ (Les Guêpes), par Edmund André. Beaune, 1881—86.—Vol. III. *Sphegidae* (Les Sphégiens), par Edmund André. (Opus incompl.). Beaune, 1886. — Vol. IV. et V. *Braconidae* (Les Braconides), par T. A. Marshall. Beaune et Paris, 1888. — Vol. VI. *Chrysididae* (Les Chrysides), par Robert du Buysson. Beaune, 1891—96.
3. Bíró L. *Új levéldarázsfaj* (Dolerus quadrinotatus) (Rovartani Lapok. I. 1884, p. 57. — *Description d'une espèce nouvelle des Tenthredinides* (Ibid. Revue, p. VII.)
4. — *Pókon élősködő darázs* (Glypta bifoveolata) (Ibid. p. 209. — Revue, p. XXVII.)
5. — *Szabadban alvó méhek és darázsok.* (Ibid. II. 1885, p. 169. — Revue, p. XXIII—XXIV.)
6. — *A Keleti-Kárpátok vidékének jellemző rovarfajai.* (A magyarországi Kárpátegyesület Évkönyve. XII. 1885.)
7. — *Hangya-háboru.* (Rovartani Lapok. II. 1885, p. 81.— *Bataille des fourmis.* Ibid. Revue, p. XIV.)
8. — *Kirándulás a Pop-Ivánra.* (Ibid. p. 30, 55. — *Une excursion sur le Pop-Iván.* Ibid. Revue, p. IV—V. VII.)
9. Borbás V. *A magyar Nagy-Alföld tölgyei* (Erdészeti Lapok. XXVI. 1887, pag. 710.)
10. — *Die Gallen der ungarischen Eiche* (Forstwissenschaftliches Centralblatt. IX. Jhrg. 1887, pag. 151.)
11. Brancsik K. *Adatok Magyarország faunájához. Trencsén vármegye Hymenoptera faunájához.* (A trencsénmegyei Természettudományi Egylet 1892/3. Évkönyve. Trencsén, 1893.)
12. Brauns, S. *Neue Ichneumoniden der Schweiz.* (Mittheil. schweiz. entom. Gesellsch. VIII. 1888.)
13. — *Die Ophioniden.* (Archiv d. Freunde d. Naturgesch. in Mecklenburg. LXIII. 1890.)
14. — *Descriptiones specierum novarum Ichneumonidarum e Fauna Hungarica.* (Természetrajzi Füzetek. XVIII. 1895, pag. 42; XIX. 1896, pag. 270.)
15. Brischke, C. G. A. und Zaddach G. *Beobachtungen über die Arten der Blatt- und Holzwespen.* (Schrift d. physik-ökon. Gesellsch. in Königsberg. I. Cimbicidæ. Bd. III. 1862, p. 204; II. Hylotomidæ. Bd. IV. 1863, p. 83; III. Lydidæ. Bd. VI. 1865, p. 104; IV. Nematidæ Bd. XVI. 1875, p. 23. II. Abtheilung in Schriften der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig. Neue Folge. Fünften Bandes viertes Heft. Danzig, 1883, p. 201.)
16. Christ, J. L. *Naturgeschichte, Classification und Nomenclatur der Insecten von Bienen-, Wespen- u. Ameisengeschlecht.* Frankfurt a/M. 1791. (Complura data ex Hungaria, nonnulla tamen inextricabilia.)
17. Chyzer K. *Zemplén vármegye méhféléi.* (Magy. orvosok és természetvizsg. 1886. Buziás-Temesvárott tartott vándorgyülésének történeti vázlata és munkálatai. Budapest, 1887.) — *Ugyanaz* (Rovartani Lapok. III. 1886. — *Les Apides* (Mellifères Latr.) *du département de Zemplén.* Ibid. Revue, p. XXV.)
18. — *Torzcsápú fürkésző darázs* (Tryphon vulgaris) (Rovartani Lapok. III. 1886, p. 44. — *Un Hyménoptère monstrueux.* Ibid. Revue, p. VI.)
19. Dahlbom, G. *Hymenoptera europaea, praecipue borealia.* Tom. I. *Sphex in sensu Linneano.* Lundæ. 1843—45. Tom. II. *Chrysis i. s. L.* Berolini, 1854.
20. Dalla-Torre, K. *Catalogus Hymenopterorum hucusque descriptorum systematicus et synonymicus.* Lipsiæ. Vol. VI. *Chrysididae* (Tubulifera), 1892. Vol. VII. *Formicidae* (Heterogyna), 1893. Vol. II. *Cynipidae.* 1893. Vol. I. *Tenthredinidae incl. Uroceridae* (Phyllophaga et Xylophaga), 1894. Vol. IX. *Vespidae* (Diploptera), 1894. Vol. X. *Apidae.* 1896. Vol. VIII. Fossores (Sphegidæ). 1897.
21. Dalla-Torre, K. et Friese, H. *Synonym. Katalog der europäischen Schmarotzerbienen* (Entom. Nachricht. XX. 1894, p. 33.)
22. — *Synonym. Katalog der europäischen Sammelbienen.* (Ibid. XXI. 1895.)
23. Dudich E. *A művész-rovarokról.* (Természettud. Közl. XVI. 1884, p. 448.)
24. — *A Megachile-fajok biologiájához.* (Rovartani Lapok I. 1884, p. 241. — *Sur la biologie des Megachiles.* Ibid. Revue, p. XXIX.)
25. Dours, A. *Hyménoptères nouveaux du bassin méditerranéen.* (Revue et Magaz. de Zoologie Sér. 3. tom. I. 1873.)
26. Fabricius, J. Fr. *Systema Piezatorum.* Brunsvigæ, 1804.
27. Förster, A. *Eine Centurie neuer Hymenopteren.* (Verhandl. Naturhist. Vereins preussisch. Rheinlande. VII. 1850, p. 276, 484, 500; VIII. 1851, p. 1.; X. 1853, p. 266.)
28. — *Zweite Centurie.* (Ibid. XII. 1855, p. 226; XVI. 1859, p. 87.)
29. — *Eine Centurie neuer Hymenopteren.* (Ibid. XVII. 1860, p. 93.)
30. — *Monographie der Gattung Hylaeus.* (Prosopis) (Verhandl. zoolog.-botan. Gesellsch. Wien XXI. 1871, p. 873.)
31. Friese, H. *Ueber seltene Andrenen.* (Entom. Nachricht. XII. 1886.)
32. — *Rövid áttekintése Magyarországban az 1886. évben tett gyüjtéseimnek.* (Rovartani Lapok III. 1886, p. 217. — *Relevé de mes captures faites en Hongrie en 1886.* Ibid. Revue, p. XXVIII.)
33. *Species aliquot novae generis Andrena.* (Természetrajzi Füzetek. XI. 1887, p. 21.)
34. — *Kurzer Ueberblick meiner Apidenausbeute in Ungarn.* (Entom. Nachricht. XIII. 1887, p. 213.)
35. — *Eine Frühlingsexcursion in das ungar.-kroat. Küstenland.* (Societas historico-naturalis croatica. II. God; na. Zagreb, 1887, p. 90.)
36. — *Die Schmarotzerbienen und ihre Wirthe.* (Zoolog. Jahrbücher. Abtheil. f. Systematik, Geograph. und Biologie der Thiere. Bd. III. Jena, 1888, pag. 847.)
37. — *Beiträge zur Biologie der solitären Blumenwespen* (Apidæ) (Ibid. Bd. V. 1891, p. 751.).
38. — *Osmienstudien.* (Entom. Nachricht. XVII. 1891, p. 257; XIX. 1893, p. 353; XXI. 1895, p. 131.)
39. — *Die Bienenfauna von Deutschland u. Ungarn.* Berlin, 1893.
40. — *Species aliquot novae vel minus cognitae generum Eucera* Scop. *et Melitturga* Latr. (Term.-rajzi Füzetek. XVIII. 1895, pag. 202.)
41. — *Die Bienen Europas.* (Apidæ europææ.) Theil I. *Schmarotzerbienen.* Berlin, 1895. — Theil II. *Solitäre Apiden. Genus Eucera.* 1896. — Theil III. Solitäre Apiden. Genus Podalirius. 1897.
42. — *Monographie der Bienengattung Ceratina* (Latr.) (Palæarktische Formen). (Természetrajzi Füzetek. XIX. 1896, p. 34.)

43. — *Species aliquot novae vel minus cognitae generis Podalirius* Latr. (Anthophora Auct.) (Ibid. XIX. 1896, pag. 265.)
44. — *Neue oder wenig bekannte südeuropäische Apiden.* (Ibid. XIX. 1896, pag. 277.)
45. — *Monographie der Bienengattung Panurgus* Panz. (Palæarktische Formen.) (Ibid. XX. 1897, p. 78.)
46. — *Species aliquot novae vel minus cognitae generis Anthidium* Fabr. (Ibid. XX. 1897, pag. 437.)
47. Fritsch, C. *Jährliche Periode der Insectenfauna von Oesterreich-Ungarn.* III. *Die Hautflügler.* (Hymenoptera.) (Denkschriften d. kais. Acad. der Wissenschaft. in Wien. Math.-naturwiss. Classe. XXXVIII. 1878, p. 97.) (Quoad species hungaricas paucæ tantum fidei.)
48. Frivaldszky J. *A magyarországi hangyafélék* (Formicidæ). (A magy. orvosok és természetvizsg. 1868. Egerben tartott XIII. nagygyülésének történeti vázlata és munkálatai. Eger, 1869, p. 229.)
49. — *Adatok Mármaros vármegye faunájához.* (M. T. Akad. math. és természettud. Közlemények. IX. 1871.)
50. — *A Herkulesfürdő és vidékén élő állatok.* (A Herkulesfürdő és környéke. Irta Munk Manó. Az állattani részt Frivaldszky János. Budapest, 1872. *Hymenoptera*, p. 98.)
51. — *Állattani kirándulásaim Orsova, Mehádia és Korniareva vidékein.* (A magy. orvosok és természetvizsg. XVI. nagygyülésének történeti vázlata és munkálatai. Pest, 1873) (Tenthredo hungarica Kl. = Tenthredopsis Tischbeinii Mocs.; Cleptes ignita Dhlb. = scutellaris Mocs.)
52. — *Adatok Temes és Krassó megyék faunájához. Data ad faunam Hungariae meridionalis Comitatuum Temes et Krassó.* (M. T. Akadémia mathem. és természettud. Közlemények. XIII. 1876.) (Mutilla ciliata F. = calva Lep.; Tachytes tesselata Dhlb. = Mocsáryi Kohl; Oxybelus bellicosus Dhlb. = elegantulus Gerst.)
53. Fuss, C. *Notizen und Beiträge zur Insektenfauna Siebenbürgens.* (Verhandl. und Mittheil. des siebenbürgischen Vereins f. Naturwiss. in Hermannstadt. XXIV. 1874, p. 34.)
54. Germar, E. F. *Reise nach Dalmatien und in das Gebiet von Ragusa.* Leipzig und Altenburg, 1817.
55. Gerstaecker, A. *Ueber die Gattung Oxybelus* Latr. (Zeitschr. f. d. gesammt. Naturwissenschaft. XXX. Berlin, 1867.)
56. Giraud, J. *Description de quelques Hyménoptères nouveaux ou rares.* (Verhandl. zoolog.-botan. Vereins in Wien. VII. 1857.)
57. Gravenhorst, J. L. C. *Ichneumonologia Europaea.* 3. Vol. Vratislaviæ, 1829.
58. Handlirsch, A. *Die Bienengattung Nomioides* Schck. (Verhandl. zoolog.-botan Gesellsch. Wien. XXXVIII. 1888, p. 396.)
59. — *Monographie der mit Nysson und Bembex verwandten Grabwespen.* (Sitzungsber. d. k. k. Akad. d. Wissensch. in Wien. Mathem.-naturwiss. Classe Bd. XCV—CVII. 1887—93. 7 partes.)
60. — *Die Hummelsammlung des k. k. naturhist. Hofmuseums.* (Annalen des k. k. naturhist. Hofmuseums. Bd. III. Wien, 1888, p. 209.)
61. Henrich, C. *Verzeichniss der (in den Jahren 1879—83) bei Hermannstadt beobachteten Blumenwespen* (Anthophila). (Verhandl. u. Mittheil. d. siebenb. Vereins für Naturwiss. in Hermannstadt, Jhrg. XXX—XXXIV. 1880—84.)
62. Herman O. *A mezőség. II. A mezőzáh-tóháti, továbbá méhesi, báldi és mezősályi tósorozat természetrajzi, különösen állattani szempontból tárgyalva.* (Erdélyi Muzeumegylet Évkönyvei. VI. Kolozsvár, 1873.) (Dasypoda thoracica Baer sec. spec. typ. = Andrena thoracica.)
63. Horváth G. *Magpusztító fürkésző-darázs* (Syntomaspis druparum Boh.) (Rovartani Lapok. III. 1886, p. 125. — Revue, p. XVIII.)
64. — *Az akáczfák paizstetveiről.* (Magy. Tud. Akad. mathem. és természettud. Értesitő. IX. köt. 1890—91, pag. 157.)
65. Kirby, W. F. *List of Hymenoptera, with descriptions and figures of the typical specimens in the British Museum.* Vol. I. *Tenthredinidae ac Siricidae.* London, 1882.
66. Kirchner, L. *Catalogus Hymenopterorum Europae.* Vindobonæ, 1867. (Nematus Frivaldszkyi Först. et pyrosomus Först. species non descriptæ e scientia delendæ sunt.)
67. Klug, G. Chr. F. *Die Blattwespen nach ihren Gattungen und Arten zusammengestellt.* (Magaz. d. Gesellsch. Naturforsch. Freunde zu Berlin. II. 1808; VI. 1814; VII. 1816; VIII. 1818.) — *Dr. Fr. Klug's gesammte Aufsätze über Blattwespen.* Herausgegeben von Dr. Jos. Kriechbaumer. Berlin, 1884.
68. — *Die europäischen Arten der Insectengattung Leucospis.* (Magaz. d. Gesellsch. Naturforsch. Freunde zu Berlin. VI. 1814.)
69. — *Uebersicht der Tenthredinetae der Sammlung.* (Jahrbücher der Insectenkunde, mit besonderer Rücksicht auf die Sammlung in königl. Museum zu Berlin. I. Bd. Berlin, 1834, p. 223.)
70. Kohl, Fr. Fr. *Sphegidologische Studien.* (Entom. Nachricht. VII. 1881, p. 90, 239.)
71. — *Ueber neue Grabwespen des Mediterrangebietes.* (Deutsche entom. Zeitung. XXVII. 1883, p. 161.)
72. — *Neue Hymenopteren in den Sammlungen d. k. k. zoolog. Hof-Cabinetes in Wien* (Verhandl. zoolog.-botan. Gesellsch. Wien. XXXIII. 1884, p. 331.)
73. — *Beiträge zur Kenntniss der Hymenopteren-Gattung Oxybelus Latr.* (Természetrajzi Füzetek. VIII. 1884. Revue, p. 101.)
74. — *Die Gattungen und Arten der Larriden.* (Verhandl. zoolog.-botan. Gesellsch. Wien. XXXIV. 1884.)
75. — *Die Gattungen der Sphecinen und die paläarktischen Sphex-Arten.* (Természetrajzi Füzetek. IX. 1885. Revue, p. 154.)
76. — *Die Crabronen der Section Thyreopus* Lep. (Zoolog. Jahrbücher. Abtheil. f. System., Geograph. und Biologie der Thiere. III. 1888, p. 543.)
77. — *Die Hymenopterengruppe der Sphecinen. I. Monographie der natürlichen Gruppe Sphex* Linn. (sensu Linn.). 2 Abtheilungen (Annalen d. k. k. naturhist. Hofmuseums. Bd. V. 1890.)
78. Konow, Fr. W. *Ueber mehrere neue und einige schon bekannte Blattwespen.* (Wien. entom. Zeitung. V. 1886, p. 37.)
79. — *Die europäischen Blennocampen.* (Ibid. V. 1886.)
80. — *Neue griechische und einige andere Blattwespen.* (Ibid. VII. 1887, p. 19.)
81. — *Nachtrag zu den Blennocampiden.* (Ibid. VI. 1887, p. 273.)
82. — *Zwei neue Blattwespen-Arten.* (Sitzungsber. d. königl. preussisch. Akad. d. Wissenschaft. zu Berlin. 1888. I., p. 187.)
83. — *Neue paläarktische Blattwespen* (Wien. entom. Zeitung. IX. 1890, p. 8.)
84. — *Catalogus Tenthredinidarum Europae.* (Deutsche entom. Zeitschrift. Jhrg. 1890, p. 241.)
85. — *Tableaux analitique et systematique du genre Tenthredopsis* Costa. (Revue d'Entom. IX. 1890, p. 63.)
86. — *Neue europäische Blattwespen.* (Wiener entom. Zeitung. XIII. 1894, p. 95.)
87. — *Neue oder wenig bekannte Tenthrediniden und eine analytische Uebersicht der Gattung Holcocneme* Knw. (Természetrajzi Füzetek. XVIII. 1895, pag. 50.)

88. — *Analytische und kritische Bearbeitung der Gattung Amauronematus* Knw. (Ibid. pag. 166.)
89. — *Verschiedenes aus der Hymenopteren-Gruppe der Tenthrediniden.* (Wiener entom. Zeitung. XV. 1896, p. 57.)
90. — *Ueber Blattwespen-Tribus Cephini.* (Ibid. p. 150.)
91. — *Neue und einige bisher verkannte Arten aus der Familie der Tenthrediniden.* (Entom. Nachricht. XXXII. 1896, p. 310.)
92. — *Systematische und kritische Bearbeitung der Blattwespen-Tribus Lydini.* (Annalen d. k. k. Naturhist. Hofmuseums. XII. 1897, pag. 1.)
93. Korlević, A. *Prilozi poznavanju hrvatskih opnokrilaca, Izvješće kralj velike gimnazije na Rieci* (Fiume) *koncem skolske godine.* 1884/5. Zagreb, 1885. (Tenthredinidæ ac Siricidæ.)
94. — *Forró földövi hangya Magyarországban.* (Rovartani Lapok. III. 1886, p. 18. — *Apparition du Monomorium Pharaonis* L. *à Fiume.* Ibid. Revue, p. IV.)
95. — *Prilozi fauni Hrvatskih opnokrilaca.* (Societas historico-naturalis Croatica. V. Godina. Zagreb, 1890.)
96. Kriechbaumer, J. *Bombus Mocsáryi n. sp.* (Stettiner entom. Zeitung. XXXVIII. 1877, p. 253.)
97. — *Neue Schlupfwespen aus Ungarn.* (Entom. Nachricht. IV. 1878, p. 41.)
98. — *Ueber den Ichneumon Fabricii* Schrk. (Ibid. VI. 1880, p. 121.)
99. — *Ichneumoniden-Studien.* II. *Neue Arten aus Süd- und Ost-Europa.* (Ibid. VIII. 1882.)
100. — *Hymenoptera nova vel minus cognita in collectione Musaei Nationalis Hungarici.* (Term.-rajzi Füzetek. VI. 1883, p. 143.)
101. — *Neue Ichneumoniden des Wiener Museums.* (Annalen d. k. k. Naturhist. Hofmuseums. III. Bd. 1888, p. 29. V. Bd. 1890, p. 483.)
102. — *Ichneumoniden-Studien. Untersuchung Tischbein'scher Schlupfwespen-Typen.* (Entom. Nachricht. XX. 1894.)
103. — *Ichneumonidae novae e Fauna Hungarica Musaei Nationalis Hungarici.* (Term.-rajzi Füzetek. XVII. 1894, p. 48.)
104. — *Neue oder wenig bekannte Ichneumoniden in der Sammlung des ungar. National-Museums.* (Ibid. XIX. 1896, p. 128.)
105. Mayr, G. *Beiträge zur Insectenfauna von Siebenbürgen.* (Verhandl. und Mittheil. d. siebenbürg. Vereins für Naturwiss. zu Hermannstadt. IV. 1853, p. 141.)
106. — *Beschreibungen einiger neuen Ameisen.* (Verhandl. zoolog.-botan. Vereins in Wien. III. 1853, p. 277.)
107. — *Beiträge zur ungarischen Formicinen-Fauna.* (Ibid. VI. 1856, p. 477.)
108. — *Ungarns Ameisen.* (Drittes Programm der städtischen Oberrealschule in Pest für das Schuljahr 1856/7. Pest, 1857, p. 5—26.)
109. — *Die Einmietler der mitteleuropäischen Eichengallen.* (Verhandl. zoolog.-botan. Gesellsch. Wien. XXII. 1872, p. 669.)
110. — *Die europäischen Torymiden.* (Ibid. XXIV. 1874, pag. 53.)
111. — *Die Chalcidier-Gattung Olinx.* (Ibid. XXVII. 1877, p. 155.)
112. — *Die Arten der Chalcidier-Gattung Eurytoma durch Zucht erhalten.* (Ibid. XXVIII. 1878, p. 297.)
113. — *Az Epitritus argiolus Em. nevű hangya előfordulása Magyarországban.* (Természetrajzi Füz. VI. 1883, p. 41. — *Ueber das Vorkommen des Epitritus argiolus Em. in Ungarn.* (Ibid. Revue, pag. 196.)
114. Mocsáry S. *Adatok Biharmegye faunájához. Data ad faunam Hungariae orientalis Comitatus Bihar.* (M. T. Akadémia mathem. és természettud. Közlemények. X. 1872, p. 163.)
115. — *Zur Hymenopteren-Fauna Siebenbürgens.* (Verhandl. u. Mittheil. d. siebenbürg. Vereins für Naturwiss. zu Hermannstadt. XXIV. 1874, p. 117.) (Ammophila holosericea F. = Heydenii Dhlb.; Dasypoda thoracica = Andrena thoracica F.)
116. — *Adatok Zemplén és Ung megyék faunájához. Data ad faunam Hungariae septentrionalis Comitatuum Zemplén et Ung.* (M. T. Akad. math. és természettud. Közl. XIII. 1875, p. 166.) (Halictus platycestus Dours = morbillosus Kriechb.; Chrysis analis Spin. = sybarita Först.)
117. — *Bihar és Hajdu megyék hártya-, két-, reczés-, egyenes- és félröpü. Hymenoptera, Diptera, Neuroptera, Orthoptera et Hemiptera Hungariae Comitatuum Bihar et Hajdú.* (Ibid. XIV. 1876.) (Chrysis elegans Lep. = succincta L.; Oxybelus trispinosus F. = furcatus Lep.; fallax Gerst. = furcatus Lep.; Osmia tricornis Latr. = bicornis L.; Eucera algira Lep. = parvicornis Mocs.: Phileremus punctatus F. = Ammobates similis Mocs.)
118. — *Trois espèces nouvelles d'Abeilles.* (Petites Nouvelles Entomologiques. Paris, 1877. Nr. 166.)
119. — *Biologiai jegyzetek.* (Természetrajzi Füzetek. I. 1877, p. 23.)
120. — *Új hártyaröpűek a Nemzeti Múzeum gyüjteményében. Hymenoptera nova in collectione Musaei Nationalis Hungarici.* (Ibid. I. 1877, pag. 87.)
121. — *Új méhfajok a Nemzeti Múzeum gyüjteményében. Mellifera nova in collectione Musaei Nationalis Hungarici.* (Ibid. I. 1877, p. 231; II. 1878, p. 15, 118; III. 1879, p. 8, 233.)
122. — *Adatok Zólyom és Liptó megyék faunájához. Data ad faunam Hungariae septentrionalis Comitatuum: Zólyom et Liptó.* (M. T. Akad. math. és természettud. Közl. XV. 1878, p. 223.) (Andrena fulvipes K. = fulvescens K.)
123. — *Espèces nouvelles de genre Eucera.* (Petites Nouvelles Entomologiques. Paris, 1878. Nr. 208.)
124. — *Drei neue Schlupfwespen aus Ungarn.* (Entom. Nachricht. VI. 1878, p. 16.)
125. — *Budapest és környéke állattani tekintetben.* (Budapest és környéke orvosi és természettudományi helyirata). Irta Margó Tivadar. *Hymenoptera. Hártyaröpűek.* Mocsáry Sándor-tól. Budapest, 1879, pag. 72—94. (Allantus viduus Rossi = costatus Klug; Cephus faunus Newm. = linearis Schrk. (faunus Thoms.); Aulacus Latreilleanus Nees = gloriator F.; Astata affinis Vanderl et Vanderlindenii Rob. = minor Kohl.)
126. — *Zur Biologie einiger Chrysiden.* (Entom. Nachricht. VII. 1879, p. 82.)
127. — *Ujabb adatok Temesmegye hártyaröpü faunájához. Data nova ad faunam Hymenopterologicam Hungariae meridionalis Comitatus Temes* (M. T. Akad. mathem. és természettud. Közlem. XVI. 1879.) (Andrena vitrea Sm. = pectoralis Schmied.)
128. — *Új hártyaröpűek a magyar faunából. Hymenoptera nova e fauna Hungarica.* (Természetrajzi Füzetek. III. 1879, p. 115.)
129. — *Új hártyaröpüek a Föld különböző részeiből. Hymenoptera nova e variis orbis terrarum partibus.* (Ibid. IV. 1880, pag. 267; V. 1881, pag. 29.)
130. — *A magyar fauna másnejü darázsai. Hymenoptera Heterogyna faunae Hungaricae.* (M. T. Akad. mathem. és természettud. Közlem. XVII. 1881.)
131. — *A magyar fauna fémdarázsai. Chrysididae faunae Hungaricae.* A M. T. Akadémia által a Vitéz-féle jutalommal kitüntetett pályamü. Opus ab Academia scientiarum Hungarica coronatum et editum. A M. T. Akad. III. osztályának különkiadványa. 1882. III. Budapest, 1882.

132. — *Hymenoptera nova Europaea et exotica. Európai és másföldi új hártyaröpüek.* (Értekezések a természettudományok köréből. Kiadja a M. T. Akadémia. XIII. 1883.)
133. — *Jellemző adatok Erdély hártyaröpű rovarainak faunájához.* (M. T. Akad. mathem. és természettud. Közlem. XIX. 1883. p. 383 és Természetrajzi Füzetek. VIII. 1884, p. 115.) — *Charakteristische Daten zur Hymenopteren-Fauna Siebenbürgens.* (Természetrajzi Füzetek. VIII. 1884. Revue, p. 218.)
134. — *A művészméhekről.* (Rovartani Lapok. I. 1884, p. 181. — *Sur les Abeilles artistes.* Ibid. Revue, p. XXIV.)
135. — *A lopó-darázsok életmódjáról.* (Ibid. p. 82. — *Sur les moeurs des Pelopoeus.* Ibid. Revue, p. XI.)
136. — *Két méhfaj kölcsönös viszonya egymáshoz.* (Ibid. p. 20. — Relation mutuelle entre deux espèces d'abeilles. Ibid. Revue, p. IV.)
137. — *Species generis Anthidium regionis palaearcticae.* (Természetrajzi Füzetek. VIII. 1884, p. 241.)
138. — *A fazekas-darázsról.* (Rovartani Lapok. II. 1885, p. 15. — *Description du nid de l'Agenia punctum* Vanderl. Ibid. Revue, p. II.)
139. — *Adatok Magyarország fürkészdarázsainak ismeretéhez. Data ad cognitionem Ichneumonidarum Hungariae. I. Ichneumones* Wesm. (M. T. Akad. mathem. és természettud. Közlem. XX. 1885, pag. 53.)
140. — *Egy elcsúfított áldozat.* (Rovartani Lapok. II. 1885, p. 106. — Revue, p. XVIII.) (Rogas circumscriptus Nees? = testaceus Spin.)
141. — *Két érdekes fa-rontó darázs.* (Ibid. p. 147. — *Découverte des Sirex fantoma* F. *et augur* F. *dans le département de Mármaros.* Ibid. Revue, p. XXI.)
142. — *Délmagyarország állattani tekintetben.* (Helyrajzi Emlékmű a magy. orvosok és természetvizsgálók 1886. évi Buziás-Temesvárott megtartott XXIII. vándorgyülésére.) Irta Tömösváry Ödön. — *Hártyásszárnyúak* (Hymenoptera). Összeállitotta: Mocsáry Sándor, pag. 137. (Macrophya femoralis Kaw. = cognata Mocs.; Allantus viduus Rossi = costatus Klug; Aulacus exaratus Retz. = striatus Jur.; Chrysis analis Spin. = sybarita Först.)
143. — *A magyarországi fa-rontó darázsok.* (Rovartani Lapok. III. 1886, p. 9, 67, 98, 113. — Les Siricides de la Hongrie. Ibid. Revue, p. III, VI, XI—XII, XIII—XIV, XV—XVII.)
144. — *Monographia Chrysididarum orbis terrarum universi. Földünk fémdarázsainak magánrajza.* M. T. Akad. III. osztályának különkiadványa. Budapest, 1888—89.
145. — *Catalogus Chrysididarum Europae et confinium.* (Természetrajzi Füzetek. XII. 1889.)
146. — *Additamentum primum ad monographiam Chrysididarum orbis terrarum universi.* (Ibid. XIII. 1890, p. 45.) — *Additamentum secundum* etc. (Ibid. XV. 1892.).
147. — *E fauna Apidarum Hungariae.* (Ibid. XVII. 1894, p. 34.)
148. — *Hymenoptera parasitica educata in collectione Musaei Nationalis Hungarici.* (Ibid. XVIII. 1895, pag. 67.)
149. — *Species Hymenopterorum magnificae novae in collectione Musaei Nationalis Hungarici.* (Ibid. XIX. 1896, p. 1.)
150. — *Hymenoptera nova e fauna Hungarica.* (Ibid. XX. 1897, p. 644.)
151. Paszlavszky J. *A rózsagubacs fejlődéséről.* (Természetrajzi Füzetek. V. 1882, p. 198. — *Ueber die Bildung des Bedeguars.* Ibid. Revue, p. 277.)
152. — *Adatok a gubacsdarázsok faunájához a magyar birodalomban, különösen Budapest környékén.* (M. T. Akad. mathematikai és természettud. Értesitő. I. 1882—84, p. 257. — *Beiträge zur Cynipiden-Fauna Ungarns, besonders der Umgebung von Budapest.* Mathem. naturwiss. Berichte aus Ungarn. I. 1882—83, p. 214.)
153. — *Adatok a gubacsdarázsok faunájához hazánkban.* (Természetrajzi Füzetek. VII. 1883, p. 152. — *Beiträge zur Cynipiden-Fauna Ungarns.* Ibid. Revue, p. 197.)
154. — *Cynips superfetationis* Gir. *Adatok a gubacsdarázsok ismeretéhez.* (M. T. Akad. mathem. és természettud. Értesitő. II. 1883, p. 90. — *Cynips superfetationis* Gir. *Ein Beitrag zur Kenntniss der Cynipiden.* Math. naturwiss. Berichte aus Ungarn. II. 1883—84, p. 172.)
155. — *Beiträge zur Biologie der Cynipiden.* (Wiener entom. Zeitung. II. 1883, p. 129, 171.)
156. — *Die Galle und Wespe der Cynips superfetationis* Gir. Ein Beitrag zur Kenntniss der Cynipiden (Ibid. III. 1884, pag. 147.)
157. — *A gubacsdarázsokról.* (Rovartani Lapok. I. 1884, p. 70. — *Sur les Cynipides.* Ibid. Revue, p. IX.)
158. — *Adalékok hazánk gubacsdarázs-faunájának ismeretéhez.* (Rovartani Lapok. I. 1884, p. 223. — *Notes pour servir l'étude des Cynipides de la Hongrie.* Ibid. Revue, p. XXVIII.)
159. — *A magyar tölgy gubacsai.* (Rovartani Lapok. II. 1885, p. 107. — Revue, p. XVIII.)
160. Pérez, J. *Contribution à la faune des Apiaires de France.* (Act. Soc Linn. Bordeaux. Sér. IV. tom. III. 1879, pag. 119.)
161. Reinhard, H. *Beiträge zur Kenntniss einiger Braconiden-Gattungen.* (Berlin. entom. Zeitschrift. IX. 1865.)
162. Sajó K. *Entomologische Bilder aus den ungarischen Flugsandsteppen.* II. Sommerbild. (Entom. Nachricht. VIII, 1882, p. 1.)
163. — *Rovarászati képek a magyar alföld futóhomok pusztáiról.* (Rovarászati Lapok. I. 1883.)
164. — *Eine neue Oxybelus-Art aus Central-Ungarn.* (Wiener entom. Zeitung. III. 1884, p. 87.)
165. Schilberszky K. *Diastrophus rubi* Htg. (Rovartani Lapok. III. 1886, p. 61. — Revue, p. X.)
166. Schletterer, A. *Die Hymenopteren-Gattung Gasteruption* Latr. (Fœnus Auct.) (Verhandl. zoolog.-botan. Gesellsch. Wien. XXXV. 1885, p. 267.)
167. — *Ueber die Hymenopteren-Gattung Evania* Fabr. (Ibid. XXXVI. 1886, p. 1.)
168. — *Die Hymenopteren-Gattung Cerceris* Latr. *mit vorzugsweiser Berücksichtigung der paläarktischen Arten.* (Zoolog. Jahrbücher. Zeitschrift für Systematik, Geographie und Biologie der Thieren. II. 1887, p. 349.)
169. — *Monographie der Bienen-Gattungen Chelostoma* Latr. *und Heriades* Spin. (Ibid. IV. 1889, pag. 591.)
170. — *Nachträgliches über die Hymenopteren-Gattung Cerceris* Latr. (Ibid. IV. 1889, p. 879.)
171. — *Die Hymenopteren-Gruppe der Evaniiden.* (Annalen d. k. k. Naturhist. Hofmuseums. IV. 1889—90. 3 Abtheilungen.)
172. — *Monographie der Hymenopteren-Gattung Stephanus* Jur. (Berlin. entom. Zeitschrift. XXXIII. 1889, pag. 71.)
173. — *Die Bienengattung Dasypoda* Latr. (Ibid. XXXV. 1890, p. 11.)
174. — *Die Gruppe der Hymenopteren-Gattung Leucospis* F. etc. (Ibid. XXXV. 1890, p. 141.)
175. Schmiedeknecht, O. H. L. *Apidae Europaeae* (Die Bienen Europa's) *per Genera, Species et Varietates dispositae et descriptae.* Tom. I. *Nomada, Bombus, Psithyrus* et *Andrena.* Gumperdæ et Berolini, 1882—84. — Tom. II. *Osmia.* Ibid.)

176. — *Die Ichneumoniden-Gattung Hemiteles mit einer Uebersicht der europäischen Arten.* (Term.-rajzi Füzetek. XX. 1879, pag. 103, 501.)
177. Shuk J. dr. *Hajdúmegye leirása.* A m. orvosok és természetvizsg. 1882. Debreczenben tartott XXII. nagygyülésének alkalmából. Debreczen, 1882. *A megye állatvilágának rövid áttekintése* Dr. Shuk J.-től. *Hártyaröpüek*, pag. 149—151. (Publicatio determinationibus falsis mixta.)
178. Scopoli, J. A. *Annus IV. historico-naturalis.* Lipsiæ, 1870. *Dissertatio de Apibus.*
179. — *Annus V. historico-naturalis.* Lipsiæ, 1772. *Observationes zoologicae.*
180. Semenov, A. *Revisio Hymenopterorum Musei zoologici Academiae Caesareae scientiarum Petropolitanae.* I. Genus *Cleptes* Latr. (Mélanges biologiques tirés du Bulletin de l'Academie des sciences de St.-Pétersbourg. Tom. XIII, 1892. Bulletin N. S. II. [XXXIV] p. 497.)
181. Sichel, J. et Radoszkovszky, O. *Essai d'une monographie des Mutilles de l'ancien continent.* (Horae soc. ent. Rossicæ. VI. 1869.)
182. Simonkai L. *Arad vármegye és Arad szabad királyi város természetrajzi leirása. Aradmegye és Arad város állatvilága.* Arad, 1893. *Hymenoptera*, p. 107. (Enumeratio nonnullarum tantum specierum, paucæ fidei.)
183. Stein, J. E. P. Fr., *Eine neue Art der Gattung Homonotus* Dhlb. (Berlin. entom. Zeitschrift. III. 1859, pag. 60.)
184. Stein, R. R. *Tenthredonologische Studien.* VII. *Drei neue Blattwespen.* (Entom. Nachricht. X. 1884, pag. 301.)
185. — *Synonymisches über Blattwespen.* (Wiener entom. Zeitung. V. 1886, p. 62.)
186. Szépligeti Gy. *Adatok a gubacsdarázsok elterjedésének ismeretéhez különös tekintettel Budapest környékére.* (Természetrajzi Füzetek. XIII. 1890, p. 12.) (Andricus quadrilineatus, secundum ipsum Auctorem, delendus est.)
187. — *A magyar fauna Gasteruption fajai. Species faunae Hungaricae generis Gasteruption.* (Ibid. XVIII. 1895, pag. 80.)
188. — *Adatok a magyarországi gubacsok ismeretéhez.* (Ibid. XVIII. 1895, p. 214.)
189. — *Adatok a magyar fauna Braconidáinak ismeretéhez. Beiträge zur Kenntniss der ung. Braconiden.* (Ibid. XIX, 1896, pag. 165, 228, 285, 359.)
190. — *Ueber Polydegmon* Först. *und eine neue Gattung der Sigalphidae.* (Wiener entom. Zeitung. XV. 1896. pag. 145.)
191. — *Cephaloplites, novum genus Braconidarum.* (Természetrajzi Füzetek. XX. 1897, pag. 600.)
192. Tischbein, P. *Hymenopterologische Beiträge.* (Stett. entom. Zeit. XIII. 1852; XIX. 1868.)
193. — *Uebersicht der europäischen Arten des Genus Ichneumon* (Wesmæl) *mit Angabe der bei Birkenfeld vorkommenden und Beschreibung neuer Arten.* (Ibid. XXXIV—XXXV. 1873—74.)
194. — *Zusätze und Bemerkungen.* (Ibid. XXXVII. 1876; XL. 1879; XLII. 1881.)
195. Thomson, C. G. *Opuscula entomologica.* Fascic. XI. Lundæ. 1887.
196. Török J. *Debreczen rovarfaunájának ismertetése.* III. *Hártyaröpüek* (Hymenoptera). (A magy. orvosok és természetvizsg. Rimaszombatban tartott XII. nagygyülésének munkálatai. Pest, 1868, p. 327.)
197. Tournier, H. *Hyménoptères famille des Scolides monographie des espèces européennes et des contrées limotrophes du genre Tiphia* F. (Annal. soc. entom. Belgique. XXXIII. 1889, p. 1.)
198. Wesmael, C. *Tentamen dispositionis methodicae Ichneumonum Belgii.* (Nouv. Mém. Acad. Bruxell. XVIII. 1844.)
199. — *Ichneumonologica Miscellanea.* (Bullet. Acad. Bruxell. XXII. 1855.)
200. — *Ichneumonologica Otia.* (Ibid. XXIV. 1857.)

Ordo. HYMENOPTERA.

Fam. TENTHREDINIDAE.

Cimbex Oliv.

1. *humeralis* Geoff. *(axillaris* Panz.) — I. Budapest, Csepel, Monor, Szeged, Fehértó (Com. Csongrád). VIII. Fiume.
2. *lutea* Linn. *(saliceti* Zadd. et Brischke). — I. Budapest, Csepel, Kalocsa, Szeged, Bánlaka (Com. Bihar). III. Trencsén, Znióváralja. IV. Mons Vihorlat, Kassa. V. Zilah, Magyarpatak (Com. Szilágy), Kis-Disznód (Com. Szeben). VII. Ostri Vrh. VIII. Zengg.
3. *femorata* Linn. *(betulae* Zadd. et Brischk.) — I. Kalocsa, Szeged, Csongrád, Bánlaka. III. Tavarnok, Trencsén, Rozsnyó. IV. Balneum Szobráncz (Com. Ung), S.-A.-Ujhely. V. Mehádia. VII. Fužine.
4. *connata* Schrk *(violascens* Thoms.) — I. Budapest, Monor. III. Montes Carpathici. V. Torda (Com. Torda-Aranyos). VII. Skoljić. Species apud nos rara esse videtur.

Trichiosoma Leach.

5. *lucorum* Linn. I. Budapest, Csepel, Kalocsa, Nagyvárad.
6. *betuleti* Klg *(crataegi* Zadd. et Brischk.) — I. Budapest, Kalocsa.
7. *vitellinae* Linn. — II. Csurgó (Com. Somogy). IV. Szinnaikő. Rarum apud nos.

Clavellaria Leach.

8. *amerinae* Linn. — Fere in omni zonarum regione observata.

Abia Leach.

9. *aurulenta* Sich. — VII. Solum in regione croatica ad Ostri Vrh. et Raduć.
10. *fasciata* Linn. — I. Com. Bihar. III. Trencsén, Virágvölgy ad Poprád. V. Hátszeg, Segesvár, Tusnád. VI. Mehádia ad montem Domogled. VIII. Čavle.
11. *nigricornis* Leach. — I. Budapest; specimen unicum.
12. *candens* Knw. — III. Trencsén, Vihorlat (mons in Comitatu Zemplén).
13. *sericea* Linn. — I. Peszér, Nagyvárad, Szeged. II. Tapolcza (Com. Zala), Kopács (Com. Baranya). III. Ujbánya. V. Nagyfalu, Mezőség. VI. Ribisvölgy, Resicza, Mehádia. VII. Pakracz, Samobor, Zágráb.
14. *fulgens* Kriechb. — III. Koritnicza (balneum). V. Kerzeschora. VII. Vaganski Vrh. Solum montium altiorum incola.
15. *nitens* Linn. *(splendida* Klg.) — I. Budapest, Peszér, Kecskemét, Kalocsa. III. Tavarnok (Com. Nyitra). IV. Eperjes. VI. Mehádia, Ulma, Grebenácz (Com. Temes).
16. *hungarica* Mocs. *(mutica* Thoms. ?) — VI. Ad Mehádiam in monte Domogled specimen solum unicum inventum.

Amasis Leach.

17. *crassicornis* Rossi *(laeta* Fabr.) — I. Budapest. II. Pécs. III. Beszterczebánya, Trencsén. VIII. Fiume, Sušak, Orehovicza, Buccari, Zengg.
18. *obscura* Fabr. — I. Budapest. II. Tapolcza (Com. Zala). III. Komjáti (Com. Torna). VII. Lukoviec.

Hylotoma Latr. (Arge Schrk.)

19. *pullata* Zadd. —VII. Ogulin, Pregrada. VIII. Čavle.
20. *coeruleipennis* Retz. — I. Budapest, Kalocsa, Nagyvárad, Kalota, Szeged. II. Tapolcza. III. Trencsén, Virágvölgy (Com. Szepes). V. Nagyfalu (Com. Szilágy), Dicső-Szentmárton, Tusnád. VI. Resicza, Krassova. VII. Pakracz, Ostri Vrh. VIII. Žakalj, Draga, Orehovicza.
21. *berberidis* Schrk. — I. Budapest, Kalocsa, Nagyvárad. III. Vallis Szádellőensis et Hermanetzensis, Trencsén, Rozsnyó. IV. Kassa. V. Torda. VI. Mehádia. VII. Pregrada.
22. *enodis* Linn. (*atrata* Klg.) — I. Budapest, Péczel, Nagyvárad. III. Trencsén. IV. Kassa. V. Zilah, Tasnád, Mezőség. VI. Mehádia, Resicza. VIII. Buccari, Zengg.
23. *cyanella* Klg. — I. Budapest. III. Poprád. IV. Vizvölgy (Com. Mármaros).

24. *pleuritica* Klg. — I. Budapest, Isaszeg, Kis-Szentmiklós, Nagyvárad. VI. Mehádia. VIII. Fiume, Novi.

25. *expansa* Klg. — VII. In regione croatica ad Zágráb.

26. *ciliaris* Linn. *(coerulea* Klg.) — I. Budapest, Nagyvárad. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely. VI. Mehádia. VIII. Orehovica.

27. *ustulata* Linn. — I. Kalocsa, Nagyvárad, Debreczen. III. Trencsén, Koritnicza, Lucsivna. VI. Resicza. VII. Pakracz. VIII. Orehovica.

28. *metallica* Klg. — II. Zircz. III. Balneum Koritnicza. V. Balneum Tusnád, Dicsö-Szentmárton.

29. *atrata* Forst. — III. Trencsén. VII. Zágráb. VIII. Čavle, Zengg.

30. *segmentaria* Panz. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Nagyvárad, Debreczen. II. Pécs. III. Koritnicza. IV. Szőllőske, Mármaros. V. Nagyvizvölgy (Com. Hunyad), Nagyszeben. VII. Pakracz, Vaganski Vrh., Velebit. VIII. Orehovica.

31. *dimidiata* Fall. — V. Hucusque solum ad Tusnád inventa.

32. *fuscipennis* H.-S. — I. Budapest. VI. Mehádia. VII. Zágráb.

33. *pagana* Pnz. — In omni parte regni collecta.

34. *Frivaldszkyi* Tischb. — I. In Hungaria centrali ad Budapest.

35. *rufescens* Zadd. Knw. — I. Species solum ad urbem Kalocsa collecta.

36. *fuscipes* Fall. — VI. Specimen unicum e Resicza.

37. *melanochroa* Gm. *(femoralis* Klg.) — In omni zonarum regione observata.

38. *cyanocrocea* Först. *(coerulescens* Fabr.) — I. Farkasd, Kalocsa, Beél, Rév. II. Duna-Örs, Kőszeg. III. Trencsén. V. Transsylvania. VI. Mehádia, Jassenova. VII. Vrdnik. VIII. Fiume, Sušak, Draga, Vezica, Žakalj, Buccari.

39. *rosae* Linn. *(rosarum* Klg.) — In omni terra Hungariæ collecta.

Cyphona Dhlb.

40. *furcata* Vill. *(angelicae* Fabr.) — I. Budapest, Kalocsa, Nagyvárad, Szeghalom. III. Trencsén. IV. Tállya. V. Tasnád, Mezőség. VI. Mehádia. VII. Zágráb, Pregrada, Gospić, Grižane. VIII. Orehovica, Buccari.

41. *geminata* Gmel. — I. Budapest. II. Duna-Örs. Species sat rara esse videtur.

Schizocera Latr.

42. *melanura* Klg. — VII. Zágráb. VIII. Žakalj, Orehovica.

43. *bifida* Klg. *(intermedia* Zadd. et Brischke). — IV. Tokaj. VII. Pregrada.

44. *Peletieri* Vill. — I. Budapest; specimen solum unicum.

45. *syrmiensis* Mocs. — VII. Vrdnik; pariter exemplar tantum unum. Solum Hungariæ terram colit.

46. *Konowi* Mocs. — I. Budapest. VI. Szerb-Keresztur (Com. Torontál). Solum Hungariæ incola.

47. *maculata* Jur. *(scutellaris* H. S.) — I. Budapest, Buda-Örs. II. Duna-Örs (Com. Komárom). v. *vittata* Mocs. — I. Solum ad Budapest observata, minusve frequens.

48. *bifurca* Klg. — Teste Dalla-Torre (20, pag. 311.) etiam Hungariam inhabitat.

Monoctenus Dhlb.

49. *juniperi* Linn. — II. Visegrád (teste Mayr. in litt. ad me). VIII. Fiume.

Lophyrus Latr.

50. *virens* Klg. — I. Budapest. IV. Haurilecz (Com. Mármaros).

51. *hercyniae* Htg. — V. Solum in Görgény.

52. *polytomus* Htg. — I. Rézbánya (Com. Bihar). III. Gyurcsina (Com. Trencsén).

53. *variegatus* Htg. — I. Péczel (Com. Pest). IV. Nagymihály (Com. Zemplén). V. Tusnád.

54. *frutetorum* Fabr. — II. Zircz (Com. Veszprém). III. Trencsén. V. Zilah.

55. *pini* Linn. — I. Budapest, Kalocsa. III. Malaczka, Almás, Lozornó (Com. Pozsony), Trencsén, Tátra. VII. Slavonia.

56. *rufus* Latr. — I. Budapest. V. Görgény. VIII. Zengg. Sat. frequens.

Cladius Illig.

57. *comari* Stein. — VII. Hucusque solum ad Zágráb.

58. *crassicornis* Knw. — VII. Pariter tantum illius regionis incola ad Gospić.

59. *pectinicornis* Fourcr. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Simontornya. IV. Tarczal, S.-A.-Ujhely. V. Tasnád, Tövis. VII. Pregrada, Gospić. VIII. Sušak, Zengg.

60. *difformis* Panz. — I. Budapest, Nagyvárad, Szeged. II. Visegrád, Duna-Örs. V. Szucság (Com. Kolozs). VI. Mehádia. VII. Samobor.

61. *ramicornis* André. — I. Budapest. III. Trencsén. IV. Imreg (Com. Zemplén). V. Zilah (Com. Szilágy).

Trichiocampus Htg.

62. *viminalis* Fall. (Clad. *eucerus* Htg.) — I. Budapest, Csepel, Kalocsa, Kecskemét, Nagyvárad,

Szeged. II. Duna-Örs. III. Tavarnok, Oravicza (Com. Árva). IV. Forró, Ungvár.

63. *rufipes* Lep. *(uncinnatus* Htg.) — I. Budapest. II. Duna-Örs. VI. Jassenova. VII. Raduć.

64. *Drewseni* Thoms. — VI. Specimen unicum e Mehádia.

65. *eradiatus* Htg. — II. Solum ad Duna-Örs (Com. Komárom).

Priophorus Latr.

66. *padi* Linn. *(pallipes* Lep.) — I. Nagyvárad. VI. Mehádia. VIII. Fiume.

67. *tristis* Zadd. — Hungaria, teste Brischke (15. 1883. p. 224). VII. Zágráb. VIII. Orehovica.

Cryptocampus Htg.

68. *saliceti* Fall. *(gemmarum* Zadd.) — VII. Tantum ad Fužine.

69. *angustus* Htg. — I. Budapest. VI. Mehádia. Species sat rara.

Pontania Costa.

70. *ischnoceros* Thoms. — V. Hucusque solum in regione transsylvanica ad Görgény.

71. *gallicola* Steph. *(Vallisnieri* Htg.) — I. Budapest. III. Ujbánya (Com. Bars), Tátrafüred. IV. Homonna (Com. Zemplén).

72. *vesicator* Bremi. — II. Parád. III. Borosznó (Com. Zólyom), Dobsina. VI. Grebenácz (Com. Temes).

Pteronus Jur.

73. *pavidus* Lep. — Species etiam Hungariæ incola (Brischke).

74. *miliaris* Panz. *(fulvus* Htg.) — I. Budapest, Pilis, Csepel, Szeged, Monyásza (Com. Arad). II. Kőszeg. IV. Szobráncz. VI. Ferenczfalva, Korniaréva. VII. Vaganski Vrh., Raduć, Fužine.

75. *microcercus* Thoms. — I. Budapest, Nagyvárad. IV. Csicsvaalja, Homonna, Kassa. VII. Zágráb.

76. *salicivorus* Cam. — III. Turócz. IV. Csicsvaalja (Com. Zemplén). VII. Zágráb.

77. *virescens* Htg. — III. Tantum ad urbem Poprád.

78. *smaragdinus* Stein. — I. Budapest.

79. *miniatus* Htg. — IV. In Comitatu Zemplén ad pagum Parnó.

80. *hortensis* Htg. — I. Budapest, Szeghalom, Szeged. II. Duna-Örs, Dorogh (teste Stein). IV. S.-A.-Ujhely. V. Tasnád.

81. *myosotidis* Fabr. — Fere in omni zonarum regione.

82. *ambiguus* Fall. — I. Budapest. IV. Tokaj. Species sat rara.

83. *leucotrochus* Htg. — II. Solum in regione pannonica ad Duna-Örs.

84. *ribesii* Scop. — I. Budapest, Ócsa, Szeged. II. Duna-Örs. III. Poprád. IV. Forró, Szerenes, S.-A.-Ujhely. V. Zilah.

85. *melanocephalus* Htg. — I. Solum ad urbem Budapest.

86. *salicis* Linn. — I. Budapest, Kalocsa. II. Duna-Örs, Őszöd (Com Somogy). III. Rózsahegy. IV. Forró, Kassa. V. Tasnád, Nagyfalu. VII. Pregrada.

Amauronematus Knw.

87. *histrio* Lep. — I. Budapest. IV. Kassa. Species sat rara.

88. *vagus* Zadd. et Brischk. — VII. Ad urbem Ogulin observatus.

89 *fallax* Lep. — I. Specimen unicum ex urbe Kalocsa.

90. *leucolenus* Zadd. — IV. Exemplar unum e regione pagi Szőllőske (Com. Zemplén).

91. *solemnis* Knw. — I. Pariter unicum tantum exemplar e regione urbis Budapest. Solum Hungariæ incola.

92. *sagmarius* Knw. — I. Apud nos solum Hungariæ centralis incola.

93. *viduatus* Zett. — I. Budapest. IV. Szőllőske, Varannó (Com. Zemplén.) V. Transsylvania (Konow).

94. *nigratus* Retz. — IV. Species ad urbem Sátor-Alja-Ujhely inventa.

95. *lateralis* Knw. — VII. Solum regionis croaticæ civis; species in montibus Karst detecta.

96. *hypobalius* Zadd. et Brischke. — I. Tantum ad urbem Budapest.

97. *amplus* Knw. — IV. Ad urbem S.-A.-Ujhely a C. Chyzer detectus.

Croesus Leach.

98. *varus* Villt. — I. Budapest. V. Mehádia. VII. Pregrada, Pakrácz.

99. *Brischkei* Zadd. — V. Ad thermas Herculis sacras Mehádienses inventus.

Holcocneme Knw.

100. *coeruleocarpa* Htg. — III. Trencsén. VII. Pakracz (Com. Pozsega).

101. *Wahlbergii* Thoms. — VII. Solum in montibus Vaganski Vrh.

102. *lucida* Panz. — I. Budapest. VII. Zágráb. Species sat rara.

Nematus Jur.

103. *abdominalis* Panz. — I. Budapest. V. Görgény. VII. Zágráb.

104. *luteus* Fabr. — I. Kalocsa. II. Kőszeg (Com. Vas). III. Trencsén. V. Rumunyest. VII. Fužine.
105. *bilineatus* Klg. — VII. Zágráb, Pregrada.

Pachynematus Knw.

106. *umbripennis* Zadd. — I. Specimen unicum e regione Budapest.
107. *brachyotus* Först. — IV. Tantum ad pagum Szőllőske (Com. Zemplén).
108. *capreae* Panz. — I. Budapest, Kalocsa, Szeged. III. Vallis ad Hermanetz (Com. Zólyom). IV. Szomotor (Com. Zemplén), Kassa. V. Mehádia.
109. *rumicis* Fall. — I. Budapest. II. Oroszvár (Com. Mosony).
110. *einersbergensis* Htg. — I. Budapest, Kalocsa. II. Duna-Örs. IV. Nagymihály. V. Mehádia.
111. *xanthocarpus* Htg. — II. Tantum ad pagum Duna-Örs.
112. *leucogaster* Htg. — III. Specimen unicum ad lacum Csorba (Csorbai-tó) inveni.
113. *pallescens* Htg. — I. Budapest, Szeged. III. Lucsivna. IV. Forró.
114. *pallidicarpus* Htg. — IV. Specimen unicum in monte Vihorlat inveni.
115. *confusus* Först. — I. Specimen unicum e Budapest.
116. *obscuratus* Zadd. et Brischk. — I. Pariter e Budapest.

Lygaeonematus Knw.

117. *pineti* Htg. — I. Specimen unicum e Szeged.
118. *Saxenesii* Htg. — III. Exemplar unicum ex Oravicza (Com. Árva).
119. *ambiguus* Fall. — V. Tantum ad Görgény.
120. *compressicornis* Fabr. — IV. Tokaj.
121. *laricis* Htg. — III. In Com. Árva ad Oravicza.
122. *pallipes* Thoms. — III. Species pariter ex illa regione oritur.

Pristophora Latr.

123. *fausta* Htg. — I. Specimen unicum e Péczel (Com. Pest).
124. *conjugata* Dhlb. — III. Poprád (Com Szepes). IV. Kassa.
125. *betulae* Retz. — I. Exemplar unicum e Budapest.
126. *approximata* Först. — I. Budapest. VI. Pancsova (Com. Torontál).
127. *similator* Först. — VI. Species ad thermas Herculis sacras Mehadienses inventa.
128. *quercus* Htg. — III. Specimen unicum e Tátrafüred (Com. Szepes).
129. *appendiculata* Htg. — II. Duna-Örs. III. Oravicza. IV. Laczháza, S.-A.-Ujhely. V. Tasnád.
130. *fulvipes* Fall. — I. Budapest. IV. Parnó. VIII. Orehovica. Species sat rara.
131. *puncticeps* Thoms. — I. Specimen unicum e regione Budapest.
132. *ruficornis* Oliv. — I. Ócsa (Com. Pest). VI. Mehádia.
133. *subbifida* Thoms. — III. Exemplar unicum e Trencsén.

Micronematus Knw.

134. *pullus* Först. — I. Makkos (Com. Csongrád). VI. Mehádia.

Phyllotoma Fall.

135. *microcephala* Klg. — VI. Exemplar unicum e Zombor (Com. Bács).

Eriocampoides Knw.

136. *aethiops* Fabr. — I. Budapest, Nagyvárad, Beél, Kalota. VI. Mehádia.
137. *cinxia* Klg. — IV. Szőllőske (Com. Zemplén). VI. Ulma (Com. Temes).
138. *annulipes* Klg. — IV. Tantum ad balneum Bártfa (Com. Sáros).
139. *limacina* Retz. (*adumbrata* Klg.). — I. Debreczen. VI. Resicza. VIII. Sušak.

Hoplocampa Htg.

140. *rutilicornis* Klg. — I. Budapest, Makkos (Com. Csongrád). VIII. Orehovica.
141. *fulvicornis* Fabr. — I. Gödöllő, Besnyö. IV. S.-A.-Ujhely.
142. *ferruginea* Fabr. (*brunnea* Klg.) — I. Kalocsa, Peszér, Kecskemét, Makkos. II. Pécs. VI. Resicza. VIII. Sušak, Orehovica.
143. *crataegi* Klg. — I. Budapest. VIII. Zengg. Species sat rara.
144. *brevis* Klg. — I, Budapest. II. Bicske (Com. Fehér).

Mesoneura Htg.

145. *opaca* Fabr. (*verna* Klg.). — I. Budapest, Nagyvárad. V. Tasnád. VI. Resicza. VII. Zágráb.

Periclista Knw.

146. *melanocephala* Fabr. — I. Budapest.
147. *albiventris* Klg. (*albidopicta* Costa). — I. Budapest. VI. Mehádia.
148. *pubescens* Zadd. — I. Budapest.
v. *analis* Klg. — VI. Resicza.
149. *lineola* Klg. — VIII. Sušak.

Pareophora Knw.

150. *nigripes* Klg. *(luridiventris* Klg.). — I. Budapest. V. Peér (Com. Szilágy). VIII. Draga.

Ardis Knw.

151. *bipunctata* Klg. *(Monoph. dissimilis* Costa).— I. Budapest. II. Duna-Örs. IV. Nagymihály. VI. Mehádia.

152. *plana* Klg. — I. Budapest. II. Kőszeg (Com. Vas). IV. Forró, Nagymihály. VI. Mehádia.

Rhadinoceraea Knw.

153. *nodicornis* Knw. — VIII. Solum regionis adriaticæ civis, species a Dom. Korlević ad urbem Fiume detecta.

154. *micans* Klg. — I. Apud nos solum ad Budapest.

155. *Reitteri* Knw. — Pariter tantum in illa regione.

156. *thoracica* Tischb. — VIII. Tantum ad Vežica et Fiume.

Phymatocera Dhlb.

157. *fuliginosa* Schrk. *(aterrima* Klg.) — I. Budapest, Kalocsa, Kecskemét. II. Duna-Őrs. III. Rozsnyó. V. Nagyszeben. VIII. Orehovica.

Tomostethus Knw.

158. *nigritus* Fabr. *(nigerrimus* Klg.). — I. Budapest, Kalocsa, Nagyvárad, Vaskoh, Algyő (Com. Csongrád). VI. Mehádia.

159. *sanguinicollis* Mocs. — I. Budapest; unicum solum specimen.

160. *fuliginosus* Schrk. — I. Kalocsa, Nagyvárad, Csaba. III. Mármaros. IV. S.-A.-Ujhely. V. Tasnád, Peér, Tusnád. VI. Pancsova. VII. Fužine, Samobor (Com. Zágráb).

161. *gagathinus* Klg. — I. Budapest, Farkasd, Nagyvárad. V. Peér. VI. Mehádia, Orsova. VIII. Fiume.

162. *ephippium* Panz. — Fere in omni zonarum regione.

v. *aethiops* Knw. *(nigrans* Knw.). — I. Derekegyháza. IV. Csicsvaalja (Com. Zemplén), Varannó. VI. Mehádia. VIII. Orehovica.

163. *fuscipennis* Fall. *(luteiventris* Fall.). — I. Budapest. III. Oravicza. IV. Mező-Laborcz. V. Görgény. VI. Mehádia. VII. Lipik, Fužine. VIII. Draga.

Blennocampa Htg.

164. *assimilis* Fall. *(hyalina* Klg.). — I. Budapest, Nagyvárad, Derekegyháza. VI. Mehádia. VII. Montes Karst.

165. *pusilla* Klg. — I. Szeged. IV. Ránk (Com. Abauj). V. Nagyfalu, Peér. VI. Mehádia, Oravicza, Baziás.

166. *alternipes* Klg. — VIII. Solum ad Lopača.

167. *confusa* Knw. — I. Nagyvárad. IV. Bártfa. VI. Baziás. VIII. Zengg.

168. *subcana* Zadd. — VII. In regione croatica ad Zágráb.

169. *tenuicornis* Klg. — VIII. Tantum ad Orehovica.

Scolineura Knw.

170. *betuleti* Klg. — VII. Apud nos solum ad Zágráb.

171. *tenella* Klg. —VI. Specimen unicum e Mehádia.

172. *recta* Thoms. — IV. Tantum ad urbem S.-A.-Ujhely.

Entodecta Knw.

173. *pumila* Klg. *(pumilio* Htg.). — VII. Solum ad oppidum Stara Pazova (Com. Szerém).

Monophadnus Htg.

174. *geniculatus* Htg. — I. Budapest, Nagyvárad. VII. Fužine. VIII. Zengg.

175. *ruficruris* Brullé. — VI. Zombor (Com. Bács). VIII. Buccari.

176. *Spinolae* Klg. *(croceiventris* Klg.). — I. Budapest. VI. Mehádia, Orsova, Baziás. VIII. Žakalj, Zengg.

v. *scutellaris* André. —VI. Baziás. VIII. Orehovica, Fiume.

177. *elongatulus* Klg. — VII. Solum ad Zágráb.

178. *semicinctus* Htg. — V. In Transsylvania, secundum Mayr i. l. ad me.

179. *longicornis* Htg. — VII. Tantum ad Ogulin.

180. *monticola* Htg. — I. Ócsa, Nagyvárad, Debreczen. II. Duna-Örs. IV. Sárospatak, Erdőbénye, Nagymihály, Varannó, Bártfa. V. Tasnád, Peér. VI. Resicza, Jeselnicza (Com. Krassó-Szörény).

181. *albipes* Gmel. — I. Budapest, Nagyvárad, Rév, Szeged. III. Trencsén, Oravicza. IV. Varannó, Munkács, Mármaros. V. Peér, Görgény. VI. Mehádia, Pétervárad. VIII. Lopača.

182. *rufoniger* Tischb. — I. Budapest, Pilis. V. Tasnád. Solum Hungariæ incola.

Pseudodineura Knw.

183. *parvula* Klg. — V. Tasnád. VIII. Draga. Apud nos rara.

184. *fuscula* Klg. — VIII. Tantum ad Orehovica.

Kaliosysphinga Tischb.

185. *Ulmi* Sundev. — VIII. Ad Buccari observata.

186. *pumila* Klg. — I. Specimen unicum e Budapest.

187. *Dohrnii* Tischb. — VII. Solum ad Pregrada.

Fenella Westw.

188. *nigrita* Westw. — VIII. Apud nos solum ad Zengg.

Harpiphorus Htg.

189. *lepidus* Klg. — I. Budapest; specimen unicum.

Athalia Leach.

190. *glabricollis* Thoms. — Fere in omni zonarum regione.

191 *rufoscutellata* Mocs. — I. Budapest, Nagyvárad (Com. Bihar); minus frequens.

192. *spinarum* Fabr. — In omni parte regni communis.

193. *paradoxa* Knw. — VII. Regionis croaticæ incola, secundum auctorem (84, pag. 249.)

194. *rosae* Linn. — In omni parte regni communis.

v. *liberta* Klg. — Cum stirpe simul.

v. *cordata* Lep. — Sicuti prior et in eius societate.

195. *lugens* Klg. — IV. Homonna (Com. Zemplén). VII. Plitvica (Com. Varasd); species apud nos rara.

196. *maculata* Mocs. — I. Budapest. VI. Mehádia, Orsova. Solum Hungariæ civis.

197. *annulata* Fabr. — In montibus et regionibus subalpinis non rara.

Selandria Klg.

198. *serva* Fabr. — I. Budapest, Nagyvárad, Kalocsa, Rév, Rézbánya, Szeged. II. Kopács (Com. Baranya). III. Trencsén. IV. Tállya. V. Zilah, Tasnád, Tusnád. VI. Zombor, Rumunyest. VII. Fužine, Pregrada, Gospić.

199. *temporalis* Thoms. — IV. Ad Kis-Azar (Com. Zemplén) a C. Chyzer inventa.

200. *stramineipes* Klg. — I. Szeged. II. Szulok (Com. Somogy). VI. Mehádia. VII. Zágráb.

201. *annalis* Thoms.—VII. Est etiam regionis croaticæ incola secundum Konow (84, pag. 249.)

202. *annulitarsis* Thoms — VIII. Hucusque solum ad Buccari.

203. *cinereipes* Klg. — III. Specimen unicum e Tátrafüred (Com. Szepes).

204. *morio* Fabr. — Fere in omni parte regni.

Thrinax Knw.

205. *mixta* Klg. — VII. In montibus Karst inventa.

206. *intermedia* Knw. — V. Specimen unicum e Görgény.

Stromboceros Knw.

207. *delicatulus* Fall. *(Strongylog. eborinus* Klg.).— I. Rézbánya. III. Sztranszke (Com. Trencsén). VII. Velebit. Solum in regionibus montanis.

Strongylogaster Dhlb.

208. *multifasciatus* Fourcr. *(cingulatus* Fabr.). — III. Pozsony. IV. Montes Rabaszkala et Vihorlat (Com. Zemplén). VI. Mehádia. VII. Zágráb. VIII. Zengg.

Eriocampa Htg.

209. *ovata* Linn. — II. Kőszeg (Com. Vas). III. Tátrafüred, Virágvölgy, Krompach. V. Görgény, Rea, Hátszeg. VI. Mehádia. VII. Fužine. Regionum montanorum incola.

Poecilosoma Dhlb.

210. *pulverata* Retz. *(obesa* Klg.). — IV. Kassa. VII. Fužine.

211. *luteola* Klg — I. Budapest, Nagyvárad. II. Ácsi-erdő (Com. Komárom). III. Virágvölgy (Com. Szepes). IV. Varannó. V. Zilah. VI. Pancsova. VII. Fužine.

v. *analis* Knw. — VI. Orsova. VII. Croatia (Konow.)

212. *obtusa* Klg. — Est solum Hungariæ incola, secundum Klug et Dalla-Torre (67, p. 211.).

213. *carbonaria* Knw. — VI. Korniaréva, Mehádia. Sat rarum.

214. *candidata* Fall. — III. Specimen unicum ad Poprád (Com. Szepes) inveni.

215. *guttata* Fall. *(impressa* Klg., *submutica* Thoms.). — I. Budapest, Nyiregyháza. II. Duna-Örs. III. Oravicza. IV. Kassa. V. Görgény. VI. Mehádia. VII. Fužine, montes Karst. VIII. Zengg.

216. *hungarica* Knw. — VI. Specimen unicum e Mehádia. Est solum Hungariæ incola.

217. *longicornis* Thoms. — I. Nagyvárad. IV. Mármaros. V. Vizérvölgy (Com. Hunyad).

218. *excisa* Thoms. — I. Nagyvárad. IV. Nagymihály. VI. Mehádia.

Emphytus Klg.

219. *viennensis* Schrk. — I. Budapest, Ujpest. II. Keszthely. Species rara.

220. *cinctus* Linn. — I. Budapest, Kalocsa, Beél, Szeged. II. Duna-Örs, Zircz. III. Trencsén, Oravicza. IV. Varannó, balneum Szobráncz. V. Nagyfalu, Tasnád, Semesnye, Kolozsvár. VI. Mehádia. VIII. Sušak.

221. *togatus* Panz. *(succinctus* Klg.). — I. Budapest; rarus. VI. Zágráb.

222. *basalis* Klg. — I. Budapest, prædium Apaj. IV. Kassa. VII. Zágráb.

223. *melanarius* Klg. — I. Budapest. III. Trencsén. VI. Mehádia.

224. *rufocinctus* Retz. — I. Budapest, Monyásza (Com. Arad). II. Zircz. IV. Balneum Szobráncz. V. Nagyfalu.

225. *calceatus* Klg. *(vicinus* Lep.). — I. Budapest, Nagyvárad, Szeged. II. Oroszvár (Com. Sopron). V. Tasnád. VII. Zágráb.

226. *balteatus* Klg. — I. Solum in regione Budapest.

227. *didymus* Klg. — I. Budapest, Nagyvárad, Szeged. IV. Varannó. V. Transsylvania. VI. Mehádia. VIII. Sušak. Čavle, Zengg, Buccari.

228. *tibialis* Klg. — I. Budapest; rarus. VII. Zlatar (Com. Varasd).

229. *filiformis* Klg. — I. Budapest. IV. Beregszász. VIII. Pećine (Com. Modrus-Fiume).

v. *cereus* Klg. — I. Specimen unicum e Budapest.

v. *serotinus* Klg. — VIII. Solum ad Pećine.

v. *temesiensis* Mocs. — VI. Specimen unicum typicum e Temesvár.

230. *ustus* Klg. — I. Budapest; specimen unicum.

231. *cerris* Kollar. — I. Exemplar unicum e Budapest.

232. *pallidipes* Spin. *(grossulariae* Klg.). — I. Budapest. II. Zircz. III. Balneum Koritnicza. VI. Mehádia.

233. *tener* Fall. — I. Budapest. Sat rarus. V. Peér. VII. Ogulin.

Taxonus Htg.

234. *glabratus* Fall. *(agilis* Klg.). — I. Budapest, Dabas, Kalocsa, Kisujszállás, Csaba. II. Duna-Örs. IV. Nagymihály. VIII. Stara Pazova.

235. *equiseti* Fall. — I. Budapest. III. Trencsén. IV. Sárospatak. V. Peér. VII. Pregrada.

236. *minutus* Costa. — I. Budapest. V. Transsylvania. Species rara.

237. *sticticus* Klg. — I. Budapest. III. Trencsén. VII. Zágráb.

238. *agrorum* Fall. *(nitidus* Klg.). — I. Kalocsa, Kecskemét, Nagyvárad, Szeged. II. Duna-Örs, Neszmély. III. Trencsén, Tátrafüred.

Dolerus Jur.

239. *pratensis* Linn. *(eglanteriae* Klg.). — In omni parti regni collectus.

v. *nigripes* Knw. — I. Budapest, Nagyvárad. III. Homonna. IV. Varannó. VII. Fužine.

240. *aericeps* Thoms. — I. Budapest. VI. Mehádia. VII. Pregrada, Samobor.

v. *rufipes* Knw. — I. Nagyvárad. IV. Homonna, Szöllőske. V. Zilah, Dicső-Szentmárton.

241. *palustris* Klg. — I. Budapest; rarus. VII. Fužine.

v. *saxatilis* Klg. — V. Dornavölgy (Vallis Dorna) in Com. Besztercze-Naszód. VIII. Fužine.

242. *tremulus* Klg. *(triplicatus* Klg.). — I. Budapest. III. Trencsén. V. Nagyfalu, Peér, Mezőség, Nagy-Csür. VI. Mehádia, Orsova, Jeselnicza. VII. Zágráb. VIII. Buccari.

243. *germanicus* Fabr. *(lateritius* Klg.). — I. Budapest. IV. Varrannó. VI. Resicza.

244. *anticus* Klg. — I. Budapest, Kalocsa, Kecskemét, Nagyvárad, Szeged. II. Duna-Örs. V. Nagyfalu. VI. Ulma, mons Allion.

245. *tristis* Fabr. — III. Specimen unicum ex Oravicza (Com. Árva).

246. *dubius* Klg. — I. Pilis, Nagyvárad. III. Trencsén.

v. *abietis* Panz. *(timidus* Klg.). — I. Budapest, Kecskemét. VII. Fužine.

v. *desertus* Klg. — VII. Pregrada, Zágráb.

247. *Mocsáryi* Knw. — I. Budapest. IV. Szőllőske. V. Transsylvania. Solum Hungariæ civis.

248. *puncticollis* Thoms. — VII. Fužine. VIII. Orehovica.

249. *croaticus* Knw. — VII. Solum Croatiæ incola, species a Dom. Korlević ad pagum Stara Pazova detecta.

250. *gonager* Fabr. — Fere in omni parte regni collectus.

251. *Raddatzi* Knw. — I. Complura specimina solum e regione Budapest.

252. *picipes* Klg. *(leucopterus* Zadd.). — I. Budapest. IV. Forró, Homonna, Mező-Laborcz. V. Vizérvölgy (Com. Hunyad). VI. Mehádia. VII. Fužine, Karst, Lippik.

253. *analis* Knw. — II. Szulok (Com. Somogy); specimen unicum.

254. *fissus* Htg. *(cenchris* Htg., *varispinus* Htg.). — Fere ex omni zonarum parte.

255. *asper* Zadd. — I. Hucusque solum e Budapest.

256. *corruscans* Knw. — I. Pariter tantum e Budapest.

257. *niger* Linn. — I. Budapest, Kalocsa, Nagyvárad, Szeged. IV. Kassa. V. Transsylvania. VI. Korniaréva. VII. Gospić. VIII. Buccari.

258. *thoracicus* Klg. *(pachycerus* Htg.). — I. Szeged, Fehértó. IV. Homonna. V. Hátszeg. VII. Ogulin.

v. *quadrinotatus* Biró. — IV. Szöllőske. V. Peér, Tasnád (Com. Szilágy).

259. *haematodes* Schrk. — I. Budapest, Kalocsa, Kecskemét, Nagyvárad, Szeged. II. Duna-Örs. IV. Varannó, Rozsnyó. V. Nagyfalu, Tasnád. VII. Fužine, Pakracz, Gospić, Zágráb.

260. *sanguinicollis* Klg. — I. Budapest; valde rarus. IV. S.-A.-Ujhely. VII. Zágráb.

v. *ravus* Zadd. — I. Solum ad Kecskemét.

v. *lucens* André. — IV. Simonka, Jászó.

261. *rugulosus* Dalla-Torre *(rugosus* Knw.). — III. Specimen ex Oravicza (Com. Árva).

262. *aeneus* Htg. *(longicornis* Zadd.). — I. Budapest. III. Oravicza, lacus Csorba. IV. Varannó, Com. Mármaros. V. Szent-Gothárd. VII. Fužine, Karst, Zágráb.

263. *anthracinus* Klg. — IV. Varannó (Com. Zemplén). VI. Ulma (Com. Temes).

Loderus Knw.

264. *palmatus* Klg. — III. Trencsén. IV. Homonna. VII. Fužine.

265. *vestigialis* Klg, — III. Trencsén, Poprád. IV. Varannó. VII. Vrdnik, Gospić, Ogulin, Fužine. VIII. Čavle.

v. *plaga* Klg. — I. Specimen unicum e Budapest.

266. *pratorum* Fall. — III. Trencsén. VII. Pregrada. Sat rarus esse videtur.

Sciapteryx Steph.

267. *consobrina* Klg. — I. Budapest. V. Tasnád. VI. Mehádia. VII. Fužine.

268. *costalis* Klg. — I. Budapest, Kalocsa, Szeged. II. Duna-Örs. III. Trencsén. IV. Kassa. V. Zilah. VI. Temesvár, Resicza. VII. Pakracz (Com. Pozsega). VIII. Zengg.

Rhogogastera Knw.

269. *picta* Klg. — I. Budapest, Nagyvárad, Debreczen, Mező-Kovácsháza. II. Kőszeg. III. Virágvölgy (Com. Szepes). V. Zilah, Előpatak, Besztercze. VI. Mehádia, Orsova, Baziás. VII. Pregrada, Zágráb, Fužine. VIII. Vežica.

270. *viridis* Linn. *(scalaris* Klg.). — In regionibus montanis in omni zonarum parte collecta.

271. *punctulata* Klg. — III. Koritnicza, Tátra. V. Alpes Görgény. VI. Korniaréva, Resicza. VII. Fužine, Velebit. In montibus.

272. *pinguis* Klg. — Secundum piæ memoriæ virum Klug species solum Hungariam inhabitat (67, pag. 211.); mihi tamen ignota.

273. *discolor* Klg. *(insignis* Klg.). — Secundum auctorem species est etiam Hungariæ incola (67, pag. 203.)

274. *lateralis* Fabr. — I. Budapest, Nagyvárad. III. Trencsén, Oravicza (Com. Árva). IV. Nagymihály, Varannó. V. Mezőség, Nagyfalu (Com. Szilágy). VI. Mehádia, Resicza. VII. Zágráb, Karst.

275. *gibbossa* Fall. *(aucupariae* Klg., *solitaria* Schrk.). — I. Budapest, Nagyvárad.

Tenthredopsis Costa.

276. *Thomsoni* Knw. *(nassata* Thoms.). — I. Budapest, Péczel, Nagyvárad, Debreczen. II. Tapolcza. V. Zilah. VI. Mehádia, Resicza. VIII. Fiume, Draga, Orehovica, Vežica, Žakalj, Buccari, Zengg.

v. *cordata* Fourcr. — I. Budapest, Isaszeg. VIII. Orehovica, Vežica, Žakalj, Buccari, Zengg.

v. *femoralis* Cam. — I. Isaszeg. III. Trencsén. VII. Pakracz, Zágráb. VIII. Vežica, Orehovica.

v. *microcephala* Lep. — VIII. Hucusque solum ad Vežica.

v. *caliginosa* Cam. — VI. Mehádia. VII. Slavonia. VIII. Buccari.

277. *Raddatzi* Knw. — I. Budapest, Nagyvárad. IV. Homonna-Bresztó (Com. Zemplén). V. Nagyfalu, Mezőség. VI. Mehádia. VII. Pakracz (Com. Verőcze). VIII. Žakalj, Zengg.

v. *vittata* Knw. — I. Hucusque solum ad Kalocsa.

v. *sagmaria* Knw. — I. Tantum ad Péczel.

v. *indocilis* Knw. *(arrogans* Knw.). — I. Budapest. IV. Komjáti (Com. Torna). V. Kolozsvár. VI. Mehádia, Resicza. VII. Vrdnik. VIII. Buccari.

278. *dorsalis* Lep. — VI. Mehádia, Resicza.

v. *diluta* Knw. — I. Budapest; plura exemplaria.

279. *austriaca* Knw. — VII. Secundum auctorem est etiam Croatiæ incola (85, pag. 65 et 72.).

280. *sordida* Klg. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Tapolcza. III. Trencsén. IV. Nagymihály. V. Mezőség. VI. Resicza, Mehádia. VII. Zágráb. VIII. Orehovica.

281. *nivosa* Klg. — Secundum auctorem species etiam Hungariam inhabitat (67, pag. 210.)

282. *Korlevićii* Knw. — VIII. Orehovica, Žakalj. Zengg.

283. *dubia* — I. Budapest; tantum exemplar unum.

284. *pavida* Fabr. — I. Gödöllő. III. Trencsén, Koritnicza. V. Tihucza (Com. Besztercze-Naszód). VII. Velebit, Raduć.

285. *elegans* Knw. — I. Tantum ad Budapest.

v. *nigronotata* Knw. — I. Cum stirpe simul.

286. *fenestrata* Knw. — III. Oravicza (Com. Árva). V. Transsylvania.

287. *scutellaris* Panz. — V. Mezőség, Szt-Erzsébet. VII. Gospić (Com. Lika-Krbava). VIII. Vežica, Buccari.

288. *Coquebertii* Klg. — III. Oravicza. VII. Montes Karst.

289. *Beuthinii* Rud. — VIII. Tantum ex urbe Zengg.

290. *Tischbeinii* Mocs. *(hungarica* Tischb., nec. Klg.). — I. Rézbánya. IV. Rabaszkala (Beszkid). VI. Jeselnicza, Mehádia, Korniaréva, vallis Ribis, Oravicza, Orsova.

291. *gynandromorpha* Rud. — VIII. Fiume, Sušak, Orehovica.

292. *tarsata* Fabr. *(opacipleuris* Stein.). — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Parád. VIII. Sušak, Orehovica.

293. *neglecta* Lep. *(histrio* André). — I. Budapest; valde communis. III. Homonna-Bresztó. VI. Mehádia. VIII. Draga.

294. *stigma* Fabr. *(histrio* Klg.). — I. Budapest, Parád, Kalocsa, Nagyvárad, Debreczen. II. Tapolcza. III. Trencsén. IV. Nagymihály. V. Nagyfalu (Com. Szilágy). VI. Mehádia, Korniaréva. VII. Lipik. VIII. Draga, Žakalj.

295. *genualis* Knw. — I. Parád (Com. Heves). IV. Kis-Azar (Com. Zemplén).

296. *excisa* Thoms. — I. Budapest, Péczel, Gödöllő, Kalocsa, Nagyvárad. IV. Bártfa.

v. *binotata* Knw. — VI. Mehádia, Korniaréva.

297. *tesselata* Klg. — I. Budapest, Nagyvárad. Apud nos satis rara.

298. *hungarica* Klg. — I. Budapest; non rara, Csepel, Kalocsa, Nagyvárad, Szeged. VI. Grebenácz. Solum Hungariam inhabitat.

299. *lactiflua* Klg. — I. Budapest, Nagyvárad, Szeged. VI. Palics.

Pachyprotasis Htg.

300. *variegata* Klg. — I. Budapest. III. Poprád, Koritnicza. IV. Simonka. VI. Mehádia.

301. *antennata* Klg. — III. Trencsén, balneum Koritnicza.

302. *rapae* Linn. — In omni zonarum regione, præsertim in montibus, non rara.

Macrophya Dhlb.

303. *rustica* Linn. — Pariter in omni zonarum regione.

304. *postica* Brullé. (*Ratzeburgii* Tischb.). — I. Budapest, Csepel, Kalocsa, Kecskemét, Szeged. II. Tapolcza. VI. Kazán.

305. *erythropus* Brullé. — VIII. Orehovica, Buccari, Zengg.

v. *croatica* Korl. — VII. Fužine. VIII. Fiume.

306. *rufipes* Linn. *(strigosa* Fabr.) — I. Budapest, Kalocsa, Nagyvárad, Szeged. III. Trencsén, Nyitra. IV. Nagymihály (Com Zemplén). V. Nagyfalu, Sz.-Gothárd, Mezőség, Sz.-Erzsébet (Com. Szeben). VI. Mehádia, Orsova. VII. Zágráb. VIII. Fužine.

307. *diversipes* Schrk. *(haematopus* Panz.) — I. Budapest, Kalocsa. II. Pécs, Tapolcza (Com. Zala). III. Trencsén. V. Hátszeg, Sz.-Erzsébet. VI. Oravicza, Resicza, Mehádia. VII. Zágráb, Vrdnik. VIII. Žakalj, Draga, Buccari Zengg.

308. *militaris* Klg. — I. Budapest, Kalocsa. II. Duna-Örs, Tapolcza. IV. S.-A.-Ujhely, Nagy-Károly. VI. Oravicza, Resicza, Mehádia, Orsova. VII. Zágráb. VIII. Draga, Orehovica, Vežica, Žakalj, Buccari.

309. *eximia* Mocs. — I. Budapest, Isaszeg, rara. IV. S.-A.-Ujhely. Tantum Hungariæ incola.

310. *chrysura* Klg. — VIII. Hucusque solum ad Zágráb.

311. *erythrocnema* Costa. — VIII. Ad Orehovica inventa.

312. *cognata* Mocs. — I. Péczel, Kalocsa. III. Koritnicza. IV. Montes Rabaszkala et Vihorlat. V. Sz.-Gothárd. VI. Ferenczfalva, Mehádia, Orsova, Baziás. VII. Zágráb. Tantum regni Hungariæ incola.

313. *albimacula* Mocs. — I. Budapest, Szeged. VI. Mehádia. Solum Hungariam inhabitat.

314. *quadrimaculata* Fabr. — I. Budapest. III. Balneum Lucski. V. Hátszeg, Görgény. VI. Mehádia, Korniaréva.

v. *tarsata* Panz. — VI. Resicza. VII. Zágráb. VIII. Sušak, Orehovica.

315. *punctum-album* Linn. — I. Budapest, Farkasd, Kecskemét, Kalocsa, Nagyvárad, Szeged. II. Szombathely, Tapolcza. III. Trencsén, Ujbánya. IV. Homonna, S.-A.-Ujhely. V. Mezőség, Maros-Vásárhely, Nagyszeben. VI. Mehádia. VII. Zágráb. VIII. Orehovica.

316. *ribis* Schrk. — III. Trencsén. IV. Mármaros. V. Segesvár, Tusnád, Nagyfalu (Com. Szilágy). VII. Zágráb, Velebit.

317. *carinthiaca* Klg. — I. Budapest. VI. Resicza. Mehádia. Sat rara.

318. *Klugii* Knw. — Secundum Auctorem etiam in Croatia. (86, pag. 95.)

319. *teutona* Panz. — III. Trencsén. VI. Resicza (Com. Krassó-Szörény). Species apud nos rara.

320. *tenella* Mocs. — I. Budapest; valde rara. VII. Zágráb. Solum regni Hungariæ incola.

321. *tibialis* Mocs. — VI. Mehádia, Resicza; species rarissima. Tantum Hungariam inhabitat.

322. *crassula* Klg. — I. Budapest, Kalocsa, Nagyvárad, Beél, Szeged. II. Kapornak, Tapolcza. III. Trencsén. IV. Forró. V. Mezőség, Sepsi-Szent-György. VI. Mehádia, Grebenácz, Ulma. VII. Vrdnik, Zágráb, Pakracz.

323. *albicincta* Schrk. — I. Budapest, Kalocsa, Nagyvárad, Debreczen, Szeged. II. Csurgó. III. Trencsén. IV. Forró. V. Mezőség, Maros-Vásárhely. VI. Mehádia, Ulma, Oravicza. VII. Vrdnik, Pakracz, Zágráb, Ogulin. VIII. Fiume, Orehovica.

v. *decipiens* Knw. — VIII. Tantum ad Fiume.

324. *12-punctata* Linn. — I. Budapest, Kalocsa, Nagyvárad. III. Trencsén, Rozsnyó, montes Beszkid. IV. S.-A.-Ujhely. V. Nagyfalu, Pele, Görgény, Nagyszeben. VI. Mehádia, Resicza. VII. Gospić. VIII. Fiume, Orehovica.

v. *novemguttata* Costa. — VII. Zágráb. VIII. Žakalj.

325. *blanda* Fabr. — I. Budapest, Kalocsa, Debreczen. III. Trencsén. IV. Nagy-Károly. VI. Mehádia, Resicza. VII. Zágráb, Fužine. VIII. Vežica, Orehovica, Žakalj, Buccari.

326. *neglecta* Klg. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Duna-Örs. III. Trencsén, Bártfa. IV. Homonna-Bresztó. V. Tasnád, Mezőség, Torda, Segesvár. VI. Mehádia, Resicza, Oravicza. VII. Fužine. VIII. Sušak Vežica, Orehovica, Žakalj.

Siobla Cam.

327. *Sturmii* Klg. — I. Solum ad Kalocsa inventa.

Allantus Jur. Knw.

328. *annulatus* Klg. — I. Budapest, Kalocsa, Szeged; rarus.

329. *vespiformis* Schrk. *(pallicornis* Fabr.) — I. Budapest. VI. Mehádia. VIII. Fiume.

330. *maculatus* Fourcr. *(zonatus* Panz.) — I. Budapest, Péczel, Nagyvárad. III. Trencsén. IV. Ungvár, Mármaros. V. Tusnád.

331. *temulus* Scop. *(bicinctus* L.). — Fere in omni zonarum regione.

332. *trabeatus* Klug. *(palustris* Klg.) — III. Trencsén, Koritnicza. IV. Montes Beszkid. V. Nagyszeben. VI. Mehádia; in montibus.

333. *albicornis* Fabr. — III. Trencsén, Poprád, Koritnicza. VI. Mehádia, Orsova, Resicza, Korniaréva. VII. Pakracz, Gospić, Pregrada. Pariter in montibus.

334. *caucasicus* Ev. *(unifasciatus* Mocs.) — V. Transsylvania. VI. Mehádia, Resicza. VII. Mons Velebit, non rarus.

335. *costatus* Klug. *(viduus nob.)*. — I. Budapest, Csepel, Kalocsa, Kis-Szent-Miklós, Mártonkáta, Kecskemét, Nagyvárad, Szeged. II. Tapolcza (Com. Zala), Duna-Örs. VI. Orsova, Jeselnicza, Palics.

336. *viduus* Rossi. — VIII. Orehovica, Fiume, Buccari.

337. *Rossii* Panz. *(bifasciatus* Klg.) — I. Budapest, Farkasd, Nagyvárad, Szeged. II. Kapornak, Kőszeg. III. Trencsén, Koritnicza. VI. Mehádia, Orsova.

v. *obesus* Mocs. — I. Kalocsa. III. Poprád, Virágvölgy, balneum Lucsivna.

338. *Vespa* Retz. *(tricinctus* Fabr.) — III. Koritnicza, balneum Lucski, Virágvölgy. VII. Pakracz, Pregrada, Velebit. In montibus.

339. *scrophulariae* L. *(propinquus* Klg.) — I. Kalocsa, Nagyvárad, Rézbánya, Szeged. II. Kőszeg, Zircz. III. Trencsén. IV. Vihorlat. V. Nagy-Csür, Tusnád, Nagy-Vizvölgy. VI. Domogled, Resicza, mons Szemenik. VII. Pakracz. Pregrada, Zágráb, Gospić. VIII. Čavle.

340. *zona* Klug. *(quadricinctus* Thoms.). — I. Budapest, Péczel. III. Trencsén. V. Transsylvania. VI. Orsova, Mehádia, Korniaréva. VII. Lokve. VIII. Orehovica.

341. *marginellus* Fabr. *(succinctus* Lep., *decipiens* Först.). — I. Nagyvárad. III. Trencsén, Rózsahegy, Koritnicza. IV. Tokaj, Parnó, Mármaros. V. Tasnád. VI. Mehádia. VII. Pregrada, Samobor, Zágráb, Gospić. VIII. Orehovica.

342. *viennensis* Panz. *(omissus* Först.) — I. Kalocsa. II. Sennye (Com. Vas). IV. Szőllőske, Parnó. V. Magyarpatak, Tasnád, Déva, Sepsi-Szent-György. VII. Pregrada, Samobor.

343. *bicinctus* Fabr. *(cingulum* Klg.). — I. Budapest. III. Trencsén, Koritnicza, balneum Lucski. IV. Vihorlat. V. Előpatak, Tusnád, Segesvár. VI. Resicza.

344. *distinguendus* Stein. — II. Simontornya. III. Trencsén, balneum Lucski. V. Előpatak. VI. Mehádia, Orsova, Resicza. VIII. Fiume.

345. *fasciatus* Scop. *(zonula* Klug.) — I. Budapest, Kalocsa, Nagyvárad. II. Kőszeg. III. Trencsén, balneum Lucski. V. Mezőség, Előpatak, Nagyszeben, Tihucza. VI. Mehádia, Orsova, Resicza. VII. Pakracz, Lokve, Velebit, Fužine. VIII. Orehovica.

346. *Frauenfeldii* Gir. — Teste Dalla-Torre est etiam Hungariæ incola. (20. pag. 70.)

347. *Koechleri* Klug. *(nigrilabris* Friv.) — III. Trencsén, Rózsahegy, Koritnicza. IV. Mármaros, Bártfa, montes Beszkid. V. Transsylvania. VI. Mons Szemenik, Mehádia, Resicza.

348. *Dahlii* Klug. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa. II. Tapolcza, Oroszvár (Com. Moson).

349. *Schaefferi* Klug. — III. Hucusque solum ad balneum Koritnicza a me inventus.

350. *arcuatus* Forst. *(notha* Klug). — In regionibus montanis est ubique sui generis species frequentissima.

351. *Frivaldszkyi* Mocs. — VI. Orsova, Mehádia; est tantum Hungariæ civis.

352. *flavipes* Fourcr. *(dispar* Klug., *rufocingulatus* Tischb.) — Budapest, Farkasd, prædium Apaj, Kalocsa, Szeged.

353. *sabariensis* Mocs. — II. Tantum Hungariæ et quidem regionis pannonicæ incola, specimina typica ad Szombathely inventa.
(viduus Rossi var. *diversipennis* Mocs. — Est Syriæ et non Hungariæ incola. Vide Dalla Torre 20. pag. 82.)

Tenthredo Linn. Knw.

354. *rufipennis* Fabr. *(rufiventris* F.) — III. Trencsén, Virágvölgy ad Poprád. VI. Mehádia. Sat rara.
v. *conspicua* Klug. — VII. Hucusque solum ad Pakracz (Com. Pozsega).
355. *balteata* Klug. — IV. In Comitatu Mármaros ad Vizvölgy. VII. Zágráb.
356. *limbata* Klug. — III. Trencsén, Koritnicza.
357. *coryli* Panz. — I. Budapest, Kalocsa, Kecskemét, Oncsásza (Com. Bihar). III. Trencsén, Rózsahegy, Lucski-fürdő. IV. Bártfa, Vissóvölgy (Com. Marmaros). VI. Mehádia, Resicza, Korniaréva. VII. Zágráb, Karst. VIII. Fiume, Žakalj.
358. *obscura* Panz. — III. Koritnicza, Tátrafüred (Com. Szepes). VII. Mons Capella. In montibus.
359. *velox* Fabr. *(gracilenta* Mocs.). — III. Rózsahegy (Com. Liptó). IV. Bártfa, Mármaros, Rabaszkala in montibus Beszkid. V. Tihucza. VII. Zágráb.
360. *moniliata* Klug. — III. Lucsivna (Com. Szepes). VI. Korniaréva. VII. Pakracz. Sat rara.
361. *Semseyi* Mocs. — I. Budapest: Jánoshegy. VI. Ad montem Domogled penes Mehádiam. Solum Hungariæ incola.
362. *Lachlaniana* Cam. — III. Specimen unicum ad balneum Lucski (Com. Liptó) inveni.
363. *atra* Linn. — I. Kalocsa. III. Trencsén, Poprád, Tátraháza (Com. Szepes). IV. S.-A.-Ujhely, vallis Balzatul in Comit. Mármaros. V. Malomviz (Com. Hunyad). VI. Mehádia. VII. Pakracz, Gospić, Raduć.
364. *dispar* Klug. — I. Budapest, Kalocsa, Nagyvárad. III. Trencsén, Oravicza (Com. Árva), Alsó-Tátrafüred (Com. Szepes). IV. S.-A.-Ujhely. V. Nagyfalu (Com. Szilágy), Malomviz. VI. Korniaréva. VII. Pakracz, Fužine.
365. *colon* Klug. — III. Balneum Koritnicza (Com. Liptó), Ujbánya (Com. Bars).
366. *livida* Linn. — I. Péczel, Kalocsa, Rézbánya, Monyásza (Com. Arad). II. Zircz, Duna-Örs. III. Alsó-Tátrafüred, Poprád, Trencsén. IV. Nagy-Károly. V. Zilah, Torda. VI. Mehádia. VII. Pakracz, Lokve, Zágráb, Fužine, Karst. VIII. Fiume.
v. *annularis* Schrk. *(maura* Fabr.). — I. Budapest. III. Trencsén. VII. Zágráb; plerumque simul cum stirpe.
367. *fagi* Panz. — II. Nagy-Kapornak (Com. Zala). III. Trencsén, Poprád. Rara species.
368. *mandibularis* Fabr. — III. Trencsén, Poprád, Tátraháza (Com. Szepes). IV. Vizvölgy (Com. Mármaros). VI. Mehádia, Resicza. VII. Brusanje. In montibus.
369. *procera* Klug. — III. Specimen unicum e Poprád (Com. Szepes).
370. *Cunyi* Knw. — IV. Tantum exemplar unicum e montibus Beszkid.
371. *mesomelaena* Linn. — In regionibus montanis ubique.
v. *obsoleta* Klug. — III. Lacus Csorba in Alta-Tátra. IV. Vizvölgy (Com. Mármaros). V. Mons Bucsecs. Præcedente multo rarior.
372. *Chyzeri* Mocs. — III. Trencsén. IV. In montibus Beszkid. Species rara et solum Hungariæ propria.
373. *olivacea* Klug. — I. Kalocsa. III. Trencsén. Videtur esse rara.
374. *flava* Scop. *(flavicornis* Fabr.). — I. Kalocsa, Nagyvárad. II. Kőszeg. III. Trencsén, Poprád, Tátrafüred. IV. Fajnavölgy (Com. Mármaros). V. Nagyfalu (Com. Szilágy), Torda, N.-Szeben, Sz.-Erzsébet, Tusnád. VI. Mehádia, Orsova, Oravicza. VII. Raduć. VIII. Orehovica, Žakalj.

Lyda Fabr.

375. *erythrocephala* Linn. — I. Budapest, Kecskemét. IV. Rozsnyó (Com. Gömör). VI. Resicza.
376. *pumilionis* Gir. — IV. E comitatu Mármaros ad Vizvölgy specimen unicum.
377. *populi* Zadd. et Brischke. — VI. Secundum auctores tria exemplaria adsunt in Musæo Berolinensi e Banatu seu Hungaria meridionali (15, 1865, pag. 119.)
378. *hieroglyphica* Christ *(campestris* Fabr.). — I. Kalocsa. Kőszeg (Com. Vas). Rara.
379. *laricis* Gir. — I. Specimen unicum e Kalocsa (Com. Pest).
380. *stellata* Christ *(pratensis* Fabr.). — I. Budapest, Kalocsa. IV. Nagymihály. VII. Pakracz (Com. Pozsega).

Cephaleia Panz.

381. *abietis* Linn. *(hypotrophica* Htg.). — III. Trencsén, mons Magura. V. Brassó.
382. *signata* Fabr. *(arvensis* Panz.). — III. Oravicza, Tátrafüred.

383. *alpina* Klug *(Falleni* Dalm.). — IV. Csernagora in Comit. Mármaros. V. Görgény (Com. Csik).

384. *reticulata* Linn. — E Budapest unicum solum specimen.

Neurotoma Konow.

385. *flaviventris* Retz. *(pyri* Schrk.). — I. Budapest, Sz.-Lőrincz, Kalocsa, Kecskemét. II. Tapolcza.

386. *nemoralis* Linn. *(punctata* Fabr.). — I. Budapest, Kalocsa, Pomáz, Szeged.

387. *fausta* Klug. — I. Budapest, Kalocsa, Nyiregyháza. II. Pécs, Visegrád. V. Nagyfalu, Szent-Erzsébet (Com. Szeben). VI. Resicza, Német-Bogsán.

Pamphilius Latr.

388. *hortorum* Klug. — I. Kalocsa. II. Parád (Com. Heves). III. Poprád. IV. Bártfa.

389. *alternans* Costa *(semicincta* Zadd.). — I. Budapest, Péczel.

390. *aurantiacus* Gir. — I. Specimen unicum ad Budapest: Svábhegy inventum.

391. *stramineipes* Klg. — I. Apud nos solum in montibus Budensibus.

392. *depressus* Schrk. — I. Budapest. III. Poprád, Tátraháza. IV. Kassa, Bártfa.

393. *marginatus* Lep. — I. Specimen unicum e Budapest.

394. *latifrons* Fall. — I. Kalocsa. VI. Ulma (Com. Temes). Species rara.

395. *histrio* Latr. — I. Tria exemplaria e Kalocsa.

396. *betulae* Linn. — I. Budapest, Péczel, Csepel, Monor, Kalocsa, Kecskemét, Nagyvárad, Debreczen. II. Tata, Duna-Örs (Com. Komárom). VI. Mehádia.

397. *inanitus* Vill. *(inanis* Klug). — I. Budapest, Péczel, Kalocsa.

398. *lucorum* F. *(arbuti* Zadd.). — I. Specimen unicum e Budapest.

399. *sylvaticus* Linn. *(nemorum* Panz.). — I. Budapest, Kalocsa, Nagyvárad, Szeged. IV. Nagymihály. V. Nagyfalu. VI. Resicza. VII. Zágráb.

Megalodontes Latr.

(*Tarpa* Fabr.)

400. *exornatus* Zadd. *(Mocsáryi* André). — VI. Specimen unicum ex Orsova.

401. *flabellicornis* Germ. *(coronatus* Zadd.). — VIII. Apud nos tantum ad Orehovica, Žakalj, Zengg.

402. *flavicornis* Klug. — I. Budapest, Dabas. Sat rarus.

403. *plagiocephalus* Fabr. — I. Budapest, Kalocsa, Kecskemét, Nagyvárad, Nyiregyháza. II. Parád. Kőszeg. III. Trencsén, Beszterczebánya. IV. Tokaj. V. Zoványi fürdő, Farkadin, Torda, Segesvár, Brassó. VI. Resicza, Ujvidék. VII. Vrdnik, Velebit.

404. *spissicornis* Klug *(Klugii* Leach). — I. Nagyvárad. III. Koritnicza. V. Farkadin, Segesvár. VIII. Fiume.

405. *cephalotes* Fabr. — I. Budapest, Dabas, Kalocsa. II. Visegrád. III. Trencsén. IV. Ungvár. V. Zoványi fürdő (Com. Szilágy). VII. Vrdnik. VIII. Fiume, Žakalj, Orehovica.

406. *laticeps* Konow. — VI. Solum Hungariæ incola, in monte Domogled ad Mehádiam collectus.

Melanopus Konow.

407. *Fabricii* Leach. *(megacephala* Klug). — I. Budapest, Kalocsa, Mező-Kovácsháza. II. Siófok. III. Trencsén, Beszterczebánya. IV. Homonna. V. Torda. VI. Grebenácz, Ulma. VII. Dálya.

Fam. SIRICIDAE.

Syrista Konow.

1. *Parreysii* Spin. — VIII. Apud nos tantum ad Buccari.

Macrocephus Schlecht.

2. *linearis* Schrk. — I. Budapest, Parád. II. Pécs. V. N.-Szeben. VI. Mehádia. VII. Dálya, Vrdnik.

Janus Steph.

3. *compressus* Fabr. — I. Ad Budapest specimen tantum unicum inventum.

4. *cynosbati* Fabr. — VI. In regione banatica ad Resicza.

v. *luteipes* Lep. *(Emichii* Mocs.). — I. E Budapest solum exemplar unum.

Calameuta Knw.

5. *filiformis* Eversm. *(vagabundus* Mocs.). — I. Budapest, Szeged. II. Kőszeg. VI. Oravicza, Resicza.

Astatus Panz.

6. *niger* Harr. — I. Budapest, Kalocsa, Nagyvárad. V. Transsylvania. VI. Mehádia, Resicza. VII. Fužine.

7. *Mocsáryi* Kirby. (an prioris var. ?) — Secundum auctorem est solum Hungariæ incola (65, pag. 356.)

Cephus Latr.

8. *pulcher* Tischb. *(luteomarginatus* Gir.). — I. Budapest, Kecskemét. II. Szegzárd. IV. Sátor-

alja-Ujhely. VI. Baziás. Solum Hungariæ incola.

9. *runcator* Knw. — VIII. Fiume, Sušak, Orehovica non rarus. Solum Hungariæ civis.

10. *nigrinus* Thoms. — I. Budapest, Kecskemét. IV. Varannó. VII. Zágráb.

11. *brachycerus* Thoms. — VIII. Tantum ad Orehovica.

12. *pilosulus* Thoms. *(pumilis* André, *similis* Mocs.). — I. Budapest. V. Tasnád. VI. Mehádia, Resicza, Baziás.

13. *pygmaeus* Linn. — Est species sui generis frequentissima, in omni zonarum parte collecta.

14. *gracilis* Costa. — I. Budapest. VIII. Fiume.

15. *pallipes* Klug. — I. Budapest, Szent-Endre. VI. Mehádia.

16. *haemorrhoidalis* Fabr. — I. Kalocsa, Szeged. VI. Mehádia, Grebenácz. VIII. Buccari.
v. *punctatus* Klug *(variabilis* Mocs.). — I. Budapest, Nagyvárad. IV. Szatmár. V. Pele-Szántó. VI. Mehádia.

Monoplopus Knw.

17. *idolon* Rossi. — VI. Resicza, Orsova, VII. Diakovár.

Xyela Dalm.

18. *coniferarum* Htg. — VII. Tantum ad Fužine.

Xiphydria Latr.

19. *dromedaria* Fabr. — I. Budapest, Kalocsa, Nagyvárad, Ecseg, Szeged. III. Trencsén. V. Pele. VI. Resicza. VII. Zágráb.

20. *longicollis* Latr. *(annulata* Jur.). — I. Budapest, Debreczen. V. Tasnád. VII. Pakracz.

21. *camelus* Linn. — I. Szeged. III. Selmeczbánya. IV. Jászó (Com. Abauj), Ungvár. VII. Pregrada.

Sirex Linn.

22. *spectrum* Linn. — In pinetis, præsertim Hungariæ septentrionalis et orientalis, non rarus.

23. *juvencus* Linn. — I. Kalocsa. III. Nagy-Rőcze. V. Borszék, Tusnád, mons Retyezát. VII. Fužine. VIII. Sušak.

24. *noctilio* Fabr. *(melanocerus* Thoms.). — I. Budapest, Isaszeg. II. Kapornak, Tapolcza. III. Trencsén, Nagy-Rőcze. IV. S.-A.-Ujhely, Vissó (Com. Mármaros).

25. *carinthiacus* Knw. — III. Specimen unicum ad Borosznó (Com. Zólyom) invenit V. Szépligeti.

26. *phantoma* Fabr. — III. Tátra. IV. Bártfa, Kőrösmező (Com. Mármaros). Species ubique rara.

27. *gigas* Linn. — Est sui generis species frequentissima, in pinetis ubique non rara.

28. *augur* Klug. — III. Nagy-Rőcze (Com. Gömör). IV. Mármaros. VII. Fužine.

Tremex Jur.

29. *fuscicornis* Fabr. — I. Budapest, Csepel, Dabas, Kalocsa, Nagyvárad. V. Peér (Com. Szilágy).

30. *magus* Fabr. v. *alchymista* Mocs. — I. Hucusque solum ad Budapest observatus, ubi semel numerose educavi.

Oryssus Latr.

31. *abietinus* Scop. *(coronatus* F., *vespertilio* F.). — I. Budapest, Parád. V. Nagyfalu (Com. Szilágy). VI. Mehádia, Resicza. VII. Slavonia.

Fam. CYNIPIDAE.

Figites Latr.

1. *scutellaris* Rossi. — I. Budapest. VI. Ferenczfalva (Com. Krassó-Szörény). VIII. Novi.

Onychia Halid.

2. *Fonscolombei* Dhlb. — I. Ad Budapest in duobus solum exemplaribus inventa.

Aspicera Dhlb.

3. *scutellata* Vill. — I. Duo specimina e Budapest.

Hypoletria Först.

4. *melanoptera* Htg. — Budapest; specimen unicum.

Neuroterus Htg.

5. *aggregatus* Wachtl. — Budapest: Vadaskert, Zugliget in *Quercu Cerri*.

6. *albipes* Schck. — I. Peszér (Com. Pest) in *Quercu pedunculata*.

7. *aprilinus* Gir. — I. Budapest: Kis-Hárshegy in *Quercu pubescenti*.

8. *baccarum* L. — I. Budapest: Svábhegy *Q. sessiliflora*, Vadaskert *Q. pedunculata*, Zugliget, Farkasvölgy *Q. pubescens*. VIII. Turnjić, Orehovica *Q. pubescens* et *sessiliflora*.

9. *fumipennis* Htg. — I. Budapest: Lipótmező, Városliget, Peszér *Q. sessiliflora* et *pedunculata*. VII. Zágráb *Q. pedunculata*.

10. *glandiformis* Mayr. — I. Budapest: Vadaskert, Kis-Hárshegy, Kincstári erdő *Q. Cerris*.

11. *laeviusculus* Schck. — I. Budapest: Hortus botanicus *Q. pedunculata*, Lóversenytér, Debreczen. IV. Szőllőske (Com. Zemplén), Beregszász (Com. Bereg). VII. Zágráb.

12. *lanuginosus* Gir. — I. Budapest: Vadaskert, Lipótmező, Széchenyi-hegy *Q. Cerris*. VIII. Veprinac, Lećaste *Q. Cerris*.
13. *lenticularis* Oliv. — I. Budapest: Városliget, Lipótmező, Széchenyi-hegy, kincstári erdő, Peszér *Q. pedunculata*, Debreczen. II. Simontornya (Com. Tolna). IV. Czéke, Szőllőske, Szerednye. VII. Zágráb *Q. sessiliflora* et *pubescens*. VIII. Turnjić, Orehovica, Vežica.
14. *macropterus* Htg. — I. Budapest: Vadaskert, kincstári erdő, Zugliget *Q. Cerris*.
15. *minutulus* Gir. — I. Budapest: Lipótmező, Vadaskert *Q. Cerris*. II. Simontornya.
16. *numismalis* Oliv. — I. Budapest: Városliget, Állatkert *Q. pedunculata*, Gödöllő, Arad. IV. Szerednye (Com. Ung). VII. Zágráb *Q. pedunculata*. VIII. Orehovica *Q. sessiliflora* et *pubescens*.
17. *obtectus* Wachtl. — I. Budapest: Lipótmező, Hárshegy *Q. Cerris*.
18. *saltans* Gir. — I. Budapest: Lipótmező. Zugliget *Q. Cerris*.
19. *tricolor* Htg. — I. Peszér. IV. Deregnyő (Com. Zemplén), Beregszász (Com Bereg).
20. *vesicatrix* Schlecht. — I. Budapest: Városliget *Q. pedunculata*, Vadaskert, Jánoshegy *Q. sessiliflora*.

Dryophanta Först.

21. *agama* Htg. — I. Budapest: Lipótmező, Hárshegy, Zugliget *Q. sessiliflora*, Debreczen *Q. pedunculata*. IV. Szőllőske, Beregszász.
22. *cornifex* Htg. — I. Budapest: Lipótmező. Sashegy, Vadaskert *Q. lanuginosa*. II. Fertőtava (Lacus Fertő, Com. Sopron).
23. *disticha* Htg. — I. Budapest: Svábhegy, Lipótmező, Zugliget *Q. sessiliflora* et *pubescens*.
24. *divisa* Htg. — I. Budapest: Zugliget; Peszér, *Q. pedunculata*.
25. *flosculi* Gir. — I. Budapest: Vadaskert *Q. pubescens*.
26. *folii* Linn. — I. Budapest: Lipótmező, Svábhegy, Mária-Remete *Q. sessiliflora* et *pedunculata*, Arad. II. Lacus Fertő. III. Ujbánya. IV. Enyiczke, Ujhely, Czéke, Mád, Szerednye. VII. Zágráb *Q. pedunculata* et *sessiliflora*. VII. Pregrada (Com. Varasd).
27. *longiventris* Htg. — I. Budapest: Városliget, Állatkert, Peszér. IV. Deregnyő. VI. Zágráb *Q. pedunculata*.
28. *pubescentis* Mayr. — I. In Hungaria centrali ad Budam in *Q. pubescenti* ubique communis II. Simontornya. VI. Lippa (Com. Temes) *Q. conferta*. VIII. Orehovica, Vežica *Q. pubescens*.
29. *similis* Adl. — I. Budapest: Vadaskert *Q. sessiliflora*.
30. *Taschenbergi* Schlecht. — I. Budapest: Vadaskert, Hárshegy *Q. sessiliflora*.
31. *verrucosa* Schlecht. — I. Apud Budapest in Q. Robore rara.

Chilaspis Mayr.

32. *Löwii* Wachtl. — I. Budapest: Kincstári erdő *Q. Cerris*. II. Simontornya (Com. Tolna). VI. Lippa (Com. Temes).
33. *nitida* Gir. — I. Budapest: Vadaskert, Hárshegy, Zugliget *Q. Cerris*. II. Simontornya.

Biorrhiza Westw.

34. *aptera* Bosc. — I. Budapest: Lipótmező *Q. sessiliflora*, Farkasd, Péczel *Q. pedunculata*. IV. S.-A.-Ujhely, Kassa. V. Nagyszeben, Szász-Régen. VIII. Draga *Q. pubescens* et *sessiliflora*.
35. *terminalis* Fabr. — I. Budapest ubique in *Q. pubescenti* et *sessiliflora*, Péczel, Peszér, Arad. III. Nagy-Maros. IV. S.-A.-Ujhely, Bereczki *Q. pedunculata*. V. Tasnád (Com. Szilágy). VIII. Cilicinovo *Q. sessiliflora* et *pubescens*.

Trigonaspis Htg.

36. *megaptera* Panz. — I. Budapest: Svábhegy *Q. pubescens* IV. Ungvár *Q. sessiliflora*.
37. *renum* Gir. — I. Budapest: Ferenczhegy *Q. pubescens*, Hárshegy *Q. sessiliflora*, Arad.
38. *synaspis* Htg. — I. Budafok penes Budapest in *Q. pubescenti*.

Aphelonyx Mayr.

39. *cerricola* Gir. — I. Budapest: Kincstári erdő, Lipótmező, Vadaskert, Svábhegy, Zugliget. VIII. Čavle *Q. Cerris*.

Cynips Linn.

40. *amblycera* Gir. — I. Budapest: Lipótmező, Kincstári erdő, Farkasvölgy, Széchenyi-hegy, Budafok.
41. *argentea* Htg. — I. Budapest, Budafok *Q. pubescens*. II. Tolna. VI. Lippa (Com. Temes) *Q. conferta* Kit. (hungarica Hub.). VIII. Orehovica, Žakalj, Cilicinovo *Q. pubescens*.
42. *aries* Gir. — I. Budapest: Városliget, Peszér, Debreczen. IV. Czéke. V. Tasnád. VII. Zágráb *Q. pedunculata*.

43. *caliciformis* Gir. — I. Budapest: Lipótmező, Kincstári erdő, Vadaskert, Zugliget, Háromhatárhegy *Q. sessiliflora* et *pubescens*, Svábhegy, Budafok, Peszér.

44. *calicis* Burgsd. — I. Budapest, Peszér, Parád, Arad, Szeged. IV. Mád, Enyiczke. VII. Pregrada *Q. pedunculata*.

45. *caput-Medusae* Htg. — I. In montibus ad Budapest sitis in *Q. sessiliflora* et *pubescenti* ubique communis, Peszér *Q. pedunculata*, Arad. VI. Sistarovecz et Lippa (Com. Temes) *Q. conferta*. VIII. Orehovica, Čavle *Q. pubescens* et *sessiliflora*.

46. *conglomerata* Gir. — I. Budapest pariter in *Q. sessiliflora* et *pubescenti* sat frequens, Peszér, Parád. II. Apáti (Com. Somogy), Ujbánya. IV. Deregnyő, Sátoralja-Ujhely, Beregszász, Vinna (Com. Ung). VII. Zágráb. VIII. Orehovica.

47. *conifica* Htg. — I. Budapest: Széchenyi-hegy, Kincstári erdő, Svábhegy, Vadaskert *Q. sessiliflora* et *pubescens*. IV. S.-A.-Ujhely. VIII. Orehovica, Fiume *Q. pubescens*.

48. *coriaria* Haimh. — I. Budapest *Q. pubescens* et *sessiliflora*, Peszér. II. Simontornya. V. Tasnád, Magyar-Csaholy (Com. Szilágy). VI. Lippa. VIII. Draga, Orehovica *Q. pubescens*.

49. *corruptrix* Schlecht. — I. Budapest: Városliget, Mária-Remete *Q. pedunculata*, Hortus zoologicus *Q. monticola* Mchx, Debreczen. IV. Mád, Czéke. V. Tasnád.

50. *galeata* Gir. — I. Budapest: Lipótmező, Vadaskert, Kincstári erdő, Farkasvölgy, Budafok *Q. sessiliflora*, Városliget *Q. pedunculata*, Állatkert *Q. monticola*, Hárshegy *Q. pubescens*.

51. *glutinosa* Gir. — I. Budapest: Lipótmező, Farkasvölgy, Széchenyi-hegy, Svábhegy, Kincstári erdő, communis in *Q. sessiliflora* et *pubescenti*. II. Parád (Com. Heves).

v. *coronata* Gir. — I. Budapest, simul cum stirpe. VIII. Čavle, rara.

v. *mitrata* Mayr. — I. Pariter, sed rarius. IV. Czéke.

52. *Hartigii* Koll. — VIII. Solum in regione adriatica: Turnjić, Orehovica, Buccari.

53. *hungarica* Htg. — I. Budapest *Q. pedunculata*, Peszér, Nagyvárad, Debreczen, Arad. IV. Deregnyő. VI. Lippa. VII. Zágráb.

54. *Kollari* Htg. — I. Budapest *Q. pedunculata* et *Yellowi* Hort., Budafok *Q. pubescens*, Peszér, Kis-Szentmiklós, Kalocsa, Parád, Szeged. II. Visegrád, Simontornya, Lacus Fertő. III. Nagy-Maros, Ujbánya, Borosznó. IV. Deregnyő, Enyiczke. V. Magyar-Csaholy. VI. Lippa. VIII. Orehovica *Q. pubescens* et *sessiliflora*.

55. *lignicola* Htg. — I. Budapest in *Q. sessiliflora*, *pedunculata*, *Yellowi* et *monticola*, Peszér, Debreczen, Kalocsa. II. Visegrád. III. Nagy-Maros. IV. Deregnyő. V. Tasnád, Magyar-Csaholy. VII. Zágráb. VIII. Orehovica.

56. *polycera* Gir. — I. Budapest, Budafok *Q. pubescens*, Szt.-Lőrincz. IV. Bereczki, Beregszász. VIII. Vežica, Klana *Q. pubescens* et *sessiliflora*.

v. *subterranea* Gir. — I. Budapest: Széchenyi-hegy, kincstári erdő, Budafok *Q. sessiliflora*.

57. *tinctoria* Oliv. — I. Budapest *Q. pedunculata*, Peszér, Parád. III. Ujbánya. IV. Beregszász. V. Tasnád. VIII. Turnjić, Orehovica *Q. sessiliflora* et *pubescens*.

58. *truncicola* Gir. — I. Budapest: Lipótmező, Svábhegy, Kincstári erdő *Q. sessiliflora* et *pubescens*, Állatkert *Q. pedunculata*.

Andricus Htg.

59. *Adleri* Mayr. — I. Ad Budapest, *Q. Cerris* sat rarus.

60. *aestivalis* Gir. — I. Budapest: Vadaskert, *Q. Cerris*.

61. *amenti* Gir. — I. Budapest: Svábhegy *Q. sessiliflora*.

62. *autumnalis* Htg. — I. Budapest: Lipótmező *Q. pubescens*.

63. *burgundus* Gir. — I. Budapest: Kincstári erdő *Q. Cerris*.

64. *callidoma* Htg. — I. Budapest: Lipótmező *Q. pubescens* et *sessiliflora*.

65. *cirratus* Adl. — I. Budapest: Hárshegy *Q. sessiliflora*.

66. *collaris* Htg. — I. Budapest: Lipótmező *Q. sessiliflora*.

67. *corticis* Htg. — IV. Bereczki, Ujhely.

68. *crispator* Tschek. — I. Budapest: Jánoshegy, Hárshegy, Hidegvölgy *Q. Cerris*, Kincstári erdő *Q. Cerris*.

69. *cryptobius* Wachtl. — I. Budapest: Lipótmező. Kis-Hárshegy *Q. Cerris*.

70. *curvator* Htg. — I. Budapest *Q. sessiliflora* et *pedunculata*. III. Ujbánya. IV. Bereczki *Q. sessiliflora*.

71. *cydoniae* Gir. — I. Budapest: Szépjuhászné, Kis-Hárshegy, Vadaskert, Lipótmező, Kincstári erdő *Q. Cerris*.

72. *fecundatrix* Htg. — I. Budapest *Q. pedunculata* et *Q. sessiliflora*, Péczel, Monor, Debreczen, Rákospalota. II. Lacus Fertő.

IV. Enyiczke, Czéke, Mád, Deregnyő. VII. Zágráb *Q. pedunculata*. VIII. Orehovica *Q. pubescens*.

73. *Giraudi* Wachtl. — I. Budapest: Városliget, Állatkert *Q. pedunculata*.

74. *glandium* Gir. — I. Budapest: Hárshegy, Pilishegység *Q. cerris*.

75. *glandulae* Htg. — I. Budapest: Lipótmező *Q. sessiliflora* et *pubescens*.

76. *globuli* Htg. — I. Budapest: Lipótmező, Hárshegy, Zugliget, Svábhegy *Q. sessiliflora* et *Q. lanuginosa*, Peszér.

77. *grossulariae* Gir. — I. Budapest: Vadaskert, Kincstári erdő *Q. Cerris*, Eger (Com. Heves).

78. *inflator* Htg. — I. Budapest *Q. pubescens* et *pedunculata*, Peszér. IV. Bereczki. V. Tasnád. Magyar-Csaholy.

79. *Kirchsbergii* Wachtl. — I. Budapest: Állatkert, Lipótmező *Q. pedunculata*.

80. *lucidus* Htg. — I. Budapest *Q. pubescens*, Kis-Szentmiklós, Parád, Arad. II. Visegrád. III. Nagy-Maros. V. Tasnád, Magyar-Csaholy. VI. Lippa. VIII. Orehovica, Čavle *Q. pubescens* et *sessiliflora*.

81. *Malpighii* Adl. — I. Budapest: Állatkert *Q. Yellowi* Hort.

82. *marginalis* Adl. — I. Budapest: Városliget, Állatkert *Q. pedunculata*.

83. *Mayri* Wachtl. — I. Budapest: Lipótmező *Q. pedunculata*, régi lóversenytér *Q. Robur*, Peszér. VI. Sistarovecz (Com. Temes) *Q. conferta*.

84. *multiplicatus* Gir. — I. Budapest, Pilis-hegység *Q. Cerris*. II. Simontornya. III. Teplicske et Nyék (Com. Hont). V. Tasnád, Magyar-Csaholy. VIII. Čavle, Lopača.

85. *occultus* Tschek. — I. Budapest: Kincstári erdő *Q. pubescens*.

86. *ostreus* Gir. — I. Budapest: Városliget, Állatkert, Zugliget, Lipótmező *Q. sessiliflora*, Peszér *Q. pedunculata*, Gödöllő, Debreczen. IV. Czéke.

87. *radicis* Fabr. — I. Budapest: Jánoshegy, Széchenyi-hegy, Hárshegy *Q. sessiliflora*, Svábhegy, Kincstári erdő. IV. Czéke, Varannó.

88. *ramuli* Linn. — I. Budapest: Vadaskert, Zugliget *Q. sessiliflora* et *pubescens*.

89. *rhizomatis* Htg. — I. Budapest: Széchenyi-hegy *Q. sessiliflora*.

90. *Seckendorfii* Wachtl. — I. Budapest: Svábhegy, Mária-Remete, Hárshegy *Q sessiliflora*, Lipótmező *Q. lanuginosa*.

91. *seminationis* Adl. — I. Budapest: Vadaskert *Q. pedunculata*.

92. *serotinus* Gir. — I. Budapest: Széchenyi-hegy *Q. sessiliflora*.

93. *Sieboldii* Htg. — I. Budapest: Széchenyi-hegy, Kincstári erdő, Budafok *Q. sessiliflora*.

94. *singulus* Mayr. — I. Budapest: Hárshegy *Q. Cerris*.

95. *solitarius* Fonsc. — I. Budapest *Q. sessilifolia* et *pubescens*. IV. Czéke (Com. Zemplén). VIII. Turnjić, Orehovica, Žakalj *Q. pubescens* et *sessilifolia*.

96. *superfetationis* Gir. — I. Budapest: Állatkert *Q. pedunculata*, Hárshegy *Q. pubescens*, Lóversenytér *Q. Robur*, Peszér.

97. *testaceipes* Htg. — I. Budapest: Budakesz, Kincstári erdő *Q. sessilifolia*, Peszér *Q. pedunculata*.

98. *trilineatus* Htg. — I. Budapest: Lipótmező *Q. pubescens*, Pilishegység *Q. Robur*.

99. *urnaeformis* Fonsc. — I. Budapest: Vadaskert, Széchenyi-hegy, Sashegy, Budafok *Q. pubescens*.

Diastrophus Htg.

100. *Mayri* Reinh. — I. Budapest: Hárshegy in *Potentilla argentea*.

101. *rubi* Bouché. — I. Budapest: Pilishegy, Pilis-Szántó in *Rubo corylifolio*, Peszér. III. Ujbánya *Rubus caesius*. IV. Bereczki, Ungvár *Rubus fruticosus*, Varannó. VII. Sljeme *Rubus fruticosus*.

Synophrus Htg.

102. *politus* Htg. — I. Budapest. II. Simontornya. IV. Czéke. V. Magyar-Csaholy.

Sapholytus Först.

103. *undulatus* Mayr. — I. Budapest ex *Aphelonice cerricola* (Szépligeti).

Synergus Htg.

104. *erythrostomus* Htg. — I. Budapest e *Cynipe lignicola* (Mayr).

105. *evanescens* Mayr. — I. Budapest ex *Andrico fecundatrice* (Mayr), ex *Andrico multiplicato* (Szépl.).

106. *orientalis* Htg. (*melanopus* Htg.). — I. Budapest e *Cynipe hungarica, tinctoria, Kollari, lignicola, conglomerata, glutinosa, Andrico lucido* (Mayr), Bélye (Com. Baranya). III. Nagy-Salló (Com. Bars), Jásztelek, Videfalva (Com. Nógrád).

107. *pallicornis* Htg. — I. Budapest e *Cynipe hungarica* (Mayr), e *Dryophanta pubescentis* (Szépl.).
108. *pallidipennis* Mayr. — I. Budapest e *Cynipe conifica* (Mayr).
109. *Reinhardii* Mayr. — I. Budapest e *Cynipe Kollari* (Mayr).
110. *variabilis* Mayr. — I. Budapest ex *Aphelonice cerricola* (Szépl.).
111. *vulgaris* Htg. — I. Budapest e *Cynipe glutinosa* v. *coronata*; e *Cynipe tinctoria* (Szépl.).

Ceroptres Htg.

112. *arator* Htg. — I. Budapest e *Cynipe hungarica* (Mayr).

Periclistus.

113. *Brandtii* Rtzb. — I. Budapest e *Rhodite rosae.*

Xestophanes Först.

114. *potentillae* Rtzb. — I. Budapest e *Potentilla reptante* (Szépl.).

Aulax Htg.

115. *glechomae* Htg. — I. Monor in *Glechoma hederacea*, Mátra in *Gl. hirsuta*, Szeged. III. Dobsina (Com. Gömör), Baldócz (Com. Szepes), Ujbánya *Gl. hirsuta*. IV. Deregnyő (Com. Zemplén) in *Gl. hederacea*. VII. Kamenitz (Com. Szerém) (Szépl.).
116. *hieracii* Bouché. — I. Budapest in *Hieracio boreali, tenuifolio* et *umbellato* communis (Szépl.), Peszér. II. Gősfa (Com. Vas) in *Hieracio vulgato*. IV. Ungvár in *Hieracio aureo* (Szépl.).
117. *Kerneri* Wachtl. — I. Budapest et Sóshegy (Com. Nógrád) in *Nepeta pannonica* (Szépl.)
118. *papaveris* Perr. v. *minor* Htg. — I. Budapest: Orbánhegy in *Papavere Rhoeade.*
119. *Rogenhoferi* Wachtl. — I. Budapest in *Centaurea scabiosa* ubique communis.
120. *scorzonerae* Gir. — I. Budapest: Sashegy, Lipótmező in *Scorzonera austriaca.*
121. *salviae* Gir. — VIII. Trsat, Draga, Vežica in *Salvia officinali.*.
122. *scabiosae* Gir. — I. Budapest in *Centaurea Sadleriana*. III. Baldócz (Com. Szepes) in *Centaurea scabiosa* (Szépl.).

Timaspis Mayr.

123. *lapsanae* Karsch. — I. Budapest: Budakesz, Vadaskert, Parád (Com. Heves), *Lapsana communis* (Szépl.).

Rhodites Htg.

124. *eglanteriae* Htg. — I. Budapest: vizivárosi temető in *Rosa canina* et *austriaca*, Rákos, Budafok in *Rosa scabrata* v. *ovifera* et *spinosissima*. III. Tátra in *Rosa alpina* (Szépl.). VII. Pregrada in *Rosa canina.*
125. *Mayri* Schlecht. — I. Budapest: Sashegy, Budakesz in *Rosa canina* (Szépl.).
126. *rosae* Linn. — I. Budapest in *Rosa canina* communis, Arad. VI. Herkulesfürdő (ad thermas Herculis sacras Mehadienses). VII. Zágráb, Pregrada.
127. *rosarum* Gir. — I. Budapest: vizivárosi temető in *Rosa canina*,
128. *spinosissimae* Gir. — I. Budapest: vizivárosi temető in *Rosa canina*, Háromhatárhegy in *Rosa gallica, canina* et *pimpinellifolia* (Szépl.), Budafok in *Rosa spinosissima* v. *megalanthe* Borb.

Ibalia Latr.

129. *leucospoides* Kochenw. *(cultellator* Fabr.). — I. Budapest, Kalocsa. II. Pápa (Com. Veszprém). III. Borosznó (Com. Zólyom), Koritnicza (balneum), Trencsén. V. Nagyszeben, Nagy-Csűr, Tusnád, Borszék in pinetis. VIII. Zengg.

Fam. EVANIIDAE.

Evania Latr.

1. *appendigaster* Linn. — Etiam Hungaria, teste Schletterer (171, 1889, pag. 138).
2. *punctata* Brullé. — Pariter etiam Hungariam inhabitat, teste Schletterer (171, 1889, pag. 141); nobis tamen adhuc non obvia.
3. *minuta* Oliv *(Brachygaster).* — I. Budapest. VI. Mehádia, Orsova, Baziás. VII. Gospić. VIII. Buccari.

Gasteruption Latr. Schlett.

(*Foenus* Auct.).

4. *affectator* Linn. — I. Budapest, Kecskemét, Beél (Com. Bihar), Szeged, Eger, Gúth, Hortobány. II. Duna-Örs, Pécs, Bodajk. III. Ujbánya, Besztercebánya, Poprád, Koritnicza, Trencsén, Emődpuszta, Rajecz. IV. Zsihovecz (Com. Mármaros). V. Tasnád, Nagyfalu, Peér, Semesnye, Sepsi-Sz.-György. VI. Mehádia, Orsova, Oravicza. VII. Karst, St.-Giorgio, Josipdol (Schlett.).
5. *rubricans* Guér. — V. Pele-Szarvad (Com. Szilágy), Borszék. VI. Mehádia. VIII. Carlopago.
6. *rugulosum* Ab. *(Kohlii* Schlett.). I. Kecskemét. II. Boglár. III. Borosznó, Ujbánya. IV. Szőllőske.

VI. Mehádia, Berzászka. VII. Grižane, St.-Giorgio. VIII. Buccari.

7. *tibiale* Schlett. — I. Budapest. IV. S.-A.-Ujhely. V. Pele-Szarvad. VII. Diakovár.

8. *pyrenaicum* Guér. — I. Kecskemét, Beél (Com. Bihar). V. Kolozsvár. VIII. Sušak.

9. *Freyi* Tourn. — I. Gúth (Com. Szabolcs). V. Kolozsvár, Szucság. VI. Mehádia, Orsova.

10. *foveolatum* Schlett. — I. Budapesl, Gúth. II. Duna-Örs. IV. Erdőbénye.

11. *pedemontanum* Tourn. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa, Hortobány (Com. Hajdú), Nagyvárad. II. Badacsony. III. Ujbánya, Borosznó. IV. Varannó, Erdőbénye. V. Tasnád, Peér. VI. Mehádia, Ferenczfalva. VII. Croatia (Schlett.), Grižane.

v. *Goberti* Tourn. — I. Budapest. VI. Mehádia.

12. *terrestre* Tourn. — I. Debreczen. V. Transsylvania (Schlett.). VI. Mehádia.

13. *Tournieri* Schlett. — I. Budapest, Kisujszállás, Parád, Nagyvárad, Beél, Hortobány, Gúth. III. Ujbánya, Emődpuszta (Com. Nyitra). IV. Tokaj, S.-A.-Ujhely. V. Peér, Sepsi-Sz.-György, Semesnye, Szucság. VI. Mehádia. VII. Zágráb, Grižane.

14. *Thomsoni* Schlett. (*jaculator* Fabr. et Auct.?) — I. Beél, Debreczen, Gúth, Szeged. II. Szegzárd. IV. Homonna. V. Peér, Semesnye, Segesvár. VII. Velebit, St.-Giorgio. VIII. Buccari.

15. *vagepunctatum* Costa. — I. Budapest, Debreczen, Beél, Szeged. IV. Forró (Com. Abauj). VIII. Buccari.

16. *nigrescens* Schlett. — Secundum auctorem species etiam Hungariam inhabitat. (171. 1890. pag. 422.)

17. *subtile* Thoms. — IV. Bártfa (Com. Sáros). VIII. Fiume (Schlett.).

18. *Kriechbaumeri* Schlett. — I. Kalocsa. IV. Zsihovecz (Com. Mármaros). VII. Croatia (Schlett.).

19. *granulithorax* Tourn. (*distinguendum* Schl.) — I. Budapest. II. Bodajk (Com Fehér). III. Ujbánya (Com. Barcs). IV. Nagymihály. V. Szucság. VI. Orsova. VIII. Sušak.

20. *hungaricum* Szépl. — I. Budapest, Farkasd. II. Boglár, Bodajk. III. Beszterczebánya, Emődpuszta. V. Tasnád, Kolozsvár, Szucság. VI. Orsova. VII. Dálya, Pazarište.

Aulacus Jur.

21. *striatus* Jur. (*exaratus* Ratzbg.) — IV. Szinna (Com. Zemplén). VI. Resicza (Com. Krassó-Szörény).

22. *gloriator* Fabr. (*flagellatus* Nees, *fasciatus* Kriechb.) — I. Budapest, Városonkolyos (Com. Bihar). VI. Mehádia. VII. Zágráb. VIII. Fužine.

23. *Patrati* Aud. Serv. (*Latreillanus* Nees.) — I. Budapest, Ujpest, Nagyvárad, Szeged. V. Peér. VI. Ulma, Grebenácz (Com. Temes). VII. Diakovár.

Fam. TRIGONALYDAE.

Trigonalys Westw.

1. *Hahnii* Spin. — III. Species rarissima, hucusque tantum in unico specimine ad balneum Lucski a me inventa.

Fam. ICHNEUMONIDAE.

Chasmodes Wesm.

1. *lugens* Grav. — I. Péczel (Com. Pest), Nagyvárad. II. Sz.-Márton (Com. Baranya). IV. Czéke (Com. Zemplén). VI. Resicza (Com. Krassó-Szörény), Mehádia. VII. Pazarište.

Exephanes Wesm.

2. *hilaris* Grav. — I. Budapest, Péczel, Beél (Com. Bihar). II. Pécs. V. Tasnád (Com. Szilágy).

3. *occupator* Grav. — I. Budapest. VI. Mehádia. VIII. Carlopago.

Ichneumon Linn.

4. *pisorius* Linn. — II. Zircz. III. Tavarnok, Trencsén, Turócz. IV. S.-A.-Ujhely. VI. Resicza. VIII. Orehovica, Žakalj.

5. *Bohemanni* Holgr. — I. Budapest, Csepel. II. Sóly (Com. Veszprém). VI. Mehádia. Rarus.

6. *sugillatorius* Linn. — I. Specimen unicum e Budapest.

7. *cyaniventris* Wesm. — I. Budapest. VI. Resicza, Mehádia. Rarus.

8. *falsificus* Wesm. — I. Apud Gúth in Comitatu Szabolcs specimen unicum inventum.

9. *sinister* Wesm. — VII. Hucusque tantum in monte Velebit.

10. *leucocerus* Grav. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Kapornak (Com. Zala), Tata. IV. Eperjes. V. Tusnád. VI. Orsova, Mehádia. VII. Zágráb, Cernik, Zlatar. VIII. Orehovica.

11. *sexguttatus* Kriechb. — I. Specimen unicum typicum cognitum ad Budakesz penes Budapest inventum est.

12. *rudis* Fonsc. — I. Pariter tantum in uno exemplari ad Budapest.

13. *lineator* Grav. — I. Budapest e pupa *Cymatophorae octogesimae* Hübn., Peszér, Mártonkáta. III. Trencsén. IV. Csornakleva (Com Mármaros). VIII. Orehovica, Žakalj, Buccari.

14. *ferreus* Grav. — I. Budapest e *Hydroecia leucographa* Bkh., Farkasd, Gödöllő, Peszér, Nagyvárad, Parád. II. Kőszeg. III. Rózsahegy, Poprád, Turcsek. V. Tasnád, S.-Sz.-György, balneum Tusnád. VI. Mehádia. VII. Pregrada. VIII. Sušak, Orehovica, Žakalj.

15. *rufinus* Grav. — VI. Mehádia. VIII. Fiume, Draga.

16. *microstictus* Grav. — IV. Eperjes. VIII. Orehovica.

17. *ruficauda* Wesm. — I. Budapest e pupis *Cosmiae ablutae* Hübn. numerose educatus. VII. Sveto Berdo et Velebit.

18. *comitator* Linn. — I. Budapest, Kis-Szentmiklós. II. Tata. III. Turcsek (Com. Túrócz). V. Nagyfalu (Com. Szilágy). VI. Hungaria meridionalis. VIII. Lopača. VIII. Buccari.

19. *derasus* Wesm. — IV. Balneum Koritnicza (Com. Liptó), mons Vihorlat (Com. Zemplén). VII. Resicza. VIII. Montes Zagrabienses.

20. *bilineatus* Grav. — I. Budapest. VII. Grohovo.

21. *consimilis* Wesm. — I. Budapest; unicum solum specimen.

22. *castaniventris* Grav. — I. Budapest, Pilis. IV. Bereczki. VI. Mehádia. VIII. Fiume.

23. *puerperae* Mocs. — I. Ex hac formosa specie apud me hucusque sex exemplaria exclusa sunt e pupis *Catocalae puerperae* Giorn., Parád. Solummodo Hungariæ incola.

24. *fuscipes* Gmel. — IV. Jászó (Com Abauj), Ungvár, S.-A.-Ujhely, Erdőbénye, Eperjes. VIII. Orehovica.

25. *imperiosus* Wesm. — Species, secundum auctorem, ex Hungaria oritur (200, pag. 10.) Solum terræ nostræ civis.

26. *albicollis* Wesm. — I. Budapest. VII. Zágráb. VIII. Žakalj. Rarus.

27. *sarcitorius* Linn. — Ubique communis. E pupis *Hydroeciae leucographae* Bkh. mas et femina exclusi.

28. *confusorius* Grav. — I. Budapest. III. Montes Tátra. IV. S.-A.-Ujhely, Szinnaikő (Com. Zemplén), Mármaros. VII. Pakracz.

29. *stramentarius* Grav. — I. Budapest. II. Sárbogárd (Com. Fehér). III. Trencsén. VII. Pregrada, Zágráb.

30. *cinctor* Kriechb. — IV. Tantum Hungariæ et regionis septentrionali-occidentalis incola, ad Runyina (Com. Zemplén) detectus.

31. *bucculentus* Wesm. — I. Budapest, Szeged. II. Öszöd (Com. Somogy). III. Trencsén. IV. Bártfa, Eperjes, Vihorlat, Szinnaikő. VI. Mehádia, Resicza. VIII. Fiume, Žakalj.

32. *suspiciosus* Wesm. — III. Körmöczbánya, Poprád, balneum Lucsivna, Virágvölgy (Com. Szepes). IV. Sátoralja-Ujhely, Nagymihály, Szinnaikő, Zsihovecz (Com. Mármaros). V. Búzamező (Com. Szolnok-Doboka), Segesvár, Előpatak, Tihucza. VII. Velebit.

33. *gracilentus* Wesm. (*adscendens* Tischb.). — I. Budapest. III. Trencsén. V. Borszék. VI. Mehádia. VII. Zágráb, Pregrada.

34. *terminatorius* Grav. — I. Budapest e *Charitptera culta* Fabr., Rézbánya (Com. Bihar). III. Trencsén, Rózsahegy, balneum Lucsivna. V. Előpatak, Tusnád, Tihucza. VI. Mehádia, Német-Bogsán, Korniareva, Resicza. VI. Zágráb, Velebit, Pregrada.

35. *vivacior* Tischb. — IV. Ad Szinnaikő specimen unicum inventum.

36. *luctatorius* Linn. — In omni fere zonarum regione.

37. *proletarius* Wesm. — Pariter inhabitat magnam regni Hungariæ partem.

38. *gradarius* Wesm. — I. Specimen unicum e regione Budapest.

39. *latrator* Fabr. — I. Budapest. II. Karancs (Com. Baranya). IV. S.-A.-Ujhely, Homonna-Jeszenő (Com. Zemplén). VI. Ferenczfalva (Com. Krassó), Ulma, Mehádia.

40. *perhiematus* Tischb. — VI. In montibus Mehádiensibus ad Bobok.

41. *analis* Wesm. — III. Hucusque solum in montibus Tatricis.

42. *inquinatus* Wesm. — I. Budapest, Kis-Szent-Miklós, Nagyvárad. II. Szent-Márton (Com. Baranya). III. Oravicza (Com. Árva). IV. Eperjes, S.-A.-Ujhely, Szinnaikő.

43. *firmipes* Wesm. — I. Budapest, Péczel. IV. Nagymihály. VI. Ferenczfalva.

44. *intermixtus* Tischb. (*finitimus* Tischb.). — II. Duna-Örs (Com. Komárom); unicum solum specimen.

45. *alboguttatus* Grav. — IV. Eperjes e pupa *Porthesiae auriflуae* Schiff. educatus. V. Mehádia ad montem Bobok.

46. *tuberculipes* Wesm. — I. Budapest. IV. In montibus Beszkid ad Orosz-Ruszka. VIII. Sušak.

47. *balteatus* Wesm. — I. Budapest. IV. Vihorlat (Com. Zemplén). VI. Ulma. VII. Zágráb.

48. *grossorius* Fabr. — I. Budakesz, Csepelsziget.

II. Pécs, Boglár, Kőszeg. IV. Szinnaikő. VI. Resicza, Mehádia.

49. *bellipes* Wesm. — III. Virágvölgy penes Poprád (Com. Szepes), in unico solum specimine a me inventus.

50. *pistorius* Grav. — I. Kalocsa. III. Trencsén, Rózsahegy, balneum Lucski. IV. S.-A.-Ujhely, Szinnaikő. VII. Pakracz (Com. Pozsega), Pregrada, Zágráb. VIII. Cirkvenica.

51. *alpicola* Kriechb. *(vafer* Tischb.). — III. Koritnicza. IV. Montes Beszkid, Runyina (Com. Zemplén). VII. Pakracz, Sveto Berdo, Vaganski Vrh.

52. *capito* Kriechb. — VI. Ad thermas Herculis sacras Mehadienses in unico solum specimine.

53. *culpator* Schrk. — Est sui generis fere frequentissima species.

54. *scutellator* Grav. — I. Budapest. III. Koritnicza. VI. Ulma (Com. Temes). VII. Zágráb.

55. *trilineatus* Grav. — I. Specimen unicum e Budapest.

56. *multiannulatus* Grav. — I. Budapest e *Mammestrae oleraceae* L. pupis in pluribus exemplaribus exclusus, Péczel, Kalocsa. IV. Eperjes, Mármaros. VI. Ulma. VII. Pregrada.

57. *molitorius* Linn. — II. Sz.-Márton (Com. Baranya). IV. Eperjes, Szinnaikő. VII. Pakracz.

58. *lativentris* Kriechb. — III. Ad balneum Koritnicza, regione subalpina, in unico solum specimine inventus.

59. *fulvidactylus* Kriechb. — III. Solum Hungariæ incola, ad Tavarnok (Com. Nyitra) pariter tantum in unico exemplari detectus.

60. *computatorius* Müll. *(bicoloripes* Tischb.). — I. Budapest (teste Tischbein), Debreczen. VI. Német-Bogsán (Com. Temes), mons Domogled penes Mehádiam.

61. *gracilicornis* Grav. — I. Budapest. II. Zircz. III. Trencsén, Virágvölgy. VI. Vihorlat, Rokitó (Com. Zemplén), Pietrosz (Com. Mármaros). V. Rézhegység. VI. Ferenczfalva, Mehádia.

62. *emancipatus* Wesm. — III. Virágvölgy penes Poprád. IV. Mármaros.

63. *caloscelis* Wesm. — VI. Orsova, Mehádia. VII. Fiume, Vežica.

64. *sulphuratus* Kriechb. — VIII. Exemplar unicum cognitum typicum ad Fiume detectum est.

65. *raptorius* Linn. — I. Bohodej-havas (regio alpina montium Bihariensium). IV. Kassa. V. Montes Transsylvanici, Tusnád. VI. Ferenczfalva, Korniaréva, Mehádia. VIII. Žakalj, Vežica.

66. *caedator* Grav. — IV. Exemplar unicum e Runyina (Com. Zemplén).

67. *Rogenhoferi* Kriechb. — I. Specimen unicum e Budapest.

68. *exilicornis* Wesm. — I. Budapest. V. Transsylvania. Species rara.

69. *erythromerus* Wesm. — IV. Specimen unicum e Szinnaikő.

70. *insidiosus* Wesm. *(affectator* Tischb.). — III. Trencsén. V. Magura (Com. Kolozs). VI. Ferenczfalva, Korniareva, Mehádia. VIII. Pečine.

71. *obsessor* Wesm. *(perfidus* Tischb.). — IV. Eperjes e *Spilosoma fuliginosa* L. educatus. VI. Mehádia.

72. *zonalis* Grav. — I. Budapest e *Caradrina ambigua* Fabr., Péczel, Kalocsa, Szeged. II. Duna-Örs. V. Balneum ad Zovány (Com. Szilágy), Torda. VI. Resicza, Mehádia. VII. Zágráb, Sljeme. VIII. Orehovica.

73. *sculpturatus* Holmgr. — Specimen unicum e Hungaria superiore.

74. *stigmatorius* Zett. — VI. Specimen unicum e Resicza.

75. *xanthorius* Forst. — I. Budapest e pupis *Polisphaenis prospicuae* Bkh., Péczel. II. Kapornak (Com. Zala). III. Trencsén. IV. Szinnaikő. VI. Resicza, Mehádia. VII. Zágráb. VIII. Fiume, Sušak, Orehovica, Draga, Buccari, Novi.

76. *sexcinctus* Grav. — III. Poprád (Com. Szepes), IV. Runyina. VI. Német-Bogsán (Com. Krassó-Szörény), Mehádia.

77. *cessator* Müll. — I. Budapest. II. Szombathely. III. Rózsahegy, vallis Felka in montibus Tátra. VI. Resicza.

78. *quaesitorius* Linn. — I. Budapest. VI. Mehádia. VII. Pazarište. VIII. Sušak, Vežica, Čavle, Buccari.

79. *melanosomus* Wesm. — III. In Comitatu Árva ad Oravicza in unico solum specimine inventus.

80. *quadrialbatus* Grav. — I. Budapest e pupis *Leucaniae evidentis* Hübn. duo exemplaria apud me exclusa, Rákospalota, Kalocsa, Szeged. II. Duna-Örs (Com. Komárom). VII. Zágráb.

81. *languidus* Wesm. — I. Budapest, Nagyvárad. III. Turóczmegye. V. Zilah (Com. Szilágy). VI. Mehádia. VII. Pazarište.

82. *medialis* Wesm. — I. Budapest; unicum tantum exemplar.

83. *melanostigma* Kriechb. — I. Budapest. VI. Mehádia, Domogled. VII. Vaganski Vrh. Solum Hungariæ civis.

84. *illustris* Kriechb. — Pariter tantum solum Hungariam inhabitat, specimen unicum typicum in montibus Tátra ad lacum Poprád (Poprádi tó) detexi.

85. *eumerus* Wesm. — I. Budapest; specimen unicum.

86. *rufidens* Wesm. — I. In montibus Bihariensibus ad Bohodej. V. Transsylvania.

87. *curtulus* Kriechb. — I. Est solum Hungariæ incola; ad Budapest in unico tantum specimine detectus.

88. *gemellus* Grav. — V. Tasnád (Com. Szilágy); tantum specimen unicum.

89. *saturatorius* Linn. — I. Budapest, Kalocsa, Nagyvárad, Monyásza. II. Pécs, Tata. III. Nyitra, Nagy-Rőcze, Poprád, Koritnicza. IV. Zsihovecz. V. Rea, Hátszeg, Sz.-Gothárd. VI. Resicza.

90. *faunus* Grav. — In Comitatu Mármaros ad Zsihovecz unicum solum specimen inventum.

91. *nigritarius* Grav. — I. Budapest. II. Szegzárd. III. Vihorlat (Com. Zemplén), Mármaros. V. Peér (Com. Szilágy). VII. Gospić. VIII. Orehovica.

92. *annulator* Fabr. — I. Budapest, Szeghalom (Com. Békés), Nagyvárad. II. Kapornak (Com. Zala.)

93. *corruscator* Linn. — I. Budapest, Pilis, Péczel, Mártonkáta (Com. Pest). II. Pécs, Zircz. VI. Resicza, Mehádia. VIII. Žakalj, Orehovica, Sušak.

94. *spilomerus* Kriechb. — III. Specimen unicum typicum cognitum in Musæo Aulico Vindobonensi ad Losoncz inventum est (101, 1888, pag. 29.)

95. *fabricator* Fabr. — I. Budapest, Pilis. III. Nyitra. IV. Eperjes, montes Beszkid, Nagy-Károly. V. Hátszeg, Magura (Com. Kolozs). VI. Mehádia. VII. Pregrada.

96. *luteiventris* Grav. — IV. Plura exemplaria ex Eperjes.

97. *clericus* Grav. — Ex Hungaria duo specimina, loco inventionis præcise non notato.

98. *Elephas* Brauns. — I. Specimen unicum typicum e regione Budapest. Solum Hungariæ incola.

99. *lacteator* Grav. — I. Apud nos solum ad Budapest.

100. *oscillator* Wesm. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Kőszeg. III. Rozsnyó. VI. Orsova. VII. Pregrada.

101. *nivatus* Grav. — Secundum Tischbein est etiam Hungariæ incola (194, 1879, pag. 32.)

102. *castaneus* Grav. — I. Budapest, prædium Szent-Lőrincz. IV. Bereczki (Com. Zemplén). VI. Mehádia.

103. *defraudator* Wesm. — Specimen unicum ex Hungaria, loco inventionis non assignato.

104. *pictus* Grav. — Pariter exemplar unicum ex Hungaria.

105. *disparis* Poda (*flavatorius* Fabr.). — I. Budapest, Péczel, Kecskemét. IV. Eperjes e pupis *Ocneriae disparis* L., Szinnaikő. VI. Resicza, Ulma. VIII. Orehovicza, Žakalj.

106. *dumeticola* Grav. — I. Budapest. VI. Montes Mehádienses.

107. *leucomelas* Gmel. — I. Budapest, Szeged. IV. Jászó (Com. Abauj). VII. Pakracz (Com. Pozsega), Velebit.

108. *melanarius* Wesm. — I. Specimen unicum e Debreczen.

109. *albinus* Grav. — I. Budapest, Peszér. IV. Szinnaikő. V. Erzsébetváros (Com. Kis-Küküllő). VI. Mehádia.

110. *monastagon* Grav. (*redimitus* Tischb.) — I. Budapest, Péczel, Peszér. II. Tapolcza. III. Poprád, Uj-Tátrafüred. IV. Eperjes e *Spilosoma menthastri* Esp. VI. Orsova, Mehádia.

111. *albosignatus* Grav. — I. Budapest, Rézbánya (Com. Bihar), Szeged. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely. V. Tasnád (Com. Szilágy).

112. *anator* Fabr. — I. Budapest, Kecskemét. III. Trencsén, balneum Lucsivna. IV. Nagy-Károly. V. Tasnád. VI. Ulma.

113. *callicerus* Grav. — I. Budapest, Szeged. II. Duna-Őrs. III. Lófej (Com. Torna). VII. Pregrada, Samobor. VIII. Sušak.

114. *sedulus* Grav. — I. Budapest, Nagyvárad, Beél (Com. Bihar), Szeged. III. Trencsén. VI. Mehádia.

115. *sexalbatus* Grav. — I. Budapest, Peszér, Nagyvárad, Szeged. II. Duna-Örs, Pécs. VI. Ulma.

116. *plagiarius* Wesm. — I. Budapest. IV. Kassa. VI. Ulma (Com. Temes).

117. *ridibundus* Grav. — I. Budapest. VI. Orsova. Rarus esse videtur.

118. *tergenus* Grav. — I. Budapest, Péczel, Peszér. VI. Mons Domogled ad Mehádiam.

119. *bilunulatus* Grav. — I. Budapest. II. Duna-Örs, Keszthely. III. Koritnicza (balneum), montes Beszkid. V. Tasnád. VI. Mehádia. VIII. Žakalj.

120. *angustatus* Wesm. — IV. Kassa, in unico solum specimine inventus.

121. *chionomus* Wesm. — I. Budapest, Szeged. IV. Szinnaikő, Nagymihály, Lelesz (Com. Zemplén). V. Tasnád. VI. Ferenczfalva, Mehádia, Resicza.

122. *derogator* Wesm. — IV. Specimen unicum e Czéke.

123. *vacillatorius* Grav. — II. Exemplar unum e Badacsony.

124. *semirufus* Grav. — I. Budapest. IV. Vihorlat (mons in Comitatu Zemplén).

125. *vestigator* Wesm. — I. Nagyvárad. II. Sóly (Com. Veszprém). IV. Szőllőske. VI. Resicza.

126. *leucurus* Kriechb. — I. Solum Hungariæ incola; specimen unicum typicum ad Budapest detectum est.

127. *cordiger* Kriechb. — I. Tantum ex Hungaria cognitus, ubi pariter ad Budapest in duobus exemplaribus inventus.

128. *albicaudatus* Fonsc. — I. Budapest. VII. Zágráb, Gospić. VIII. Sušak, Žakalj.

129. *pulcher* Tischb. — Secundum auctorem ex Hungaria oritur (194, 1879, pag. 32.); typus tamen secundum J. Kriechbaumer iam non existit, ideoque species dubia est.

130. *ruficeps* Grav. — III. Ex Oravicza (Com. Árva), specimen unicum.

131. *ochropis* Gmel. — I. Budapest. IV. Javorina. V. Transsylvania. VI. Resicza.

132. *discrepator* Wesm. — VI. In montibus Hungariæ meridionalis: Resicza.

133. *rufifrons* Grav. — III. Trencsén. IV. Bártfa, Forró (Com. Zemplén).

134. *lanius* Grav. — I. Budapest, Pilis. VIII. Buccari.

135. *albilarvatus* Grav. — I. Budapest. IV. Sátor-Alja-Ujhely. V. Peér. VI. Mehádia.

136. *terebrosus* Wesm. — IV. In S.-A.-Ujhely inventus.

137. *Försteri* Wesm. — III. Oravicza; specimen unicum.

138. *curvinervis*, Htg. — IV. S.-A.-Ujhely, Nagymihály.

Hoplismenus Grav.

139. *armatorius* Fabr. *(perniciosus* Grav.) — I. Budapest, Kalocsa. IV. S.-A.Ujhely, Szinnaikő, Sárospatak. V. Hátszeg. VII. Samobor. VIII. Orehovica, Sušak.

140. *violentus* Grav. *(infaustus* Wesm.) — IV. Sátoralja-Ujhely; specimen unicum.

141. *terrificus* Wesm. — I. Budapest; exemplar unum.

142. *pica* Wesm. — Hucusque solum ad Cirkvenica.

143. *aulicus* Grav. *(Hybophorus) (Ichn. flavipetiolatus* Tischb.) — III. Ad balneum Lucski (Lucski-fürdő) et Montes Tátra duo tantum specimina inventa.

Amblyteles Wesm.

144. *palliatorius* Grav. *(Ichn. ochraceus* Tischb.) — Marem et feminam e pupis *Mammestrae tinctae* Brahm. exclusos accepi. I. Gödöllő. II. Tapolcza. III. Tavarnok (Com. Nyitra). IV. Eperjes. VI. Resicza, Mehádia. VII. Zágráb. VIII. Fiume, Žakalj, Buccari.

145. *monitorius* Panz. — I. Budapest e *Perigrapha J-cincta* Hübn., Dabas, Kalocsa, Nagyvárad. II. Pécs. III. Balneum Rajecz. IV. Jászó (Com. Abauj).

146. *infractorius* Panz. — I. Isaszeg. II. Kőszeg. III. Rajecz (Com. Trencsén). V. Magura (Com. Kolozs), Tíhucza (Com. Besztercze-Naszód). VI. Mehádia, Korniaréva. VII. Pregrada. VIII. Zengg.

147. *fasciatorius* Fabr. — I. Budapest e pupis *Agrotis fimbriae* L., Péczel, Kalocsa, Nagyvárad, Szeged. II. Kapornak (Com. Zala), Keszthely. III. Trencsén, Beszterczebánya. VII. Pregrada, Raduć. VIII. Sušak, Buccari, Zengg.

148. *amatorius* Müll. — I. Budapest e pupis *Polyshaenis sericatae* Esp. et *Agrotis linogriseae* Schiff. exclusi, montes Biharenses. II. Kőszeg. III. Tavarnok, Virágvölgy, balneum Lucsivna. IV. Lungacsásza (Com. Mármaros). V. Tasnád, Borszék.

149. *oratorius* Fabr. — I. Budapest; unicum specimen.

150. *Spilosomae* Mocs. — IV. Eperjes, e pupis *Spilosomae Menthastri* Esp. educatus. Solum Hungariæ terram colit.

151. *quadripunctorius* Müll. *(natatorius* Fabr.) — Fere in omni zonarum regione communis. E pupis *Charipterae viridanae* Walch., *Agrotis pronnubae* L. et *Poliae polymitae* L.

152. *pandur* Kriechb. — VI. In montibus ad thermas Herculis sacras Mehadienses in unico solum exemplari detectus. Solum Hungariæ civis.

153. *atratorius* Fabr. — I. Budapest, Kalocsa. II. Kőszeg. VI. Mehádia.

154. *subsericans* Grav. — I. Budapest, Parád. IV. Vihorlat, S.-A.-Ujhely, Tokaj. V. Hátszeg, Sz.-Erzsébet. VI. Mehádia, Domogled. VII. Velebit. VIII. Draga.

155. *crispatorius* Linn. — I. Budapest, Nagyvárad, Beél (Com. Bihar). II. Kőszeg. IV. Eperjes. VI. Resicza. VIII. Zengg.

156. *litigiosus* Wesm. — III. In Koritnicza, regione subalpina, unicum solum specimen inventum.

157. *equitatorius* Panz. — I. Szeged; unum exemplar.

158. *glaucatorius* Fabr. — I. Budapest e *Dianthoecia compta* Fabr. III. Nyitra, Trencsén. IV. Szöllőske. VI. Korniaréva. VII. Pregrada.

159. *hungaricus* Tischb. — I. Budapest e pupa *Smerinthi ocellati* L. exclusus, Comitatus Bihar, montes Mátra. IV. S.-A.-Ujhely. VII. Podvesica.

160. *vadatorius* Illig. — I. Budapest, Nagyvárad, Kalocsa, Szarvas (Com. Békés), Szeged. II. Sárbogárd. III. Vallis Felka in montibus Tátra. IV. Forró (Com. Abauj-Torna). V. Nagyfalu (Com. Szilágy). VI. Ulma. VII. Križavac.

161. *occisorius* Fabr. — IV. Ad Parnó (Com. Zemplén) observatus.

162. *nonagriae* Hlgr. *(celsiae* Tischb.) — I. In unico exemplari ad Debreczen.

163. *Johansoni* Hlgr. — IV. Eperjes e pupis *Nonagriae sparganii* Esp. et *arundinis* Fabr. plura specimina educata.

164. *Gravenhorstii* Wesm. — I. Budapest, Szeged. IV. Kis-Azar, Nagymihály, Parnó. V. Brassó. VI. Temesvár.

165. *Fabricii* Grav. — I. Prædium Szent-Lőrincz (Com. Pest). IV. S.-A.-Ujhely.

166. *punctus* Grav. — I. Budapest; complura exemplaria e pupis *Caradrinae Kadenii* Frr. exclusa.

167. *negatorius* Fabr. — II. Kőszeg. III. Trencsén, Mármaros, Rózsahegy, Koritnicza, Poprád, Tátrafüred. V. Tihucza. VI. Resicza, Mehádia, Korniaréva. VII. Stalak, Velebit. VIII. Fiume, Fužine.

168. *uniguttatus* Grav. — I. Budapest, Péczel, Mátyásföld, Nagyvárad, Szeged. II. Tapolcza (Com. Zala) Pécs. III. Trencsén, Koritnicza. IV. Parnó, S.-A.-Ujhely. V. Transsylvania. VI. Orsova, Korniareva. VII. Raduć. VIII. Sušak.

169. *lethifer* Mocs. *(? impressus* Tischb.) — I. Monor e *Dianthoecia silene* Hübn., Nagyvárad. III. Nyitra, S.-A.-Ujhely. Solum Hungariæ incola.

170. *proximus* Tischb. — Secundum auctorem specimen typicum ex Hungaria oritur. (194, 1879, pag. 36.)

171. *conspurcatus* Grav. — I. Budapest. II. Kapornak (Com. Zala). VIII. Pečine,

172. *jucundus* Kriechb. — I. Budapest, Nagyvárad. VI. Mehádia. Ubique rarus et solum Hungariæ incola.

173. *pseudonymus* Wesm. — I. Budapest e *Hylophila prasina* L. educatus, Péczel. VI. Domogled ad Mehádiam.

174. *sputator* Fabr. — I. Budapest. II. Zircz. III. Trencsén, Poprád. IV. Simonka (Com. Zemplén). V. Szucság et Magura (Com. Kolozs). VI. Mehádia. VIII. Žakalj.

175. *Kriechbaumeri* Mocs. — VI. Solum Hungariæ incola; species ad Mehádiam in duobus solum exemplaribus inventa.

176. *camelinus* Wesm. — I. Budapest, Mártonkáta, Nagyvárad, Szeged. III. Tavarnok, Trencsén. IV. Szöllőske, Eperjes e pupis *Vanessae polychloros* L., *xanthomelas* Esp., *Antiopae* L., *urticae* L. et *cardui* L. copiose educatus, Mármaros, Munkács. V. Tasnád, Pele-Szarvas, Nagyszeben. VI. Mehádia.

177. *castigator* Fabr. — I. Budapest, prædium Szent-Lőrincz. II. Duna-Örs. III. Rajecz (Com. Trencsén). IV. Eperjes e *Nonagria sparganii* Esp., S.-A.-Ujhely. VI. Mehádia.

178. *melanocastanus* Grav. — I. Budapest, Pilis, Nagyvárad. VI. Mehádia. VIII. Vežica.

179. *dirus* Mocs. — I. Budapest e *Toxocampa limosa* Tr. educatus. V. Torda (Com. Torda-Aranyos). VIII. Cirkvenica. Solum Hungariæ incola, ubi rarus esse videtur.

180. *rubro-ater* Ratzb. — VII. Hucusque solum ad Zágráb observatus.

181. *politus* Wesm. — VI. Specimen unicum e Mehádia.

182. *divisorius* Grav. — I. Budapest, Parád (Com. Heves). VIII. Orehovica.

183. *messorius* Grav. — I. Budapest e *Plusia asclepiadis* Schiff. cultus, Török-Bálint prope Budapest; tantum rarius obviens.

184. *albomarginatus* Kriechb. — Solum Hungariæ incola; specimen unicum cognitum typicum verisimiliter e parte regni superiore oritur.

185. *fossorius* Müll. — III. Tavarnok (Com. Nyitra), Rózsahegy. IV. Vihorlat. VI. Mehádia. VII. Zágráb. VIII. Žakalj, Čavle.

186. *inspector* Wesm. — I. Budapest, Nagyvárad. III. Nyitra, Trencsén, balneum Lucsivna. VI. Resicza, Korniareva, Mehádia. VIII. Sušak, Orehovica.

187. *repentinus* Grav. — I. Budapest e *Cucullia chamomillae* Schiff., Nagyvárad. VI. Resicza, Mehádia. VII. Škurinja, Lokve. VIII. Fiume.

188. *Panzeri* Wesm. — I. Budapest, Kalocsa. II. Balf (Com. Sopron). VII. Pakracz, Stara Pazova.

189. *funereus* Fourcr. — I. Budapest, Kalocsa. IV. Szerencs et S.-A.-Ujhely. V. Besztercze (Com. Besztercze-Naszód).

190. *moestus* Mocs. — Solum Regni Hungariæ incola; exemplar typicum e (VI.) Korniarevæ montibus ad Mehádiam oritur. VII. Zágráb.

191. *laminatorius* Fabr. — I. Budapest, rarus. Marem e pupa *Mammestrae tinctae* Brahm. exclusum accepi. VII. Pakracz.

192. *fusorius* Linn. — In omni zonarum regione observatus; communis ad Budapestinum, ubi e *Sphingis convolvuli* L., *Macroglossae stellatarum* L., *fuciformis* L. et *Miseliae oxyacanthae* L. sæpius educatus est.

193. *strigatorius* Grav. — I. Budapest. IV. S.-A.-Ujhely. VI. Mehádia. VIII. Buccari.

Catadelphus Wesm.

194. *arrogator* Fabr. — I. Budapest, Budafok. II. Badacsony. Sexus e *Pterogone Proserpina* Pall. *(Oenetherae* Schiff.) exclusos accepi.

Trogus Grav.

195. *lutorius* Fabr. — I. Budapest e pupis *Smerinthi tiliae* L. et *Deilephilae lineatae* F., Budafok, Szeged. III. Rózsahegy. IV. Eperjes e *Smerintho ocellato* L. et *Sphinge pinastri* L.

196. *exaltorius* Panz. — I. Budapest e pupis *Sphingis ligustri* L. sæpius et copiose educatus. IV. Eperjes e *Smerintho ocellato* L. V. Brassó. VI. Mehádia.

197. *rufescens* Grav. — Secundum piæ memoriæ virum auctorem species tantum Hungariam inhabitat 57, pag. 388.). Tempore tamen recenti non est reinventa.

Psilomastax Tischb.

198. *lapidator* Fabr. — I. Budapest e pupis *Papilionis Machaonis* L. copiose et ex *Argynnis Pandorae* L. unum exemplar exclusi. IV. Eperjes, pariter a priore et numerose.

199. *pictus* Kriechb. — Tischbein speciem e pupa *Apaturae Iris* Ochs. exclusam ex Hungaria accepit. Nos tantum specimen unicum habemus e regione pannonica (II.) ad Kőszeg inventum.

Automalus Fabr.

200. *alboguttatus* Grav. — I. Budapest. VI. Montes Mehádienses. VII. Montes Zágrábienses.

Anisobas Wesm.

201. *cephalotes* Kriechb. — I. Budapest in pupis *Lycaenae Jolantis* Ochs. sat frequens. IV. Eperjes. VI. Jassenova (Com. Temes). VIII. Fiume, Orehovica.

202. *cingulatorius* Grav. — I. Budapest. II. Duna-Örs, Kóly. V. Tasnád, Peér. VI. Korniareva. VIII. Pećine, Vežica.

203. *rebellis* Wesm. — I. Budapest, Makkos (Com. Csongrád). VII. Pregrada. VIII. Fiume, Žakalj.

Neotypus Först.

204. *melanocephalus* Gmel. — III. Balneum Lucski. VI. Mehádia. Rarus.

205. *lapidator* Fabr. — I. Ad Budapest: Farkasvölgy, Svábhegy; rarus.

Probolus Wesm.

206. *alticola* Grav. — I. Hucusque tantum ad Budapest.

207. *concinnus* Wesm. — I. Pariter solum ad Budapest; rarus.

Miscophorus Kriechb.

208. *flavosignatus* Kriechb. — IV. Eperjes e pupa *Harpyae vinulae* L. educatus. VI. Resicza. Species elegans et solum Hungariæ civis rara esse videtur.

Eurylabus Wesm.

209. *dirus* Wesm. — I. Budapest e pupa *Taeniocampae opimae* Hübn. exclusus; rarus. VI. Resicza.

210. *torvus* Wesm. — I. Ad Péczel in unico solum specimine inventus.

211. *larvatus* Christ. — VIII. Solum ad Buccari.

212. *seticornis* Tischb., Kriechb. *(Ichn. seticornis* Tischb.). — VI. Secundum auctorem specimen typicum e Mehádia oritur (Tischbein, 192, 1868, pag. 248.). — Solum Hungariæ terram colit.

Platylabus Wesm.

213. *pedatorius* Fabr. — I. Budapest ex *Eupithecia innotata* Hufn. complura specimina educata. II. Pécs.

214. *varipedalis* Wesm. — Secundum auctorem species est etiam Hungariæ incola (200, pag. 58.)

215. *rufus* Wesm. — VI. Mehádia. VII. In montibus Karst.

216. *rufiventris* Wesm. — I. Ad Budapest duo tantum specimina collecta.

217. *decipiens* Wesm. — I. E Budapest; in uno tantum exemplari.

218. *suborbitalis* Kriechb. — I. Est solum Hungariæ incola; specimen typicum unicum in montibus Bihariensibus inventum est.

219. *orbitalis* Grav. — V. Specimen unicum ad Torda (Com. Torda-Aranyos) a me inventum.

220. *leucogrammus* Wesm. — I. Tantum ad Budapest et Péczel.

221. *dimidiatus* Grav. — I. Budapest. VIII. Orehovica.

Hemichneumon Wesm.

222. *elongatus* Ratzb. (*subdolus* Wesm.). — I. Budapest e pupa *Taleporiae politellae* Ochs. educatus.

Apaeleticus Wesm.

223. *flammeolus* Wesm. — I. In Hungaria centrali e Péczel specimen unicum.

Gnathoxys Wesm.

224. *nasutus* Wesm. — Secundum auctorem etiam in Hungaria inventus est (199, pag. 57.)

225. *marginellus* Wesm. — Auctor speciem hanc etiam ex Hungaria adfert (200, pag. 62.)

Herpestomus Wesm.

226. *facialis* Grav. — I. Budapest; rarus. III. Rajecz (Com. Trencsén). IV. Ladomér, Bártfa.

Colpognathus Wesm.

227. *celerator* Grav. — I. Budapest, Kalocsa, Nagyvárad. IV. Varannó, Tolcsva, Tokaj, Szerencs. V. Peér, Tasnád (Com. Szilágy).

228. *divisus* Thoms. — I. Specimen unicum e regione Budapest.

Dicaelotus Wesm.

229. *pumilus* Grav. — I. Budapest, Debreczen. IV. S.-A.-Ujhely.

230. *ruficoxatus* Grav. (*unipunctatus* Wesm.). — I. Budapest; tantum specimen unicum.

Cinxaelotus Hlgr.

231. *erythrogaster* Hlgr. — VI. Specimen unicum ex Orsova.

Centeterus Wesm.

232. *major* Wesm. — I. Budapest, Nagyvárad.

233. *opprimator* Grav. — I. Budapest. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely.

234. *nigricornis* Thoms. — I. Specimen unicum e Budapest.

Aethecerus Wesm.

235. *major* Wesm. — I. Apud nos hucusque tantum ad Nagyvárad.

236. *pallidus* Wesm. — IV. Tokaj, S.-A.-Ujhely.

237. *placidus* Wesm. — I. Solum ad Kecskemét.

Phaeogenes Wesm.

238. *planifrons* Wesm. — IV. In monte Vihorlat (Com. Zemplén) inventus.

239. *melanogonus* Gmel. — IV. Bártfa (Com. Sáros), Szinna (Com. Zemplén).

240. *stipator* Wesm. — IV. Solum ad Tokaj (Com. Zemplén).

241. *stimulator* Grav. — I. Budapest, Farkasd, Péczel. IV. Kassa.

242. *rusticus* Wesm. — I. Specimen unicum e regione Budapest.

243. *nanus* Wesm. — III. Exemplar unum e comitate Mármaros.

244. *fuscicornis* Wesm. — IV. In Hungaria septentrionali ad Bártfa.

245. *trepidus* Wesm. — VIII. Ad Buccari collectus.

246. *flavidens* Wesm. — IV. Apud nos tantum ad Czéke.

247. *ischiomelinus* Wesm. — I. Tantum in centro regni ad Budapest.

248. *eximius* Wesm. — IV. Ad Tolcsva in comitatu Zemplén.

249. *ophthalmicus* Wesm. — IV. Solummodo ad O.-Ruszka.

250. *semivulpinus* Grav. — VI. Ulma (Com. Temes). VIII. Sušak, Pécine.

251. *Sesiae* Mocs. — I. Sexus ad Budapest e pupis *Sesiae asiliformis* Rott. educati. Hucusque solum Hungariæ incola.

252. *crassidens* Thoms. — IV. Solum ad S.-A.-Ujhely.

Proscus Hlgr.

253. *cephalotes* Wesm. — Duo specimina ex Hungaria superiore.

Diadromus Wesm.

254. *troglodytes* Grav. — VI. Mehádia. VIII. Buccari.

255. *subtilicornis* Grav. — IV. Szomotor, S.-A.-Ujhely, Tokaj, Tolcsva, Varannó (Com. Zemplén).

256. *rubellus* Grav. — I. Specimen unicum e Budapest.

Oronotus Wesm.

257. *coarctatus* Wesm. — IV. Ad Szinna (Com. Zemplén) inventus.

Ischnus Grav.

258. *truncator* Wesm. — I. Budapest e *Bombyce lanestri* L.; non rarus. II. Badacsony, Szegzárd. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj. V. Tasnád, Nagyfalu (Com. Szilágy).

259. *filiformis* Grav. — I. Tantum ad Budapest: Gellérthegy.

Epitomus Thoms.

260. *parvus* Thoms. — I. Specimen unicum e Budapest.

Cryptnrus Grav.

261. *argiolus* Grav. — I. Budapest e *Poliste gallico* L. numerose educatus, Szeged. II. Pécs, Badacsony. IV. S.-A.-Ujhely.

Echtrus Grav.

262. *lancifer* Grav. — I. Budapest e *Saperda populnea* L. complura exemplaria exclusa. VI. Ulma.

263. *reluctator* Grav. — Hucusque solum ad Zágráb.

Osphrynchotus Spin.
(*Linoceras* Taschb.)

264. *macrobatus* Grav. — I. Budapest. III. Szliács, Koritnicza. VII. Pregrada. VIII. Orehovica, Buccari.

265. *seductorius* Grav. (*Xenodocon ruficorne* Först.) — I. Budapest e nido *Sceliphronis destillatorii* Illig. educatus, Kalocsa, Kecskemét. VIII. Čavle.

Cryptus Auct.

266. *albatorius* Grav. — I. Budapest, Pilis, Szent-Endre, Szeged. IV. Kassa, Homonna. V. Transsylvania.

267. *annulipes* Taschbg. — I. Székelyhid. V. Tasnád.

268. *atripes* Grav. — VIII. Quattuor specimina e Buccari.

269. *attentorius* Grav. — I. Budapest, Kalocsa. II. Pécs.

270. *crenulatus* Brauns. — V. Transsylvania. VI. Mehádia. Solum Hungariæ incola.

271. *cyanator* Grav. — I. Budapest e *Cosmia abluta* Hübn., Nagyvárad. IV. S.-A.-Ujhely, Varannó.

272. *Dianae* Grav. — IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj.

273. *exstinctor* Tschek. — I. Budapest, Kisujszállás. VI. Mehádia.

274. *Germari* Taschbg. — I. Budapest; nonnulla specimina.

275. *gratiosus* Tschek. — I. Budapest, Kisujszállás, Debreczen. IV. Eperjes. VI. Oravicza. VII. Raduć.

276. *incisus* Tschek. — V. Hucusque solum in Semesnye.

277. *infornatus* Thoms. — VIII. Hucusque solum ad Orehovica.

278. *inmitis* Tschek. — VI. Mehádia. VIII. Buccari.

279. *italicus* Grav. — I. Budapest. II. Pécs.

280. *leucocheir* Ratzbg. — I. Budapest e *Clavellaria amerinae* L. educatus.

281. *melanocephalus* Grav. — V. Tasnád; specimen unicum.

282. *migrator* Fabr. — IV. S.-A.Ujhely. V. Tasnád.

283. *moschator* Fabr. — I. Soroksár, Kecskemét.

284. *murorum* Tschek. — VIII. Fužine; specimen in nostra collectione.

285. *obscurus* Grav. — I. Budapest e puppis: *Charipterae viridanae* Walch., *Brotolomiae meticulosae* L. et *Plusiae asclepiadis* Schiff., Nagyvárad. II. Zircz. III. Trencsén. IV. Sátoralja-Ujhely. VIII. Zengg, Buccari.

286. *obnoxius* Grav. — VIII. Žakalj.

287. *pseudonymus* Tschek. — I. Budapest e *Cirrhoidea ambusta* F. complura exemplaria. II Zircz.

288. *rubicola* Brauns. — VIII. Fiume, parasita *Osmiae rubicolae* Friese (Friese, 38, 1891, pag. 259.)

289. *spinosus* Grav. — I. Budapest. VIII. Sušak, Trsat, Buccari.

290. *spiralis* Grav. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa. II. Duna-Örs.V. Nagyvizvölgy.VI. Deliblat.

291. *sponsor* Fabr. — I. Budapest. III. Trencsén. IV. Tolcsva, Forró. VI. Mehádia. VIII. Lokve, Fužine. VIII. Novi.

292. *tarsoleucus* Grav. — I. Budapest e *Chariptera viridana* Walch. plura exemplaria, Kisujszállás. III. Trencsén, Koritnicza, Túrócz. IV. Bereczki. V. Mezőség, mons Retyezát. VII. Samobor, Karst. VIII. Cirkvenica.

293. *tinctorius* Grav.—IV. Apud nos solum ad Tokaj.

294. *tuberculatus* Grav.—I. Budapest. IV. Szomotor.

295. *viduatorius* Grav. — I. Budapest e *Saperda populnea* L. complura specimina, Kecskemét, Kisujszállás, Nagyvárad, Szeghalom, Makkos. III. Nyitra, Trencsén, Tátra. IV. Szomotor, Bártfa, O-Ruszka, Mármaros. V. Peér, Sepsi-Szent-György, Tusnád. VI. Mehádia, Ferenczfalva, Apatin. VII. Pregrada, Vaganski Vrh. VIII. Buccari.

Idiolispa Först.
(*Liocryptus* Thoms.)

296. *analis* Grav. — I. Budapest, Kecskemét, Nagyvárad. II. Duna-Örs. III. Koritnicza. IV. Bártfa, Erdőbénye, Tolcsva. VI. Mehádia. VIII. Sušak, Orehovica.

Trychosis Först.
(*Goniocryptus* Thoms.)

297. *inimica* Tschek. — I. Budapest, Fóth, Kisujszállás. VI. Mehádia. VIII. Zengg.

298. *neglecta* Tschek. — I. Specimen unicum e Budapest.

299. *picta* Thoms. — VI. Hucusque apud nos solum in Mehádia.

300. *plebeja* Tschek (*clypearis* Thoms.) — I. Budapest, Nagyvárad. IV. Erdőbénye, Szobráncz. V. Semesnye, Szucság. VI. Mehádia, Resicza, Ferenczfalva, Ulma. VII. Pregrada, Vaganski Vrh, Raduć. VIII. Orehovica, Zengg.

301. *rustica* Tschek. — I. Budapest. VI. Mehádia.

302. *titillator* Linn. — I. Budapest. VII. Lokve.

303. *tristator* Tschek. — I. Budapest, Csepel, Nagyvárad. VI. Ulma, Rumunyest. VII. Vrdnik.

Coenocryptus Thoms.

304. *bimaculatus* Grav. — I. Apud nos solum ad Budapest.
305. *rufiventris* Grav. — I. Pariter solum ad Budapest.
306. *vittatorius* Jur. (*sexannulatus* Grav.) — I. Budapest, Kalocsa, Szeged. IV. Kassa.

Habrocryptus Thoms.

307. *alternator* Grav. — I. Budapest. III. Rajecz.
308. *assertorius* Grav. — I. Budapest. V. Torda, Kolozsvár, Szucság. VI. Mehádia.
309. *brachyurus* Grav. — III. Specimen unicum e Virágvölgy Tátræ.
310. *minutorius* Fabr. — I. Budapest. VII. Fužine.

Aritranis Först.
(*Hygrocryptus* Thoms.)

311. *fuscicornis* Tschek. — I. Specimen unicum e Budapest.

Pycnocryptus Thoms.

312. *peregrinator* L. — I. Budapest. II. Keszthely. III. Trencsén, Rajecz. IV. S.-A.-Ujhely, Szomotor, Tokaj, Nagymihály, Varannó, Szinnaikő, O.-Ruszka, Mármaros. V. Peér. VI. Mehádia, Rumunyest. VIII. Pećine, Orehovica, Buccari.

Spilocryptus Thoms.

313. *dispar* Thoms. — I. Budapest, Peszér. IV. S.-A.-Ujhely.
314. *fumipennis* Grav. — I. Budapest e *Bombyce populi* L. complura exemplaria. VIII. Orehovica.
315. *grossus* Grav. — IV. Hucusque apud nos tantum in S.-A.-Ujhely.
316. *hospes* Tschek. — I. Budapest e *Saturnia spini* L.
317. *incubitor* Grav. — I. Budapest. IV. Beregszász. V. Peér.
318. *nigricornis* Kriechb. — I. Specimen unicum ex Isaszeg. Solum Hungariæ incola.
319. *nubeculator* Grav. — I. Budapest. II. Lacus Fertő (teste Giraud). VIII. Draga.
320. *ornatus* Grav. — II. Exemplar unum e Duna-Örs.
321. *solitarius* Tschek. — I. Budapest, Nagyvárad. VI. Mehádia, Oravicza. VII. Vrdnik.
322. *tibialis* Thoms. — VIII. Hucusque solum ad Orehovica.
323. *tricolor* Grav. — I. Budapest. IV. S.-A.-Ujhely, Simonka, Nagy-Károly.
324. *Zygaenarum* Thoms. — III. Apud nos solum in Trencsén.

Hoplocryptus Thoms.

325. *dubius* Taschbg. — I. Budapest, Kalocsa.
326. *erythrogaster* Grav. — VI. Mehádia, Orsova.
327. *fugitivus* Grav. — VIII. Tantum ad Draga.
328. *insectator* Tschek. — III. Szliács; exemplar unum.
329. *mediterraneus* Tschek. — VIII. Mehádia; rarus.
330. *occisor* Grav. — III. Vallis Hermanetz.
331. *pulcher* Thoms. — III. Trencsén.
332. *quadriguttatus* Grav. — V. In regione transsylvanica ad Tasnád.
333. *quadrispinus* Grav. — V. Pariter in illa regione et loco.

Mesostenus Grav.

334. *albinotatus* Grav. — I. Budapest. III. Trencsén. IV. Tokaj, Bártfa.
335. *compressicornis* Grav. — VI. Specimen unicum e Mehádia.
336. *funebris* Grav. — IV. Sátoralja-Ujhely. VI. Mehádia, Resicza.
337. *gladiator* Scop. — I. Budapest. II. Badacsony. III. Trencsén, Nagy-Rőcze. IV. Tolcsva. V. Semesnye, Szucság. VI. Mehádia. VIII. Draga, Orehovicza, Buccari.
338. *grammicus* Grav. — I. Duo specimina e Budapest.
339. *ligator* Grav. — I. Budapest, Kecskemét. IV. Nagymihály, Tokaj, Bereczki.
340. *obnoxius* Grav. — VIII. Hucusque solum ad Fiume.
341. *pygostolus* Grav. — IV. Tantum ad Sátoralja-Ujhely.
342. *recreator* Fabr. — I. Budapest. VI. Mehádia.
343. *transfuga* Grav. — IV. Tantum ad Ladomér.

Listognathus Tschek.

344. *cornutus* Tschek. — I. Complura exemplaria e Budapest.
345. *tricolor* Tschek. — VI. Hucusque tantum ad Resicza.

Nematopodius Grav.

346. *formosus* Grav. — IV. Tantum ad Ladomér.

Chaeretymma Först.
(*Cratocryptus* Thoms.)

347. *anatorius* Grav. — I. Budapest. V. Tasnád.
348. *furcator* Grav. — VI. Mehádia; specimen unicum.

Calocryptus Thoms.

349. *congruens* Grav. — I. Budapest. III. Trencsén.

Coelocryptus Thoms.

350. *curvus* Schrk. *(rufipes* Grav.). — I. Budapest. III. Trencsén. VIII. Draga, Orehovica.
351. *rufinus* Grav. — III. Hucusque tantum ad Trencsén.

Plectocryptus Thoms.

352. *arrogans* Grav. — III. Trencsén. IV. Bártfa.
353. *digitatus* Grav. *(bivinctus* Grav.). — I. Budapest, Pilis. IV. Tisza-Szántó.

Trichocryptus Thoms.

354. *cinctorius* Grav. — IV. Hucusque solum ad Czéke.

Microcryptus Thoms.

355. *abdominator* Grav. *(jejunator* Grav.). — I. Budapest. IV. Szöllőske, Tolcsva. Gesztely, Mármaros, Bártfa. VI. Mehádia.
356. *arrogans* Grav. — VI. Mehádia; specimen unicum.
357. *curvus* Grav. — I. Budapest. III. Nyitra. V. S.-Sz.-György.
358. *erythrostictus* Grav. — I. Budapest; plura specimina.
359. *femoralis* Thoms. — IV. Bártfa. VI. Oravicza.
360. *graminicola* Grav. — IV. Tantum ad Bártfa.
361. *gravipes* Grav. — VI. Specimen unicum e Korniareva.
362. *improbus* Grav. — I. Budapest. VI. Korniareva.
363. *lacteator* Grav. — III. Solummodo ad Trencsén.
364. *leucostictus* Grav. — I. Complura exemplaria e Budapest.
365. *nigrocinctus* Grav. — I. Hucusque tantum ad Kecskemét.
366. *perspicillator* Grav. — I. Budapest e *Charipteraviridana* Walch. III. Virágvölgy, Lucsivna. IV. Eperjes. VI. Mehádia. VIII. Buccari.
367. *sperator* Grav. — I. Budapest. III. Trencsén. VI. Mehádia.
368. *terminatus* Grav. *(ceilonotus* Taschbg.). — I. Budapest. II. Keszthely. VI. Mehádia. Orsova.
369. *triannulatus* Grav. — VI. Specimen unicum e Mehádia.

Acanthocryptus Thoms.

370. *flagitator* Grav. — I. Kecskemét. III. Trencsén. VI. Mehádia, Ulma.
371. *nigritus* Grav. — III. Hucusque tantum ad Turcsek (Com. Túrócz).

Stylocryptus Thoms.

372. *brevis* Grav. — I. Budapest. IV. Kis-Azar. VI. Mehádia.
373. *vagabundus* Grav. — I. Budapest, Nagyvárad. III. Nyitra, Trencsén, Rajecz, Poprád. V. Transsylvania. VI. Resicza, Orsova. VIII. Sušak.

Phygadeuon Grav.

374. *cephalotes* Grav. — VI. Mehádia solum apud nos.
375. *congruens* Grav. — IV. Tantum ad Bártfa.
376. *diaphanus* Grav. — I. Budapest. IV. Sátoralja-Ujhely.
377. *dimidiatus* Thoms. — I. Ad Nagyvárad collectus.
378. *dumetorum* Grav. — VI. Tantum ad Mehádia.
379. *fumator* Grav. — IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj. VIII. Orehovica.
380. *graminicola* Grav. — IV. Apud nos tantum ad Bártfa.
381. *insidiosus* Grav. — IV. In montibus Beszkid.
382. *jucundus* Grav. — I. Budapest. IV. Sátoralja-Ujhely, Homonna, Bártfa.
383. *ovatus* Grav. — VIII. Tantum ad Buccari.
384. *parviventris* Thoms. — IV. Hucusque solum ad S.-A.-Ujhely.
385. *pimplarius* Thoms. — IV. Pariter tantum in illo loco.
386. *plagiator* Grav. — IV. Hucusque tantum ad Bártfa.
387. *profligator* Fabr. — I. Budapest. VI. Oravicza.
388. *semipolitus* Taschbg. — IV. Ad Bártfa.
389. *simplarius* Thoms. — IV. Penes S.-A.-Ujhely.
390. *sodalis* Taschbg. — I. Exemplar unum e Budapest.
391. *submuticus* Thoms. — I. Specimen unicum e Budapest.
392. *troglodytes* Grav. — IV. S.-A.-Ujhely.
393. *vagans* Grav. — I. Nagyvárad. III. Trencsén.
394. *variabilis* Grav. — I. Budapest, Kecskemét. Transsylvania. VI. Orsova.

Cremnodes Först.

395. *atricapillus* Grav. — I. Budapest. III. Tátra.

Agrothereutes Först.

396. *batavus* Voll. — I. Monyásza. III. Koritnicza. VI. Mehádia.

Pezomachus Grav.

397. *agilis* Först. — I. Budapest. IV. S.-A.-Ujhely, Mező-Laborcz, Bártfa, Mármaros. VI. Mehádia.
398. *alacer* Först. — IV. Tantum ad Király-Lehota.
399. *aries* Först. — I. Specimen unicum e Budapest.
400. *audax* Först. — I. Pariter specimen unicum e Budapest.

401. *bellicosus* Först. — VI. Exemplar unum e Mehádia.
402. *canaliculatus* Kriechb. — I. Makkos. Solum Hungariæ incola.
403. *comes* Först. — I. Duo specimina e Budapest.
404. *cursitans* Grav. — I. Tria exemplaria ad Budapest inventa.
405. *cyanurus* Först. — I. Budapest, Szeged.
406. *decipiens* Först. — I. Nagyvárad, Beél.
407. *discedens* Först. — I. Budapest, Nagyvárad.
408. *edentulus* Först. — III. Tantum ad Tátrafüred.
409. *fasciatus* Grav. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Pécs, Duna-Örs. IV. S.-A.-Ujhely, Szomotor, Tokaj, Bártfa, Beregszász, Ladomér, Bereczki. V. Transsylvania. VI. Berzászka.
410. *faunus* Först. — IV. Tantum ad Nagymihály.
411. *festinus* Grav. — I. Solummodo e Budapest.
412. *formicarius* Först. — V. Tantum ad Peér inventus.
413. *fraudulentus* Först. — IV. Hucusque solum in Mármaros.
414. *fugax* Först. — I. Budapest. VI. Temesvár.
415. *instabilis* Först. — I. Budapest. IV. S.-A.-Ujhely, Homonna, Tokaj, Varannó, Czéke, Kassa. V. Tasnád.
416. *ineptus* Först. — IV. Tantum ad Sztropkó.
417. *integer* Först. — IV. Pariter solum in illa regione ad Torna.
418. *lepidus* Först. — II. Duna-Örs. IV. Tokaj.
419. *linearis* Först. — I. Érmihályfalva (Com. Bihar). II. Sóly (Com. Veszprém).
420. *Neesii* Först. — IV. Hucusque tantum in Torna.
421. *nigritus* Först. — I. Solummodo e Budapest.
422. *pulex* Först. — IV. Apud nos tantum ad Czéke.
423. *pulicarius* Grav. — I. Budapest, Nagyvárad, Debreczen.
424. *proximus* Först. — IV. Bánszka, Simonka, montes Beszkid.
425. *rufulus* Först. — I. Hucusque tantum ad Budapest.
426. *rusticus* Grav. — I. Pariter solum in Hungaria centrali.
427. *sylvicola* Först. — II. Tantum in regione pannonica ad Duna-Örs.
428. *tricolor* Gir. — I. Solum ad Budapest.
429. *vagans* Grav. — I. Nagyvárad, Sztána. VI. Zombor.
430. *zonator* Först. — VI. Specimen unicum ex Orsova.

Aptesis Först.

431. *formosa* Först. — IV. Hucusque solum ad Tolcsva.
432. *nigrocincta* Grav. — I. Budapest. IV. Varannó, Olyka, Kis-Azar, Mármaros. VI. Krassova.
433. *sudetica* Först. — III. Hucusque solum in montibus Tatricis.

Stilpnus Grav.

434. *gagates* Grav. — IV. Tokaj, S.-A.-Ujhely.

Hemiteles Grav.

435. *aestivalis* Grav. — I. Hucusque apud nos solum ad Budapest.
436. *areator* Panz. — I. Budapest, Nagyvárad. III. Trencsén. IV. Szinnaikő. VI. Kazán.
437. *biannulatus* Grav. — IV. Tantum ad Tokaj.
438. *bicolorinus* Grav. — I. Solum ad Budapest.
439. *bidentulus* Thoms. — I. Specimen unicum e Budapest.
440. *brevicauda* Thoms. — I. Pariter e Budapest.
441. *cingulator* Grav. — IV. S.-A.-Ujhely, Ungvár. V. Peér. VI. Mehádia.
442. *crassicornis* Grav. — IV. Solum ad Nagymihály.
443. *dispar* Thoms. — I. Tantum ad Budapest.
444. *fasciatus* Thoms. — VI. Apud nos ad Orsova.
445. *flavigaster* Schmiedekn. — Specimen unicum e Budapest.
446. *fulvipes* Grav. — IV. Exemplar unum e Kassa.
447. *hemipterus* Grav. — I. Budapest, Szentes. VI. Mehádia.
448. *inimicus* Grav. — I. Apud nos ad Budapest.
449. *insignis* Grav. *(Heringii* Ratzbg.) — I. Budapest, complura specimina e *Psyche unicolori* Hufn., Kalocsa. IV. Eperjes. VI. Ulma, Grebenácz, Mehádia.
450. *longipennis* Grav. — I. Tantum e Budapest.
451. *luteolator* Grav. — I. Specimen unicum e Budapest.
452. *macrurus* Thoms. — IV. Specimen unicum ex Ungvár.
453. *maculipennis* Grav. — I. Budapest e *Fumea intermediella* Brd.
454. *micator* Grav. — IV. Hucusque solum ad S.-A.-Ujhely.
455. *pedestris* Grav. — IV. S.-A.-Ujhely, Sztropkó, Beregszász, Torna.
456. *picipes* Grav. — I. Tantum ad Budapest.
457. *rubricollis* Thoms. — I. Pariter solummodo ad Budapest.
458. *rufullus* Thoms. — I. Budapest. IV. Vallis Szádellő.
459. *similis* Grav. — I. Specimen unicum e Szeghalom (Com. Békés).

460. *vexator* Grav. — III. Apud nos solum ad Trencsén.
461. *vicinus* Grav. — I. Budapest complura specimina e *Pontia rapae* L. IV. Kassa. VIII. Orehovica.

Bremia Kriechb.

462. *pulchella* Kriechb. — Budapest. VI. Mehádia. IV. Montes Beszkid (Coll. Braunsii).

Opheltes Hlgr.

463. *glaucopterus* L. — I. Budapest e *Cimbice lutea* L., Dabas, Nagyvárad, Szeged, Debreczen, Vaskóh. II. Pécs, Kapornak, Szombathely. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely. V. Hátszeg. VII. Raduć, Diakovár.

Hadrodactylus Thoms.

464. *nigrifemur* Thoms. — V. Specimen e Transsylvania.
465. *seminiger* Grav. — I. Ad Budapest inventus.

Mesoleptus Grav.

466. *bipunctatus* Grav. — I. Pariter tantum e Budapest.
467. *cinctulus* Grav. — III. Virágvölgy penes Poprád. IV. Homonna.
468. *cingulatus* Grav. — III. Trencsén, Virágvölgy.
469. *femoralis* Hlgr. — IV. Specimen e Bártfa.
470. *fugax* Grav. — I. Budapest. V. Hátszeg. VI. Mehádia.
471. *fulvipes* Grav. — IV. Hucusque apud nos ad Simonka.
472. *pectoralis* Grav. — VI. Specimen unicum e Mehádia.
473. *sponsorius* Grav. — IV. Exemplar unum e Homonna.
474. *prosoleucus* Grav. — IV. S.-A.-Ujhely, Vihorlat, Bártfa, montes Beszkid.
475. *subrugulosus* Först. — IV. Pariter tantum ex illa regione ad Homonna.
476. *testaceus* Fabr. — I. Budapest. VI. Mehádia, Ulma.
477. *typhae* Fourcr. — I. Budapest, Nagyvárad, Szentes, Derekegyháza. III. Trencsén, Lucsivna. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj, Sárospatak. V. Transsylvania.

Syncholeter Thoms.

478. *leptocerus* Grav. *(geniculosus* Grav.) — I. Budapest. IV. S.-A.-Ujhely, Homonna, Szinna, Kassa. V. Tasnád.

Eurycproctus Hlgr.

479. *defectivus* Grav. — I. Budapest. VI. Mehádia.
480. *nemoralis* Fourcr. — III. Vallis Szádellő. IV. Bártfa, Szinnaikő, Mármaros.
481. *nigriceps* Grav. — I. Budapest e *Clavellaria amerinae* L., Szeged. II. Tata.
482. *rufoniger* Grav. — IV. Hucusque tantum e Simonka.

Ipoctonus Thoms.

483. *atomator* Grav. — I. Specimen unicum e Nagyvárad.

Syndipnus Thoms.

484. *scotopterus* Grav. — I. Budapest. VI. Mehádia.

Eclytus Hlgr.

485. *frontalis* Hlgr. — I. Duo specimina e Budapest.
486. *ornatus* Hlgr. — VI. Pariter duo exemplaria e Mehádia.

Closterocerus Westw.

487. *sericeus* Hlgr. — Specimen unicum e Hungaria superiore.

Mesoleius Hlgr.

488. *armillatorius* Grav. — V. Exemplar unum e Transsylvania.
489. *aulicus* Grav. — I. Budapest, Hódmezővásárhely.
490. *bicolor* Grav. — I. Budapest. V. Segesvár.
491. *colon* Grav. — VI. Specimen unicum e Mehádia.
492. *filicornis* Hlgr. — I. Pariter tantum exemplar unum e Budapest.
493. *formosus* Grav. — I. Similiter solum e Budapest.
494. *haematodes* Grav. — I. Budapest, Pilis.
495. *insolens* Grav. *(Tryph. petulans* Grav.) — I. Budapest. VIII. Buccari.
496. *italicus* Grav. — III. Tantum ad Trencsén.
497. *melancholicus* Grav. — IV. Solum ad Szinna.
498. *melanocephalus* Grav. — IV. Szinna, montes Beszkid.
499. *multicolor* Grav. — I. Nagyvárad. IV. Bártfa. VI. Mehádia.
500. *niger* Grav. — VI. Tantum ad Mehádia.
501. *nigricollis* Fabr. — VIII. Solum ad Orehovica.
502. *ruficornis* Grav. — IV. Bártfa, mons Vihorlat. VI. Orsova.
503. *rufus* Grav. — Specimen unicum e Budapest.
504. *sanguinicollis* Grav. — VI. Hucusque tantum in Mehádia.

505. *semicaligatus* Grav. — I. E regione Budapest.
506. *sternoxanthus* Grav. — I. Budapest. VI. Resicza.
507. *trochanteratus* Kriechb. — III. Specimen unicum e regione lacus Csorba. Solum Hungariæ civis.
508. *ustulatus* Hlgr. — III. In illa regione ad Koritnicza.
509. *vepretorum* Grav. — III. Virágvölgy ad Poprád (Com. Szepes).
510. *Waltoni* Curt. — VI. Specimen unicum e Mehádia.

Perispudus Thoms.

511. *mesoxanthus* Thoms. — VI. Exemplar unum e Mehádia.
512. *sulphuratus* Grav. — I. Budapest. VII. Samobor.

Perilissus Först.

513. *buccatus* Kriechb. — I. Specimen unicum e Budapest. Solum Hungariam inhabitat.
514. *erythrocephalus* Grav. — III. Hucusque tantum ad Putnok (Com. Gömör.)
515. *filicornis* Grav. — I. Budapest, Kecskemét, Nagyvárad. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Bártfa, Simonka. VI. Mehádia. VII. Fužine. VIII. Buccari.
516. *limitaris* Grav. — I. Duo specimina e Budapest.
517. *pallidus* Grav. — I. Plura exemplaria e Budapest.
518. *seminiger* Grav. — I. Budapest, Nagyvárad, Szeged. II. Duna-Örs. V. Farkadin (Com. Hunyad).
519. *sticticus* Fabr. — I. Budapest. III. Virágvölgy ad Poprád. VII. Diakovár.
520. *subcinctus* Hlgr. — VI. Specimen unicum e Mehádia.
521. *vernalis* Grav. — I. Budapest, Kecskemét, Nagyvárad. IV. Homonna, Mező-Laborcz. V. Transsylvania. VI. Mehádia.

Oxytorus Thoms.

522. *armatus* Thoms. — I. Specimen unicum e Nagyvárad.

Absyrtus Hlgr.

523. *luteus* Hlgr. — IV. Hucusque solum ad Sátoralja-Ujhely.

Catoglyptus Först.

524. *antilope* Grav. — I. Pilis. VI. Mehádia.
525. *crassipes* Hlgr. — I. Plura specimina e Budapest.
526. *fortipes* Grav. — I. Budapest. IV. Erdőbénye. VI. Mehádia. VIII. Orehovica, Žakalj, Buccari.
527. *foveolator* Hlgr. — III. Hucusque tantum in Trencsén.
528. *fuscicornis* Gmel. — III. Trencsén. VI. Mehádia.

Notopygus Hlgr.

529. *resplendens* Hlgr. — III. Specimen unicum e Virágvölgy ad Poprád.
530. *rufinus* Grav. — III. Pariter ex illa regione et loco.

Griphodes Kriechb.

531. *caligatus* Kriechb. — I. Specimen unicum e Budapest. Solum Hungariam inhabitat.

Ctenopelma Hlgr.

532. *caudata* Hlgr. — III. Exemplar unum e Tátrafüred.
533. *variabilis* Tschek. — VI. Solum ad Resicza apud nos.

Prionopoda Hlgr.

534. *xanthopsana* Grav. — VI. Pariter in illa regione ad Orsova.

Trematopygus Hlgr.

535. *nigricornis* Hlgr. — IV. Specimen unicum e Varannó.
536. *procurator* Grav. — I. Hucusque solum ad Budapest.
537. *ruficornis* Hlgr. — I. In Hungaria centrali ad Kecskemét.
538. *varius* Hlgr. — IV. Montes Beszkid, Bártfa.

Tryphon Fallén.

539. *bicornutus* Hlgr. — IV. Solum ad balneum Bártfa.
540. *braccatus* Grav. — I. Budapest, montes Biharienses. IV. Mármaros. VI. Mehádia.
541. *brachyacanthus* Grav. — I. Budapest. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely. VII. Pregrada.
542. *brunniventris* Grav. — VII. Hucusque solum ad Fužine.
543. *compunctor* L. — I. Budapest. IV. Erdőbénye, Kis-Azar, Szinnaikő. VIII. Sušak.
544. *consobrinus* Hlgr. — I. Budapest. IV. Bártfa. VI. Mehádia.
545. *elongator* Grav. — I. Budapest. III. Trencsén, vallis Hermanetz, Koritnicza, Oravicza (Com. Árva), Tátra, Lucsivna. IV. S.-A.-Ujhely, montes Beszkid, Rokitó. V. Malomvíz (Com. Hunyad). VII. Pregrada. VIII. Draga.

546. *ephippium* Hlgr. — I. Budapest. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Erdőbénye. V. Transsylvania. VI. Mehádia.
547. *erythrogaster* Thoms. — III. Hucusque solum ad Trencsén.
548. *heliophilus* Grav. — VII. Apud nos tantum ad Pregrada.
549. *incestus* Hlgr. — III. Trencsén. IV. Varannó. V. Transsylvania. VII. Fužine. VIII. Draga.
550. *lateralis* Grav. — I. Specimen unicum e Budapest.
551. *naevius* Grav. — IV. Exemplar unum tantum e Bártfa.
552. *notatus* Grav. — Teste Gravenhorst species etiam Hungariam inhabitat. (57. Vol. 2. pag. 262.)
553. *rutilator* Linn. — Est species sui generis frequentissima.
554. *Schmiedeknechti* Brauns. — I. Budapest. II. Pécs.
555. *segmentarius* Grav. — I. Budapest. VI. Mehádia, Korniareva.
556. *signator* Grav. — I. Budapest, Kecskemét, Nagyvárad. IV. S.-A.-Ujhely, Sárospatak, Bártfa, montes Beszkid. V. Malomviz. VI. Mehádia, VIII. Sušak, Orehovica, Žakalj.
557. *trochanteratus* Hlgr. — III. Rajecz. IV. S.-A.-Ujhely, Varannó. V. Transsylvania. VI. Resicza.
558. *vulgaris* Hlgr. — I. Budapest, Nagyvárad. III. Trencsén, Koritnicza. IV. S.-A.-Ujhely, Mármaros. V. Transsylvania. VI. Mehádia.

Dyspetus Thoms.

559. *praerogator* Grav. — I. Budapest. IV. Mármaros. VII. Zágráb. VIII. Draga, Fiume.

Otoblastus Thoms.

560. *luteomarginatus* Grav. — I. Specimen unicum e Budapest.

Polyblastus Hart.

561. *carinatus* Hlgr. — II. Tantum ad Buda-Örs.
562. *pinguis* Grav. — I. Budapest, prædium Apaj.
563. *pratensis* Grav. — I. Budapest, Nagyvárad.
564. *sanguinatorius* Ratzbg. — IV. Specimen unicum e Tokaj,
565. *varitarsus* Grav. — I. Budapest. IV. Sátoralja-Ujhely, Ág-Csernő, Bártfa. VIII. Orehovica.

Monoblastus Hlgr.

566. *longicornis* Hlgr. — VI. Mehádia. VIII. Buccari.

Delotomus Hlgr.

567. *auriculatus* Thoms. — I. Budapest. V. Torda.
568. *cephalotes* Grav. — III. Oravicza (Com. Árva). VI. Mehádia.
569. *coarctatus* Hlgr. — I. Budapest, Pilis.
570. *lucidulus* Grav. — IV. S.-A.-Ujhely, Bártfa.

Hyperacmus Hlgr.

571. *crassicornis* Grav. — I. Specimen unicum e Budapest.

Anisoctenion Thoms.

572. *alacre* Grav. Först. — I. Complura specimina e Budapest.

Exenterus Hart.

573. *apiarius* Grav. — Hucusque solum ad Pregrada.
574. *marginatorius* F. — I. Budapest, Kalocsa. III. Virágvölgy ad Poprád.

Colpotrichia Hlgr.

575. *elegantula* Schrk. — I. Budapest, Kisujszállás, Szeged, Mező-Kovácsháza, Kalocsa. III. Nagy-Rőcze. V. Kolozsvár, Búzamező, Segesvár. VI. Mehádia. VIII. Fiume.

Chorinaeus Hlgr.

576. *australis* Thoms. — I. Budapest, Szeged. VII. Samobor.
577. *cristator* Grav. — I. Nagyvárad, Tenke. VI. Baziás.
578. *longicornis* Thoms. — I. Budapest, Nagyvárad.
579. *tricarinatus* Hlgr. — I. Specimen unicum e Budapest.

Exochus Grav.

580. *annulitarsis* Thoms. — I. Pariter tantum e regione Budapest.
581. *castaniventris* Brauns. — I. Budapest; quattuor exemplaria. Solum Hungariæ civis.
582. *consimilis* Hlgr. — I. Tantum exemplar unum e Budapest.
583. *coronatus* Grav. — I. Szeghalom (Com. Bihar). V. Peér.
584. *femoralis* Grav. — I. Budapest. IV. Ungvár.
585. *flavomarginatus* Hlgr. — I. Specimen unicum e Budapest.
586. *gravipes* Grav. — I. Budapest, Kecskemét. III. Trencsén. VII. Pregrada.
587. *mitratus* Grav. — I. Budapest. VI. Mehádia.
588. *nigripalpis* Thoms. — IV. Specimina e Mármaros.
589. *prosopius* Grav. — I. Budapest. IV. Mármaros.

Strongylopsis Brauns.

590. *anomala* Brauns. — I. Budapest. VI. Mehádia. Solum Hungariæ incola.

Triclistus Thoms.

591. *Holmgreni* Thoms. — VI. Specimina e Mehádia.

592. *pubiventris* Thoms. — I. Apud nos solum e Budapest.

Bassus Fabr.

593. *albosignatus* Grav. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Pécs. IV. Kis-Azar, Tolcsva. VIII. Sušak, Orehovica.

594. *areolatus* Hlgr. — IV. S.-A.-Ujhely, Tolcsva.

595. *cinctus* Grav. — I. Hucusque solum ad Budapest.

596. *laetatorius* Fabr. — I. Budapest e *Calophasia casta* Bkh., Szolnok, Nagyvárad, Debreczen, Rév, Szentes. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Erdőbénye, Tolcsva, Homonna. V. Tasnád. VI. Mehádia, Resicza. VIII. Sušak, Orehovica.

597. *multicolor* Grav. — VI. Specimen unicum e Resicza.

598. *nemoralis* Hlgr. — IV. Bártfa, Tolcsva.

Promethus Thoms.

599. *festivus* Grav. — I. Budapest. IV. Tolcsva, Bártfa. V. Zilah.

600. *pulchellus* Hlgr. — I. Budapest, Nagyvárad. IV. Kassa. VIII. Buccari.

601. *sulcator* Grav. — I. Szoboszló (Com. Hajdú). IV. S.-A.-Ujhely, montes Beszkid.

Homoporus Thoms.

602. *bizonarius* Grav. — I. Budapest, Nagyvárad. IV. Sátoralja-Ujhely, Simonka, Bártfa. VIII. Orehovica.

603. *lateralis* Grav. — IV. Hucusque solum ad Tokaj.

604. *ornatus* Grav. — I. Complura specimina e Budapest.

605. *pectoratorius* Grav. — I. Budapest, Nagyvárad. III. Lucsivna. IV. Forró, Tolcsva, Bártfa.

606. *pictus* Grav. — VIII. Hucusque solum in Sušak.

607. *sexcinctus* Brauns. — I. Specimen unicum e Budapest. Solum Hungariæ incola.

Metopius Panz.

608. *anxius* Wesm. — I. Budapest. VII. Pregrada.

609. *circumcinctus* Först. (*nasutus* Gir.) — I. Budapest e *Bombyce lanestri* L. III. Tavarnok (Com. Nyitra). IV. Eperjes e *Bombyce catace* L. numerose exclusus.

610. *connexorius* Wesm. — VII. Hucusque solum in Pregrada.

611. *dentatus* Fabr. — I. Budapest plura exemplaria e *Bombyce quercus* L. VIII. Sušak, Draga.

612. *erythropus* Kriechb. — I. Specimen unicum e Budapest. Solum Hungariæ incola.

613. *fuscipennis* Wesm. — I. Budapest. IV. Nagymihály.

614. *leiopygus* Först. — I. Budapest, Debreczen. VI. Mehádia, Jassenova.

615. *micratorius* Fabr. — I. Budapest, Péczel. VII. Pregrada.

Eumesius Westw.

(*Euceros* Grav.)

616. *albitarsus* Curt. — VI. Specimen unicum e Resicza.

617. *crassicornis* Grav. — I. Budapest. IV. Eperjes.

618. *dimidiatus* Brullé. — I. Budapest. IV. Komjáti (Com. Torna).

619. *superbus* Kriechb. — VI. Mehádia, Resicza.

Exyston Schiödte.

620. *carinatus* Thoms. — I. Budapest. VI. Mehádia.

621. *cinctulus* Grav. — III. Hucusque solum ad Trencsén.

Hellwigia Grav.

622. *elegans* Grav. — I. Budapest. VI. Ulma. VII. Dálya.

623. *obscura* Grav. — I. Specimen unicum e Budapest.

Ophion Fabr.

624. *costatus* Ratzbg. — Hungaria etiam (Coll. Braunsii).

625. *curvinervis* Kriechb. — I. Budapest, Szeged. VI. Ferenczfalva.

626. *dispar* Brauns. — IV. Specimen unicum ex Eperjes. Solum Hungariæ incola.

627. *longigena* Thoms. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Pécs e *Cucullia formosa* Rog. et *chamomillae* Schiff., Kőszeg. VI. Mehádia.

628. *luteus* Linn. — I. Budapest e *Cucullia argentina* Hufn., Nagyvárad, Debreczen, Vaskoh. III. Trencsén, Igló. IV. Nagymihály, Kassa, Eperjes, Rabaszkala, Forró, Mármaros. V. Mezőség, Tihucza. VI. Mehádia. VIII. Draga, Buccari.

629. *minutus* Kriechb. — I. Complura specimina e Budapest.

630. *Mocsáryi* Brauns. — I. Budapest e *Cirrhoidea ambusta*. Fabr. copiose educatus.

631. *obscurus* Fabr. — I. Budapest ex *Episema scoriacea* Esp. et *Polysphaene sericata* Bkh., Kecskemét, Kalocsa.

632. *parvulus* Kriechb. — I. Budapest e *Cucullia*

tanaceti Schiff. et *artemisiae* Hufn. plura specimina exclusa.

633. *pteridis* Kriechb. — III. Hucusque solum ad Virágvölgy (Com. Szepes).

634. *unicallosus* Voll. — VI. Zombor, Grebenácz.

635. *ventricosus* Grav. — I. Budapest, Nagyvárad. III. Tátra.

Stauropoctonus Brauns.

636. *bombycivorus* Grav. — I. Monor (Com. Pest) specimen unicum.

Eniscopilus Steph.

637. *inflexus* Ratzbg. — VI. Specimen unicum e Mehádia.

638. *merdarius* Grav. — I. Budapest e *Cucullia chrysanthemi* Gbn., *Dianthoecia albimacula* Bkh. et *Simyra nervosa* Fabr., Kecskemét, Debreczen, Szeged. III. Szliács, Turcsek. IV. S.-A.-Ujhely. V. Hátszeg, Tihucza. VI. Resicza, Zombor. VII. Gospić. VIII. Žakalj, Cirkvenica.

639. *ramidulus* L. — I. Dabas, Kalocsa. III. Pozsony. IV. Tiszabő. Eperjes.

640. *repentinus* Hlgr. — I. Budapest, Peszér. VI. Grebenácz, Jassenova. VII. Zágráb, Raduć.

641. *undulatus* Grav. — I. Budapest e *Bombyce quercus* L. plura specimina. IV. Eperjes e *Lasiocampa betulifolia* Hbn., Mármaros. VI. Ulma.

Eremotylus Först.

642. *marginatus* Grav. — I. Budapest, Péczel. IV. Eperjes.

Parabatus Thoms.

643. *cristatus* Thoms. — IV. Specimen unum e Kassa.

644. *latungula* Thoms. — VII. Hucusque solum ad Zágráb.

645. *virgatus* Grav. — VII. Tantum ad Pregrada.

Paniscus Thoms.

646. *fuscipennis* Grav. — Specimen unicum ex Hungaria.

647. *gracilipes* Thoms. — VI. Ulma, Grebenácz. V. Tihucza. VII. Pregrada, Zágráb.

648. *testaceus* Grav. — I. Budapest e *Perigrapha cincta* F., *Harpyia bifida* Hbn., *Pygaera curtula* L., *Cloanthe radiosa* Esp. et *Polia polymita* L., Kecskemét, Nagyvárad, Szoboszló, Szeghalom, Szeged. IV. Bártfa, Eperjes. VI. Mehádia. VII. Gospić.

v. *melanurus* Thoms. — I. Budakesz. III. Trencsén. VI. Resicza.

649. *Thomsoni* Brauns. — I. Duo specimina e Budapest.

Schizoloma Wesm.

650. *amictum* Fabr. — VI. Mehádia. VII. Zlatar, Zágráb.

Heteropelma Wesm.

651. *calcator* Wesm. — I. Budapest. VI. Mehádia. VII. Zlatar.

Exochilum Wesm.

652. *brevicorne* Grav. — I. Budapest. VIII. Sušak, Žakalj.

653. *circumflexum* Linn. — II. Kőszeg, III. Balneum Lucski, Lucsivna, Rozsnyó. IV. Eperjes e *Nonagria sparganii* Esp. V. Balneum-Tusnád. VI. Mehádia, Frenczfalva. VII. Pregrada. VIII. Sušak, Buccari.

Agrypon Först.

654. *clandestinum* Först. — Specimen typicum ex Hungaria.

655. *flaveolatum* Grav. — I. Budapest, Pilis, Nagyvárad. VI. Mehádia.

656. *furtivum* Först. — I. Budapest, Algyő. VI. Mehádia.

657. *tenuicorne* Grav. *(delarvatum* nobis). — I. Budapest e pupis *Thais polyxenae* Schiff. copiose educatum, Nagyvárad. III. Tavarnok (Com. Nyitra). IV. Eperjes, Imreg. VII. Pregrada.

658. *trochanteratum* Hlgr. — I. Budapest. VI. Jassenova.

659. *varitarse* Wesm. — IV. Specimen unicum e Mármaros.

Anomalon Grav.

660 *arcuatum* Grav. — IV. Specimen unicum e Tiszabő.

661. *annulitarse* Thoms. — I. Tria exemplaria e Budapest.

662. *armatum* Wesm. — I. Budapest ex *Eugonia quercaria* Hbn. et *Acronycta cuspide* Hbn. IV. Kassa.

663. *bellicosum* Wesm. — I. Isaszeg. IV. Eperjes e *Sphinge pinastri* L.

664. *brevicolle* Wesm. — VI. Specimen unicum e Mehádia.

665. *canaliculatum* Ratzbg. — I. Exemplar unum e Budapest.

666. *ruficorne* Grav. — I. Budapest. II. Zirz.

667. *cerinops* Grav. — I. Budapest e *Calocampa exoleta* L. II. Tapolcza. III. Koritnicza. V. Tihucza (Com. Besztercze-Naszód). VI. Mehádia.

668. *discrepans* Brauns. — I. Budapest. Solum Hungariæ civis.

669. *fibulator* Grav. — I. Budapest, Dabas. Plura exemplaria.
670. *flavipenne* Brauns. — I. Apud nos solum ad Budapest.
671. *latro* Grav. *(lethifer* Först. i. l.) — I. Budapest e *Diloba coeruleocephala* L., *Perigrapha cincta* F. et *Acronycta acere* L. III. Tavarnok. IV. Sárospatak. VIII. Sušak.
672. *longicorne* Brauns. — I. Budapest e *Phalera bucephala* L. Solum Hungariæ incola.
673. *delarvatum* Grav. — I. Budapest, in coll. Dom. Mayr.
674. *Försteri* mihi *(brevicorne* Först., nec Grav.) — I. Specimen unicum e Budapest. Solum Hungariæ incola.
675. *giganteum* Grav. — VII. Exemplar unum e com. Pozsega.
676. *melanops* Först. — I. Budapest. Tantum Hungariam inhabitat.
677. *paradoxum* Brauns. — VI. Specimen unicum e Mehádia. Solum Hungariæ civis.
678. *procerum* Grav. — VI. Exemplar unicum e Resicza.
679. *propugnator* Först. — I. Budapest; rarum. Tantum apud nos.
680. *signatum* Grav. — I. Budapest e *Saturnia pavonia* L., *Bombyce lanestri* L. et *trifolii* L.
681. *varians* Brauns. — I. Budapest, Kecskemét. VI. Resicza. Tantum Hungariæ incola.
682. *vicinum* Först. — I. Specimen unicum e Budapest. Solum Hungariæ civis.

Atrometus Först.

683. *trachynotus* Brauns. — I. Budapest; duo specimina e *Zygaena laeta* Hbn. Tantum Hungariæ incola.

Barylypha Thoms.

684. *genale* Thoms. — I. Budapest e *Bombyce castrensi* L. et *Cloanthe hyperici* Fabr.
685. *humerale* Brauns. — I. Budapest, non rara, Csepel, Szeged, Makkos, Fehértó. VI. Mehádia. Solum Hungariam inhabitat.
686. *perspicillator* Grav. — I. Complura exemplaria e Budapest. VII. Pregrada.
687. *uniguttatum* Grav. — I. Budapest, Kecskemét, Szeged.

Trichomma Wesm.

688. *enecator* Rossi. — VII. Montes Zágrábienses, Sljeme.
689. *fulvidens* Wesm. — I. Budapest, Csepel, Nagyvárad.

Gravenhorstia Boie.

690. *picta* Boie. — VII. Apud nos solum ad Martinšćica.

Barycephalus Brauns.

691. *Mocsáryi* Brauns. — I. Budapest. VI. Ulma. Solum Hungariæ incola.
692. *seminiger* Brauns. — I. Budapest. Pariter tantum terram nostram colit.

Trachynotus Grav.

693. *foliator* F. — I. Budapest, Gyón (Com. Pest). II. Duna-Örs. V. Tusnád. VI. Orsova. VIII. Carlopago.

Campoplex Grav.

694. *adjunctus* Först. — VI. Specimen unicum e Mehádia.
695. *areolatus* Brauns. — I. Budapest. Tantum Hungariæ civis.
696. *arvensis* Grav. — Teste Kirchner etiam Hungariam inhabitat. (66. pag. 90.)
697. *auriculatus* Först. — I. Complura specimina e Budapest.
698. *blandus* Först. IV. Komjáti, Mármaros.
699. *bucculentus* Hlgr. — I. Budapest e *Heliothe dipsacea* L., Dabas, Kecskemét, Nagyvárad. VI. Mehádia, Resicza.
700. *calceatus* Brauns. — I. Tria specimina e Budapest. Solum apud nos.
701. *canaliculatus* Först. — I. Duo exemplaria e Budapest.
702. *castanipes* Thoms. — I. Plura specimina e Budapest.
703. *cobolicida* Först. — VI. Specimen unicum e Mehádia.
704. *confusus* Först. — III. Hucusque solum ad Tátrafüred.
705. *cultrator* Grav. — I. Budapest, Péczel.
706. *facialis* Först. — III. Apud nos tantum in montibus Tátricis.
707. *falcator* Thunbg. — I. Budapest e *Phalaera bucephaloide* Ochs. et *Simyra nervosa* Fabr. II. Zircz. III. Lucsivna. IV. Csécs (Com. Abauj).
708. *foveolatus* Först. — I. Budapest. IV. Eperjes. VI. Mehádia.
709. *insignitus* Först. — IV. Eperjes e *Hylophila bicolorana* Fuessly.
710. *nitidulator* Hlgr. — I. Budapest, Nagyvárad. III. Oravicza. VI. Korniareva.
711. *nobilitatus* Hlgr. — I. Duo specimina e Budapest.
712. *obliterator* Först. — VIII. Hucusque solum ad Orehovica.

713. *oxyacanthae* Boie. — I. Budapest e *Caradrina pulmonari* Esp. IV. Eperjes.
714. *perditor* Först. — IV. Eperjes. Quinque specimina e *Hylophila bicolorana* Fuessly.
715. *prominulus* Först. — I. Duo exemplaria e Budapest.
716. *pugillator* Linn. — I. Budapest e *Phalaera bucephaloides* Ochs. et *Cirrhoidea ambusta* F. plura specimina, Nagyvárad. II. Duna-Örs. IV. S.-A.-Ujhely, Imreg, Nagymihály, Bártfa. V. Szucság. VI. Korniareva. VII. Pregrada. VIII. Buccari.
717. *signator* Brauns. — III. Nagy-Rőcze, duo specimina. Solum Hungariæ incola.
718. *spinipes* Thoms. — I. Complura exemplaria e Budapest.
719. *stragifex* Först. — I. Budapest. III. Tátrafüred.
720. *stygius* Först. — I. Tria exemplaria e Budapest.
721. *subaequalis* Först. — III. Hucusque apud nos solum in Trencsén.
722. *tenuis* Först. — I. Duo specimina e Budapest.

Ecphora Thoms.

723. *vexans* Hlgr — I. Plura specimina e *Caradrina lenta* Tr.

Charops Hlgr.

724 *decipiens* Grav. — I. Budapest e *Zygaena laeta* Hbn. et *punctum* Ochs. numerose educata, Peszér. III. Trencsén. V. Segesvár. VI. Mehádia, Resicza. VIII. Sušak.

Sagaritis Hlgr.

725. *annulata* Grav. — I. Apud nos solum ad Budapest.
726. *declinator* Grav. — I. Budapest e *Plusia modesta* Hbn. IV. Montes Beszkid.
727. *lutrator* Grav. — I. Budapest e *Talpochare communimacula* Hbn.
728. *zonata* Grav. — IV. S.-A.-Ujhely, Bereczki, Erdőbénye, montes Beszkid. VIII. Vežica.

Cymadusa Hlgr.

729. *cruentata* Grav. — III. Homonna. IV. Mármaros. VII. Mrzla vodica.

Casinaria Hlgr.

730. *claviventris* Hlgr. — I. Hucusque apud nos solum ad Budapest.
731. *ischnogaster* Thoms. — VI. Duo specimina ex Oravicza.
732. *morionella* Hlgr. — VIII. Solum in regione adriatica ad Sušak.
733. *nigripes* Grav. — VI. Specimen unicum e Resicza.
734. *orbitalis* Grav. — IV. Montes Beszkid. VIII. Fiume.
735. *tenuiventris* Grav. — I. Budapest. III. Bereczki. VIII. Sušak, Orehovica.

Limneria Hlgr.

736. *albida* Gmel. — I. Budapest, Nagyvárad. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj, Vihorlat. V. Peér. VI. Mehádia, Resicza.
737. *ensator* Grav. — I. Hucusque solum ad Budapest.
738. *fuscicarpus* Thoms. — I. Specimen unicum e Budapest.
739. *geniculata* Grav. — I. Budapest ex *Arctia casta* Esp. IV. Montes Beszkid. VIII. Orehovica.
740. *juniperina* Hlgr. — III. Specimen unum ex Oravicza.
741. *notata* Grav. — I. Budapest. IV. Szomotor. VI. Mehádia, Orsova.
742. *planiscapus* Thoms. — I. Exemplar unum e Budapest.
743. *tibialis* Grav. — I. Budapest e *Caradrina lenta* Tr.

Pyracmon Hlgr.

744. *fumipennis* Zett. — I. Budapest. VI. Orsova.
745. *melanurus* Hlgr. — VI. Specimen unicum e Mehádia.
746. *obscuripes* Hlgr. — I. Exemplar unum e montibus Bihar.
747. *xoridiformis* Hlgr. — I. Budapest, Pilis. V. Vizvölgy (Com. Hunyad).

Phobocampa Thoms.

748. *bicingulata* Grav. — I. Budapest. IV. Balneum Ránk.

Omorga Thoms.

749. *difformis* Grav. — I. Kecskemét. III. Szliács.
750. *multicincta* Grav. — I. Specimen unicum e Nagyvárad.
751. *ruficoxa* Thoms. — Secundum Thomson solum in Hungaria (195, pag. 1127.)

Olesicampa Thoms.

752. *fulviventris* Grav. — VII. Apud nos solum ad Fužine.
753. *longipes* Grav. — I. Budapest. VI. Mehádia, Orsova.

Meleboris Thoms.

754. *rufiventris* Grav. — I. Complura exemplaria e Budapest.

Angitia Hlgr.

755. *armillata* Grav. — I. Specimen unum e Budapest.
756. *rufipes* Grav. — I. Budapest. VIII. Fiume, Sušak.
757. *sanguinicoxa* Brauns. — I. Duo specimina e Budapest. Solum Hungariæ incola.
758. *tenuipes* Thoms. — I. Exemplar unum e Budapest.

Holocneme Thoms.

759. *melanogaster* Thoms. — III. Specimen unicum e Poprád.

Analista Thoms.

760. *braccata* Grav. — IV. Hucusque solum ad S.-A.-Ujhely.
761. *dolosa* Grav. — I. Budapest. VI. Mehádia.
762. *ebenina* Thoms. — I. Specimen unicum e Nagyvárad.
763. *melanaria* Hlgr. — I. Budapest; complura specimina ex *Orgyia ericae* Germ.
764. *ochrostoma* Hlgr. — I. Apud nos solum ad Budapest.
765. *rapax* Grav. — I. Budapest. VI. Orsova.
766. *rufocincta* Grav. — I. Complura exemplaria e Budapest.

Cremastus Grav.

767. *bellicosus* Grav. — I. Budapest. IV. S.-A.-Ujhely, Mármaros.
768. *confluens* Grav. — I. Hucusque solum ad Budapest.
769. *decoratus* Grav. — I. Pariter tantum in Hungaria centrali.
770. *geminus* Grav. — I Budapest, Kecskemét.
771. *interruptor* Grav. — I. Kecskemét. IV. Szőllőske (Com. Zemplén).
772. *pungens* Grav. — I. Tantum in Hungaria centrali.

Atractodes Grav.

773. *gravidus* Grav. — VI. Specimen unicum e Mehádia.

Exolytus Först.

774. *laevigatus* Grav. — I. Budapest. III. Montes Tátrenses. IV. Tolcsva. V. Kolozsvár. VI. Mehádia. VIII. Vežica.
775. *petiolaris* Thoms. — I. Exemplar unicum e Budapest.

Cidaphus Först.

776. *alliarius* Först. — I. Apud nos hucusque solum ad Budapest.

Mesochorus Grav.

777. *dorsalis* Hlgr. — III. Solum ad Oravicza.
778. *fulgurans* Curt. — I. Specimen unum e Budapest.
779. *testaceus* Grav. — I. Pariter tantum e regione Budapest.
780. *thoracicus* Grav. — IV. Hucusque solum ad S.-A.-Ujhely.
781. *varipes* Hlgr. — VI. Exemplar unum e Mehádia.
782. *vittator* Hlgr. — I. Pariter specimen unicum e Budapest.
783. *vitticollis* Hlgr. — I. Plura specimina e Budapest.

Porizon Grav.

784. *claviventris* Grav. — Secundum auctorem est etiam Hungariæ incola (57, Vol. III. pag. 755.)
785. *gravipes* Grav. — I. Duo specimina e Budapest.
786. *harpurus* Schrk. — I. Kecskemét. III. Trencsén.

Tersolichus Hlgr.

787. *moderator* Grav. — I. Complura specimina e Budapest.
788. *nutritor* Grav. — I. Pariter plura exemplaria e Budapest.

Pristomerus Hlgr.

789. *vulnerator* Panz. — I. Budapest, Kecskemét. V. Peér. VI. Mehádia.

Dimophora Först.

790. *robusta* Brischke. — VI. Specimen unicum e Mehádia.

Rhynchobanchus Kriechb.

791. *bicolor* Kriechb. — VI. Specimen unicum e Resicza. Solum Hungariæ incola.

Banchus Fabr.

792. *compressus* Fabr. — I. Budapest. III. Mons Vihorlat. VI. Mehádia.
793. *falcator* Fabr. I. Budapest, Nagyvárad, Szeged. II. Kapornak. III. Trencsén, Tátrafüred, Koritnicza. V. Tasnád, Borszék, Tihucza. VI. Mehádia. VII. Velebit, Fužine. VIII. Sušak.
794. *hastator* Fabr. — Specimen unicum e Mehádia.
795. *pictus* Fabr. — I. Budapest e *Cirrhoidea ambusta* Fabr., Kalocsa, Kecskemét, Nagyvárad. II. Tapolcza. III. Tátrafüred. IV. Varannó. V. Tasnád, Zilah. VII. Pregrada, Zágráb. VIII. Pećine.
796. *similis* Kriechb. — I. Tantum exemplar unum e Budapest.

Corinephanus Wesm.

797. *moniliatus* Grav. — V. Balneum Tusnád, Tihucza (Com. Besztercze-Naszód) in pinetis.

Scolobates Grav.

798. *auriculatus* Fabr. — IV. Szomotor. VI. Palics. VIII. Buccari.

799. *nigripennis* Sich. — I. Budapest, Sz.-Lőrincz. VIII. Sušak, Buccari.

Pachymerus Grav.

800. *calcitrator* Grav. — I. Budapest, prædium Apaj, Kecskemét, Nagyvárad, Csongrád, Derékegyháza. IV. S.-A.-Ujhely, Kis-Azar. VI. Mehádia.

Arotes Grav.

801. *albicinctus* Grav. (*Sphalaerus bifasciatus* Kriechb.). — VI. Duo specimina e Mehádia.

802. *annulicornis* Kriechb. — V. Specimen unicum e balneo Tusnád. Solum Hungariæ incola.

803. *ustulatus* Kriechb. — VI. Mehádia, Oravicza. Similiter tantum Hungariam inhabitat.

Leptobates Grav.

804. *gracilis* Brauns. — I. Specimen unicum e Budapest. Tantum Hungariæ civis.

805. *rufipes* Linn. — III. Koritnicza, Lucsivna. V. Tusnád. VI. Ferenczfalva.

806. *Ziegleri* Grav. — I. Complura exemplaria e Budapest.

Exetastes Grav.

807. *bilineatus* Grav. — VIII. Hucusque solum ad Sušak.

808. *cinctipes* Retz. — I. Sz.-Lőrincz. II. Balf (Com. Sopron).

809. *clavator* Grav. — In Hungaria centrali ad Kecskemét.

810. *crassus* Grav. — I. Budapest e *Chariclea delphinii* L. et *Mammestra oleracea* L., Monor e *Notodonta ziczac* L., Nagyvárad. IV. Szomotor. VI. Mehádia.

811. *facialis* Desv. — I. Specimen unicum e Budapest.

812. *fornicator* Fabr. — I. Nagyvárad. III. Koritnicza, balneum Lucski, Igló. IV. Vihorlat, Mármaros. V. Nagyvizvölgy, Tihucza. VI. Mehádia. VII. Raduć.

813. *geniculosus* Hlgr. — I. Complura specimina e Budapest.

814. *gracilicornis* Grav. — I. Pariter plura exemplaria e Budapest.

815. *guttatorius* Grav. — I. Budapest e *Caradrina Kadenii* Frr. et *ambigua* Frr. numerose exclusus. IV. Tokaj. V. Tihucza. VI. Mehádia, Ferenczfalva. VII. Zágráb. VIII. Fiume, Žakalj, Buccari.

816. *illusor* Grav. — I. Budapest ex *Agrote putri* L., Nagyvárad. III. Trencsén, Virágvölgy, lacus Csorba, Koritnicza. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj. VI. Mehádia.

817. *laevigator* Vill. — III. Koritnicza, vallis Deményfalva, Poprád, Tátra, Oravicza. IV. Vihorlat, Mármaros. V. Tihucza. VI. Mehádia, Ferenczfalva.

818. *nigripes* Grav. — III. Trencsén, Szliács. IV. Komjáti. V. Tasnád. VI. Mehádia, Jassenova. VII. Fužine.

819. *nitidulus* Grav. — VIII. Hucusque solum ad Pećine.

820. *robustus* Grav. — I. Tria exemplaria e Budapest.

Glyptocentrus Thoms.

821. *fulvipes* Grav. — VI. Hucusque solum e Mehádia.

Lampronota Halid.

822. *nigra* Grav. — II. Duna-Örs. III. Trencsén. VI. Mehádia.

Perithous Hlgr.

823. *albicinctus* Grav. — VII. Hucusque tantum e Pregrada.

824. *divinator* Rossi. — I. Budapest, Szeged. II. Pécs. III. Trencsén. V. Peér, Tihucza.

825. *mediator* Farr. — I. Budapest e *Cynipe argentea* Gir., Kecskemét. II. Pécs. IV. Sátoralja-Ujhely, Czéke. VIII. Orehovica.

826. *varius* Grav. — I. Budapest (coll. Mayri). IV. Nagymihály, Ungvár. VIII. Orehovica.

Glypta Grav.

827. *bifoveolata* Grav. — I. Budapest, Nagyvárad. III. Trencsén. IV. Bártfa. V. Tasnád ex Aranearum specie *Steatoda castanea* Clerck. VI. Oravicza.

828. *Brischkei* Hlgr. — VIII. Hucusque solum e Fiume.

829. *ceratites* Grav. — I. Peszér, Szeged. IV. Bártfa, montes Beszkid. VI. Mehádia.

830. *evanescens* Ratzbg. — I. Budapest, Szeghalom.

831. *filicornis* Thoms. — I. Budapest, Peszér, Nagyvárad. VI. Orsova.

832. *flavolineata* Grav. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Badacsony. III. Trencsén. IV. Bártfa, Simonka.

833. *fronticornis* Grav. — I. Kecskemét. IV. Sátoralja-Ujhely. V. Balneum Tusnád.

834. *genalis* Möll. — VI. Specimen unicum e Mehádia.

835. *haesitator* Grav. — IV. Apud nos ad Bártfa.

836. *incisa* Grav. — V. Exemplar unum e Kolozsvár.
837. *mensurator* Grav. — I. Budapest, Szeged. II. Boglár. III. Trencsén. V. Tasnád.
838. *microcera* Thoms. — I. Budapest. V. Tasnád, Peér.
839. *rostrata* Hlgr. — I. Budapest. II. Pécs. III. Tátrafüred. VI. Mehádia.
840. *sculpturata* Grav. — II. Kőszeg. V. Magura (Com. Kolozs). VI. Mehádia.
841. *scalaris* Grav. — VI. Specimen unicum ex Orsova.
842. *striata* Grav. — V. Pariter tantum exemplar unum e Torda.
843. *tegularis* Thoms. — V. Hucusque solum ad balneum Tusnád.
844. *vulnerator* Grav. — I. Budapest. III. Montes Tátrenses. IV. Simonka (Com. Zemplén), Szinnyér-Váralja.

Lissonota Grav.

845. *agnata* Grav. — IV. Eperjes. V. Tihucza (Com. Besztercze-Naszód).
846. *bellator* Grav. (*argiola* Grav.) — I. Budapest, Nagyvárad. II. Badacsony. III. Trencsén. IV. Erdőbénye, Varannó, Vihorlat, Orosz-Ruszka, montes Beszkid, Mármaros. VI. Orsova, Mehádia.
847. *bicornis* Grav. — I. Duo specimina e Nagyvárad.
848. *catenator* Panz. — IV. Szomotor, Bártfa, Vihorlat, Simonka, Javorina. VII. Zágráb.
849. *commixta* Hlgr. — IV. S.-A.-Ujhely, Erdőbénye, Vihorlat, Bártfa.
850. *conflagrata* Grav. — I. Budapest, Mártonkáta. VI. Mehádia.
851. *culiciformis* Grav. — I. Budapest. IV. Sátoralja-Ujhely, Rakovica.
852. *cylindrator* Grav. — I. Budapest, Beél. III. Trencsén. IV. Sárospatak. Bártfa. V. Szucság, Brassó. VI. Mehádia.
853. *decimator* Grav. Kriechb. — I. Kecskemét. IV. S.-A.-Ujhely, Szomotor. VII. Eszék. VIII. Orehovica.
854. *diversor* Grav. — I. Specimen unicum e Budapest.
855. *elector* Grav. — I. Budapest. VII. Pregrada.
856. *hians* Thoms. — I. Budapest, Nagyvárad.
857. *hortorum* Grav. — III. Hucusque tantum in Trencsén.
858. *impressor* Grav. — I. Budapest. III. Trencsén.
859. *irrisoria* Grav. — I. Budapest e *Sesia cynipiformi* Esp. et *Talpochare pannonica* Frr.
860. *lateralis* Grav. — I. Tantum ad Budapest.
861. *leptogaster* Hlgr. — IV. Specimen unicum e Mármaros.
862. *lunigera* Brauns. — I. Duo specimina e Budapest.
863. *maculatoria* Fabr. — I. Budapest, Meziád. IV. Legyes-Bénye. V. Semesnye. VIII. Vežica. Orehovica, Žakalj, Buccari.
864. *manca* Brauns. — I. Budapest. VI. Mehádia. Solum Hungariæ incola.
865. *murina* Grav. — I. Budapest, Pilis. III. Trencsén.
866. *parallela* Grav. — I. Budapest, Kisujszállás, Nagyvárad, Szeghalom, Meziád, Debreczen, Szeged. II. Balf (Com. Sopron). IV. Sátoralja-Ujhely, Szomotor, Szőllőske, Tokaj. V. Peér, Semesnye. VI. Báziás, Grebenácz, Gombos.
867. *petiolaris* Grav. — I. Specimen unicum e Budapest.
868. *pimplator* Zett. — I. Pariter tantum e regione Budapest.
869. *scapularis* Kriechb. — In Musæo aulico vindobonensi teste auctore ex Hungaria (101, 90, pag. 483.)
870. *segmentator* Fabr. — III. Trencsén. IV. Sátoralja-Ujhely, Sárospatak, Tokaj, Tolcsva.
871. *setosa* Grav. — I. Budapest, Kecskemét, Nagyvárad, Debreczen.
872. *sulphurifera* Grav. — I. Budapest. VIII. Vežica, Buccari.
873. *varicoxa* Thoms. — I. Budapest. VI. Baziás.
874. *verberans* Grav. — III. Szliács. V. Buzamező. VII. Zágráb.

Schizopyga Grav.

875. *podagrica* Grav. — I. Budapest. IV. Sátoralja-Ujhely.

Ctenochira Först.

876. *bisinuata* Först. — I. Specimen unicum e Budapest. Solum Hungariæ incola.

Aphanoroptrum Först.

877. *abdominale* Grav. — I. Budapest. IV. Bártfa. VII. Diakovár.

Pimpla Fabr.

878. *alternans* Grav. — III. Hucusque apud nos in Trencsén.
879. *angens* Grav. — I. Kisujszállás. II. Badacsony. VI. Mehádia.
880. *arundinator* Gir. — IV. Imreg, Tállya. VI. Zombor.
881. *brevicornis* Grav. — I. Solummodo ad Budapest.

882. *brunnea* Nees. — VIII. Tantum ad Fiume.
883. *calobata* Grav. — I. Specimen unicum e Budapest.
884. *capulifera* Kriechb. — IV. Eperjes e *Limenite populi* L.
885. *detrita* Hlgr. — I. Budapest. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely. V. Tasnád.
886. *examinator* Fabr. — I. Budapest ex *Acronycta rumicis* L. et *Epichnopteryge bombycella* Schiff. et præterea fere in omni parte regni.
887. *extensor* L. — IV. Szőllőske. V. Zilah. VIII. Vežica.
888. *flavipes* Grav. — Secundum auctorem est etiam Hungariæ incola (57, Vol. III. pag. 198.)
889. *graminellae* Hlgr. — V. Hucusque solum in Mezőség.
890. *Gravenhorstii* Taschbg. — II. Apud nos tantum ad Kopács.
891. *illecebrator* Grav. — I. Budapest e *Deilephila Elpenore* L.
892. *instigator* Linn. — Est species sui generis frequentissima, e pupis: *Pygaerae curtulae* L., *Spilosomae mendicae* Cl., *Ocneriae disparis* L., *Dasychirae fascelinae* L., *Cosmiae ablutae* Hbn., *Mammestrae oleraceae* L. et *Vanessae xanthomelanos* Esp. educata.
893. *inflata* Grav. (*varicornis* Grav.). — I. Budapest e *Zygaena punctum* Ochs., Nagyvárad, Debreczen. II. Parád, Zircz. III. Tavarnok, Szliács. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj, Komjáti, Rozsnyó, Eperjes. V. Mezőség. VI. Mehádia, Resicza.
894. *inquisitor* Scop. (*stercorator* Grav.) — I. Budapest, Peszér. III. Trencsén. IV. Simonka, Bánszka, Ungvár.
895. *mandibularis* Grav. — IV. Specimen unicum e Mármaros.
896. *melanocephala* Grav. — I. Budapest e *Leucania impura* Hbn., Péczel, Kecskemét, Kalocsa, Szeged, Debreczen. VI. Mehádа.
897. *nucum* Ratzbg. — VII. Hucusque tantum ad Pregrada.
898. *oculatoria* Fabr. — I. Budapest, Szeged. III. Balneum Lucsivna.
899. *ornata* Grav. — I. Budapest. II. Keszthely.
900. *ovalis* Thoms. — I. Budapest e *Psyche Ecksteinii* Led.
901. *roborator* Fabr. — I. Budapest. II. Kopács.
902. *rufata* Grav. (*flavonotata*. Hlgr.) — I. Budapest, Parád. III. Trencsén, Turócz, Poprád. IV. Montes Beszkid. VII. Fužine. VIII. Fiume, Orehovica.
903. *scanica* Linn. — I. Budapest e *Chariptera viridana* Walch., Peszér. III. Homonna, Tátrafüred. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj, Imreg, Bártfa. VI. Mehádia, Ulma. VIII. Sušak, Orehovica, Žakalj, Buccari.
904. *strigipleuris* Thoms. — V. Tantum specimen unicum e Brassó.
905. *turionellae* Linn. — I. Budapest e *Talpochare rosea* Hbn. et *communimacula* Hbn., Nagy-Várad, Hadház, Algyő, Szeged. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj, Bártfa, Varannó, Kassa, Mező-Laborcz. VI. Mehádia. VIII. Sušak, Orehovica, Buccari.
906. *viduata* Grav. — I. Budapest e *Psyche Ecksteinii* Led. et *Ocneira dispare* L., Peszér ex *Orgyia ericae* Germ. *var. intermedia* Friv.

Clistopyga Grav.

907. *incitator* Fabr. — V. Hucusque apud nos tantum ad balneum Borszék.

Colpomeria Hlgr.

908. *melanopyga* Grav. — I. Budapest, Peszér. II. Pécs. VI. Resicza.

Theronia Hlgr.

909. *flavicans* Fabr. — I. Budapest ex *Aporia crataegi* L., *Agrote fimbria* L. et *Cymatophora octogesima* Hbn., Nagyvárad, Debreczen, Szeged. II. Badacsony, Tapolcza. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj, Komjáti, Homonna. V. Mezőség, Nagyszeben. VI. Mehádia, Ulma, Gombos. VIII. Orehovica, Žakalj.

Ephialtes Grav.

910. *abbreviatus* Thoms. — II. Zircz. IV. Eperjes, montes Carpathici. V. Nagyvizvölgy (Com. Hunyad). VI. Resicza.
911. *brevicauda* Kriechb. — VI. Mehádia, Resicza.
912. *carbonarius* Christ. — I. Budapest. II. Parád, Pápa, Zircz. III. Eperjes. V. Semesnye, Szucság. VI. Mehádia.
913. *dux* Tschek (*scutellaris* Thoms.). — I. Budapest, Nagyvárad. III. Montes Carpathici. V. Montes Transsylvaniæ. VII. Velebit.
914. *extensor* Linn. — I. Budapest. V. Transsylvania. VI. Mehádia. VIII. Orehovica.
915. *glabratus* Ratzbg. — I. Tantum in montibus Bihariensibus.
916. *geniculatus* Kriechb. — IV. Specimen unicum ex Ungvár.
917. *gnathaulax* Thoms. — I. Solum e Mártonkáfa.

918. *juniperi* Kriechb. — VI. Exemplar unum e Mehádia.

919. *longicauda* Mocs. — I. Specimen unicum e Debreczen. Solum Hungariæ terram colit.

920. *luteipes* Thoms. — I. Budapest e *Saperda populnea* L. II. Badacsony.

921. *macrocentrus* Kriechb. — VI. Specimen unicum e Soronist, prope Mehadiam.

922. *macrurus* Thoms. — IV. S.-A.-Ujhely, Parnó, Homonna, Bártfa. VIII. Sušak, Orehovica.

923. *manifestator* Linn. Holgr. (*imperator* Kriechb.). — I. Kalocsa, Nagyvárad. III. Trencsén, Tátrafüred. IV. S.-A.-Ujhely. V. Mezőség. VI. Mehádia. VII. Fužine. VIII. Sušak, Orehovica.

924. *mesocentrus* Grav. — I. Szent-Endre. IV. S.-A.-Ujhely. V. Nagyvizvölgy. VI. Mehádia, Korniaréva, Resicza.

925. *rufithorax* Kriechb. — IV. Ad urbem S.-A.-Ujhely solum apud nos.

926. *tuberculatus* Fourcr. Hlgr. — IV. S.-A.-Ujhely, Szaláncz, Rozsnyó, Bártfa. V. Nagyvizvölgy, montes Bucsecs, Tusnád. VI. Mehádia, Resicza.

Rhyssa Grav.

927. *amoena* Fabr. — III. Hungaria superior. IV. Lupusinka in Com. Mármaros.

928. *approximator* Fabr. — III. Tantum specimen unicum e balneo Koritnicza.

929. *obliterata* Grav. — I. Tria specimina e regione Budapest.

930. *persuasoria* Grav. — Ubique in pinetis non rara; tamquam *Siricis gigantis* L. parasita optime cognita.

Thalessa Hlgr.

931. *superba* Schrk. (*clavata* Grav.). — IV. S.-A.-Ujhely. VI. Mehádia.

932. *citraria* Oliv. (*superba* Grav.). — I. Budapest, numerose educata tamquam *Tremicis Magi F., var. alchymistae* Mocs. parasita. VI. Mehádia.

933. *leucographa* Grav. — I. Budapest et insuper in Hungaria septentrionali.

934. *curvipes* Grav. — II. Specimen unicum e Duna-Örs.

Orthopelma Taschbg.

935. *luteolator* Grav. — I. Budapest. IV. S.-A.-Ujhely e *Rhodite rosae* L.

Poemeria Hlgr.

936. *tipularia* Hlgr. — III. Specimen unicum e Barlangliget (Com. Szepes).

Acoenites Latr.

937. *arator* Grav. — I. Budapest, Szeged. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Szomotor. V. Semesnye, Segesvár. VI. Mehádia, Orsova. VII. Vrdnik. VIII. Buccari.

938. *dubitator* Panz. — I. Kalocsa, Kecskemét, Nagyvárad, Szeged. II. Duna-Örs. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Nagymihály. V. Mezőség. VI. Mehádia, Ulma.

939. *fulvicornis* Grav. — I. Budapest, Szeged. VI. Mehádia, Krassova. VII. Zágráb.

940. *rufipes* Grav. — I. Nagyvárad. III. Trencsén, Virágvölgy, Koritnicza. V. Tasnád. VI. Mehádia, Orsova.

941. *saltans* Grav. — I. Budapest, Kecskemét. II. Pécs. III. Trencsén. IV. Imreg. VI. Mehádia. VII. Vrdnik.

Lapton Nees.

942. *femoralis* Nees. — I. Budapest, Nagyvárad. III. Szliács. VI. Ulma. VII. Dálya.

Arenetra Hlgr.

943. *tomentosa* Grav. — I. Specimen unicum e Budapest.

Taschenbergia Schmied.

944. *modesta* Grav. — I. Exemplar unum e regione Budapest: Szent-Endre.

Phytodietus Grav.

945. *coryphaeus* Grav. — I. Tria exemplaria e Budapest.

946. *geniculatus* Thoms. — Specimen unicum ex Hungaria superiore.

947. *segmentator* Grav. — I. Budapest, Kecskemét, Nagyvárad. IV. Szomotor, Imreg. VI. Resicza.

Perosis Brischke.

948. *annulata* Brischke. — I. Budapest. IV. Komjáti. V. Peér, Zilah.

Xylonomus Grav.

949. *ater* Grav. — Secundum auctorem est etiam Hungariæ incola (57. Vol. III. pag. 827.)

950. *caligatus* Grav. — II. Pápa. IV. Kőrösmező (Com. Mármaros). VII. Fužine.

951. *ephialtoides* Kriechb. — VI. Duo specimina e Mehádia. Solum Hungariæ civis.

952. *ferrugatus* Grav. — I. Specimen unicum e Péczel.

953. *filiformis* Grav. — I. Budapest e *Callidio sanguineo* L., Monor, Kisujszállás, Kecskemét, Tök. II. Keszthely. IV. S.-A.-Ujhely, Szaláncz.

954. *gracilicornis* Grav. — IV. Hucusque tantum ad S.-A.-Ujhely.
955. *irrigator* Fabr. — III. Hucusque solum ad Trencsén.
956. *pilicornis* Grav. — I. Péczel, Szeged. III. Putnok. IV. Varannó, Szinnaikő, Sárospatak. V. Transsylvania. VIII. Zengg.
957. *praecatorius* Fabr. — I. Budapest, Péczel, Gödöllő, Kecskemét. IV. S.-A.-Ujhely, Szalánc, Sárospatak, Bártfa. V. Torda. VI. Mehádia. VII. Diakovár.
958. *propinquus* Tschek. — I. Budapest. VI. Resicza.
959 *rufipes* Grav. — Secundum auctorem etiam Hungariæ terram colit (57, Vol. III. pag. 823.)

Xorides Latr.

960. *albitarsus* Grav. — VI. Specimen unicum e Resicza.
961. *collaris* Grav. — III. Virágvölgy ad Poprád, montes Tátra.
962. *nitens* Grav. — I. Tök (Com. Pest). IV. Szalánc, S.-A.-Ujhely. VII. Diakovár.

Alomya Grav.

963. *ovator* Linn. — In regionibus montanis ubique collectus.
964. *nigra* Grav. (an prioris var.?). — Secundum auctorem (57, Vol. II. pag. 405.) est etiam Hungariæ incola.

Ischnocerus Grav.

965. *rusticus* Grav. — I. Budapest, Pilis, Szeged. VI. Mehádia.

Odontomerus Grav.

966. *catenator* Grav. — VII. Hucusque solum ad Zágráb.
967. *dentipes* Linn. — I. Nyiregyháza. IV. Bártfa.
968. *pinetorum* Thoms. — III. Balneum Koritnicza. V. Borszék, Tusnád.
969. *punctulatus* Thoms. — III. Tátrafüred, Oravicza. V. Tusnád.

Coleocentrus Grav.

970. *caligatus* Grav. — II. Specimen unicum e Kőszeg.
971. *exareolatus* Kriechb. — V. Tantum exemplar unum e Görgény. Solum Hungariæ civis.
972. *excitator* Poda. — II. Kőszeg. III. Trencsén, Rózsahegy, Oravicza, Rosnyó. V. Tihucza (Com. Besztercze-Naszód). VII. Fužine.

Fam. STEPHANIDAE.

Stephanus Jur.

1. *serrator* Fabr. (*coronatus* Jur.). — I. Budapest. II. Duna-Örs, K.-Kövesd (Com. Zala). V. Peér, Zilah. VI. Mehádia, Orsova. VII. V.-Teplicz, Pakracz, Vrdnik. VIII. Čavle, Zengg.
2. *anomalipes* Först. — I. Specimen unicum Budapest.

Fam. BRACONIDAE.

Vipio Latr.

1. *desertor* Fabr. — I. Budapest. II. Pápa. VI. Mehádia. VII. Vrdnik. VIII. Buccari.
2. *contractor* Nees. — I. Budapest, Budakesz.
3. *intermedius* Szépl. — I. Budapest, Kecskemét, Szeged. II. Boglár. VI. Ulma, Deliblat. Solum Hungariæ civis.
4. *nominator* Fabr. — I. Budapest, Meziád, Debreczen, Szeged. II. Boglár, Zircz. III. Ujbánya (Com. Bars), Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj, Szinnaikő. VI. Mehádia. VII. Diakovár, Gospić, Pregrada, Samobor. VIII. Sušak, Orehovica, Vežica, Buccari.
5. *curticaudis* Szépl. — I. Budapest. VIII. Portó-Ré. Tantum apud nos.
6. *filicaudis* Szépl. — I. Solum ad Budapest inventus.
7. *Frivaldszkyi* Szépl. — I. Specimen unicum e Budapest. Tantum Hugariæ terram colit.
8. *appellator* Nees. — I. Budapest, Nagyvárad, Szeged, Debreczen. II. Pilis-Maróth, Boglár, Duna-Örs. III. Ujbánya, Nyitra. IV. Szomotor. V. Peér. VI. Ulma, Deliblat.
9. *terrefactor* Vill. — I. Budapest, Peszér, Szeghalom (Com. Békés). IV. S.-A.-Ujhely, Szomotor, Bereczki. VI. Mehádia, Jassenova, Ulma. VIII. Sušak, Buccari, Zengg.

Pseudovipio Szépl.

10. *inscriptor* Nees. — I. Budapest, Kisujszállás. Szeghalom, Szeged. II. Pilis-Maróth, Boglár, Duna-Örs. III. Ujbánya. VI. Ulma, Mehádia. VII. Diakovár.
11. *castrator* Fabr. — I. Budapest, Budakesz, Szeged. VI. Jassenova. VIII. Buccari.
12. *umbraculator* Nees. — I. Budapest. II. Balf (Com. Sopron). VI. Jassenova.
13. *siculus* Marsh. — VIII. Solum ad Porto-Ré.
14. *Birói* Szépl. — I. Complura exemplaria e Kecskemét. Tantum Hungariam inhabitat.

15. *tentator* Rossi. — I. Budapest. II. Ácsi-erdő. V. Zilah.
16. *hungaricus* Szépl. — I. Budapest, Kisujszállás, Szeghalom. Solum terræ nostræ civis.

Iphiaulax Först.

17. *impostor* Scop. *(Bracon mactator* nob.) — I. Budapest, Kalocsa, Nagyvárad, Beél, Debreczen, Szeged. II. Iváncsa (Com. Fehér), Duna-Örs, Tapolcza. IV. S.-A.-Ujhely, Szinna, Azar, Homonna. V. Magura (Com. Kolozs). VI. Mehádia, Baziás. V. Nagyfalu, Peér, Előpatak. VII. Diakovár, Pregrada. VIII. Orehovica, Zengg.

Coelobracon Thoms.

18. *initiator* Fabr. — I. Budapest. V. Tusnád.
19. *denigrator* Nees. — I. Budapest e *Poecilonota rutilanti var. variolosa* Payk. educavit L. Biró. IV. Szőlöske, Szádellő. V. Semesnye. VI. Deliblat, Oravicza, Resicza. VII. Vrdnik. VIII. Gospić, Fužine.
20. *sculpturatus* Thoms. — I. Budapest. IV. Szőllőske.

Bracambus Thoms.

21. *flavator* Fabr. *(Cyanopterus flavator* F.). — I. Budapest. IV. Erdőbénye. V. Buzamező (Com. Szolnok-Doboka). VI. Ulma, Mehádia.

Bracon Fabr.

22. *luteator* Spin. — I. Budapest. VIII. Portó-Ré.
23. *sulphurator* Szépl. — I. Budapest ex *Aphelonice cerricola* Gir. educavit auctor. Solum Hungariæ civis.
24. *pectoralis* Wesm. — I. Budapest. IV. Sárospatak. VI. Orsova. VII. Diakovár. VIII. Zengg.
25. *obscuricornis* Szépl. — I. Budapest. Tantum in Hungaria.
26. *semiflavus* Thoms. — I. Budapest. VIII. Portó-Ré.
27 *trucidator* Marsh. — I. Budapest, Kisujszállás, Kalocsa, Nagyvárad, Debreczen. II. Duna-Örs. V. Peér. VIII. Buccari, Portoré.
28. *ruficoxis* Szépl. — I. Tantum apud nos et solum ad Budapest.
29. *intercessor* Nees. — I. Budapest, Szeged. II. Iváncsa. III. Ujbánya. VI. Deliblat. VII. Diakovár.
30. *minutator* Nees. — I. Budapest, Szeged. II. Torbágy, Iváncsa. VI. Mehádia. VII. Diakovár. VIII. Buccari.
31. *stabilis* Wesm. — I. Budapest, Kecskemét, Szeghalom. IV. S.-A.-Ujhely. VI. Korniareva.
32. *crassicornis* Thoms. — I. Budapest e *Cynipe Caput-Medusae* L. educavit V. Szépligeti, Kalocsa. VII. Diakovár.
33. *concolor* Thoms. — I. Budapest.
34. *fulvipes* Nees. — I. Budapest, Kalocsa. VII. Diakovár.
35. *variegator* Nees. — I. Peszér.
36. *ochraceus* Szépl. — VIII. Tantum e Cirkvenica cognitus.
37. *fulvus* Szépl. — I. Budapest; solum Hungariæ civis.
38. *ochromus* Szépl. — I. Budakesz, penes Budapest. Solum terræ nostræ proprius.
39. *sulcatulus* Szépl. — I. Solum regionis Budapestinensis civis.
40. *tenuicornis* Wesm. var. — II. Iváncsa (Com. Fehér.
41. *nigratus* Nees. — I. Budapest, Peszér. VI. Mehádia.
42. *fortipes* Wesm. — I. Budapest. VIII. Portoré, Zengg.
43. *immutator* Nees. — IV. S.-A.-Ujhely.
44. *brevicornis* Wesm. — I. Budapest.
45. *pallidipes* Szépl. — I. Budapest. II. Visegrád. Tantum in Hungaria.
46. *caudatus* Ratzbg. — I. Budapest e *Tera terminali* educavit V. Szépligeti.
47. *regularis* Wesm. — V. Specimen unicum ex Hung. orientali.
48. *discoideus* Wesm. — I. Budapest. VI. Korniareva (Com. Krassó-Szörény).
49. *terebella* Wesm. — I. Budapest. III. Ujbánya.
50. *dichromus* Wesm. — I. Budapest, Péczel. II. Pápa. III. Rajecz, Turcsek (Com. Trencsén). VI. Grebenácz.
51. *maculiger* Wesm. — I. Budapest, Szeged. II. Pápa.
52. *variator* Nees. — I. Budapest. II. Duna-Pentele, Zircz. IV. Bereczki. V. Transsylvania. VII. Diakovár. VIII. Cirkvenica, Zengg.
53. *collinus* Szépl. — I. Solum in Hungaria centrali ad Budapest.
54. *praecox* Wesm. — I. Budapest, Debreczen. II. Duna-Pentele. V. Zilah. VIII. Cirkvenica.
55. *sabulosus* Szépl. — VI. Tantum Hungariæ meridionalis civis, species ad Deliblat inventa.
56. *urinator* Fabr. — I. Budapest, Peszér, Kisujszállás, Szeged. IV. Szomotor, Bereczki. V. Peér, S.-Sz.-György, Tusnád. VI. Grebenácz. VII. Vrdnik, Zágráb. VIII. Vežica, Portoré.
57. *osculator* Nees. — III. Borosznó. IV. Sátoraljaújhely. VI. Korniareva. VII. Vaganszky Vrh.
58. *anthracinus* Nees. — I. Budapest, Nagyvárad, Beél, Szeghalom. III. Borosznó, Ujbánya.

Xenarcha Först.

59. *variabilis* Szépl. — I. Budapest. Tantum Hungariæ incola.

60 *similis* Szépl. — I. Pariter tantum illius regionis civis.

61. *ruficornis* Szépl. — I. Tantum ad Budapest hucusque observata.

62. *major* Szépl. — I. Solum in Hungaria centrali ad Kecskemét.

Oncophanes Först.

63. *lanceolator* Nees. — I. Budapest. IV. Velejte.

Spathius Nees.

64. *exaratator* L. — I. Budapest, Tisza-Keszi (Com. Borsód). II. Duna-Örs. III. Ujbánya IV. Sátoralja-Ujhely, Nagymihály, Ungvár. V. Semesnye. VI. Orsova. VII. Raduć, Vaganski Vrh.

Synodus Ratzbg.

65. *caesus* Nees. — I. Budapest. IV. S.-A.-Ujhely.

Hecabolus Curt.

66. *sulcatus* Curt. — IV. Szinna, a Dre. C. Chyzer inventus.

Eucorystes Reinh.

67. *aciculatus* Reinh. — I. Budapest. IV. Szaláncz.

Coeliodes Wesm.

68. *abdominalis* Zett. — III. Tátraháza.

Doryctes Halid.

69. *leucogaster* Nees. — I. Budapest, Nagyvárad. III. Tavarnok, Tátraháza. IV. Ungvár, Kassa, S.-A.-Ujhely, Sárospatak, Kis-Azar, Tállya, Varannó. V. Peér. VI. Mehádia, Resicza, Orsova, Ulma. VII. Diakovár, Gospić, Pregrada, Fužine. VIII. Sušak, Orehovica, Buccari, Zengg.

70. *Heydenii* Reinh. — Secundum Catalogum Kirchneri species etiam Hungariam inhabitat (66, pag. 115.)

71. *grandis* Szépl. — IV. Varannó. V. Peér, Solum Hungariæ terram collit.

72. *gallicus* Reinh. *(Ischiogonus domesticus* Först.). — I. Budapest. IV. S.-A.-Ujhely.

73. *imperator* Halid. — I. Szeged, Tisza-Keszi. IV. Simonka, Ungvár. VI. Mehádia. VII. Diakovár.

74. *longicaudis* Gir. — I. Budapest. VI. Ulma.

75. *fulviceps* Reinh. — I. Tisza-Keszi, Koty. VI. Hungaria merid. (Banat, Reinh.). VII. Croatia (Marshall).

76. *brachyurus* Marsh. — IV. Solum Hungariæ civis, species ad Czeke a Dre. C. Chyzer detecta.

77. *striatellus* Nees. — I. Budapest. IV. Velejte.

78. *obliteratus* Nees. — IV. In monte Vihorlat (Com. Zemplén) a me inventus.

Coenopachys Först.

79. *Hartigii* Ratzbg. — I. Kalocsa, a J. Thalhammer collecta.

Rhacontus Ruthe.

80. *aciculatus* Ruthe. — I. Budapest.

Chremylus Halid.

81. *rubiginosus* Nees. — VII. Vaganski Vrh.

Hormius Nees.

82. *moniliatus* Nees. — I. Budapest. II. Pécs. IV. S.-A.-Ujhely.

83. *similis* Szépl. — VIII. Tantum e Buccari. Solum terræ nostræ civis.

Clinocentrus Halid.

84. *exertor* Nees. — I. Budapest. IV. Szomotor.

85. *excubitor* Halid. — I. Budapest.

Pelecystoma Wesm.

86. *luteum* Nees. — I. Budapest. VIII. Cirkvenica.

Rogas Nees.

87. *rugulosus* Nees. — I. E pupis *Clidiae geographicae* Frr. 7 exemplaria educata. Kecskemét.

88. *dissector* Nees. — III. Morócz (Com. Turócz). VII. Podvesica. VIII. Buccari.

89. *grandis* Gir. — I. Budapest, Tenke (Com. Bihar). IV. S.-A.-Ujhely. VI. Mehádia.

90. *carbonarius* Gir. — I. Budapest. II. Lacus Fertő (Giraud). III. Turócz.

91. *morio* Reinh. — I. Budapest. VI. Mehádia.

92. *cruentus* Nees. — I. Budapest, Rév, Szeged. III. Borosznó. VIII. Sušak.

93. *reticulator* Nees. — I. Budapest, Nagyvárad. IV. S.-A.-Ujhely. VI. Resicza. VII. Vaganski Vrh.

v. *nobilis* Curt. — I. Budapest, Szeged. II. Szegzárd. III. Borosznó.

94. *irregularis* Wesm. — IV. Bártfa.

95. *pallidicornis* H. S. — I. Nagy-Károly. VII. Diakovár.

96. *dimidiatus* Spin. — I. Budapest, Gödöllő, Nagyvárad, Debreczen. IV. Aszaló. V. Kolozsvár. VI. Oravicza, Orsova. VIII. Sušak, Draga.

97. *gasterator* Jur. — I. Budapest, Csurgó. II. Szegzárd. V. Hátszeg. VI. Orsova, Mehádia, Korniaréva.

98. *geniculator* Nees. — I. Budapest, Nagyvárad. VI. Mehádia, Oravicza.

99. *tristis* Wesm. — I. Budapest. IV. Tolcsva. VI. Mehádia.

100. *bicolor* Spin. — I. Budapest e *Vanessa urticae* L., Szeged. IV. Ungvár. VI. Mehádia. VIII. Cirkvenica.
101. *miniatus* H. S. — II. Duna-Pentele.
102. *praerogator* Nees. — IV. Simonka.
103. *praetor* Reinh. — I. Budapest.
104. *pulchripes* Wesm. — I. Pariter in illa regione.
105. *testaceus* Spin. — I. Budapest e *Harpyia bifida* Hbn. bis numerose educatus, Csepel. II. Iváncsa. VI. Mehádia.
106. *circumscriptus* Nees. — I. Budapest ex *Eupithecia alliaria* Staud. II. Bodajk (Com. Fehér). III. Ujbánya, Borosznó, Rajecz. IV. Sátoralja-Ujhely. VI. Mehádia. VII. Diakovár, Gospić.
107. *unicolor* Wesm. — I. Budapest. VI. Mehádia.
108. *armatus* Wesm. — I. Budapest. IV. Tokaj. VI. Mehádia.
109. *vittiger* Wesm. — I. Budapest: Farkasvölgy, olim invenit G. Mayr. (Coll. Mayri).
110. *nigricornis* Wesm. — I. Budapest. III. Ujbánya.

Allodorus Först.

111. *lepidus* Halid. — Specimen e Hungaria septentrionali.

Polydegmon Först.

112. *Marshalli* Szépl. — I. Budapest, Peszér. II. Visegrád. Tantum Hungariæ civis.
113. *sinuatus* Szépl. — I. Budapest. II. Szegzárd. Solum terram nostram colit.
114. *intermedius* Szépl. — I. Budapest solum patriam suam profitetur.

Försteria Szépl.

115. *laeviuscula* Szépl. — VII. Tantum in monte Velebit observata.
116. *flavipes* Szépl. — I. Solum e Budapest cognita.

Sigalphus Latr.

117. *thoracicus* Curt. — I. Budapest. VI. Mehádia.
118. *ambiguus* Nees. — I. Budapest. IV. Sátoralja-Ujhely. VI. Baziás, Orsova, Mehádia. VII. Diakovár. VIII. Buccari, Carlopago.
119. *obscurus* Nees. — I. Budapest. VI. Mehádia. VIII. Cirkvenica.
120. *pallidipes* Nees. — I. Budapest.
121. *luteipes* Thoms. — I. Budapest. IV. S.-A.-Ujhely e *Brucho lentis* educatus.

Chelonus Jur.

122. *speculator* Marsh. — I. Budapest.
123. *mutabilis* Nees. — I. Budapest, Nagyvárad, Csaba, Szeged, Horgos. II. Öszöd, Pécs. V. Peér. VI. Mehádia, Oravicza, Grebenácz. VIII. Zengg.
124. *Bonelli* Nees. — I. Budapest.
125. *alboannulatus* Szépl. — I. Budapest, Szeged. Solum Hungariæ civis.
126. *buccatus* Thoms. — III. Trencsén, sec. Drem. C. Brancsik (11, pag. 106.)
127. *inanitus* Linn. — I. Budapest, Peszér, Szeged, Szentes. II. Pilis-Maróth, Boglár, Öszöd. IV. Szomotor. V. Peér. VI. Grebenácz, Mehádia, Palics.
128. *occultus* Nees. — I. Budapest, Peszér, Szeged. II. Pilis-Maróth, Pécs. IV. S.-A.-Ujhely. VI. Oravicza, Deliblat. VII. Gospić.
129. *scaber* Nees. — I. Budapest, Kecskemét, Nagy-Várad. II. Szegzárd. IV. S.-A.-Ujhely, Szomotor. VI. Mehádia, Oravicza.
130. *vanescens* Wesm. — I. Budapest. III. Mármaros.
131. *pannonicus* Szépl. — I. Budapest e *Talpochare pannonica* Fr. Solum Hungariæ incola.
132. *nitens* Reinh. — I. Budapest. VII. Diakovár.
133. *corvulus* Marsh. — I. Budapest. III. Borosznó. V. Tusnád.
134. *bimaculatus* Szépl. — I. Budapest. VI. Deliblat. VIII. Buccari. Tantum ex Hungaria.
135. *maculatus* Szépl. — IV. Hucusque solum e S.-A.-Ujhely cognitus.
136. *nigrator* Szépl. — VIII. Tantum ad Buccari. Solummodo Hungariam inhabitat.
137. *decorus* Marsh. — I. Szeghalom. VI. Oravicza.
138. *rufiscapus* Szépl. — I. Solum Hungariæ centralis incola.
139. *carbonator* Marsh. — I. Budapest, Szeghalom, Csaba. II. Pilis-Maróth.
140. *dispar* Marsh. — I. Szeghalom (Com. Békés). V. Peér. VI. Grebenácz, Deliblat.
141. *hungaricus* Szépl. — VI. Mehádia; tantum Hungariæ terram colit.
142. *curvisulcatus* Szépl. — I. Tantum in Hungaria centrali ad Szeged.
143. *rimatus* Szépl. — I. Pariter tantum e regione Budapest.
144. *latrunculus* Marsh. — I. Budapest. III. Mármaros.
145. *flavipalpis* Szépl. — I. Solum in Hungaria centrali ad Budapest.
146. *parcicornis* H. S. — I. Budapest.
147. *scabrosus* Szépl. — I. Budapest. VII. Fruska-Gora. Solum Hungariæ civis.
148. *sulcatus* Nees. — I. Budapest e *Talpochare Dardouini* B. III. Mármaros.
149. *contractus* Nees. — I. Budapest.

Ascogaster Wesm.

150. *instabilis* Wesm. — I. Budapest.

151. *annularis* Nees. — I. Budapest e *Rhodite rosae* L. VI. Mehádia. VIII. Cirkvenica.
152. *elegans* Nees. — I. Budapest.
153. *rufipes* Nees. — I. Budapest.
154. *bicarinatus* H. S. — VII. Diakovár. VIII. Gospić.
155. *rostratus* Szépl. — I. Budapest, Budafok. II. Visegrád. Tantum ex Hungaria cognitus.

Phanerotoma Wesm.

156. *planifrons* Nees. — I. Budapest, Péczel, Nagyvárad. II. Pilis-Maróth, Duna-Pentele, Pécs. IV. Szőllőske. VI. Mehádia.
157. *dentata* Panz. — I. Budapest ex *Aeciella Zinkenella* Tr., Kecskemét, Szeged. II. Duna-Pentele. VIII. Novi.

Sphaeropyx Ill.
(*Rhitigaster* Wesm.)

158. *irrorator* Fabr. — I. Budapest. VI. Mehádia.

Acampis Wesm.

159. *alternipes* Nees. — I. Bndapest: Sas- et Svábhegy.

Cardiochiles Nees.

160. *saltator* Fabr. (*Migrogaster Frivaldszkyi* Först. i. l.) — I. Budapest, Csepel, Kecskemét, Szeged, Szatymaz. II. Herczeghalom, Duna-Pentele. VI. Jassenova. VII. Vrdnik, Pregrada. VIII. Sušak, Buccari.

Acoelius Halid.

161. *viator* Först. — III. Trencsén. VIII. Zengg.

Apanteles Först.

162. *albipennis* Nees. — V. Specimen unicum ad balneum Tusnád inventum.
163. *solitarius* Ratzbg. — I. Budapest. V. Peér.
164. *tetricus* Ratzbg. — I. Budapest. III. Borosznó. IV. Velejte. V. Peér. VIII. Buccari.
165. *ordinarius* Ratzbg. — I. Budapest. III. Borosznó.
166. *congestus* Nees. — I. Numerosa exemplaria e Budapest.
167. *areolatus* Szépl. — VIII. Cirkvenica. Solum Hungariæ incola.
168. *glomeratus* Linn. — I. Budapest e *Vanessa cardui* L., *urticae* L. et *Atalanta* L., Nagyvárad. III. Borosznó. VI. Mehádia.
169. *Vanessae* Reinh. — I. Budapest.
170. *spurius* Wesm. — I. Budapest ex *Agrote fugace* Frr., Szeghalom. III. Borosznó. VI. Baziás, Oravicza. VII. Diakovár.
171. *difficilis* Nees. — In montibus Bihariensibus ad Rézbánya.
172. *victorius* Nees. — I. Budapest.
173. *scabriusculus* Reinh. — I. Budapest.
174. *falcatus* Nees. — III. Borosznó, Tátraháza. VI. Ferenczfalva (Com. Krassó-Szörény).
175. *hoplites* Ratzbg. — I. Budapest.
176. *minutus* Szépl. — I. Budapest: Gellérthegy. Solum Hungariæ civis.
177. *lacteus* Nees. — I. Budapest.
178. *xanthostigma* Halid. — I. Budapest.
179. *emarginatus* Nees. — I. Budapest.
180. *obscurus* Nees. — I. Budapest, Peszér. II. Visegrád. III. Borosznó, Ujbánya. V. Peér. VII. Diakovár. VIII. Cirkvenica.
181. *tenebrosus* Wesm. — I. Budapest.
182. *vimetorum*. Wesm. — I. Budapest. II. Visegrád. III. Borosznó.
183. *longicaudis* Wesm. — I. Budapest. III. Ujbánya. VI. Orsova.
184. *specularis* Szépl. — I. Budapest. Tantum Hungariæ civis.
185. *corvinus* Reinh. — I. Budapest: Gellért- et Sashegy.
186. *fraternus* Reinh. — I. Budapest ex *Acronycta aceris* L.
187. *rubens* Reinh. — I. Budapest.
188. *fulvipes* Halid. — I. Budapest. II. Iváncsa. IV. Velejte, S.-A.-Ujhely e *Spilosoma fuliginosa* L. educavit Dr. C. Chyzer. V. Peér.
189. *lateralis* Halid. — I. Budapest.
190. *lucidus* Szépl. — I. Tantum Hungariæ centralis incola ad Budapest.

Microplitis Först.

191. *ochracea* Szépl. — I. Solum ad Budapest observata.
192. *fumipennis* Ratzbg. — I. Budapest, Nagyvárad, Szeged.
193. *Spinolae* Nees. — I. Budapest, Nagyvárad, Szeged. III. Ujbánya. IV. Bereczki, Eperjes. V. Peér. VIII. Buccari.
194. *xanthopus* Ruthe. — I. Budapest, Apaj. II. Herczeghalom. IV. Varannó. VII. Diakovár.
195. *ocellatae* Bouché. — I. Budapest e *Smerintho ocellato* L. tria exemplaria educata.
196. *vidua* Ruthe. — I. Budapest. II. Balf, Pécs. IV. Varannó. VII. Diakovár,
197. *varipes* Ruthe. — I. Budapest.
198. *tristis* Nees. — I. Budapest e *Plusia modesta* Hbn., *consona* F. et *Calophasia casta* Bkh. educatæ.
199. *sordidipes* Nees. — I. Budapest e *Symira nervosa* Schiff. complura exemplaria culta. III. Borosznó.

200. *mediator* Halid. — I. Budapest. IV. Velejte.
201. *mediana* Ruthe. — I. Budapest. IV. Szomotor. VI. Deliblat. VII. Diakovár.
202. *tuberculifera* Wesm. — I. Kalocsa, Szatymaz. II. Bodajk (Com. Fehér). VII. Diakovár.
203. *adunca* Ruthe. — I. Budapest. II. Herczeghalom.
204. *lugubris* Ruthe. — VII. Diakovár, Vaganski Vrh.

Microgaster Latr.

205. *dorsalis* Nees. — VI. Mehádia.
206. *abdominalis* Nees. — I. Budapest. III. Ujbánya. IV. Eperjes. V. Peér. VII. Diakovár, Fruska-Gora.
207. *subcompletus* Nees. — I. Budapest e *Plusia illustri* L.
208. *deprimator* Nees. — I. Budapest e *Spilothyro altheae* complura exemplaria. Peszér, Nagy-Várad. II. Duna-Pentele. IV. Szádellő. V. Szucság, Segesvár. VI. Jassenova, Mehádia. VIII. Buccari.
209. *globatus* Linn. — I. Budapest. II. Bodajk, Pécs. V. Tusnád.
210. *tibialis* Nees. — I. Budapest, Beél. III. Ujbánya. V. Borszék. VI. Mehádia, Ferenczfalva. VII. Diakovár. VIII. Zengg.
211. *nobilis* Reinh. — I. Budapest, Szeged.
v. *hungaricus* Szépl. — I. Hucusque solum e Budapest cognitus.

Agathis Latr.

212. *glaucoptera* Nees. — I. Budapest. VI. Ulma.
213. *syngenesiae* Nees. — I. Budapest. V. Tasnád.
214. *umbellatarum* Nees. — IV. S.-A.-Ujhely, Szőllöske. VI. Mehádia.
215. *malvacearum* Latr. — I. Budapest, Kecskemét. III. Borosznó. IV. Mármaros, Sátoralja-Ujhely, Eperjes. V. Tusnád.
216. *nigra* Nees. — I. Budapest. II. Pécs. III. Borosznó. IV. Mármaros, Tokaj, Szőllőske. VI. Mehádia, Orsova. VII. Gospić, Vrdnik.
217. *rufipalpis* Nees. — I. Budapest. III. Ujbánya, Borosznó. IV. Mármaros. VI. Mehádia, Orsova. VII. Diakovár.
218. *breviseta* Nees. — I. Budapest.
219. *tibialis* Nees. — I. Budapest e *Coleophora astragalella* Zett., Kecskemét, Szeged. II. Zircz. III. Turcsek. IV. Mármaros. VI. Mehádia. VII. Diakovár.

Cremnops Först.

220. *desertor* Latr. — I. Budapest, Peszér, Eger, Nagyvárad, Debreczen, Szeghalom, Szeged. II. Iváncsa. III. Beszterczebánya. IV. S.-A.-Ujhely. V. Peér, Hátszeg. VI. Ulma, Deliblat. VII. Diakovár.

Disophrys Först.

221. *inculcator* Linn. — I. Budapest, Dabas, Kalocsa, Debreczen, Szeghalom, Szeged. II. Pécs, Szegzárd, Balatonfüred. VI. Mehádia. VII. Dálya, Zágráb, Sljeme, Pregrada. VIII. Orehovica.
222. *caesus* Klug. — I. Budapest, Nagyvárad. IV. Szőllőske.

Microdus Nees.

223. *conspicuus* Wesm. — I. Peszér, Kecskemét, Szeged. V. Tasnád.
224. *linguarius* Nees. — VI. Mehádia. VII. Diakovár.
225. *tumidulus* Nees. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Bodajk. III. Ujbánya. VI. Mehádia, Orsova. VII. Diakovár, Vaganski Vrh.
226. *cingulipes* Nees. — VI. Mehádia.
227. *calculator* Fabr. — VI. Ferenczfalva.
228. *dimidiator* Nees. — III. Borosznó, Ujbánya.
229. *rugulosus* Nees. — I. Budapest: Lipótmező.

Earinus Wesm.

230. *nitidulus* Nees. — I. Budapest ex *Acontia lucida* Hufn. IV. Varannó.

Orgilus Halid.

231. *hungaricus* Szépl. — I. Budapest. VI. Deliblat. Solum in Hungaria.
232. *zonator* Szépl. — I. Tantum e regione Budapest cognitus
233. *similis* Szépl. — I. Pariter tantum e Budapest.
234. *ruficornis* Szépl. — I. Solum Hungariæ centralis civis.
235. *rubrator* Ratzbg. — I. Budapest: Sashegy.
236. *obscurator* Nees. — I. Budapest, Peszér. II. Visegrád, Iváncsa.
237. *rugosus* Nees. — I. Budapest e *Talpochare pannonica* Frr.

Pachylomma Bréb.

238. *buccata* Nees. — I. Budapest, Szeghalom. II. Pápa. III. Túrócz. IV. Ungvár. VII. Pétervárad, Gospić, Brusanje.

Euphorus Nees.

239. *pallidipes* Nees. — I. Budapest. VII. Diakovár.
v. *orchesiae* Curt. — I. Budapest. VI. Orsova, Krassova.
240. *coactus* Marsh. — IV. S.-A.-Ujhely.

241. *accinctus* Halid. — I. Budapest.
242. *ornatus* Marsh. — I. Budapest.

Perilitus Nees.

243. *foveolatus* Reinh. — I. Budapest.
244. *bicolor* Wesm. — I. Budapest. VII. Diakovár.
245. *aethiops* Nees. — I. Budapest.
246. *melanopus* Ruthe. — II. In regione pannonica ad Herczegfalva.
247. *parcicornis* Ruthe. — I. Budapest.
248. *rutilus* Wesm. — I. Budakesz, prope Budapest.
249. *terminatus* Nees. — I. Budapest.
250. *strenuus* Marsh. — I. Budapest, Budafok.

Microctonus Wesm.

251. *conterminus* Nees. — I. Budapest.

Meteorus Halid.

252. *albitarsis* Curt. — I. Budapest, Csepel. IV. Komjáti (Com. Zemplén).
253. *chrysophthalmus* Nees. — I. Budapest e *Metoponia flava* Hübn. III. Borosznó.
254. *deceptor* Wesm. — I. Budakesz. III. Borosznó.
255. *ictericus* Nees. — I. Budapest.
256. *ruficeps* Nees. — I. Budapest.
257. *atrator* Curt. — I. Gödöllő, non procul a Budapest.
258. *albicornis* Ruthe. — I. Budapest.
259. *brunnipes* Ruthe. — I. Budapest. IV. Velejte.
260. *abdominator* Nees. — I. Budapest. II. Ivánesa. III. Borosznó. IV. Kassa. VI. Mehádia.
261. *sulcatus* Szépl. — VII. Grehovica. Solum Hungariæ civis.
262. *pulchricornis* Wesm. — I. Budapest, Szeged. VIII. Buccari.
263. *consor* Ruthe. — I. Budapest.
264. *unicolor* Wesm. — I. Budapest, Tóthfalu. VI. Mehádia.
265. *versicolor* Wesm. — I. Budapest.
266. *cinctellus* Nees. — II. Ácsi-erdő. III. Borosznó.
267. *tenellus* Marsh. — III. Borosznó.
268. *rubens* Nees. — I. Budapest.
269. *laeviventris* Wesm. — I. Budapest. III. Turcsek. IV. S.-A.-Ujhely.
v. *medianus* Ruthe. — I. Budapest.
270. *rubens* Nees. — I. Budapest.

Eubadizon Nees.

271. *extensor* Nees. — I. Budapest. IV. Sátoralja-Ujhely.
272. *pallidipes* Nees. — I. Budapest. IV. Ungvár. V. Transsylvania.
273. *rufipes* H. S. — IV. Ad balneum Bártfa.

Calyptus Halid.

274. *tibialis* Halid. — III. Borosznó.
275. *ruficoxis* Wesm. — I. Budapest, Peszér.
276. *fuscipalpis* Wesm. — I. Budapest: Gellérthegy.
277. *parvulus* Ruthe. — I. In centro regni ad Budapest.
278. *cingulatus* Szépl. — I. Ad prædium Peszér. Tantum terræ nostræ civis.

Blacus Nees.

279. *ruficornis* Nees. — I. Budapest. III. Ujbánya. Borosznó. IV. Velejte, Szerencs, Sátoralja-Ujhely.
280. *compar* Ratzbg. — I. Tenke (Com. Bihar). III. Borosznó.
281. *maculipes* Wesm. — I. Budapest. III. Borosznó. VII. Gospić.
282. *instabilis* Ruthe. — IV. S.-A.-Ujhely.
283. *longipennis* Grav. — I. Budapest.
284. *paganus* Halid. — I. Rajecz (Com. Trencsén).

Liophron Nees.

285. *muricatus* Halid. — III. Ujbánya.

Ichneutes Nees.

286. *reunitor* Nees — I. Budapest: Zugliget, Ó-Buda.

Proterops Wesm.

287. *nigripennis* Wesm. — III. Poprád. VI. Mehádia.

Helcon Nees.

288. *aequator* Nees. — I. Budapest. II. Pécs. III. Tátra, Turcsek. V. Brassó, Tusnád.
v. *rugator* Ratzbg. — III. Borosznó, Tátraháza.
289. *carinator* Nees. — I. Budapest. IV. Ungvár. V. Transsylvania. VI. Mehádia.
290. *claviventris* Nees. — IV. Apud nos in monte Pop-Iván (Com. Mármaros).
291. *tardator* Nees *(Gymnoscelus)*. — I. Budapest, Nagyvárad, Szeged, Debreczen. IV. Ujbánya, Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Simonka, Bereczki, K.-Azar. V. Zilah. VI. Mehádia. VIII. Zengg.
292. *ruspator* Nees. — V. Ad balneum Tusnád.
293. *angustator* Nees. — I. Kecskemét. II. Tata. V. Tasnád. VI. Mehádia. VIII. Sušak.

Macrocentrus Curt.

294. *marginator* Nees. — III. Trencsén. IV. Montes Beszkid.
v. *nidulator* Nees. — I. Budapest. VI. Mehádia.
295. *thoracicus* Nees. — I. Budapest. V. Transsylvania.

296. *abdominalis* Fabr. — I. Budapest, Csepel duo specimina e *Psamote pulverali* Hbn. educata, Nagyvárad. VII. Diakovár.
297. *linearis* Nees. — III. Tantum ad Trencsén inventus (11, pag. 106.)
298. *hungaricus* Marsh. — I. Peszér, Hadház (Com. Hajdú). II. Duna-Pentele, Herczegfalva.
299. *infirmus* Nees. — I. Budapest.
300. *collaris* Spin. — I. Budapest, Budakesz. II. Iváncsa. III. Ujbánya, Borosznó, Trencsén.

Zele Curt.

301. *testacator* Curt. — I. Budapest, Makkos (Com. Csongrád). III. Ujbánya. VI. Ferenczfalva.
302. *calcarator* Wesm. — I. Budapest, Kisujszállás, Szeged, Szöreg. III. Ujbánya.
303. *discolor* Wesm. — I. Budapest e *Polysphaene sericata* Bkh., Nagyvárad.

Diospilus Halid.

304. *oleraceus* Halid. — I. Budapest III. Borosznó. VIII. Buccari.
305. *capito* Nees. — I. Budapest. III. Borosznó. VII. Diakovár.
306. *speculator* Halid. — I. Budapest: Zugliget.
307. *ruficornis* Szépl. — I. Tantum Hungariæ centralis incola.
308. *ephippius* Nees. — IV. In Com. Mármaros.

Discoletes Halid.

309. *similis* Szépl. — I. Budapest. II. Visegrád. Solum Hungariæ civis.

Opius Wesm.

310. *lugens* Halid. *var.* — I. Budapest.
311. *pygmaeator* Nees. — III. Borosznó.
312. *apiculator* Nees. — I. Budapest. II. Duna-Pentele. III. Borosznó.
313. *variegatus* Szépl. — I. Budapest. II. Iváncsa. IV. Velejte. VII. Gospić. Solummodo terram Hungariæ colit.
314. *pallidipes* Wesm. — I. Budapest. IV. Sátoralja-Ujhely.
315. *fallax* Szépl. — VII. Tantum in Hungaria ad Diakovár.
316. *lucidus* Szépl. — I. Solum ad prædium Peszér inventus.
317. *ochrogaster* Wesm. — I. Budapest; satis frequens.
318. *leptostigmus* Wesm. — II. Duna-Pentele.
319. *polyzonius* Wesm. — I. Budapest.
320. *nidulator* Nees. — I. Budapest.
321. *rudis* Wesm. — I. Budapest: Ó-Buda.
322. *silvicola* Szépl. — I. Ad prædium Peszér. Solum Hungariam inhabitat.
323. *hungaricus* Szépl. — I. Budapest: Gellérthegy. Tantum terræ nostræ civis.
324. *rufipes* Wesm. — I. Budapest.

Cephaloplites Szépl.

325. *Mocsáryii* Szépl. — I. Specimen unicum typicum cognitum e regione Budapest.

Biosteres Först.

326. *melanosoma* Szépl. — I. Solum regionis Budapestinensis civis.
327. *blandus* Halid. — I. Budapest: Lipótmező.
328. *haemorrhous* Halid. — I. Budapest.
329. *nitidus* Szépl. — I. Similiter in illa regione et loco tantum.
330. *Wesmaeli* Halid. — I. Budapest. III. Ujbánya.
331. *carbonarius* Nees. — III. Borosznó.

Diachasma Först.

332. *caffer* Wesm. — I. Budapest: Zugliget.

Trachyusa Ruthe.

333. *aurora* Halid. — I. Budapest: Hárshegy.

Alysia Latr.

334. *manducator* Panz. — II. Zircz. III. Nagy-Rőcze (Com. Gömör), Tátra. IV. Ladomér, Varannó, Vihorlat, Bártfa. V. Borszék. VI. Oravicza, Ferenczfalva. VIII. Sušak.
335. *fuscipennis* Halid. — III. Ujbánya, Com Mármaros. IV. Montes Beszkid.
336. *truncator* Nees. — I. Budapest.
337. *Tipulae* Scop. — I. Budapest. V. Mons Retyezát.
338. *Sophia* Halid. — I. Budapest.

Aphaereta Först.

339. *cephalotes* Först. — I. Budapest, Szeghalom. IV. Szinna.

Phaenocarpa Först.

340. *Theodori* Woll. — I. Budapest. III. Boroszno.
341. *picticornis* Ruthe. — IV. Szomotor.
342. *conspurcator* Halid. — I. Budapest. VI. Deliblat.
343. *livida* Halid. — I. Budapest: Hármashatárhegy.

Orthostigma Ratzbg.

344. *pumila* Nees. — I. Budapest. III. Borosznó. VII. Gospić.

Aspilota Först.

345. *concinna* Halid. — I. Budapest: Hárshegy.
346. *nervosa* Halid. — I. Budapest, Kecskemét. VIII. Cirkvenica.

347. *fuscicornis* Halid. — I. Budapest. III. Borosznó. IV. Velejte.
348. *distracta* Nees. — I. Budapest, Budakesz. III. Borosznó.

Gyrocampa Först.

349. *affinis* Nees. — II. Duna-Pentele, Herczegfalva.
350. *foveola* Halid. — I. Budapest: Ó-Buda, Budafok.

Caenon Curt.

351. *anceps* Curt. — I. Budapest. V. Transsylvania.

Coelinius Nees.

352. *parvulus* Nees. — I. Budapest: Rákospalota, Farkasvölgy (Coll. Mayri).
353. *viduus* Halid. — I. Budapest. II. Duna-Pentele, Ivánesa. VIII. Zengg.
v. *obscurus* Curt. — I. Budapest.
354. *niger* Nees. — I. Budapest. III. Ujbánya, Borosznó. IV. Mármaros.
355. *gracilis* Halid. — I. Budapest. III. Borosznó. VI. Orsova.
356. *elegans* Halid. — I. Budapest.

Polemon Gir.

357. *Liparae* Gir. — VIII. Tantum ad Fiume apud nos.

Fam. CHALCIDIDAE.

Smiera Walk.

1. *melanaris* Dalm. — IV. Apud nos ad urbem S.-A.-Ujhely.
2. *nigrifex* Sulz. — I. Budapest, Kalocsa. V. Szamosfalva (Com. Kolozs).
3. *sispes* Linn. — I. Budapest, Kalocsa. II. Szegzárd, Balf (Com. Sopron). V. Nagy-Csűr (Com. Zaránd), Mezőség. VI. Mehádia, Orsova.

Leucospis Fabr.

4. *Biguetina* Jur. (*parvicauda* Mocs.) — I. Budapest. VI. Jassenova, Grebenácz; rara species.
5. *dorsigera* Fabr. (*ligustica* Nees, *assimilis* Westw.) — I. Budapest ex *Osmia rufa* L. educavi, Kalocsa, Nagyvárad, Budurásza (Com. Bihar), Szeged. III. Nyitra. V. Nagyfalu, Szucság, S.-Sz.-György. VI. Mehádia, Resicza. VII. Pregrada. VIII. Fiume, Orehovica.
6. *gigas* Fabr. (*grandis* Kl., *varia* Germ.) — VIII. Tantum regionis adriaticæ incola, ubi non rara esse videtur.
7. *intermedia* Illig. — I. Budapest. II. Balaton-Füred. VIII. Fiume.

Chalcis Fabr.

8. *boops* Thoms. — I. Budapest e *Calophasia opalina* Esp., Nagyvárad. VI. Grebenácz. VII. Pakracz, Vrdnik.
9. *Dalmanni* Thoms. — I. Specimen unicum e Budapest.
10. *femorata* Fabr. — I. Budapest. VII. Pakracz. Rara esse videtur.
11. *flavipes* Panz. — I. Budapest ex *Aporia crataegi* L., Péczel, Peszér, Kalocsa, Kecskemét, Kisujszállás, Nagyvárad. IV. Forró. VI. Orsova, Deliblat. VII. Vrdnik.
12. *Fonscolombei* Duf. — I. Budapest, Kalocsa. II. Badacsony. VIII. Zengg. Sat rara.
13. *intermedia* Dalm. — I. Budapest e pupis: *Talpocharis pannonicae* Frr., *Zygaenae laetae* Esp., *angelicae* Ochs., *coronillae var. trigonellae* Esp., Kalocsa, Nagyvárad. VI. Mehádia, Orsova, Grebenácz. VIII. Sušak, Orehovica.
14. *punctulata* Först. — I. Budapest, Makó. VI. Mehádia.
15. *scirropoda* Först. — Secundum auctorem solum Hungariæ incola. (28, Vol. XVI, pag. 97.)

Brachymeria Westw.

16. *minuta* Linn. — I. Budapest, Nagyvárad, Beél, Szőreg. II. Simontornya. III. Trencsén. IV. Szőllőske, Homonna. V. Transsylvania. VIII. Orehovica, Novi.

Hockeria Lap.

17. *armata* Panz. — I. Ad Budapest solum in unico specimine inventa.

Halticella Spin.

18. *bifasciata* Walk. — I. Complura exemplaria e Budapest.
19. *fronticornis* Fonsc. (*Hockeria tuberculata* Först.) — I. Budapest. VIII. Buccari.
20. *sexdentata* Först. — I. Tantum ad Budapest observata, ubi valde rara est.
21. *subarmata* Först. — I. Ad Budapest in uno tantum exemplari detecta.
22. *tenuicornis* Först. — VI. Grebenácz (Com. Temes).

Dirrhinus Dalm.

23. *hesperidum* Dalm. — I. Specimen unicum e Budapest.

Coccophagus Westw.

24. *scutellaris* Dalm. — I. Monor, e Coccidarum specie *Lecanium robiniarum* Dougl. educavit Dr. G. Horváth.

25. *obscurus* Westw. — I. Budapest e *Lecanio ulmi* Linn. (Dr. Horváth).

Arrhenophagus Aur.

26. *chionaspidis* Auriv. — I. Budapest, parasita *Diaspis rosae* Sandb.

Eupelmus Dalm.

27. *linearis* Först. — I. Budapest, in uno tantum exemplari inventus.

28. *spongipartus* Först. — I. Jásztelek, Videfalva (Com. Nográd). III. Nagy-Salló (Com. Bars).

29. *urozonus* Dalm. — I. Budapest e Cynipidarum specie *Teras terminalis* Htg. (teste Mayr).

Polymoria Först.

30. *coronata* Dalm. — IV. Specimen unicum e Forró (Com. Zemplén).

Microterys Thoms.

31. *lunatus* Dalm. — I. Budapest.

32. *tesselatus* Nees. — I. Budapest.

Comys Först.

33. *scutellata* Sved. — I. Budapest; rara. VI. Mehádia.

Anusia Först.

34. *nasicornis* Först. — Secundum Kirchner est etiam Hungariæ incola (66, pag. 145.)

Cerapterocerus Ratzbg.

35. *mirabilis* Westw. — I. In Hungaria centrali ad Farkasd in unico solum specimine inventus.

Copidosoma Ratzbg.

36. *truncatellum* Dalm. — I. Budapest e *Plusia modesta* Hübn. copiose educatum.

Phaenodiscus Först.

37. *aeneus* Dalm. (*melanopterus* Nees). — I. Nonnulla specimina e Budapest.

Euscapus Dalm.

(*Dinocarsis* Först.)

38. *hemipterus* Dalm. — I. Budapest. VII. Breza (Com. Belovár-Kőrös).

Habrolepis Först.

39. *Dalmanni* Westw. — I. Péczel e *Mytilaspide lineari* Geoffr. educavit Dr. G. Horváth.

Spalangia Latr.

40. *fuscipes* Nees. — I. Budapest; rara esse videtur.

Eucharis Latr.

41. *adscendens* Latr. — I. Budapest, Monor. VI. Resicza.

42. *cynipiformis* Latr. — I. Budapest, Nagyvárad. IV. Szőllőske, Zsalobina (Com. Zemplén). V. Nagyszeben. VIII. Novi.

Perilampus Latr.

43. *auratus* Panz. — I. In Hungaria centrali ad prædium Sz.-Lőrincz; rarus.

44. *cuprinus* Först. — V. Secundum auctorem solum in Transsylvania. (28, Vol. XVI. pag. 121.)

45. *splendidus* Dalm. — I. Budapest, Nagyvárad, Beél. III. Balneum Lucski. V. Tasnád. VI. Mehádia, Orsova.

46. *violaceus* Dalm. — I. Budapest, Kalocsa. II. Duna-Örs. III. Pócsmegyer. VI. Resicza.

Ormylus Westw.

47. *tubulosus* Westw. — I. Budapest e *Tera terminali* Htg. copiose educatus. III. Nagy-Salló. IV. Szádellő.

Holaspis Mayr.

48. *pannonica* Mayr. — I. Budapest (teste Mayr), Nagyvárad.

Torymus Dalm.

49. *bedeguaris* Linn. — I. Budapest e *Rhodite rosae* L. V. Nagy-Csűr. VI. Mehádia, Orsova.

50. *cultriventris* Ratzbg. — I. Species ad Budapest rara esse videtur.

51. *erucarum* Schrk. — VI. Specimen unicum ex Oravicza.

52. *regius* Nees. — I. Budapest e *Cynipe Kollari*, *lignicola*, *glutinosa*, *Andrico terminali*, *Dryophanta scutellari* (teste Mayr). V. Transsylvania.

53. *saphyrinus* Fonsc. — I. Specimen unicum e Nagyvárad.

54. *ventralis* Fonsc. — I. Budapest, Beél (Com. Bihar), tantum specimina duo.

Oligosthenes Först.

55. *stigma* Fabr. — I. E *Rhodite rosae* L. copiose educatus.

Diomorus Walk.

56. *calcaratus* Nees. — I. Budapest, nonnulla specimina.

Syntomaspis Först.

57. *cyanea* Boh. — I. Budapest e *Dryophanta longiventri*, teste Mayr (110, pag. 80.)

58. *lazulina* Först. — I. Budapest, Nagyvárad.

59. *macrurus* Först. — Secundum auctorem species solum Hungariam inhabitat. (28, Vol. XVI. pag. 101.)

Megastigmus Dalm.

60. *dorsalis* Fabr. — I. Budapest e *Cynipe lignicola* et *glutinosa var. coronata*, teste Mayr (110, pag. 135.)

61. *stigmaticans* Fabr. — I. Budapest e *Cynipe argentea*, *Kollari* et *Caput-Medusae*, teste Mayr (110, pag. 132.)

Palmon Dalm.

62. *pachymerus* Walk. — I. Budapest, ex ovo *Mantis religiosae* L. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj.

Monodontomerus Westw.

63. *aereus* Walk. — I. Specimen unicum e Nagyvárad.

64. *dentipes* Boh. — I. Unum exemplar ad Budapest inventum.

65. *obsoletus* Fabr. — I. Budapest e *Vanessa Antiopa* L., *Orgyia ericae var. intermedia* Friv. et *Bombyce quercus* L.

Eyrotoma Illig.

66. *nodularis* Boh. — I. Budapest, teste Mayr (112, pag. 307.)

67. *robusta* Mayr. — VI. Tantum ad Korniaréva.

68. *rosae* Nees. — I. Budapest e *Cynipe glutinosa var. coronata* et *Aphilotrice lucida*, teste Mayr (112, pag. 320.), Jásztelek. Nagyvárad. IV. Homonna. VI. Hungaria meridionalis.

Trigonoderus Westw.

69. *trifasciatus* Thoms. — I. Budapest, Kalocsa. II. Zircz. V. Oravicza, Orsova.

Cleonymus Latr.

70. *immaculatus* Nees. — I. Budapest e *Cynipe Caput-Medusae* copiose educatus.

Lamprotatus Westw.

71. *splendens* Thoms. — I. Specimen unicum e Budapest.

Coelopisthia Först.

72. *catillus* Web. — I. Budapest; unicum solum specimen.

Cheiropachus Westw.

73. *quadrum* Walk. — I. Budapest. V. Transsylvania e *Hylesino fraxini* Fabr.

Cecidostiba Thoms.

74. *rugifrons* Thoms. — I. Budapest, Jásztelek, Videfalva. III. Nagy-Salló.

Habroscytus Thoms.

75. *bedeguaris* Thoms. — I. Budapest e *Rhodite rosae* tantum specimen unicum.

76. *fasciatus* Thoms. — I. Budapest; species rara.

Pteromalus Sved.

77. *puparum* Linn. — I. Budapest e *Pieride rapae* L., *Vanessa Antiopa* L. et *Atalanta* L. copiose exclusus, Nagyvárad.

Euplectrus Westw.

78. *bicolor* Sved. — VI. Specimina duo ex Orsova.

Olinx Först.

79. *scianeurus* Ratzbg. (*gallarum* Först.) — I. Budapest e *Tera terminali* Htg. (Mayr, 111, pag. 162.)

80. *trilineatus* Mayr. — III. Tantum specimen unicum e Nagy-Salló.

Cirrospilus Westw.

81. *pictus* Nees. — I. Budapest; plura exemplaria.

Eulophus Geoffr.

82. *dimidiator* Nees. — I. Budapest; duo specimina tantum.

Pleurotropis Thoms.

83. *bimacularis* Dalm. — I. Budapest; specimen unicum.

Entedon Dalm.

84. *cioni* Thoms. — I. Specimen unicum e Budapest.

Fam. PROCTOTRUPIDAE.

Gonatopus Ljungh.

1. *pilosus* Thoms. — I. Budapest, Farkasd, Kecskemét, Szeged. II. Simontornya. IV. Szomotor.

Proctotrupes Latr.

2. *emarciator* Fabr. — I. Budapest, medio Junii.

3. *gladiator* Halid. — I. Budapest, Nagyvárad. IV. Kassa, Komjáti. VI. Mehádia, Korniaréva.

4. *gravidator* Linn. — I. Budapest, Nagyvárad, Tenke. IV. Balneum Bártfa.

5. *pallipes* Jur. — I. Solum ad Nagyvárad.

Prosacantha Nees.

6. *varicornis* Thoms. — I. Budapest: Farkasvölgy.

Inostemma Halid.

7. *lycon* Walk. — I. Complura specimina e Budapest.

Aneurhynchus Westw.

8. *nodicornis* Marsh. — I. Budapest: Zugliget; plura exemplaria.

Paramesius Westw.

9. *elongatus* Thoms. — I. Pariter tantum ad Budapest.

Galesus Curt.

10. *rufipes* Thoms. — I. Budapest: Kincstári erdő.

Entomius H. S.

11. *campanulatus* H. S. *(Ismarus Halidayi* Först.) — I. Budapest. VII. Stara Pazova.

Helorus Latr.

12. *anomalipes* Panz. — I. Budapest: kőbányai Rákos (Coll. Mayri).

Fam. CHRYSIDIDAE.

Cleptes Latr.

1. *nitidulus* Fabr. *(fallax* Mocs.) — I. Budapest, Isaszeg, Kalocsa. II. Simontornya, Duna-Örs. V. Peér. VI. Deliblat, Baziás. VII. Velebit.
2. *Chevrieri* Frey *(Chyzeri* Mocs.) — II. Csurgó (Com Somogy), Kőszeg. IV. Szőllőske. V. Peér; species ubique rara.
3. *semiauratus* Linn. — I. Budapest, Péczel, Isaszeg, Kalocsa. II. Duna-Örs. IV. Tokaj. VI. Német-Bogsán. VIII. Orehovica.
   v. *pallipes* Lep. — I. Budapest. II. Duna-Örs. V. Kolozsvár. VII. Gospić.
4. *ignitus* Fabr. — I. Budapest, Csepel; rarus. VI. Ulma (Com. Temes).
5. *scutellaris* Mocs. — I. Budapest. III. Nyitra. VI. Mehádia. Species ubique rara.
6. *orientalis* Dhlb. — I. Budapest: Széchenyi hegy, Péczel, Comit. Arad. Rarus.
7. *Saussurei* Mocs. — I. In Hungaria centrali ad Budapest in Mártonhegy quatuor exemplaria invenit J. Stipanics.
8. *aerosus* Först. — I. Budapest. VIII. Novi. Species rarissima, tantum tria exemplaria cognita. Solum Hungariæ civis.
9. *Mocsáryi* Sem. — Secundum auctorem (180, pag. 184.) exemplar unicum typicum ex Hungaria oritur.
   (cafer Luc. — Specimen Musæi Nationalis Hungarici, quod Buysson vidit (2, Vol. VI. pag. 79.), Syriam et non Hungariam patriam suam profitetur).

Ellampus Spin. Schck.

10. *pyrosomus* Först. *(chrysonotus* Dhlb.) — I. Budapest, Kis-Szentmiklós, Kalocsa, Kecskemét. II. Szegzárd. V. Transsylvania. VI. Palics.
11. *spina* Lep. *(Frivaldszkyi* Först.) — I. Budapest, Rákos-Palota, Péczel, Gödöllő, Dabas, Szőreg, Szeged. VI. Duplaj (Com. Temes), Mehádia. VIII. Zengg.
12. *scutellaris* Panz. *(Panzeri* Fabr.) — I. Budapest, Péczel, Soroksár, Csaba, Horgos. II. Boglár. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj. V. Torda, Dicső-Szent-Márton. VI. Grebenácz, Palics, Mehádia.
13. *bidens* Först. — I. Aradmegye, V. Görgény, Nagy-Enyed. VII. Pregrada; ubique rarus.
14. *coeruleus* Dhlb. *(viridiventris* Ab.) — I. Budapest, Szőreg, Szeged, Palics. II. Simontornya. VI. Grebenácz. VII. Zágráb.
15. *angustatus* Mocs. — I. Budapest, Szőreg, Szeged. II. Velencze. VI. Grebenácz. VIII. Cirkvenica.
16. *Horváthi* Mocs. *(Wesmaeli* Mocs. nec Chevr.) — I. Budapest, Peszér, Szatymáz. VI. Grebenácz, Deliblat.
17. *bidentulus* Lep. — I. Budapest, Farkasd, Gödöllő, Kalocsa, Szeged. II. Szegzárd. IV. Tokaj, Homonna. V. Petrozsény (Com. Hunyad.)
18. *Wesmaeli* Chevr. — I. Kapornak, Kecskemét, Nagyvárad, Szeged. II. Szegzárd, Simontornya. III. Nyitra. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj. V. Peér, Kovászna, Hátszeg. VIII. Fiume, Fužine.
19. *auratus* Linn. — In omni zonarum regione communis.
   v. *triangulifer* Ab. — II. Duna-Örs. IV. Varannó.
   v. *virescens* Mocs. — I. Kalocsa, Tiszafüred, Nyiregyháza. V. Dicső-Szent-Márton.
   v. *maculatus* Mocs. — I. Kalocsa. IV. Szőllőske.
20. *Bogdanovii* Rad. *(Rudowi* Buyss., *punctulatus* Mocs., nec. Dhlb.). — I. Budakesz, Péczel. Kalocsa. II. Szombathely. VII. Vrdnik. VIII. Zengg. Species rara.
21. *truncatus* Dhlb. — I. Kecskemét, Kisujszállás, Debreczen, Szeged. IV. S.-A.-Ujhely, Szatmár, Homonna. V. Peér, Rónaszék.
22. *similis* Mocs. — V. Specimen unicum typicum in Transsylvania ad Nagy-Csűr inventum est.
23. *aeneus* Fabr. — I. Budapest, Kalocsa, Kisujszállás, Nagyvárad, Makó. II. Pápa, Duna-Örs. Szegzárd. III. Vallis Hermanetz, Trencsén. IV. Ungvár, Homonna, Tokaj, S.-A.-Ujhely. V. Petrozsény, Peér, Kovászna, Dicső-Szt-Márton. VI. Grebenácz.

v. *blandus* Först. — I. Budapest. II. Duna-Örs.
v. *Chevrieri* Tourn. — V. Tasnád. VII. Pakracz (Com. Pozsega), Vrdnik.

24. *pusillus* Fabr. — Fere in toto regno Hungariæ observatus.

25. *violaceus* Scop. *(coerulescens* Lep.) — IV. Hucusque solum ad Olyka in Com. Zemplén.
v. *virens* Mocs. — VII. In Slavonia ad Pakracz collectus.

Holopyga Dhlb. Mocs.

68. *curvata* Först. *(chloroidea* Dhlb.) — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Szeged. II. Duna-Örs, Pécs. III. Trencsén, Nyitra. V. Peér. VI. Deliblat. VII. Vrdnik. VIII. Novi.

27. *amoenula* Dhlb. *(ovata* Dhlb.) — Est sui generis frequentissima, fere in omni parte regni, regionibus montanis exceptis, collecta.

28. *chrysonota* Först. — I. Budapest, Farkasd, Péczel, Peszér, Dabas, Kecskemét, Kis-Szentmiklós, Kalocsa, Nagyvárad, Szeged. II. Duna-Örs, Boglár, Magyar-Óvár. III. Érsekujvár. V. Peér. VI. Mehádia. VII. Vrdnik.

29. *similis* Mocs. — I. Budapest, Tótfalu, Farkasd, Szeged. VI. Palics.

30. *gloriosa* Fabr. *(inflammata* Först.) — I. Budapest, Péczel, Mártonkáta, Kalocsa, Szeged. II. Pécs, Magyar-Óvár. VI. Zombor, Palics, Grebenácz, Orsova. VII. Vrdnik. VIII. Cirkvenica.

31. *fervida* Fabr. *(Hed. chalconotum* Först.) — I. Budapest, Kis-Szentmiklós, Kalocsa, Nagyvárad, Debreczen, Szeged. II. Duna-Örs, Tapolcza, Kőszeg. III. Érsekujvár. V. Mezőség. VI. Deliblat. VII. Dálya, Vrdnik.

32. *flavipes* Ev. *(bellipes* Mocs.) — I. Budapest. III. Nyitra. V. Peér. Species rara.

33. *monochroa* Buyss. — I. Budapest, Kecskemét, Kisujszállás. II. Boglár. V. Peér. VII. Vrdnik.

34. *plagiata* Mocs. VII. Species rarissima; hucusque solum in unico specimine ab A. Korlević ad Fiume (Žakalj) inventa

35. *sculpturata* Ab. — I. Budapest, Isaszeg, Kisujszállás. V. Peér, Szucság. VI. Német-Bogsán. VII. Vrdnik. VIII. Buccari.

36. *ahenea* Dhlb. — I. Specimen unicum ad Kisujszállás invenit Dr. E. Daday.

37. *iucunda* Mocs. — I. Budapest, Péczel, Isaszeg, Mártonkáta, Kecskemét. III. Szliács. VII. Pregrada.

38. *coriacea* Dhlb. — I. Budapest, Péczel, Isaszeg, Nagyvárad. IV. Homonna, Szomotor. V. Buzamező, Kovászna, Tihucza. VIII. Fiume.

39. *femorata* Dhlb. — I. Budapest, Tótfalu. Valde rara.

40. *ardens* Coqueb. — I. Budakesz, Péczel, Isaszeg, Kalocsa. II. Boglár. V. Peér. VI. Mehádia. VII. Pregrada.

41. *rosea* Rossi. — I. Budapest, Péczel, Isaszeg, Kis-Szentmiklós, Mártonkáta, Szeged. II. Szegzárd, Boglár. III. Érsekujvár, Nyitra, Puszta-Emőd, Szliács. V. Peér, Szucság, Semesnye. VI. Ulma.

Hedychrum Latr. Mocs.

41. *semiviolaceum* Mocs. — I. Budapest; hucusque exemplar tantum unicum inventum.

42. *Gerstaeckeri* Chevr. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Balmaz-Ujváros, Babarcz (Com. Baranya). IV. Szőllőske. V. Tasnád, Torda, Kolozsvár, Szucság. VI. Ferenczfalva, Deliblat. VII. Vrdnik, Ottocsán, Pregrada. VIII. Fužine.

43. *longicolle* Ab. — IV. Hucusque solum in Com. Zemplén ad Szőllőske.

44. *nobile* Scop. *(lucidulum* Fabr.) — In omni parte regni est species Chrysididarum vulgatissima.

45. *rutilans* Dhlb. — I. Budapest, Péczel, Mártonkáta, Peszér, Kecskemét, Kisujszállás, Kalocsa, Nagyvárad, Debreczen, Balmaz-Ujváros. II. Boglár, Szegzárd. III. Érsekujvár, Szliács. IV. Tarczal, Tolcsva, Szőllőske, Vizsoly. V. Nagyvízvölgy. VI. Grebenácz, Német-Bogsán. VII. Pregrada.

Chrysogona Först.

46. *pumila* Klug *(assimilis* Dhlb.) — I. Budapest, Mártonkáta, Kecskemét, Kisujszállás, Kalocsa. II. Boglár, Szegzárd. IV. Forró. V. Peér, Szucság, Brassó.

Stilbum Spin.

47. *cyanurum* Forst. *(splendidum* Dhlb., *festivum* Mocs.) — I. Budapest, Péczel, Rákos-Palota, prædium Szentlőrincz, Peszér, Szeged. II. Tapolcza (Com. Zala). IV. Tolcsva. VI. Resicza, Kazán. VIII. Sušak, Orehovica, Fiume, Vežica, Lopača, Cirkvenica.
v. *nobile* Sulz. *(calens* Fabr.) — I. Budapest: Gellérthegy, Sashegy, Rákos. VII. Velebit, Vaganski Vrh.

Chrysis Linn. Mocs.

48. *Kuthyi* Mocs. — I. In Hungaria centrali est species rarissima, hucusque ad Isaszeg in unico solum specimine inventa.

49. *coeruleiventris* Ab. — I. Specimen unicum ad Budapest mense Augusto J. Pável invenit.

50. *millenaris* Mocs. — I. Budapest: Mártonhegy, Makó. V. Peér.

51. *incrassata* Spin. I. Ad Budapest in duobus solum exemplaribus collecta.

52. *candens* Germ. — VIII. Ab A. Korlević in Sušak inventa.

53. *trimaculata* Först. — I. In Hungaria centrali est species rarissima: Sashegy, initio veris, Hajós. V. Brassó.

54. *refulgens* Spin. — VI. In Hungaria meridionali ad Orsovam in unico solum specimine inventa. VIII. In Littorali Hungarico: ad Sušak, Vežica, Draga, Samobor et Buccari non rara.

55. *simplex* Dhlb. — I. Budapest. II. Boglár. III. Szliács, Borosznó (Com. Zólyom); species ubique rara.

56. *austriaca* Fabr. — I. Pilis-Szentkereszt, Gödöllő. II. Pusztavádé (Com. Somogy). III. Znióváralja, Koritnicza. IV. Nagymihály, Bártfa. V. Peér, Szilágycsehi, Szucság, Rea. VI. Mehádia, Kazán. VII. Fužine.

57. *neglecta* Shuck. (*integrella* Dhlb.) — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Nagyvárad. II. Visegrád. III. Beszterczebánya. VII. Dálya.

58. *pustulosa* Ab. — I. Mártonkáta. II. Pusztavadé. III. Ujbánya. Ribisvölgy, Német-Bogsán, Mehádia. VIII. Buccari.

59. *ignifrons* Brullé. — VI. Orsova. VII. Raduć. VIII. Sušak, Orehovica, Vežica.

60. *uniformis* Dhlb. — VI. Ad thermas Herculis sacras Mehadienses in unico solum specimine inventa.

61. *filiformis* Mocs. (*Gyllenhali* Mocs.) — VI. E montibus Hungariæ meridionalis Comitatus Krassó, Kazán. VIII. Orehovica, Vežica. Species rara.

62. *dichroa* Dhlb. — I. Budapest, Péczel, Mártonkáta, Kalocsa, Debreczen, Nagyvárad, Rév. II. Paks. III. Trencsén. V. Peér. VI. Mehádia, Kazán. VII. Velebit. VIII. Sušak, Vežica. Orehovica, Čavle, Buccari.

v. *minor* Mocs. — I. Budapest, Isaszeg. VI. Mehádia.

63. *angustifrons* Ab. (*carinaeventris* Mocs.). — I. Péczel, Isaszeg, in pluribus exemplaribus collecta.

64. *hybrida* Lep. (*venusta* Mocs.). — I. Budapest: Széchenyi-hegy; Parád. III. Szliács. Sat rara.

65. *cuprea* Rossi (*coeruleipes* Fabr.). — I. Budapest, Kecskemét. III. Trencsén. VI. Jassenova, Ulma, Mehádia, Zombor, Apatin. VII. Dálya, Vrdnik. VIII. Fiume, Sušak, Orehovica, Buccari.

66. *unicolor* Dhlb. (*lazulina* Först., *albipennis* Dhlb.). — I. Budapest, Tótfalu, Kecskemét. VI. Grebenácz, Deliblat.

67. *Saussurei* Chevr. — I. Budapest, Péczel, Kisujszállás, Nagyvárad. II. Duna-Örs, Boglár. IV. Szőllőske. V. Tasnád, Peér, Búzamező. VI. Rumunyest, Német-Bogsán. VII. Velebit. VIII. Orehovica, Zengg.

68. *mediocris* Dhlb. — VI. Specimen unicum e Mehádia.

69. *fallax* Mocs. — I. Budapest, Isaszeg, Nagyvárad. V. Peér, Dicső-Szt-Márton. VII. Vrdnik.

70. *versicolor* Spin. — I. Budapest: Sashegy, Széchenyihegy. VIII. Cirkvenica, Zengg.

71. *Leachii* Shuck. — I. Budapest, Mártonkáta, Kalocsa, Szeged. III. Szliács. IV. Szőllőske. V. Peér, Szucság, Tusnád. VI. Nagy-Kikinda, Berzászka. VII. Vrdnik.

72. *succincta* Linn. (*hungarica* Christ?, *Frivaldszkyi* Mocs.). — I. Budapest, Péczel, Isaszeg, Kecskemét, Szeged. IV. S.-A.-Ujhely. V. Szucság.

v. *bicolor* Lep. — I. Kis-Szent-Miklós, Péczel, Kalocsa, Peszér. V. Nagy-Vázsony, Tusnád. VIII. Fiume, Fužine.

v. *Germari* Wesm. — I. Budapest, Péczel. II. Boglár. IV. Tokaj. V. Peér. VIII. Cirkvenica, Zengg.

73. *cyanea* Linn. — In toto regno Hungariæ sat frequens.

74. *Páveli* Mocs. VII. Vrdnik. Solum terram nostram colit.

75. *indigotea* Duf. et Perr. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa, Debreczen, Szeged. VI. Mehádia. VIII. Fiume, Žakalj, Zengg, Buccari.

76. *nitidula* Fabr. — I. Mártonkáta, Kecskemét. III. Trencsén, Rozsnyó, Borosznó. V. Hátszeg, Rea, Peér, Szilágycsehi, Búzamező. VI. Rumunyest (Com. Krassó-Szörény).

77. *semicincta* Lep. — Secundum Dahlbom etiam Hungariam inhabitat (19. Vol. II. 242.); nobis tamen hucusque non obvia.

78. *placida* Mocs. — I. Specimen unicum typicum e Budapest oritur.

79. *fulgida* Linn. — Fere in omni parte regni observata.

80. *viridula* L. (*bidentata* L.). — Cum priore est species Chrysidarum maxime diffusa.

v. *cingulicornis* Först. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. Boglár. V. Erzsébetváros. VI. Nagy-Kikinda. VII. Vrdnik.

81. *splendidula* Rossi (*cyanopyga* Dhlb.). — I, Budapest, Péczel. III. Puszta-Emőd (Com. Nyitra). VIII. Vežica.

82. *rutilans* Oliv. (*splendidula* Dhlb.). — I. Budapest, Isaszeg. II. Duna-Örs. III. Trencsén. IV. Gesztely (Com. Zemplén), Szomotor, S.-A.-Ujhely. VI. Rumunyest. VII. Velebit, Pregrada. VIII. Orehovica, Draga, Žakalj, Cirkvenica.

83. *chrysostigma* Mocs. (*Ramburi* Dhlb. ex parte). — IV. S.-A.-Ujhely. VI. Jassenova. VII. Diakovár. Species rara.

84. *marginata* Mocs. — VII. Apud nos solum in Vrdnik a J. Pável sexus uterque inventus.

85. *sybarita* Först. — I. Budapest, Kecskemét. II. Duna-Örs, Tata. IV. S.-A.-Ujhely, Homonna, Mármaros. VI. Ulma. Species sat rara.

86. *Thalhammeri* Mocs. — In Hungaria meridionali ad Berzászka (Com. Krassó-Szörény) in unico solum specimine inventa.

87. *scutellaris* Fabr. — I. Budapest, Péczel, Kisujszállás. II. Boglár, Szegzárd. III. Szliács. V. Peér. VI. Gombos, Zombor. VII. Vrdnik, Pregrada. VIII. Sušak, Orehovica, Cirkvenica.

88. *varidens* Ab. — I. Specimen unicum e regione Budapestinensi in Musæo Aulico Vindobonensi, quod ipse vidi.

89. *Grohmanni* Dhlb. — VIII. Sušak, Orehovica.

90. *Chevrieri* Mocs. (*distinguenda* Dhlb.). — I. Budapest, Péczel, Mártonkáta, Nagyvárad, Debreczen. II. Boglár. V. Peér. VI. Kazán. VII. Pregrada, Velebit. VIII. Sušak.

91. *comta* Först. — I. Budapest, Peszér. IV. Sárospatak, S.-A.-Ujhely. V. Peér, Szilágycsehi, Búzamező. VIII. Buccari.

92. *inaequalis* Dhlb. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Mártonkáta, Szeged. V. Peér, Rea, Szucság, Búzamező. VI. Gombos. VIII. Sušak, Buccari.

93. *ignita* Linn. — Est sui generis frequentissima, in omni zonarum parte collecta.

v. *obtusidens* Duf. et Perr. — IV. Szőllőske. V. Tihucza ; rarius.

v. *rutiliventris* Ab. — I. Budapest. V. Peér, Búzamező, Szucság, Brassó. VII. Velebit.

v. *longula* Ab. — I. Budapest, Pilis, Kecskemét, Kisujszállás. II. Pápa. III. Znióváralja. V. Semesnye. VII. Fužine. VIII. Orehovica.

94. *uncifera* Ab. — I. Makó. II. Duna-Örs. III. Homonna. V. Búzamező. VII. Klana. VIII. Orehovica, Buccari, Zengg.

95. *Ruddii* Shuck. (*auripes* Wesm.). — IV. Lupusinka (Com. Mármaros). V. Brassó. VII. Velebit, Fužine. VIII. Buccari, Fiume.

96. *cerastes* Ab. — I. Budapest ; rara. VIII. Sušak, Buccari, Zengg.

97. *angulata* Dhlb. — VII. Pregrada, ab A. Korlević in duobus exemplaribus inventa et a J. Pável ad Vrdnik quoque collecta.

98. *pulchella* Spin. — I. Budapest, Péczel, Isaszeg. II. Szegzárd. VI. Ulma, Palics. VII. Vrdnik.

99. *calimorpha* Mocs. — I. Rákospalota, Péczel, Isaszeg, Kis-Szentmiklós, Mártonkáta, species sat rara.

100. *sexdentata* Christ (*micans* Dhlb.). — I. Budapest, Peszér, Beél (Com. Bihar), Szeged. II. Boglár. V. Tasnád, Peér. VI. Grebenácz. VIII. Cirkvenica.

101. *equestris* Dhlb. — I. Szeged. VIII. Orehovica ; species rara.

102. *fasciata* Oliv. (*violacea* Panz.). — I. Mártonkáta. III. Trencsén. V. Búzamező. VII. Slavonia ; species ubique rara.

103. *purpurata* Fabr. (*Euchroeus purpuratus* Fabr. et *quadratus* Shuck.). — I. Budapest, Gellérthegy, Ó-Buda, Péczel, Isaszeg, prædium Szent-Lőrincz, Veresegyháza, Mártonkáta, Kecskemét, Dabas, Kalocsa, Debreczen, Szeged. II. Boglár, Tapolcza, Szegzárd. VI. Zombor.

104. *Dalla-Torreana* Mocs. *(Spinolia).* — I. Isaszeg, Péczel, Szeged. VI. Deliblat. VII. Vrdnik. Species magnifica.

Parnopes Latr.

105. *grandior* Pall. (*carnea* Rossi). — I. Budapest, Péczel, Mátyásföld, Kis-Szt-Miklós, Kalocsa, Peszér, Szeged. IV. Tolcsva, Szomotor. V. Szt-Erzsébet. VI. Kopács (Com. Baranya), Grebenácz, Nagy-Kikinda. VIII. Sušak, Zengg.

v. *fasciatus* Mocs. — I. Hucusque solum ad Isaszeg et Csepel.

Fam. FORMICIDAE.

Ponera Latr.

1. *coarctata* Latr. (*contracta* Latr.). — I. Budapest, Szentes. — II. Veszprém, Karancs (Com. Baranya). III. Putnok. IV. S.-A.-Ujhely, Beregszász, Nagy-Károly. V. Tasnád, Kolozsvár. VI. Mehádia, Orsova. VIII. Fiume, Orehovica.

Myrmecina Curt.

2. *Latreillei* Curt. — I. Budapest, Kalocsa, Makkos, Koly (Com. Bihar). IV. Komjáti, Szinyérváralja. V. Tasnád, Peér. VIII. Draga, Orehovica.

Anergates Forel.

3. *atratulus* Schck. — I. Budapest : Rákos. II. Visegrád (teste Mayr. i. l. ad me.)

Monomorium Mayr.

4. *Pharaonis* Linn. — VIII. Hucusque solum ad Fiume.

Solenopsis Westw.

5. *fugax* Latr. — I. Budapest, Kecskemét, Nagy-Várad, Beél, antrum ad Kalota (Com. Bihar), Makkos. II. Visegrád. III. Ungvár. V. Tasnád, Peér, Nagyszeben. VII. Pregrada. VIII. Draga, Orehovica.

Crematogaster Lund.

6. *scutellaris* Oliv. — VI. Mehádia. VIII. Fiume, Sušak, Orehovica, Zengg.

7. *sordidula* Nyl. — VIII. Fiume, Cilicinovo, Orehovica, Vežica.

Pheidole Westw.

8. *pallidula* Nyl. — V. Transsylvania (teste Dohrn). VI. Baziás (teste Mayr. i. l. ad me). VIII. Fiume, Orehovica.

Aphenogaster Mayr.

9. *barbara* Linn. — VIII. Vežica, Luižinska cesta, Novi, Zengg.

10. *structor* Latr. — Fere in omni zonarum regione observata.

11. *subterranea* Latr. — I. Budapest. II. Simontornya. IV. Beregszász, Torna. VI. Oravicza (teste Mayr). VIII. Fiume, Orehovica, Vežica.

Myrmica Latr.

12. *laevidonis* Nyl. — In magna parte regni observata.

13. *lobicornis* Nyl. — I. Budapest, Kalocsa. II. Simontornya. III. Balneum Lucski. IV. Áj et Szádellő (Com. Torna), Vihorlat (Com. Zemplén).

14. *rubida* Latr. — II. Zircz. III. Trencsén, Koritnicza, Tátrafüred. IV. Vihorlat, Javorina (Com. Szepes), Sáros, Mármaros. V. Transsylvania (Mayr), in montibus.

15. *ruginodis* Nyl. — I. Budapest, Mezőtúr, Rézbánya (Mayr). II. Pécs. III. Trencsén, Koritnicza. IV. Olyka, Csap, Mármaros. VI. Mehádia, mons Szemenik. VIII. Fiume.

16. *rugulosa* Nyl. — I. Szeged. IV. Szőllőske, Tokaj, Beregszász. V. Peér, Zilah.

17. *scabrinodis* Nyl. — Est sui generis vulgatissima, fere in omni regni parte observata.

18. *sulcinodis* Nyl. — I. Hucusque solum in Hungaria centrali ad Rákospalota (teste Mayr. i. l.) observata.

Stenamma Westw.

19. *Westwoodii* Westw. — IV. Czéke, Kis-Azar. V. Zilah, Kolozsvár. VI. Mehádia.

Leptothorax Mayr.

20. *acervorum* Fabr. — IV. Szinnaikő, Vihorlat. VI. Mehádia. Ubique sat rara.

21. *angustulus* Nyl. — VIII. Apud nos tantum ad Fiume.

22. *corticalis* Schck. — IV. Hucusque tantum ad Áj (Com. Torna) inventus.

23. *interruptus* Schck. — I. Budapest, Makkos. IV. Szendrő, Beregszász.

24. *muscorum* Nyl. — VI. Tantum ad thermas Herculis sacras Mehadienses observata.
v. *Gredleri* Mayr. — I. Budapest. II. Sóly (Com. Veszprém).

25. *Nylanderi* Först. — Fere in toto regno observata.

26. *tuberum* Fabr. — I. Budapest: Városliget (Mayr. i. l. ad me) IV. K.-Azar. VIII. Cilicinovo, Vežica, Buccari.
v. *affinis* Mayr. — I. Budapest: Svábhegy (Mayr). II. Szegzárd (Biró). VIII. Fiume.

27. *unifasciatus* Latr. — In omni parte regni Hungariæ diffusa.

Strongylognathus Mayr.

28. *testaceus* Schck. — I. Budapest: Mátyáshegy, Kecskehegy (Mayr). IV. Ungvár (teste Sajó).

Tetramorium Mayr.

29. *caespitum* Linn. — In tota Hungaria commune.

Epitritus Em.

30. *argiolus* Em. — I. Species rarissima, hucusque in unico solum exemplari ad Farkasd (Com. Pest) inventus.

Dolichoderus Lund.

31. *quadripunctatus* Linn. (*Hypoclinea* Mayr). — I. Budapest. II. Visegrád (Mayr), Szegzárd. III. Trencsén, Putnok. IV. Nagymihály, Czeke, Ungvár, Nagy-Károly. V. Tasnád, Nagyszeben (Fuss). VI. Antrum Veteráni. VIII. Orehovica.

Liometopum Mayr.

32. *microcephalum* Panz. (*austriacum* Mayr.). — I. Nagy-Tétény, Érmihályfalva (Com. Bihar), Debreczen. II. Lacus Fertő (Mayr). IV. Páczin, Tokaj, Tárkány, Szőllőske, Szomotor, S.-A.-Ujhely. V. Tasnád. VIII. Fiume.

Tapinoma Först.

33. *erraticum* Latr. — In omni parte regni observatum.

Bothriomyrmex Em.

34. *meridionalis* Roc. — VIII. Tantum ad Fiume et Orehovica.

Plagiolepis Mayr.

35. *pygmaea* Latr. — Fere in omni parte Hungariæ collecta.

Prenolepis Mayr.

36. *imparis* Say v. *nitens* Mayr. — I. Budapest, Budafok (Mayr). II. Simontornya, Pécs. V. Tasnád, Nagy-Csür. VI. Ferenczfalva, Oravicza. VIII. Orehovica, Buccari, Vežica.

Lasius Fabr.

37. *alienus* Först. — In magna parte regni collectus.

38. *bicornis* Först. — IV. Hucusque solum ad Velejte (Com. Zemplén) observatus.

v. *affinis* Schck. — IV. Kassa, K.-Tapolcsány. VIII. Orehovica.

39. *brunneus* Latr. — In omni fere parte Hungariæ.

40. *emarginatus* Oliv. — I. Budapest, Szeged, Makkos, Hadház. III. Király-Lehota, Koritnicza. IV. Tokaj. V. Tasnád, Peér. VI. Oravicza. VII. Fužine. VIII. Cilicinovo, Orehovica, Vežica.

41. *flavus* Fabr. — I. Budapest, Debreczen. III. Szliács, Pozsony, Tátra. IV. S.-A.-Ujhely. V. Tasnád, Hátszeg, montes Biharienses (Mayr), Nagy-Szeben. VIII. Fiume, Draga, Orehovica.

42. *fuliginosus* Latr. — Fere in omni zonarum regione.

43. *mixtus* Nyl. — I. Budapest, Füzes-Abony, Debreczen, Hadház. IV. Szőllőske, Tolcsva, Vihorlat. V. Borszék.

44. *niger* Linn. — In omni fere regni parte collectus.

45. *umbratus* Nyl. — Budapest, Rákos. II. Balaton-Füred. IV. S.-A.-Ujhely, Varannó, Körtvélyes.

Formica Linn.

46. *cinerea* Mayr. — I. Nagyvárad, Beél, Kalota, Rév. IV. Eperjes, Siroka (Com. Sáros), Királyháza (Com. Ugocsa), Homonna, montes Beszkid (Mayr). VI. Baziás, Avala (Mayr), Grebenácz, Orsova, Mehádia, Oravicza.

47. *exsecta* Nyl. — I. Sat rara, Budapest: mons Hajnalos (Friv.).

48. *fusca* Linn. — I. Parád, Nagyvárad, Fonácza, montes Biharienses (Mayr). II. Balaton-Füred (Mayr). III. Trencsén, Koritnicza, balneum Lucski. IV. Bártfa, Homonna, Mező-Laborcz, Vihorlat. V. Tasnád. VI. Ulma.

49. *gagates* Latr. — I. Budapest, Pilis-Csaba (Mayr), Nagyvárad. II. Visegrád. IV. S.-A.-Ujhely, Homonna. VI. Baziás, Avala (Mayr). VIII. Orehovica.

50. *pratensis* Deg. (*congerens* Nyl.). — In omni zonarum regione communis.

51. *pressilabris* Nyl. — Secundum Mayr est etiam Hungariæ incola.

52. *rufa* Linn. — I. Budapest, Pilis-Csaba (Mayr), Nagyvárad, Debreczen, Szeged. II. Neszmély. III. Pozsony, Trencsén, balneum Lucski. IV. Bereczki, Tokaj, Kassa, Eperjes (Mayr), Ungvár. VI. Oravicza (Mayr), Mehádia. VII. Fužine.

53. *rufibarbis* Fabr. (*cunicularia* Latr.). — In tota Hungaria, regionibus montanis altioribus exceptis, invenitur.

54. *sanguinea* Latr. — In regionibus collinis montanisque fere ubique occurrit.

55. *truncicola* Nyl. — I. Péczel. II. Balaton-Füred (Mayr). III. Balneum Lucski, Koritnicza, Tátra-Füred. V. Pele-Szarvad (Com. Szilágy), Tusnád. VIII. Fiume.

Polyergus Latr.

56. *rufescens* Latr. — I. Budapest, Székelyhid, Szeged. II. Visegrád, Kenese (Com. Veszprém), Zircz, Duna-Földvár, Pécs. III. Szliács, Trencsén. IV. Tokaj, Szőllőske, Torna, Körtvélyes (Com. Torna). V. Peér, Nagyszeben. VI. Grebenácz. VII. Dálya, Pregrada. VIII. Fiume.

Myrmecocystus Wesm.

(*Cataglyphis* Först.)

57. *cursor* Fonsc. — I. Budapest, Alberti-Irsa, Tápió-Szele, Kecskemét, Szeged, Horgos. VI. Baziás, Grebenácz.

58. *viaticus* F. v. *orientalis* For. — I. Budapest, Fadd. IV. Tokaj. V. Mezőség. VI. Kazán, Grebenácz.

Camponotus Mayr.

59. *aethiops* Latr. — I. Budapest, Péczel, Alberti-Irsa, Nagyvárad. II. Visegrád. IV. Tokaj. V. Peér, Nagyszeben. VI. Baziás, Avala (Mayr), Orsova. VIII. Fiume, Orehovica.

60. *herculeanus* Linn. — In regionibus montanis fere ubique.

61. *lateralis* Oliv. — I. Budapest, Nagyvárad, Makkos. II. Visegrád. III. Pozsony. V. Előpatak. VI. Kazán, Domogled, Mehádia, Orsova, Baziás, Avala, Oravicza, Pétervárad. VII. Vrdnik, Gospić, Fužine. VIII. Fiume, Orehovica.

v. *dalmaticus* Nyl. — VI. Mehádia. VIII. Orehovica, Vežica, Cilicinovo.

v. *piceus* Leach (*foveolatus* Mayr). — I. Budapest, Nagyvárad, Derékegyháza. II. Szegzárd. III. Pozsony. IV. Szendrő, Torna. V. Tasnád. VI. Fehértemplom, Pétervárad. VII. Zágráb.

62. *ligniperdus* Latr. — In omni zonarum regione

communis, regionibus montanis altioribus exceptis.

63. *marginatus* Latr. — I. Budapest, Péczel, Parád. IV. Tolcsva, Ungvár. V. Zilah. VI. Baziás, Avala, Ulma, Mehádia.

64. *sylvaticus* Oliv. — I. Budapest, Derékegyháza, Eger. II. Simontornya. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj, Torna, Szendrő, Ungvár. V. Peér. VI. Mehádia, Ulma. VIII. Fiume.

v. *aethiops* Latr. — Simul cum stirpe invenitur.

65. *truncatus* Spin. *(Colobopsis).* — I. Budapest. IV. S.-A.-Ujhely, Szerencs, Czéke. V. Tasnád, Pele. VI. Mehádia, Avála (Mayr).VII. Pétervárad. VIII. Orehovica, Cilicinovo.

66. *vagus* Scop. (*pubescens* Fabr.). — Fere in omni zonarum regione.

Fam. HETEROGYNIDAE.

Mutilla Linn.

1. *brutia* Pet. *(hungarica* Fabr.) — I. Budapest, Puszta-Peszér, Kis-Szentmiklós, Kecskemét, Szeged. VI. Deliblat. VIII. Cirkvenica, Buccari.

2. *calva* Vill. *(distincta* nob.) — I. Budapest, Szeged, Jászkisér, Laskó. II. Duna-Örs. III. Pásztó, Szliács. IV. Aszaló, Vizsoly. V. Zilah. VI. Mehádia, Grebenácz. VII. Dálya, Pregrada.

3. *catanensis* Rossi *(paripunctata* Sich. et Rad. — I. Budapest ; exemplar unicum.

4. *europaea* Linn. — I. Budapest, Péczel, Dabas, Peszér, Kalocsa, Nagyvárad. III. Trencsén, Barlangliget, Tátrafüred. IV. Rosnyó, Tolcsva, Pietrosz, Zihovecz (Com. Mármaros). V. Nagyfalu, Torda, Nagyszeben. VI. Mehádia, Temesvár, Deliblat. VII. Brušane.

5. *erythrocephala* Latr. *(cornuta* Oliv., *quinquefasciata* nob.) — I. Budapest, Peszér. III. Pásztó. V. Torda, Nagyfalu. VIII. Fiume, Buccari, Carlopago, Zengg.

6. *littoralis* Pet. *(graeca* Lep., *salentina* Costa.) — I. Péczel, Kalocsa. VIII. Fiume, Novi, Buccari.

7. *lugubris* Fabr. — I. Budapest, Rákospalota, prædium Szentlőrincz, Csepel, Kalocsa, Kecskemét.

8. *maura* Linn. — I. Budapest, Péczel, Alberti-Irsa, Dabas, Peszér. II. Tapolcza, Badacsony. VI. Ulma, Grebenácz. VIII. St.-Giorgio, Buccari.

9. *montana* Panz. — I. Budapest. III. Szliács. IV. S.-A.-Ujhely. VI. Szabadka, Ulma. VII. Pregrada. VIII. Vežica.

v. *nigrita* Gir. — I. Ad Budapest in montibus rara.

10. *punctata* Latr. *(quadripunctata* Oliv.) — I. Budapest : Farkasvölgy, Gellérthegy.

11. *regalis* Fabr. — I. Budapest, Péczel. VI. Grebenácz. Ubique rara.

12. *rubrocincta* Luc. — I. Budapest, Kis-Szentmiklós. Hungaria meridionalis (teste Rad. et Sich.)

13. *rufipes* Fabr. — I. Budapest, Peszér, Kecskemét, Nagyvárad, Debreczen, Szeged. II. Mohács, Duna-Örs. III. Nyitra. IV. Pásztó, Tállya. V. Mező-Záh, Semesnye, Sepsi-Sz.-György, Nagyszeben. VI. Szabadka, Jassenova, Grebenácz. VII. Pregrada, Vrdnik. VIII. Pećine.

14. *trifasciata* Rad. — III. Szliács, Borosznó (Com. Zólyom), Trencsén, Koritnicza, Tátra. V. Nagy-Szeben. Solum in regionibus montanis.

15. *viduata* Pall. *(stridula* Rossi.) — I. Budapest. Péczel, Kis-Szentmiklós, Peszér, Kecskemét. VI. Ulma, Grebenácz, Deliblat.

Myrmosa Latr.

16. *cognata* Costa. — I. Budapest. II. Badacsony. V. Transsylvania. VI. Mehádia. Sat rara.

17. *ephippium* Fabr. Rossi. — I. Ad Budapest in unico solum specimine inveni.

18. *melanocephala* Fabr. — I. Budapest, Tápió-Szele, Szeged. II. Duna-Örs, Zircz. III. Trencsén. V. Mező-Záh, Semesnye, Rea. VI. Oravicza, Grebenácz, Deliblat. VII. Diakovár.

Methoca Latr.

19. *ichneumonoides* Latr. — I. Budapest, Péczel, Kecskemét, Szeged. II. Duna-Örs. VI. Grebenácz, Deliblat, Oravicza.

Pristocera Klug.

20. *depressa* Fabr. — I. Budapest, Kalocsa, Szeged. II. Duna-Örs. IV. S.-A.-Ujhely. V. Hátszeg. VI. Palics.

Scolia Fabr.

21. *flavifrons* Fabr. v. *haemorrhoidalis* Fabr. — *(Sphex versicolor, radula sibirica, radula hungarica* Christ). — I. Budapest, Péczel, Kis-Szentmiklós, Kalocsa, Nagyvárad, Debreczen, Szeged. II. Komárom, Tapolcza, Siófok, Balaton-Füred, Pécs. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely. V. Jassenova, Baziás, Ferenczfalva, Resicza, Mehádia. V. Nagyfalu. VII. Dálya, Eszék. VIII. Pećine, Orehovica.

22. *insubrica* Scop. — I. Budapest, Péczel, Peszér, Kecskemét, Kisujszállás, Kalocsa, Debreczen, Szeged. VI. Jassenova, Ulma. VIII. Zengg.

23. *quadripunctata* Fabr. — Est species in planitie totius regni communis.
24. *hirta* Schrk. — Pariter in omni zonarum regione in planitie ubique frequens.
25. *unifasciata* Cyrill. — I. Hucusque tantum in duobus exemplaribus ad Budapest inventa.

Elis Fabr.

26. *quinquecincta* Fabr. *(villosa* Sauss. et Sich.) — Budapest, Kisujszállás, Szendrő, Szeged. VI. Apatin (Com. Bács), Grebenácz, Deliblat. V. Szucság (Com. Kolozs). VII. Dálya, Vukovár.
27. *sexmaculata* Fabr. — I. Budapest, Péczel, Kis-Szentmiklós, Peszér, Dabas, Kalocsa, Kecskemét, Nagyváred, Debreczen, Szeged. II. Duna-Örs. III. Trencsén. VI. Grebenácz.

Tiphia Fabr.

28. *fulvipennis* Sm. — I. Farkasd, Kalocsa, Nagyvárad. II. Pécs. V. Torda. Sat rara.
29. *lativentris* Tourn. — Secundum auctorem solum Hungariam inhabitat (197, pag. 11.)
30. *minuta* Vanderl. — I. Budapest, Szeged. II. Duna-Örs. III. Trencsén. IV. Kis-Azar (Com. Zemplén), Homonna. VI. Orsova, Mehádia.
31. *morio* Fabr. *(villosa* Fabr.) — I. Budapest, Kalocsa, Debreczen, Szeged. II. Tapolcza. III. Trencsén. V. Mező-Záh. VI. Ulma, Mehádia, Orsova. VII. Pregrada. VIII. Fiume, Orehovica.
32. *ruficornis* Schck. — I. Kis-Szentmiklós, Nagyvárad, Rézbánya. V. Erzsébetváros, Segesvár, Nagyszeben, Tusnád.
33. *semipolita* Tourn. *(femorata nobis).* — Secundum auctorem est solum Hungariæ incola. In nostro regno fere ubique est sui generis vulgatissima et in omni zonarum regione, montibus altioribus exceptis, collecta.

Myzine Latr.

34. *cylindrica* Fabr. *(nitidula* Klug). — I. Budapest, Besnyő, Kecskemét, Dorozsma. II. Duna-Örs, Boglár. VI. Grebenácz.
35. *tripunctata* Rossi *(sexfasciata* Rossi). — I. Budapest, Kecskemét. II. Duna-Örs. IV. S.-A.-Ujhely, Szomotor. VI. Grebenácz, Palics.

Sapyga Latr.

36. *clavicornis* Linn, — III. Trencsén. IV. Mehádia. V. Tasnád, Hátszeg, Tihucza, Nagyszeben. VIII. Orehovica. Præsertim in regionibus montanis.
37. *decemguttata* Jur. *(cylindrica* Schck.) — I. Nagyvárad. III. Beszterczebánya.
38. *quinquepunctata* Fabr. *(pacca* Fabr.) — I. Budapest ex *Osmia rufa* a me culta, Peszér, Dabas, Kalocsa, Nagyvárad, Szeged. II. Boglár. III. Szliács, Beszterczebánya. V. Tasnád, Szucság, Sepsi-Szent-György. VI. Ulma. VII. Pregrada. VIII. Fiume, Sušak, Orehovica, Vežica.
39. *repanda* Spin. *(Aclastocera Frivaldszkyi* Först.) — I. Budapest, Puszta-Peszér, Dabas, Pilis e nido *Xylocopae violaceae* 9 exemplaria educata, Kecskemét. IV. S.-A.-Ujhely, Nagymihály. VI. Mehádia. Ubique rara.

Fam. POMPILIDAE.

Ceropales Latr.

1. *albicinctus* Rossi *(histrio* Fabr.) — I. Budapest, Péczel, Kisujszállás, Kalocsa, Nagyvárad, Szeged. III. Trencsén. VI. Kazán. VII. Pregrada, Samobor. VIII. Orehovica, Cirkvenica.
2. *maculatus* Fabr. — I. Budapest, Péczel, Kis-szentmiklós, Kisujszállás, Kalocsa, Nagyvárad, Rézbánya, Debreczen, Csongrád, Monyásza (Com. Arad). II. Duna-Örs. III. Nyitra, Trencsén, Rózsahegy. IV. Kassa. V. Tusnád. VI. Palics. VII. Pregrada, Zágráb, Stara Pazova.
3. *variegatus* Fabr. — I. Budapest, Dabas, Kisujszállás, Nagyvárad, Debreczen, Szeged. II. Duna-Örs. VI. Mehádia, Oravicza. VII. Pregrada.

Pompilus Fabr.

4. *affinis* Stein *(Homonotus affinis* Stein). — VI. Secundum auctorem ad thermas Herculis sacras Mehadienses inventus (183, pag. 63.); nobis ignotus.
5. *albispinus* Panz. — I. Budapest. II. Badacsony. VI. Mehádia. Sat rarus.
6. *albonotatus* Wesm. — VIII. Fiume, Sušak, Pećine, Cernik.
7. *aterrimus* Rossi *(Zelleri* Dhlb.) — Secundum Dahlbom (19, Vol. I. pag. 449) est etiam Hungariæ incola. VIII. Zengg (Padewieth).
8. *castor* Kohl. — I. Budapest. III. Ujbánya (Com. Bars). VII. Pregrada. Rara species.
9. *cellularis* Dhlb. *(neglectus* Wesm.) — I. Budapest, Nagyvárad. III. Trencsén, Rózsahegy. V. Tasnád, Segesvár. VI. Mehádia, Orsova. VII. Pregrada, Kalocsa. VIII. Vežica.
10. *chalybeatus* Schiödte. — I. Budapest, Szent-Lőrincz, Kisujszállás, Szeged. II. Boglár. IV. Tokaj. V. Hátszeg, Nagyszeben. VI. Grebenácz. VII. Pregrada, Zágráb.

11. *cinctellus* Vanderl. — I. Budapest. IV. Homonna. V. Sepsi-Sz.-György. VI. Mehádia, Oravicza. VIII. Sušak.
12. *cingulatus* Rossi (*luctuosus* Mocs.) — I. Budapest, Péczel. VII. Pregrada, Vrdnik. VIII. Čavle.
13. *fumipennis* Zett. — I. Budapest, Peszér. III. Ujbánya (Com. Bars). Rarus.
14. *gibbus* Fabr. — I. Budapest, Nagyvárad. V. Mezőség. VII. Pregrada.
15. *laesus* Mocs. — I. Solum Hungariæ incola, ubi ad Budapest rarus.
16. *lateritius* Mocs. — I. Budapest. Valde rarus.
17. *Magrettii* Kohl. — I. Budapest, Szent-Endre, Dabas. II. Boglár. III. Poprád, Uj-Tátrafüred. V. Hátszeg, Semesnye. VI. Kazán, Deliblat, Grebenácz.
18. *nanus* Schck. — I. Budapest. III. Emőd-puszta (Com. Nyitra). Rarus.
19. *nigerrimus* Scop. (*niger* Fabr.) — Fere in omni zonarum regione observatus.
20. *pectinipes* Vanderl. — VIII. Hucusque solum ad Fiume (Žakalj.)
21. *plumbeus* Fabr. — I. Budapest, Palota, Kis-Szentmiklós, Peszér, Kalocsa, Horgos. V. Nagyszeben. VI. Palics, Grebenácz, Deliblat. In locis arenosis sat frequens.
22. *Pollux* Kohl. — VII. Pregrada. VIII. Cirkvenica.
23. *quadripunctatus* Fabr. — I. Budapest, Péczel, Kis-Szentmiklós, Peszér, Dabas, Szeged. VIII. Fiume, Sušak, Orehovica, Cirkvenica, Carlopago, Čavle, Buccari.
24. *quadrispinosus* Kohl. — I. Budapest. VI. Palics. VII. Vaganski Vrh. VIII. Buccari.
25. *rufipes* Linn. — I. Budapest, Palota, Szentlőrincz, Kis-Szentmiklós, Monor, Peszér, Dabas, Nagyvárad, Debreczen, Szeged. III. Nyitra. V. Mezőség. VIII. Orehovica, Trsat.
26. *sanguinolentus* Farr. — I. Budapest, in aliquot exemplaribus collectus. VIII. Buccari.
27. *spissus* Schiödte. — I. Budapest, Nagyvárad. III. Koritnicza. IV. S.-A.-Ujhely.
28. *stygius* Costa (*retusus* Costa). — I. Budapest. II. Kőszeg. III. Nyitra. Rarus.
29. *tripunctatus* Vanderl. — I. Budapest, Péczel, Nagyvárad. VI. Palics.
30. *trivialis* Vanderl. — III. Trencsén. VI. Szatymaz. VII. Pregrada.
31. *ursus* Fabr. (*coccineus* Fabr.) — I. Budapest, Kis-Szentmiklós. II. Pécs. III. Nyitra. V. Torda. VI. Grebenácz, Deliblat.
32. *vagans* Klug (*orbitalis* Costa). — I. Budapest, Kalocsa, Pécska (Com. Arad). VI. Mehádia, Palics. VIII. Čavle.
33. *viaticus* Linn. — Est species sui generis frequentissima, in omni zonarum regione collectus.
34. *Wesmaeli* Thoms. — VII. Tantum ad Klana.

Calicurgus Lep., Thoms.

35. *fasciatellus* Spin. — I. Budapest, Kisujszállás. II. Badacsony, Pécs. VI. Mehádia, Baziás. VII. Zágráb, Pregrada. VIII. Fiume, Orehovica, Cernik, Buccari.

Salius Fabr.

(*Priocnemis* Auct.)

36. *affinis* Vanderl. — I. Budapest, Kisujszállás, Kalocsa. III. Körtvélyes (Com. Torna). V. Dicsőszentmárton, Brassó. VI. Mehádia. VIII. Draga, Carlopago.
37. *annulatus* Fabr. — VIII. Buccari, Novi, Zengg.
38. *coriaceus* Dhlb. — VII. Zágráb, Kupinovo. VIII. Fiume.
39. *elegans* Spin. — VIII. Tantum ad Orehovica.
40. *exaltatus* Fabr. — I. Péczel, Kalocsa, Debreczen, Monyásza (Com. Arad). II. Kapornak. III. Rajecz, Trencsén, Poprád. IV. S.-A.-Ujhely, Homonna, Mármaros. V. Nagyszeben. VI. Resicza, Deliblat. VII. Pétervárad, Vaganski Vrh.
41. *fuscus* Fabr. (*sepicola* Sm.) — In omni zonarum regione.
42. *hyalinatus* Fabr. (*fasciatellus* Schck.) — I. Szeged. V. Tasnád, Nagyszeben.
43. *minutus* Vanderl. — I. Budapest; rarus. VII. Pregrada.
44. *notatus* Rossi. — I. Budapest. III. Trencsén. IV. Homonna, Bereczki. V. Tasnád. VII. Zágráb, Pregrada. VIII. Orehovica.
45. *obtusiventris* Schiödte. — I. Budapest. II. Visegrád, Kapornak. V. Szucság, Tasnád, Nagyszeben.
46. *parvulus* Dhlb. — I. Budapest, Kisujszállás, Ecseg, Szeged. III. Puszta-Emőd. V. Semesnye. VII. Pregrada, Stara Pazova.
47. *pusillus* Schiödte. — I. Budapest, Kisujszállás. III Trencsén. IV. Szádellő, Homonna. V. Tusnád. VI. Mehádia. VII. Gospić, Pregrada, Sfara Pazova, Vaganski Vrh.
48. *Schenckii* Kohl (*maculipennis* Schck). — I. Budapest, Péczel, Nagyvárad; non rarus. II. Ácsi-erdő (Com. Komárom). IV. S.-A.-Ujhely. VI. Mehádia, Orsova, Deliblat. VIII. Fiume.
49. *versicolor* Scop. (*variegatus* Fabr., *bipunctatus* Fabr.) — In omni zonarum parte cum v. *Fabricii* Vanderl. collectus minusve rarus.
50. *vulneratus* Costa. — I. Budapest, Kis-Szentmiklós, prædium Szentlőrincz, Kecskemét. II.

Duna-Örs. VI. Palics, Deliblat. Species elegantissima et rara.

Pseudagenia Kohl.

51. *albifrons* Dalm. — I. Budapest; sat rara. II. Duna-Örs. VIII. Portoré.

52. *carbonaria* Scop. (*punctum* Dhlb.) — In omni fere zonarum regione.

Agenia Schiödte.

(*Pogonius* Dhlb.)

53. *bifasciata* Dhlb. — III. Balneum Koritnicza. VI. Mehádia.

54. *erythropus* Kohl. — VIII. Solum ad Buccari inventa.

55. *hircana* Fabr. — I. Szeged. VI. Mehádia. VII. Pakracz, Pregrada.

56. *intermedia* Dhlb. — I. Budapest, Parád. V. Tihucza (Com. Besztercze-Naszód). VI. Mehádia. VIII. Orehovica.

57. *variegata* Linn. — I. Budapest. IV. Szőllőske. VI. Mehádia. VIII. Sušak, Čavle, Buccari.

Fam. SPHECIDAE.

(SPHEGIDAE Auct.)

Pison Spin.

1. *atrum* Spin. — I. Species rarissima, tantum in unico specimine ad Budapest inventa.

Trypoxylon Latr.

2. *figulus* Linn. — In omni parte regni commune.

3. *attenuatum* Sm. — I. Budapest, Nagyvárad. III. Trencsén. V. Szucság, Semesnye.

4. *clavicerum* Lep. et Serv. — I. Kalocsa, Nagy-Várad. II. Kapornak. IV. Homonna. V. Tusnád. VI. Grebenácz. VII. Pregrada, Gospić. VIII. Sušak, Draga, Orehovica.

Solierella Spin.

(*Sylaon* Piccioli.)

5. *compedita* Picc. — I. Budapest, Kis-Szt-Miklós, Kisujszállás. Species rara.

Nitela Latr.

6. *Spinolae* Latr. — IV. Szőllőske. VIII. Fiume.

Miscophus Jur.

7. *bicolor* Jur. — I. Budapest, Péczel, Kisujszállás. II. Boglár. IV. Szőllőske, Homonna. V. Szucság, S.-Sz.-György. VII. Vrdnik.

8. *spurius* Dhlb. — II. Duna-Örs. III. Szliács. VIII. Buccari.

Larra Fabr.

(*Larrada* Sm.)

9. *anathema* Rossi. — I. Budapest, Péczel, Dabas, Kecskemét, Kalocsa, Nagyvárad, Debreczen, Szeged, Fehértó (Com. Csongrád). V. Zilah, Torda, Búzamező, Semesnye, Erzsébetváros. VI. Palics. VIII. Čavle, Lopača.

Notogonia Costa.

10. *pompiliformis* Panz. (*nigra* Vanderl.) — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Kisujszállás, Nagyvárad. VI. Grebenácz. VII. Dálya, Pregrada. (*nigrita* Lep. — Ungarn? Kohl (74, pag. 253.). Species non est Hungariæ incola.)

Tachytes Panz.

11. *etruscus* Rossi. — I. Budapest, Péczel, Isaszeg, Kis-Szent-Miklós, Kecskemét, Szeged. VI. Grebenácz, Palics.

12. *obsoletus* Rossi. — I. Péczel. II. Duna-Örs. VIII. Fiume. Species rara.

13. *europaeus* Kohl (*obsoletus* Auct.). — I. Budapest, Isaszeg, Kis-Szent-Miklós, Kecskemét, Kalocsa, N.-Várad, Debreczen, Szeged. IV. Vizsoly. V. Segesvár, Szt-Erzsébet. VI. Gombos, Palics, Grebenácz, Jassenova, Mehádia. VII. Josephsthal (Josipdol) (Kohl).

Tachysphex Kohl.

14. *Panzeri* Vanderl. (*discolor* Friv.). — I. Budapest, Péczel, Kis-Szent-Miklós, Mátyásföld, Kisujszállás. III. Érsekujvár. IV. Szomotor, Páczin (Com. Zemplén). VI. Grebenácz.

15. *Mocsáryi* Kohl. — I. Species rarissima, hucusque solum ad Mátyásföld et Dabas (Com. Pest) inventa. Solum Hungariæ terram colit.

16. *pygidialis* Kohl. — I. Budapest, Kisujszállás. VI. Grebenácz, Jassenova. VII. Gospić.

17. *rufipes* Aich. (*spoliatus* Gir.). — I. Budapest. VI. Mehádia, Orsova. VIII. Fiume, Orehovica, Cirkvenica, Buccari.

18. *lativalvis* Thoms. — I. Species rara, hucusque apud nos solum ad Budapest.

19. *acrobates* Kohl (*strigosus* Mocs.). — I. Budapest. III. Nyitra. V. S.-Szt-György.

20. *pectinipes* Linn. — I. Péczel, Mártonkáta, Kalocsa, Szatymaz. III. Turcsek. V. Nagy-Vizvölgy (Com. Hunyad), Tasnád, Tusnád. VI. Grebenácz. VII. Pregrada, Vrdnik.

21. *nitidus* Spin. (*unicolor* Panz.). — I. Budapest, Kisujszállás. III. Szliács, Nyitra, Érsekujvár. V. Dicső-Szent-Márton. VI. Mehádia, Grebenácz, Jassenova, Deliblat, Nagy-Kikinda. VII. Pregrada. VIII. Fiume, Carlopago, Buccari, Zengg.

Dinetus Jur.

22. *pictus* Fabr. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Nagyvárad, Rév. V. Szucság, Szent-Erzsébet (Com. Szeben). VI. Grebenácz, Kazán. VII. Pregrada.

Palarus Jur.

23. *guttatus* Fabr. (*flavipes* Fabr.). — I. Budapest, Peszér, Kecskemét, Kisujszállás, Kalocsa, Nagy-Várad, Szatymaz. II. Kopács. III. Érsekujvár. IV. Szőllőske, Szomotor. V. Transsylvania. VI. Grebenácz, Deliblat, Kubin, Palics.

Astata Latr.

24. *boops* Schrk. — I. Budapest, Péczel, Kecskemét, Kisujszállás, Kalocsa, Nagyvárad, Szeged. III. Trencsén, Szliács, vallis ad Hermanetz. V. Tasnád, Kolozsvár, Semesnye, Kovászna. VI. Ulma, Orsova, Mehádia. VII. Diakovár, Josephsthal (Josipdol, Kohl), Klana. VIII. Fiume, Pečine, Vežica, Orehovica.

25. *minor* Kohl. — I. Budapest, Kalocsa. II. Boglár. III. Nyitra, Szliács. V. Kovászna. VI. Gombos, Grebenácz, Deliblat. VII. Vrdnik.

26. *rufipes* Mocs. — I. Budapest; valde rara.

27. *Costae* Piccioli. — I. Budapest; unum tantum exemplar.

28. *stigma* Panz. *var femoralis* Mocs. — III. Koritnicza. VII. Raduć. Rara.

29. *tricolor* Vanderl. (*Dryudella modesta* Mocs. et *lineata* Mocs.). — I. Budapest, Kis-Szent-Miklós. VI. Grebenácz. VIII. Fiume (Kohl).

Mimesa Shuck.

(*Mesopora* Wesm.)

30. *atra* Fabr. — I. Rézbánya in montibus Biharien-sibus. VI. Resicza. VII. Klana, Pregrada, Vrdnik.

31. *equestris* Fabr. — I. Budapest. III. Poprád, Trencsén. IV. Szobráncz. V. Mons Magura (Com. Kolozs). VI. Grebenácz. VIII. Fiume (Žakalj).

32. *Shuckardii* Wesm. — I. Budapest, Nagyvárad. IV. Homonna. VI. Mehádia.

33. *unicolor* Vanderl. — I. Budapest, Szeged. VI. Grebenácz. VIII. Draga, Orehovica.

34. *Dahlbomi* Wesm. — III. Ujbánya. V. Nagyszeben.

35. *carbonaria* Tourn. — IV. Szomotor. V. Tihucza. VI. Korniaréva.

Psen Latr.

36. *atratus* Panz. — I. Budapest, Kecskemét, Nagy-Várad, Rév, Debreczen. II. Duna-Örs. III. Ujbánya, Trencsén. IV. Forró, Bártfa. V. Semesnye, S.-Szt-György, Kovászna. VI. Oravicza, Grebenácz. VII. Pétervárad. VIII. Orehovica, Draga, Vežica.

37. *fuscipennis* Dhlb. — III. Rajecz. V. Balneum Tusnád, Kovászna. VI. Mehádia, Rumunyest. VII. Klana, Pregrada. VIII. Draga, Orehovica.

38. *Chevrieri* Tourn. — VIII. Hucusque tantum ad Fiume.

Pemphredon Latr.

(*Pemphredon* gen.)

39. *lugubris* Latr. — I. Budapest, Mártonkáta, Nagy-Várad, Beél, Szeged. V. Nagyszeben, Tusnád. VI. Resicza. VII. Montes Karst. VIII. Orehovica.

40. *montanus* Dhlb. — III. Lacus Csorba, Oravicza (Com. Árva). IV. Mármaros. V. Tihucza (Com. Besztercze-Naszód).

41. *lugens* Dhlb. — Hungaria superior. V. Balneum Tusnád, Tihucza. VI. Mehádia. VII. Fužine.

42. *luctuosus* Shuck. — IV. Szomotor. VI. Resicza.

(*Diphlebus* Wesm., *Cemonus* Auct.)

43. *unicolor* Fabr. — I. Budapest, Csepel, Kecskemét, Kisujszállás, Kalocsa. II. Zircz. III. Poprád, Tátraháza. IV. Szőllőske. V. Mezőség, Erzsébetváros, Kovászna, Nagyszeben. VI. Mehádia, Grebenácz. VII. Pregrada. VIII. Orehovica, Cirkvenica, Buccari.

44. *lethifer* Shuck. — I. Budapest. VII. Pregrada. VIII. Orehovica, Portoré.

45. *Wesmaeli* A. Mor. — I. Budapest. V. Búzamező, Szucság.

46. *Shuckardii* A. Mor. — I. Budapest: Svábhegy, Nagyvárad. II. Duna-Örs. IV. Homonna. VI. Mehádia. VII. Dálya.

(*Cerathophorus* Shuck.)

47. *morio* Vanderl. — III. Virágvölgy penes Poprád. V. Tihucza (Com. Besztercze-Naszód).

48. *clypealis* Thoms. — III. Virágvölgy. V. Tihucza.

Passaloecus Shuck.

49. *abnormis* Kohl. — VI. Hucusque tantum ad Orsova.

50. *brevicornis* A. Mor. — I. Nagyvárad. IV. Szomotor, Bártfa, Ungvár. V. Brassó. VI. Mehádia.

51. *gracilis* Dhlb. — I. Nagyvárad. III. Prædium Emőd (Com. Nyitra), Trencsén. IV. Tolcsva, Homonna. VI. Korniaréva.

52. *insignis* Shuck. — Tantum ad Trencsén.

53. *turionum* Dhlb. — IV. Ungvár. V. Brassó.

Stigmus Panz.

54. *pendulus* Vanderl. — III. Apud nos ad Trencsén.

55. *Solskyi* A. Mor. — I. Budapest, Kalocsa. VI. Mehádia, Oravicza, Orsova, vallis Ribis (Com. Krassó-Szörény). VII. Montes Karst.

Spilomena Westw.

56. *troglodytes* Vanderl. — IV. Ungvár. V. Semesnye (Com. Szolnok-Doboka).

Diodontus Curt.

57. *minutus* Fabr. — I. Budapest. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely. V. Tasnád, Nagyszeben. VI. Mehádia, Grebenácz. VII. Stara Pazova, Vaganski Vrh. VIII. St.-Giorgio.

58. *luperus* Shuck. — III. Prædium Emőd, Ujbánya. V. Nagyszeben.

59. *tristis* Vanderl. — II. Boglár. IV. Szomotor, Homonna. V. Tasnád.

Ampulex Jur.

60. *fasciata* Jur. — VI. Mehádia. Specimen unicum.

Sceliphron Klug

(*Pelopoeus* Latr.)

61. *spirifex* Linn. — VIII. Fiume, Sušak, Cirkvenica, Zengg, Buccari.

62. *destillatorium* Ill. — I. Budapest, Peszér, Kecskemét, Kalocsa, Nagyvárad, Debreczen, Szeged. III. Trencsén, Rozsnyó. IV. Forró, Szobráncz, Deregnyő (Com. Zemplén). V. Nagyfalu, Mezőség, Hátszeg, Dicsőszentmárton. VI. Apatin, Grebenácz, Orsova, Kubin, Deliblat. VIII. Fiume, Sušak, Zengg, Buccari.

63. *femoratum* Fabr. — I. Kecskemét, Eger. VI. Ulma. VII. Slavonia. Species ubique rara.

64. *omissum* Kohl (*violaceum* apud Korlev. nec Fabr.) — VIII. Cirkvenica, Carlopago, Zengg, Buccari.

Sphex Fabr.

65. *occitanicus* Lep. et Serv. (*fera* Dhlb.) — I. Budapest, Peszér, Kalocsa. VI. Palics (Com. Bács). Species ubique rara.

66. *subfuscatus* Dhlb. (*Gastrosphaeria anthracina* Costa.) — I. Budapest, Rákos, Kis-Szentmiklós, Szeged. VIII. Zengg. Satis rarus.

67. *paludosus* Rossi. — VII. Josephsthal (Josipdol) (Kohl). VIII. Fiume, Vežica, Cirkvenica, Cernik, Buccari.

68. *pruinosus* Klug? — Secundum A. Korlević ad Fiume inventus.

69. *maxillosus* Fabr. — I. Budapest, Peszér, Kisujszállás, Kalocsa, Nagyvárad, Szeged. II. Siófok. III. Tavarnok. VI. Grebenácz, Mehádia, Palics, Kazán. VIII. Fiume, Orehovica, Zengg.

70. *flavipennis* Fabr. — VIII. Tantum in regione adriatica: ad Zengg.

(*Enodia* Lep., *Parasphex* Sm.)

71. *albisectus* Lep. — I. Budapest, Kis-Szentmiklós, Kecskemét, Kalocsa, Nagyvárad. V. Transsylvania. VI. Ulma, Palics. VIII. Cirkvenica.

Ammophila Kirby.

(*Miscus* Latr.)

72. *campestris* Latr. — I. Budapest, Palota, Szent-Lőrincz, Mátyásföld, Péczel, Kisujszállás. IV. Varannó. V. Szent-Erzsébet (Com Szeben). VI. Jassenova, Grebenácz. VII. Vrdnik.

(*Ammophila* s. str.).

73. *Mocsáryi* Friv. — I. Budapest, Palota, Kis-Szentmiklós, Mártonkáta, Kecskemét, Szeged. IV. Szomotor, Páczin, Palics. VI. Grebenácz, Deliblat.

74. *sabulosa* Linn. — Est sui generis species vulgatissima.

75. *hungarica* Mocs. (*fallax* Kohl.) — I. Budapest. II. Duna-Örs. Species rara.

76. *Heydenii* Dhlb. — I. Budapest, Peszér, Kecskemét, Kisujszállás, Debreczen. V. Nagyfalu, Nagyenyed, S.-Sz.-György. VI. Mehádia, Ulma, Grebenácz, Palics. VII. Dálya, Fužine. VIII. Fiume, Sušak, Vežica, Cirkvenica, Buccari, Novi, Carlopago, Zengg.

(*Parapsammophila* Tasche.)

77. *armata* Illig. — VIII. Tantum in regione adriatica: Čavle.

(*Psammophila* Dhlb.)

78. *hirsuta* Scop. (*viatica* Linn.) — I. Budapest, Kalocsa, Debreczen, Nagyvárad, Rézbánya, Vaskóh, Szeged. II. Simontornya, Zircz. III. Pozsony, Trencsén, Szliács, Beszterczebánya, Rosnyó. V. Mezőség, Brassó, Tusnád. VI. Grebenácz. VII. Zágráb. VIII. Sušak, Buccari, Zengg.

79. *affinis* Kirby (*lutaria* Panz.) — I. Budapest, Mártonkáta, Kecskemét, Kisujszállás, Nagyvárad, Debreczen. II. Kapornak, Kenese. V. Segesvár. VI. Mehádia, Ulma.

80. *capucina* Costa. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa. IV. Szepsi (Com. Abauj). VI. Ulma, Grebenácz. Species sat rara.

Philanthus Fabr.

81. *triangulum* Fabr. — I. Budapest, Kalocsa, Nagyvárad, Debreczen, Szatymaz. II. Zircz, Duna-Örs, Kopács. III. Érsekujvár, Nyitra, Trencsén. IV. S.-A,-Ujhely, Szikszó. V. Nagy-

falu, Dicsőszentmárton, Nagyszeben. VI. Grebenácz. VII. Vrdnik, Pétervárad. VIII. Fiume, Pećine, Zengg, Buccari.

82. *coronatus* Fabr. — I. Budapest, Péczel, Kis-Szentmiklós, Kalocsa, Szeged. II. Kapornak, Kopács. IV. Megyaszó (Com. Abauj). VII. Dálya, Pregrada, Vrdnik, Ujvidék.

83. *venustus* Rossi. — I. Budapest, Rákos, Peszér, Kis-Szentmiklós, Kecskemét, Szeged. VI. Grebenácz.

84. *eximius* Mor. (*elegans* Mor.) — I. Species rarissima, hucusque solum in unico specimine ad Budapest penes Rákospalota inventa.

Cerceris Latr.

85. *rybiensis* Linn. (*ornata* Latr., *semicincta* Pz., *variabilis* Schrk.) — I. Budapest, Kis-Szentmiklós, Kalocsa, Nagyvárad. III. Szliács, Beszterczebánya. IV. Tokaj. V. Nagyfalu, Tasnád, Nagy-Csűr, Nagyszeben. VI. Resicza, Mehádia, Orsova, Grebenácz. VII. Raduć, Pregrada. VIII. Sušak, Orehovica.

86. *emarginata* Panz. — I. Budapest, Kalocsa, Kisujszállás, Nagyvárad, Szatymaz. II. Kapornak, Simontornya. III. Érsekujvár, Trencsén, Beszterczebánya. V. Tasnád, Kolozsvár, Sepsi-Szent-György. VI. Mehádia, Jassenova, Palics. VII. Ruma, Diakovár, Vrdnik. VIII. Fiume, Orehovica, Cirkvenica, Buccari.

87. *hortivaga* Kohl. — I. Prædium Poo (Com. Jász-Nagykún). VI. Resicza, Mehádia. VII. Pregrada. VIII. Fiume. Species sat rara.

88. *funerea* Costa. — I. Budapest, Rákos, Mátyásföld. VI. Grebenácz. In locis arenosis sat rara.

89. *albofasciata* Rossi (*tricincta* Vanderl.) — I. Budapest. VI. Mehádia. VII. Zágráb, Pregrada. Nullibi frequens.

90. *dacica* Schletterer. — I. Budapest, Péczel, Mátyásföld, Kecskemét, Kalocsa. II. Kapornak. IV. Szomotor. VI. Grebenácz, Palics. Simul cum v. *magnifica* Schletterer. est solum Hungariæ civis.

91. *striolata* Schletterer. — I. Tantum Hungariæ et quidem regionis centralis incola, ubi ad Budapest et Nagyvárad rara est.

92. *bupresticida* Duf. — VI. Mehádia. VII. Vrdnik, rara.

93. *quadrimaculata* Duf. — Teste Schletterer, species mediterranea etiam Hungariam inhabitat (168, pag. 400.)

94. *stratiotes* Schletterer. — VI. Ad Jassenova et Grebenácz a me collecta.

95. *melanothorax* Schletterer. (*tenuivittata* Duf?). — VI. Ad Jassenova duo solum exemplaria inveni.

96. *leucozonica* Schletterer. — I. Budapest, Péczel. II. Szent-Márton (Com. Zala), Szombathely. III. Érsekujvár. Species elegans et rara.

97. *arenaria* Linn. — I. Budapest, Mátyásföld, Kalocsa, Nagyvárad, Debreczen, Szeged. III. Trencsén, Nyitra. IV. Szobráncz. V. Zilah. VI. Mehádia, Resicza, Grebenácz, Deliblat, Ujvidék. VII. Dálya, Vrdnik. VIII. Fiume, Orehovica, Carlopago, Buccari.

98. *luctuosa* Costa (*cribrata* Mocs.). — I. Budapest, Rákos, Kecskemét, Kisujszállás, Nagy-Várad, Szeged. II. Kopács. III. Érsekujvár. VI. Grebenácz, Jassenova.

99. *capitata* Sm. (*fuscipennis* Costa). — I. Péczel, Kisujszállás, Kalocsa; rara.

100. *rubida* Jur. (*albonotata* Vanderl.). — I. Budapest, Kalocsa, Kis-Szentmiklós, Nagyvárad, Szeged. II. Kapornak. IV. Tokaj, Szőllőske. V. Tasnád. VI. Grebenácz, Palics. VII. Diakovár, Vrdnik. VIII. Cirkvenica.

101. *quadrifasciata* Panz. — I. Budapest, Mártonkáta, Kecskemét, Kalocsa. II. Duna-Örs, Pécs. III. Szliács, Koritnicza, Tátrafüred. V. Tusnád, Tihucza. VI. Mehádia, Kazán, Orsova. VII. Zágráb, Josephsthal (Josipdol, Schletter.), Fužine. VIII. Orehovica, Lokve, Buccari.

102. *quadricincta* Vanderl. — I. Péczel. III. Ujbánya (Com. Bars). VII. Pregrada, montes Velebit. VIII. Fiume, Buccari. Species sat rara.

103. *quinquefasciata* Rossi. — I. Budapest, Péczel. II. N.-Kapornak, Boglár. III. Érsekujvár, Nyitra. VI. Ulma, Grebenácz, Gombos. VII. Ruma, Josephsthal (Josipdol, Schletter.), Zágráb, Pregrada, Vrdnik. VIII. Orehovica, Cirkvenica, Novi.

104. *interrupta* Panz. — I. Budapest, Kis-Szent-Miklós, Peszér. II. Simontornya, Kapornak, Villány. VI. Jassenova, Deliblat. VIII. Čavle.

105. *conigera* Dhlb. (*flavicornis* Brullé?). — Teste Schletterer, species hæc mediterranea etiam Hungariam inhabitat (168, pag. 438.)

106. *bracteata* Eversm. (*penicillata* Mocs.). — I. Budapest, Kis-Szentmiklós, Debreczen. VI. Grebenácz. Sat rara.

107. *bucculenta* Costa. — Teste Schletterer, etiam hæc species sarda Hungariam inhabitare dicitur (168, pag. 439.)

108. *Ferreri* Vanderl. — I. Budapest, Kalocsa, Kisujszállás. II. Kapornak, Duna-Örs, Szegzárd. IV. Szobráncz. V. Nagyfalu, Tasnád. VI. Jassenova, Deliblat. VII. Pregrada. VIII. Fiume, Pećine.

109. *labiata* Fabr. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa, Nagyvárad. II. Pécs. III. Nyitra, Trencsén,

Szliács, Rajecz. IV. S.-A.-Ujhely, Aszaló. VI. Mehádia, Jassenova. VII. Ruma, Josephsthal (Josipdol, Schlett.), Pregrada. VIII. Fiume, Orehovica, Cirkvenica, Buccari.

110. *tuberculata* Vill. — I. Budapest, Isaszeg, Kecskemét, Kisujszállás, Szeged, Kalocsa. II. Béllye. V. Mezőség, Vizakna, Kolozsvár, Dicső-Szent-Márton. VI. Mehádia, Jassenova, Palics.

Oxybelus Latr.

111. *lineatus* Fabr. — I. Budapest, Csepel; duo tantum specimina.

112. *elegantulus* Gerst. — I. Budapest, Kalocsa, Kecskemét, Kisujszállás, Nagyvárad, Beél. II. Simontornya. III. Érsekujvár, Trencsén. VII. Eszék.

113. *furcatus* Lep. — I. Budapest, Kalocsa, Kecskemét, Kisujszállás, Mező-Kovácsháza, Nagyvárad, Beél. III. Érsekujvár, Nyitra. VI. Deliblat. VII. Trsat.

114. *quatordecimnotatus* Jur. — VII. Hucusque solum in regione croatica inventus.

115. *mucronatus* Fabr. — Teste Kohl species etiam Hungariam inhabitat. (73, pag. 114.)

116. *nigripes* Oliv. — I. Budapest, Nagyvárad. III. Nyitra, Trencsén. IV. Simonka (Com. Zemplén). V. Tusnád.

117. *meridionalis* Mocs. — VI. Mehádia, in unico solum specimine inventus.

118. *ambiguus* Gerst. VII. Lokve. — Hungaria, teste Kohl (73, pag. 110.)

119. *bipunctatus* Oliv. — I. Budapest, Debreczen. III. Érsekujvár. IV. Lelesz (Com. Abauj).

120. *maculipes* Sm. — I. In Hungaria centrali ad Kis-Szentmiklós.

121. *pugnax* Oliv. — III. Ad Nyitra plura specimina inveni. VIII. Fiume (Žakalj).

122. *latro* Oliv. — I. Budapest, Rákos, Mátyásföld, Kis-Szentmiklós, Peszér, Szeged.

123. *Trefortii* Sajó. — I. Solum Hungariæ incola, species prope Budapest ad Kis-Szentmiklós ab auctore detectus.

124. *psammobius* Kohl. — I. Budapest. III. Érsekujvár. VI. Grebenácz. VIII. S.-Giorgio. Species rara.

125. *elegans* Mocs. — I. Budapest, Kis-Szentmiklós. VI. Grebenácz. Tantum Hungariæ civis.

126. *melancholicus* Chevr. (*analis* Gerst.) — I. Budapest, Kalocsa, Makó. II. Pécs. III. Érsekujvár, Nyitra. V. Búzamező, S.-Sz.-György. VI. Grebenácz. VII. Stara Pazova, Grižane.

127. *mandibularis* Dhlb. — I. Budapest, Kis-Szentmiklós, Kalocsa. III. Érsekujvár. IV. Forró.

128. *uniglumis* Linn. — I. Budapest, Dabas, Kecskemét, Kalocsa. III. Érsekujvár, Trencsén. IV. Homonna. V. Kolozsvár, Nagyszeben, Tusnád.

129. *aurantiacus* Mocs. — I. In Hungaria centrali ad Kis-Szentmiklós a C. Sajó detectus. Species rara.

Oxybeloides Rad.

130. *obscurus* Kohl. — I. Nagyvárad. II. Balaton-Füred. Rarus esse videtur.

Nysson Latr.

131. *scalaris* Illig. — I. Budapest, Kis-Szentmiklós, Kalocsa, Nagyvárad. IV. Szobráncz. V. Transsylvania. VI. Grebenácz. VII. Fužine.

132. *fulvipes* Costa. — I. Farkasd, Péczel. VIII. Orehovica (Handlirsch).

133. *spinosus* Forst. — I. Péczel, Nagyvárad. IV. Bártfa. VII. Zágráb.

134. *interruptus* Fabr. — I. Budapest, Farkasd, Kalocsa. VI. Mehádia.

135. *trimaculatus* Rossi. — IV. Vallis ad Szádellő (Com. Torna). V. Nagyvízvölgy (Com. Hunyad).

136. *maculatus* Fabr. — I. Budapest; rarus IV. Varannó.

137. *tridens* Gerst. — III. Secundum C. Brancsik in Trencsén inventus.

138. *dimidiatus* Jur. — I. Budapest. II. Duna-Örs. VI. Mehádia. VIII. Orehovica.

Alyson Jur.

139. *tricolor* Lep. et Serv. — I. Budapest; rarus.

140. *fuscatus* Panz. (*bimaculatus* Panz.) — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Kecskemét. II. Badacsony. V. Nagyszeben, Szucság, Rea. VI. Mehádia, Grebenácz. VII. Pregrada.

141. *Perthesii* Gorski (*festivum* Mocs.) — I. Budapest; in unico solum specimine inventus.

Didineis Wesm.

142. *lunicornis* Fabr. — I. Kisujszállás, Nagyvárad. II. Sz.-Endre. V. Nagyszeben. VII. Pregrada. Species ubique rara.

143. *Wüstneii* Handl. — I. Budapest, exemplar tantum unum.

144. *pannonica* Handl. — I. Nagyvárad, solum specimen unicum typicum inveni. Tantum Hungariam inhabitat.

145. *crassicornis* Handl. — II. Pariter tantum Hungariæ civis, exemplar unicum typicum ad Kopács (Com. Baranya) detectum est.

Mellinus Fabr.

146. *arvensis* Linn. — I. Budapest, Gödöllő, Kalocsa, Szeged. II. Zircz. III. Vallis ad Hermanetz, Lucski, Poprád, Alsó-Tátrafüred. V. Semesnye, Tusnád, VI. Grebenácz. VII. Zágráb, Klana, Pregrada. VIII. Buccari.

147. *sabulosus* Fabr. — I. Com. Bihar. III. Rózsahegy, Poprád, Alsó-Tátrafüred.

Gorytes Latr. Handl.

(*Gorytes* s. str.)

148. *mystaceus* Linn. — I. Budapest, Kalocsa. III. Koritnica. VI. Mehádia.

149. *campestris* Müll. — Budapest, Kalocsa, Nagyvárad. III. Trencsén, Poprád, Koritnicza. V. Mezőség. VI. Orsova.

(*Harpactes* Shuck.)

150. *elegans* Lep. (*Carcelii* Dhlb.) — I. Budapest. III. Trencsén. VI. Grebenácz, Deliblat.

151. *affinis* Spin. — I. Budapest, Péczel. VI. Mehádia, Deliblat.

152. *laevis* Latr. — I. Budapest, Kis-Szentmiklós, Péczel, Kecskemét, Nagyvárad. II. Simontornya, Boglár, Duna-Földvár. IV. Bodrog-Szög (Com. Zemplén), Vizsoly, Szobráncz. VI. Ulma. VII. Pregrada, Pétervárad.

(*Lestiphorus* Lep.)

153. *bicinctus* Rossi. — I. In Hungaria centrali ad Budapest rarus. VII. Pregrada.

154. *bilunulatus* Costa. — VI. Ad thermas Herculis sacras Mehadienses in unico solum specimine inventus.

(*Hoplisus* Lep.)

155. *ottomanus* Mocs. — I. Specimen unicum ex insula Csepel.

156. *punctulatus* Vanderl. — VI. Grebenácz, Deliblat. Rarus.

157. *latifrons* Spin. (*minutus* Mocs.) — I. Debreczen. IV. Szőllőske. VII. Klana. VIII. Fiume (Žakalj).

158. *consanguineus* Handl. — VIII. Buccari, Zengg, teste auctore. (59, 1888, pag. 422.)

159. *laticinctus* Shuck. — III. Ujbánya (Com. Bars), Trencsén, Rózsahegy. VI. Mehádia.

160. *quadrifasciatus* Fabr. — III. Ujbánya, Trencsén. V. Segesvár. VI. Korniaréva. VII. Zágráb, Klana.

v. *montivagus* Mocs. — III. In Hungaria septentrionali ad balneum Koritnicza detexi.

161. *planifrons* Wesm. — VI. Resicza. VIII. Orehovica. Rarus.

162. *dissectus* Panz. (*albidulus* Lep.) — I. Solum in Hungaria centrali observatus, ubi non est rarus.

163. *pleuripunctatus* Costa. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Kapornak. VI. Jassenova. VII. Dálya. VIII. Fiume (Žakalj), Buccari.

164. *quinquefasciatus* Panz. (*eburneus* Chevr., *anceps* Mocs.). — I. Budapest, Nagyvárad, Szeged. VI. Mehádia. VIII. Fiume, Orehovica, Buccari.

165. *procrustes* Handl. — VI. Mehádia et VII. Josephsthal (Josipdol) (teste handlirsch. 59, Vol. III. pag. 492). VIII. Cernik, Fiume.

166. *nigrifacies* Mocs. — I. Budapest, Csepel, Szeged. VI. Grebenácz. Ubique sat rarus.

167. *quinquecinctus* Fabr. — In omni zonarum regione observatus.

168. *sulcifrons* Costa. — I. Hucusque apud nos solum ad Budapest.

169. *Kohlii* Handl. — VIII. Tantum ad Fiume.

Entomosericus Dhlb.

170. *concinnus* Dhlb. — Exemplar unicum ex Hungaria, loco inventionis non adscripto. Teste Ant. Handlirsch specimen etiam ex Hungaria in Mus. Berolinensi.

Specius Dhlb.

171. *luniger* Eversm. — VIII. Fiume, Orehovica, ab A. Korlević collectus.

Stizus Latr.

172. *tridens* Fabr. — I. Budapest, Isaszeg, Kis-Szentmiklós, Dabas, Kecskemét, Kalocsa, Nagyvárad, Szeged. II. Tapolcza, Boglár, Duna-Örs. III. Érsekujvár. IV. Lelesz, S.-A.-Ujhely. V. Kocsárd, Segesvár, Nagyszeben. VI. Grebenácz, Jassenova. VII. Croatia (Handlirsch 59, Vol. VI. pag. 39). VIII. Carlopago.

173. *hungaricus* Friv. — I. Budapest, Kis-Szent-Miklós, Kecskemét, Kalocsa, Szeged. II. Kopács. IV. Szomotor, Páczin, Szőllőske. VI. Grebenácz. Solum Hungariæ civis.

174. *tridentatus* Fabr. (*bifasciatus* Jur.) — I. Nagyvárad, Szeged. VI. Ulma. Species rara.

175. *fasciatus* Fabr. (*integer* Fabr.). — VII. Secundum Ant. Handlirsch est etiam Croatiæ incola. (59, Vol. VI. pag. 117.)

176. *terminalis* Eversm. (*conicus* Germ. ?). — V. Hucusque solum in regione transsylvanica ad Szerdahely et Vízakna collectus.

177. *Perrisii* Duf. — In Hungaria centrali ad Csepel et Kecskemét.

Bembex Fabr.

178. *integra* Panz. (*tarsata* Latr.) — I. Budapest, Péczel, Dabas, Peszér, Kecskemét, Debreczen, Szeged. II. Siófok, Duna-Örs. VI. Jassenova. VIII. Carlopago.

179. *Megerlei* Dhlb. (*undata* Dhlb.?). — I. Budapest, Mátyásföld, Kalocsa, Kecskemét, Szeged. II. Siófok. IV. Szomotor, Páczin, Jassenova. VI. Grebenácz, Deliblat, Palics.

180. *rostrata* Linn. — I. Budapest, Isaszeg, Péczel, Peszér, Kecskemét, Kalocsa, Debreczen, Szeged. II. Kopács, Siófok, Duna-Örs. V. Szent-Erzsébet (Com. Szeben). VI. Grebenácz. VII. Raduć. VIII. Sušak.

181. *bidentata* Vanderl. — I. Budapest, Dabas, Peszér, Gyón, Kecskemét, Kalocsa. IV. Szomotor. VI. Grebenácz, Jassenova.

182. *mediterranea* Handl. (*glauca* Lep., *olivacea* Dhlb.). — I. Budapest, Péczel, Kis-Szentmiklós, Peszér, Kecskemét, Kalocsa, Szeged. VI. Ulma, Grebenácz.

183. *oculata* Latr. (*repanda* Latr., *Latreillei* Lep.). — I. Budapest, Kis-Szentmiklós, Kecskemét, Peszér. VI. Ulma, Grebenácz, Palics. VIII. Sušak, Vežica, Zengg, Portoré.

v. *pannonica* Mocs. — I. Budapest, Kis-Szent-Miklós.

Crabro Fabr. Kohl.

(*Rhopalum* Kirby.)

184. *coarctatus* Scop. (*tibialis* Fabr.). — I. Budapest. IV. Tolcsva. V. Nagyszeben.

185. *nigrinus* Kiesenw. (*Kiesenwetteri* A. Mor.). — I. Nagyvárad, Beél, II. Kopács.

(*Entomognathus* Dhlb.)

186. *brevis* Vanderl. — I. Budapest, Kalocsa, Nagyvárad. III. Trencsén, Rajecz. IV. Tokaj, Homonna, vallis ad Hermanetz. V. Zilah, Peér, Segesvár. VII. Pregrada. VIII. Orehovica.

(*Lindenius* Lep.)

187. *subaeneus* Lep. — I. Budapest, Kecskemét, Nagyvárad. III. Szliács. IV. Tolcsva, vallis ad Hermanetz, Homonna. V. S.-Sz.-György. VI. Mehádia. VII. Vrdnik. VIII. Buccari.

188. *Panzeri* Vanderl. — I. Budapest. II. Boglár. III. Koritnicza. IV. Homonna. VI. Grebenácz, Deliblat. VII. Diakovár. VIII. Buccari.

189. *armatus* Rossi. — IV. Hucusque tantum ad Szőllőske (Com. Zemplén).

190. *pygmaeus* Vanderl. — I. Budapest, Hadház. IV. Pásztó, Szomotor.

191. *albilabris* Fabr. — I. Budapest, Kisujszállás, Nagyvárad, Szeged. II. Boglár, Zircz. III. Trencsén, Koritnicza, balneum Lucski, Tátraháza. IV. Pásztó, S.-A.-Ujhely. V. Semesnye, Nagyszeben, Brassó. VI. Mehádia, Grebenácz, Jassenova, Gombos. VII. Pregrada, Kupinovo.

(*Coelocrabro* Thoms.)

192. *capitosus* Shuck. — I. Budapest. V. Nagyszeben.

193. *cinxius* Dhlb. — III. Specimen unicum ex Oravicza (Com. Árva).

194. *leucostoma* Linn. — III. Trencsén, prædium Emőd, Turcsek, Tátrafüred. V. Nagyszeben.

195. *cetratus* Shuck. — I. Budapest. III. Tátrafüred. IV. Homonna, Olyka. V. Brassó. VI. Mehádia.

196. *carbonarius* Dhlb. — III. Balneum Koritnicza. IV. Montes Beszkid. VI. Orsova. VII. Montes Karst.

197. *podagricus* Vanderl. — I. Budapest, Péczel, Nagyvárad. V. Peér. VI. Mehádia, Grebenácz. VIII. Orehovica.

(*Crossocerus* Thoms.)

198. *palmarius* Schreb. (*scutatus* Fabr.). — I. Csepel. IV. Tokaj.

199. *Wesmaelii* Vanderl. — I. Budapest, Kalocsa.

200. *varius* Lep. — III. Trencsén. IV. Tokaj. VI. Orsova.

201. *exiguus* Dhlb. — IV. Hucusque apud nos solum ad Ungvár.

202. *tirolensis* Kohl. — I. Budapest: Svábhegy. III. Rajecz, Tátrafüred. IV. Homonna, Sz.-Olyka. V. Brassó.

203. *elongatulus* Vanderl. (*obliquus* Shuck.). — I. Budapest, Nagyvárad, Laczháza. IV. Homonna, mons Vihorlat. V. Nagyszeben. VI. Korniaréva. VII. Pregrada, Stara Pazova. VIII. Buccari.

(*Hoplocrabro* Thoms.)

204. *quadrimaculatus* Fabr. — I. Budapest, Mátyásföld, Kalocsa, Tápió-Szele. V. Semesnye. VI. Mehádia. VIII. Fiume, Draga, Cirkvenica.

(*Blepharipus* Dhlb.)

205. *vagabundus* Panz. — I. Budapest, Szeged. III. Trencsén, Koritnicza, Poprád. IV. Mármaros. V. Tusnád, Nagyszeben. VI. Resicza. VII. Gospić. VIII. Orehovica.

206. *signatus* Panz. — V. Nagyszeben. VI. Mehádia.

207. *serripes* Panz. — I. Budapest. VII. Lokve. VIII. Orehovica, Buccari.

(*Thyreopus* Lep.)

208. *cribrarius* Linn. — I. Budapest, Kalocsa, Nagyvárad, Szeged. III. Nyitra, Trencsén, Koritnicza, Poprád, Tátrafüred. IV. Szobráncz, Mármaros. V. Magura, Búzamező, Tihucza, Tusnád, Szent-Erzsébet (Com. Szeben). VI. Apatin. VIII. Fiume.

209. *peltarius* Schreb. (*patellatus* Dhlb.). — I. Budapest, Mátyásföld, Csepel, Kalocsa, Mártonkáta. II. Siófok. III. Poprád. V. Nagyszeben. VI. Grebenácz.

210. *scutellatus* Scheven (*pterotus* Panz.). — I. Budapest. IV. Szomotor.

211. *ingricus* Mor. — VII. Specimen unicum e Mehádia.

212. *alpinus* Imh. — V. In alpibus Bucsecs. VII. Vaganski Vrh.

(*Anothyreus* Dhlb.)

213. *lapponicus* Zett. — III. Balneum Tátrafüred. IV. Montes Beszkid.

(*Solenius* Lep. A. Mor., *Ectemnius* Dhlb.)

214. *dives* Lep. — I. Budapest, Kalocsa, Nagyvárad, Szeged. II. Szombathely. III. Trencsén, Koritnicza. IV. Szőllőske, Homonna-Bresztó, Mármaros. V. Nagyszeben, Búzamező. VI. Mehádia, Resicza, Grebenácz. VII. Diakovár, Pregrada, Zágráb, Raduć. VIII. Sušak.

215. *spinicollis* H. S. — I. Isaszeg, Eger, Nagyvárad. IV. Nagymihály. V. Szucság, Tihucza. VI. Mehádia. VIII. Fiume, Draga, Orehovica, Buccari.

216. *rugifer* Dhlb. — I. Nagyvárad. III. Ujbánya. IV. S.-A.-Ujhely.

217. *guttatus* Dhlb. — III. Trencsén, Koritnicza, balneum Lucski, Lucsivna. V. Szucság, Tusnád. VI. Mehádia. VIII. Orehovica, Fužine.

218. *vagus* Linn. — Est species sui generis frequentissima.

219. *rubicola* Duf. — Hungaria septentrionalis. VIII. Sušak.

220. *microstictus* H. S. — III. Trencsén, Ujbánya. VI. Mehádia.

221. *fuscitarsis* H. S. — I. Budapest, Dabas, Nagyvárad. III. Trencsén. IV. Sárospatak. V. Transsylvania. VII. Zágráb. VIII. Buccari.

222. *meridionalis* Costa. — I. Budapest, Kalocsa. III. Nyitra. VIII. Sušak, Orehovica.

223. *spinipes* Mor. (*Bulsanensis* Kohl.). — I. Budapest. VI. Mehádia.

224. *lituratus* Panz. — I. Magyarpatak in montibus Bihariensibus. III. Trencsén. IV. Szöllőske. VIII. Draga, Orehovica.

(*Clytochrysus* A. Mor.)

225. *chrysostomus* Lep. (*lapidarius* Panz.). — I. Budapest, Nagyvárad, Beél, Szeged. III. Trencsén, Rajecz, Koritnicza, Poprád, Lucsivna. IV. Tolcsva, Bártfa, Mármaros. V. Nagyszeben. VI. Mehádia. VII. Zágráb, Pregrada. VIII. Fiume, Draga, Orehovica.

226. *sexcinctus* Fabr. — III. Koritnicza. VII. Lokve, Zágráb, Sljeme. VIII. Orehovica.

227. *cavifrons* Thoms. — I. Besnyő. III. Koritnicza, Lucsivna, Virágvölgy. IV. Mármaros. V. Kolozsvár. VI. Resicza. VII. Fužine, Mehádia. VIII. Orehovica, Draga.

228. *planifrons* Thoms. — I. Kecskemét. III. Koritnicza, Turcsek. V. Tihucza, Borszék, Kovászna. VII. Zágráb.

(*Crabro* s. str.)

229. *fossorius* Linn. — V. Balneum Előpatak. VI. Mehádia, Resicza, Ulma. VII. Pregrada, Zágráb. VIII. Orehovica, Draga.

230. *quadricinctus* Fabr. (*striatus* Dhlb.). — I. Budapest, Kalocsa, Oncsásza (Com. Bihar). II. Duna-Örs. V. Nagyszeben, Brassó. VI. Mehádia, Resicza. VIII. Sušak, Orehovica.

(*Thyreocerus* Costa.)

231. *crassicornis* Spin. — I. Complura specimina e Budapest.

(*Thyreus* Lep. H. S.)

232. *clypeatus* Linn. (*vexillatus* Panz.). — In omni zonarum parte observatus.

(*Ceratocolus* Lep.)

233. *subterraneus* Fabr. — I. Budapest, Mátyásföld. V. Torda. VI. Jassenova, Grebenácz, Zombor.

234. *alatus* Panz. — I. Budapest, Kis-Szentmiklós, Kalocsa, Szeged. VII. Raduć.

Fam. VESPIDAE.

Celonites Latr.

1. *abbreviatus* Vill. — VIII. Sušak, Cirkvenica, Novi, Buccari, Zengg.

v. *hungaricus* Mocs. — I. Solum in Hungaria centrali.

Discoelius Latr.

2. *Dufouri* Lep. — I. Budapest. IV. Szőllőske, Mármaros.

3. *zonalis* Panz. — I. Budapest, Kecskemét, Debreczen. IV. Mons Vihorlat. V. Semesnye. VI Mehádia. VIII. Orehovica, Buccari.

Eumenes Latr.

4. *Andréi* D. T. (*obscurus* André). — VII. Pregrada, Kupinovo. VIII. Fiume, Orehovica.

5. *arbustorum* Panz. — III. Trencsén. VII. Vaganski Vrh. VIII. Orehovica, Cirkvenica, Carlopago, Zengg.
   v. *dimidiata* Brullé. — I. Budapest: Gellért-et Sashegy.

6. *coarctata* Linn. — I. Budapest, Peszér, Kalocsa, Nagyvárad, Szeged. III. Trencsén, Szliács. V. Nagyfalu. VI. Mehádia, Ulma. VII. Vrdnik, Diakovár, Samobor, Pregrada. VIII. Fiume, Orehovica, Zengg.

7. *pomiformis* Fabr. — Est sui generis species vulgatissima.
   v. *bimaculata* André. — I. Peszér. VIII. Fiume, Sušak, Orehovica.

8. *mediterranea* Kriechb. — I. Budapest, Kalocsa, Kisujszállás. VII. Vrdnik, Pregrada. VIII. Fiume, Sušak, Orehovica, Buccari.

9. *unguiculata* Vill. (*coangustata* Rossi). — VI. Mehádia, Német-Bogsán, Grebenácz. VII. Vukovár, Vrdnik, Diakovár. VIII. Fiume, Orehovica, Cirkvenica, St-Giorgio, Carlopago, Buccari, Zengg.

Odynerus Latr.

10. *allobrogus* Sauss. — I. Rézbánya in montibus Bihar. III. Poprád, Koritnicza. VI. Mehádia.

11. *alpestris* Sauss. — I. Budapest: Svábhegy. VI. Grebenácz. VII. Vrdnik. VIII. Cirkvenica, Novi, St-Giorgio, Buccari.

12. *antilope* Panz. — III. Trencsén. IV. Bártfa, Mármaros, Zsadány (Com. Abauj).

13. *aurantiacus* Mocs. — I. Budapest, Kisujszállás, Szeged. Solum Hungariæ terram colit.

14. *bifasciatus* Linn. — III. Apud nos solum ad Trencsén.

15. *callosus* Thoms. — I. Budapest, Csepel, Debreczen, Szeged. IV. Bártfa, Szőllőske. V. Tusnád. VI. Mehádia, Deliblat. VII. Samobor, Vaganski Vrh. VIII. Draga, Zengg.

16. *Chevrierianus* Sauss. (*Dufourianus* Sauss.). — I. Budapest, Kalocsa. II. Pécs, Balatonfüred, Tapolcza. III. Ujbánya. VI. Mehádia. VII. Samobor, Kupinovo. VIII. Fiume, Sušak, Vežica.

17. *crassicornis* Panz. — In omni zonarum regione communis.

18. *Dantici* Rossi. — I. Budapest, Peszér, Kecskemét, Kisujszállás, Nagyvárad, Szeged. II. Pécs, Siófok, Boglár. III. Érsekujvár. VIII. Fiume, Orehovica, Carlopago, Zengg, Buccari.

19. *debilitatus* Sauss. — III. Ujbánya, Poprád. IV. Bártfa. V. Semesnye, Brassó, Tusnád. VI. Mehádia. VII. Pregrada.

20. *dubius* Sauss. — I. Budapest, Kisujszállás. IV. Tarczal. VIII. Sušak, Orehovica, Cirkvenica, St-Giorgio, Buccari.

21. *egregius* H. S. — VIII. Hucusque apud nos solum ad Orehovica.

22. *ephippium* Klug. — I. Budapest, Dorozsma. VIII. St-Giorgio, Buccari.

23. *exilis* H. S. — I. Nagyvárad. V. Nagyszeben. VI. Mehádia.

24. *femoratus* Sauss. — VIII. Apud nos tantum ad Fiume (Žakalj).

25. *floricola* Sauss. — I. Budapest. II. Pécs. VI. Orsova. VIII. Fiume, Orehovica, Vežica, Buccari.

26. *fuscipes* H. S. — VI. Hucusque solum e Mehádia.

27. *gazella* Panz. — VI. In monte Allion ad Orsova. VIII. Orehovica.

28. *germanicus* Sauss. — VII. Apud nos ad Pregrada.

29. *gracilis* Brullé (*elegans* H. S.). — I. Budapest. III. Ujbánya, Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Homonna, Szobráncz. V. Semesnye, Nagyszeben. VI. Mehádia, Orsova. VII. Zágráb, Samobor. VIII. Orehovica.

30. *graphicus* Sauss. — VIII. Hucusque tantum ex Orehovica.

31. *helvetius* Sauss. — I. Budapest, Nagyvárad. V. Nagyszeben. VI. Mehádia.

32. *Herrichii* Sauss. — I. Budapest, Péczel, Isaszeg, Nagyvárad, Szeged.

33. *hungaricus* André. — I. Budapest, Dabas. V. Dicső-Szentmárton (Com. Kis-Küküllő). VI. Mehádia, Grebenácz. VIII. Buccari. Solum Hungariæ incola.

34. *jucundus* Mocs. — I. Budapest, Péczel. IV. Tokaj. VI. Mehádia.

35. *laevipes* Shuck. (*simplicipes* H. S.). — I. Kalocsa, Nagyvárad, Szeged. III. Poprád, Oravicza, ad lacum Csorba, Alsó-Tátrafüred. V. Brassó. VI. Mehádia, Resicza, Orsova. VII. Montes Karst. VIII. Fiume, Sušak, Buccari.

36. *limbiferus* Mor. — VIII. Sušak, Cirkvenica, St-Giorgio, Buccari, Zengg.

37. *melanocephalus* Gmel. — In omni zonarum regione communis.

38. *minutus* Fabr. (*pictus* H. S.). — I. Budapest, Nagyvárad, Szeged. II. Boglár. III. K.-Lehota. VI. Jassenova, Ulma. VIII. Fiume, Orehovica, Buccari.

39. *nigripes* H. S. — I. Budapest, Kalocsa, Nagyvárad, Nagy-Károly. II. Pécs, Tapolcza, Kapornak. III. Koritnicza. IV. Tokaj, Homonna. V. Peér, Semesnye, Dicső-Szentmárton. VI. Rumunyest, Mehádia, Orsova, Resicza. VIII. Fiume, Sušak, Zengg.

40. *nugdunensis* Sauss. — I. Debreczen, Szeged. III. Ujbánya. IV. Homonna. V. Nagyszeben. VI. Rumunyest, Orsova. VII. Pregrada. VIII. Sušak, Draga, Orehovica.

41. *oviventris* Wesm. — III. Poprád, Koritnicza, lacus ad Csorba. VII. Sveto-Brdo. VIII. Carlopago.

42. *parietum* Linn. — Est sui generis species vulgatissima.

v. *auctus* Fabr. — VI. Hucusque tantum e Mehádia.

v. *renimacula* Lep. — I. Dabas, Kisujszállás, Nagyvárad, Szeged. II. Duna-Örs. Tapolcza. IV. Szőllőske, Forró, Szobráncz. VI. Mehádia, Jassenova. VII. Dálya. VIII. Sušak, Novi, Buccari.

v. *trifasciatus* Fabr. — III. Oravicza (Com. Árva). IV. Homonna, mons Vihorlat.

43. *parvulus* Lep. — I. Budapest, Farkasd, Nagyvárad, Szeged. II. Boglár. VI. Grebenácz. VII. Ruma, Gombos.

v. *orbitalis* Sauss. — I. Apud nos tantum ad Budapest.

44. *pictus* Curt. — I. Kalocsa, Peszér. III. Beszterczebánya, Koritnicza. V. Semesnye. VI. Mehádia, Korniaréva. VIII. Fiume.

45. *pubescens* Thoms. — III. In montibus Tátra. IV. Homonna, Mármaros. V. Borszék.

46. *posticus* H. S. — V. Nagyszeben. VI. Grebenácz.

47. *reniformis* Gmel. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Duna-Örs. III. Trencsén, Lucsivna. V. Hátszeg. VII. Pregrada.

48. *Rossii* Lep. — I. Nagyvárad. III. Trencsén. VII. Pregrada.

49. *rubripes* André. — V. Specimen unicum typicum cognitum e Transsylvania oritur.

50. *simplex* Fabr. — I. Budapest. III. Koritnicza. IV. Szőllőske, Bártfa. V. Peér, Előpatak, Tusnád.

51. *sinuatus* Fabr. — I. Kalocsa, Eger, Nagyvárad, Beél, Debreczen. III. Trencsén, Ujbánya, Rózsahegy, Poprád, Tátrafüred. V. Nagyszeben. VI. Mehádia, Resicza. VII. Diakovár, Pregrada, Zágráb.

52. *spinipes* Linn. — III. Poprád, Koritnicza. IV. Bártfa. V. Nagyszeben. VI. Mehádia.

53. *spiricornis* Spin. — I. Budapest, Péczel. VIII. Fiume.

54. *tomentosus* Thoms. — VIII. Hucusque apud nos ad Orehovica.

55. *transitorius* Mor. — I. Hucusque tantum ad Kisujszállás.

56. *trimarginatus* Zett. — VII. Tantum e Pregrada.

57. *viduus* H. S. — III. Trencsén. IV. Mons Vihorlat. VII. Zágráb.

58. *xanthomelas* H. S. — I. Budapest, Kalocsa, Kisujszállás, Nagyvárad. II. Pécs. III. Trencsén, Ujbánya. IV. S.-A.-Ujhely, montes Beszkid. V. Nagyszeben. VI. Mehádia.

Pterocheilus Klug.

59. *phaleratus* Panz. — I. Budapest, Palota, Mátyásföld, Kecskemét. VI. Szabadka, Deliblat.

v. *formosus* Friv. — VI. Tantum ad Grebenácz et Deliblat.

60. *terricola* Mocs. — I. Budapest. II. Adony. VI. Nagy-Kikinda, Ulma. VII. Dálya. Tantum Hungariæ terram colit.

Alastor Lep.

61. *atropos* Lep. — I. Budapest, non rarus. II. Siófok. VII. Zágráb.

Polistes Latr.

62. *gallica* Linn. — In omni parte regni communis.

v. *biglumis* Latr. (*diadema* Latr.). — Plerumque simul cum stirpe.

v. *bimaculata* Fourcr. — Sicuti prior, sed rarius.

Pseudovespa Schmied.

63. *austriaca* Panz. — III. Trencsén, balneum Lucski, Poprád, Lubló, Koritnicza. IV. Bártfa, Mármaros. V. Tusnád. In regionibus montanis.

Vespa Linn.

64. *orientalis* Linn. — VIII. A M. Padewieth ad Zengg collecta.

65. *crabro* Linn. — In omni zonarum regione inventa.

66. *media* Retz. — I. Budapest: Lipótmező. II. Pécs, Kőszeg. III. Znióváralja. IV. Mármaros. V. Búzamező, Tusnád. VI. Resicza. VII. Zágráb, Klana.

67. *germanica* Fabr. — Pariter in omni parte regni collecta.

68. *saxonica* Fabr. (*norvegica* Fabr.). — III. Trencsén, Szliács, Tátrafüred. IV. Mons Vihorlat. VI. Mehádia. VII. Montes Karst, Fužine.

69. *rufa* Linn. — I. Csepel. II. Zircz. III. Trencsén, Koritnicza, Tátrafüred. V. Nagyszeben, Tusnád. VI. Mehádia. VII. Pregrada, Fužine.

70. *sylvestris* Scop. (*holsatica* Fabr.). — III. Trencsén. V. Semesnye, Sepsi-Szt-György, Kovászna, Brassó. VI. Mehádia. VII. Vaganski Vrh, Fužine. VIII. Carlopago, Novi.

71. *vulgaris* Linn. — I. Péczel, prædium Apaj, Kalocsa, Nagyvárad, Szeged, Debreczen. II. Visegrád. III. Lucsivna, Tátra, Trencsén. V. Hátszeg, Semesnye, Brassó. VII. Montes Karst, Fužine. VIII. Cirkvenica.

Fam. APIDAE.

I. APIDAE GENUINAE SEU VERAE Mocs.

A) SOCIALES.

Apis Linn.

1. *mellifica* Linn. — In toto regno, regionibus alpinis exceptis, ubique colitur.
   v. *fasciata* Latr. et *ligustica* Spin. — Magis in regionibus calidis.

Bombus Latr.

2. *hortorum* Linn. — In omni parte regni collectus.
   v. *argillaceus* Scop. (*ligusticus* Spin.). — I. Szeged. V. Mezőség, Kolozsvár, Torda, Nagyszeben. VI. Orsova. VII. Zágráb. VIII. Fiume, Sušak, Draga, Orehovica.
   v. *ruderatus* Fabr. — Cum stirpe simul invenitur.

3. *subterraneus* Linn. (*Latreillelus* Kirby, *Apis (Bombus) maura* Christ). — I. Budapest, Nagyvárad. III. Trencsén, Poprád, Tátra. IV. S.-A.-Ujhely, Homonna, Nagymihály. V. Nagyszeben, Tusnád, mons Magura (Com. Kolozs). VI. Grebenácz. VII. Zágráb, Sljeme. VIII. Fiume.
   v. *borealis* Schmied. — V. Mons Magura. VI. Mehádia, Korniaréva. VII. Sljeme.

4. *distinguendus* Mor. — III. Oravicza (Com Árva), balneum Lucsivna (Com. Szepes).

5. *Gerstaeckeri* Mor.—V. In alpibus Transsylvaniæ: Retyezát et Galben.

6. *alpinus* Linn. — VI. Teste C. Dalla-Torre (Schmiedeknecht 175, pag. 340.) etiam in montibus Mehadiensibus inventus est; nobis tamen adhuc non obvius.

7. *vorticosus* Gerst. — I. Budapest, Peszér. V. Torda. Ubique rarus.

8. *Jonellus* Kirby (*Scrimshiranus* K.) — IV. Specimen unicum Corn. Chyzer ad pagum Szőllőske invenit.

9. *pratorum* Linn. — In totius regni montibus observatus.

10. *Derhamellus* K. (*Rajellus* K.) — In regionibus collinis et montanis frequens.

11. *hypnorum* Linn. — III. Tátrafüred. IV. Nagy-Károly. V. Nagyszeben, Brassó, Tusnád.

12. *alticola* Kriechb. — II. Kőszeg. III. Trencsén. IV. Mármaros. Species apud nos sat rara.

13. *silvarum* Linn. — In omni zonarum parte communis.

14. *arenicola* Thoms. — I. Budapest, Péczel; rarus. III. Lucsivna, Poprád, Alsó-Tátrafüred non rarus. V. Mons Magura (Com. Kolozs), Tihucza (Com. Besztercze-Naszód).

15. *agrorum* Fabr. (? *muscorum* Linn.). — In toto regno est species valde communis.
   v. *mniorum* Fabr. — VI. Ad thermas Herculis sacras Mehádienses, teste O. Schmiedeknecht. (175, pag. 344.)
   v. *pascuorum* Scop. — VIII. Fiume, teste Ant. Handlirsch in Musæo Aulico Vindobonensi. (60, pag. 218.)

16. *cognatus* Steph. Schmiedkn. — I. Budapest, Kisujszállás, Kalocsa, Szeged. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Szomotor, Sárospatak, Nagymihály. V. Torda. VI. Mehádia. VII. Zágráb. Pregrada.

17. *variabilis* Schmied. (*senilis* F. ex parte.). — In omni zonarum regione communis.
   v. *tristis* Seidl. et *notomelas* Schmiedkn. cum stirpe simul collectus.

18. *laesus* Mor. (*Mocsáryi* Kriechb.). — I. Budapest, Kalocsa, Dömsöd, Nagyvárad. II. Köszeg. IV. Szomotor, Páczin, Aszaló. V. Tasnád. VI. Jassenova, Deliblat, Nagy-Kikinda, Zombor, Ujvidék. VII. Gombos, Josefsthal in Mus. Aulico Vindob. teste Handlirsch. VIII. Zengg.

19. *mucidus* Gerst. — V. Nagyszeben, teste C. Henrich. (61, 1884, pag. 136.)

20. *fragrans* Pall. — I. Budapest, Peszér, Kalocsa, Debreczen, Szeged. II. Siófok, Tapolcza (Com. Zala), Balatonfüred. IV. S.-A.-Ujhely. VI. Jassenova, Ulma, Deliblat, Grebenácz.

21. *zonatus* Sm. (*apicalis* Mor., *Steveni* Rad.). — VI. Mehádia, Grebenácz, Deliblat.

22. *pomorum* Panz. — I. Budapest, Peszér, Dabas, Kalocsa, Kisujszállás, Nagyvárad, Debreczen. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Szomotor, Mármaros. V. Torda, Mezőség, Szucság, Sepsi-Szent-György, Nagyszeben. VI. Zombor.
   v. *elegans* Seidl. (*mesomelas* Gerst.). — I. Budapest. III. Oravicza, Rózsahegy, Koritnicza, Znióváralja. IV. Montes Beszkid. V. Magura, Nagyszeben.

23. *lapidarius* Linn. — Est species in toto regno sui generis vulgatissima.

24. *soroënsis* F. — I. Budapest; rarus. III. Trencsén, Pozsony, Poprád, Tátrafüred. IV. Szomotor. VIII. Fiume.

v. *Proteus* Gerst. — III. Solum in montibus ad balneum Koritnicza, Tátrafüred.

v. *collinus* Sm. — III. Lucsivna, Koritnicza. VI. Mehádia.

25. *mastrucatus* Gerst. — III. Trencsén, Poprád, Tátrafüred, Koritnicza. IV. Mármaros, Zboj et Orosz-Ruszka in montibus Beszkid. V Nagyszeben, Alpes Galben, Magura (Com. Kolozs). VI. Mehádia. VII. Josefstahl (Josipdol) (Handl), Fužine. VIII. Fiume.

26. *confusus* Schck. — I. Budapest, Péczel. II. Kapornak. IV. Homonna, Bresztó, Forró, Nagymihály. V. Nagyszeben. VI. Jassenova. VII. Pregrada, Zágráb.

v. *paradoxus* Dalla-Torre. — I. Péczel. II. Keszthelyi Hévvíz, Pécs. IV. Nagymihály. Páczin. V. Nagyszeben. VII. Pregrada.

v. *festivus* Hoffer. — I. Péczel. II. Keszthelyi Hévvíz. V. Nagyszeben. VII. Zágráb, Pregrada.

v. *infernalis* Mocs. — IV. In unico specimine ad Tokaj a C. Chyzer inventus. — Totus ater.

27. *terrestris* Linn. — In omni zonarum regione collectus.

v. *lucorum* Linn. — Cum stirpe simul.

B) SOLITARES.

a) *Pedilegidae* vel *Crurilegidae.*

Podalirius Latr.

(*Anthophora* Latr.)

28. *zonatulus* Sm. (*Habrophora zonatula* Sm.). — I. In Hungaria centrali inter Rákos-Keresztúr et Czinkota penes Budapest a H. Friese numerose collectus.

29. *quadrifasciatus* Vill. (*nidulans* Fabr.). — I. Budapest, Kalocsa, Peszér, Nagyvárad, Debreczen. IV. S.-A.-Ujhely, Szőllőske, Szomotor. V. Transsylvania. VI. Grebenácz, Jassenova, Ulma, Nagy-Kikinda, Zombor. VII. Dálya, Vukovár, Pregrada. VIII. Sušak, Pećine.

30. *garrulus* Rossi (*bombylans* Mocs.) — VI. Jassenova. VII. Pregrada. Sat rarus.

31. *albigena* Lep. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Kecskemét, Nagyvárad. IV. Tokaj. V. Vizakna, Dicső-Szentmárton. VI. Ulma. VII. Dálya, Vukovár, Vrdnik, Pregrada. VIII. Pećine.

32. *salviae* Mor. (*pipiens* Mocs.). — VI. Grebenácz, Ulma. VII. Vukovár, Stara Pazova. VIII. Fiume.

33. *magnilabris* Mor. — I. Budapest, Kisujszállás. II. Kapornak. VI. Jassenova. Ulma. VII. Vukovár. VIII. Fiume.

34. *bimaculatus* Panz. (*Saropoda rotundata* Panz.). — I. Budapest, Peszér, Kecskemét, Kalocsa. II. Siófok. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Szőllőske. V. Zilah. Mezőség. VI. Grebenácz. VII. Gombos, Pregrada.

35. *podagrus* Lep. (*tomentosus* Mocs.). — I. Budapest. VI. Deliblat. Species rara.

36. *pubescens* Lep. (*flabellifera* Lep.). — I. Budapest, Kalocsa, Peszér, Nagyvárad, Szeged. II. Pécs, Kopács, Nagy-Harsány, Duna-Örs. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Páczin. V. Tasnád, Nagy-Enyed, Erzsébetváros, Sepsi-Sz.-György, Nagyszeben. VI. Mehádia, Grebenácz. VII. Vukovár, Pétervárad, Pregrada.

37. *vulpinus* Panz. (*quadrimaculatus* Panz.). — I. Budapest, Szeged. II. Kapornak, Komárom-Tarján, Balatonfüred. III. Nyitra, Beszterczebánya, Szliács. IV. S.-A.-Ujhely, Orosz-Ruszka. V. Tasnád, Kolozsvár, Szucság, Torda, Erzsébetváros, Nagyszeben. VII. Zágráb, Pregrada, Vrdnik. VIII. Fiume.

38. *borealis* Mor. — I. Jászkisér (Com. Heves). V. Torda. Species sat rara.

39. *crinipes* Sm. — I. Budapest, Dabas, Peszér, Kecskemét, Kalocsa, Nagyvárad, Szeged. II. Mohács, Zircz, Pápa. IV. Szinna. VII. Ogulin. VIII. Fiume, Sušak, Draga, Orehovica, Zengg.

40. *robustus* Klug (*nigromaculatus* Luc.). — VI. Tantum e Mehádia. Species rara esse videtur.

41. *dispar* Lep. — I. Femina unica e Budapest.

42. *nigrocinctus* Lep. — VIII. Zengg. Ab A. Korlević inventus.

43. *Dufouri* Lep. (*dives* Dours.). — I. Budapest. VI. Mehádia. VIII. Fiume, Sušak, Vežica, Orehovica, Buccari.

44. *mucidus* Grib. — VI. Ad thermas Herculis sacras Mehadienses rarus.

45. *biciliatus* Lep. (*ventilabris* Mor.). — VI. Specimen unicum e Mehádia.

46. *retusus* Linn. (*aestivalis* Panz., *intermedius* Lep.). — I. Budapest, Dabas, Kecskemét, Kalocsa, Nagyvárad, Szeged. II. Duna-Örs, Szombathely. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj, Terebes, Homonna-Bresztó. V. Torda, Dicső-Szentmárton. VI. Grebenácz, Ulma. VII. Fužine. VIII. Fiume, Buccari.

v. *obscurus* Friese. — I. Apud nos ad Budapest.

47. *acervorum* Linn. (*pilipes* Fabr.). — Primis diebus veris in omni zonarum regione communis.

v. *nigripes* Friese. — VIII. Tantum ad Zengg.

48. *parietinus* Fabr. — I. Budapest, Peszér, Mártonkáta, Kecskemét. II. Mohács, Szombathely. III. Trencsén, Koritnicza, Poprád, Lucsivna, Tátrafüred. VII. Vrdnik.

v. *villosus* H. S. — I. Budapest, Mártonkáta. II. Tapolcza, Balatonfüred, Szombathely.

49. *furcatus* Panz. — I. Budapest, Kalocsa, Kecskemét, Nagyvárad, Szeged. II. Balatonfüred, Szegzárd. III. Trencsén, Virágvölgy. IV. Imreg, Homonna. V. Tasnád, Nagyszeben, Tusnád. VII. Zágráb, Pregrada, Lokve, Vrdnik. VIII. Fiume, Draga, Orehovica.

Eucera Scop.

(*Macrocera* Latr., *Tetralonia* Spin.)

50. *hungarica* Friese (*ruficollis* et *grandis* nob.).— I. Budapest, Peszér, Kecskemét, Kalocsa, Szeged. II. Siófok, Balatonfüred, Tapolcza, Komárom-Tarján, Keszthely. IV. Szomotor. VI. Jassenova, Grebenácz, Ulma. VII. Dálya.

51. *alternans* Brullé. — VIII. Fiume, Vežica.

52. *tricincta* Erichs. — I. Budapest, Kalocsa, Szeged, Szatymaz, Poroszló, Jászkisér. II. Lacus Fertő (Kolazy). IV. Vizsoly, Szomotor. VI. Baziás. VII. Dálya.

53. *armeniaca* Mor. (*glaucopis* Mocs.). — I. Jászkisér, Szeghalom. V. Torda, Vizakna.

54. *dentata* Klug. — I. Budapest, Peszér, Kecskemét, Nagyvárad, Szeged. II. Kopács. IV. Sátoralja-Ujhely, Szomotor, Tállya, Vizsoly. V. Tasnád, Semesnye, Segesvár, Sz.-Erzsébet. VI. Baziás, Grebenácz, Deliblat. VII. Dálya.

55. *graja* Eversm. — I. Budapest, Nagy-Kikinda. VI. Grebenácz, Deliblat, Kubin.

56. *pollinosa* Lep. (*fossulata* Mor., *adusta* Mocs.). — I. Budapest, Isaszeg, Csepel, Nagyvárad, Szeged. II. Kopács, Nagy-Harsány, Béllye. V. Tasnád. VI. Mehádia, Deliblat. VII. Kupinovo. VIII. Zengg.

57. *lyncea* Mocs. — V. Tasnád. VI. Deliblat. Solum Hungariæ incola.

58. *ruficornis* Fabr. — I. Budapest, Kisujszállás, Kis-Terenne (Com. Nógrád), Szeged. II. Mindszent (Com. Baranya). III. Nyitra, Szliács. IV. Szőllőske. V. Zilah, Tasnád, P.-Szarvad, Kis-Csür. VI. Deliblat. VII. Pregrada, Vrdnik, mons Velebit. VIII. Fiume.

v. *Bíróí* Mocs. — I. Kisujszállás. II. Vizsló (Com. Baranya). V. Tasnád. VI. Orsova, Deliblat.

59. *Dufouri* Pérez. — VIII. Apud nos tantum ad Fiume, teste H. Friese. (41, Vol. II. pag. 82.)

60. *acutangula* Mor. — VIII. Fiume, Zengg, teste H. Friese. (41, Vol. II. pag. 83.)

61. *salicariae* Lep. (*basalis* Mor.). — I. Budapest, Kalocsa, Nagyvárad, Kis-Terenne, Szőreg. II. Szegzárd, Kopács, Vizsló. III. Szliács. IV. Szőllőske, Tokaj. V. Semesnye, Segesvár, Vizakna, Sz.-Erzsébet, Nagyszeben. VI. Grebenácz, Orsova, Kazán. VII. Vrdnik, Pregrada, Josipdol. VIII. Fiume.

62. *nana* Mor. (*tenella* Mocs.) — I. Budapest, Kalocsa. II. Mindszent. IV. Szobráncz, Szőllőske. V. Tasnád, P.-Szarvad. VI. Grebenácz, Jassenova, Deliblat, Mehádia, Zenta. VIII. Fiume.

63. *scabiosae* Mocs. — I. Budapest, Nagyvárad, Szeged. II. Vizsló III. Nyitra, Szliács. V. Tasnád, Segesvár. VI. Jassenova, Grebenácz, Ujvidék, Kazán. VIII. Fiume. Solum Hungariæ civis.

64. *malvae* Rossi. — I. Budapest, Kalocsa, Kecskemét, Nagyvárad, Debreczen, Szeged. II. Pécs. IV. Kassa, Lelesz, Tokaj, Szomotor, Szőllőske, Szobráncz. V. Tasnád, Torda, Erzsébetváros. VI. Ulma, Grebenácz. VII. Dálya, Vukovár, Vrdnik, Pregrada. VIII. Fiume.

(*Eucera* in sp.)

65. *longicornis* Linn. — I. Budapest, Kalocsa, Kecskemét, Nagyvárad, Szeged. II. Duna-Örs. III. Trencsén, Homonna-Bresztó. IV. Bártfa, Sátoralja-Ujhely, Varannó, Kassa, Rozsnyó. V. Mezőség, Semesnye, Nagyszeben, Brassó. VI. Temesvár, Mehádia, Grebenácz, Ulma. VII. Fužine. VIII. Fiume, Sušak, Orehovica, Buccari.

v. *cincta* Friese. — In locis nonnullis simul cum stirpe, sed rarior.

66. *difficilis* Pérez. — I. Budapest, Kalocsa, Nagyvárad. II. Balatonfüred, Szombathely, Kőszeg. IV. S.-A.-Ujhely, Nagymihály, K.-Azar, Tokaj. V. Torda. VI. Mehádia, Jassenova. VII. Dálya, Eszék, Vukovár, Pregrada, Josipdol. VIII. Orehovica, Fuzine, Buccari, Zengg.

67. *interrupta* Baer (*semistrigosa* Dours). — I. Budapest, Kalocsa, Nagyvárad. II. Pécs, Siófok, Keszthely, Balatonfüred. IV. S.-A.-Ujhely, Szomotor, Nagymihály. V. Marosvásárhely, Segesvár, Nagyszeben. VI. Jassenova, Grebenácz. VII. Deliblat, Dálya, Eszék, Vrdnik, Pregrada. VIII. Fiume, Orehovica, Buccari.

68. *nitidiventris* Mocs. — I. Budapest, Csepel; non rara, Szeged. VIII. Fiume.

69. *parvicornis* Mocs. — I. Budapest, Péczel, Csepel, Kecskemét, Nagyvárad. II. Balatonfüred. VI. Jassenova, Deliblat.

70. *dalmatica* Lep. (*dubia* Sich., *echii* Mocs.). — VI. Jassenova, Deliblat, Kubin.

71. *clypeata* Erichs. (*punctilabris* Lep.). — I. Budapest, Kalocsa, Kecskemét, Ecseg, Poroszló (Com. Heves), Mező-Kovácsháza. II. Balatonfüred. IV. Megyaszó, Szomotor, Nagy-Károly. VI. Orsova, Jassenova, Grebenácz. VII. Dálya, Eszék, Pregrada. VIII. Fiume.

72. *puncticollis* Mor. (? *seminuda* Brullé.). — VI. Specimen unicum e Baziás.

73. *similis* Lep. — I. Nagyvárad. II. Pécs, in Musæo Aulico Viennensi, sec. H. Friese (41, Vol. II. pag. 125.). VI. Orsova.

74. *nigrifacies* Lep. (*sedula* Mocs.). — I. Budapest, Kisujszállás, Jászkisér. III. Nyitra. V. Semesnye. VI. Jassenova, Deliblat, Rara.

75. *caspica* Mor. — VIII. Fiume, Sušak.
v. *Pérezi* Mocs. (*amplitarsis* et *tarsata* Mocs.). — I. Budapest. IV. Tokaj.

76. *curvitarsis* Mocs. — I. Budapest, Péczel, Isaszeg.

77. *excisa* Mocs. — I. Dabas. VI. Jassenova. VII. Dálya. Solum Hungariam inhabitat.

78. *seminuda* Brullé (*paradoxa* Mocs.). — I. Budapest, Péczel. II. Mohács. VI. Jassenova.

79. *cinerea* Lep. — I. Budapest, Mátyásföld, Kalocsa, Peszér, Mártonkáta, Kecskemét. V. Nagyszeben. VI. Jassenova, Grebenácz, Deliblat, Baziás.

80. *parvula* Friese. — VIII. Secundum auctorem apud nos solum ad Fiume. (41, Vol. II. pag. 158.)

81. *chrysopyga* Pérez (*favosa* Mocs.). — I. Budapest, Csepel, Peszér, Kalocsa, Kecskemét, Debreczen. II. Siófok, Béllye. IV. Szomotor. V. Peér, Nagyszeben. VI. Mehádia, Temesvár, Jassenova, Deliblat. VII. Dálya, Eszék, Pregrada, Diakovár.

82. *hispana* Lep. (*pannonica* Mocs.). — I. Budapest, Péczel, Jászkisér, Kalocsa, Szeged. IV. S.-A.-Ujhely. V. Torda. VI. Grebenácz.
v. *tomentosa* Dours (*spectabilis* Mocs.). — I. Budapest, Kalocsa, Nagyvárad, Debreczen. II. Pécs. V. Torda. VI. Jassenova, Grebenácz, Deliblat.

Meliturga Latr.

83. *clavicornis* Latr. — I. Budapest, Mátyásföld, Jászkisér, Szeged. II. Szaik (Com. Baranya), Szombathely. III. Nyitra. IV. Szomotor, Tokaj, Vizsoly, Homonna. V. Peér, Torda, Szucság, Segesvár, Sz.-Erzsébet. VI. Grebenácz, Deliblat. VII. Dálya, Pregrada, Vrdnik. VIII. Fiume.

Xylocopa Latr.

84. *cyanescens* Brullé. — I. Budapest, Isaszeg, Mártonkáta. II. Tapolcza. VIII. Fiume, Sušak, Orehovica, Buccari, Zengg.

85. *violacea* Poda Gerst. — I. Budapest, Kalocsa, Nagyvárad, Szeged. II. Pécs, Szombathely, Tapolcza. III. Nyitra, Trencsén, Pozsony, Igló. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj, Erdőbénye, Kassa, Rozsnyó. V. Tasnád, Mezőség, Nagyszeben. VI. Mehádia. VII. Fužine. VIII. Sušak, Orehovica, Draga, Novi.

86. *valga* Gerst. — I. Budapest, Kalocsa, Nagyvárad, Beél, Debreczen. II. Pécs. III. Szliács, Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Szomotor, Tokaj, Homonna. V. Kolozsvár, Szucság, Semesnye, Segesvár, S.-Szt-György, Nagyszeben. VI. Mehádia, Grebenácz. VII. Dálya, Vukovár, Pregrada, Raduć. VIII. Draga, Orehovica, Pećine, Buccari, Zengg.

Ceratina Latr.

87. *cucurbitina* Rossi (*albilabris* F.). — VI. Orsova, Mehádia, Deliblat. VII. Pregrada. VIII. Fiume, Sušak, Cirkvenica, Vežica, Buccari, Portoré.

88. *chalcites* Germ. (*egregia* Gerst., *chrysomalla* nob.). — I. Gúth (Com. Szabolcs). VI. Jassenova. Species apud nos valde rara.

89. *cyanea* K. — I. Budapest, Péczel, Kecskemét, Kalocsa, Szeged. II. Kopács. III. Trencsén. IV. Homonna. V. Tusnád, Nagyszeben. VI. Orsova, Baziás, Jassenova, Deliblat. VII. Diakovár. VIII. Fiume, Cirkvenica, Buccari.
v. *nigrolabiata* Friese. — I. Budapest: Gellérthegy.

90. *acuta* Friese. — I. Budapest: Gellérthegy, Kecskemét. VIII. Zengg, Carlopago.

91. *callosa* Fabr. (*Loewii* et *hungarica* nob.). — I. Budapest, Kecskemét, Nagyvárad, Szeged. III. Szliács. IV. S.-A.-Ujhely, Szőllőske, Forró. V. Nagyfalu, Torda, Nagyenyed, Erzsébetváros, Nagyszeben, Dicső-Szentmárton. VI. Mehádia, Oravicza, Jassenova, Kazán. VII. Dálya, Pregrada, Pétervárad. VIII. Orehovica, Vežica, Buccari.

92. *gravidula* Gerst. — I. Specimina duo ad Budapest: Zugliget, Fáczány inveni.

93. *nigroaenea* Gerst. — VII. Zágráb. VIII. Fiume.

Macropis Fabr.

94. *labiata* Panz. — I. Budapest, Kecskemét, Rév. II. Pécs. III. Trencsén, Tátrafüred. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj, montes Beszkid, Vihorlat. V. Zilah, Szucság. VI. Mehádia, Resicza. VII. Diakovár. VIII. Fiume, Orehovica.
v *fulvipes* Fabr. — I. Budapest, Kecskemét, Szeged. II. Kőszeg. III. Tátrafüred. IV. Szobráncz. V. Zilah. Species apud nos præcedenti rarior.

95. *Frivaldszkyi* Mocs. — I. Budapest, Kecskemét. II. Pécs. VI. Mehádia, Oravicza, Jassenova. VII. Vrdnik. VIII. Fiume, Orehovica, Buccari. Solum Hungariæ incola.

Systropha Latr.

96. *curvicornis* Scop. — I. Budapest, Peszér, Kecskemét, Kalocsa, Nagyvárad, Szeged. II. Kapornak, Pécs, Nagy-Harsány. III. Szliács, Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Szomotor, Homonna. V. Semesnye, Erzsébetváros, S.-Szt-György, Segesvár, Nagy-Csür, Brassó. VI. Mehádia, Grebenácz, Jassenova, Deliblat, Baziás. VII. Dálya, Vukovár, Pregrada, Diakovár, Velebit. VIII. Fiume, Sušak.

97. *planidens* Gir. — I. Budapest, Jászkisér, Nagyvárad. II. Pécs, Balatonfüred. III. Szliács, Beszterczebánya. IV. Tolcsva, Homonna, Rokitó, Nagymihály. V. Torda, Brassó. VI. Jassenova. VII. Dálya.

Melitta K.

(*Cilissa* Leach).

98. *haemorrhoidalis* Fabr. — I. Budapest, Budakesz, Nagyvárad. III. Poprád, Tátrafüred. V. Tihucza. VI. Mehádia. VII. Vrdnik, Zágráb. VIII. Fiume.

99. *melanura* Nyl. — I. Budapest, Rákospalota, Péczel. II. Villány. III. Trencsén. IV. Bereczki. V. S.-Szt-György. VI. Mehádia. VII. Pregrada, Samobor. VIII. Orehovica.

100. *leporina* Panz. (*tricincta* Kirby). — Est species sui generis vulgatissima.

101. *dimidiata* Mor. v. *hungarica* Mocs. — I. Budapest, Rákospalota. IV. Tokaj. V. Torda. VIII. Fiume.

102. *budensis* Mocs. — I. Solum Hungariæ incola, species in montibus ad Budapest rara.

Dasypoda Latr.

103. *plumipes* Panz. (*hirtipes* Auct.). — I. Budapest, Kalocsa, Nagyvárad, Szatmár. II. Simontornya, Zircz. III. Trencsén, Nyitra. IV. Szomotor, Szőllőske. V. Transsylvania. VI. Korniaréva, Grebenácz, Jassenova, Deliblat, Ujvidék. VII. Pregrada, Samobor, Pétervárad. VIII. Fiume.

104. *distincta* Rossi. — Hungaria centralis et meridionalis (Croatia, teste Schletterer 173, pag. 40.); nobis tamen adhuc non obvia.

105. *argentata* Panz. — I. Budapest, Rákos, Csepel, Kalocsa. VI. Grebenácz, Jassenova.

v. *braccata* Eversm. — I. Péczel, Peszér, Dabas, Mártonkáta, Nagyvárad, Szeged. VI. Grebenácz, Deliblat, Nagy-Kikinda.

106. *Thomsoni* Schlett. — I. Budapest, Peszér, Dabas, Nagyvárad. Species ubique sat rara.

Panurgus Panz.

107. *Banksianus* K. (*ater* Panz.). — III. Rózsahegy, Lucsivna, Poprád, Uj-Tátrafüred. IV. Vihorlat, Mármaros, Orosz-Ruszka. V. Tihucza. Solum in regionibus montanis.

108. *siculus* Mor. — VI. Specimen unicum e Mehádia in Mus. Aulico Viennensi, teste H. Friese (45, pag. 88.)

109. *calcaratus* Scop. (*lobatus* Panz.). — I. Budapest, Peszér, Nagyvárad, Szeged. II. Kőszeg, Zircz. III. Szliács, Beszterczebánya, Trencsén, Poprád. IV. S.-A.-Ujhely, Szőllőske, Szomotor, Tokaj, Varannó. V. Tasnád, Szucság, Hátszeg, Búzamező, Tusnád. VI. Grebenácz, Palics. VII. Pregrada, Zágráb, Klana, Velebit, Vaganski Vrh. VIII. Fiume.

Camptopeum Spin.

110. *frontale* Fabr. (*Panurgus fasciatus* Gir.). — I. Budapest, Gödöllő. II. Sárbogárd. IV. Szomotor, Szőllőske, Tokaj. V. Semesnye, Nagy-Enyed, Vizakna. VI. Mehádia, Grebenácz, Jassenova, Deliblat, Palics, Zombor, Nagy-Kikinda, Ujvidék. VII. Pregrada. VIII. Fiume.

111. *Friesei* Mocs. — I. Kalocsa. V. Peér. VI. Deliblat. Solum Hungariæ civis.

Rhophites Spin.

112. *quinquespinosus* Spin. — In omni zonarum regione observatus.

113. *canus* Ev. — I. Budapest, Kalocsa. III. Trencsén, Poprád. IV. Szomotor, Szőllőske, Tokaj, Homonna, Szobráncz. V. Tasnád, Kolozsvár, Semesnye, Torda, S.-Szt-György, Tihucza. VI. Mehádia, Jassenova, Rékás. VII. Vrdnik.

Halictoides Nyl.

114. *dentiventris* Nyl. — I. Budapest. II. Nagy-Harsány. III. Koritnicza, Tátrafüred. IV. S.-A.-Ujhely, Tolcsva. V. Semesnye, Tihucza, Nagy-Szeben. VII. Raduć. VIII. Buccari.

115. *inermis* Nyl. — I. Budapest. II. Nagy-Harsány (Com. Baranya). IV. S.-A.-Ujhely, Erdőbénye, Szobráncz. V. Nagyszeben.

Dufourea Lep.

116. *halictula* Nyl. — I. Ad Budapest aliquot specimina invenit H. Friese.

117. *vulgaris* Schck. — I. Budapest (Friese). III. Trencsén, Rajecz, Alsó-Tátrafüred. IV. Vihorlat, Runyina. V. Tihucza (Com. Besztercze-Naszód).

Panurginus Nyl.

118. *labiatus* Eversm. — I. Sashegy penes Budapest (Coll. Mayri). II. Boglár. III. Szliács non rarus. VI. Baziás.

Nomia Latr.

119. *femoralis* Pall. (*difformis* Panz.). — I. Budapest, Palota, Péczel, Szeged. VI. Grebenácz, Jassenova, Deliblat, Palics, Zombor. V. Szerdahely (Com. Szeben). VII. Pregrada. Species ubique sat rara.

120. *ruficornis* Spin. — I. Budapest, Kalocsa, Poroszló (Com. Heves), Szeged. II. Siófok, Beremend (Com. Baranya). V. Torda, Vizakna. VI. Grebenácz, Deliblat, Palics. VII. Vukovár, Zágráb. VIII. Orehovica, St-Giorgio, Zengg.

121. *diversipes* Latr. (*hungarica* Först.). — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa, Szeged. IV. Szomotor, Szőllőske, Tokaj. VI. Grebenácz, Jassenova. VII. Dálya, Gombos. VIII. Cirkvenica, Portoré, Zengg.

Colletes Latr.

122. *cunicularius* Linn. — I. Budapest, Kalocsa, Algyő. II. Duna-Örs. IV. Szőllőske, Szomotor. V. Nagyszeben. VI. Grebenácz.

123. *nasutus* Sm. — I. Budapest, Peszér, Debreczen. II. Siófok, Hidja (Com. Tolna), Duna-Örs, Szombathely. III. Szliács, Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Szomotor. V. Erzsébetváros, Segesvár. VI. Jassenova, Deliblat. VII. Dálya, Vukovár, Gombos, Pétervárad.

124. *niveofasciatus* Dours. — I. Budapest, Farkasd; rarus. VIII. Fiume, Zengg.

125. *punctatus* Mocs. — I. Péczel, Isaszeg, Kis-Szentmiklós. V. Peér. VI. Jassenova. VII. Ruma. Solum Hungariæ civis.

126. *caspicus* Mor. — I. Budapest: Svábhegy; rarus. VIII. Fiume.

127. *frigidus* Pérez. — I. In Hungaria centrali ad Budapest: Sashegy unicum tantum specimen inventum.

128. *hylaeiformis* Ev. — I. Budapest, Péczel, Peszér, Kisujszállás, Nagyvárad, Szeged. II. Kapornak, Érsekujvár. V. Tasnád. VI. Grebenácz, Jassenova, Palics.

129. *marginatus* Sm. — I. Budapest, Csepel, Rákos-Keresztúr.

130. *fodiens* Fourcr. — I. Budapest. V. Nagyszeben. VII. Pregrada. VIII. Orehovica.

131. *floralis* Ev. — V. Transsylvania. VII. Pregrada. VIII. Vežica, Fiume.

132. *picistigma* Thoms. — I. Budapest, Peszér, Nagyvárad. II. Szombathely. V. Tasnád. VI. Oravicza, Mehádia, Resicza, Grebenácz. VII. Dálya, Vrdnik.

133. *Davesianus* K. — I. Budapest, Péczel, Nagyvárad. III. Trencsén, Poprád, Beszterczebánya. IV. Homonna. V. Nagyfalu, Marosvásárhely. VI. Korniaréva, Grebenácz, Palics, Berzászka.

134. *succinctus* Linn. — I. Budapest. IV. Szomotor. VI. Oravicza. VII. Zágráb, Pregrada. VIII. Fiume, Orehovica, Buccari, Zengg.

Biareolina Dours.

135. *neglecta* Dours (*Andrena liburnica* Friese). — I. Szeged. VII. Diakovár. VIII. Fiume, Sušak, Draga, Lopača.

Anthrena Fabr.

(*Andrena* Auct.)

136. *morio* Brullé (*holomelaena* Lep.). — I. Budapest, Péczel, Isaszeg, Kis-Szentmiklós, Peszér, Kecskemét, Kisujszállás, Kalocsa, Dabas, Szeged. II. Kapornak. III. Érsekujvár, Nyitra. IV. Tokaj. VI. Ulma, Grebenácz, Nagy-Kikinda, Apatin, Palics. VIII. Fiume.

137. *ephippium* Spin. (*Lepeletieri* Luc.). — II. Hucusque solum ad Kapornak.

v. *dilecta* Mocs. — I. Budapest, Mátyásföld, Péczel, Dabas, Kecskemét, Kalocsa. II. Sárbogárd. VI. Deliblat, Jassenova.

138. *pyrrhopygia* Kriechb. — VI. Solum ad Deliblat collecta.

139. *carbonaria* Linn. (*pilipes* Fabr.). — I. Budapest, Peszér, Kalocsa, Kecskemét, Kisujszállás, Nagyvárad, Debreczen, Szeged. II. Duna-Örs. IV. Nagymihály. V. Zilah. VI. Ulma, Grebenácz, Jassenova, Deliblat. VII. Kupinovo.

140. *nasuta* Gir. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa, Nagyvárad, Szeged. II. Mohács, Szombathely. III. Trencsén. IV. Szomotor, Páczin. VI. Mehádia, Ujvidék. VII. Dálya, Vukovár.

141. *cineraria* Linn. — I. Budapest, Kis-Szent-Miklós. II. Tapolcza. III. Trencsén, Oravicza (Com. Árva), Rajecz. IV. S.-A.-Ujhely, Szőllőske, Szomotor, Nagymihály, Kassa. V. Tihucza, Nagyszeben, Brassó. VI. Mehádia, Resicza. VII. Raduć. VIII. Sušak.

142. *fumipennis* Schmiedkn. — VI. Mehádia. VII. Raduć. Species rara.

143. *Flessae* Panz. — III. Trencsén. VIII. Fiume, Sušak. Apud nos rara esse videtur.

144. *thoracica* Fabr. — I. Budapest, Peszér, Kecskemét, Kalocsa, Mártonkáta, Szeged, Parád. II. Duna-Örs. III Nyitra, Érsekujvár, Oravicza. IV. Szomotor. V. Mezőség, Erzsébetváros, Borgo-Prund (Com. Beszterce-Naszód), Nagyszeben, Brassó. VI. Ulma, Jassenova, Palics. VII. Fužine, Raduć. VIII. Fiume, Draga, Sušak, Orehovica, Lopača.

145. *pectoralis* Schmied. — I. Budapest, Kalocsa,

Kisujszállás, Szeged. II. Tapolcza. III. Lucsivna. IV. S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Tokaj. V. Tasnád. VI. Jassenova, Palics. VII. Pregrada, Kupinovo, Fužine. VIII. Buccari.

146. *nitida* Fourcr. — I. Budapest, Kalocsa, Nagyvárad, Debreczen. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Szomotor, Nagymihály. V. Nagyszeben. VI. Jassenova. VIII. Draga, Lopača.

147. *Lichtensteinii* Schmied. — VIII. Fiume, Orehovica.

148. *ovina* Klug (*pratensis* Nyl.). — I. Budapest, Kalocsa. III. Trencsén. IV. Szomotor, Szőllőske.

149. *albicans* Müll. (*haemorrhoa* F.). — I. Budapest, Kalocsa, Szeged. III. Trencsén, Oravicza. IV. S.-A.-Ujhely, Czéke, Szőllőske, Nagymihály, Vihorlat, Homonna. V. Nagyszeben. VII. Ogulin. VIII. Sušak, Lopača.

150. *tibialis* K. — I. Budapest, Kalocsa, Nagyvárad, Szeged. II. Duna-Örs, Szaik (Com. Baranya). III. Szliács, Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj, Szomotor, Nagymihály, Szobráncz. V. Kolozsvár, Torda. VI. Oravicza, Mehádia. VII. Ogulin. VIII. Draga, Zengg.

151. *Morawitzii* Thoms. — I. Budapest. II. Duna-Örs. IV. Szőllőske, Szomotor. VIII. Fiume.

v. *Páveli* (Mocs.) Schmied. — I. Budapest. II. Duna-Örs, Babarcz (Com. Baranya). VI. Mehádia, Resicza. VIII. Draga. Solum Hungariæ civis.

152. *nigroaenea* K. — I. Budapest, Szeged. II. Ácsi-erdő (Com. Komárom). IV. Simonka. VIII. Sušak, Draga, Orehovica.

153. *Trimmerana* K. — I. Budapest, Péczel. IV. S.-A.-Ujhely, Nagymihály, Gálszécs, Szőllőske. VI. Mehádia. VIII. Draga, Lopača.

154. *suerinensis* Friese (*chalybea* Pérez). — I. Budapest, Csepel; non rara.

155. *bimaculata* K. — I. Budapest. IV. Szomotor. VII. Zágráb. VIII. Sušak, Draga, Lopača.

156. *apicata* Sm. — I. Budapest. IV. Szőllőske. VIII. Fiume, in valle Draga.

157. *fulvago* Christ. — I. Budapest. IV. Tolcsva. V. Nagyszeben. VI. Mehádia.

158. *sisymbrii* Friese. — I. Tantum Hungariæ centralis propria, ubi sat rara est.

159. *humilis* Imh. (*fulvescens* Sm.). — I. Budapest, Nagyvárad. II. Duna-Örs. III. Trencsén, Oravicza, Lucsivna. IV. Tokaj, Simonka, Terebes, Mármaros. V. Tihucza, Nagyszeben, Brassó. VI. Mehádia. VII. Raduć. VIII. Sušak.

160. *taraxaci* Gir. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa, Nagyvárad, Szeged. II. Szegzárd, Tapolcza, Duna-Örs. IV. Tokaj, Varannó, Szőllőske, Nagymihály. VII. Zágráb. VIII. Fiume, Draga.

161. *symphyti* Schmied. — I. Budapest, Nagyvárad. VI. Mehádia. VIII. Fiume, Orehovica.

162. *rufo-hispida* Dours. — I. Budapest; rara. IV. S.-A.-Ujhely. VIII. Fiume, Sušak.

163. *Gwynana* K. (*aestiva* Sm.). — I. Budapest, Kalocsa. III. Trencsén, Szliács, Koritnicza, Rozsnyó. IV. Szomotor. V. Nagyszeben. VI. Mehádia, Resicza. VII. Fužine, Ogulin. VIII. Sušak, Orehovica, Lopača.

164. *rufula* Schmied. — I. Budapest. VI. Mehádia. VIII. Sušak, Vežica, Draga, Lopača.

165. *parviceps* Kriechb. —VIII. Secundum H. Friese ad Fiume non rara.

166. *Jullianii* Schmied. — I. Budapest; sat rara. VIII. Sušak, Draga, Orehovica, Buccari.

167. *croatica* Friese. — VII. Martinšćica. VIII. Sušak, Draga, Orehovica, Buccari; non rara.

168. *rufitarsis* Zett. (*ruficrus* Nyl.). — I. In Hungaria centrali ad Budapest valde rara.

169. *praecox* Scop. — I. Budapest, Szeged. III. Trencsén, Oravicza. IV. S.-A.-Ujhely, Gálszécs, Nagymihály, Szomotor, Szőllőske. V. Transsylvania. VIII. Fiume, Draga, Lopača.

170. *mitis* Schmied. — I. Budapest, Kalocsa. VIII. Fiume; non rara.

171. *varians* K. (*helvola* L., *mixta* Schck). — I. Budapest, Kalocsa, Szeged. III. Trencsén. IV. Nagymihály, Rabaszkala.

172. *lapponica* Zett. — IV. Hucusque solum ad Rabaszkala in montibus Beszkid inventa.

173. *fucata* Sm. — I. Budapest. IV. Vihorlat, Rabaszkala, Orosz-Ruszka. VI. Mehádia. VII. Fužine.

174. *hystrix* Schmied. — Secundum auctorem species etiam Hungariam inhabitat (175, Vol. I.). pag. 618.

175. *bucephala* Steph. (*longipes* Sm.). — I. Budapest, in montibus sat rara. VI. Resicza.

176. *albicrus* K. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Duna-Örs. III. Érsekujvár. IV. Szomotor. VI. Mehádia, Orsova, Grebenácz.

177. *tenuis* Mor. — I. Budapest, Kis-Tarcsa.

178. *parvula* K. — I. Budapest, Nagyvárad, Szeged. II. Visegrád. III. Trencsén. IV. Homonna-Bresztó. V. Nagyszeben. VI. Mehádia, Baziás. VII. Pregrada, Samobor. VIII. Sušak, Draga, Orehovica, Zengg.

179. *minutula* K. — I. Budapest. IV. S.-A.-Ujhely. VII. Ogulin. VIII. Sušak.

180. *bisulcata* Mor. — I. Budapest, Kis-Tarcsa. II. Boglár, Duna-Örs. IV. Szomotor. Sat rara.

181. *figurata* Mor. — VIII. Fiume, Orehovica.
182. *floricola* Eversm. — I. Budapest, Szeged. VI. Mehádia. Species ubique rara.
183. *nana* K. — I. Budapest. III. Trencsén. IV. Szőllőske. V. Tasnád, Nagyszeben. VIII. Fiume, Draga.
184. *niveata* Friese. — I. Budapest, Kis-Tarcsa. IV. Szomotor.
185. *aeneiventris* Mor. — I. Budapest, Kalocsa, Szeged. II. Pécs, Mindszent (Com. Baranya). VI. Jassenova. VII. Gombos. VIII. Fiume.
186. *sericata* Imh. — I. Budapest, Szeged. II. Duna-Örs. IV. Szőllőske. VII. Zágráb.
187. *ventralis* Imh. — I. Budapest, Csepel, Kalocsa, Szeged. II. Duna-Örs. III. Trencsén. IV. Szőllőske, Varannó, Nagymihály. V. Tasnád, Nagyszeben. VI. Mehádia. VII. Zágráb.
188. *cyanescens* Nyl. — I. Budapest, Nagyvárad, Szentes. II. Visegrád, Beremend (Com. Baranya). IV. Nagy-Károly. V. Tasnád, Nagyszeben. VI. Mehádia. VIII. Draga, Lopača.
189. *marginata* Fabr. *(Cetii* Schrk). — I. Budapest, Péczel, Peszér, Szeged. II. Nagy-Harsány (Com. Baranya). III. Nyitra, Alsó-Tátrafüred. IV. Szőllőske. V. Tasnád, Nagyszeben. VI. Tusnád, Jassenova, Grebenácz. VII. Pregrada, Samobor. VIII. Fiume.
190. *eximia* Sm. — I. Budapest, Kalocsa. II. Lacus Fertő (Giraud). IV. Szőllőske, Varannó. V. Nagyszeben. VI. Resicza.
191. *dragana* Friese. — VIII. A H. Friese ad Fiume detecta.
192. *grossa* Friese. — VIII. Ad Sušak specimen tantum unicum ab auctore inventum.
193. *ferox* Sm. — I. Budapest. VI. Mehádia, Resicza. Species ubique rara.
194. *decorata* Sm. *(Magrettiana* Schmiedkn.) — I. Budapest, Csepel, Péczel. II. Prædium ad Harkály, Duna-Örs (Com. Komárom). Species rara.
195. *florea* Fabr. *(rubricata* Schck.). — I. Budapest, Peszér, Nagyvárad, Rév. II. Szombathely. III. Rozsnyó. IV. Szőllőske, Szomotor, B.-Szög. V. Nagy-Vízvölgy (Com. Hunyad), Torda, Nagyszeben. VI. Mehádia. VII. Fužine.
196. *austriaca* Panz. *(rosae* Panz., *zonalis* K.). — I. Budapest, Szeged. III. Trencsén, Rózsahegy, Tátrafüred. IV. S.-A.-Ujhely, Szőllőske, Szomotor, Mármaros. V. Zilah, Mezőség, Nagyszeben, Tusnád. VI. Mehádia, Resicza, Jassenova. VII. Zágráb. VIII. Fime.
197. *scita* Eversm. — I. Budapest, Peszér, Dabas, Kalocsa, Nagyvárad. II. Duna-Örs. IV. Szomotor. VI. Deliblat. VII. Dálya.
198. *Hattorfiana* K. — I. Budapest, Peszér, Kecskemét, Kalocsa, Nagyvárad, Beél, Rézbánya. II. Kőszeg. III. Nyitra, Trencsén, Koritnicza, Tátrafüred. IV. S.-A.-Ujhely, Orosz-Ruszka. V. Torda, S.-Sz.-György, Kovászna, Brassó, Nagyszeben. VI. Palics, Mehádia. VII. Dálya, Zágráb. VIII. Fužine, Buccari.
199. *Schenckii* Mor. *(Schrankella* Nyl.). — I. Budapest. III. Szliács, Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Szomotor, Tolcsva, Varannó. V. Nagyszeben. VI. Resicza. VII. Fužine. VIII. Fiume.
200. *cingulata* F. — I. Budapest, Nagyvárad. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Nagymihály. V. Szent-Gothard, Nagyszeben. VII. Zágráb. VIII. Fiume.
201. *genevensis* Schmied. — I. Budapest, Buda-Örs. IV. Czéke, Tokaj, S.-A.-Ujhely. V. Tasnád.
202. *croceiventris* Mor. — IV. Secundum H. Friese ad S.-A.-Ujhely inventa.
203. *fimbriata* Brullé *(variabilis* Sm., *piceicornis* Dours). — I. Budapest, Kalocsa, Kisujszállás. II. Kapornak, Duna-Örs. III. Érsekujvár. IV. Szomotor, Szőllőske, Szikszó, Homonna, Tarczal. V. Tasnád. VI. Mehádia, Rékás, Jassenova, Palics.
204. *Braunsiana* Friese. — I. Solum Hungariæ centralis incola, ad Csepel ab auctore detecta.
205. *polita* Sm. — I. Budapest. II. Kapornak, Nagy-Harsány (Com. Baranya). V. Segesvár, Sepsi-Szent-György. VII. Vukovár.
206. *nobilis* Mor. — I. Budapest, Péczel, Mátyásföld, Csepel, Peszér, Debreczen.
207. *truncatilabris* Mor. — I. Budapest. IV. Szőllőske. I. Torda. VI. Grebenácz. VII. Dálya.
208. *limbata* Ev. *(squamea* Gir.). — I. Hucusque apud nos solum ad Budapest.
209. *curvungula* Thoms. *(squamigera* Schck.) — I. Budapest, Nagyvárad. II. Kőszeg. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Szomotor, Simonka. V. Nagyszeben. VI. Rumunyest, Kazán. VIII. Fiume, Draga, Orehovica, Vežica, Lukovec, Buccari.
210. *picicrus* Schck. — V. Nagyszeben, teste C. Henrich. (61, 1883, pag. 115.)
211. *extriata* K. *(fasciata* Wesm.). — I. Budapest. IV. S.-A.-Ujhely, Szomotor, Nagymihály, Gálszécs, Czéke. V. Nagyszeben. VI. Mehádia, Resicza. VII. Kupinovo, Raduć. VIII. Fiume, Lopača.
212. *flavipes* Panz. *(fulvicrus* K.). — Est species sui generis frequentissima.
213. *labialis* K. — In omni zonarum regione.
214. *decipiens* Schck. — I. Kalocsa, Nagyvárad, Szeged. VIII. Buccari. Species sat rara.

215. *argentata* Sm. — I. Budapest, Peszér, Kalocsa. IV. Sátoralja-Ujhely, Szomotor. VI. Mehádia, Palics. VII. Gombos. VIII. Fiume.

216. *proxima* K. *(consobrina* Schck). — I. Budapest, Nagyvárad. III. Trencsén. IV. Bártfa. V. Nagyszeben. VI. Mehádia. VII. Fužine. VIII. Fiume, Orehovica, Lopača.

217. *lepida* Schck *(distinguenda* Schck). — VIII. Fiume, Draga.

218. *nitidiuscula* Schck. — I. Budapest, Nagyvárad, Debreczen. III. Nyitra. IV. S.-A.-Ujhely, Szőllőske, H.-Rokitó, Homonna. V. Torda, Segesvár. VI. Orsova, Jassenova. VII. Klana, Pregrada. VIII. Orehovica.

219. *atrata* Friese. — I. Budapest, Kis-Tarcsa. III. Szliács. IV. S.-A.-Ujhely, Szőllőske. V. Torda. VI. Mehádia, Jassenova.

220. *chrysosceles* K. — I. Budapest. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Szőllőske, Erdőbénye. VI. Derekegyháza.

221. *Shawella* K. — I. Budapest. III. Koritnicza, Tátrafüred, Lacus Csorba. IV. Szőllőske, mons Vihorlat, Bártfa. V. Tasnád, Tihucza, Sepsi-Szent-György, Tusnád. VI. Jassenova. VII. Pregrada. VIII. Fiume.

222. *erythrocnemis* Mor. — I. Kalocsa. III. Trencsén. IV. Tállya. V. Tasnád. VI. Jassenova. Sat rara.

223. *tarsata* Nyl. — V. Szucság. VII. Vrdnik. Rara.

224. *combinata* Christ. — I. Budapest, Nagyvárad, Szeged. III. Trencsén. V. Zilah. VI. Grebenácz. VII. Pregrada. VIII. Fiume.

225. *incisa* Eversm. — II. Tata. III. Nyitra. Tantum duo exemplaria inventa.

226. *propinqua* Schck *(Lewinella* K. Schck). — I. Budapest, Nagyvárad. II. Duna-Örs. III. Szliács, Rózsahegy, Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Szőllőske, Szomotor. V. Zilah, Nagyszeben. VI. Mehádia, Grebenácz. VII. Ogulin. VIII. Fiume.

227. *dorsata* K. *(separanda* Schmied.). — I. Hucusque apud nos tantum ad Budapest.

228. *Mocsáryi* Schmied. — I. Budapest, Kalocsa, rara. VIII. Fiume. Tantum regni Hungariæ incola.

229. *dubitata* Schck. — I. Budapest. III. Szliács, Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Szőllőske, Szomotor, Nagymihály, Sz.-Olyka. VI. Kazán. VIII. Fiume, Draga, Lopača.

230. *congruens* Schmied. — I. Budapest. IV. Forró. VI. Mehádia, Resicza. VIII. Fiume, Orehovica, Draga, Sušak, Lopača.

231. *chrysopyga* Schck. — I. Budapest, Péczel. II. Kapornak, Szombathely. V. Tasnád.

232. *Korleviciana* Friese. — VIII. Sušak, Draga, Orehovica, Lopača.

233. *xanthura* Nyl. — I. Budapest. IV. S.-A.-Ujhely, Kis-Azar VIII. Fiume, Orehovica.

234. *convexiuscula* K. *(Afzeliella* K., *fuscata* Sm.). — In omni parte regni.

v. *albofasciata* Thoms. — VIII. Secundum H. Friese ad Fiume inventa. (39, pag. 41.)

235. *hyppopolia* Schmied. — I. Budapest, Isaszeg, Péczel, Rákos-Keresztur, Czinkota, Kisujszállás, Szeged. III. Nyitra. VI. Palics, Grebenácz. VII. Kupinovo. VIII. Fiume.

236. *ventricosa* Dours. — VIII. Tantum ad Fiume, Sušak.

237. *denticulata* K. *(Listerella* K.). — III. Tátrafüred. V. Tihucza (Besztercze-Naszód), Tusnád. VI. Mehádia, Resicza. VII. Pregrada. Sat rara.

238. *fuscipes* K. *(pubescens* K.). — I. Budapest, Kalocsa. V. Tasnád. VII. Dálya, Klana, Pregrada, Fužine.

239. *seminuda* Friese. — VII. ab A. Langhoffer ad Eszék detecta. Solum Hungariæ incola.

240. *nigriceps* K. — IV. Hucusque apud nos in montibus Beszkid et V. ad Tihucza inventa.

241. *spectabilis* Sm. — I. Budapest, Palota, Kis-Szentmiklós, Sz.-Lőrincz, Peszér, Szeged.

242. *albopunctata* Rossi *(funebris* Panz.). — I. Budapest, Péczel, Csepel, Peszér, Kisujszállás. V. Tasnád. VI. Ulma. VII. Kupinovo. VIII. Fiume.

243. *hungarica* Friese. — I. Budapest, Rákos-Keresztúr, Gödöllő. II. Szombathely. Species solum Hungariæ incola et valde rara.

244. *fulva* Schrk. — V. Brassó. VII. Ogulin. VIII. Draga. Species apud nos rara esse videtur.

245. *Clarkella* K. — I. Budapest. VIII. Fiume. Apud nos species rara.

246. *Tschekii* Mor. *(nigrifrons* Sm.). — I. Budapest: Sashegy. IV. S.-A.-Ujhely, Czéke. VI. Mehádia, Orsova. VIII. Sušak, Orehovica, Draga, Buccari.

247. *nycthemera* Imh. — I. Budapest, Palota. VII. Zágráb. Species ubique rara.

(nigrosericea Dours, secundum H. Friese (39, pag. 44.) e Mehádia in Mus. Nat. Hung. — Exemplar non existit, ideoque species e fauna Hungariæ delenda).

(mucida Kriechb., Erdőbénye (Com. Zemplén) secundum H. Friese (39, pag. 44.). — Specimen in nostra collectione non est *A. mucida* Kriechb., ideoque species pariter delenda).

Halictus Latr.

(*Hylaeus* Fabr.)

248. *aeratus* K. — I. Budapest, Kecskemét, Kisujszállás, Nagyvárad, Beél, Belényes. III. Szliács. IV. S.-A.-Ujhely, Szomotor. V. Búzamező, S.-Sz.-György. VI. Mehádia. VII. Vrdnik. VIII. Sušak, Buccari.

249. *albipes* Fabr. *(obovatus* K.). — I. Budapest, Nagyvárad, Beél, Szeged. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Forró. VI. Mehádia, Jeselnicza, Grebenácz. VII. Pregrada, Ogulin.

v. *affinis* Schck. — I. Prædium Sz.-Lőrincz, Rév. II. Pécs. IV. Homonna, Homonna-Bresztó, S.-A.-Ujhely. VI. Mehádia.

250. *calceatus* Scop. *(cylindricus* F., *abdominalis* K., *fulvocinctus* K.). — In omni zonarum regione communis.

v. *elegans* Lep. *(rubellus* Gir., *rufiventris* Gir., *Giraudi* D. T. et Friese.). — I. Budapest, Kalocsa. II. Neszmély. III. Trencsén. IV. Tokaj, Szomotor, Szőllőske. VI. Grebenácz. VII. Zágráb.

251. *carinaeventris* Mor. — I. Budapest. V. Nagyenyed. VI. Mehádia, Jassenova, Grebenácz. VII. Vukovár, Gombos.

252. *cephalicus* Mor. *(? gemmeus* Dours.). — I. Budapest, Kisujszállás, Kalocsa, Nagyvárad. II. Kapornak. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Czéke, Mád. VIII. Buccari.

253. *clypearis* Schck. — II. Specimen unicum e Szombathely (Com. Vas.).

254. *costulatus* Kriechb. — I. Budapest, Péczel. V. Torda. VI. Mehádia, Grebenácz. VIII. Fiume, Sušak.

255. *exilis* Schck *(minutissimus* Schck). — I. Hucusque apud nos solum ad Budapest.

256. *fasciatellus* Schck. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Nagyvárad. IV. S.-A.-Ujhely, Szőllőske. V. Nagy-Apold, Szerdahely. VI. Mehádia, Resicza, Grebenácz, Moldova. VII. Pregrada, Ogulin. VIII. Sušak.

257. *interruptus* Panz. — In toto regno communis.

258. *leucopus* K. — I. Budapest. VIII. Fiume.

259. *leucozonius* Schrk. — I. Budapest, Kecskemét, Nagyvárad, Rézbánya. II. Kopács, Zircz. IV. S.-A.-Ujhely, Szomotor, Mármaros, Beregszász, O-Ruszka. V. S.-Sz.-György, Nagyszeben. VI. Mehádia, Baziás, Orsova, Grebenácz. VII. Pregrada. VIII. Fiume.

260. *laevigatus* K. — I. Budapest. II. Pozsony. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Czéke, Szőllőske. VI. Mehádia. VIII. Fiume.

261. *lineolatus* Lep. — I. Budapest. VI. Mehádia, Grebenácz, Jassenova.

262. *longulus* Sm. — I. Nagyvárad, Beél, Rév, Szeged. IV. Homonna, Szobráncz.

263. *lucidulus* Schck. — I. Nagyvárad. IV. Sátoralja-Ujhely, Szomotor. VI. Baziás. VIII. Buccari.

264. *maculatus* Sm. — In omni zonarum regione frequens.

265. *major* Nyl. — I. Budapest, Kisujszállás. III. Trencsén. IV. Homonna. V. Malomvíz, Tusnád. VI. Mehádia, Resicza. VII. Raduć. VIII. Fiume.

266. *malachurus* K. — I. Budapest, Nagyvárad. III. Trencsén, Beszterczebánya. IV. S.-A.Ujhely, Czéke. VII. Pregrada, Zágráb, Samobor, Kupinovo. VIII. Fiume, Sušak, Draga, Orehovica, Buccari.

267. *marginatus* Brullé. — I. Budapest. II. Visegrád (in coll. Mayri.)

268. *minutissimus* K. — I. Budapest, Nagyvárad. V. Transsylvania. VII. Zágráb. VIII. Fiume.

269. *minutus* Schck. — VI. Mehádia, Jeselnicza, Baziás.

270. *morbillosus* Kriechb. — I. Budapest, Kalocsa, Kisujszállás, Nagyvárad, Szeged. II. Pécs, Kapornak, Keszthely. III. Trencsén, Nyitra, Érsekujvár, Homonna. IV. Szőllőske, Tolcsva, Tokaj, Nagymihály. V. Torda, Nagyenyed, Erzsébetváros, Segesvár. VI. Mehádia, Kazán, Jassenova, Grebenácz. VII. Pregrada, Velebit.

271. *morio* Fabr. — I. Budapest, Beél. III. Hermanetz, IV. S.-A.-Ujhely, Szőllőske. VI. Mehádia.

272. *mucoreus* Eversm. *(pollinosus* Sich.). — I. Budapest, Dabas, Kalocsa, Kisujszállás, Nagyvárad, Szeged. II. Babarcz. IV. S.-A.-Ujhely, Erdőbénye, Tolcsva. V. Nagyszeben. VI. Grebenácz.

273. *nitidiusculus* K. — I. Budapest. III. Nyitra, Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely. VI. Mehádia. VIII. Fiume.

274. *nitidus* Schck *(minutulus* Schck). — IV. Szőllőske, Szikszó. VI. Mehádia.

275. *obscuratus* Mor. — I. Budapest, Péczel, Kisujszállás. II. Pécs. III. Nográd. VII. Vrdnik.

276. *parvulus* Schck. — V. Nagyszeben, teste C. Henrich. (61, 1881, pag. 68.).

277. *patellatus* Mor. — I. Budapest, Kisujszállás, Kalocsa, Jászkisér, Szeged. IV. S.-A.-Ujhely, Szőllőske, Szomotor, Páczin. VI. Nagy-Kikinda. Moldova. VIII. Fiume, Draga, Orehovica, Zengg, Buccari.

278. *pauxillus* Schck. — I. Budapest, Nagyvárad, Tenke, Beél, Rév. II. Pécs. V. Tasnád, Nagyszeben. VI. Orsova. Baziás.

279. *pleuralis* Mor. — IV. Hucusque solum ad Tolcsva.

280. *politus* Schck. — I. Budapest, Nagyvárad. IV. S.-A.-Ujhely, Sárospatak. V. Nagyszeben. VI. Orsova. VIII. Fiume.

281. *puncticollis* Mor. — IV. Tantum ad Sátoralja-Ujhely.

282. *quadricinctus* Fabr. (*quadristrigatus* Latr.). — I. Budapest, Kalocsa, Kisujszállás, Nagyvárad, Szeged. II. Balatonfüred. III. Szliács, Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj, Nagymihály. V. Nagyfalu, Peér, S.-Sz.-György. VI. Palics, Mehádia, Grebenácz. VII. Stara Pazova, Kupinovo.

283. *quadrinotatus* K. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Zircz. III. K.-Lehota. IV. S.-A.-Ujhely, Czéke, Tolcsva, Szobráncz, Homonna, Bresztó. V. Kovászna, Tusnád. VI. Mehádia, Orsova, Kazán. VIII. Buccari.

284. *rubicundus* Christ. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Pozsony. III. Trencsén, Virágvölgy. IV. Tokaj, Szőllőske, Sz.-Olyka, O.-Ruszka, Nagymihály, Varannó, Homonna. V. Mezőség, Semesnye, Nagyszeben, Tusnád, Brassó. VI. Mehádia, Resicza. VII. Pregrada, Ogulin. VIII. Fiume, Orehovica, Sušak.

285. *rufocinctus* Nyl. — I. Budapest. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Szőllőske, Tokaj, Nagymihály, Homonna. VI. Mehádia. VIII. Sušak, Orehovica, Draga, Zengg.

286. *scabiosae* Rossi. — I. Budapest, Peér, Nagyvárad, Szeged. IV. Szomotor. V. Tusnád. VI. Grebenácz. VII. Pregrada. VIII. Sušak, Orehovica, Cirkvenica, Zengg.

287. *semicinctus* Först. — Secundum auctorem (29, pag. 140.) tantum Hungariæ terram colit.

288. *semitectus* Mor. — I. Budapest. VI. Grebenácz.

289. *sexcinctus* Fabr. — I. Budapest, Kalocsa, Kisujszállás, Nagyvárad. II. Kapornak, Balatonfüred. III. Trencsén, Beszterczebánya, Nagyfalu. V. Nagy-Csűr, S.-Sz.-György, Nagyszeben. IV. S.-A.-Ujhely, Szomotor. VI. Grebenácz, Deliblat. VII. Pregrada, Vrdnik, Stara Pazova. VIII. Fiume.

290. *sexnotatus* K. — I. Budapest, Szeged. II. Kapornak, Zircz, Duna-Örs, Szombathely. III. Trencsén, Beszterczebánya. IV. Sárospatak, Eperjes. V. Tömös, Nagyszeben. VI. Mehádia, Grebenácz. VII. Pregrada.

291. *Smeathmanellus* K. — I. Budapest, Kecskemét, Kisujszállás. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Szőllőske. V. Nagyszeben, Brassó. VIII. Sušak, St-Giorgio.

292. *tetrazonius* Klug (*quadricinctus* K.). — In omni parte regni.

293. *tumulorum* Linn. (*seladonius* F., *flavipes* F., *fasciatus* Nyl.). — In omni zonarum regione communis.

294. *variipes* Mor. — I. Budapest, Kisujszállás, Nagyvárad. II. Pécs. IV. S.-A.-Ujhely, Szőllőske, Tolcsva, Erdőbénye, Tokaj. V. Nagyenyed. VI. Mehádia, Baziás. VIII. Sušak, Orehovica.

295. *villosulus* K. (*punctulatus* K.). — I. Budapest, Nagyvárad. IV. S.-A.-Ujhely, Szőllőske, Homonna. V. Nagyszeben. VI. Orsova. VIII. Fiume.

296. *virescens* Lep. (*gramineus* Sm.). — I. Budapest, Kalocsa, Kisujszállás, Nagyvárad, Beél, Szeged. II. Simontornya, Kapornak. III. Szliács. V. Tasnád, S.-Sz.-György, Brassó. VI. Grebenácz. VII. Pregrada, Vrdnik, Gospić. VIII. Sušak, Buccari.

297. *vulpinus* Nyl. — I. Budapest, Kecskemét. II. Balaton-Füred, Szombathely. V. Szucság. VI. Mehádia. VII. Pregrada, Zágráb, Samobor, Stara Pazova, Kupinovo. VIII. Sušak, Orehovica, Vežica, Buccari.

298. *xanthopus* K. — I. Budapest, Csepel, Kecskemét, Kalocsa, Nagyvárad, Szeged. II. Mohács, Keszthely, Balaton-Füred, Szombathely. IV. S.-A.-Ujhely, Szomotor. VI. Mehádia, Ulma, Grebenácz. VII. Pregrada.

299. *zonulus* Sm. — I. Budapest, Kisujszállás, Nagyvárad, Szeged. II. Pécs, Kapornak. III. Losoncz. IV. S.-A.-Ujhely, Szobráncz, Homonnna, Erdőbénye. V. Hátszeg. VI. Palics, Grebenácz, Oravicza. VIII. Fiume.

(*Nomioides* Schck.)

300. *pulchellus* Schck. (? *minutissimus* Rossi). — I. Budapest, Rákos-Palota, Kis-Szentmiklós, Kecskemét, Kalocsa, Csongrád, Horgos. IV. Szomotor. VI. Grebenácz, Jassenova. VII. Dálya, Pétervárad.

301. *variegatus* Oliv. (*pulchellus* Jur.). — I. Budapest, Kis-Szentmiklós, Monor, Dabas, Kalocsa. II. Duna-Örs. IV. Szomotor. V. Transsylvania. VI. Grebenácz, Jassenova, Deliblat. VII. Eszék, Dálya.

b) *Gastrolegidae* vel *Dasigastrae*.

Eriades Spin.

(*Heriades* Auct., *Trypetes* Schck.)

302. *truncorum* Linn. — I. Budapest, Kalocsa, Nagyvárad, Beél, Szeged. II. Kapornak. III. Trencsén, Beszterczebánya. IV. S.-A.-Ujhely, Erdőbénye, Göncz, Homonna, Szobráncz. V. Kolozsvár, Nagyszeben, Tusnád. VI. Grebenácz.

VII. Pétervárad, Zágráb, Pregrada. VIII. Fiume, Sušak, Orehovica.

303. *crenulatus* Nyl. — I. Budapest, Kalocsa, Nagyvárad. III. Szliács, Nyitra. IV. Szomotor. V. Tasnád, Tihucza, Nagyenyed. VI. Orsova, Deliblat, Palics. VII. Gombos. VIII. Fiume.

(*Chelostoma* Latr.)

304. *florisomnis* L. (*maxillosus* L., *culmorum* Lep.). — In omni zonarum regione.

305. *grandis* Nyl. — VI. Specimen unicum ad thermas Herculis sacras Mehadienses in monte Domogled inventum.

306. *appendiculatus* Mor. — I. Kalocsa. VI. Mehádia. VII. Lipik. Species rara esse videtur.

307. *emarginatus* Nyl. — II. Pécs. VI. Mehádia, Kazán, Rumunyest.

308. *Handlirschii* Schlett. — VI. Secundum auctorem species etiam in Mehádia inventa est. (169. pag. 627.)

309. *campanularum* K. — I. Budapest, Nagyvárad II. Pécs. III. Vallis Hermanetz. V. Nagyszeben. VI. Mehádia, Rumunyest.

310. *ventralis* Schlett. — IV. S.-A.-Ujhely. VI. Mehádia, Kazán. Solum Hungariam inhabitat.

311. *foveolatus* Mor. — VI. Orsova et VIII. Fiume, teste Schletterer. (169, pag. 638.)

312. *Schmiedeknechtii* Schlett. — VI. Specimen unicum cognitum typicum e Mehádia.

313. *nigricornis* Nyl. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Tapolcza. III. Trencsén, Beszterczebánya, vallis ad Hermanetz, Koritnicza. IV. S.-A.-Ujhely, Homonna, Szobráncz, Ungvár. V. Nagyszeben, Brassó, Borszék. VI. Mehádia. VIII. Fiume, Sušak, Draga, Orehovica.

Osmia Panz.

314. *rufa* L. (*bicornis* L., *fronticornis* Latr). — In omni zonarum regione communis.

315. *cornuta* Latr. — Pariter inhabitat omnes regni Hungariæ partes.

316. *emarginata* Lep. — I. Budapest. IV. Kassa. VI. Orsova. VIII. Fiume. Sat rara.

317. *fuciformis* Latr. — VII. Pregrada. VIII. Fiume.

318. *pilicornis* Sm. — I. Budapest: Svábhegy in unico solum exemplari invenit H. Friese.

319. *coerulescens* L. (*aenea* L., *cyanea* Gir.). — In toto regno non rara.

320. *melanogastra* Spin. — In omni zonarum regione.

321. *fulviventris* Panz. — Est species sat frequens.

322. *Solskyi* Mor. — II. Kapornak. III. Nyitra, Trencsén, Poprád, Koritnicza. V. Előpatak, Tusnád. VI. Mehádia. VII. Eszék, Ruma, Pregrada. VIII. Buccari.

323. *cephalotes* Mor. — VIII. Tantum ad Fiume.

324. *longiceps* Mor. — VI. Mehádia. VIII. Draga, Fiume, Zengg.

325. *rubicola* Friese. — Apud Fiume ab auctore detecta (38, 1891, pag. 257.)

326. *Panzeri* Mor. — I. Budapest, Mátyásföld, Kecskemét, Dabas, Kalocsa, Nagyvárad. II. Tapolcza. IV. Szőllőske, Sárospatak. V. Nagyszeben. VI. Mehádia, Oravicza. VII. Pétervárad, Dálya.

327. *submicans* Mor. (? *Giraudi* Schmied.). — III. Hucusque tantum ad balneum Koritnicza inveni.

328. *versicolor* Latr. — VIII. Tantum ad Zengg collecta.

329. *gallarum* Spin. (*ruborum* Duf. et Perr.). — I. Budapest. V. Tasnád.

330. *viridana* Mor. — VIII. Zengg; teste H. Friese. (38, 1893, pag. 357.)

331. *anthrenoides* Spin. — I. Budapest. II. Pécs. IV. S.-A.-Ujhely. VI. Mehádia, Zombor. VII. Pregrada, Raduć. VIII. Fiume, Sušak, Vežica, Buccari, Zengg.

332. *rufohirta* Lep. (*fulvohirta* Spin., *spiniventris* Gir.). — I. Budapest, Kalocsa, Hajós, Nagyvárad. II. Visegrád, Balatonfüred, Keszthely. III. Nyitra. IV. S.-A.-Ujhely. VI. Mehádia, Jassenova. VIII. Fiume, Sušak, Draga, Buccari, Zengg.

333. *mitis* Nyl. (*montivaga* Mor.). — I. Budapest, unicum tantum inveni exemplar.

334. *acuticornis* Duf. et Perr. (*dentiventris* Mor.). — I. Budapest. V. Pele (Com. Szilágy). VIII. Fiume.

335. *claviventris* Thoms. (*foveolata* Schck). — I. Budapest. IV. S.-A.-Ujhely.

336. *leucomelaena* K. (*parvula* Duf. et Perr.). — I. Budapest, Nagyvárad, Szeged. II. Kapornak. III. Szliács. IV. Tokaj, Szőllőske. VI. Rumunyest.

337. *villosa* Schck. — Trencsén, Koritnicza. IV. Rabaszkala in montibus Beszkid.

338. *adunca* Panz. — In omni zonarum regione.

339. *Lepeletieri* Pérez. — IV. Tantum in montibus Beszkid a C. Chyzer collecta.

340. *Morawitzii* Gerst. — VII. Fužine. VIII. Fiume, Orehovica, Vežica.

341. *pallicornis* Friese. — VIII. Tantum regionis adriaticæ incola, ad Fiume etiam a me collecta, Zengg.

342. *hybrida* Pérez. — VII. Pregrada. VIII. Fiume.

343. *insularis* Schmied. — VIII. Fiume, Zengg.

344. *Spinolae* Schck (*anthocopoides* Schck, *caementaria* Gerst.). — In omni zonarum parte non rara.

345. *crenulata* Mor. — VII. Pregrada. VIII. Fiume.
346. *tridentata* Duf. et Perr. — Fiume, Orehovica.
347. *curvipes* Mor. — VIII. Ad Fiume.
348. *laevifrons* Mor. — I. Budapest; sat rara.
349. *aurulenta* Panz. — I. Budapest, Peszér, Kalocsa, Nagyvárad, Mező-Kovácsháza, Szeged. III. Szliács, Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Szőllőske, Tarczal. V. Nagyszeben. VI. Mehádia.
350. *bicolor* Schrk (*fusca* Christ). — I. Budapest, Kalocsa, Szeged. VI. Mehádia. VII. Diakovár, Fužine.
351. *dives* Mocs. — I. Tantum Hungariæ et quidem centralis incola; species ad Budapest rara.
352. *papaveris* Latr. — I. Budapest, Kis-Tarcsa. IV. S.-A.-Ujhely. VII. Fužine.
353. *bisulca* Gerst. — I. Budapest. II. Pécs. VI. Grebenácz. VIII. Fiume, Sušak.
354. *Mocsáryi* Friese. — I. Tantum regionis centralis civis; specimina typica ad Budapest inventa. Species valde rara esse videtur.
355. *dalmatica* Mor. — VI. Mehádia, Deliblat. VIII. Fiume.
356. *grandis* Mor. — I. Veresegyház, Kecskemét. Species valde rara.
357. *princeps* Mor. — I. Budapest, Kecskemét. Species etiam valde rara.
358. *croatica* Friese. — VIII. Solum regionis adriaticæ incola, species ad Orehovica et Zengg detecta.
359. *spinulosa* K. — I. Budapest, Farkasd. II. Bélye. IV. S.-A.-Ujhely. V. Nagyszeben. VI. Mehádia. VII. Pregrada, Samobor. VIII. Fiume, Pećine, Orehovica.
360. *ligurica* Mor. (*detrita* Pérez). — VIII. Fiume, Orehovica.
361. *scutellaris* Mor. — VIII. Pariter solum ad Fiume.
362. *bidentata* Mor. (*affinis* Friv.). — I. Budapest, Peszér, Kalocsa, Szeged. II. Pécs. III. Trencsén. IV. Lelesz, Forró, Göncz. V. Tasnád, Torda, Erzsébetváros, Nagyszeben. VI. Oravicza, Grebenácz, Nagy-Kikinda. VII. Vukovár, Gombos, Zágráb. VIII. Sušak, Orehovica.
363. *Anceyi* Pérez. — VIII. Tantum ad Fiume et Orehovica.

Lithurgus Latr.

364. *fuscipennis* Lep. (*monoceros* Ev.). — I. Budapest, Peszér, Dabas, Kalocsa, Kisujszállás, Nagyvárad, Debreczen, Makó, Szeged. IV. Szomotor. V. Tasnád, Semesnye, Hátszeg. VI. Mehádia, Grebenácz, Deliblat.
365. *chrysurus* Fonsc. — I. Budapest, Nagyvárad, Debreczen. V. Búzamező, Dicső-Szentmárton. VI. Palics, Nagy-Kikinda, Grebenácz, Deliblat. VII. Vukovár. VIII. Fiume, Novi.

Megachile Latr.

366. *lagopoda* L. — In omni parte regni.
367. *maritima* K. — In omni zonarum regione.
368. *Willughbiella* K. — I. Budapest, Dabas, Szeged. II. Siófok. III. Szliács. IV. Tokaj. V. Tihucza, Sepsi-Szent-György, Nagyszeben. VI. Mehádia, Ferenczfalva, Baziás, Grebenácz. VII. Zágráb, Pregrada. VIII. Fiume, Orehovica.
369. *circumcincta* K. — I. Budapest, Kalocsa, Debreczen. II. Tapolcza. III. Szliács, Lucsivna, Poprád. VI. Mehádia. VII. Fužine. VIII. Orehovica.
370. *analis* Nyl. — III. Szliács, Lucsivna, Tátrafüred. V. Mehádia. VII. Fužine.
371. *bicoloriventris* Mocs. — I. Species rara ad Budapest a me detecta.
372. *sericans* Fonsc. — VI. In regione banatica ad Deliblat a H. Friese inventa.
373. *bombycina* Pall. Ev. — I. Kalocsa, Monor, Debreczen. II. Baranya, Siófok. V. Tasnád, Peér. VI. Deliblat, Mehádia.
374. *pilicrus* Mor. (*vicina* Mocs.). — I. Budapest, Kalocsa, Szeged. IV. S.-A.-Ujhely. V. Tasnád. VI. Mehádia, Korniaréva, Rékás. VII. Pregrada. VIII. Fiume, Orehovica, Sušak, Cirkvenica.
375. *genalis* Mor. — II. Duna-Örs. III. Lekér (Com. Bars). Species ad faunam Hungariæ peculiaris e China descripta est.
376. *ligniseca* K. — III. Trencsén. IV. Mármaros. V. Tusnád. VI. Oravicza. Species rara.
377. *ericetorum* Lep. — In omni zonarum regione.
378. *melanopyga* Costa. — I. Budapest. II. Balatonfüred, keszthelyi Hévvíz. VI. Rékás (Com. Temes). VIII. Buccari.
379. *dacica* Mocs. — VI. Ferenczfalva, Mehádia. Solum Hungariæ civis.
380. *lapponica* Thoms. — III. Tátrafüred. V. Tihucza, Tusnád.
381. *centuncularis* Linn. — I. Budapest, Kalocsa, Nagyvárad, Szeged. II. Lekér, Szombathely. III. Nyitra, Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely. V. Hátszeg, Nagyszeben. VII. Vrdnik, Pregrada. Zágráb. VIII. Sušak, Orehovica.
382. *versicolor* Sm. — I. Budapest, Peszér, Nagyvárad. II. Kapornak. VI. Ferenczfalva, Mehádia. VII. Pregrada. VIII. Fiume, Orehovica.
383. *octosignata* Nyl. — I. Budapest, Kalocsa. II. Pécs. IV. S.-A.-Ujhely. V. Segesvár, Nagyszeben. VI. Mehádia. VII. Pregrada. VIII. Fiume, Sušak, Orehovica.

384. *leucomalla* Gerst. — II. Lekér (Com. Baranya). III. Nyitra. V. Peér. VI. Grebenácz.

385. *argentata* Fabr. — In omni zonarum regione.

386. *apicalis* Spin. — In toto regno collecta.

387. *dorsalis* Pérez. — I. Budapest. II. Nagy-Harsány, Balatonfüred.

388. *pacifica* Panz. (*imbecilla* Gerst.). — I. Budapest, Kalocsa, Kecskemét, Nagyvárad. II. Siófok, Kapornak. III. Szliács, Nyitra. IV. S.-A.-Ujhely. V. Tasnád. VI. Grebenácz. VIII. Fiume, Sušak.

389. *nigriventris* Schck. — IV. Hucusque tantum ad Zsihovecz (Com. Mármaros) et V. Tihucza (Com. Besztercze-Naszód).

390. *derasa* Gerst. — VI. Ad thermas Herculis sacras Mehádienses in unico solum specimine inventa.

(*Chalicodoma* Lep.)

391. *Lefeburei* Lep. — VIII. Fiume, Cirkvenica, Buccari St.-Giorgio, Zengg.

392. *syraensis* Rad. (*hungarica* Mocs.). — I. Species ad Budapest valde rara.

393. *pyrenaica* Lep. (*pyrrhopeza* Gerst.). — VIII. Fiume, Draga, Orehovica, Vežica, Carlopago, St.-Giorgio, Buccari.

394. *manicata* Gir. — VIII. Fiume, Sušak, Draga, Orehovica, Vežica.

395. *muraria* Fabr. — I. Budapest. II. Neszmély. VIII. Fiume, Vežica.

v. *nestorea* Brullé. — VIII. Tantum ad St.-Giorgio, Buccari et Zengg.

Trachusa Panz.

396. *serratulae* Panz. — I. Budapest. II. Kőszeg. III. Szliács, Koritnicza, Virágvölgy, Alsó-Tátrafüred. V. Tihucza, Tusnád. VI. Resicza, Mehádia. VII. Pregrada, Raduć. VIII. Fiume.

Anthidium Fabr.

397. *laterale* Latr. — I. Budapest, Péczel, Isaszeg, Peszér, Kalocsa, Parád, Szeged. IV. Szomotor. VI. Grebenácz, Jassenova, Zombor.

398. *oblongatum* Illig. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. Pécs, Bélye. III. Szliács. IV. Sátoralja-Ujhely. V. Torda, Nagyszeben. VI. Zombor, Mehádia. VII. Vukovár, Pregrada. VIII. Fiume, Draga, Orehovica, Cirkvenica, St.-Giorgio.

399. *montanum* Mor. — IV. Apud nos solum in regionibus montium Tátra: Lucsivna, Alsó-Tátrafüred a me collecta.

400. *manicatum* Linn. — I. Budapest, Kalocsa, Nagyvárad, Szeged. II. Kopács. III. Nyitra, Trencsén, Szliács. IV. S.-A.Ujhely. V. Tasnád, Kolozsvár, S.-Sz.-György, Kovászna, Nagyenyed. VI. Mehádia, Jassenova. VII. Dálya, Vukovár, Zágráb, Pregrada, Raduć. VIII. Orehovica, Buccari, Zengg.

401. *cingulatum* Latr. — I. Budapest, Péczel, Peszér, Kisujszállás. II. Dunaörs. III. Trencsén. V. Sz.-Erzsébet. VI. Mehádia, Jassenova, Deliblat, Zombor. VIII. Draga, Vežica, Cirkvenica, Buccari. Zengg.

402. *punctatum* Latr. — I. Budapest. III. Trencsén, Szliács. IV. S.-A.-Ujhely, Tarczal. V. Torda. VI. Jassenova. Gospić, Vrdnik. VIII. Sušak, Draga, Orehovica, Cirkvenica, Buccari.

v. *fulvipes* Friese. — Secundum auctorem etiam in Hungaria. (46, pag. 439.)

403. *variegatum* Fabr. — I. Budapest, Rákospalota, Péczel, Peszér, Kecskemét. VIII. Cirkvenica, Buccari, St.-Giorgio.

404. *septemdentatum* Latr. — I. Budapest. VI. Deliblat, Kazán. VIII. Fiume, Vežica, Buccari, Carlopago, Zengg.

405. *florentinum* Fabr. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa, Nagyvárad, Debreczen, Szeged. II. Kopács, Siófok. IV. Szőllőske. VI. Grebenácz, Jassenova, Ulma, Deliblat. VII. Vukovár.

406. *tenellum* Mocs. — I. Budapest, Kalocsa, Szeged. II. Pécs, Szegzárd, Siófok. VI. Grebenácz, Rékás, Deliblat. Solum Hungariæ incola.

407. *lituratum* Panz. (*nanum* Mocs.). — I. Budapest, Isaszeg, Peszér, Kalocsa, Kecskemét, Nagyvárad, Debreczen, Szeged. II. Pécs, Kapornak, Duna-Örs. IV. S.-A.-Ujhely, Szőllőske, Tokaj. V. Szucság, Nagyszeben. VI. Mehádia, Rékás, Kazán. VII. Dálya, Vrdnik, Fužine VIII. Buccari.

408. *strigatum* Panz. (*contractum* Latr.). — I. Budapest, Péczel, Mártonkáta, Kecskemét, Kalocsa, Debreczen, Hadház, Szeged. II. Bélye. III. Szliács, Virágvölgy, Alsó-Tátrafüred. IV. Mármaros. VI. Jassenova. VII. Diakovár. VIII. Fiume, Sušak, Orehovica, Samobor, Buccari.

409. *interruptum* Fabr. — I. Budapest, Peszér, Dabas. III. Szliács. VI. Mehádia, Deliblat. VII. Vrdnik.

410. *pubescens* Mor. — I. Budapest, Peszér, Kecskemét. VI. Grebenácz, Deliblat, Kubin.

411. *Mocsáryi* Friese. — VI. Mehádia, Deliblat. VIII. Fiume, Buccari.

412. *barbatum* Mocs. — I. Budapest, Csepel; tantum duo specimina. Solum Hungariæ civis.

II. APIDAE SPURIAE SOLITARES.

(*Archiapidae* vel *Proapidae* Friese.)

Prosopis Fabr.

(*Hylaeus* Auct.)

413. *angustata* Schck. — I. Budapest, Nagyvárad. IV. Homonna. VI. Oravicza.

414. *atratula* Först. — Secundum auctorem solummodo Hungariæ incola. (30, pag. 980.).

415. *bipunctata* Fabr. (*signata* Panz.). — I. Budapest, Kalocsa, Nagyvárad, Rév, Rézbánya. II. Boglár. III. Trencsén, Beszterczebánya. IV. S.-A.-Ujhely, Szobráncz. V. Nagyszeben. VI. Mehádia, Grebenácz. VIII. Fiume.

416. *brevicornis* Nyl. (*pygmaea* Schck). — I. Budapest, Nagyvárad. IV. Homonna. VI. Mehádia. VIII. Fiume.

417. *clypearis* Schck. — I. Budapest, Nagyvárad. IV. S.-A.-Ujhely. VIII. Fiume.

418. *communis* Nyl. (*annulata* Schck). — I. Budapest. V. Nagyszeben. VI. Mehádia.

419. *confusa* Nyl. (*annularis* K., *signata* Nyl.). — I. Budapest, Nagyvárad, Beél. III. Szliács. IV. Szomotor, Szerencs, Ungvár. V. Nagyszeben. VI. Oravicza.

420. *cornuta* Sm. — I. Budapest. II. Balf (Com. Sopron). IV. Homonna. VI. Mehádia, Jassenova, Grebenácz. VIII. Fiume.

421. *difformis* Eversm. (*subfasciata* Schck). — II. Visegrád. III. Beszterczebánya, Rózsahegy. IV. Szatmár, Mármaros, Szőllőske. V. Kolozsvár, Semesnye, Tusnád. VI. Mehádia, Resicza. VII. Vrdnik.

422. *dilatata* K. (*annularis* K.). — I. Nagyvárad, Beél, Belényes, Rév. III. Szliács, Beszterczebánya, Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Mád, Szobráncz, Homonna, O-Ruszka. V. Nagyszeben. VI. Mehádia.

423. *euryscapa* Först. — I. Budapest. IV. Szőllőske, Juszko-Volya (Com. Zemplén). VII. Vrdnik. Solum Hungariæ terram colit.

424. *genalis* Thoms. (*confusa* Först.). — VIII. Littorale hungaricum, teste H. Friese. (39, pag. 38.)

425. *hyalinata* Sm. (*armillata* Nyl.). — I. Budapest, Nagyvárad, Makó. III. Szliács, Beszterczebánya, vallis ad Hermanetz. IV. Szomotor, Szőllőske. V. Nagyszeben, Sepsi-Sz.-György. VI. Mehádia, Jassenova. VIII. Fiume.

v. *corvina* Först. — VIII. Fiume, teste H. Friese. (39, pag. 38.)

v. *subquadrata* Först. — VIII. Fiume, teste, H. Friese. (39, pag. 38.)

426. *insignis* Först. — VIII. Littorale hungaricum, teste H. Friese. (39, pag. 38.)

427. *Kahrii* Först. — VIII. Littorale hungaricum, teste H. Friese. (39, pag. 38.)

428. *lineolata* Schck (*inaequalis* Först.). — I. Budapest. VIII. Fiume.

429. *nigrita* Fabr. (*propinqua* Nyl.). — I. Nagyvárad. III. Szliács, Beszterczebánya, vallis Hermanetz. IV. S.-A.-Ujhely, Homonna. V. Kolozsvár, Tövis, S.-Sz.-György, Nagyszeben, Brassó, Tusnád. VI. Mehádia. VIII. Orehovica, Fiume.

430. *pictipes* Nyl. (*excisa* Schck). — I. Budapest, Nagyvárad, Beél, Rév, Rézbánya. II. Kopács. IV. S.-A.-Ujhely, Homonna. VI. Oravicza, Mehádia. VII. Pregrada. VIII. Fiume.

431. *punctatissima* Sm. (*obscurata* Schck). — I. Nagyvárad, Beél. IV. K.-Azar. VIII. Fiume.

432. *rimosa* Först. — Secundum auctorem solummodo Hungariæ incola. (30, pag. 1025.)

433. *sinuata* Schck. — I. Budapest, Nagyvárad. III. Beszterczebánya, Hermanetz. IV. Homonna. VI. Grebenácz.

434. *variegata* Fabr. — I. Budapest, Dabas, Kalocsa, Kisujszállás, Nagyvárad, Beél. II. Kapornak. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Szőllőske, Szomotor, Szobráncz. V. Nagyszeben, Tusnád. VI. Mehádia, Resicza, Jassenova, Grebenácz. VII. Pregrada, Vrdnik. VIII. Orehovica, Cirkvenica.

v. *meridionalis* Först. (*rhodia* nob.). — I. Dabas, Kisujszállás, Szeged. IV. Tokaj, Forró. V. Tasnád. VI. Mehádia, Jassenova, Grebenácz. VII. Pregrada, Vrdnik. VIII. Orehovica.

Sphecodes Latr.

(*Dichroa* Illig.)

435. *ephippius* Linn. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Duna-Örs. IV. Szőllőske. V. Nagyszeben. VII. Pregrada.

436. *fuscipennis* Germ. — I. Budapest, Peszér, Kisujszállás, Kalocsa, Debreczen, Szeged. II. Duna-Örs, Szombathely, Kapornak. III. Nyitra. IV. Szomotor, Tokaj. V. Tasnád, Semesnye. VI. Jassenova, Grebenácz, Kazán. VII. Dálya, Pregrada, Velebit. VIII. Buccari.

437. *fulviventris* Scop. — Secundum Christ (16, pag. 172.) species etiam Hungariæ terram colit.

438. *gibbus* Linn. — I. Budapest, Kisujszállás, Szeged. II. Nyitra. IV. S.-A.-Ujhely, Szőllőske. V. Tasnád, Nagyszeben, Tusnád. VI. Mehádia, Orsova, Jassenova, Grebenácz, Deliblat, Ulma. VII. Pregrada, Vežica, Fužine. VIII. Buccari.

439. *pilifrons* Thoms. — I. Budapest. II. Szombat-

hely. IV. Eperjes. VI. Resicza, Mehádia, Grebenácz. VII. Pregrada.

440. *puncticeps* Thoms. — III. Nyitra. V. Tusnád. VI. Mehádia, Resicza.

441. *reticulatus* Thoms. *(distinguendus* Hagens). — I. Nagyvárad, Beél, Algyő. IV. Tokaj, Tarczal, Szomotor. VI. Mehádia, Jassenova, Deliblat. VII. Velebit.

442. *rufiventris* Panz. *(rubicundus* Hagens). — I. Budapest, Beél. IV. S.-A.-Ujhely. V. Hátszeg. VI. Grebenácz.

443. *scabricollis* Wesm. — I. Nagyvárad. VI. Mehádia.

444. *similis* Wesm. *(rufescens* Fourcr.). — I. Budapest, Nagyvárad, Rév, Szeged. IV. Vizsoly, Homonna, Homonna-Bresztó. V. Nagyszeben.

445. *subquadratus* Sm. — I. Budapest, Nagyvárad, Rév, Szeged. II. Szombathely. III. Szliács. IV. S.-A.-Ujhely, Szomotor, Tokaj, Tállya. V. Tasnád, Zilah, Nagyfalu, S.-Sz.-György, Nagyszeben. VI. Jassenova, Grebenácz. VII. Vrdnik.

III. APIDAE PARASITICAE SEU CUCULLINAE.

A) COMMENSALES.

Psithyrus Lep.

(*Apathus* Newm).

446. *rupestris* Fabr. *(subterraneus* Christ). — I. Budapest, Kalocsa, Nagyvárad. III. Tátrafüred, Szliács, Trencsén, Pozsony. IV. S.-A.-Ujhely, Szőllőske, Erdőbénye, Homonna. V. Kolozsvár, Magura, Nagyszeben. VII. Pregrada, Fužine. VIII. Orehovica.

447. *campestris* Panz. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Kőszeg. III. Trencsén, Pozsony. IV. S.-A.-Ujhely, Tállya, Szinna. V. Nagyszeben. VI. Mehádia. VII. Zágráb, Pregrada.

448. *Barbutellus* K. *(? monacha* Christ, *saltuum* Panz.). — In omni zonarum regione.

449. *maxillosus* Klug *(lugubris* Kriechb.). — I. Budapest, Péczel; rarus. VI. Mehádia. VII. Zágráb. VIII. Fiume, Orehovica, Buccari.

450. *vestalis* Fourcr. — I. Budapest, Kalocsa, Nagyvárad, Szeged. II. Duna-Örs. III. Trencsén, Tátrafüred. IV. S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Szomotor, Vihorlat, Mármaros. V. Magura, Brassó, Nagyszeben. VII. Zágráb, Pregrada. VIII. Vežica.

451. *quadricolor* Lep. — I. Budapest; rarus. III. Trencsén, Tátrafüred. IV. Vallis Balzatul in com. Mármaros. V. Mons Magura (Com. Kolozs). VI. Montes Mehadienses. VII. Fužine.

452. *globusus* Ev. — III. Trencsén, Tátrafüred, Koritnicza.

B) SOLITARES.

Melecta Latr.

453. *armata* Panz. *(punctata* K.). — I. Budapest, Peszér, Kalocsa, Nagyvárad. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj, Varannó, Nagymihály. V. Nagyfalu, Mezőség, Nagyszeben. VI. Mehádia.

454. *luctuosa* Scop. *(punctata* F.). — I. Budapest, Dabas, Peszér, Kalocsa, Szeged. II. Duna-Örs. III. Körmöczbánya, Selmeczbánya (Scopoli). IV. Tolcsva, Rozsnyó. V. Nagyfalu. VI. Ulma. VII. Raduć, Gospić. VIII. Orehovica, Zengg.

455. *funeraria* Sm. — I. Inter Rákos-Keresztúr et Czinkota prope Budapest a H. Friese numerose collecta. VIII. Zengg (Padewieth).

456. *albovaria* Erichs. — VI. Ad thermas Herculis sacras Mehadienses in unico tantum specimine inventa.

457. *plurinotata* Brullé. — VI. Ad Mehadiam exemplar unicum H. Friese invenit.

Crocisa Jur.

458. *scutellaris* Fabr. *(histrionica* Illig.). — I. Budapest, Nagyvárad. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely. V. Búzamező, Sepsi-Szentgyörgy, Nagyszeben. VI. Grebenácz.

459. *affinis* Mor. — I. Budapest, in duobus solum exemplaribus a me inventa.

460. *ramosa* Lep. — I. Budapest, Kalocsa, Kecskemét, Nagyvárad. II. Pécs, Boglár, Duna-Örs, Tapolcza. IV. S.-A.-Ujhely. V. Nagyfalu. VI. Grebenácz, Ulma. VII. Pregrada. VIII. Fiume.

461. *major* Mor. — I. Budapest, Péczel; non rara. VI. Grebenácz, Zombor. VII. Pregrada. VIII. Zengg.

462. *truncata* Pérez. — I. Budapest non rara, Kecskemét, Kisujszállás, Kalocsa. II. N.-Harsány. VI. Grebenácz, Jassenova, Deliblat.

Epeolus Latr.

463. *tristis* Smith *(speciosus* Gerst.). — I. Budapest, Péczel, Kecskemét, Mártonkáta, Kalocsa, Szeged, Debreczen. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj. VI. Mehádia, Grebenácz, Deliblat. VII. Pregrada. VIII. Fiume.

464. *variegatus* L. *(rufipes* Thoms.). — I. Budapest, Péczel, Peszér, Dabas, Kalocsa. II. Duna-Örs. VI. Grebenácz, Deliblat. VII. Pregrada, Klana. VIII. Fiume.

465. *Schummelii* Schill. — I. Péczel, Farkasd, prædium Peszér. Rarus.

466. *Jullianii* Pérez. — VIII. Apud nos tantum ad Fiume, teste H. Friese. (41, Vol. I. pag. 200.)

467. *productus* Thoms. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa, Dabas, Szeged. II. N.-Harsány. III. Érsekujvár. VI. Grebenácz, Deliblat. VIII. Fiume, Sušak.

468. *fasciatus* Friese (*transitorius* nob.). — I. Budapest, Péczel, Kecskemét, Dabas. VI. Grebenácz, Nagykikinda. VII. Pregrada. VIII. Fiume.

Epeoloides Gir.

469. *coecutiens* Fabr. — II. Parád. VI. Mehádia. VIII. Fiume. Species rara.

Nomada Scop.

470. *succincta* Panz. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. IV. Czéke, Tokaj. V. Kolozsvár, Tihucza. VI. Mehádia. VII. Zágráb. VIII. Fiume, Cirkvenica, Buccari.

471. *lineola* Panz. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa, Szeged. III. Oravicza. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Szőllőske, Tokaj, Nagymihály. V. Transsylvania. VI. Deliblat. VII. Zágráb. VIII. Fiume, Sušak, Orehovica, Lopača.

472. *alternata* K. (*Marshamella* K.). — I. Budapest, Kalocsa, Kisujszállás. III. Trencsén. IV. Nagymihály. VII. Diakovár. VIII. Sušak.

473. *mutica* Mor. — I. Budapest, in duobus tantum exemplaribus inventa.

474. *solidaginis* Panz. — I. Budapest: Fáczány. III. Hungaria superior. V. Transsylvania. VII. Pregrada. VIII. Fiume.

475. *nobilis* H. S. — I. Budapest, Péczel, Paks, Szeged. II. Keszthelyi Hévvíz. IV. S.-A.-Ujhely, Tarczal. VI. Jassenova, Ulma. VIII. Fiume, Orehovica.

476. *fucata* Panz. (*varia* Panz.). — In omni zonarum regione.

477. *jacobeae* Panz. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Szeged. II. Béllye, Zircz. III. Trencsén, Nyitra, Oravicza. IV. S.-A.-Ujhely, Szőllőske. V. Nagyszeben. VI. Mehádia. VII. Pregrada, Diakovár.

478. *sexfasciata* Panz. — I. Budapest, Kalocsa, Nagyvárad, Szeged. II. Parád, Tapolcza. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Szomotor. V. Nagy-Csűr, Segesvár, Nagyszeben. VI. Mehádia. VII. Fužine. VIII. Fiume, Sušak, Vežica.

479. *imperialis* Schmied. — I. Budapest, specimina tantum duo inventa.

480. *incisa* Schmied. — VII. Zágráb, teste H. Friese. (39, pag. 60.)

481. *Lathburiana* K. — I. Budapest, Kalocsa. III. Trencsén, Species apud nos rara.

482. *verna* Schmied. (*balteata* Schmied.). — I. Budapest. VIII. Fiume. Species rara.

483. *pectoralis* Mor. — I. Budapest, Kalocsa, Nagyvárad. Species rara.

484. *chrysopyga* Mor. — I. Budapest, Csepel, Rákos, Kecskemét, Szeged. VI. Ulma. VII. Dálya. Sat rara.

485. *speciosissima* Schmied. (*pastoralis* Schmied.). — I. Budapest, Péczel, Isaszeg. VI. Nagy-Kikinda. Species rara et tantum Hungariæ incola.

486. *discrepans* Schmied. — I. Ad Budapest in unico solum specimine inventa.

487. *trispinosa* Schmied. — I. Budapest, Péczel, Dabas, Kalocsa, Szeged, Szentes. IV. Nagymihály, Szőllőske. V. Mezőség. VII. Lipik. VIII. Sušak, Draga.

488. *Gribodoi* Schmied. — I. In Hungaria centrali ad Isaszeg specimen tantum unicum inventum.

489. *elegans* Mocs. — VI. Deliblat. Solum Hungariæ civis, a L. Biró detecta.

490. *flavomaculata* Luc. (*basalis* H. S.? *tripunctata* Mor.). — I. Budapest, Mező-Kovácsháza, Nagyvárad. II. Szegzárd, Kapornak, Balatonfüred. V. Torda, Dicső-Szentmárton. VI. Mehádia, Orsova, Grebenácz. VII. Dálya, Pregrada. VIII. Orehovica.

491. *erythrocephala* Mor. (*blepharipes* Schmied.). — I. Budapest, specimen tantum unicum inventum.

492. *mauritannica* Lep. v. *Mannii* Mor. — I. Budapest, Péczel, Rákospalota, Csepel, Rákos-Keresztúr, Jászkisér. VII. Gombos.

493. *callimorpha* Schmied. (*scita* Schmied. ♂). — I. Budapest, Ujpest, Péczel, Isaszeg, Dombiratos. VI. Ulma. Species sat rara.

494. *Mocsáryi* Schmied. — I. Ad Budapest inter Rákos-Keresztúr et Rákos-Csaba, Csepel, Dabas. VI. Ulma. Species rarissima.

495. *sybarita* Schmied. — I. Specimina duo typica ad Budapest sunt inventa. Solum Hungariæ incola.

496. *hungarica* D. T. et Friese (*scita* Schmied. excl. ♂). — I. Budapest, Rákos-Keresztúr, Szeged. V. Torda. VIII. Sušak.

497. *Schmiedeknechti* (Mocs.) Schmied. (*robusta* Mor. ?). — I. Budapest; sat rara. II. Szegzárd, Duna-Örs.

498. *melanopyga* Schmied. — I. Budapest, Péczel; species rara et solum Hungariæ civis.

499. *ochrostoma* K. (*punctiscuta* Thoms.). — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Nagyvárad. III. Trencsén, Poprád. VI. Mehádia, Resicza. VII. Pakracz. VIII. Fiume, Buccari.

500. *Braunsiana* Schmied. — VIII. Specimen tantum unicum habemus e Fiume, a Géza de Horváth inventum.

501. *guttulata* Schck. — I. Budapest; sat rara. VII. Zágráb.

502. *dira* Schmied. — I. Budapest, Péczel, Dabas.

503. *xanthosticta* K. (*lateralis* Panz.). — I. Budapest, Rákos-Palota, Péczel, Kalocsa. III. Poprád. IV. Szőllőske. V. Nagyszeben.

504. *rhenana* Mor. — I. Budapest, Péczel, Szeged. II. Szegzárd, Parád. III. Trencsén, Nyitra, Érsekujvár. V. Tasnád. VI. Ujvidék, Grebenácz. VII. Zágráb, Pregrada, Diakovár. VIII. Fiume.

505. *zonata* Panz. — I. Budapest, Kalocsa, Szeged. II. Kapornak. III. Trencsén. IV. Szőllőske, Szomotor. VI. Resicza. VII. Zágráb, Pregrada. VIII. Fiume, Sušak, Orehovica, Buccari.

506. *ruficornis* Linn. — In omni zonarum regione collecta.

v. *glabella* Thoms. — I. Budapest. VI. Mehádia. Sat rara.

v. *flava* Panz. — III. Trencsén. V. Mezőség, Nagyszeben. VII. Zágráb. VIII. Draga, Orehovica.

v. *signata* Jur. — I. Budapest, Kalocsa. III. Trencsén. IV. Czéke.

507. *cruenta* Schmied. — I. Budapest, Ráczkeve, Kalocsa. V. Mehádia. VII. Dálya. Species sat rara.

508. *bifida* Thoms. — I. Budapest, Rákospalota, Budaörs. III. Oravicza (Com. Árva). IV. Szőllőske.

509. *alboguttata* H. S. (*quinquespinosa* Thoms.). — I. Budapest, Kalocsa. IV. Szőllőske, Szomotor, Páczin, Lelesz. VI. Palics.

510. *eustalacta* Gerst. (*longiceps* Schmied.). — I. Budapest, Mátyásföld, Gödöllő, Kecskemét. Species rara.

511. *borealis* Zett. — I. In Hungaria centrali ad Rákospalota complura specimina collecta.

512. *flavoguttata* K. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa, Szeged. IV. Nagymihály. V. Nagyszeben. VI. Resicza, Mehádia, Orsova. VII. Pregrada.

513. *olympica* Schmied. (*Dalla-Torreana* Schm.). — V. Transsylvania. VI. Mehádia. Species apud nos rara.

514. *furva* Panz. (*minuta* Fabr.). — I. Budapest, Nagyvárad, Szeged. II. Kapornak. V. Mezőség. VI. Mehádia, Orsova.

515. *distinguenda* Mor. — I. Budapest, Kalocsa, Nagyvárad, Szeged. III. Pásztó (Com. Nográd). IV. S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Varannó. V. Nagyszeben. VI. Mehádia, Orsova. VII. Pregrada.

516. *bispinosa* Mocs. — I. Budapest. VI. Mehádia, Resicza. VII. Bastaji (Com. Pozsega). Species rara.

517. *Kohlii* Schmied. — I. Budapest, Nagyvárad. Species apud nos rara esse videtur.

518. *fuscicornis* Nyl. — I. Budapest. VI. Resicza. VII. Pregrada.

519. *similis* Mor. — V. Tihucza. (Com. Beszterczе-Naszód); specimen unicum.

520 *armata* H. S. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. II. Kőszeg. III. Trencsén, Tátrafüred. IV. Jászó. V. Nagyfalu, Nagyszeben. VI. Jassenova. VII. Dálya, Vrdnik, Diakovár, Fužine.

521. *mutabilis* Mor. — I. Budapest. V. Hátszeg. VI. Mehádia, Ulma, Grebenácz. VII. Dálya.

522. *femoralis* Mor. — I. Budapest, Szeged. II. Pécs, Parád. VI. Ulma, Orsova, Kazán. VII. Raduć. VIII. Fiume.

523. *corcyrea* Schmied. — I. Budapest, Csepel. IV. Tolcsva, secundum H. Friese. (39, pag. 59.)

524. *ferruginata* Linn. — I. Péczel, Kalocsa, Szeged. III. Trencsén. IV. Szobráncz, Homonna. V. Tihucza, parasita *Anthrenae humilis* Imh. Nagyszeben, Brassó. VI. Mehádia, Resicza. VII. Zágráb, Pakracz, Vaganski Vrh. VIII. Sušak, Orehovica, Buccari.

525. *cinnabarina* Mor. — I. Budapest; rara. IV. Szőllőske, Szobráncz. V. Torda, Kolozsvár. VII. Diakovár. VIII. Fiume.

526. *brevicornis* Schmied. — I. Budapest. II. N.-Harsány (Com. Baranya). V. Tasnád, Nagyszeben. VI. Mehádia, Jassenova.

527. *Fabriciana* Linn. — I. Budapest, Kalocsa. III. Vallis ad Hermanetz. IV. Tolcsva. V. Tihucza. VI. Mehádia. VII. Zágráb, Fužine. VIII. Fiume, Sušak, Draga, Buccari.

528. *obtusifrons* Nyl. Thoms. — III. Koritnicza. IV. Bártfa, Mármaros. V. Tihucza (Com. Beszterczе-Naszód). Tusnád. In montibus ubique rara.

(*immaculata* Mor. — E Mehádia, Szomotor, S.-A.-Ujhely, sub hoc nomine a H. Friese allata, ad aliam pertinet speciem).

Nomadita Mocs.

529. *montana* Mocs. — III. In montibus Tatricis ad Tátrafüred (Com. Szepes) unicum detexi specimen. Solum Hungariæ civis.

Biastes Panz.

530. *emarginatus* Schck (*punctatus* Lep.). — I. Budapest, Péczel. V. Pele-Szarvad, Kovászna, Tihucza (Com. Beszterczе-Naszód). VII. Zágráb. Species ubique rara.

531. *brevicornis* Panz. (*Pasites Schottii* F.). — I. Budapest, Csepel, Kalocsa, Szeged. II. Nagy-Kapornak, Badacsony. IV. Szőllőske. V. Pele-Szarvad, Nagyszeben. VI. Grebenácz, Nagy-Kikinda. VII. Gombos, Pregrada, Vrdnik.

Pasites Jur.

532. *maculatus* Jur. — I. Budapest, Kis-Szent-Miklós, Péczel, Peszér, Dabas, Kalocsa, Mártonkáta, Szeged, Horgos. V. Torda, Hátszeg. VI. Nagy-Kikinda, Grebenácz, Deliblat. VII. Gombos. VIII. Fiume, Cirkvenica, Portoré.

533. *minutus* Mocs. — I. Tantum Hungariæ et quidem solum centralis incola; species ad Budapest, Rákos, Csepel, Kis-Szentmiklós collecta.

Phiarus Gerst.

534. *abdominalis* Ev. (*Ammobates extraneus* Först.). — I. Budapest, Jászkisér. II. Badacsony. V. Torda. VI. Ulma, Deliblat.

Ammobates Latr.

535. *similis* Mocs. (*Phileremus punctatus* nob.). — I. Nagyvárad. II. Pécs, Nagy-Harsány. V. Peér, Tasnád. Species solum Hungariæ propria.

536. *vinctus* Gerst. (*setosus* Mor.). — I. Budapest. V. Pele-Szarvad. VII. Vrdnik. Species eximia et rara.

537. *punctatus* Fabr. v. *atratus* Mocs. (*Ammobates rufiventris* Latr. *var.*). — I. Budapest, Rákospalota, Csepel, Kalocsa. VI. Grebenácz, Deliblat.

Dioxys Lep.

538. *cincta* Jur. — VIII. Zengg a J. Padewieth inventa.

v. *jucunda* Mocs. — I. Budapest. V. Kolozsvár, Semesnye. Species ubique rara.

539. *tridentata* Nyl. — I. Budapest, Kecskemét. IV. Szőllőske. VII. Samobor. VIII. Fiume, Sušak.

Paradioxys Mocs.

540. *pannonica* Mocs. — I. Solum Hungariæ centralis incola speciesque rara.

Coelioxys Latr.

541. *haemorrhoa* Först. — I. Budapest, Kalocsa. II. Sárbogárd. Species ubique rara.

542. *erythropyga* Först. — I. Budapest, Peszér, Kalocsa, Kecskemét, Szeged. VI. Grebenácz, Deliblat. VII. Vrdnik.

543. *rufocaudata* Sm. (*octodentata* Lep., *brevis* nob.). — I. Budapest, Kalocsa, Dabas, Nagyvárad, Szeged. II. Boglár, Kapornak. III. Érsek-Ujvár. IV. Tarczal, Erdőbénye. V. Nagyszeben. VI. Zombor. VII. Pregrada. VIII. Orehovica, Buccari.

v. *echinata* Först. — I. Budapest. VIII. Fiume, rara, teste H. Friese. (41, Vol. I. pag. 81.)

544. *polycentris* Först. — I. Kalocsa, Peszér. VI. Grebenácz. Species ubique rara.

545. *Försteri* Mor. — Specimen e Budapest in Musæo Aulico Vindobonensi, teste H. Friese. (41, Vol. I. pag. 88.)

546. *argentea* Lep. (*constricta* Först.). — VI. Specimen unicum e Mehádia in Musæo Aulico Vindobonensi, quod ipse vidi. VIII. Fiume, teste H. Friese. (41, Vol. I. pag. 93.)

547. *afra* Lep. (*coronata* Först.). — I. Budapest, Kalocsa, Kisujszállás, Szeged. II. Siófok, Szegzárd, Duna-Örs. III. Szliács. IV. Tokaj. V. Pele-Szarvad, Tasnád, Torda, Szt-Erzsébet. VI. Grebenácz, Deliblat, Jassenova. VII. Dálya, Vukovár, Pregrada, Vrdnik. VIII. Fiume, Orehovica, Cirkvenica, Carlopago, Buccari, Portoré.

548. *emarginata* Först. — I. Budapest, Kecskemét, Peszér, Debreczen. II. Duna-Örs. IV. Szomotor. VI. Grebenácz, Deliblat. VIII. Zengg. Sat rara.

549. *conoidea* Illig. (*vectis* Curt.). — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa, Szeged. II. Pécs, Velencze, Siófok. III. Szliács, Puszta-Emőd. IV. Szomotor, Szőllőske, Lelesz. V. Szent-Erzsébet (Com. Szeben). VII. Dálya, Pregrada. VIII. Fiume, Buccari.

550. *mandibularis* Nyl. — III. Lucsivna. V. Tusnád (Com. Csík). Apud nos rara.

551. *elongata* Lep. (*simplex* Nyl., *tricuspidata* Först.). — I. Budapest. IV. S.-A.-Ujhely. V. Sepsi-Szent-György, Nagyszeben, Tihucza.

552. *acanthura* Ev. (*macrura* Först.). — I. Budapest. VIII. Fiume valde rara, teste H. Friese. (41, Vol. I. pag. 97.)

553. *quadridentata* Linn. (*conica* Linn., *fissidens* Först.). — I. Budapest, Csepel, Kecskemét, Mártonkáta. III. Trencsén. V. Mezőség, Nagyszeben. VIII. Fiume.

554. *acuminata* Nyl. — I. Budapest, Dabas, Kecskemét, Kisujszállás, Kalocsa, Szeged. II. Boglár, Szegzárd. III. Szliács. IV. S.-A.-Ujhely, Páczin, Tokaj, Erdőbénye, Nagymihály. V. Nagyszeben, Tusnád. VII. Vukovár, Dálya, Eszék. VIII. Fiume, Orehovica.

555. *alata* Först. — VII. Specimen unicum e Slavonia in nostra collectione.

556. *rufescens* Lep. (*diglypha* Först., *fallax* Mocs.). — In omni zonarum regione minus rara.

557. *aurolimbata* Först. (*apiculata* Först., *recurva* Schck, *reflexa* Schck). — I. Budapest, Kalocsa, Szeged. II. Baranyavár. III. Nyitra. IV. S.-A.-Ujhely, Nagymihály. V. Zilah, Semesnye, Maros-Vásárhely, Nagyszeben. VI. Rékás. VIII. Buccari, St.-Giorgio.

Stelis Panz.

558. *Frey-Gessneri* Friese. — I. Specimen unicum e Kecskemét.

559. *signata* Latr. — I. Budapest. V. Tusnád. VIII. Fiume, Sušak, Orehovica, Vežica, Cirkvenica, Novi, Portoré.

560. *nasuta* Latr. — I. Budapest e nido *Chalicodomae murariae* F. educavi. VIII. Fiume, Orehovica, St.-Giorgio, Buccari.

561. *aterrima* Panz. — I. Budapest, Kalocsa, Szeged. II. Pápa, Duna-Örs. III. Szliács, Nyitra. V. Tasnád, Semesnye, Segesvár, Nagyszeben. VII. Pétervárad, Zágráb. VIII. Fiume, Orehovica.

562. *breviuscula* Nyl. — I. Budapest, Dabas. IV. S.-A.-Ujhely, Szobráncz, Homonna, Tolcsva. V. Transsylvania. VI. Rumunyest, Grebenácz.

563. *phaeoptera* K. — I. Budapest, Kalocsa, Mártonkáta, Kecskemét, Nagyvárad, Szeged. II. Pécs, Duna-Örs, Boglár, Balatonfüred. III. Szliács, Beszterczebánya. IV. S.-A.-Ujhely, Páczin, Szinna, Forró. V. Tasnád, Torda, Kocsárd, Búzamező, Nagyszeben, Tusnád. VII. Pregrada. VIII. Orehovica, Carlopago.

564. *minuta* Lep. — V. Specimen unicum e Semesnye (Com. Szolnok-Doboka).

565. *ornatula* Klug (*octomaculata* Sm.). — I. Budapest. III. Trencsén. Rara.

Conspectus familiarum, generum specierumque.

Familia	Genus	Species
1. Tenthredinidæ	67	407
2. Siricidæ	11	31
3. Cynipidæ	22	129
4. Evaniidæ	3	23
5. Trigonalydæ	1	1
6. Ichneumonidæ	179	972
7. Stephanidæ	1	2
8. Braconidæ	71	357
9. Chalcididæ	46	84
10. Proctotrupidæ	9	12
11. Chrysididæ	8	105
12. Formicidæ	25	66
13. Heterogynidæ	9	39
14. Pompilidæ	6	57
15. Sphecidæ	37	234
16. Vespidæ	9	71
17. Apidæ	45	565
	549	3155

Summa

Familiarum	17
Generum	549
Specierum	3155

INDEX GENERUM.

Ordo. LEPIDOPTERA.

Auctoribus Ludovico Abafi-Aigner, Joanne Pável, Ferdinando Uhryk.

A lepidopterologiának művelése hazánkban a mult század második felében vette kezdetét. Scopoli János Antal, 1766—1776-ig a selmeczi akadémia tanára volt az első, ki nálunk tudományos szempontból gyűjtötte a lepkéket; őt követték Mitterpacher János és Piller Mátyás, a budai egyetem tanárai, kik ebbeli észleleteiket Pozsega megyéről írt művökben, «Iter per Poseganam Sclavoniæ provinciam», 1783-ban bocsátották nyilvánosságra.

Egy évtizeddel utóbb Budapesten találkozunk egy baráti körrel, mely a rovarászattal, főleg a lepkészettel foglalkozott. E férfiak: Koy Tóbiás és Böhm Mór János, a m. kir. udvari kamara tisztviselői, valamint Holzer és Frenreisz, valószinűleg szintén hivatalnokok. Vezérök és fejök Koy volt, ki több új fajt is fedezett fel. Gyűjteménye, 1800-ban kibocsátott jegyzéke szerint, igen tekintélyes volt. A bécsi, sőt németországi hírnevesebb gyűjtőkkel sűrű összeköttetésben állván, azok ő általa lőnek a magyar fauna gazdag voltára figyelmessé, és kezdtek mind sűrűbben hazánkba átrándulgatni.

Ilyen volt gróf Hofmannsegg János, drezdai lepkész, ki 1793/94-ben Budapest, Pécs, Szeged, Titel és Mehádia vidékein gyűjtött; Germar E. Frigyes, hallei tanár, ki a Tengermelléken búvárkodott; Dahl György, bécsi rovarkereskedő, ki 1812-től fogva több ízben járta be hazánkat és több új fajt fedezett itt fel, szintúgy mint versenytársa, Stentz Károly, bécsi rovarkereskedő, ki a 20-as évektől kezdve Felső- és Délmagyarországot, Erdélyt s a Tengermelléket kereste fel; Kollar Vincze, a bécsi cs. k. muzeum őre, ki Szerémben és Mehádián járt; báró Wimmer József, ki a 20-as évek óta húzamosb ideig tartózkodott Budán; és Kindermann Albert, ki 1820-ban Csehországból Budára jött lakni s itt ép oly buzgalommal, mint szerencsével folytatta a gyűjtést és rovarkeres-

Omnium, qui apud nos lepidopteris studuerunt, primus fuit A. J. Scopoli, professor academiæ Selmecziensis, qui in altera parte sæculi prioris, annis 1766—1776 studii causa lepidoptera colligebat, quem postea secuti J. Mitterpacher et M. Piller universitatis Budensis professores, qui suas in comitatu Pozsega animadversiones in opere «Iter per Poseganam Sclavoniæ provinciam» inscripto anno 1783 juris publici fecerunt.

Decennio post in urbe Budapest viros amititia junctos invenimus: T. Koy et J. M. Böhm cameræ regiæ Hungaricæ magistratus, deinde Holzer-um et Frenreisz-um, ut suspicamur aliquo magistratu functos, qui omnes insectis et quidem præcipue lepidopteris operam dabant. Eorum quasi dux fuit Koy, qui et multas species novas invenerat et permulta ejusmodi animalia collegerat, quod ex catalogo suo a. 1800 emisso perspici potest. A quo adducti, qui Vindobonæ atque in Germania lepidopteris studebant et magna auctoritate pollebant, et copiam faunæ nostræ animadverterant et magis magisque terram nostram frequentabant.

Ex locorum numero adducimus comitem J. Hofmannsegg Dresdensem, qui a. 1793—94 in regionibus urbium Budapest, Pécs, Szeged, Titel et Mohács lepidoptera conquirebat, Fr. E. Germar-um, professorem Halensem, loca prope mare Adriatico sita perquirentem; Georgium Dahl, insectorum mercatorem Vindobonensem, qui ab a. 1812 patriam nostram sæpius adiit et complures species novas invenit. Hujus æmulus, æque ac is Vindobonæ insectorum venditor, erat C. Stentz, qui ab a. 1820 Hungariam ad septentrionem et meridiem conversam, prætera Transylvaniam et regiones ad mare Adriaticum sitas investigabat. V. Kollar custos musæi cæs. reg. Vindobonensis regiones comitatus Szerém et urbis Mehadiæ perquisivit; J. Wimmer baro longius Budæ morabatur. A. Kindermann, qui a. 1820 ex

kedést, s ennek érdekében fiát sok évig a Keleten utaztatta. Mindkettőnek nevéhez igen számos új felfedezés fűződik. Báró WIMMER-nek külföldi ügynöke volt bizonyára dr. WALLT JÓZSEF Passauban, ki 1834-ben egy franczia szaklapban magyarországi lepkék árjegyzékét tette közzé.

Ezalatt támadtak újabb magyar lepkészek is. Ilyen volt RUMY KÁROLY GYÖRGY, iglói tanár és PIDAY JÁNOS, egyetemi tanársegéd, ki új fajt fedezett fel; utóbb pedig kivált FARKAS FERENCZ és FRIVALDSZKY IMRE. Az előbbi, budai ügyvéd, ki a 20-as évek óta gyűjtvén, Bács- és Szerémmegyében új fajokat fedezett fel és nehány fajnak magyar honosságát állapította meg. FRIVALDSZKY IMRE, orvos-doktor, 1822 óta a Nemzeti Muzeum természettudományi tárának hivatalnoka, majd őre, a ki egész életét az állattannak szentelte, a lepidopterologia terén is a legkiválóbb helyet foglalja el. Gazdag rovar-gyűjteményének jegyzéke már 1834-ben látott napvilágot. Egykorú buzgó gyűjtő volt RAU, cs. k. dohánygyári hivatalnok Fiuméban, a ki ott a többi közt a szép *Saturnia caecigená*-t fedezte fel.

A 30-as és 40-es években FRIVALDSZKY dominált ugyan a lepkészet terén, mindazáltal tisztes helyet vívott ki magának NÁTLY JÓZSEF postafőtiszt is, ki Budán, Varasdon, Sopronban és Temesvárott gyűjtve, több érdekes felfedezést tett. Kiváló lepkész volt NENDTVICH TAMÁS pécsi gyógyszerész is, ki 1846-ban bocsátotta ki Pécs faunájának jegyzékét. Kortársa volt PRAZNOVSKY IGNÁCZ, a Károlyi grófok ügyésze, ki igen tekintélyes gyűjteményre tett szert s egy-két állatot először fogott Magyarországon. Kiránduló társa, ECKSTEIN JÁNOS, pesti aranyverő, a Rákoson a róla elnevezett Psyche-fajt fedezte fel.

Nagyobb felkaroltatásban részesült a lepkészet az 1848/49-ki szabadságharczot követő évtizedben. Első sorban említendő FRANZENAU JÓZSEF, a nagyági aranybánya igazgatója, ki Hunyadmegyét alaposan átkutatván, ott mintegy 900 macro- és 400 microlepidoptera fajt gyűjtött, köztük számos hazánkra nézve új, sőt nehány egészen új fajt is. Szép gyűjteménye halála után az Erdélyi Muzeum-Egylet birtokába jutván, HERMAN OTTÓ készítette el és bocsátotta közre róla a jegyzéket.

Sokkal általánosabban foglalkozott az állattannal FRIVALDSZKY JÁNOS, a Nemzeti Muzeum természeti osztályának igazgató őre, a ki, habár leginkább a coleopterologia terén vált tekintélylyé, több hazai

Bohemia Budam transmigravit, ibi non minore studio quam fortuna insecta et conquirebat et vendebat, cujus rei causa filios suos per multos annos orientis solis partes obire jussit. Hi utrique permulta nova exploraverant. J. WALLT, qui sine dubio res baronis WIMMER apud externas gentes procurabat, a. 1834 in ephemeride quadam Gallorum, in hoc genere litterarum versanti, pretia lepidopterorum in Hungaria conquisitorum indicavit.

Interea et in Hungaria viri docti exstiterunt novi, qui lepidopteris studebant, ut G. C. RUMY professor in urbe Igló, J. PIDAY in universitate litterarum docendi adjutor, qui et speciem novam repererat, postea FR. FARKAS et E. FRIVALDSZKY, quorum alter advocatus Budensis ab a. 1820 in comitatibus Bács et Szerém cum aliquot species novas invenerat, tum aliarum Hungariam esse patriam comprobabat; alter E. FRIVALDSZKY medicinæ doctor, a. 1822 magistratus deinde custos ejus partis musæi nationalis Hungarici factus, quæ res naturæ complectitur, se totum animalibus tractandis dedidit et lepidopteris colendis quoque alios longe superat. Indicem insectorum, quorum magnum numerum collegerat, jam a. 1834 publici juris fecit. Magno studio ejusmodi res iis temporibus conquirebat et RAU magistratus officinæ cæs. regiæ tabaci in urbe Fiume, qui ibi inter alia pulcherrimam *Saturniam caecigenam* repererat.

Quamquam annis, qui sunt inter 1830 et 1840 FRIVALDSZKY omnibus, qui lepidopteris studebant antecellit, tamen non ita secundas partes iis temporibus obtinebant J. NATLY rei vehiculariæ curator, qui in urbibus Buda, Varasd, Sopron et Temesvár multa collegerat et aliquot nova repererat; TH. NENDTVICH pharmacopola in urbe Pécs, qui a. 1846 indicem faunæ hujus urbis edidit; J. PRAZNOVSKY, comitum Károlyi advocatus, horum virorum æqualis, qui permultas, in his aliquot species in Hungaria primus collegerat socio usus ILANNE ECKSTEIN aurifice, qui in campo quodam, ad urbem Budapest sito, Rákos vocato, speciem Psyches, quæ deinde ab ipso nomen duxit repererat.

Decennio post bellum pro libertate tuenda a. 1848—49 susceptum plures quam antea lepidopteris studebant. In quorum numero adducimus J. FRANZENAU auri fodinæ in urbe Nagyág præpositum, qui toto comitatu Hunyad pervestigato species macrolepidopterorum 900, microlepidopterorum 400 conquirebat, in his aliquot, quæ in Hungaria tum primum repertæ sunt, præterea et novas. Post ejus mortem omnia, quæ collegerat societas litteraria, quæ vocatur Erdélyi-Muzeum-Egylet possedit, indicem collectionis O. HERMAN composuit et edidit.

Omnia, quæ ad historiam naturalium pertinent,

és keleti utazásában a lepidopterologiának is nagy szolgálatokat tett.

Rajta kivül Budapesten, valamint vidéken többen buzgólkodtak a lepkészet ügye körül. Ezek közt első helyen állanak az Anker-testvérek, Anker Lajos, a budai takarékpénztár könyvelője, és Anker Rudolf, utóbb monori vadőr, kik Budapest környékéről több új fajjal gyarapították hazai faunánkat, szintúgy mint Pech János, a német színház zenekari tagja is.

A vidéki gyűjtők közül kiemelendők: Metelka Ferencz, dabasi gyógyszerész, ki róla elnevezett új fajt fedezett fel; dr. Török József, ref. collegiumi tanár Debreczenben, ki e vidék faunáját állította össze; Vidak Özséb és Simonics Gábor, sz. benedekrendi gymnasiumi tanárok Sopronban, kik e város környékét búvárolták; és Haberhauer József, ki eleinte Mehádián és Pécsett gyűjtve, az utóbbi helyen új *Cucullia*-fajt fedezett fel.

Az ezidétt hazánkban járó idegen gyűjtők közül Mann József, a bécsi cs. k. muzeum felügyelője, hazánkat több ízben kereste fel, és nevezetesen Mehádia, Fiume, s a horvátországi Josipdol környékén a magyar faunára nézve számos új fajt gyűjtött.

A következő évtizedben (1860—70) a budapesti lepkészek közt tisztes helyet foglal el Emich Gusztáv, az Athenaeum igazgatója, kinek az első magyar lepkészeti kézikönyv s az első kisérlet Budapest lepkefaunájának rendszeres összeállítására köszönhető.

Sok kitartással és buzgalommal foglalkozott e téren Pável János, 1863 óta a Nemz. Muzeum preparátora és gyűjtője, a ki részint a két Frivaldszkyval, részint egyedül, keresztül-kasul beutazta hazánkat, sőt Törökország és Kisázsia némely vidékét is, s igy bő alkalma nyilt a magyar faunát számos új fajjal gyarapítani. Kiváló érdeme, hogy dr. Horváth Gézá-val szövetkezve, legelőször állította össze a hazai Macrolepidopterák rendszeres jegyzékét, utóbb pedig Délmagyarország lepkefaunáját külön is kibocsátotta.

A haza különféle vidékein is támadtak lelkes lepkészek. Ilyenek a következők: Geyer G. Gyula, főgymnasiumi tanár Rozsnyón, majd Iglón, ki e két helyen, valamint a magas Tátrában gyűjtve, igen pontos jegyzeteit több ízben bocsátotta közre;

accuratius cognoscebat J. Frivaldszky. Is, quamquam magis coleopterologia colenda auctoritate valeret, tamen et ad lepidoptera penitus cognoscenda multa attulit, præcipue peregrinationibus, quas et in Hungaria et in orientis solis partibus susceperat. Sed præter hunc et in urbe Budapest et in aliis Hungariæ locis multi lepidopteris operam dabant, ex quibus primo loco proferimus fratres Anker, Ludovicum et Rud. Anker, quorum alter magistratus Budensis, alter saltuarius in pago Monor et cum eis J. Pech theatri Germanici fidicen complures novas species faunæ nostræ invenerant.

Nec tamen aliis patriæ nostræ partibus viri sui deerant, inter quos Fr. Metelka pharmacopola in pago Dabas speciem novam, de ipso nomen ducentem invenit; J. Török, professor collegii Helveticæ confessioni addictorum Debreczeniensis faunam hujus regionis conscripsit; E. Vidák et G. Simonics professores ordinis S. Benedicti in urbe Sopron loca prope hanc urbem sita perscrutabantur; J. Haberhauer primum regiones urbium Mehadia et Pécs pervestigabat et hac in urbe novam speciem generis *Cuculliae* invenit.

Ex numero externorum, qui colligendi causa patriam nostram adierunt, J. Mann præpositum musæi cæs. reg. Vindobonensis proferimus, qui in regionibus urbium Mehadia, Fiume et in valle Josipdol, in Croatia, species multas apud nos antea incognitas annotavit.

Decennio, quæ tum secutum est (1860—1870), inter viros doctos, qui Budapestini lepidopteris operam dabant, singularem locum obtinuit G. Emich, penes quem laus est et enchiridion primum lepidopterorum lingva Hungarica scriptum edidisse, et faunam urbis Budapest via et ratione componere studuisse.

Pari constantia ac studio huic rei operam dabat J. Pavel, jam ab a. 1863 musæi nationalis Hungarici præparator et collector, qui et a duobus Frivaldszky socius assumptus, et solus et patriam nostram et Turciam et Asiam Minorem saepius peragrabat multasque novas species — occasione ita oblata — faunæ Hungariæ annotabat. Magnopere laudandum est, quod socio G. Horváth sibi ascito indicem macro lepidopterorum nostrorum primus composuit, deinde autem faunam lepidopterorum Hungariæ meridionalis singillatim quoque edidit.

Sed et in aliis patriæ nostræ partibus inveniebantur, qui summo studio lepidopteris operam darent, ut J. G. Geyer prof. gymnasii primum in urbe Rozsnyó, postea in urbe Igló, qui et quæ in his locis, et quæ in montibus Tátra collegerat, sæpius juris publici faciebat; postea R. Kempelen redi-

Kempelen Radó m. kir. pénzügyi tanácsos, ki az egri faunát ismertette először; Rothe Lajos, a felső-lövői evang. tanintézet tanára, ki Vasmegye ez érdekes zugát búvárolta; Viertl Adalbert nyug. cs. és kir. vadász-kapitány, ki előbb Morva- és Gácsországban gyűjtött, 1867-ben pedig Pécsett telepedett le s e vidék kutatása közben új fajra is bukkant.

Nagy lendületet nyert a lepkészet a 70-es években. Az újabb gyűjtők közül első helyen említendő Bohatsch Ottó, bécsi kereskedő, ki, bár nem hazánk fia, lepkefaunánk érdekében e korszakban mégis legtöbbet tett, a mennyiben egy negyedszázad óta az ország sok helyén gyűjtve, a magyar faunát számos új adattal bővítette.

Budapesten ez időben Langerth József vasuti hivatalnok, Jámbory Kálmán, a m. kir. honvédelmi ministerium tisztviselője és dr. Steffek Adolf kerületi orvos gyűjtött; a hazai fauna ismeretéhez mind a hárman több új adattal járultak.

Mocsáry Sándor, a Nemzeti Muzeum állattárának őre, a lepkékre is kiterjesztette figyelmét és több megyére nézve érdekes adatokat nyujtott. Faunistikai irodalmunk gyarapításához hozzájárultak a következő gyűjtők: Méry Etel, sz. benedekrendi főgymnasiumi tanár Győrött; Kardos Károly, lyceumi tanár Máramaros-Szigeten; Rózsay Emil, főgymnasiumi tanár Pozsonyban; Farkas-Vukotinovič Lajos, körösmegyei főispán, és Herman Ottó, ki Erdély némely vidékén lepkéket is gyűjtött.

Országszerte terjedő felkarolásban részesült a epkészet az utóbbi három lustrum alatt (1880—1895). dr. Kaufmann Ernő, szabolcsbányai orvos Pécs környékén kutatott; Biró Lajos búvárlásai közben a Velebit-hegységben új Psyche-fajt fedezett fel; dr. Vángel Jenő Trencsén- és Árvamegye s a Magas Tátra faunájának ismeretéhez járult becses adatokkal.

Az újabb budapesti gyűjtők közül kiemelendők: dr. Uhryk Nándor, orvos és Abafi-Aigner Lajos, kik Pável János-sal együtt a jelen munka részére a macro-, illetőleg a microlepidopterák jegyzékét állították össze; Tomala Nándor mérnök, és Cerva A. Frigyes lithografus, a kik Budapest faunájának ismeretét nehány új adattal gyarapították.

A vidéken élő gyűjtők közt az első helyet Husz Ármin, evang. collegiumi tanár Eperjesen, foglalja el, a ki a környék faunáját búvárolván, nehány új fajváltozatot fedezett fel és számos állatnak magyar honosságát először mutatta ki. Ebbeli publicatióiba felvette Dahlström Gyula, eperjesi takarékpénztári hivatalnok nagybecsű megfigyeléseit is. Szepesmegyében Hudák Ede Ágost tanító, majd takarék-

tuum publicorum præfectus regius, qui faunam urbis Eger primus conscripsit; L. Rothe, prof. scholæ Augustanæ confessioni addictorum in urbe Felső-Lövő, qui urbis hujus regionem perscrutabatur; B. Viertl, qui Moraviam atque Galiciam perscrutatus, postea a. 1867 sedem in urbem Pécs transtulit, ejusque regionibus pervestigatis novam etiam speciem invenit.

Decennio quoque, quod tum secutum est, complures operam in lepidopteris colligendis ponebant, et quibus adducimus O. Bohatsch mercatorem Vindobonensem, qui quamquam externus, ad lepidoptera patriæ nostræ cognoscenda plurimum attulit.

His temporibus Budapestini J. Langerth viae ferratæ, — C. Jámbory consilii rerum bellicarum magistratus et A. Steffek, medicus lepidoptera colligebant et aliquantum ad faunam nostram cognoscendam afferebant.

A. Mocsáry musæi nationalis custos et lepidopteris studebat, et de aliquot comitatibus res nonnullas annotabat. Ad litteraturam faunæ nostræ augendam, qui colligendo annotandoque aliquid attulerunt, hi sunt: E. Méry, prof. gymnasii St. Benedicti in urbe Győr, C. Kardos, prof. lycei in urbe Máramaros-Sziget, Aem. Rózsay, prof. gymnasii in urbe Pozsony, L. Farkas-Vukotinovič, comes comitatus Kőrös, et O. Herman, qui in regione transylvanica et lepidoptera colligebat.

Omnium mentes animosque intra annos, qui tria efficiunt lustra (1880—1895) in se converterant lepidoptera. E. Kaufmann, med. doctor in urbe Pécs regionem hujus urbis perscrutabatur; L. Biró, montes, qui Velebit nominantur pervestigando novam speciem *Psyche*-s invenit; E. Vángel multas res, nullo modo negligendas ad faunam cognoscendam comitatuum Trencsén, Árva et montium Tátra attulit.

Ex iis, qui hodie colligendis lepidopteris Budapestini operam dant, proferimus Ferd. Uhryk, medicinæ doctorem, L. Abafi-Aigner, qui una cum J. Pável indicem macro- et microlepidopterorum huic operi composuerunt, Ferd. Tomala agrimensorem, Fr. A. Cerva lithographum, qui aliquas faunæ Budapestini novas species annotaverunt.

Ex iis, qui in aliis regni partibus huic rei student, primum locum obtinet A. Husz prof. collegii Augustanæ confessioni addictorum in urbe Eperjes, qui fauna hujus urbis perquisita nonnullas specierum variationes invenit, et multarium Hungariam quoque patriam esse primus probavit. In quibus hæc demonstraverat et ea recipiebat quæ J. Dahlström magistratus arcæ communis in urbe

pénztári igazgató Gölniczbányán búvárolta át a környéket. Nógrádmegyében gyűjt Kosztka László, gácsi gyógyszerész; Barsmegyében Nécsey István; Nyitramegyében pedig Hutten-Klingenstein M., földbirtokos Nagy-Bossánban, Bossányi József, nováki plébános és főleg Kelecsényi Károly, körjegyző Tavarnokon. Pozsony gazdag faunáját Bogsch János, főreáliskolai tanár búvárolja; Zalamegyében Redl Gusztáv, felső népiskolai igazgató kutat; Pápán Wachsmann János, nyug. urad. tiszttartó, Csákvárott Pauliny Béla, urad. ispán, Szegeden Vellay Imre hivatalnok gyűjtött; Kalocsán Thalhammer János, jézus-rendi főgymnasiumi igazgató; máramarosi Bustyaházán Piso Kornél, kir. erdész; Kolozsvárott dr. Pachinger Alajos, kegyes r. főgymnasiumi tanár; Nagyszebenben Laitzner Mór, tüzértábornok és főleg dr. Czekelius Dániel, főorvos; Fogarason Györke Lajos, tanár; Brassón Méhely Lajos, tanár; Hunyad-megyében Bardan István és Buda Ádám; Eszéken, Károlyvárosban és Rumán Hensch Andor, ezredorvos; Fiumében Meissner Károly, gyári tisztviselő, ki már több új adattal növelte a magyar fauna körét.

Az említett gyűjtők, a mennyiben még életben vannak, nagyobbára készségesen rendelkezésünkre bocsátották gyűjteseik jegyzékét, melyek alapján — a nyomatott műveket beleértve — jelen munkálat — dr. Staudinger Ottó rendszerének követésével — készült. Nekik s általában mindazon szakférfiaknak, kik művünket bármi tekintetben előmozdították, e helyen is hálás köszönetet mondunk, kivált Bohatsch Ottó-nak, ki nemcsak összes idevágó jegyzeteit volt szíves átengedni, hanem még a bécsi cs. k. muzeumban található magyar lelhelyeket is kijegyezte részünkre, és bennünket becses útbaigazításokkal is támogatott.

A felsorolt közlemények és jegyzékek némelyikébe téves vagy kétes adatok csúsztak be, a melyeket mellőzendőknek véltünk, czélunk nem az lévén, hogy bármi adat felvételével a magyar lepkefaunát minél bővebbnek mutassuk be, hanem egyedül az, hogy teljesen megbízható adatok egybeállításával a további kutatások számára biztos alapot teremtsünk és lepkefaunánk hű képét adjuk. A szigorúan megrostált anyag összegezése még mindig igen gazdagnak tünteti fel lepkefaunánkat. Ki van itt tüntetve a Nagy-lepkék (Macrolepidoptera) csoportjából 1382 faj és 321 fajváltozat, az Apró-lepkék (Microlepidoptera) csoportjából 1246 faj és 26 fajváltozat.

E fajok földrajzi elterjedését tekintve, úgy látjuk,

Eperjes, animadverterat. Ex iis, qui huic rei student, afferimus deinde A. Ed. Hudak, primum quidem ludi magistrum, postea præfectum arcæ communis in urbe Gölniczbánya, qui regiones comitatus Szepes pervestigabat; L. Kosztka pharmacopolam in urbe Gács comitatus Nógrád; St. Nécsey in comitatu Bars; M. Hutten-Klingenstein agrorum possessorem in comitatu Nyitra in pago N.-Bossán; J. Bossányi, plebanum in pago Novák, et imprimis C. Kelecsényi conventus notarium in pago Tavarnok. Adducimus præterea J. Bogsch professorem, qui faunam copiosissimam urbis Pozsony inquirit; G. Redl ludi primarii præfectum, qui in comitatu Zala, J. Wachsmann provisorem cum annuis præbendis dimissum, qui in urbe Pápa, B. Pauliny provisorem, qui in urbe Csákvár hæc animalia investigabant. In hanc rem operam collocabant præterea Emericus Vellay, magistratus in urbe Szeged; J. Thalhammer gymnasii S. Jesu director in urbe Kalocsa; Corn. Piso sylvæcultor regius in comitatu Máramaros in pago Bustyaháza; A. Pachinger professor in urbe Kolozsvár M. Laitzner, cohortis tormentariorum præfectus summus in urbe Nagy-Szeben; ibidem imprimis D. Czekelius archiater; L. Györke et L. Méhely professores, A. Buda in com. Hunyad; ille quidem in urbe Fogaras, hic in urbe Brassó; St. Basdan et Henibusch medicus legionis in urb Eszék, Károlyváros et Ruma; C. Meissner officinæ magistratus in urbe Fiume, qui jam aliquot species novas faunæ nostræ annotavit.

Eorum virorum, qui vivunt, pæne omnes summa cum liberalitate nobis indicem lepidopterorum, quæ collegerent, permiserunt; quibus indicibus et libris, typis exscriptis innisi et rationem O. Staudingeri secuti hunc librum composuimus. His et omnibus viris doctis, qui nos in instituto nostro consequendo aliquid adjuvarunt, gratias vel maximas agimus et inter hos imprimis O. Bohatsch, qui non solum annotationum suarum, quæ ad hanc rem pertinent, nobis potestatem fecit, sed etiam locos quibus hæc animalia apud nos nascuntur, quique in musæo cæs. reg. Vindobonensi reperiri possunt, annotavit nobis, sæpiusque, quam viam sequamur, amicissime significavit.

Sed cum in libros et indices supra enumeratos errores irrepsissent, cumque institutum nostrum esset, non ut aliquid recipiendo fauna lepidopterorum nostrorum copiosior videretur, sed ut rebus fidissimis conquirendis viris posthac lepidopteris studentibus fundamenta firmissima ponerentur, ipsaque lepidoptera recte describerentur: earum rerum, quæ falsæ vel dubiosæ viderentur, in librum nostrum nihil recepimus. Vero rebus quamvis reli-

hogy számos faj úgyszólván az egész földön tenyészik, a mennyiben mind az öt világrészben előfordul, északon is, a meddig ember lakik; némelyik pedig csupán Ausztráliában hiányzik. Sok faj az egész palæarcticus területen el van terjedve; faunánk jó része pedig, a sarkvidék kivételével, egész Európában és Szibériában az Altai hegységig, gyakran az Amurig, vagyis Ázsia keleti határáig, sőt Japánig is honos, sok esetben Észak-Afrika és Kis-Ázsia érintésével.

Lepkéink zöme azonban a mérsékeltebb éghajlatú Európát (a 60-ik és 37—40 fok közt) Portugalliától az Uralig lakja, olykor Angliában hiányozván, viszont Észak-Afrikát és Kis-Ázsiát érintvén. Nagy azok száma is, a melyek csupán a mérsékelt éghajlatú európai kontinensen, olykor Dél-Anglia érintésével, vagyis egyrészt Németország északi határától (55°) Genuáig vagy Corsicáig (43—45°), másrészt Francziaország keleti részétől a Volgáig előfordulnak.

Lepkéink többi része még szűkebb körre szorítkozik s e fajok *a magyar faunát jellemző állatoknak* tekintendők. Közülök némelyek kizárólag az európai havasokat, nevezetesen az Alpeseket és a Kárpátokat lakják, mint pl.: *Erebia Epiphron, melampus, melas, Gorge, Goante, Pronoë; Hadena illyrica; Gnophos serotinaria; Psodos trepidaria; Triphosa sabaudiata* stb.

Ez alpesi fajokhoz sorakoznak azok, melyek az *északibb* vidékek lakói, s a melyeknek Magyarország a legdélibb állomásuk. Ilyenek pl.: *Argynnis Pales, amathusia; Trochilium melanocephalum; Nudaria senex; Pleretes matronula; Pygaera Timon; Panthea coenobita; Agrotis hyperborea, Dahlii; Cheimatobia boreata* stb.

Viszont vannak *déli fajok*, melyek minálunk, vagy közel hozzánk érik el észak felé való elterjedésöknek végpontját; mint pl.: *Pieris Ergane; Anthocharis Belia; Lycaena Jolas; Libythea celtis; Vanessa Egea; Sesia stomoxyformis, masariformis; Zygaena punctum; Paida obtusa; Hypopta caestrum; Agrotis cos; Cucullia celsiae; Anophia leucomelas; Zethes insularis; Leucanitis stolida; Grammodes algira; Spintherops spectrum, cataphanes; Boarmia perversaria; Eupithecia fenestrata* stb.

A déli fajok egy része belevegyül a keletiek közé, a mennyiben Kis-Ázsiában is előfordulnak.

giose examinatis, tamen fauna lepidopterorum Hungariæ numero prævalet; nam ex macrolepidopteris species 1382 et variationes 321, ex microlepidopteris species 1246 et variationes 26 enumeravimus.

Has species pæne in omnibus orbis terrarum quinque partibus diffusas videmus in regionis etiamquas homines colunt, in aquilonem versas; paucæ sunt, quæ in Australia desiderantur sola. Multæ in tota regione palæarctica gignuntur, plurimæ exceptis regionibus polvero tota Europa et Sibiria ad montes Altai, sæpe ad flumen Amur, usque ad fines Asiæ ad orientem spectantis, nonnunquam etiam in imperio Japan, in parte septentrionali Africæ et in Asia Minore inveniuntur.

Sed longe major pars lepidopterorum nostrorum incolit Europam plaga mitiorem (inter polos 60—37 aut 49) ab Portugallia usque ad montes Ural. Pauca, quæ in Brittania desiderantur, rursus regiones Africæ in aquilonem spectantis et Asiam Minorem habitant. Permulta sunt, quæ sola in Europa, cœlo temperata, nonnunquam in partibus Brittanniæ meridionalibus inveniantur, id est ab finibus Germaniæ in aquilonem versis usque ad urbem Genuam et insulam Corsicam; vel ab regionibus Galliæ occidentalibus usque ad flumen Volgam.

Quæ restant ex lepidopteris nostris, quæque minores obtinent locos, faunæ Hungaricæ propria habenda sunt. Sunt ex iis, quæ altissimos Europæ montes Alpes et Carpathes incolant sola, exempli gratia: *Erebia Epiphron, melampus, melas, George, Goante, Pronoë; Hadena illyrica; Gnophos serotinaria; Psodos trepidaria; Triphosa sabaudiata* etc.

Ad has species, quæ Alpes incolunt junguntur, quæ regiones ad axem septentrionalem magis admotas habitant, et quæ versus meridiem ultra fines nostros non procedunt, ut *Argynnis Pales, amathusia; Trochilium melanocephalum; Nudaria senex; Pleretes matronula; Pygaera Timon; Panthea coenobita; Agrotis hyperborea, Dahlii; Cheimatobia boreata* etc.

Sunt rursus species magis partes orbis terrarum meridionales habitantes, quæ nostros fines aut his proximos, ad septentriones profectæ non transeunt, ut *Pieris Ergane; Antocharis belia; Lycaena Jolas; Libythea celtis; Vanessa egea; Sesia stomoxyformis, masariformis; Zygaena punctum; Paida obtusa; Hypopta caestrum, agrotis Eos; Cucullia celsiae; Anophia leucomelas; Zethes insulasis; Leucanitis stolida; Grammodes algira; Spintherops spectrum, cataphanes; Boarmia perversaria; Eupithecia fenestrata* etc.

Pars specierum regiones meridionales incolentium cum in Asia Minore quoque occurrat, permixta

Tisztán *keleti állatok*, azaz olyanok is vannak, melyek nyugat felé Magyarországon túl vagy épen nem, vagy alig vannak elterjedve, mint pl.: *Argynnis Laodice; Melanargia Larissa, Suwarovius; Pararge Roxelana, Clymene; Lasiocampa otus; Saturnia caecigena, Mamestra cavernosa; Praestilbia armeniaca; Caradrina Lepigone; Amphipyra micans; Gnophos Stevenaria* stb.

A keleti fajokkal szemben áll számos *nyugati faj*, melyek kelet felé való elterjedésének az erdélyi Kárpátok szabnak határt; ilyenek pl. *Coenonympha Oedipus; Laelia coenosa; Hybocampa Milhauseri; Hadena Maillardi; Habrynthis scita; Omias cymbalariae; Eupithecia Guenata* stb.

Végül van néhány faj és fajváltozat, mely Magyarországon kivül vagy épen nem, vagy csak igen szórványosan fordul elő. Ilyenek pl.: *Melitaea v. mehadiensis; Nemeophila Metelkana; Psyche Ecksteinii, Zelleri, undulella; Epichnopteryx Sapho; Agrotis transylvanica; Oxytrypia orbiculosa; Cucullia balsamitae, formosa; Thalpochares pannonica; Acidalia Pecharia; Eilicrinia cordiaria; Hybernia Ankeraria; Chondrosoma fiduciaria; Bormia Viertlii; Eupithecia alliaria, graphata* stb.

A fajok elterjedését illetőleg ugyanaz áll természetszerűen a *Microlepidopterákra* nézve is. Itt is úgy tapasztaljuk, hogy számos délvidéki faj nálunk éri el elterjedésének északi határát. Ilyenek: *Eurycreon sulphuralis, Crambus candiellus, Nephopteryx Metzneri, Cochylis impurana, pudorana, salebrana, Pygolopha lugubrana, Petalea festivana, Grapholitha albidulana, Eidophasia syenitella, Lita inustella, Parasia intestinella, Stomopteryx detersella, Pterolonche inspersa, Hypatima inunctella* stb.

Különösen szembeszökő az a hasonlatosság, melylyel faunánk s a *keleti vidékek*, és kivált a déloroszországi Sarepta-vidéke faunája kőzt uralkodik. Idevonatkozó fajaink: *Myelois deserticola, Aphelia Sareptana, Grapholitha Wimmerana, Atychia pumila, Ateliotum Hungaricellum, Depressaria venesulella, Glyptechia Sareptensis, Teleia anguinella, Megacraspedus lagopellus, Chilopselaphus fallax* stb.

A magasabb hegyi, úgynevezett *alpesi fajokból* felsorolhatók: *Grapholitha mendiculana, Melasina lugubris, Scardia boletella, Gelechia perpetuella* és *melaleucella, Glyphipteryx* v. *Pietruskii* stb.

inveniri potest cum eis, quæ regiones ad orientem versas habitant. Sunt præterea nonnulla, quæ regiones orientis solis habitant, neque in regionibus, quæ ultra nostros fines ad occasum solis pertinent reperiantur vel certe rarissime occurrant. Ejusmodi sunt: *Argynnis Laodice; Melanargia Larissa, v. Suwarovius; Pararge Roxelana, Clymene; Lasiocampa otus; Saturnia caecigena, Mamestra cavernosa; Praestilbia armeniaca; Caradrina Lepigone; Amphipyra micans; Gnophos Stevenaria* etc.

His speciebus ad ortum solis pertinentibus eas species occidentales ex adverso constituimus, quæ in procedendo ad orientem solem, montibus Carpathicis Transylvaniæ terminantur, ut: *Coenonympha Oedipus; Laelia coenosa; Hybocampa Milhauseri; Hadena Maillardi; Habrynthis scita; Olmias cymbalariae; Eupithecia Gueneata* etc.

Sunt denique species et variationes nonnullæ, quæ præter nostros fines non, nisi rarissime occurrunt. Ejusmodi sunt: *Melitaea v. mehadiensis; Nemeophila Metelkana; Psyche Ecksteini, Zelleri, undulella; Epichnopteryx Sapho; Agrotis transylvanica; Oxytrypia orbiculosa; Cucullia balsamitae, formosa; Thalpochares pannonica; Acidalia Pecharia; Eilicrinia cordiaria; Hybernia Ankeraria; Chondrosoma fiduciaria; Bormia Viertlii; Epithecia alliaria, graphata* etc.

De distributione specierum, hæc eadem de Microlepidopteris dici possunt, cum multæ species, in calidioribus terris viventes, ad septemtriones versus ultra nostros fines non reperiantur. Ejusmodi sunt: *Eurycreon sulphuralis, Crambus candiellus, Nephopteryx Metzneri, Cochylis impurana, pudorana, salebrana, Pygolopha lugubrana, Petalea festivana, Grapholitha albidulana, Eidophasia syenitella, Lita inustella, Parasia intestinella, Stomopteryx detersella, Pterolonche inspersa, Hypatima inunctella* etc.

Neminem deinde fugit, quanta similitudo faunæ nostræ intercedat cum fauna regionum, ad orientem vergentium, imprimis autem earum, quæ circum Sareptam in Russia meridionali sitæ sunt. Species nostræ ejus generis sunt hæ: *Myelois deserticola, Aphelia Sareptana, Grapholitha Wimmerana, Atychia pumila, Ateliotum Hungaricellum, Depressaria venesulella, Glyptechia Sareptensis, Teleia anguinella, Megacraspedus lagopellus, Chilopselaphus fallax* etc.

Ex speciebus altiorum montium sic dictis alpestribus afferendæ sunt: *Grapholitha mendiculana, Melasina lugubris, Scardia boletella, Gelechia perpetuella* et *melaleucella, Glyphipteryx* v. *Pietruskii* etc.

Végre vannak oly fajok, melyek kizárólagosan Magyarországon fordulnak elő, és másutt alig észlelteltek. Ily *speciális magyar fajok* a következők: *Ennychia Ledereri, Grapholitha lacteana* és *anserana, Steganoptycha Hungaricana, Dichroramplia cinerosana, Tinea Ankerella, Gelechia Hungariae, Cladodes rasilella, Symmoca designella, Glyphipteryx loricatella, Butalis Emichii*, és *Platyptilia capnodactyla*.

Mindezek oly fajok, melyek Magyarország faunájának jellemzésére szolgálnak.

Habár az Apró-lepkéknek e jegyzékben felsorolt számuk csekélynek látszik is, mégis elég tekintélyes számban látjuk hazánkban képviselve eme pilléket is, kivált ha meggondoljuk, hogy nálunk régi idők óta voltak ugyan kedvelői és művelői a lepidopterologiának, de alig akadtak olyanok, kik a microlepidopterákkal is behatóbban foglalkoztak volna.

Az elért eredmény azon férfiaknak is köszönhető, kik a microlepidopterák névjegyzékének szerkesztőit adatok gyűjtésével támogatták. E férfiak: Abafi Aigner Lajos, ki a haza több pontjáról igen bő anyagot gyűjtött, Bohatsch Ottó, ki Pável János-sal a bécsi udv. muzeumban a hazai microlepidopterákat összeirta, Cerva Frigyes, dr. Czekelius Dániel, Gabriely György, dr. Horváth Géza, Kohaut Rezső, Kosztka László, dr. Madarász Gyula, Meiszner Károly, dr. Rebel H., Szépligeti Győző, Tomala Nándor, Uhl Károly, dr. Vángel Jenő, gr. Wass Béla, Wachsmann Ferencz és Wachsmann János.

Sunt denique species, quæ cum nusquam nisi in Hungaria reperiantur, alicubi autem haud inveniantur, *species Hungariae propriae* sunt habendæ, ut: *Ennychia Ledereri, Grapholitha lacteana* et *anserana, Steganoptycha Hungaricana, Dichroramplia cinerosana, Tinea Ankerella, Gelechia Hungariae, Cladodes rasilella, Symmoca designella, Glyphipteryx loricatella, Butalis Emichii* et *Platyptilia capnodactyla*. Hæ species omnes ejusmodi sunt, quæ fauna Lepidopterorum Hungariæ characterem imprimant.

Quamquam species Microlepidopterorum, quæ in hoc indice enumerantur non sunt conspicuæ numero, paucitas tamen eorum nullo modo est contemnenda. In hac re enim consideran dum est multos utpote apud nos jam in antiquioribus temporibus fuisse, qui Lepidopteris studerent, sed eos, qui Microlepidopteris operam darent haud exstitisse.

Emolumenti laus his viris etiam est assignanda, qui viros, indicem hanc Microlepidopterorum conficientes rebus colligendis sublevabant. Quorum in numero sunt: L. Abafi-Aigner, qui ex plerisquæ patriæ nostræ regionibus permulta hujus cohortis animalia contulit, O. Bohatsch, qui una cum J. Pavel Microlepidoptera Hungariæ, quæ sunt in Museo Aulæ Cæsareæ-Regiæ Vindobonensi, conscripsit, præterea: Fr. Cerva, D. Czekelius dr., G. Gabriely, G. Horváth dr., R. Kohaut Lad. Kosztka, Jul. Madarász dr., C. Meiszner, H. Rebel dr., G. Szépligeti, Ferd. Tomala, C. Uhl, Eug. Vángel dr., B. Vass comt., Franc. Wachsmann et J. Wachsmann.

LITTERATURA.

1. Anker Lajos, Beschreibung eines neuen Spanners aus der Ofner Gegend (Chondrosoma fiduciaria). Verhandl. des zool.-bot. Vereins in Wien, IV. 1854. 111—112.
2. — Verzeichniss jener Lepidopteren, welche von mir um Ofen bisher gefunden worden sind. 1856. Kézirat l. Speyer, Geogr. Verbreitung der Schmetterlinge. I. 1858. 448.
3. — Budapest és környékének lepke-faunája; közli Frivaldszky János: Gerlóczy és Dulácska, Budapest és környéke természettudományi, orvosi és közmivelési le irása. Budapest, 1879. 386—90.
4. Bogsch János, Pozsony vidékének lepkéi: A pozsonyi áll. főreálisk. értesitője 1891/92. 8-r. 15 l.
5. Bohatsch Otto, Die Eupithecien Oesterreich-Ungarns: Wiener Ent. Zeit. I. 105. l. és köv. II. 185—88, 227—30; III. 294—378; VI. 117—129.
6. — Lepidopterologische Mittheilungen: U. o. IV. 143—46, 176—79.
7. — Eine neue Boarmia aus Ungarn. (Viertlii.) U. o. II. 111—14; III. 146.
8. — Beiträge zur Lepidopteren-Fauna Slavoniens. (Lipik.) II. Jahresbericht des Wiener Ent. Vereins 1891. 31—50.
9. — Mittheilungen über Eupithecien: Iris, 1893. 1—36.
10. — Verzeichniss der in Ungarn von 1869—93 gefangenen Macrolepidopteren, inclus. der in meiner Sammlung befindlichen sicher ungarischen Arten. Kézirat. (Parádi gyüjtéséről külön is.)
11. — Verzeichniss der aus Ungarn stammenden Macrolepidopteren des k. k. Hofkabinets in Wien. Kézirat.
12. Czekelius, dr. D., Verzeichniss der bisher in der Umgebung von Hermannstadt gefangenen Macrolepidopteren: Verhandl. d. siebenb. Vereins f. Naturwiss. XLII. 1892. Különnyomat. n. 8-r. 9 l.
13. Eckstein, Johann, Die Lebensweise von Thalpochares purpurina: Wiener Ent. Monatsschrift IV. 1860. 313—14.
14. — Psyche Ecksteinii: Verhandl. d. zool.-bot. Vereins in Wien VI. 1856. 755.
15. Emich Gusztáv, A Budapest környékén észlelt lepkék sorozata. Különnyomat «A kis lepkegyüjtő» czimü könyvből. Pest, 1868. 12-r. 22 l.
16. Franzenau, Josef v., Verzeichniss der bis jetzt in Siebenbürgen aufgefundenen Lepidopteren: Verhandl. der siebenb. Vereins f. Naturwiss. I. 1850. 54—64; III. 1852. 181—186; VII. 1856. 20—24; X. 1859. 25—27.
17. Frivaldszky Imre, Catalogus insectorum. Pest, 1834. 4-r. 12 l.
18. — Hazánk faunájára vonatkozó adatok és a pusztapeszéri erdő: A m. tud. társ. évk. IX. 1856. 19—28.
19. — Entomologiai kémleletek: M. t. akad. math. és term. tud. közlemények II. 1862. 231—40.
20. — Jellemző adatok Magyarország faunájához: A m. tud. akad. évk. XI. k. 4 db. Pest, 1865. 4-r., 274 l. 13 tábl.
21. Frivaldszky János, Adatok Máramaros vármegye faunájához: M. tud. akad. math. és term. tud. közlemények. IX. 1871. 183—232. l.
22. — Állattani kirándulásaim Orsova, Mehádia és Korniareva vidékein: M. orv. és term. vizsg. munkál. XIV. 1873. 197—243.
23. — Adatok Temes- és Krassómegyék faunájához: M. t. akad. math. és term. tud. közl. XIII. 1877. 363—366.
24. Fronius, Friedrich, Beobachtungen über periodische Erscheinungen im Thier- und Pflanzenreiche aus der Umgebung von Schässburg: Verhandl. der siebenb. Vereins f. Naturwiss. VII. 1856. 10—14; 197.
25. German E. Fr., Reise durch Oesterreich und Tyrol nach Dalmatien und Ragusa. Leipzig, 1814.
26. Geyer G. Gyula, Adalékok Rozsnyó vidékének faunájához: Magyar orv. és term. vizsg. munkál. XIII. 1869. 239—249.
27. — Zoophaenologiai észleletek (Rozsnyó környékén): Meteorol. és földdelej. intézet évk. I. 1871. 118—122.
28. — Zoophaenologiai észleletek Rókuszon (a keleti Tátra alján) és környékén: M. Kárpát-egyesület évkönyve II. 1875. 111—119.
29. — Zoophaenologiai észleletek Szepes-Iglón és környékén: U. o. III. 1876. 54—87; IV. 1877. 32.
30. — Állatphaenologiai adatok. Rozsnyó és környéke: U. o. IV. 1877. 2—32.
31. Herman Ottó, Lepidopterorum transylvanicorum catalogus. (Franzenau gyüjteménye.) Erd. muzeum-egyl. évk. IV. 1868. 1—17; V. 1871. 30—32.
32. — A mezőség. I. A Hódos- vagy Szarvastó és környéke: U. o. V. 1871. 28. l. Pillék.
33. — Állattani közlemények V.: U. o. 1871. évf. 95. l. Pillék.
34. Horváth Géza, dr., Csongrádmegyei lepidopterák. 1874. Kézirat.
35. — és Pável János, Magyarország nagy-pikkelyröpüinek rendszeres névjegyzéke: A m. t. akad. math. és term. tud. közl. XII. 1874. 15—74.
36. Hudák Ede Ágost, Gölniczbányai lepkék: Rovart. Lap. III. 1886. 61.
37. — Lepkészeti jegyzetek: U. o. III. 1886. 146.
38. — Adatok Gölniczbánya vidékének lepkefaunájához: U. o. III. 1886. 233—256.
39. Husz Ármin, Eperjes környékének nagy-pikkelyröpüi: A m. Kárpát-egyes. évk. VIII. 1881. 238—268. Különnyomat. 8-r. 34 l. (Német nyelven is.)
40. — Magyarország nagy-pikkelyröpüinek (Macrolepidoptera) faunájára vonatkozó új adatok: Az eperjesi ev. colleg. értesitője 1880/81. Különnyomat. 8-r. 34 l.
41. Hutten-Klingenstein M., Aufzählung der im Jahre 1881 an Saft gefangenen Nachtschmetterlinge (in Nagy-Bossán): Stettiner Ent. Zeit. 1882. 202—209.
42. Kardos Károly, Máramaros állatrajzi ismertetése: A m.-szigeti h. h. lyceum értesitője 1876/77. 14—17. l.
43. Kelecsényi Károly, Nyitramegyei lepkék: Rov. Lap. II. 1885. 16.
44. — Éjjeli lepkevadászat Nyitramegyében: U. o. 1885. 71—47.
45. — Három nyitramegyei lepkefaj: U. o. II. 1885. 187—188.
46. — Ujabb felfedezések Nyitramegye lepkefaunájából: U. o. II. 1885. 249—250.
47. — Filipendulae ab. latoconfluens: Intern. Ent. Zeitung V. 1887. 4. sz.
48. — Nyitramegyei Nagy-Tapolcsány környékének bogár- és lepke-faunája. Különl. a Nyitrai Orv.-gyógysz. és term. tudományi egyesület évkönyvéből. Nyitra 1896.
49. Kempelen Rezső, Heves és Külső-Szolnok t. e. vármegyék állattani leirása: Heves és Külső-Szolnok vm. leirása. Szerk. M. Albert Ferencz. Eger, 1868. 221—226.
50. — Jellemző adatok Eger környékének lepkefaunájához: Rovarász. Lap. I. 1883. 47—49.
51. — Pozsony környékének lepkéiről: Rovart. Lap. I. 1884. 94—99.
52. Kindermann Albert, Die Coleoptera und Lepidoptera in der Gegend von Ofen. Manuscript für die Topographie von Ofen und Pest. Kézirat Sadler József gyüjteményéből a Nemz. Muzeum állatt. oszt. könyvt. E. 15.
53. Koy, Tobias, Alphabetisches Verzeichniss meiner Insekten-Sammlung. Ofen, 1800. 16-r. 64 l.
54. (Langerth, Josef), Die Schmetterlinge Ungarns. Freie Uebersetzung aus dem Ungarischen (des Em. Frivaldszky). Ofen, 25/4. 1868. Kézirat a Nemz. Muzeum állatt. oszt. könyvt. Ec. 61.

55. — Entomologische Notate von der Pest-Ofner Fauna 1874—77. Kézirat Aigner Lajos birtokában.
56. Lurtz, Franz Eduard, Beobachtungen über einige periodische Erscheinungen im Pflanzen- und Thierreiche: Verhandl. d. siebenb. Ver. f. Naturwiss. VII. 1856. 6—9.
57. Mann, Josef, Verzeichniss der im Jahre 1853 in der Gegend von Fiume gasammelten Schmetterlinge: Wiener Ent. Monatschr. I. 1857. 139—189.
58. — Schmetterlinge gesammelt im Jahre 1866 um Josefsthal in der croatischen Militärgrenze: Verhandl. der zool.-bot. Vereins in Wien. XVII. 1867. 63—76.
59. Meissner, Karl, Schmetterlings-Fauna von Fiume. Kézirat.
60. Méry Etel, A megye állatvilága (Pillangók): Győrm. és város egyet. leirása, szerk. Fehér Ipoly. Budapest, 1874. 133—157.
61. Mocsáry Sándor, Adatok Biharmegye faunájához: A m. t. t. akad. math. és termt. közl. X. 1872. 163—200.
62. — Biharmegye téhely- és pikkelyröpüi: U. o. XI. 1873. 95—156. S ennek alapján: Benyitay Vince, Nagyvárad természetrajza. 1890. 212—223. l.
63. — Zemplén- és Ungh megyék faunájához: U. o. XIII. 1877. 131—186.
64. — Adatok Zólyom- és Liptó megyék faunájához: U. o. XV. 1878. 223—263.
65. Nendtvich Tamás, Pécsnek lepkéi és vidékökhezi viszonyaik: A m. orv. és term. vizsg. munkál. VI. Pécs, 1846. 305—308. l.
66. Pachinger Alajos, dr., A Kolozsvár vidékén gyakrabban előforduló lepkék jegyzéke: Értesitő az erd. Muzeum-egyl. orvos-term. tud. szakosztályából. XVI. 1891. II. 159—163.
67. Pável János, Délmagyarország lepke-faunája: M. orv. és term. vizsg. munkál. XXIII. Temesvár, 1886. 149—152.
68. — Adatok Magyarország lepidoptera-faunájához: Természetrajzi Füzetek. V. 1881. 197.
69. — Két érdekes araszló-pille: Rovart. Lap. I. 1884. 209. II. 1885. 195.
70. Pidav, Joannes, Praeliminaria lepidopterologia. Pestini, 1823.
71. Piller, Math. et Lud. Mitterpacher, Iter per Posegam Sclavoniae provinciam mensibus Junio et Julio anno 1782. Budae, 1783.
72. Podhraczky Ferencz és Mocsáry Sándor: Természetrajzi Szemelvények. Nagyvárad, 1868. 149—151.
73. Rebel H., dr., Verzeichniss der von Dr. R. Sturany im J. 1895 in Croatien gesammelten Lepidopteren: Verhandl. d. zool.-bot. Ges. Wien 1895. XLV. 390—392. l.
74. Redl Gusztáv, Tapolczán gyüjtött lepkék nyomtatott jegyzéke (czim nélkül). 1894. 8-r. 9 l.
75. Rothe, Ludwig, Verzeichniss der Macrolepidopteren, welche in der Umgegend Oberschützens gefunden wurden: Programm der öff. ev. Schulanstalten zu Oberschützen 1866/67. Wien, 1867. 4-r. 27—31.
76. Rózsay Emil, Pozsony és környéke nagylepkéinek jegyzéke: A pozsonyi kir. kath. főgymnasium értesitője 1877/78-ról.
77. Rumy, Karl Georg, Versuch einer Iglóer entomologischen Fauna. Bredetzky's Beytr. z. Topogr. v. Ungarn IV. 1805. 220—238; Neue Beytr. 1807. 334—352. l.
78. Scopoli J. A., Annus historico-naturalis. Lipsiae, 1771. V. 110—119. l. (Selmeczi fauna.)
79. Simonics, Gabriel, Verzeichniss der um Oedenburg (im Jahre 1855) gesammelten Microlepidopteren: Programm des Benedictiner Obergymn. zu Oedenburg. 1856. 20—23.
80. Simonkai Lajos, Aradmegye és város faunája. Lepkék: Arad vm. és Arad sz. kir. város termr. leirása III. 1893. 111—116.
81. Szalkay Gyula, dr., Délmagyarország pilléi: A temesvári m. k. áll. főreálisk. értesitője 1881/82. 3—10.
82. — Temesvár és környékének lepkéi: Term. tud. füzetek Temesvár, III. 1879. 102.—108. l.
83. Török József, Debreczen rovarfaunája ismertetése. II. Lepidoptera: M. orv. és term. vizsg. munkál. XI. 1866. 266—271. l.
84. Vaitzik Emil, Jegyzék a Selmeczbánya és vidéke körül gyüjtött lepkékről. Kézirat.
85. Vángel Jenő, dr., Adatok Kosócz és környékének lepke-faunájához: Trencsén m. term. tud. egyl. évk. VI. 1883. 29—40.
86. — Adatok Árvamegye lepke-faunájához: Rovart. Lap. II. 1886. 160—165.
87. — Adatok Trencsénmegye faunájához: U. o. III. 1886. 139—145.
88. (Vidák, Eusebius), Verzeichniss der in Oedenburg und dessen Umgebung gesammelten (Macro-) Lepidopteren: Programm des Benedictiner Obergymn. zu Oedenburg. 1856. 9—20.
89. Viertl, Adalbert, Pécs környékének lepke-faunája: Emléklapok Pécs sz. kir. város multjából és jeleneből. Szerk. dr. Ágh Timót. Pécs, 1894. 61—72. l.
90. Vukotinović Ljudevit, Fauna leptirah u okolišu Zagrebućkom: Rad jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. XLVIII. 1879. 1—129.
91. Waltl, Jos. dr., Catalogue des Lépidoptères de Hongrie: Revue entom. p. Silbermann II. 1834. 131—136.

Végül Anker Lajos, Pável János, dr. Uhryk Nándor, Cerva A. Frigyes, Kosztka László, Tomola Nándor, Zahradka F. Ignácz és Aigner Lajos jegyzetei, valamint a Nemzeti Muzeumban foglalt adatok, s az oda dr. Kertész Kálmán, Z. Kiss Endre (Szilágy), dr. Madarász Gyula (Bártfa, Fertő stb.), Méhely Lajos (Brassó és Tusnád), Metelka Ferencz (Dabas), gróf Neuhaus Emil (Nagyvárad), Pruzsinszky Zoltán (Debreczen), Thalhammer János (Kalocsa), gróf Wass Béla (Szt.-Gothárd) és másoktól ajándékul, vagy meghatározás czéljából beküldött állatok jegyzékei.

Ordo. LEPIDOPTERA.

MACROLEPIDOPTERA.

Auctoribus Ludovico Abafi-Aigner et Joanne Pável.

I. RHOPALOCERA.

Fam. PAPILIONIDÆ.

Papilio L.

1. *Podalirius* L. — In toto regno communis.
   ab. *Zanclaeus* Z. — I. Budapest. II. Pécs. III. Tavarnok. IV. Eperjes.
2. *Machaon* L. — Ubique frequens.
   ab. *sphyrus* Hb. — I. Budapest.
   ab. *aurantiaca* Spr. — I. Budapest.

Thais F.

3. *Polyxena* Schiff. — Frequens.
   v. *Cassandra* Hb. — I. Budapest. II. Pécs. III. Pozsony, Tavarnok (com. Nyitra), Kocsócz (com. Trencsén). VII. Velebit. VIII. Fiume.
   ab. *ochracea* Stgr. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Pécs. VI. Mehádia.
   ab. *rufescens* Obth. I. Arad.

Parnassius Latr.

4. *Apollo* L. — I. Vácz, montes Bihar. II. Győr, Kőszeg, Felső-Lövő, Fraknó. III. Tavarnok, com. Bars, Selmeczbánya, Beszterczebánya, Felső-Szarvas (com. Zólyom), Rózsahegy, Trencsén, Árvavára alja, Tátra, Igló, Szepesolaszi, Gölniczbánya, Rozsnyó. IV. Eperjes, Com. Máramaros. V. Kolozsvár, Kisbánya, Magura, (c. Kolozs), Radna. VII. Lič, Vaganski Vrch, Fužine, Gospić, Tuhobič, Javorje.
   v. *carpathicus* Rbl. — IV. Eperjes.
   v. *liburnicus* Rbl. e Rghfr. — VII. Velebit.
5. *Mnemosyne* L. — Non rara.

Fam. PIERIDÆ.

Aporia Hb.

1. *crataegi* L. — In toto regno communis.

Pieris Schrk.

2. *brassicae* L. — Frequens.
3. *rapae* L. — Communis.
4. *Ergane* H-G. — Rara. VIII. Fiume.
5. *napi* L. — Non rara.
   v. *napaeae* Esp. — I. Budapest, Parád, Nyiregyháza. II. Pécs. III. Tavarnok, Poprád, Gölniczbánya. IV. Eperjes. VI. Mehádia. VII. Lipik. VIII. Fiume.
   ab. *bryoniae* O. — I. Eger, Nagyvárad. III. F.-Szarvas, Kis-Kriván (com. Trencsén), Gölniczbánya. IV. Eperjes, Fajnavölgy (com. Máramaros). V. Nagyág, Nagyszeben, Brassó.
   v. *fusca* L. — III. Tátra.
6. *Daplidice* L. — In toto regno frequens.
   v. *Bellidice* O. — I. Budapest, Eger, Nagyvárad, Szolnok, Szeged. II. Pécs. III. Pozsony, Tavarnok, Kocsócz, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyszeben. VIII. Fiume.

Anthocharis B.

7. *Belia* Cr. — Rara. VII. Josipdol.
8. *cardamines* L. — In toto regno frequens.
   ab. *turritis* O. — I. Budapest. IV. Eperjes.

Leucophasia Stph.

9. *sinapis* L. (et v. *lathyri* Hb.) — Ubique communis.
   v. *diniensis* B. (et ab. *erysimi* Bkh.) — I. Budapest. II. Pécs. III. Pozsony, Tavarnok, Kocsócz, Poprád, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyszeben, Kovászna. VI. Mehádia. VII. Lipik. VIII. Fiume.

Colias F.

10. *Palaeno* L. — Valde rara. III. Lucsivna, com. Bars.
11. *Phicomone* Esp. — III. Stola (com. Szepes). IV. Eperjes, Kassa.

12. *Hyale* L. — In toto regno communis.
ab. *flava* Husz. — I. Budapest. II. Pécs. IV. Eperjes.
13. *Chrysotheme* Esp. — I. Budapest. II. Sopron. III. Nagy-Lévárd, Körmöczbánya, Kocsócz. IV. Eperjes. V. Nagyág, Gyeke. VI. Orsova.
14. *Myrmidone* Esp. — Non rara.
ab. *alba* Stgr. — III. Poprád. IV. Eperjes.
15. *Edusa* F. — In toto regno frequens.
ab. *Helice* Hb. — I. Budapest. II. Pécs, Arács. III. Pozsony, Tavarnok. IV. Eperjes. V. Nagyszeben. VI. Szabadka. VII. Lipik. VIII. Fiume.

Rhodocera B.

16. *rhamni* L. — In toto regno communis.

Fam. LYCÆNIDÆ.

Thecla F.

1. *betulae* L. — Non rara.
ab. *spinosae* Gerh. — VII. Lipik.
2. *spini* Schiff. — Ubique frequens.
ab. *Lynceus* Hb. — V. Brassó.
3. *W-album* Knoch. — I. Budapest, Parád, Eger, Nagyvárad. II. Pécs, Sopron. III. Pozsony, Tavarnok, Gács, Rozsnyó, Igló, Tátra. IV. Eperjes. V. Nagyág. VI. Mehádia. VIII. Fiume.
4. *ilicis* Esp. — In toto regno non rara.
ab. *cerris* Hb. — I. Budapest, VI. Baziás. VII. Lipik. VIII. Fiume.
v. *aesculi* Hb. — V. Nagyág.
5. *acaciae* F. — I. Budapest, Peszér, Parád, Eger, Nagyvárad. II. Pécs, Visegrád, Sopron. III. Pozsony, Tavarnok, Beszterczebánya, Rózsahegy. IV. Eperjes, Kassa, Vörösmart, mons Gutin. V. Nagyág, Nagyszeben. VII. Vrdnik, Lipik, Josipdol. VIII. Fiume.
6. *pruni* L. — In toto regno occurrit.
7. *quercus* L. — Ubique sat frequens.
ab. *bellus* Gerh. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Pécs. III. Tavarnok, Pozsony. VII. Lipik.
8. *rubi* L. — Ubique communis.

Polyommatus Latr.

9. *virgaureae* L. — In toto regno observata.
v. *Miegii* Vogel. — IV. Eperjes.
10. *Thersamon* Esp. — I. Budapest, Peszér, Parád, Eger, Nagyvárad, Arad, Szeged, Kisujszállás, Szentes. II. Pécs, Győr, F.-Lövő, Sopron. III. Pozsony, Tavarnok, Gács, Kocsócz, Rozsnyó, Gölniczbánya. IV. Eperjes, Komjáti, Szoroskő. V. Kolozsvár, Nagyág, Rea, Gyeke. VI. Jeselnicza. VII. Com. Szerém, Lipik.
11. *rutilus* Wernb. — I. Budapest, Dabas, Parád, Nagyvárad, Csongrád, Szeged. II. Pécs, Tapolcza. III. Pozsony, Tavarnok, Selmeczbánya, N.-Maros, m. Kikula, Rozsnyó. IV. Eperjes, Szoroskő. V. Nagyág, Nagyszeben. VI. Mehádia, Fehértemplom. VII. Lipik, Josipdol.
12. *Hippothoë* L. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Pécs, Tapolcza, Sopron. III. Pozsony, Tavarnok, com. Bars, Selmeczbánya, Rózsahegy, Árvavára alja, Tátra, Igló, Gölniczbánya. IV. Eperjes, com. Máramaros. V. Kolozsvár, Gyeke, Nagyág. VI. Mehádia, Ulma. VII. Josipdol.
ab. *confluens* Gerh. — III. Gölniczbánya. IV. Eperjes.
v. *Eurybia* O. — IV. Eperjes.
13. *Alciphron* Rott. — I. Budapest, Peszér, Debreczen, Nagyvárad. II. Pécs, com. Somogy. III. Pozsony, com. Liptó, Rozsnyó, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyág, Rea. VI. Báziás, Ferenczfalva. VII. Josipdol, Raduč.
v. *Gordius* Sulz. — IV. Eperjes.
14. *Dorilis* Hfn. — Ubique communis.
v. *subalpina* Spr. — III. Tavarnok.
15. *phlaeas* L. — Ubique frequens.
v. *Eleus* F. — I. Budapest. III. Tavarnok, Gölniczbánya, Poprád. IV. Eperjes. VI. Mehádia. VII. Lipik.
ab. *Schmidtii* Gerh. — III. Poprád. IV. Eperjes.
16. *Amphidamas* Esp. — I. Szolnok. III. Poprád, Rókusz. IV. Eperjes.

Lycæna F.

17. *Baetica* L. — Rara. I. Budapest. IV. Eperjes. VIII. Fiume.
18. *Telicanus* Lang. — Rarior. I. Budapest, Diósgyőr. VI. Német-Bogsán. VIII. Fiume, Buccari.
19. *argiades* Pall. — In toto regno non rara.
ab. *Coretas* O. — I. Budapest, Parád, Nagyvárad. II. Pécs. III. Pozsony, Tavarnok, Kocsócz, Árvaváralja, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyszeben, Szt-Gothárd. VII. Lipik. VIII. Fiume.
ab. *decolorata* Stgr. — VII. Lipik.
v. *Polysperchon* Bgst. — I. Budapest, Nagyvárad, Arad, Szeged. II. Pécs, Sopron. III. Pozsony, Tavarnok, Kocsócz, Gölniczbánya. IV. Eperjes, Kassa. V. Nagyág, Rea. VI. Uj-Szeged.
20. *aegon* Schiff. — In toto regno communis.
21. *Argus* L. — Frequens, regione V. excepta.
ab. *argyrognomon* Bgst. — III. Pozsony. VI. Mehádia. VII. Lipik.
22. *optilete* Knoch. — Rara. IV. Eperjes.
23. *Orion* Pall. — Ubique frequens.
ab. *nigra* Gerh. — I. Budapest. III. Gölniczbánya.

24. *Baton* Bgstr. — In toto regno non rara.
25. *astrarche* Bgstr. — Ubique frequens.
ab. *allous* Hb. — I. Budapest. IV. Eperjes.
v. *aestiva* Stgr. — III. Kocsócz. IV. Eperjes. VI. Mehádia.
26. *icarus* Rott. — Ubique communis.
ab. *icarinus* Scr. — I. Budapest. III. Pozsony, Poprád, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyszeben. VII. Lipik.
ab. *caerulea* Stgr. — III. Tavarnok. IV. Nagy-Károly. VII. Lipik.
27. *Eumedon* Esp. — III. Rozsnyó, Alsó-Kubin. IV. Eperjes. V. Nagyszeben, Maros-Ujvár.
ab. *Speyeri* Husz. — IV. Eperjes.
28. *Amanda* Schn. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Pécs. III. Javorina (com. Árva). V. Nagyág. VI. Fehértemplom.
29. *bellargus* Rott. — In toto regno communis.
ab. *ceronus* Esp. — I. Budapest, Nagyvárad. III. Pozsony, Nagy-Lévárd, Tavarnok. IV. Eperjes.
30. *Corydon* Poda. — Ubique communis.
31. *hylas* Esp. — I. Budapest, Eger, Parád, Nagyvárad. II. Pécs, Sopron. III. Pozsony, Nagy-Lévárd, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Gyilkostó (Gyergyó) VII. Lipik, Josipdol. VIII. Fiume.
32. *Meleager* Esp. — Sat frequens, regione VIII. excepta.
ab. *Steveni* Tr. — VII. Lipik.
33. *Admetus* Esp. — I. Budapest, Eger. II. Pécs. III. Pozsony, Tavarnok, Kocsócz, Árvaváralja.
34. *Damon* Schiff. — In reg. I—VI. sat frequens.
35. *argiolus* L. — Ubique sat frequens.
36. *Sebrus* B. — Rarior. IV. Eperjes. V. Kolozsvár. Nagyszeben.
37. *minima* Fssl. — In toto regno frequens.
38. *semiargus* Rott. — Non rarus.
ab. *caeca* Fuchs. — II. Pécs. IV. Eperjes.
39. *Cyllarus* Rott. — Ubique frequens.
40. *Jolas* O. — I. Budapest, Eger, Nagyvárad, II. Pécs, Sopron. III. Kocsócz, Rozsnyó. IV. Eperjes. VIII. Fiume, Buccari.
41. *Alcon* F. — I. Budapest, Eger, Pestere. II. Pécs. III. Gács, Teplicz, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Kolozsvár, Nagyág, N.-Szeben. VII. Lipik, Josipdol.
42. *euphemus* Hb. — I. Budapest. II. F.-Lövő, Sopron, III. Tavarnok, Gács, Selmeczbánya, Rozsnyó. Tátraháza, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyág. Nagyszeben. VII. Josipdol. VIII. Fiume.
43. *Arion* L. — In toto regno occurrit, reg. VIII. excepta.
44. *Arcas* Rott. — III. Nagy-Lévárd, Selmeczbánya, Poprád, Gölniczbánya. IV. Eperjes, com. Máramaros.

Fam. ERYCINIDÆ.

Nemeobius Stph.

1. *Lucina* L. — Ubique sat frequens.

Fam. LIBYTHEIDÆ.

Libythea F.

1. *celtis* Laich. — VI. Orsova. VII. Lič, Fužine. VIII. Fiume, Buccari.

Fam. APATURIDÆ.

Apatura F.

1. *Iris* L. — In toto regno non rara.
ab. *Jole* Schiff. — III. Tavarnok, Rozsnyó, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyág.
2. *Ilia* Schiff. — In regionibus I—VII. non rara.
ab. *Clytie* Schiff. — In reg. I—VII. non rara.
ab. *astasioides* Stgr. — IV. Eperjes.
ab. *Eos* Rossi (v. *Metis* Frr.). — I. Budapest. Tiszamellék. II. Pécs, F.-Lövő. IV. Eperjes. VII. Com. Szerém.

Fam. NYMPHALIDÆ.

Limenitis F.

1. *populi* L. — In toto regno occurrit, regione VII. excepta.
ab. *tremulae* Esp. — III. Tavarnok, Tátra, Igló, Gölniczbánya. IV. Eperjes. VII. Fužine.
2. *Camilla* Schiff. — I. Eger, Nagyvárad. II. Pécs, Győr. III. Pozsony, Lőcse. IV. Com. Máramaros. VI. Mehádia. VII. Vrdnik, Diakovár, Lipik, Josipdol, Fužine, Velebit. VIII. Fiume, Cirkvenica.
3. *Sibylla* L. — In toto regno occurrit, regione VIII. excepta.

Neptis F.

4. *Lucilla* F. — In toto regno occurrit, regionibus VI. et VIII. exceptis.
v. *Ludmilla* H-S. — V. Nagyszeben, Brassó. VI. Mehádia. VII. Lipik.
5. *aceris* Lepech. — Ubique occurrit, reg. VIII. excepta.

Vanessa F.

6. *levana* L. — In toto regno non rara.
ab. *porima* O. — I. Parád. III. Tavarnok. V. Nagyág. VII. Lipik.
v. *prorsa* L. — Ubique occurrit, reg. VIII. excepta.
7. *Egea* Cr. — I. Nagyvárad. VI. Mehádia. VIII. Fiume, Buccari, Cirkvenica.
8. *C-album* L. — Ubique frequens.
ab. *F-album* Esp. — I. Budapest. III. Pozsony. V. Nagyág.

9. *polychloros* L. — Ubique communis.
ab. *pyromelas* Frr. — IV. Eperjes.
10. *xanthomelas* Esp. — In toto regno observata, reg. VIII. excepta.
11. *L-album* Esp. — I. Budapest, Kecskemét, Nagyvárad. II. Pécs. III. Pozsony, Nagy-Lévárd, Tavarnok, Selmeczbánya, Lőcse. IV. Eperjes. V. Nagyág. VI. Mehádia. VII. Lipik, Com. Szerém.
12. *urticae* L. — Ubique communis.
v. *atrabatensis* Band. — VI. Kolozsvár, Nagyszeben.
13. *Io* L. — In toto regno communis.
ab. *ioides* O. — III. Selmeczbánya, Gölniczbánya. IV. Eperjes.
14. *Antiopa* L. — Nullibi rara.
15. *Atalanta* L. — In toto regno frequens.
16. *cardui* L. — Ubique communis.

Melitaea F.

17. *Cynthia* Hb. — Rara V. Nagyág.
18. *maturna* L. — Non rara sed in regione IV. deest.
19. *aurinia* Rott. — In regionibus I—VII. non rara.
v. *Merope* Prun. — III. Gölniczbánya.
v. *provincialis* B. — VII. Josipdol.
20. *Cinxia* L. — Ubique communis.
21. *Arduinna* Esp. — Rara. VII. Josipdol.
22. *Phoebe* Knoch. — In toto regno communis.
v. *aetherie* Hb. — VII. Josipdol.
v. *parva* Gerh. — VI. Mehádia.
23. *Trivia* Schiff. — Ubique frequens.
24. *didyma* O. — Ubique communis.
v. *alpina* Stgr. — I. Parád. IV. Eperjes. VII. Plitvica.
v. *meridionalis* Stgr. — VII. Lipik.
25. *dictynna* Esp. — In reg. I—V. et VII. observata.
26. *Athalia* Rott. — Ubique communis.
ab. *corythalia* Hb. — IV. Eperjes. VII. Lipik.
ab. *navarina* Selys. — IV. Eperjes.
v. *mehadiensis* Gerh. — II. Pécs. V. Mehádia. VII. Lipik.
27. *Aurelia* Nick. — Ubique sat frequens.
v. *Britomartis* Assm. — IV. Eperjes. VII. Josipdol.
28. *Parthenie* Bkh. — I. Budapest. II. Pécs. III. Pozsony, Tavarnok, Javorina, IV. Eperjes. V. Nagyág. VII. Josipdol.
v. *varia* Meyer-D. — II. Pécs. III. Tavarnok.

Argynnis F.

29. *Selene* Schiff — Non rara.
30. *Euphrosyne* L. — In toto regno non rara.
v. *Fingal* Hbst. — IV. Eperjes.
31. *Pales* Schiff. — I. Nagyvárad. IV. Eperjes.
v. *Isis* Hb. — III. Banovka (com. Árva), Tátra.
v. *Arsilache* Esp. — III. Rozsnyó, Tátra. IV. Eperjes.
32. *Dia* L. — In toto regno communis.
33. *Amathusia* Esp. — Rarior. III. Lőcse, Sz.-Olászi. IV. Eperjes.
34. *Daphne* Schiff. — Non rara in reg. I—III. et V—VIII.
35. *Ino* Rott. — II. Csákvár. III. Selmeczbánya, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Kolozsvár. VII. Josipdol.
36. *Hecate* Esp. — In toto regno occurrit, reg. VIII. excepta.
37. *Latonia* L. — Ubique frequens.
ab. *valdensis* Esp. — I. Budapest. IV. Eperjes.
38. *Aglaja* L. — Nullibi rara.
39. *Niobe* L. — In toto regno non rara.
ab. *Eris* Meig. — I. Budapest, Parád. II. F.-Lövő. III. Pozsony, Nagy-Lévárd, Tavarnok, Kocsócz, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyszeben. VIII. Fiume, Zengg.
ab. *Pelopia* Bkh. — I. Budapest. III. Nagy-Lévárd, Tavarnok. IV. Eperjes. V. Nagyszeben.
40. *Adippe* L. — Ubique sat frequens.
ab. *Cleodoxa* O. — Non rara.
41. *Laodice* Pall. — Valde rara. IV. Peér (com. Szilágy). V. Nagyszeben. Tantum duo specimina hungarica cognita.
42. *Paphia* L. — In toto regno sat frequens.
ab. *valesina* Esp. — I. Budapest. II. Pécs. IV. Eperjes. V. Nagyszeben.
43. *Pandora* Schiff. — Ubique rara.

Fam. SATYRIDÆ.

Melanargia Meig.

1. *Galatea* L. — Ubique communis.
ab. *leucomelas*. — In toto regno non rara.
ab. *Galene* O. II. Pécs. VII. Lipik.
v. *Procida* Hbst. — III. Tavarnok, Kocsócz. IV. Eperjes. V. Nagyág. VI. Mehádia. VII. Lipik, Brod, Josipdol. VIII. Fiume. Carlopago.
ab. *turcica* B. — VIII. Carlopago.
2. *Larissa* H.-G. — Rara. VIII. Fiume, Carlopago.
v. *Herta* H.-G. — VIII. Carlopago.
3. *Japygia* Cyr. v. *Suwarovius* Hbst. — I. Budapest, Peszér. II. Pécs.

Erebia B.

4. *Epiphron* Kn. — III. Tátra. IV. Eperjes. V. Kolozsvár. VI. Korniareva (com. Krassó-Szörény).
v. *Cassiope* F. — III. Tátra, Rohács (com. Árva). IV. Eperjes. VI. Mehádia.
ab. *Nelamus* B. — III. Tátra.

5. *Melampus* Fssl. — III. Tátra, Rohács, Selmeczbánya. VI. Mehádia.
6. *Mnestra* Hb. — Rara. III. Tátra.
7. *Pharte* Hb. — Rara. III. Tátra.
8. *Manto* Esp. — III. Selmeczbánya, Kis-Kriván, Tátra. IV. Pietrosz (com. Máramaros). VI. Mehádia.
9. *Ceto* Hb. — Valde rara. VI. Mehádia.
10. *Medusa* F. — In toto regno non rara.
v. *psodea* Hb. (Eumenis Frr.). — III. Tátra, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Brassó. VI. Mehádia. VII. Velebit.
v. *hippomedusa* O. — III. Tátra, Gölniczbánya. IV. Eperjes.
11. *Oeme* Hb. — Rara. III. Tátra.
v. *spodia* Stgr. — IV. Eperjes.
12. *Stygne* O. — Rara. IV. Com. Máramaros.
13. *Nerine* Frr. — IV. Com. Máramaros. V. Nagyág.
14. *melas* Hbst. — Rara. VI. Mehádia.
15. *lappona* Esp. — III. Tátra, Rohács. IV. Eperjes, Pietrosz. V. Nagyág, Zenega (com. Hunyad). VI. Mehádia.
16. *Tyndarus* Esp. (v. cassioides Esp.) — III. Tátra. VI. Mehádia.
17. *Gorge* Esp. — Rara. III. Tátra.
18. *Goante* Esp. — Rara. III. Tátra.
19. *Pronoë* Esp. — Rara. V. Com. Hunyad.
20. *aethiops* Esp. — Non rara in reg. I—VII.
v. *leucotaenia* Stgr. — III. Gölniczbánya, Strecsnó (com. Trencsén), Javorina. IV. Eperjes. VI. Mehádia. VII. Lipik.
21. *ligea* L. — Sat frequens regionibus II. et VIII. exceptis.
v. *Adyte* Hb. — III. Tátra. IV. Eperjes. V. Nagyszeben. VI. Mehádia.
22. *Euryale* Esp. — In regionibus I., III.—VI. sat frequens.
ab. *ocellaris* Stgr. — III. Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyszeben.
ab. *Philomela* Esp. — V. Nagyszeben.
v. *euryaloides* Tgr. — IV. Eperjes.

Satyrus F.

23. *Hermione* L. — In toto regno sat frequens.
24. *Alcyone* Schiff. — III. Selmeczbánya, Teplicz. IV. Eperjes. VIII. Fiume.
25. *Circe* F. — In toto regno non rara.
26. *Briseis* L. — Ubique frequens.
27. *Semele* L. — In toto regno frequens.
28. *Arethusa* Esp. — I. Budapest, Eger, Királyhágó. II. Pécs, Sopron. III. Pozsony, Nagy-Lévárd, Tavarnok, Selmeczbánya, Nagymaros, Beczkó. VI. Orsova.
29. *Statilinus* Hfn. — I. Budapest, Szeged. III. Nagy-Lévárd, Kocsócz. IV. Eperjes.
v. *Allionia* F. — VI. Mehádia. VIII. Fiume, Buccari.
30. *Dryas* Sc. — Ubique frequens, sed in regione VIII. deest.

Pararge Hb.

31. *Roxelana* Cr. — Rara. VI. Orsova.
32. *Clymene* Esp. — Rara. V. Nagyág. VI. Orsova.
33. *Maera* L. — In toto regno frequens.
v. *Adrasta* Hb. — I. Peszér. III. Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyág. VIII. Fiume.
34. *hiera* F. — I. Budapest. III. Kocsócz, Rozsnyó, Gölniczbánya. IV. Eperjes, Szádelő (comitat. Abauj-Torna.)
35. *Megaera* L. — Ubique frequens.
v. *lyssa* B. — VII. Raduč. VIII. Fiume.
36. *Egeria* L. v. *egerides* Stgr. — In toto regno frequens. (Egeria L. simul in Europa mediterranea.)
37. *achine* Sc. — In reg. I—VI. non rare.

Epinephele Hb.

38. *Lycaon* Rott. — In reg. I—V. et VIII. non rarus.
39. *Janira* L. — In toto regno frequens.
v. *Hispulla* Hb. — I. Királyhágó. III. Tavarnok, Gács, Poprád, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyág. VII. Lipik.
40. *Tithonus* L. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Pécs. III. Selmeczbánya, F.-Szarvas. IV. Eperjes. V. Nagyág. VI. Mehádia. VII. Eszék, Lipik. VIII. Fiume.
41. *Hyperanthus* L. — Ubique frequens.
ab. *Arete* Müll. — III. Pozsony, Kocsócz. IV. Eperjes.

Coenonympha Hb.

42. *Oedipus* F. — I. Budapest, Peszér. III. Selmeczbánya, Tátra. IV. Eperjes. VI. Banatus.
43. *Hero* L. — Rara. II. F.-Lövő. III. Selmeczbánya, Poprád. IV. Eperjes.
44. *Leander* Esp. — Rara. II. Nezsider. VI. Mehádia.
45. *Iphis* Schiff. — In toto regno communis.
46. *arcania* L. — Ubique frequens.
v. *Satyrion* Esp. — IV. Eperjes.
47. *pamphilus* L. — In toto regno valde frequens.
v. *Lyllus* Esp. — I. Peszér. II. Pécs. III. Poprád, Gölniczbánya. IV. Eperjes.
48. *Tiphon* Rott. — I. Debreczen, Rév (com. Bihar). IV. Eperjes. VI. Mehádia.
v. *Isis* Thnb. — VI. Bánság (coll. Staudinger).

Fam. HESPERIDÆ.

Spilothyrus Dup.

1. *alceae* Esp. — In toto regno frequens.
2. *altheae* Hb. — I. Budapest, Peszér, Debreczen. II. Pécs. III. Pozsony. IV. Eperjes. VI. Mehádia. VII. Lipik, Josipdol.
3. *lavaterae* Esp. — I. Budapest, Peszér, Debreczen, Nagyvárad. II. Pécs. III. Kocsócz. V. Nagyág. VI. Mehádia. VII. Josipdol. VIII. Fiume.

Syrichthus B.

4. *tessellum* Hb. — Rara. V. Nagyág.
5. *sidae* Esp. — V. Nagyág. VI. Mehádia, Versecz. VII Josipdol.
6. *carthami* Hb. — Ubique frequens.
   v. *Moeschleri* H.-S. — I. Budapest.
7. *alveus* Hb. — In reg. I—V. et VII., VIII. non rara.
   v. *fritillum* Hb. — I. Budapest, Eger, Nagyvárad. II. Győr, Sopron. III. Kocsócz, Turócz, Znióváralja. IV. Eperjes, Kassa. V. Nagyág, VIII. Portoré, Zengg.
   v. *cirsii* Rbr. — VI. Mehádia.
8. *serratulae* Rbr. — I. Budapest, Kisujszállás. III. Rozsnyó, m. Kikula (com. Trencsén). IV. Eperjes. V. Nagyszeben, Rea.
   v. *caecus* Frr. — IV. Eperjes.
9. *malvae* L. — Ubique frequens.
10. *orbifer* Hb. — I. Budapest, Peszér, Parád. II. Pécs, Visegrád, Felső-Lövő. IV. Eperjes.
11. *Sao* Hb. — I. Eger. II. Sopron. III. Nagy-Lévárd, Beszterczebánya, Gölniczbánya. IV. Eperjes. VI. Ujvidék. VII. Josipdol, Plitvica. VIII. Fiume.
    ab. *eucrate* O. — III. Gölniczbánya. IV. Eperjes. VII. Josipdol.

Nisoniades Hb.

12. *Tages* L. — In toto regno communis.
    v. *Cervantes* Grasl. — VII. Lipik.

Hesperia B.

13. *Thaumas* Hfn. — In regionibus I—V. et VII., VIII. sat frequens.
14. *lineola* O. — Ubique frequens.
15. *Actaeon* Rott. — III. Nagy-Lévárd, Rozsnyó. IV. Eperjes. V. Nagyág. VI. Mehádia. VII. Lipik. VIII. Fiume.
16. *sylvanus* Esp. — In toto regno frequens.
17. *comma* L. — Ubique frequens.
    ab. *Catena* Stgr. — IV. Eperjes.

Cyclopides Hb.

18. *Morpheus* Pall. — I. Budapest, Peszér, Nagyvárad. II. Pécs, Csákvár, Sopron. III. Pozsony, Kocsócz. V. Kolozsvár. VI. Báziás. VII. Vrdnik.

Carterocephalus Ld.

19. *Palaemon* Pall. — In regionibus I—VI. et VIII. non rarus.
20. *silvius* Kn. — Rarus. V. Nagyág.

II. HETEROCERA.

A) SPHINGES.

Fam. SPHINGIDÆ.

Acherontia O.

1. *Atropos* L. — In toto regno sat frequens.

Sphinx O.

2. *convolvuli* L. — Ubique; in regione VII. non observata.
3. *ligustri* L. — Ubique frequens.
   ab. *spiraeae* Esp. — IV. Eperjes.
4. *pinastri* L. — Ubique frequens, sed in regionibus V. et VIII. deest.

Deilephila O.

5. *galii* Rott. — I. Budapest, Szeged, Debreczen, Eger, Nagyvárad. II. Pécs, F.-Lövő, Sopron. III. Pozsony, Nagy-Lévárd, Tavarnok, Selmeczbánya, Kocsócz, Igló, Gölniczbánya. IV. Eperjes, Kassa, Rahó (com. Máramaros). V. Nagyág, Gyeke, Nagyszeben.
6. *euphorbiae* L. — In toto regno frequens.
7. *livornica* Esp. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Pécs, Pápa. III. Pozsony, Tavarnok, Gölniczbánya. IV. Eperjes, Kassa. V. Kolozsvár, Nagyszeben, Nagyág, Rea, Puj. VI. Orsova, Karánsebes. VII. Com. Szerém. VIII. Fiume, Buccari.
8. *celerio* L. — Rara. I. Budapest. II. Pécs. III. Pozsony.
9. *Elpenor* L. — Ubique occurrit, reg. VII. excepta.
10. *porcellus* L. — In reg. I—VII. non rara.
11. *nerii* L. — I. Budapest, Eger, Debreczen, Nagyvárad. II. Pécs. III. Pozsony, Tavarnok, Rozsnyó.

IV. Eperjes, M.-Sziget, V. Kolozsvár, Rea, Medgyes, Nagyszeben, Brassó, Fogaras. VI. Orsova, N.-Bogsán, Temesvár. VII. Krapina. VIII. Fiume, Buccari.

Smerinthus O.

12. *tiliae* L. — Ubique frequens.
v. *brunnea* Stgr. — I. Budapest. III. Tavarnok, IV. Eperjes.
13. *quercus* Schiff. — I. Budapest, Gödöllő, Eger, Nagyvárad. II. Pécs, Sopron, Com. Somogy, Com. Zala. III. Pozsony, Tavarnok, Com. Bars, Selmeczbánya, Rozsnyó. IV. Eperjes. V. Nagyág, Kolozsvár. VI. Mehádia. VIII. Fiume, Buccari.
14. *ocellata* L. — Ubique frequens.
15. *populi* L. — In toto regno frequens.

Pterogon B.

16. *Proserpina* Pall. — I. Budapest, Eger. II. Pécs, Sopron. III. Pozsony, Tavarnok, Rozsnyó, Lőcse. IV. Eperjes, Com. Máramaros. V. Nagyág, Puj. VII. Lipik. VIII. Fiume.

Macroglossa O.

17. *stellatarum* L. — Ubique frequens.
18. *croatica* Esp. — Rara. VII. Károlyváros. VIII. Fiume.
19. *bombyliformis* O. — Ubique rarior.
ab. *millesiformis* Tr. — VIII. Fiume.
20. *fuciformis* L. — Non rara.

Fam. SESIIDÆ.

Trochilium Sc.

1. *apiforme* Cl. — Ubique sat frequens.
ab. *siriciforme* Esp. — I. Budapest. V. Nagyág.
ab. *tenebrioniforme* Esp. — I. Kalocsa. II. Sopron. III. Pozsony. V. Nagyág.
2. *melanocephalum* Dalm. — Species valde rara I. Budapest, Szeged. Nonnisi duo specimina ex Hungaria cognita.

Sciapteron Stgr.

3. *tabaniforme* Rtt. — I. Budapest, Félegyháza, Szeged. II. Pécs. III. Pozsony, Tavarnok, Kocsócz. IV. Eperjes. VII. Vukovár. VIII. Fiume.

Sesia F.

4. *spheciformis* Gern. — I. Budapest. III. Rozsnyó. IV. Kassa. V. Nagyág.
5. *mesiiformis* H-S. — Valde rara. VI. Resiczabánya.
6. *andreniformis* Lasp. — Valde rara. I. Budapest. III. Pozsony.
7. *cephiformis* O. — II. Pécs. III. Pozsony, Tavarnok. V. Tusnád. VII. Gospić.
8. *tipuliformis* Cl. — Non rara.
9. *conopiformis* Esp. — Rara. I. Budapest, Nagyvárad. II. Pécs, Sopron. VII. Bánát.
10. *asiliformis* Rott. — Frequens in reg. I–VI. et VIII.
11. *myopiformis* Bkh. — I. Budapest, Nagyvárad, Makó. II. Pécs. III. Pozsony, Tavarnok, Kocsócz, Gölniczbánya. IV. Eperjes, Homonna. V. Nagyág, Nagyszeben, Fogaras.
12. *culiciformis* L. — I. Budapest, Szeged. II. Győr. III. Rozsnyó. IV. Eperjes, Bártfa. VIII. Portoré.
13. *stomoxyformis* Hb. — I. Budapest, Peszér. II. Pécs. III. Pozsony. V. Nagyág.
14. *formiciformis* Esp. — I. Budapest, Sz.-Márton-Káta, Szeged, Parád, Nagyvárad, Tótvárad. II. Pécs. III. Tavarnok, Gölniczbánya. IV. Szomotor. V. Nagyszeben.
15. *ichneumoniformis* F. — I. Budapest, Szeged. II. Pécs, Keszthely. III. Pozsony. V. Nagyszeben, Nagyág. VII. Vrdnik. VIII. Fiume, Buccari.
v. *megillaeformis* Hb. — I. Budapest. III. Pozsony. VII. Vrdnik. VIII. Buccari.
16. *uroceriformis* Tr. — Rara. I. Budapest. VIII. Portoré.
17. *masariformis* O. — Rara. I. Budapest. III. Pozsony. VI. Mehádia. VIII. Buccari.
18. *annellata* Z. — I. Budapest, Dabas, Szeged. II. Pécs. III. Kocsócz. IV. S.-A.-Ujhely, Nagyszeben. VI. Grebenácz, Oravicza. VII. Vrdnik, Josipdol.
ab. *minorata* Stgr. — I. Budapest. IV. Szomotor. VII. Vrdnik.
ab. *oxybeliformis* H-S. — I. Budapest. VII. Pétervárad.
19. *empiformis* Esp. — Ubique frequens.
20. *astatiformis* H-S. — I. Budapest. II. Csákvár. III. Kocsócz. IV. Homonna.
21. *triannuliformis* Frr. — I. Budapest, Parád, Debreczen. II. Kőszeg. VI. Mehádia, Ujvidék. VII. Vrdnik, Josipdol.
22. *colpiformis* Stgr. — Valde rara. VI. Jaszenova.
23. *stelidiformis* Frr. — I. Budapest. II. Pécs. VIII. Fiume.
v. *icteropus* H.-S. — I. Budapest.
24. *bibioniformis* Esp. — I. Budapest, Horgos. II. Pécs. VI. Uj-Szeged, Grebenácz. VII. Vrdnik.
25. *muscaeformis* Vw. — I. Budapest, Szeged. II. Pécs. III. Tavarnok. IV. Eperjes.
26. *leucomelaena* Z. — Rarior. I. Budapest.
27. *affinis* Stgr. — Rarior. I. Budapest. VII. Vrdnik.
28. *leucopsidiformis* Esp. — I. Budapest.
29. *chrysidiformis* Esp. — Rara. V. Nagyág. VIII. Fiume.

30. *chalcidiformis* Hb. — Rarior. I. Budapest. IV. S.-A.-Ujhely. VI. Mehádia.
ab. *Schmidtii* Ld. — VIII. Fiume, Buccari.

Bembecia Hb.

31. *hylaeiformis* Lasp. — I. Budapest. III. Tavarnok, Rózsahegy, Poprád. IV. Eperjes. V. Nagyág. VII. Lipik. VIII. Fiume.

Paranthrene Hb.

32. *tineiformis*. Esp. — Valde rara. I. Budapest.
v. *brosiformis* Hb. — I. Budapest. II. Pécs. VII. Vrdnik.

Fam. THYRIDIDÆ.

Thyris Ill.

1. *fenestrella* Sc. — Ubique sat frequens.

Fam. ZYGÆNIDÆ.

Ino Leach.

1. *ampelophaga* Bayle. — I. Budapest. II. Pécs, Com. Somogy, Com. Tolna, Tapolcza, Csákvár, Felső-Lövő. III.Tavarnok.VI. Orsova.VIII. Fiume.
2. *pruni* Schiff. — Non rara.
3. *chloros* Hb. — I. Budapest, Szeged. II. Pápa, Csákvár. III. Pozsony. IV. Eperjes. V. Kolozsvár. VI. Bánát
v. *sepium* B. — V. Nagyág. VIII. Fiume.
4. *tenuicornis* Z. — I. Budapest, Nagyvárad. III. Pozsony, Tavarnok, Kocsócz. V. Kolozsvár. VI. Bánát. VII. Josipdol.
5. *globulariae* Hb. — In reg. I—VI. observata.
6. *subsolana* Stgr. — I. Budapest. II. Pécs. VI. Mehádia. VIII. Fiume.
7. *budensis* Spr. — I. Budapest. II. Pápa.
8. *statices* L. — Ubique frequens.
v. *Heydenreichii* Ld. (v. *micans* H.-S.)—I. Budapest. II. Pápa. III. Tavarnok. VI. Mehádia. VIII. Fiume.

Zygaena F.

9. *pilosellae* Esp. — In toto regno frequens.
ab. *polygalae* Esp. — II. Pécs. IV. Eperjes.
ab. *Pluto* O. — I. Budapest. II. Pécs. III. Breztova (com. Árva), Kocsócz. Gölniczbánya. IV. Eperjes.
ab. *interrupta* Stgr. — II. Pécs. V. Kolozsvár.
ab. *latoconfluens* Kel. — III. Tavarnok.
v. *nubigena* Ld. — III. Tavarnok. IV. Eperjes.
10. *brizae* Esp. — I. Budapest, Eger, Parád, Nagyvárad. II. Pécs, Győr, Kőszeg, Sopron. VI. Pozsony, Tavarnok, Kocsócz, Rozsnyó. VI. Bánát.
11. *scabiosae* Schev. — Sat frequens in reg. I—VII.
12. *punctum* O. — I. Budapest, Parád. II. Pécs, Szobb (com. Somogy). III. Kocsócz. V. Nagyág. VII. Josipdol. VIII. Fiume.
13. *achilleae* Esp. — Ubique sat frequens.
v. *bellis* Hb. — II. Sopron. III. Igló. IV. Eperjes. V. Nagyág. VI. Mehádia.
ab. *viciae* Hb. — II. Pécs. III. Tavarnok. Igló. IV. Eperjes.
14. *cynarae* Esp. — I. Budapest, Dabas. II. Pécs. III. Kocsócz. Árvaváralja. V. Nagyág. VI. Bánát. VII. Lipik.
ab. *Turatii* Stdfs. — I. Budapest.
15. *meliloti* Esp. — Non rara.
v. *Stentzii* Frr. — IV. Eperjes. V. Nagyág.
16. *trifolii* Esp. — I. Budapest. III. Selmeczbánya, Poprád, Sz.-Olaszi, Tátra. IV. Eperjes. V. Nagyág. VII. Josipdol.
ab. *confluens* Stgr. — III. Poprád. IV. Eperjes.
ab. *orobi* Hb. — III. Poprád. IV. Eperjes V. Nagyág.
16. *lonicerae* Esp. — Ubique sat frequens.
18. *filipendulae* L. — Ubique sat frequens.
ab. *cytisi* Hb. — I. Budapest. II. Sopron. III. Tavarnok, Poprád. IV. Eperjes. V. Nagyszeben. VII. Lipik.
v. *Ochsenheimeri* Z. — VIII. Fiume.
19. *angelicae* O. — In toto regno frequens.
20. *transalpina* Esp. — III. Tátra, Tavarnok. IV. Eperjes. VII. Lipik, Zágráb, Josipdol. VIII. Fiume.
21. *Ephialtes* L. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Pécs. Csákvár, Győr, Sopron. III. Tavarnok, Kocsócz, Poprád, Sz.-Olaszi, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyág, Kolozsvár. VII. Zágráb. VIII. Fiume.
ab. *Medusa* Pall. — I. Budapest, Debreczen. II. Sopron. III. Poprád. IV. Eperjes. V. Nagyág, Nagyszeben, Brassó. VI. Mehádia. VII. Lipik.
ab. *coronillae* Esp. — Non rara in regionibus I—V., VII. et VIII.
ab. *trigonellae* Esp. — In toto regno sat frequens.
ab. *Aeacus* Esp. — III. Rozsnyó. IV. Eperjes. V. Nagyág.
v. *peucedani* Esp. — III. Poprád, Sz.-Olaszi. IV. Eperjes. V. Nagyág, Nagyszeben. VIII. Fiume.
ab. *athamanthae* Esp. — III. Poprád. IV. Eperjes. V. Nagyszeben, Nagyág.
22. *laeta* Hb. — I. Budapest, Peszér. III. Pozsony, Tavarnok. VI. Mehádia.
23. *fausta* L. — Valde rara. IV. Eperjes. Specimen unicum ex Hungaria cognitum.
24. *carniolica* Sc. — Ubique communis.
ab. *diniensis* H.-S. — V. Nagyszeben.

ab. *hedysari* Hb. — I. Budapest. III. Pozsony, Tavarnok. V. Kolozsvár. VI. Német-Bogsán. VIII. Fiume.
v. *flaveola* Esp. — I. Budapest.
ab. *berolinensis* Stgr. — I. Budapest. V. Nagyszeben.
ab. *amoena* Stgr. — I. Budapest.
25. *occitanica* Vill. — Rara. VII. Vrdnik.

Fam. SYNTOMIDAE.

Syntomis Ill.

1. *Phegea* L. — In toto regno communis.
ab. *Phegeus* Esp. — I. Budapest. II. Pécs, Sopron. III. Pozsony, Tavarnok. IV. Eperjes. VIII. Fiume.
ab. *Cloelia* Esp. — I. Budapest. II. Pécs. III. Nagyszombat. VI. Mehádia. VIII. Fiume.
ab. *Iphimedia* Esp. — I. Budapest. II. Pécs. III. Pozsony. VII. Lipik, Vrdnik.

Naclia B.

2. *ancilla* L. — In toto regno non rara.
3. *punctata* F. — III. Pozsony. IV. Eperjes. V. Nagyág.
v. *famula* Frr. — V. Nagyág. VIII. Fiume.
v. *hyalina* Frr. — VI. Mehádia.

B) BOMBYCES.

Fam. NYCTEOLIDAE.

Sarrothripa Gn.

1. *undulana* Hb. (Révayana S. V.) — I. Budapest. II. Pécs, F.-Lövő. IV. Eperjes. V. Nagyág. VII. Josipdol.
ab. *dilutana* Hb. — II. Pécs. III. Gölniczbánya. V. Nagyág. VII. Lipik, Josipdol. VIII. Fiume.
v. *degenerana* Hb. — II. Pécs. V. Nagyág. VIII. Fiume.
ab. *punctana* Hb. — I. Budapest. II. Pécs. V. Nagyág.
ab. *ramosana* Hb. — II. Pécs. V. Nagyág.

Earias Hb.

2. *vernana* Hb. — I. Budapest, Nagyvárad. III. Pozsony. IV. Eperjes. VIII. Fiume.
3. *clorana* L. — I. Budapest, Szeged. II. Pápa. III. Pozsony, Com. Bars. IV. Eperjes. V. Nagyág, Nagyszeben, Gyeke. VII. Lipik. VIII. Fiume.

Hylophila Hb.

4. *prasinana* L. — Non rara.
5. *bicolorana* Fssl. — I. Budapest. II. Pécs, Sopron. III. Pozsony, Selmeczbánya, Kocsócz, Rozsnyó. IV. Eperjes. V. Nagyág. VI. Mehádia. VIII. Fiume.

Nycteola H.-S.

6. *falsalis* H.-S. — Rara. VIII. Fiume.

Fam. LITHOSIDAE.

Nola Leach.

1. *togatulalis* Hb. — II. Pécs. III. Pozsony. IV. Eperjes. VIII. Fiume.
2. *cucullatella* L. — I. Budapest. II. Pécs, Kőszeg. III. Pozsony. IV. Eperjes. V. Nagyág. VII. Josipdol. VIII. Fiume.
3. *cicatricalis* Tr. — I. Budapest. II. Pécs. III. Pozsony, Gács, Igló. VIII. Portoré, Zengg.
4. *strigula* Schiff. — I. Budapest. II. Pécs. III. Pozsony. IV. Eperjes. V. Nagyág. VII. Josipdol. VIII. Martinšćica, Zengg.
5. *confusalis* H.-S. — I. Budapest. III. Pozsony. IV. Eperjes. VI. (Coll. Staudinger).
6. *ancipitalis* H.-S. — Secundum Staudinger in reg. VII. occurit.
7. *chlamydulalis* Hb. — Rara. VIII. Fiume.
8. *albula* Hb. — I. Dabas. IV. Eperjes. V. Sz.-Gothárd. VII. Lipik.
9. *centonalis* Hb. — IV. Eperjes. VIII. Fiume.
10. *cristatula* Hb. — Rara. VIII. Fiume.

Paida H.-S.

11. *obtusa* H.-S. — Rarissima. VI. Ujvidék. Tantum duo exemplaria cognita.

Nudaria Stph.

12. *senex* Hb. — Rara. IV. Eperjes.
13. *mundana* L. — III. Selmeczbánya, Rózsahegy. IV. Eperjes. VI. Mehádia. VII. Raduč. VIII. Fiume.
14. *murina* Hb. — I. Budapest. II. Sopron. III. Rozsnyó, Aggtelek. IV. Szádelő.

Calligenia Dup.

15. *miniata* Forst. — Rarior; in reg. I—VII.

Setina Schrk.

16. *irrorella* Cl. — In toto regno sat frequens.
17. *roscida* Esp. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Pécs, Csákvár. III. Pozsony, Kocsócz. IV. Eperjes. V. Nagyág. VII. Josipdol. VIII. Fiume.

18. *aurita* Esp. — III. Pozsony. IV. Com. Máramaros.
19. *mesomella* L. — In toto regno non rara.

Lithosia F.

20. *muscerda* Hfn. — I. Budapest, Dabas. II. Pécs. IV. Eperjes. VI. Palics. VII. Vrdnik.
21. *griseola* Hb. — I. Szeged, Debreczen. II. Pécs. III. Pozsony, Rozsnyó. IV. Eperjes. V. Kolozsvár. VII. Lipik.
22. *deplana* Esp. — In reg. I—VII. sat frequens.
23. *lurideola* Zinck. — Non rara, excepta reg. VI.
24. *complana* L. — Ubique sat frequens.
25. *caniola* Hb. — V. Nagyág. VI. Mehádia. VIII. Fiume.
26. *unita* Hb. — I. Budapest, Eger, Nagyvárad. II. Sopron. III. Pozsony, N.-Bossán. IV. Eperjes. V. Nagyág.
    v. *palleola* Hb. (v. *flaveola* Rbr.) — I. Budapest. II. Pécs. III. Pozsony, Kocsócz. IV. Eperjes. V. Nagyszeben, Nagyág.
    ab. *vitellina* Tr. — I. Budapest.
    v. *arideola* Hering. — IV. Eperjes.
27. *lutarella* L. — I. Budapest, Eger, Debreczen, Nagyvárad. II. Sopron. III. Pozsony, Nagy-Lévárd, Rozsnyó, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyág. VII. Josipdol.
    ab. *nigrocincta* Spr. — III. Sztraczenavölgy, Poprád. IV. Eperjes.
28. *paltifrons* Z. — Rarior. I. Budapest.
29. *sororcula* Hfn. — Plus-minus ubique frequens.

Gnophria Stph.

30. *quadra* L. — Ubique sat frequens.
31. *rubricollis* L. — Non rara in reg. I—V., et VII., VIII.

Fam. ARCTIIDAE.

Emydia B.

1. *striata* L. — Non rara in reg. I—V., VII., VIII.
    ab. *melanoptera* Brahm. — I. Budapest, Feketeerdő. VII. Josipdol.
2. *cribrum* L. — III. Tátra, Igló. IV. Eperjes. V. Nagyág. VI. Mehádia. VIII. Fiume.
    v. *punctigera* Frr. — I. Debreczen. V. Nagyszeben. VI. Mehádia.
    v. *candida* Cyr. — VI. Mehádia, Oravicza.
    v. *inquinata* Rbr. — I. Debreczen.

Deiopeia Stph.

3. *pulchella* L. — I. Budapest, Sz.-Mártonkáta. II. Pécs, Sopron. III. Pozsony, Tavarnok, Selmeczbánya. IV. Eperjes. V. Rea. VII. Lipik. VIII. Fiume, Buccari.

Euchelia B.

4. *jacobaeae* L. — Sat frequens in reg. I—V. et VII., VIII.

Nemeophila Stph.

5. *russula* L. — Non rara.
    ab. *pallida* Stgr. — VI. Mehádia (Coll. Staudinger).
6. *Metelkana* Ld. — Rara; solum in reg. I. Dabas.
7. *plantaginis* L. — In toto regno occurrit.
    ab. *hospita* Schiff. — I. Fonácza (com. Bihar). III. Rózsahegy, Koritnyicza, Sztranszke, Kocsócz, Oszobita (com. Árva), Rozsnyó, Gölniczbánya. IV. Eperjes, Arany-Idka (com. Abauj). V. Nagyszeben.

Callimorpha Latr.

8. *dominula* L. — Plus-minus frequens in reg. I—VII.
9. *Hera* L. — In toto regno sat frequens.
    ab. *lutescens* Stgr. — I. Budapest. IV. Eperjes.

Pleretes Ld.

10. *matronula* L. — I. Nagyvárad. II. Kőszeg, Sopron. III. Rozsnyó, Gölniczbánya. IV. Eperjes, Szádelő, Perecseny. V. Nagyág, Nagyszeben.

Arctia Schrk.

11. *caja* L. — Ubique communis.
12. *villica* L. — In toto regno frequens.
    ab. *Angelica* B. — II. Pécs.
    ab. *confluens* Rom. — II. Pécs.
13. *purpurata* L. — In reg. I—VI. et VIII. sat frequens.
14. *Hebe* L. — I. Budapest. II. Pápa, Tapolcza, Csákvár, F.-Lövő. III. Nagy-Lévárd, Tavarnok, Com. Bars, Selmeczbánya, Kocsócz, Sz.-Olaszi. V. Nagyág. VI. Mehádia. VII. Lipik.
15. *aulica* L. — Ubique sat frequens.
16. *maculosa* Gern. — I. Budapest, Eger, Nagyvárad. II. Sopron. III. Pozsony, Tavarnok. V. Kolozsvár. VI. Mehádia. VII. Lipik.
17. *casta* Esp. — I. Budapest, Peszér, Nagyvárad. II. Visegrád. III. Pozsony.

Ocnogyna Ld.

18. *parasita* Hb. — I. Budapest, Peszér, Eger, Verpelét. II. Pécs. III. Tavarnok, Putnok. IV. Com. Máramaros.

Spilosoma Stph.

19. *fuliginosa* L. — Ubique frequens.
v. *fervida* Stgr. — I. Budapest. III. Pozsony, Tavarnok, Rozsnyó. IV. Eperjes.
20. *luctifera* Esp. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Csákvár, Sopron. III. Nagy-Lévárd, Tavarnok, Rozsnyó. IV. Eperjes. V. Nagyág, Nagyszeben, Gyeke, Szent-Gothárd, Brassó. VIII. Fiume.
21. *luctuosa* H.-G. — II. Pécs, Csákvár. VI. Mehádia. VIII. Fiume, Sušak.
22. *mendica* Cl. — In toto regno sat frequens.
v. *rustica* Hb. — Secundum Staudinger etiam in Hungaria habitat.
23. *lubricipeda* Esp. — Non rara.
24. *menthastri* Esp. — In toto regno non rara.
25. *urticae* Esp. — In reg. I—V. et VII., VIII. non rara.

Fam. HEPIALIDAE.

Hepialus F.

1. *humuli* L. — In reg. I—VI. non rara.
2. *sylvinus* L. — In reg. I—V. et VII., VIII. non rara.
3. *velleda* Hb. — III. Pozsony, Tátra. IV. Eperjes. V. Nagyszeben. VI. M. Branu et m. Szemenik (com. Krassó).
4. *carna* Esp. — III. Rohács, Tátrafüred, Igló. IV. Eperjes. V. Nagyszeben, Montes Magura, Vurvupiatra et Vlegyásza. VI. Montes Opesata et Branu.
5. *lupulinus* L. — I. Budapest, Arad. II. Pécs. III. Pozsony, Nagy-Lévárd, Selmeczbánya, Gács, Bresztova, Igló. IV. Eperjes. V. Nagyág. VII. Josipdol. VIII. Fiume.
6. *hecta* L. — In reg. I—VI. non rara.

Fam. COSSIDAE.

Cossus F.

1. *Cossus* L. — In toto regno non rara.
2. *terebra* F. — Species rara. VIII. Fiume.

Zeuzera Latr.

3. *pyrina* L. — In toto regno non rara.

Phragmatoecia Newm.

4. *castaneae* Hb. — I. Budapest, Dabas, Szeged. VI. Baja, Zombor. VII. Eszék.

Hypopta Hb.

5. *thrips* Hb. — Rara. VIII. Fiume. (Dubiosa.)
6. *caestrum* Hb. — I. Budapest, Peszér, Tótfalu. II. Pécs, Fertő-Nezsider. III. Pozsony, Jobbágyi. VIII. Fiume.

Endagria B.

7. *ulula* Bkh. — I. Budapest, Peszér, Eger, Debreczen, Nagyvárad. II. Pécs. III. Pozsony, Gács. V. Nagyág, Sz.-Gothárd. VII. Vukovár, Lipik. VIII. Fiume, Buccari.

Fam. COCHLIOPODAE.

Heterogenea Knoch.

1. *limacodes* Hfn. — In toto regno non rara.
2. *asella* Schiff. — III. Tavarnok. IV. Eperjes. V. Nagyág, Szt.-Gothárd. VII. Lipik.

Fam. PSYCHIDAE.

Psyche Schrk.

1. *unicolor* Hfn. — Ubique frequens.
2. *villosella* O. — I. Budapest, Dabas, Szeged, Parád, Nagyvárad, Arad. II. Pécs. III. Pozsony, Kocsócz. IV. Eperjes. V. Nagyszeben. VII. Lipik. VIII. Fiume.
3. *Ecksteini* Ld. — II. Budapest. II. Pécs. III. Pozsony. V. Nagyszeben.
4. *viciella* Schiff. — I. Budapest, Parád, Nagyvárad. II. Pécs, Sopron. III. Pozsony, Tavarnok, m. Kikula, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Kolozsvár, Nagyág, Szamosujvár. VII. Lipik, Plitvica.
5. *viadrina* Stgr. — Rara. VI. Mehádia.
6. *Graslinella* B. — Rara. V. Nagyág.
7. *opacella* H.-S. — I. Budapest, Eger. III. Pozsony. Tavarnok. VI. Temesvár. VII. Zágráb. VIII. Fiume.
8. *Zelleri* Mn. — I. Budapest. VIII. Fiume.
9. *muscella* Hb. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Sopron. III. Pozsony, Tavarnok. IV. Eperjes. V. Kolozsvár, Nagyág, Nagyszeben.
10. *mediterranea* Ld. — Rara. VIII. Fiume.
11. *plumifera* O. — I. Budapest, Nagyvárad. III. Pozsony, Kocsócz. IV. Eperjes.
12. *hirsutella* Hb. — I. Budapest. III. Pozsony. IV. Eperjes, Com. Máramaros. V. Nagyág. VII. Lipik.

Epichnopteryx Hb.

13. *bombycella* Schiff. — I. Budapest. II. Sopron. III. Pozsony. IV. Eperjes. V. Nagyág. VI. Mehádia. VII. Lipik, Josipdol.
14. *undulella* F.-R. — I. Budapest, Peszér. IV. Eperjes.
15. *pulla* Esp. — Sat frequens in toto regno, reg. VI. excepta.
16. *Sieboldii* Reutt. (*plumella* O.) — Rarior. IV. Eperjes. V. Nagyág.
17. *pectinella* F. — I. Budapest, Nagyvárad. IV. Eperjes. V. Nagyág.
v. *perlucidella* Brd. — VIII. Fiume.

18. *nudella* O. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Pécs, Kőszeg. III. Pozsony. IV. Eperjes. V. Kolozsvár.
v. *vestalis* Stgr. — I. Budapest.
19. *Sappho* Mill. — I. Budapest, Eger, Arad. V. Kovászna. VII. Lipik, Josipdol.

Cochliotheca Sieb.

20. *crenulella* Brd. (*Helix* Sieb.) — I. Budapest, Szeged, Parád, Debreczen. II. Pécs. VIII. Fiume.

Fumea Hb.

21. *nitidella* Hofm. — Ubique sat frequens, solum in reg. VI. deest.
22. *affinis* Reutt. — I. Budapest, Debreczen.
23. *betulina* Z. — III. Pozsony. VII. Lipik.
24. *sepium* Spr. — Rara. VII. Lipik.

Fam. LIPARIDAE.

Penthophora Stph.

1. *morio* L. — In regionibus I—VII. communis.

Orgyia O.

2. *gonostigma* F. — I. Budapest, Szeged, Nagyvárad. II. Pécs, Sopron. III. Pozsony, Tavarnok, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyág, Medgyes. VII. Lipik.
3. *antiqua* L. — Ubique sat frequens.
4. *ericae* Germ. — I. Budapest, Peszér.
v. *intermedia* Friv. — I. Budapest, Peszér. VI. Mehádia, Grebenácz (com. Temes).

Dasychira Stph.

5. *selenitica* Esp.— II. Pécs. III. Nagy-Lévárd, Tavarnok, Selmeczbánya, Gács. IV. Eperjes.
6. *fascelina* L. — Ubique frequens.
7. *pudibunda* L. — In regionibus I—VI.

Laelia Stph.

8. *coenosa* Hb. — I. Budapest, Dabas. II. Velencze (com. Fejér). VI. Mehádia, Deliblat.

Laria Hb.

9. *L-nigrum* Müll. — I. Budapest. II. Pécs, Sopron. III. Pozsony. IV. Eperjes. V. Nagyág.

Leucoma Stph.

10. *salicis* L. — Ubique communis.

Porthesia Stph.

11. *chrysorrhoea* L. — In toto regno communis.
12. *similis* Fssl. — Ubique frequens.

Psilura Stph.

13. *monacha* L. — In toto regno plus-minus frequens.
ab. *eremita* O. — III. Selmeczbánya, Poprád. IV. Eperjes. VII. Lipik.

Ocneria H.-S.

14. *dispar* L. — Ubique communis.
15. *detrita* Esp. — I. Budapest. III. Pozsony. IV. Eperjes.
16. *rubea* F. — I. Budapest, Parád. II. Pécs. III. Pozsony. V. Nagyág. VIII. Fiume.

Fam. BOMBYCIDAE.

Bombyx B.

1. *crataegi* L. — In regionibus I—VII. non rare.
2. *populi* L. — In toto regno non rara.
3. *castrensis* L. — I. Budapest, Eger. III. Pozsony, Tavarnok, Com. Bars, Kocsócz. IV. Eperjes. V. Nagyág. VII. Josipdol. VIII. Fiume.
4. *neustria* L. — Ubique communis.
5. *lanestris* L. — In toto regno sat frequens.
6. *catax* L. — I. Budapest, Eger, Nagyvárad. II. Pécs, Tapolcza, F.-Lövő, Sopron. III. Pozsony, Tavarnok, Com. Bars, Gács, Rozsnyó. IV. Eperjes, Ungvár. V. Nagyág, Nagyszeben. VI. Temesvár. VIII. Fiume.
7. *rimicola* Hb. — I. Budapest, Eger, Nagyvárad. II. Pécs, Sopron. III. Gács. IV. Eperjes. V. Nagyszeben. VIII. Fiume.
8. *trifolii* Esp. — Ubique frequens.
ab. *medicaginis* Bkh. — I. Budapest, Debreczen, Nagyvárad. II. Pécs, Csákvár, F.-Lövő. IV. Eperjes. V. Nagyág.
9. *quercus* L. — Ubique frequens.
10. *rubi* L. — In toto regno frequens.

Crateronyx Dup.

11. *taraxaci* Esp. — I. Budapest, Eger, Nagyvárad. II. Pécs. III. Pozsony, Tavarnok, Rozsnyó, Igló, Lőcse, Gács. IV. Eperjes. V. Nagyág. VIII. Fiume.
12. *dumi* L. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Pécs, Csákvár, Pápa. III. Pozsony, Com. Bars, Gács, Rozsnyó. IV. Eperjes. V. Kolozsvár, Nagyág, Nagyszeben. VI. Mehádia. VIII. Fiume.

Lasiocampa Latr.

13. *potatoria* L. — I. Dabas, Nagyvárad. II. Pécs, F.-Lövő. III. Pozsony, Nagy-Lévárd, Tavarnok, Com. Bars, Selmeczbánya. IV. Eperjes. VIII. Fiume.
14. *pruni* L. — In toto regno non rara.

15. *quercifolia* L. — Ubique frequens.
ab. *alnifolia* O. — I. Budapest. II. Pécs. III. Pozsony, Gölniczbánya, Poprád. IV. Eperjes.
16. *populifolia* Esp. — I. Budapest, Szeged, Nagyvárad. II. Pécs, F.-Lövő. III. Pozsony, Nagy-Lévárd, Tavarnok. Lőcse, Igló. IV. Eperjes. V. Kolozsvár.
17. *tremulifolia* Hb. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Pécs, Győr, F.-Lövő, Sopron. III. Pozsony, Tavarnok, Rozsnyó. IV. Eperjes. V. Nagyág, Nagyszeben. VII. Lipik.
18. *ilicifolia* L. — I. Budapest. II. Pécs. III. Lőcse.
19. *lunigera* Esp. — Valde rara. III. Lopusnavölgy. Specimen unicum ex Hungaria cognitum.
20. *pini* L. — I. Budapest. II. F.-Lövő. III. Pozsony, Tavarnok, Selmeczbánya, Igló, Sz.-Olaszi. IV. Eperjes. V. Kolozsvár, Görgény. VI.
v. *montana* Stgr. — III. Pozsony, Tavarnok.
21. *otus* Drury. — Rara. VIII. Fiume.

Fam. ENDROMIDAE.

Endromis O.

1. *versicolora* L. — In regionibus I—VII. non rara.

Fam. SATURNIDAE.

Saturnia Schrk.

1. *pyri* Schiff. — In toto regno frequens.
2. *spini* Schiff.—In reg. I—IV.,VI. et VII. frequens.
hibr. *hybrida* O. — Rara. I. Budapest, Eger. III. Pozsony, Gács.
3. *pavonia* L. — Ubique frequens.
4. *caecigena* Kup. — Rara. VIII. Fiume, Cattaro.

Aglia O.

5. *tau* L. — In reg. I—VII. non rare.
ab. *lugens* Stdfs. — VI. Mehádia.

Fam. DREPANULIDAE.

Drepana Schrk.

1. *falcataria* L. — Non rara; solum in regione VI. deest.
2. *curvatula* Bkh. — I. Budapest. III. Pozsony, Igló. IV. Eperjes, Com. Ung.
3. *harpagula* Esp. — I. Budapest. III. Pozsony, Nagy-Lévárd. IV. Eperjes. V. Nagyág. VII. Zágráb.
4. *lacertinaria* L. — II. Sopron. III. Pozsony, Gölniczbánya. IV. Eperjes, Com. Máramaros.
5. *binaria* Hfn. — I. Budapest, Eger, Nagyvárad, Arad. II. Pécs, Sopron. III. Pozsony, Tavarnok, N.-Bossán, Rozsnyó, Sz.-Olaszi. IV. Eperjes. V. Nagyág. VII. Lipik. VIII. Fiume.
6. *cultraria* F. — I. Budapest, Eger. III. Pozsony, Tavarnok, Bellus, Rozsnyó. IV. Eperjes. V. Nagyág, Nagyszeben. VII. Lipik.

Cilix Leach.

7. *glaucata* Sc. — I. Budapest, Dabas, Kisujszállás, Nagyvárad. II. Pécs, Csákvár, Sopron. III. Pozsony, Tavarnok, Selmeczbánya, Gács, Kocsócz, Igló. IV. Eperjes. V. Nagyág, Nagyszeben, Sz.-Gothárd. VII. Lipik. VIII. Fiume.

Fam. NOTODONTIDAE.

Harpyia O.

1. *bicuspis* Bkh. — Rara. I. Budapest. III. Poprád. IV. Eperjes.
2. *furcula* L. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Pécs. III. Pozsony, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyág, Nagyszeben. VII. Lipik, Josipdol.
3. *bifida* Hb. — I. Budapest, Eger, Nagyvárad. II. Pécs, Sopron. III. Pozsony, Nagy-Lévárd. Tavarnok, Rozsnyó, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyág, Nagyszeben. VIII. Fiume.
4. *erminea* Esp. — I. Budapest, Szeged, Nagyvárad. II. F.-Lövő, III. Pozsony, Nagy-Lévárd, Tavarnok, Selmeczbánya, Lőcse, Sz.-Olaszi. IV. Eperjes. V. Nagyág. VI. VIII. Fiume.
5. *vinula* L. — Ubique sat frequens.

Stauropus Germ.

6. *fagi* L. — I. Budapest, Debreczen, Nagyvárad. II. Pécs. III. Pozsony, Nagy-Lévárd, Gács, Gölniczbánya. IV. Eperjes, Tarczal, Bodrogköz. V Kolozsvár, Nagyág. VI. Temesvár. VIII. Fiume, Buccari.

Uropus B.

7. *ulmi* Schiff. — I. Budapest, Eger, Nagyvárad. II. Pécs. III. Pozsony, Kocsócz. IV. Eperjes, Bodrogköz. V. Nagyág. VIII. Buccari.

Hybocampa Ld.

8. *Milhauseri* F. — I. Budapest. II. Pécs. III. Pozsony, Tavarnok. IV. Eperjes. V. Nagyág. VIII. Fiume.

Notodonta O.

9. *tremula* Cl. — I. Budapest, Szeged, Nagyvárad. II. Pécs, Sopron. III. Pozsony, Nagy-Lévárd, Selmeczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyág. VII. Lipik.
10. *dictaeoides* Esp. — I. Budapest. II. Pécs. III. Pozsony. IV. Eperjes. V. Nagyág.
11. *ziczac* L. — In reg. I—V. et VIII. non rara.
12. *tritophus* F. — I. Budapest, Szeged, Nagyvárad.

III. Pozsony, Nagy-Lévárd. IV. Eperjes. V. Nagyág, Nagyszeben. VI. Temesvár.

13. *trepida* Esp. — I. Budapest, Parád, Nagyvárad. II. Pécs, Sopron. III. Pozsony. IV. Eperjes. V. Nagyszeben. VIII. Fiume.

14. *torva* Hb. — I. Budapest. IV. Eperjes.

15. *dromedarius* L. — I. Budapest, Eger. II. Sopron. III. Pozsony, Nagy-Lévárd, Tavarnok, Kocsócz. IV. Eperjes. V. Nagyág. VII. Károlyváros. VIII. Fiume.

16. *chaonia* Hb. — I. Budapest, Eger. II. Pécs, Sopron. III. Pozsony, Tavarnok, Kocsócz. IV. Eperjes. V. Nagyág. VII. Plitvica.

17. *querna* F. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Pécs. III. Pozsony. IV. Eperjes. V. Nagyág. VI. Orsova.

18. *trimacula* Esp. — I. Budapest, Nagyvárad. III. Pozsony. IV. Eperjes. V. Nagyszeben. VI. Mehádia. VIII. Fiume.

v. *dodonea* Hb. — I. Budapest, Eger, Parád. II. Pécs, Sopron. III. Pozsony. IV. Eperjes.

19. *bicoloria* Schiff. — I. Budapest. II. Sopron. III. Rozsnyó. IV. Eperjes. V. Nagyág.

20. *argentina* Schiff. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Pécs, Sopron. III. Pozsony. V. Nagyág. VI. Com. Temes. VII. Lipik. VIII. Fiume.

Lophopteryx Stph.

21. *carmelita* Esp. — III. Rozsnyó. IV. Eperjes.

22. *camelina* L. — In toto regno non rara.

23. *cuculla* Esp. — I. Budapest. II. Pécs. III. Pozsony. IV. Eperjes. V. Nagyág, Nagyszeben. VI. Mehádia.

Pterostoma Germ.

24. *palpina* L. — Ubique sat frequens.

Drynobia Dup.

25. *velitaris* Rott. — II. Sopron. III. Pozsony, Tavarnok. IV. Eperjes.

26. *melagona* Bkh. — IV. Eperjes. V. Nagyág.

Gluphisia B.

27. *crenata* Esp. — III. Pozsony, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyág, Tusnád.

Ptilophora Stph.

28. *plumigera* Esp. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Pécs, Sopron. III. Pozsony, Tavarnok. IV. Eperjes. V. Nagyág.

Cnethocampa Stph.

29. *processionea* L. — Ubique communis.

30. *pityocampa* Schiff. — Rarior. II. Pécs.

Phalera Hb.

31. *bucephala* L. — Ubique frequens.

32. *bucephaloides* O. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Pécs, Nezsider. III. Pozsony, Trencsén. V. Nagyág. VI. Mehádia.

Pygaera O.

33. *Timon* Hb. — Valde rara. IV. Eperjes. Unicum solum specimen ex Hungaria cognitum.

34. *anastomosis* L. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Pécs, Sopron. III. Pozsony, Tavarnok, Com. Bars, Kocsócz. IV. Eperjes. V. Nagyág, Nagyszeben.

35. *curtala* L. — Non rara.

36. *anachoreta* F. — Ubique sat frequens.

37. *pigra* Hfn. — I. Budapest. II. Pécs, Sopron. III. Pozsony, Nagy-Lévárd. Tavarnok, Selmeczbánya, Trencsén, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyág. VIII. Fiume.

Fam. CYMATOPHORIDAE.

Gonophora Brd.

1. *derasa* L. — I. Budapest. II. Pécs. III. Pozsony, Tavarnok, Rozsnyó, Lőcse, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyág, Fogaras.

Thyatira O.

2. *batis* L. — In regionibus I—V. et VII. non rara.

Cymatophora Tr.

3. *octogesima* Hb. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Pécs. III. Pozsony, N.-Bossán. IV. Eperjes. VII. Eszék. VIII. Fiume.

4. *or* F. — In toto regno non rara.

5. *duplaris* L. — I. Budapest. II. Sopron. III. Pozsony, Igló. IV. Eperjes. V. Nagyág. VI. Palics.

6. *fluctuosa* Hb. — III. Igló. IV. Eperjes. V. Nagyág.

Asphalia Hb.

7. *ruficollis* F. — I. Budapest. II. Pécs. IV. Eperjes. VI. Mehádia.

8. *diluta* F. — I. Budapest. II. Pécs. IV. Eperjes. V. Nagyág.

9. *flavicornis* L. — I. Budapest, Parád. II. Pécs, Sopron. III. Pozsony, Nagy-Lévárd, Tavarnok, Selmeczbánya, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyág, Nagyszeben. VI. Mehádia.

10. *ridens* F. — I. Budapest. II. Pécs, Sopron. III. Pozsony, Nagy-Lévárd, Kocsócz. IV. Eperjes. V. Nagyág, Nagyszeben. VIII. Fiume.

C) NOCTUAE.

Fam. NOCTUIDÆ.

Diloba Steph.

1. *coeruleocephala* L. — Ubique frequens.

Simyra O.

2. *nervosa* F. — I. Budapest. II. Visegrád, Pécs. III. Pozsony. V. Nagyág.

Arsilonche Ld.

3. *albovenosa* Göze. — Rarior. I. Budapest, Eger. IV Eperjes.

Clidia B.

4. *geographica* F. — I. Budapest, Szeged. II. Pécs. III. Pozsony, Nagy-Lévárd, Kocsócz. IV. Eperjes. VI. Orsova, Grebenácz.

Demas Steph.

5. *coryli* L. — Ubique occurrit, sed in reg. VI. deest.

Acronycta O.

6. *leporina* L. — II. Sopron. III. Pozsony, N.-Bossán, Rozsnyó, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyág, Rea, Nagyszeben. VII. Lipik.
   v. *bradyporina* Tr. — II. Sopron. III. Pozsony. V. Nagyág.
7. *aceris* L. — Ubique frequens.
   ab. *candelisequa* Esp. — I. Budapest. III. Pozsony.
8. *megacephala* F. — In toto regno sat frequens.
9. *alni* L. — Rara. I. Nagyvárad. IV. Eperjes. V. Nagyág. VIII. Fiume.
10. *strigosa* F. — I. Eger, Debreczen, Peér. III. Pozsony, Tavarnok, Nagy-Bossán, Rozsnyó, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Kolozsvár, Oláhpián, Nagy-Szeben, Brassó, Szt.-Gothárd.
11. *tridens* Schiff. — Ubique sat frequens, regione VII. excepta.
12. *psi* L. — In regionibus I—VII. non rara.
13. *cuspis* Hb. — III. Nagy-Lévárd, Tavarnok, Poprád. IV. Eperjes. V. Nagyág.
14. *menyanthidis* Vw. — Rarior. IV. Eperjes. V. Nagyág.
15. *auricoma* F. — I. Budapest. II. Pécs, Sopron. III. Pozsony, Tavarnok, Kocsócz, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyág. VII. Josipdol.
16. *abscondita* Fr. — Rara. I. Budapest.
17. *euphorbiae* F. — In reg. I—V. et VII. non rara.
18. *euphrasiae* Brahm. — Rara. VIII. Fiume.
19. *rumicis* L. — In toto regno frequens.
20. *ligustri* F. — In reg. I—V. et VIII. non rara.

Bryophila Tr.

21. *raptricula* Hb. — I. Budapest, Szeged, Debreczen, Nagyvárad. II. Sopron. III. Pozsony, Tavarnok, Kocsócz. IV. Eperjes.
   ab. *deceptricula* Hb. — I. Budapest. II. Pécs, Sopron. IV. Eperjes.
22. *fraudatricula* Hb. — I. Budapest, Szeged, II. Pécs, Sopron. III. Pozsony, Tavarnok. IV. Eperjes. V. Kolozsvár, Nagyszeben.
23. *receptricula* Hb. — I. Budapest, Parád, Kecskemét, Kisujszállás, Debreczen, Nagyvárad. II. Pécs, Sopron. III. Pozsony, Tavarnok, Rózsahegy, Kocsócz, Tátra. IV. Eperjes. V. Nagyág. VIII. Fiume.
24. *ravula* Hb. — III. Pozsony. V. Nagyág.
   v. *ereptricula* Tr. — I. Budapest. III. Pozsony. IV. Eperjes. V. Nagyág, Nagyszeben.
25. *algae* F. — I. Budapest, Eger, Nagyvárad. II. Pécs. III. Pozsony, Tavarnok, Kocsócz. IV. Eperjes. V. Kolozsvár, Nagyág.
26. *muralis* Forst. — I. Budapest. II. Pécs. VI. VIII. Buccari.
27. *perla* F. — I. Budapest. II. Sopron. III. Gölniczbánya. IV. Eperjes.

Moma Hb.

28. *Orion* Esp. — I. Budapest, Eger, Debreczen, Nagyvárad, Arad. II. Pécs, Sopron. III. Pozsony, Nagy-Lévárd, Selmeczbánya, Nagy-Maros, Trencsén-Teplicz, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyág. VI. Német-Szt.-Péter.

Diphthera O.

29. *ludifica* L. — I. Monor. II. Pécs. III. Selmeczbánya. IV. Eperjes.

Panthea Hb.

30. *coenobita* Esp. — Rara. VIII. Fiume.

Agrotis O.

31. *strigula* Thnb. — III. Tátrafüred, ad lacum Csorba. IV. Eperjes.
32. *polygona F.* — I. Budapest, Monor. II. Sopron. IV. Eperjes. V. Nagyág.
33. *signum* F. — I. Budapest. II. Sopron. III. Nagy-Lévárd. IV. Eperjes. V. Nagyág, Brassó, Nagyszeben.
34. *janthina* Esp. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Pécs, Sopron. III. Pozsony. IV. Eperjes. V. Nagyág. VI. Mehádia. VII. Diakovár. VII. Fiume.
35. *linogrisea* Schiff. — I. Budapest, Nagyvárad.

II. Pécs, Sopron. III. Pozsony. IV. Eperjes. V. Nagyág. VI. Mehádia. VII. Diakovár. VIII. Fiume.

36. *fimbria* L. — Ubique frequens.

37. *interjecta* Hb. — VIII. Fiume.

38. *augur* F. — I. Budapest. II. Pécs, ad lacum Fertő III. Pozsony, Tavarnok, Tátra, Igló. IV. Eperjes. V. Verespatak. VIII. Fiume.

39. *obscura* Brahm. — I. Budapest, Kisujszállás, Parád, Debreczen, Nagyvárad, Peér, H.-M.-Vásárhely. II. Pécs, Sopron. III. Pozsony, Kocsócz, Rozsnyó, Gölniczbánya. IV. Eperjes, Jászó. V. Nagyág, Rea, Nagyszeben, Kovászna, Szent-Gothárd. VII. Vrdnik.

40. *pronuba* L. — In toto regno frequens.
ab. *innuba* Tr. — In reg. I—V. et VII. frequens.
ab. *Hoegei* H.-S. — IV. Eperjes.

41. *orbona* Hfn. — I. Budapest. II. Pécs, Sopron. III. Tavarnok, Kocsócz. IV. Eperjes. V. Nagyág. VIII. Fiume.
ab. *subsequa* Hb. — I. Budapest. II. Sopron.

42. *comes* Hb. — In reg. I—V., VII. et VIII. frequens.
ab. *adsequa* Tr. — I. Budapest. III. Pozsony.
ab. *prosequa* Tr. — I. Budapest. II. Sopron. III. Pozsony.

43. *castanea* Esp. v. *neglecta* Hb. — I. Budapest. II. Pécs, Sopron. V. Nagyág.

44. *hyperborea* Zett. — Rarior. III. Mons Prasiva (com. Liptó). IV. Eperjes.

45. *triangulum* Hfn. — I. Budapest, Eger. II. Pécs, Sopron. III. Pozsony, Nagy-Lévárd, Tavarnok, Selmeczbánya, Kocsócz. IV. Eperjes. Nagyszeben. V. Nagyág. VIII. Fiume.

46. *baja* F. — I. Budapest. II. Sopron. III. Pozsony, Tavarnok, Kocsócz, Igló. IV. Eperjes. V. Segesvár, Nagyág. VIII. Fiume.

47. *speciosa* Hl. — Valde rara. V. Mons Magura (c. Kolozs). Specimen unicum ex Hungaria cognitum.

48. *candelarum* Stgr. — I. Budapest. III. Gölniczbánya. V. Nagyág. VI. Mehádia.
v. *signata* Stgr. — Secundum Staudinger etiam in Hungaria observata.

49. *C-nigrum* L. — In reg. I—V. et VIII. occurrit.

50. *ditrapezium* Bkh. — II. Pécs, Sopron. III. Pozsony, Tavarnok. IV. Eperjes. V. Nagyág. VIII. Fiume.

51. *stigmatica* Hb. — I. Budapest. II. Pécs. III. Pozsony, N.-Bossán. IV. Eperjes. V. Nagyág.

52. *xanthographa* F. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Pécs, Sopron. III. Pozsony, Tavarnok. IV. Eperjes. V. Nagyág. VIII. Fiume.
ab. *cohaesa* H.-S. — I. Budapest. II. Pécs. III. Pozsony, Tavarnok. IV. Eperjes.

53. *umbrosa* Hb. — I. Budapest. III. N.-Bossán. IV. Eperjes. V. Nagyág.

54. *rubi* View. — I. Budapest. III. Pozsony, Tavarnok. IV. Eperjes. V. Nagyág, Rea, Nagyszeben. VI. Mehádia.

55. *florida* Schmidt. — Rara. IV. Eperjes.

56. *Dahlii* Hb. — Rara. III. Tátra. V. Nagyág.

57. *brunnea* F. — I. Budapest. II. Sopron. III. Pozsony, Tavarnok, Kocsócz, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyág, Rea.

58. *festiva* Hb. — II. Pécs, F.-Lövő. IV. Eperjes, Mons Gutin (com. Máramaros).

59. *depuncta* L. — I. Budapest. II. Sopron. III. Pozsony, N.-Bossán, Tátra. IV. Eperjes. V. Nagyág, Rea. VI. Mehádia.

60. *margaritacea* Vill. — I. Budapest. II. Sopron. V. Nagyág. VI. Temesvár.

61. *multangula* Hb. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Pécs. IV. Eperjes. V. Nagyág.

62. *rectangula* F. — I. Budapest. II. Pécs, Sopron. III. Tátra. V. Nagyág, Rea, Mezőzáh.

63. *cuprea* Hb. — Rarior. IV. Eperjes. V. Nagyág, Mons Magura (com. Kolozs).

64. *plecta* L. — I. Budapest, Kalocsa, Nagyvárad. II. Pécs. III. Pozsony, Tavarnok, Selmeczbánya, Kocsócz, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyág, Rea, Nagyszeben, Sz.-Gothárd. VIII. Fiume.

65. *musiva* Hb. — Rara. V. Nagyág. VI. Mehádia.

66. *flammatra* F. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Pécs, Sopron. IV. Vörösmart (com. Máramaros). V. Nagyág.

67. *candelisequa* Hb. — Rara. I. Budapest.

68. *simulans* Hfn. — I. Budapest, Kalocsa, Debreczen, Nagyvárad. II. Pécs, Sopron. III. Tavarnok, Zazriva (com. Árva), Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyág, Rea. VII. Lipik, Velebit. VIII. Fiume.

69. *lucipeta* F. — I. Budapest, Parád. II. Sz.-Gothárd (comit. Vas). III. F.-Szarvas, Rozsnyó, Poprád, Igló, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyág, Nagyszeben. VI. Temesvár.

70. *fugax* Tr. — I. Budapest, Eger, Parád, Nagyvárad. III. Pozsony, Gács. IV. Eperjes. V. Nagyág. VI. Grebenácz, Mehádia. VIII. Fiume.

71. *putris* L. — In reg. I—V., VII. et VIII. non rara.

72. *signifera* F. — I. Budapest, Gödöllő. II. Pécs, Sopron. III. Pozsony. V. Nagyág.

73. *forcipula* Hb. — I. Budapest. II. Pécs. III. Pozsony, Kocsócz. IV. Eperjes. V. Nagyág.

74. *fimbriola* Esp. — I. Budapest. II. Pécs.

75. *latens* Hb. — III. Poprád. IV. Eperjes. V. Nagyág. VIII. Fiume.

76. *grisescens* Tr. — Rara. III. F.-Szarvas, Rohács (com. Árva), Deményfalu (com. Liptó).

77. *birivia* Hb. — Rara. III. Szliács. IV. Szádelő. V. Nagyszeben.
78. *renigera* Hb. — Secundum Treitschke (V. 1. 198.) etiam in Hungaria occurrit.
79. *Cos* Hb. (v. Nagyágensis Frr.) — Valde rara. III. Nagy-Lévárd. V. Nagyág.
80. *cinerea* Hb. — I. Budapest, Szeged. III. Rozsnyó. IV. Eperjes. V. Nagyág, Nagyszeben, Brassó. VI. Mehádia. VII. Josipdol, Vaganski Vrch, Velebit. VIII. Fiume.
81. *puta* Hb. — Rara. VIII. Martinšćica.
82. *exclamationis* L. — Ubique sat frequens.
83. *recussa* Hb. — Rara. III. Gölniczbánya.
84. *transylvanica* H.-S. — Secundum Herrich-Schäffer (II. 346.) in Hungaria observata.
85. *nigricans* L. — I. Budapest, Szeged. II. Pécs, Sopron. III. Pozsony, Tavarnok, Znióváralja, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyág, Nagyszeben, Gyeke. VII. Josipdol. VIII. Fiume.
ab. *rubricans* Esp. — II. Pécs. V. Nagyszeben.
86. *tritici* L. — I. Budapest, Eger. II. Pécs, Tapolcza, Sopron. III. Pozsony, Tavarnok, Selmeczbánya, com. Nógrád, Kocsócz. IV. Eperjes, Legyesbénye (com. Zemplén). V. Nagyág
v. *eruta* Hb. — I. Budapest.
v. *aquilina* Hb. — I. Budapest. II. Pécs. IV. Eperjes. V. Nagyág, Rea.
87. *vitta* Hb. — I. Budapest. III. Pozsony. V. Nagyág.
88. *multifida* Ld. — Valde rara. I. Budapest.
89 *distinguenda* Ld. — Rara. I. Budapest, Monor, Szeged.
90. *obelisca* Hb. — I. Budapest, Eger. II. Pécs, Sopron. III. Pozsony, Tavarnok, N.-Bossán, Kocsócz, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyág, Rea, Sz.-Gothárd, Nagyszeben. VIII. Fiume.
ab. *ruris* Hb. — I. Budapest, Kisujszállás, Nagyvárad. II. Pécs, Sopron. III. Pozsony, Tavarnok, Rozsnyó, Igló. IV. Eperjes. V. Nagyág, Nagyszeben.
v. *Villiersii* Gn. — I. Budapest, Peszér. II. Pécs. III. Gács.
91. *hastifera* Donz. — Rara. V. Mons Magura (com. Kolozs).
92. *conspicua* Hb. — Rara. I. Monor.
93. *saucia* Hb. — Ubique occurrit, sed in regione VI. deest.
ab. *margaritosa* Hw. — I. Budapest. II. Pécs, Sopron. V. Nagyág, Rea, Nagyszeben. VIII. Fiume.
94. *trux* Hb. — Rara. V. Nagyág.
95. *ypsilon* Rott. — Ubique sat frequens, excepta regione VI.
96. *segetum* Schiff. — Ubique communis.
97. *corticea* Hb. — I. Budapest. II. Pécs. III. Tavarnok, Rózsahegy. IV. Eperjes. V. Nagyág, Nagyszeben. VII. Josipdol, Velebit. VIII. Fiume.
98. *crassa* Hb. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Pécs. III. Pozsony. IV. Eperjes. V. M.-Ujvár, Rea.
v. *lata* Tr. — I. Budapest.
99. *vestigialis* Rott. — I. Budapest, Kecskemét, Kis-Kőrös, Szeged, Nagyvárad, Debreczen. III. Nagy-Lévárd, Gács. IV. Eperjes.
100. *praecox* L. — I. Budapest. II. Pécs. III. Com. Bars. IV. Eperjes. V. Nagyág, Nagyszeben.
101. *prasina* F. — III. Pozsony, Selmeczbánya, Znióváralja, Lőcse. IV. Eperjes. V. Nagyág.
102. *occulta* L. — III. Poprád. IV. Eperjes.

Charœas Stph.

103. *graminis* L. — I. Budapest. II. Pécs. III. Com. Bars. IV. Eperjes. V. Verespatak, Nagyszeben. VI. Mehádia.

Neuronia Hb.

104. *popularis* F. — In reg. I—V. et VII. non rara.
105. *cespitis* F. — I. Budapest, Peszér. II. Pécs, Sopron. III. Pozsony, Kocsócz, Igló, Poprád, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyág, Nagyszeben, Sz.-Gothárd.

Mamestra Tr.

106. *leucophaea* View. — I. Budapest, Eger. II. Pécs, Sopron. III. Pozsony, Tavarnok, Nagy-Bossán, Selmeczbánya, Felső-Szarvas, Kocsócz, Igló, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyág, Nagyszeben. VIII. Fiume.
107. *serratilinea* Tr. — Secundum Staudinger etiam in Hungaria occurrit.
108. *advena* F. — I. Budapest, Eger. II. Sopron. III. Pozsony. IV. Eperjes. V. Nagyág.
109. *tincta* Brahm. — IV. Eperjes. VI. Mehádia, Ferenczfalva.
110. *nebulosa* Hfn. — I. Budapest, Szeged, Nagyvárad. II. Sopron. III. Pozsony, Nagy-Lévárd, Tavarnok, N.-Bossán, Selmeczbánya, Gács, Kocsócz, Rozsnyó, Lőcse, Igló, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyág, Nagyszeben, Szent-Gothárd. VII. Josipdol, Lipik, Károlyváros.
111. *contigua* Vill. — I. Budapest. II. Pécs, Sopron. III. Pozsony. IV. Eperjes. V. Segesvár, Nagyszeben, Nagyág. VI. Bálincz VII. Com. Szerém, Károlyváros.
112. *thalassina* Rott. — Nullibi rara.
ab. *achates* Hb. — VI. Orsova.
113. *dissimilis* Knoch. — In reg I—V. et VII. VIII. non rara.
ab. *errata* Gn. (permixta H.-G.) — I. Budapest. III. Pozsony. IV. Eperjes.

114. *pisi* L. — Non rara; solum in reg. VII. deest.
115. *brassicae* L. — In toto regno frequens.
116. *Leineri* Frr. — Rara. I. Budapest, Peszér.
117. *persicariae* L. — Ubique occurrit, regione VII. excepta.
ab. *unicolor* Stgr. — I. Budapest. III. Pozsony. V. Nagyág.
118. *albicolon* Hb. — I. Budapest, Szt-Márton-Káta, Szeged. II. Pécs, Csákvár. IV. Eperjes. V. Nagyág.
119. *aliena* Hb. — I. Budapest. III. Pozsony, Nagy-Bossán. IV. Eperjes, Com. Ung, Sztára (com. Zemplén). V. Nagyág.
120. *splendens* Hb. — Rara. I. Budapest, Peszér. V. Nagyszeben.
121. *oleracea* L. — Ubique frequens.
122. *genistae* Bkh. — In reg. I—V. et VIII. frequens.
123. *glauca* Hb. — III. Stola (com. Szepes) IV. Eperjes. V. Brassó, Tusnád.
124. *dentina* Esp. — Ubique sat frequens.
125. *dianthi* Tausch. — Rara. I. Budapest, P.-Poó, Dömsöd, Szentes, Kisujszállás.
126. *marmorosa* Bkh. — III. Pozsony, Tátra, Poprád, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyág. VII. Croatia.
127. *trifolii* Rott. — Ubique frequens.
ab. *Farkasii* Tr. — Rara. VII. Com. Szerém.
128. *sodae* Rbr. — Valde rara. IV. Eperjes. Ex Hungaria specimen unicum cognitum.
129. *cavernosa* Ev. — Rara. I. Budapest, Peszér, P.-Poó. Tantum 3 exempla hungarica cognita.
130. *reticulata* Vill. — I. Budapest. II. Pécs, Sopron. III. Pozsony, Kocsócz, Igló, Poprád. IV. Eperjes. V. Nagyág. VII. Plitvica.
131. *chrysozona* Bkh. — Ubique sat frequens.
132. *serena* F. — I. Budapest, Szeged, Eger, Poprád, Debreczen. II. Pécs, Sopron. III. Pozsony, Rozsnyó, Igló, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyág. VII. Lipik, Josipdol.

Dianthoecia B.

133. *luteago* Hb. — I. Budapest, Eger, Kalocsa. II. Pécs, Csákvár, Sopron. III. Pozsony. V. Nagyág, Nagyszeben. VI. VIII. Fiume.
134. *proxima* Hb. — Rara. III. Tátra.
135. *caesia* Bkh. — Rara. VI. Mehádia.
136. *filigrana* Esp. — III. Pozsony. IV. M. Kuka. (com. Máramaros). V. Nagyág. VI. Mehádia.
v. *xanthocyanea* Hb. — I. Budapest. VII. Josipdol.
v. *luteocincta* Rbr. — VIII. Fiume.
137. *Magnolii* B. — Rara. VIII. Fiume.
138. *nana* Rott. — Nullibi rara.
139. *albimacula* Bkh. — I. Budapest. III. Pozsony, Selmeczbánya, Rozsnyó, Lőcse, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyág, Nagyszeben. VII. Josipdol. VIII. Fiume.
140. *compta* F. — I. Budapest. II. Pécs, Sopron. III. Pozsony, Selmeczbánya, Rozsnyó, Lőcse, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyág, Nagyszeben. VII. Josipdol. VIII. Fiume.
ab. *viscariae* Gn. — I. Budapest.
141. *capsincola* Hb. — Ubique sat frequens, sed in reg. VI. deest.
142. *cucubali* Fssl. — Nullibi rara, sed in reg. VI. deest.
143. *carpophaga* Bkh. — I. Budapest. II. Sopron. III. Pozsony, Rozsnyó. IV. Eperjes. V. Nagyág, mons Magura (com. Kolozs). VII. Com. Szerém. VIII. Fiume.
144. *silenes* Hb. — Rara. I. Budapest, Monor, Dabas. VI. Ulma.
145. *irregularis* Hfn. — I. Budapest, Peszér. V. Kolozsvár.

Episema O.

146. *glaucina* Esp. — I. Budapest. II. Pécs. III. Pozsony. IV. Eperjes. V. Szent-Gothárd.
ab. *tersina* Stgr. — I. Budapest. II. Pécs.
ab. *dentimacula* Hb. — I. Budapest. II. Pécs. III. Pozsony. V. Nagyág.
ab. *hispana* B. — I. Budapest.
ab. *unicolor* Dup. — I. Budapest.
147. *scoriacea* Esp. — I. Budapest. III. Pozsony. IV. Eperjes. V. Nagyág.

Aporophyla Gn.

148. *lutulenta* Bkh. — I. Budapest. II. Pécs. V. Nagyág.
149. *nigra* Hw. — Rarior. IV. Eperjes. VIII. Fiume.

Ammoconia Ld.

150. *caecimacula* F. — In reg. I—V. et VII. occurrit.

Polia Tr.

151. *serpentina* Tr. — Rara. VIII. Fiume.
152. *polymita* L. — In regionibus I—VI. non rara.
153. *flavicincta* F. — I. Budapest. II. Pécs. IV. Eperjes. V. Nagyág.
154. *ruficincta* H.-G. — Rara. V. Nagyág. VIII. Fiume.
155. *xanthomista* Hb. — I. Budapest. IV. Eperjes. V. Nagyág.
v. *nigrocincta* Tr. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Pécs. III. Pozsony, Tavarnok, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyág.
156. *canescens* Dup. — Rara. V. Nagyág. VIII. Fiume.
157. *chi* L. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Pécs, Tapolcza. III. Pozsony, Tavarnok, Com. Bars, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyág.

Thecophora Ld.

158. *fovea* Tr. — Rara. I. Budapest. II. Pécs. VIII. Fiume.

Dryobota Ld.

159. *roboris* B. — I. Budapest. II. Pécs. IV. Eperjes.
ab. *cerris* B. — I. Budapest.
160. *monochroma* Esp. — I. Budapest. II. Pécs. III. Pozsony. IV. Eperjes. V. Nagyág.
161. *protea* Bkh. — I. Budapest. II. Pécs. III. Pozsony, N.-Bossán. IV. Eperjes. V. Nágyág, Nagyszeben. VIII. Fiume.

Dichonia Hb.

162. *convergens* F. — I. Budapest. II. Pécs, Sopron. III. Pozsony, Tavarnok, N.-Bossán. IV. Eperjes. V. Nagyág.
163. *aeruginea* Hb. — I. Budapest. II. Pécs. III. Pozsony. IV. Eperjes. V. Nagyág.
164. *aprilina* L. — In regionibus. I—V. frequens.

Chariptera Gn.

165. *viridana* Walch. — I. Budapest. II. Pécs, Visegrád, Sopron. III. Pozsony, Tavarnok, Kocsócz, Rozsnyó. IV. Eperjes. V. Nagyág, Rea. VIII. Fiume.

Miselia Stph.

166. *bimaculosa* L. — I. Budapest. II. Sopron. III. Pozsony, Tavarnok, com. Bars. V. Rea. VI. Temesvár.
167. *oxyacanthae* L. — In regionibus I—VI. et VIII. frequens.

Valeria Germ.

168. *oleagina* F. — I. Budapest, Eger, Nagyvárad. II. Pécs, Sopron. III. Pozsony, Tavarnok, Kocsócz. IV. Eperjes. V. Nagyág. VI. Mehádia. VIII. Fiume.

Oxytrypia Stgr.

169. *orbiculosa* Esp. — Rara. I. Budapest, Szeged. II. Székes-Fehérvár.

Apamea Tr.

170. *testacea* Hb. — I. Budapest, Laczháza, Szeged. II. Pécs. III. Pozsony, N.-Bossán. IV. Eperjes. V. Nagyág, Nagyszeben, Szent-Gothárd.

Luperina B.

171. *matura* Hfn. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Pécs, Sopron. III. Pozsony, Tavarnok, Kocsócz. V. Segesvár, Nagyszeben, Nagyág. VIII. Fiume.
172. *rubella* Dup. — Rara. VIII. Fiume.
173. *virens* L. v. *immaculata* Stgr. — I. Budapest, Eger, Nagyvárad. II. Pécs. III. Pozsony, Tavarnok, Selmeczbánya, Kocsócz. IV. Eperjes. V. Nagyág. VII. Lipik.
174. *Zollikoferi* Frr. — Valde rara. I. Budapest.

Hadena Tr.

175. *porphyrea* Esp. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Pécs, Sopron. III. Pozsony, N.-Bossán, Árvaváralja. IV. Eperjes. V. Nagyág, Sz.-Gothárd. VII. Károlyváros.
176. *adusta* Esp. — III. Tavarnok, Trencsén, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyág, m. Magura (c. Kolozs).
177. *Solieri* B. — Rara. VIII. Fiume.
178. *ochroleuca* Esp. — I. Budapest. II. Pécs, Sopron. III. Pozsony, com. Nyitra, Rozsnyó. IV. Eperjes.
179. *Maillardi* H.-G. — Valde rara. VI. Mons Branu (com. Krassó-Szörény).
180. *rubrirena* Tr. — Valde rara. III. Nagyszombat.
181. *furva* Hb. — III. Pozsony. V. Nagyág, m. Vlegyásza. VIII. Fiume.
182. *abjecta* Hb. — III. Tavarnok, Drietoma (com. Trencsén). IV. Eperjes. V. Nagyág.
183. *lateritia* Hfn. — II. Pécs. III. Lucsivna, Igló, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyszeben, Nagyág. VIII. Fiume.
184. *monoglypha* Hfn. — In toto regno non rara.
185. *lythoxylea* F. — I. Budapest, Peszér. II. Pécs. III. Pozsony, Tavarnok, N.-Bossán, Kocsócz, Rozsnyó. IV. Eperjes. V. Kolozsvár, Nagyszeben.
186. *sublustris* Esp. — Rara. I. Budapest.
187. *sordida* Bkh. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Pécs, Sopron. III. N.-Bossán, Selmeczbánya, Rozsnyó. IV. Eperjes. V. Nagyág.
188. *basilinea* F. — I. Budapest, Parád, Debreczen, Nagyvárad. II. Pécs, Csákvár, Sopron. III. Pozsony, N.-Bossán, Rozsnyó, Igló, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyág, Nagyszeben. VI. Mehádia. VII. Lipik.
189. *rurea* F. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Pécs. III. Pozsony, Rozsnyó, Igló. IV. Eperjes, Com. Máramaros. V. Nagyág.
ab. *alopecurus* Esp. — III. Poprád. IV. Eperjes. V. Nagyág.
190. *scolopacina* Esp. — IV. Eperjes. V. Nagyszeben. VII. Varasd.
191. *hepatica* Hb. — I. Budapest. II. Sopron. IV. Eperjes. V. Nagyág. VII. Lipik, Varasd.
192. *gemina* Hb. — I. Budapest. II. Pécs. IV. Eperjes. V. Nagyág.
ab. *remissa* Tr. — VII. Lipik.
193. *unanimis* Tr. — I. Budapest. III. Poprád. IV. Eperjes.
194. *illyrica* Frr. — Rara. I. Bpest. II. Pécs. V. N.-ág.

195. *didyma* Esp. — Ubique sat frequens; sed in regione VI. non observata.
ab. *nictitans* Esp. — I. Budapest. II. Pécs, Sopron. III. Pozsony, Tavarnok, N.-Bossán, Poprád. IV. Eperjes. V. Nagyág, Nagyszeben.
ab. *leucostigma* Esp. — I. Budapest. III. Pozsony, Tavarnok, N.-Bossán. V. Nagyág.
196. *pabulatricula* Brahm. — Rara. IV. Eperjes, ubi unicum exemplum observatum.
197. *ophiogramma* Esp. — I. Budapest. II. Sopron. III. Poprád. IV. Eperjes. V. Nagyág.
198. *literosa* Hw. — I. Budapest. III. Pozsony. V. Nagyág.
199. *strigilis* Cl. — Ubique, excepta regione VI., observata.
ab. *latruncula* Lang. — In reg I—V., VII., VIII. observata.
ab. *aethiops* Hw. — IV. Eperjes. V. Nagyág, Nagyszeben.
200. *bicoloria* Vill. — I. Budapest. II. Pécs. III. Pozsony, Tavarnok. IV. Eperjes. V. Kolozsvár.
ab. *furuncula* Hb. — I. Budapest. III. Pozsony. IV. Eperjes.

Dypterygia Stph.

201. *scabriuscula* L. — In reg. VI. et VIII. deest.

Hyppa Dup.

202. *rectilinea* Esp. — Rarior. III. Poprád. IV. Eperjes. V. Nagyág.

Rhizogramma Ld.

203. *detersa* Esp. — I. Budapest, Eger, Nagyvárad. II. Pécs. III. Pozsony, Trencsén. IV. Eperjes, Com. Máramaros. V. Nagyág.

Cloantha B.

204. *hyperici* F. — Ubique, reg. VI. excepta, frequens.
205. *polyodon* Cl. — In regionibus I—V. non rara.
206. *radiosa* Esp. — I. Budapest, Debreczen. III. Pozsony, Nagy-Lévárd, Tavarnok. IV. Eperjes. VI. Mehádia.

Eriopus Tr.

207. *purpureofasciata* Piller. — I. Budapest. II. Pécs. IV. Eperjes. V. Nagyág. VII. Lipik, Josipdol, Varasd.
208. *Latreillei* Dup. — VI. Mehádia. VIII. Fiume.

Poliphaenis B.

209. *sericata* Esp. — Rara. I. Budapest, Eger, Nagyvárad. II. Pécs, Sopron. III. Pozsony, N.-Bossán, Tavarnok. IV. Eperjes. V. Nagyág. VII. Lipik. VIII. Fiume.

Trachea Hb.

210. *atriplicis* L. — Ubique frequens.

Trigonophora Hb.

211. *flammea* Esp. — Rara. VIII. Fiume.

Euplexia Stph.

212. *lucipara* L. — I. Budapest, Parád, Eger. II. Pécs. III. Pozsony, Rozsnyó, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyág, Rea, Brassó. VII. Lipik. VIII. Fiume.

Habryntis Ld.

213. *scita* Hb. — II. Pécs. III. Tavarnok, Selmeczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyág. VI. Mehádia. VII. Com. Szerém, Vaganski Vrch.

Brotolomia Ld.

214. *meticulosa* L. — Ubique frequens.

Mania Tr.

215. *maura* L. — In reg. I—VII. sat frequens.

Naenia Stph.

216. *typica* L. — In toto regno occurrit, reg. VI. excepta.

Jaspidea B.

217. *celsia* L. — I. Budapest, Peszér, P.-Vacs, Debreczen, Nagyvárad. III. Selmeczbánya, Igló. VI. Báziás.

Helotropha Ld.

218. *leucostigma* Hb. — I. Budapest. IV. Eperjes.
ab. *fibrosa* Hb. — IV. Eperjes.

Hydroecia Gn.

219. *nictitans* Bkh. — I. Budapest. II. Pécs. III. Pozsony, Tavarnok, Kocsócz, Znióváralja, Tátra, Poprád, Gölniczbánya. V. Nagyág, Sz.-Gothárd, Kovászna, Tusnád. VIII. Fiume.
ab. *erythrostigma* Hw. — III. Pozsony, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyág, Kovászna.
220. *micacea* Esp. — Rara. III. Pozsony, Tavarnok, Kocsócz. IV. Eperjes.
221. *petasitis* Dbld. — Rara. V. Nagyág. VI. Mehádia.
222. *leucographa* Bkh. (lunata Frr.) — Rara. VI. Mehádia.

Gortyna O.

223. *ochracea* Hb. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Pécs. III. Pozsony, Selmeczbánya, Igló. IV. Eperjes. V. Nagyág, Sz.-Gothárd. VI. Bálincz.

Nonagria O.

224. *cannae* O. — I. Budapest. II. Pécs. IV. Eperjes.
225. *sparganii* Esp. — I. Budapest. IV. Eperjes. V. Nagyág.
226. *arundinis* F. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Pécs. IV. Eperjes. V. Nagyág. VII. Com. Szerém.
ab. *fraterna* Tr. — I. Peszér.
227. *geminipuncta* Hatch. — Valde rara. IV. Eperjes.
228. *neurica* Hb. — Rara. V. Nagyszeben.

Senta Stph.

229. *maritima* Tausch. — Rara. I. Budapest.
ab. *bipunctata* Hw. — I. Budapest.

Tapinostola Ld.

230. *musculosa* Hb. — Rara. I. Budapest.
231. *fulva* Hb. — Rara. I. Budapest. IV. Eperjes.
232. *Hellmanni* Ev. — Rarus. II. Pécs, ubi exemplum unicum observatum.

Calamia Hb.

233. *lutosa* Hb. — I. Peszér, Szeged, Debreczen. III. Pozsony. V. Sz.-Gothárd.

Meliana Curt.

234. *flammea* Curt. — Rara. I. Budapest, Nagyvárad. III. Tavarnok.

Leucania O.

235. *impudens* Hb. — I. Budapest. IV. Eperjes. V. Algyógy. VII. Croatia.
236. *impura* Hb. — I. Budapest. II. Pécs. IV. Eperjes. V. Felvincz. VII. Orehovica.
237. *pallens* L. — In reg. I—V. et VII. frequens.
ab. *ectypa* Hb. — I. Budapest.
238. *obsoleta* Hb. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Pécs, Csákvár. III. Pozsony, Nagy-Lévárd, Tavarnok, Trencsén. IV. Eperjes. V. Nagyszeben.
239. *comma* L. — . II. Sopron. III. Rozsnyó. IV. Eperjes. V. Nagyág, N.-Szeben. VI. Mehádia. VII. Josipdol. VIII. Fiume, Buccari.
240. *conigera* F. — I. Budapest. II. Pécs, Keszthely, Sopron. III. Pozsony, N.-Bossán, Rozsnyó. IV. Eperjes. V. Nagyág, N.-Szeben. VI. Mehádia.
241. *evidens* Hb. — Rarior. I. Budapest. II. Pécs. V. Nagyág.
242. *vitellina* Hb. — I. Budapest. II. Pécs. III. Pozsony, N.-Bossán. IV. Eperjes. V. Nagyág, Nagyszeben. VIII. Fiume.
243. *L-album* L. — Ubique frequens, sed in reg. VI. non observata.
244. *congrua* Hb. — Rara. I. Budapest.
245. *albipuncta* F. — Frequens in reg. I—V. et VII.
246. *lythargyrea* Esp. — I. Budapest, Eger. II. Pécs, F.-Lövő, Sopron. III. Pozsony, Tavarnok, N.-Bossán. IV. Eperjes. V. Segesvár, Nagyág.
247. *turca* L. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Pécs. IV. Eperjes. V. Nagyág, Rea, N.-Szeben.

Mithymna Gn.

248. *imbecilla* F. — III. Pozsony, Hamir (c. Árva), Tátra. IV. Vihorlat (c. Zemplén). V. Nagyág. M. Magura (com. Kolozs). VI. Mehádia.

Praestilbia Stgr.

249. *armeniaca* Stgr. — Valde rara. VIII. Fiume, ubi exemplum unicum observatum.

Grammesia Stph.

250. *trigrammica* Hfn. — Nullibi rara.
v. *bilinea* Hb. — I. Nagyvárad. IV. Eperjes. V. Nagyág. VI. Mehádia. VII. Josipdol, Plitvica.

Caradrina O.

251. *exigua* Hb. — I. Budapest. III. Tavarnok. IV. Eperjes. V. Kolozsvár. VIII. Fiume.
252. *Morpheus* Hfn. — I. Budapest, Szeged. III. Pozsony, Árvaváralja, Rozsnyó. IV. Eperjes. V. Nagyág, Fogaras. VII. Com. Szerém.
253. *quadripunctata* F. — Ubique frequens.
254. *Kadenii* Frr. — I. Budapest. II. Pécs. III. Tavarnok, N.-Bossán.
255. *terrea* Frr. — Rarior. I. Budapest, Peszér.
ab. *dubiosa* Stgr. — I. Budapest.
256. *pulmonaris* Esp. — I. Budapest. III. Pozsony, Tavarnok. IV. Eperjes. V. Nagyág.
257. *respersa* Hb. — I. Budapest. II. Pécs, Csákvár, Sopron. III. Pozsony, N.-Bossán. IV. Eperjes. V. Nagyág. VIII. Fiume.
258. *alsines* Brahm. — Nullibi rara, sed regioni VI. deest.
259. *superstes* Tr. — I. Budapest. II. Pécs. III. Pozsony, Tavarnok, N.-Bossán. IV. Eperjes. V. Nagyág.
260. *ambigua* F. — I. Budapest, Szeged, Parád, Nagyvárad, Arad. II. Pécs, Sopron. III. Pozsony, Tavarnok, Kocsócz, Rozsnyó. IV. Eperjes. V. Nagyág, Nagyszeben, Sz.-Gothárd.
261. *taraxaci* Hb. — I. Budapest, Szeged, Nagyvárad. II. Pécs, Sopron. III. Pozsony, Tavarnok, Nagy-Bossán, Rozsnyó. IV. Eperjes. V. Nagyág, Nagyszeben, Sz.-Gothárd. VI. Mehádia.
262. *lenta* Tr. — I. Budapest, Peszér, Nagyvárad, Szeged. II. Pécs. V. Nagyág, Nagyszeben. VI. Palics.
263. *gluteosa* Tr. — I. Budapest, Eger, Kalocsa. V. Sz.-Gothárd. VI. Ulma. VII. Com. Szerém.
264. *palustris* Hb. — Rarior. IV. Eperjes. V. Nagyág.

265. *lepigone* Möschl. — Rarissima. I. Budapest, ubi exemplum unicum observatum.

Acosmetia Stph.

266. *caliginosa* Hb. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Pécs. IV. Eperjes. V. Nagyszeben, Nagyág. VII. Lipik.

Rusina B.

267. *tenebrosa* Hb. — I. Budapest. II. Pécs, Sopron. III. Pozsony, Tavarnok, N.-Bossán, Rózsahegy. IV. Eperjes. V. Nagyszeben, Nagyág. VII. Lipik. VIII. Fiume.

Amphipyra O.

268. *micans* Ld. — Rarissima. VI. Mehádia.

269. *tragopogonis* L. — Ubique sat frequens.

270. *tetra* F. — I. Budapest. II. Pécs. III. Rózsahegy. VII. Josipdol.

271. *livida* F. — In regionibus I—VII. non rara.

272. *pyramidea* L. — Ubique sat frequens.

273. *perflua* F. — III. Pozsony, Selmeczbánya. IV. Eperjes.

274. *cinnamomea* Göze. — I. Budapest, Sz.-Márton-Káta, Parád, Nagyvárad. II. Pécs. IV. Eperjes.

Perigrapha Ld.

275. *cincta* F. — I. Budapest. II. Pécs. III. Pozsony.

Taeniocampa Gn.

276. *gothica* L. — In reg. I—VI. et VIII. frequens.

277. *miniosa* F. — I. Budapest. II. Pécs, Sopron. III. Pozsony. IV. Eperjes. V. Nagyág, Nagyszeben. VIII. Fiume.

278. *pulverulenta* Esp. — In reg. I—VI. frequens.

279. *populeti* Tr. — I. Budapest. III. Pozsony, Rozsnyó, Igló. IV. Eperjes. V. Nagyszeben.

280. *stabilis* View. — In reg. I—V. et VIII. sat frequens.

281. *gracilis* F. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Pécs, Sopron. III. Pozsony, Tavarnok, Selmeczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyág, Nagyszeben.

282. *incerta* Hfn. — In reg. I—VI. et VIII. sat frequens.
ab. *fuscata* Hw. — I. Budapest. III. Pozsony, Tavarnok. IV. Eperjes. V. Nagyág, Nagyszeben.

283. *opima* Hb. — I. Budapest. IV. Eperjes.

284. *munda* Esp. — I. Budapest, Eger, Nagyvárad. II. Pécs. Sopron. III. Pozsony, Tavarnok, Rozsnyó. IV. Eperjes. V. Nagyág, Nagyszeben, Fogaras.
ab. *immaculata* Stgr. — I. Budapest. II. Pécs. IV. Eperjes. V. Nagyág, Nagyszeben.

Panolis Hb.

285. *piniperda* Panz. — I. Budapest. II. F.-Lövő. III. Pozsony, Nagy-Lévárd, Selmeczbánya. IV. Eperjes, Com. Máramaros. V. Nagyszeben.

Pachnobia Gn.

286. *leucographa* Hb. — I. Budapest. III. Pozsony. IV. Eperjes. V. Nagyág.

287. *rubricosa* F. — I. Budapest. II. Pécs. III. Pozsony, N.-Bossán, Igló, Poprád. IV. Eperjes. V. Nagyág.

Mesogona B.

288. *oxalina* Hb. — I. Haraszti. III. Pozsony. IV. Eperjes. V. Nagyszeben.

289. *acetosellae* F. — I. Budapest, Eger, Nagyvárad. II. Pécs, Sopron. III. Pozsony, Tavarnok, Nagy-Bossán. Kocsócz. IV. Eperjes. V. Nagyág, Sz.-Gothárd.

Dicycla Gn.

290. *Oo* L. — I. Budapest, Peszér, Parád. II. Pécs, Sopron. III. Pozsony; Com. Bars. IV. Eperjes.
ab. *renago* Hw. — I. Budapest. II. Pécs. VIII. Fiume.

Calymnia Hb.

291. *pyralina* View. — II. Sopron. III. Pozsony, Rozsnyó, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyág, Nagyszeben.

292. *diffinis* L. — I. Budapest, Eger, Nagyvárad. II. Pécs, Sopron. III. Pozsony, Tavarnok, N.-Bossán. IV. Eperjes. VIII. Fiume.

293. *affinis* L. — I. Budapest. II. Pécs. III. Pozsony, Tavarnok, N.-Bossán, Kocsócz. IV. Eperjes. V. Nagyág, Fogaras. VII. Lipik. VIII. Fiume.

294. *trapezina* L. — Ubique frequens, sed in regione. VI. non observata.

Cosmia O.

295. *paleacea* Esp. — II. Sopron. III. Tavarnok, Rozsnyó. IV. Eperjes. V. Nagyág.

296. *abluta* Hb. — Rarior. I. Budapest. II. Pécs.
ab. *glaucula* Gn. — I. Budapest.

Dyschorista Ld.

297. *suspecta* Hb. — I. Budapest, Peszér, Pilis. III. Pozsony. IV. Eperjes. V. Kolozsvár.
ab. *iners* Tr. — I. Budapest.

298. *fissipuncta* Hw. — I. Budapest, Szeged, Eger, Nagyvárad. II. Pécs. III. Pozsony, Tavarnok, Kocsócz, Árvaváralja, Rozsnyó. IV. Eperjes. V. Nagyág, Nagyszeben. VII. Lipik.

Plastenis B.

299. *retusa* L. — Ubique occurit.

300. *subtusa* F. — I. Budapest. II. Pécs. III. Pozsony, Tavarnok. IV. Eperjes. V. Nagyág, Nagyszeben, Sz.-Gothárd.

Cirrhoidea Gn.

301. *ambusta* F. — I. Budapest. II. Pécs. IV. Eperjes. V. Nagyág, Sz.-Gothárd.

302. *xerampelina* Hb. — Rara. I. Budapest, Nagyvárad.

Cleoceris B.

303. *viminalis* F. — I. Budapest. II. Sopron. IV. Eperjes. V. Nagyág.

Orthosia O.

304. *rubricilla* Esp. — Rarior. I. Budapest. IV. Eperjes.

305. *lota* Cl. — I. Budapest. II. Pécs, Sopron. III. Pozsony, Tavarnok, N.-Bossán. IV. Eperjes. V. Nagyág, Nagyszeben, Sz.-Gothárd.

306. *macilenta* Hb. — I. Budapest. II. Pécs. III. Pozsony, Nagy-Bossán, Tavarnok. IV. Eperjes. V. Nagyág, Nagyszeben.

307. *circellaris* Hfn. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Pécs, Sopron. III. Pozsony, Tavarnok, Selmeczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyág, Nagyszeben, Szent-Gothárd.

308. *helvola* L. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Pécs, Csákvár, Sopron. III. Pozsony, Tavarnok, Nagy-Bossán, Gács. IV. Eperjes. V. Nagyág, Nagyszeben.

309. *pistacina* F. — II. Pécs, Sopron. III. Pozsony, Tavarnok, N.-Bossán. IV. Eperjes.

310. *nitida* F. — I. Budapest. II. Pécs, Sopron. III. Pozsony, Tavarnok, Selmeczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyág, Szent-Gothárd.

311. *humilis* F. — I. Budapest, Eger. II. Pécs. III. Pozsony, N.-Bossán. IV. Eperjes. V. Nagyág.

312. *laevis* Hb. — I. Budapest, Eger, Nagyvárad. II. Pécs, Sopron. III. Pozsony, Tavarnok, N.-Bossán. IV. Eperjes, Com. Torna. V. Nagyág.

313. *Kindermannii* F.-R. — Rara. VIII. Fiume.

314. *litura* L. — I. Budapest. II. Pécs, Sopron. III. Pozsony, N.-Bossán, Selmeczbánya, Rozsnyó, Gölniczbánya. IV. Eperjes, Jászó. V. Nagyág, Nagyszeben, Szent-Gothárd. VIII. Fiume.

Xanthia Tr.

315. *citrago* L. — I. Budapest. II. Pécs, Sopron. III. Pozsony, N.-Bossán. IV. Eperjes. V. Nagyág.

316. *sulphurago* F. — I. Budapest. II. Pécs. III. Pozsony, Nagy-Bossán, Kocsócz. IV. Eperjes. V. Nagyág.

317. *aurago* F. — I. Budapest. II. Pécs, Sopron. III. Pozsony, Tavarnok, N.-Bossán. IV. Eperjes. V. Nagyág.

ab. *fucata* Esp. — I. Budapest. III. Pozsony, Tavarnok. IV. Eperjes. V. Nagyág, Nagyszeben.

318. *flavago* F. — I. Budapest. II. Pécs, Sopron. III. Pozsony, Nagy-Lévárd, Tavarnok, Selmeczbánya, Kocsócz. Rozsnyó, Igló. IV. Eperjes. V. Nagyág, Szent-Gothárd.

319. *fulvago* L. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Pécs, Sopron. III. Pozsony, Nagy-Lévárd, Tavarnok, N.-Bossán, Selmeczbánya, Rozsnyó, Igló. IV. Eperjes. V. Nagyág, Nagyszeben. VIII. Fiume.

ab. *flavescens* Esp. — I. Budapest. II. Pécs, Sopron. III. Pozsony. IV. Eperjes. V. Nagyág, Szent-Gothárd.

320. *gilvago* Esp. — I. Budapest, Peszér, Nagyvárad. II. Pécs. III. Pozsony, Tavarnok, N.-Bossán, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Kolozsvár, Nagyszeben, Szent-Gothárd. VII. Diakovár.

ab. *palleago* Hb. — I. Budapest, Nagyvárad. IV. Eperjes. V. Szt-Gothárd.

321. *ocellaris* Bkh. — I. Budapest. III. Pozsony, Tavarnok. IV. Eperjes. V. Nagyszeben.

ab. *lineago* Gn. — III. Pozsony.

Oporina B.

322. *croceago* F. — I. Budapest. II. Pécs, Tapolcza, Sopron. III. Pozsony, Tavarnok, N.-Bossán. IV. Eperjes. V. Nagyág. VIII. Fiume.

Orrhodia Hb.

323. *fragariae* Esp. — I. Budapest. II. Pécs, Csákvár, Sopron. III. Pozsony. IV. Eperjes, C. Máramaros. V. Nagyág, Nagyszeben. VII. Varasd.

324. *erythrocephala* F. — I. Budapest. II. Pécs, Csákvár. III. Pozsony, Tavarnok, Nagy-Bossán, Rozsnyó, Igló, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyág, Nagyszeben, Sz.-Gothárd.

ab. *glabra* Hb. — I. Budapest. II. Csákvár, Sopron. III. Pozsony, Tavarnok, Nagy-Bossán, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyág, Nagyszeben, Sz.-Gothárd.

325. *veronicae* Hb. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Pécs, Sopron. III. Pozsony, Rozsnyó. IV. Eperjes. V. Nagyág.

326. *vau-punctatum* Esp. — I. Budapest, Peszér, Nagyvárad. II. Pécs, Csákvár, Sopron. III. Pozsony, Tavarnok, N.-Bossán. IV. Eperjes. V. Nagyág, Nagyszeben, Sz.-Gothárd.

ab. *immaculata* Stgr. — I. Budapest.

327. *vaccinii* L. — I. Budapest, Eger. II. Pécs, Csákvár, Sopron. III. Pozsony, Tavarnok, Nagy-Bossán,

Selmeczbánya, Rozsnyó, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyág, Nagyszeben, Sz.-Gothárd.

ab. *spadicea* Hb. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Pécs, Sopron. III. Pozsony, Tavarnok, Nagy-Bossán, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Gyeke, Nagyág, Nagyszeben, Sz.-Gothárd.

ab. *mixta* Stgr. — I. Budapest. II. Pécs. III. Pozsony, Tavarnok, N.-Bossán. IV. Eperjes. V. Nagyszeben.

328. *ligula* Esp. — I. Budapest. II. Pécs. III. Pozsony, Gölniczbánya. IV. Eperjes.

ab. *polita* Hb. — I. Budapest. II. Pécs, Sopron. III. Pozsony, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyág, Nagyszeben.

ab. *subspadicea* Stgr. —I. Budapest. II. Pécs. III. Pozsony, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyszeben.

329. *rubiginea* F. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Pécs, Sopron. III. Pozsony, Tavarnok, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyág, Sz.-Gothárd.

ab. *unicolor* Stgr. (i. l.) — I. Budapest.

Scopelosoma Curt.

330. *satellitia* L. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Pécs, Csákvár, Sopron. III. Pozsony, Tavarnok, Nagy-Bossán, Selmeczbánya, Rozsnyó, Gölniczbánya. IV. Eperjes, Jászó, Bustyaháza. V. Nagyág, Nagyszeben, Sz.-Gothárd. VI. Temesvár.

Scoliopteryx Germ.

331. *libatrix* L. — Ubique sat frequens.

Xylina O.

332. *semibrunnea* Hw. — I. Budapest. III. Pozsony, Tavarnok, N.-Bossán. IV. Eperjes.

333. *socia* Rott. — I. Budapest, Debreczen, Nagyvárad. III. Pozsony, Tavarnok, Nagy-Bossán, F.-Szarvas, Rozsnyó, Igló, Gölniczbánya, Gács. IV. Eperjes. V. Nagyág, Nagyszeben, Sz.-Gothárd. VIII. Fiume.

334. *furcifera* Hfn. — I. Budapest. II. Pécs, F.-Lövő. III. Pozsony, Tavarnok, N.-Bossán. IV. Eperjes. V. Verespatak, Nagyszeben, Sz.-Gothárd.

335. *ingrica* H.-S. — Rarior. III. N.-Bossán, Oravicz (com. Árva). V. Nagyszeben.

336. *ornithopus* Rott. — In reg. I—VI. frequens.

337. *Merckii* Rbr. — Rara. VI. ubi Kindermann observavit.

Calocampa Stph.

338. *vetusta* Hb. — I. Budapest, Eger, Debreczen. II. Pécs. III. Pozsony, Tavarnok, N.-Bossán, Gölniczbánya. IV. Eperjes, Bustyaháza. V. Nagyág, Nagyszeben. VI. Mehádia. VIII. Fiume.

339. *exoleta* L. — Ubique occurrit, reg. VI. excepta.

Xylomiges Gn.

340. *conspicillaris* L. — I. Budapest, Eger, Debreczen, Nagyvárad. II. Pécs, F.-Lövő, Sopron. III. Pozsony, Tavarnok, Lőcse. IV. Eperjes. V. Nagyág, Nagyszeben. VIII. Fiume.

ab. *melaleuca* View. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Pécs. III. Pozsony, Tavarnok. V. Nagyág, Nagyszeben. VIII. Fiume.

Scotochrosta Ld.

341. *pulla* Hb. — I. Budapest.

Astroscopus B.

342. *nubeculosus* Esp. — I. Budapest. III. Pozsony, Tavarnok, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyág, Nagyszeben, Kovászna.

343. *sphinx* Hfn. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Pécs, Sopron. III. Pozsony, Tavarnok, Felső-Szarvas, Rozsnyó. IV. Eperjes. V. Kolozsvár, Nagyág, Nagyszeben.

Xylocampa Gn.

344. *areola* Esp. — Rarior. III. Pozsony. IV. Eperjes.

Lithocampa Gn.

345. *ramosa* Esp. — Rarior. II. Pécs. IV. Eperjes. V. Nagyág.

Epimecia Gn.

346. *ustula* Frr. — Rara. I. Budapest, Peszér, Szeged. VII. Com. Szerém.

Calophasia Stph.

347. *casta* Bkh. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Pécs. IV. Eperjes. VIII. Fiume.

348. *platyptera* Esp. — Rarior. VIII. Fiume, Buccari.

349. *lunula* Hfn. — I. Budapest, Kalocsa, Szeged, Eger, Nagyvárad. II. Pécs, Zákány, Felső-Lövő, Sopron. III. Pozsony, Tavarnok. IV. Eperjes. V. Kolozsvár, Nagyszeben, Nagyág. VII. Vrdnik. VIII. Fiume.

Cleophana B.

350. *antirrhini* Hb. — I. Budapest. II. Pécs. III. Pozsony. V. Nagyág. VI. Mehádia. VII. Com. Szerém. VIII. Fiume.

Cucullia Schk.

351. *prenanthis* B. — II. Pécs, Sopron. V. Nagyszeben. VIII. Fiume.

352. *verbasci* L. — In toto regno occurit.
353. *scrophulariae* Cap. — I. Budapest, Eger. II. Pécs, Sopron. III. Pozsony, Nagy-Lévárd, Selmeczbánya, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyág. VIII. Fiume.
354. *lychnitis* Rbr. — I. Budapest. II. Pécs. III. Gölniczbánya. IV. Eperjes.
355. *thapsiphaga* Tr. — III. Pozsony. VIII. Fiume.
356. *blattariae* Esp. — Rara I. Budapest, Pécs. VIII. Fiume.
357. *asteris* Schiff. — I. Kalocsa. III. Poprád, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyág.
358. *celsiae* H.-S. — Valde rara. VI. Mehádia, ubi in exemplum unicum observatum.
359. *mixta* Frr. — I. Budapest.
360. *balsamitae* B. — I. Budapest, Peszér.
361. *umbratica* L. — Ubique frequens.
362. *lactucae* Esp. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Pécs, Sopron. III. Pozsony, Nagy-Lévárd, Selmeczbánya, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyág. VII. Josipdol. VIII. Fiume.
363. *lucifuga* Hb. — II. Kőszeg, Sopron. III. Pozsony. IV. Eperjes. V. Nagyág. VII. Josipdol. VIII. Fiume.
364. *campanulae* Frr. — Rara. III. Hermanecz. IV. Szádelő.
365. *chamomillae* Schiff. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Pécs. III. Pozsony, Tavarnok, Gács, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyág.
ab. *chrysanthemi* Hb. — I. Budapest. III. Pozsony.
v. *calendulae* Tr. — I. Budapest.
366. *tanaceti* Schiff. — I. Budapest. II. Pécs, Sopron. III. Pozsony, Nagy-Lévárd. V. Nagyág.
367. *xeranthemi* B. — Rarior. I. Budapest.
368. *gnaphalii* Hb. — Rara. I. Budapest, Peszér. V. Szt.Gothárd.
369. *fraudatrix* Ev. — I. Beél (com. Bihar). V. Nagyág. VII. Com. Szerém.
370. *artemisiae* Hfn. — I. Budapest. II. Pécs. III. Pozsony. IV. Eperjes, Homonna. V. Nagyág.
371. *absinthii* L. — I. Budapest. II. Pécs, Sopron. III. Tavarnok. IV. Eperjes. V. Nagyág. VI. Mehádia.
372. *formosa* Rgh. — II. Pécs.
373. *argentea* Hfn. — I. Budapest. III. Nagy-Lévárd. IV. Eperjes, Bustyaháza.
374. *argentina* F. — Valde rara. III. Pozsony, ubi unicum exemplum observatum.

Eurhipia B.

375. *adulatrix* Hb. — I. Budapest. II. Pécs. III. Tavarnok, Árvaváralja. VIII. Fiume.

Calpe B.

376. *capucina* Esp. — I. Budapest, Debreczen, Nagyvárad. II. Pécs. VIII. Fiume.

Telesilla H.-S.

377. *amethystina* Hb. — Rarior. V. Kolozsvár, Puj, Nagyág. VII. Com. Szerém.
378. *virgo* Tr. — Rara. VI. Futak.

Plusia O.

379. *triplasia* L. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Pécs, Sopron. III. Pozsony, Nagy-Lévárd, Tavarnok, Selmeczbánya, Kocsócz, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyág, Nagyszeben, Fogaras, Sz.-Gothárd. VIII. Fiume.
380. *asclepiadis* Schiff. — I. Budapest. II. Pécs, Sopron. III. F.-Szarvas. IV. Eperjes. V. Nagyág. VI. Mehádia.
381. *tripartita* Hfn. — Ubique occurrit, reg. VI. excepta.
382. *C-aureum* Knoch. — I. Budapest, Debreczen, Nagyvárad. II. Pécs. III. Pozsony. IV. Eperjes. V. Nagyág.
383. *deaurata* Esp. — I. Budapest. II. Pécs. V. Nagyág, Nagyszeben. VII. Com. Szerém.
384. *moneta* F. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Pécs, Győr. III. Igló. IV. Eperjes. VI. Mehádia.
385. *cheiranthi* Tausch. — Rara. VI. Temesvár.
386. *consona* F. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Pécs, Sopron. IV. Eperjes. V. Nagyszeben.
387. *illustris* F. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Pécs. III. Pozsony, Rózsahegy. V. Nagyág. VI. Mehádia. VII. Lipik.
388. *modesta* Hb. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Csáktornya. III. Pozsony, Rózsahegy. V. Nagyág. VI. Mehádia.
389. *chrysitis* L. — In toto regno occurrit.
390. *chryson* Esp. — Rara. I. Monor. IV. Eperjes. V. Nagyág, Puj.
391. *bractea* F. — I. Budapest. II. Pécs. III. Rohács (com. Árva). IV. Eperjes, Mons Gutin (com. Máramaros). V. Nagyág.
392. *festucae* L. — I. Budapest. II. Pécs, Sopron. III. Pozsony, Selmeczbánya, Igló, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyág, Nagyszeben.
393. *V-argenteum* Esp. — Rara. VIII. Fiume.
394. *gutta* Gn. — Ubique occurrit.
395. *chalcitis* Esp. — Rara. VIII. Fiume.
396. *jota* L. — I. Budapest, Parád. II. Tapolcza. III. Pozsony, Selmeczbánya, Rozsnyó, Igló, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyág, Brassó.
ab. *percontationis* Tr. — I. Budapest. V. Nagyszeben, Nagyág.

397. *pulchrina* Hw. — Rara. IV. Eperjes. V. Nagyszeben.
398. *gamma* L. — Ubique communis.
399. *ni* Hb. — Rara. I. Budapest. V. Nagyág. VIII. Fiume.
400. *interrogationis* L. — I. Eger, Nagyvárad. III. T.-Füred. V. Nagyág, Nagyszeben. VI. Báziás.
401. *ain* Hw. — Rara. IV. Eperjes.

Anophia Gn.

402. *leucomelas* L. — VIII. Fiume.

Aedia Hb.

403. *funesta* Esp. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Pécs. Nagy-Kanizsa, Sopron. III. Pozsony, Tavarnok. IV. Eperjes, Com. Máramaros. V. Nagyág, Nagyszeben. VI. Lipik.

Anarta Tr.

404. *myrtilli* L. — II. Sopron. III. Pozsony, Selmeczbánya, Gölniczbánya. IV. Eperjes.

Heliaca H.-S.

405. *tenebrata* Sc. — Ubique occurrit, sed regioni VI. deest.

Heliodes Gn.

406. *rupicola* Hb. — Rarior. I. Budapest. III. Pozsony.

Omia Gn.

407. *cymbalariae* Hb. — Rara. VI. Mons Domogled (com. Krassó-Szörény).

Heliothis Tr.

408. *cognatus* Frr. — I. Budapest, Szatymáz (com. Csongrád), Szeged. IV. Eperjes. VII. Čserević.
409. *cardui* Hb. — I. Budapest, Nagyvárad. III. Pozsony. IV. Eperjes. V. Nagyszeben. VIII. Fiume.
410. *ononidis* F. — I. Debreczen. II. Pécs, Sopron. III. Pozsony, Selmeczbánya, Rozsnyó. IV. Eperjes. V. Nagyág, Nagyszeben, Gyeke. VIII. Fiume.
411. *dipsaceus* L. — In toto regno frequens.
412. *scutosus* Schiff. — In reg. I—VII. observata.
413. *peltiger* Schiff. — I. Budapest. II. Pécs. III. Pozsony. IV. Eperjes, Com. Máramaros. V. Nagyszeben, Nagyág. VI. Orsova, Grebenácz, Ujvidék. VII. Com. Szerém, Lipik, Josipdol. VIII. Fiume, Buccari.
414. *armiger* Hb. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Sopron. III. Pozsony. IV. Eperjes. V. Nagyág, Nagyszeben. VI. Mehádia. VIII. Fiume.
415. *incarnatus* Frr. — Rara. VI. Orsova.

Chariclea Stph.

416. *delphinii* L. — I. Budapest, Szeged, Eger, Nagyvárad. II. Pécs. III. Tavarnok, C. Bars, Rozsnyó. V. Nagyág.
417. *purpurites* Tr. — I. Budapest. III. Pozsony. IV. Com. Máramaros.
418. *umbra* Hfn. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Pécs, Felső-Lövő, Sopron. III. Pozsony, Tavarnok, Rozsnyó, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyág, Nagyszeben. VII. Lipik. VIII. Fiume.

Acontia O.

419. *Titania* Esp. — Rara. I. Peszér. VI. Ulma.
420. *lucida* Hfn. — In toto regno occurrit.
v. *albicollis* F. — I. Budapest, Kisujszállás, Szeged. II. Pécs. III. Pozsony. IV. Eperjes. V. Nagyszeben. VI. Orsova.
ab. *insolatrix* Hb. — I. Budapest.
421. *luctuosa* Esp. — Ubique frequens.

Thalpochares Ld.

422. *arcuinna* Hb. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Pécs. IV. Eperjes. VIII. Fiume.
423. *suavis* Hb. — I. Budapest, Peszér. VI. Mehádia. VII. Vrdnik, Lipik. VIII. Fiume, Carlopago.
424. *jucunda* Hb. — Secundum Treitschke (V.3. 314) in Hungaria occurrit.
425. *Dardoini* B. — I. Budapest. IV. Eperjes. VII. Josipdol. VIII. Fiume.
426. *respersa* Hb. — I. Budapest. II. Pécs, Csákvár. Nezsider. III. Pozsony. IV. Eperjes. VIII. Fiume.
427. *polygramma* Dup. — Rara. VI. Mehádia. VIII. Fiume.
428. *communimacula* Hb. — I. Budapest, Eger, Nagyvárad. II. Pécs. III. Pozsony, Selmeczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyág.
429. *pannonica* Frr. — Rarior. I. Budapest, Peszér. II. Pécs. IV. Eperjes.
430. *ostrina* Hb. — Valde rara. VIII. Fiume.
431. *purpurina* Hb. — I. Budapest, Eger, Nagyvárad, Szeged. II. Pécs. IV. Eperjes, Komjáti. V. Kolozsvár, Sz.-Gothárd, Segesvár. IV. Grebenácz, Pancsova. VII. Josipdol. VIII. Fiume, Buccari.
432. *parva* Hb. — Valde rara. VIII. Fiume, Buccari.
433. *paula* Hb. — I. Budapest, Peszér. II. Pécs.
434. *helichrysi* Rbr. — Rara. VIII. Fiume.
435. *viridula* Gn. — Rara. VIII. Fiume, Buccari.

Erastria O.

436. *argentula* Hb. — I. Budapest, Peszér, Kalocsa, Szeged. II. Pécs. III. Pozsony, Tavarnok. IV. Eperjes. VI. Mehádia, Bálincz, Nagy-Kikinda, Uj-Szeged.

437. *uncula* Cl. — I. Budapest, Dabas. III. Pozsony. IV. Eperjes.
438. *obliterata* Rbr. — Valde rara. V. Sz.-Gothárd. VII. Čerević (com. Szerém).
439. *pusilla* View. — I. Budapest, Nagyvárad, Peér, Arad, Szeged. II. Pécs, Pápa. III. Pozsony, N.-Bossán, Rozsnyó. IV. Eperjes, Nagy-Károly. V. Nagyág, Nagyszeben, Sz.-Gothárd. VII. Lipik, Josipdol.
440. *deceptoria* Sc. — I. Budapest, Parád, Debreczen. II. Pécs, Kőszeg. III. Pozsony, Nagy-Lévárd, Tavarnok, Selmeczbánya, Rozsnyó. IV. Eperjes. V. Nagyág.
441. *fasciana* L. — Ubique occurrit.
ab. *Guenei* Fall. — VII. Lipik.

Phothedes Ld.

442. *captiuncula* Tr. — Rara. VI. Mehádia.

Prothymia Hb.

443. *viridaria* Cl. — In reg. I—V. VII. VIII. occurit.

Mesotrosta Ld.

444. *signalis* Tr. — Rarior. I. Budapest. VII. Vrdnik.

Agrophila B.

445. *trabealis* Sc. — In toto regno frequens.

Metoponia Dup.

446. *flava* Hb. (Koekeretziana Hb.) — Rara. I. Budapest. II. Pécs. V. Nagyág.
447. *vespertalis* Hb. — Rara. VIII. Zengg.

Euclidia O.

448. *mi* Cl. — In toto regno frequens.
v. *litterata* Cyr. — V. Brassó, Nagyszeben.
449. *glyphica* L. — Ubique frequens.
450. *triquetra* F. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Pécs. III. Kocsócz. Árvaváralja. VI. Grebenácz, Jeselnicza (com. Krassó-Szörény). VII. Josipdol.

Zethes Rbr.

451. *insularis* Rbr. — Rara. VIII. Fiume, Buccari.

Leucanitis Gn.

452. *stolida* F. — Rara. VIII. Fiume.

Grammodes Gn.

453. *algira* L. — II. Pécs. VI. Mehádia. VIII. Fiume, Buccari.

Pseudophia Gn.

454. *lunaris* Schiff. — In toto regno occurrit.

Catephia O.

455. *alchymista* Schiff. — I. Budapest, Hódmező-Vásárhely, Nagyvárad. II. Pécs, Sopron. III. Pozsony, Tavarnok, Rozsnyó, Igló. IV. Eperjes. V. Nagyág, Nagyszeben. VII. Károlyváros. VIII. Fiume.

Catocala Schrk.

456. *fraxini* L. — In regionibus I—V. non rara.
457. *elocata* Esp. — Ubique frequens.
458. *nupta* L. — In toto regno occurrit.
459. *dilecta* Hb. — I. Budapest, Szeged, Nagyvárad. II. Pécs. III. Tavarnok, Rozsnyó. V. Nagyág, Nagyszeben. VI.
460. *sponsa* L. — In regionibus I—VII. frequens.
461. *promissa* Esp. — In regionibus I—VII. observata.
462. *electa* Bkh. — In regionibus I—VII. occurrit.
463. *puerpera* Gior. — I. Budapest, Peszér, Szeged. II. Pécs. III. Pozsony, Nagy-Lévárd. Tavarnok, Nagy-Bossán, Kocsócz.
464. *paranympha* L. — In regionibus I—VII.
465. *hymenaea* Schiff. — In toto regno (reg. V. excepta) occurrit.
466. *conversa* Esp. — I. Budapest. II. Csákvár. III. Pozsony, Tavarnok. IV. Eperjes.
v. *agamos* Hb. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Pécs. III. Pozsony, Tavarnok. IV. Eperjes, Kassa.
467. *diversa* H.-G. — I. Budapest. II. Pécs. III. Tavarnok. VI.
468. *nymphagoga* Esp. — I. Parád. II. Pécs. III. Tavarnok. V. Nagyág.

Spintherops B.

469. *spectrum* Esp. — Rara. VIII. Fiume.
470. *cataphanes* Hb. — Rara. VIII. Martinšćica.
471. *dilucida* Hb. — Rara. VIII. Fiume.

Eccrita Ld.

472. *ludicra* Hb. — I. Budapest. II. Sopron. III. Rozsnyó. IV. Eperjes.

Toxocampa Gn.

473. *lusoria* L. — I. Budapest, Debreczen. II. Pécs, Sopron. III. Árvaváralja. IV. Eperjes. V. Nagyág. VIII. Buccari.
474. *pastinum* Tr. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Sopron. III. Pozsony, Nagy-Lévárd. IV. Eperjes. V. Nagyszeben, Nagyág.
475. *viciae* Hb. — I. Budapest, Parád. II. Sopron. III. Trencsén. IV. Eperjes. V. Nagyág. VII. Lipik.
476. *craccae* F. — I. Budapest, Eger, Nagyvárad. II. Pécs, Csákvár, Sopron. III. Pozsony, Tavarnok, Kocsócz. IV. Eperjes. V. Nagyág, Kolozsvár. VIII. Fiume, Buccari.

477. *limosa* Tr. — Rarior. I. Budapest. II. Pécs. VIII. Fiume.

Aventia Dup.

478. *flexula* Schiff. — I. Nagyvárad. II. Pécs. III. Rózsahegy. IV. Eperjes. V. Segesvár, Hargitta, Nagyág. VII. Lipik.

Boletobia B.

479. *fuliginaria* L. — In toto regno habitat.

Helia Gn.

480. *calvaria* F. — I. Budapest, Eger. II. Pécs, Csákvár. III. Pozsony, Tavarnok, Nagy-Bossán, F.-Szarvas, Kocsócz. IV. Eperjes, Szobráncz. V. Nagyág, Nagyszeben, Sz.-Gothárd. VI. Mehádia. VII. Lipik. VIII. Fiume.

Simplicia Gn.

481. *rectalis* Ev. — Rarior. I. Budapest, Peszér, Eger. IV. Eperjes.

Zanclognatha Ld.

482. *tarsiplumalis* Hb. — I. Budapest, Parád, Nagyvárad. II. Pécs, Kőszeg, Sopron. III. Pozsony, Rozsnyó. IV. Eperjes. V. Nagyág, Nagyszeben, P.-Kamarás. VI. Mehádia. VII. Vrdnik, Lipik.

483. *tarsicristalis* Hb. — II. Pécs. VIII. Fiume.

484. *grisealis* Hb. — I. Budapest. II. Pécs. III. Pozsony. IV. Eperjes. VI. Mehádia, Bálincz, Temesvár. VII. Lipik.

485. *tarsipennalis* Tr. — I. Budapest, Parád, Miskolcz. II. Pécs, Zákány. IV. Eperjes. VII. Lipik. VIII. Fiume.

486. *bidentalis* Hein. — Rarior. IV. Eperjes.

487. *tarsicrinalis* Knoch. — I. Budapest, Parád, Debreczen. II. Pécs, Pápa, Sopron. III. Pozsony, Nagy-Bossán, Rozsnyó, Gölniczbánya. IV. Eperjes, N.-Károly. V. Nagyág, Sz.-Gothárd. VI. Temesvár. VII. Lipik.

488. *stramentacealis* Brem. — Rarissima; in Europa solum in Hungaria in regione VII. apud pagum Lipik specimen unicum observatum.

489. *emortualis* Schiff. — I. Budapest. II. Pécs. III. Pozsony, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyszeben, Nagyág. VI. Mehádia, Temesvár. VII. Lipik. VIII. Fiume.

Madopa Stph.

490. *salicalis* Schiff. — I. Budapest, Kalocsa, Parád, Nagyvárad. II. Szombathely, Kőszeg, Sopron. III. Pozsony, Tavarnok, Rozsnyó, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyág, Nagyszeben. VII. Lipik, Vrdnik, Josipdol. VIII. Fiume.

Herminia Latr.

491. *cribrumalis* Hb. — II. Pécs. IV. Eperjes. V. Nagyág.

492. *gryphalis* H.-S. — VI. Mehádia. VII. Lipik, Com. Szerém.

493. *crinalis* Tr. — I. Budapest, Nagyvárad. III. Pozsony, Rozsnyó. IV. Vörösmart. V. Nagyág, Fogaras. VI. Bálincz. VIII. Buccari.

494. *tentacularia* L. — In toto regno habitat.

495. *derivalis* Hb. — Ubique occurrit.

Pechypogon Hb.

496. *barbalis* Cl. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Pécs, Sopron. III. Pozsony, Selmeczbánya, Rozsnyó, Tátra, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyág, Nagyszeben. VI. Temesvár. VII. Lipik, Josipdol, Plitvica. VIII. Fiume.

Bomolocha Hb.

497. *fontis* Thnb. — III. Pozsony, Rozsnyó, Tátra. IV. Eperjes. V. Oláh-Láposbánya, Nagyszeben, Brassó. VIII. Fiume.

Hypena Tr.

498. *antiqualis* Hb. — Rara. VI. Orsova. VIII. Fiume, Buccari.

499. *rostralis* L. — Ubique sat frequens, solum in reg. VI. non observata.

ab. *radiatalis* Hb. — I. Budapest, Dabas, Peszér. II. Pécs. III. Gölniczbánya.

500. *proboscidalis* L. — Ubique observata, reg. II. excepta.

501. *palpalis* Hb. — Rara. VIII. Fiume.

502. *obesalis* Tr. — I. Debreczen. III. Felső-Szarvas, Rozsnyó, Igló, Gölniczbánya. V. Nagyág, Oláh-Láposbánya, Gyeke. VIII. Fiume.

503. *obsitalis* Hb. — Rara. VIII. Fiume, Buccari.

Hypenodes Gn.

504. *costaestrigalis* Stph. — Rarior. I. Budapest. II. Pécs. IV. Eperjes.

505. *albistrigatus* Hw. — Rarus. I. Budapest. IV. Eperjes.

Orectis Ld.

506. *proboscidata* H.-S. — Rara. VI. Mehádia. VIII. Fiume, Buccari.

Rivula Gn.

507. *sericealis* Sc. — I. Budapest, Parád, Nagyvárad. II. Pécs. III. Pozsony, Kocsócz, Rozsnyó, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyág, Sz.-Gothárd, Nagyszeben, Fogaras. VI. Bálincz. VII. Lipik, Josipdol, Plitvica. VIII. Fiume.

D) BREPHIDES.

Fam. BREPHIDAE.

Brephos O.

1. *Parthenias* L.—I. Budapest, Szeged, Eger. II. Pécs, Sopron. III. Pozsony, N.-Lévárd, Tavarnok, Trencsén, Árvaváralja, Rozsnyó, Tátra, Lőcse, Gölniczbánya. IV. Eperjes, Kassa, F.-Tőkés. V. Nagyág.
2. *nothum* Hb. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Pécs, III. Pozsony, Nagy-Lévárd, Tavarnok, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyág, Nagyszeben.
3. *puella* Esp. — I. Budapest, Szeged, Eger, Nagyvárad. II. Pécs. III. Pozsony, Nagy-Lévárd. Tavarnok. IV. Eperjes. V. Nagyág. VI.

E) GEOMETRAE.

Fam. GEOMETRIDAE.

Pseudoterpna H.-S.

1. *pruinata* Hfn. — Ubique frequens.

Geometra B.

2. *papilionaria* L. — In regionibus I—VI. occurrit.
3. *vernaria* Hb. — Ubique habitat.

Phorodesma B.

4. *pustulata* Hfn. — In reg. I—V. et VII. occurrit.
5. *smaragdaria* F. — In regionibus I—VII.

Eucrostis Hb.

6. *herbaria* Hb. — Rara. VIII. Fiume.
7. *indigenata* Vill. — Valde rara. VI. Grebenácz.

Nemoria Hb.

8. *viridata* L. — In toto regno occurrit.
9. *porrinata* Z. — Ubique habitat, solum regioni V. deest.
10. *pulmentaria* Gn. — I. Budapest, Parád, Peér. II. Pécs, Csákvár. III. Pozsony. V. Nagyág, Kovászna. VII. Vrdnik.
11. *strigata* Müll. — In regionibus I—V. VII. VIII.

Thalera Hb.

12. *fimbrialis* Sc. — In toto regno habitat.

Jodis Hb.

13. *putata* L. — II. Pécs. III. Pozsony, Tátra, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyág. VI. Temesvár, Mehádia. VII. Plitvica.
14. *lactearia* L. — III. Pozsony, Com. Bars, Selmeczbánya, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyág. VI. Temesvár, Bálincz. VII. Lipik.

Acidalia Tr.

15. *pygmaearia* Hb. — Valde rara. II. Sopron.
16. *trilineata* Sc. — Ubique frequens.
17. *flaveolaria* Hb. — Rarior. IV. Eperjes.
18. *perochraria* F.-R. — Ubique frequens, solum regioni II. deest.
19. *ochrata* Sc. — In regionibus I—VII. frequens.
20. *rufaria* Hb. — In toto regno habitat.
21. *consanguinaria* Ld. — Rara. VI. Mehádia.
22. *sericeata* Hb. — I. Budapest. II. Pécs. III. Pozsony, Rozsnyó, Igló. IV. Eperjes. V. Nagyág. VIII. Fiume.
23. *moniliata* F. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Pécs. III. Pozsony. IV. Eperjes. V. Nagyág. VII. Lipik, Josipdol. VIII. Fiume.
24. *muricata* Hfn. — I. Budapest, Peszér, Debreczen, Nagyvárad. III. Pozsony, Selmeczbánya. IV. Eperjes, S.-A.-Ujhely. VI. Bálincz. VII. Lipik. VIII. Fiume.
25. *dimidiata* Hfn. — I. Budapest, Peszér, Szeged, Parád. III. Pozsony, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyág. VI. Mehádia. VII. Lipik.
26. *sodaliaria* H.-S. — Rara. VI. Mehádia. VIII. Fiume, Buccari.
27. *virgularia* Hb. — In reg. I—V. et VII. occurrit.
    v. *canteneraria* B. — VI. Mehádia. VIII. Fiume.
    ab. *Bischoffaria* Latr. — I. Budapest, Peszér.
28. *straminata* Tr. — I. Budapest. III. Pozsony, Gölniczbánya. IV. Eperjes, Com. Máramaros. VI. Mehádia.
29. *pallidata* Bkh. — In reg. I. III—VII. habitat.
30. *subsericeata* Hw. — I. Budapest. II. Pécs. IV. Eperjes. VI. Fehértemplom. VII. Lipik. VIII. Fiume.
    v. *mancuniata* Knaggs. — VII. Lipik.
31. *laevigaria* Hb. — I. Parád. II. Somogy-Szobb. V. Nagyszeben. VII. Lipik, Josipdol.
32. *extarsaria* H.-S. — Rara. VIII. Fiume.
33. *obsoletaria* Rbr. — I. Budapest, Peszér. III. Tavarnok. IV. Eperjes. VI. Orsova.
34. *incarnaria* H.-S. — Rara. VIII. Fiume.
35. *herbariata* F. — In reg. I—IV. VII. VIII. habitat.
36. *Pecharia* Stgr. — Rarior. I. Budapest.
37. *elongaria* Rbr. — Rara. VI. Mehádia.
38. *bisetata* Hfn. — I. Budapest. III. Pozsony.

Rozsnyó. IV. Eperjes. V. Nagyág, Sz.-Gothárd, Nagyszeben. VII. Diakovár, Lipik.

39. *trigeminata* Hw. — Ubique observata.

40. *politata* Hb. — V. Kolozsvár. VI. Bálincz. VII. Lipik, Josipdol. VIII. Fiume.
ab. *abmarginata* Bohatsch. — VI. Mehádia. VII. Lipik.

41. *filicata* Hb. — I. Budapest. II. Pécs. IV. Eperjes. V. Nagyág. VIII. Fiume.

42. *rusticata* F. — In toto regno occurrit.
v. *vulpinaria* H.-S. — II. Pécs. III. Pozsony. IV. Eperjes. VIII. Fiume.

43. *humiliata* Hfn. — Ubique frequens, solum regioni VI. deest.

44. *dilutaria* Hb. — I. Budapest, Peszér, Szeged, Parád. II. Pécs, Pápa. III. Pozsony, Rozsnyó, Igló, Gölniczbánya. V. Nagyág. VI. Mehádia. VII. Lipik, Josipdol.

45. *holosericata* Dup. — I. Budapest, Parád. II. Pécs. Pápa, Kőszeg. IV. Eperjes. VI. Mehádia. VII. Lipik, Vrdnik, Diakovár. VIII. Fiume.
ab. *praeustaria* Mn. — I. Parád. VI. Mehádia. VII. Lipik. VIII. Fiume.

46. *nitidata* H.-S. — Rarior. V. Nagyszeben. VI. Mehádia. VII. Lipik.

47. *diffluata* H.-S. — Valde rara. VI. Mehádia.

48. *degeneraria* Hb. — I. Budapest, Debreczen. II. Pécs, Pápa. III. Pozsony. IV. Eperjes. V. Nagyág. VI. VIII. Fiume.

49. *bilinearia* Fuchs. (ab. *rubraria* Stgr.). — Rarior. I. Budapest.

50. *inornata* Hw. — In toto regno habitat.

51. *deversaria* H.-S. — Ubique observata, regione V. excepta.

52. *aversata* L. — Ubique occurrit.
ab. *spoliata* Stgr. — I. Budapest, Com. Bihar. III. Pozsony, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyszeben. VII. Lipik.

53. *emarginata* L. — I. Budapest, Peszér. III. Pozsony, Tavarnok, Kocsócz, Igló, Rozsnyó. IV. Eperjes. V. Kolozsvár, Nagyszeben. VII. Lipik.

54. *immorata* L. — Ubique frequens.

55. *tessellaria* B. — Valde rara. VII. Josipdol, Zágráb.

56. *rubiginata* Hfn. — In toto regno occurit.

57. *marginepunctata* Göze. — Ubique habitat.

58. *luridata* Z. — Rara. VI. Mehádia.
v. *confinaria* H.-S. — VI. Mehádia. VIII. Fiume.

59. *submutata* Tr. — Rara. II. Pápa. VIII. Fiume, Buccari.

60. *incanata* L. — In toto regno habitat.

61. *fumata* Stph. — III. Koritnicza, Rózsahegy, Bresztova, Tátra, Gölniczbánya. IV. Eperjes, Com. Máramaros. V. Nagyág.

62. *remutaria* Hb. — I. Budapest. III. Pozsony, Igló. IV. Eperjes. V. Nagyág. VI. Temesvár. VII. Lipik, Josipdol. VIII. Fiume.

63. *nemoraria* Hb. — IV. Eperjes.

64. *punctata* Tr. — I. Budapest, Nagyvárad. III. Rózsahegy. IV. Eperjes. V. Nagyág. VI. Mehádia, Orsova. VII. Vrdnik.

65. *caricaria* Reutt. — Rarior. I. Budapest. IV. Nagy-Károly. VI. Mehádia. VII. Lipik.

66. *immutata* L. — In toto regno observata, regione II. excepta.

67. *strigaria* Hb. — In toto regno occurrit.

68. *umbellaria* Hb. — I. Debreczen. III. Pozsony. IV. Eperjes. V. Nagyág. VIII. Fiume.

69. *strigillaria* Hb. — Ubique habitat.

70. *emutaria* Hb. — I. Kisujszállás, Szeged, Eger. III. Tavarnok. V. Kolozsvár. VIII. Fiume.

71. *flaccidaria* Z. — I. Budapest, Püspök-Ladány, Peér, Szeged. II. Kőszeg. IV. Szatmár. V. Szent-Gothárd. VI. Bálincz, Baja. VII. Lipik.
ab. *albicans* Stgr. i. l. — VII. Lipik.

72. *imitaria* Hb. — V. Kolozsvár. VI. Banatus. VIII. Fiume.

73. *eugeniata* Mill. — Rara. VI. Mehádia.

74. *ornata* Sc. — Ubique observata, regione VI. excepta.

75. *decorata* Bkh. — In toto regno occurrit, solum regioni VI. deest.

Zonosoma Ld.

76. *pendularia* Cl. — I. Budapest, Parád. III. Pozsony, Selmeczbánya, Rozsnyó, Gölniczbánya. IV. Eperjes, Szatmár, Com. Máramaros. V. Nagyág, Nagyszeben.

77. *orbicularia* Hb. — V. Nagyág. VI. Mehádia. VII. Lipik.

78. *annulata* Schulze. — Ubique observata.

79. *albiocellaria* Hb. — I. Budapest, Nagyvárad. III. Pozsony. V. Nagyág. VI. Orsova. VII. Lipik, Josipdol. VIII. Fiume.

80. *pupillaria* Hb. — VIII. Fiume.
ab. *gyrata* Hb. — I. Budapest. VIII. Fiume.
v. *nolaria* Hb. — VIII. Fiume.

81. *porata* F. — I. Budapest, Kisujszállás, Parád, Nagyvárad. III. Pozsony, Rozsnyó. IV. Eperjes. V. Nagyág, VI. Bálincz. VII. Lipik, Josipdol. VIII. Fiume.

82. *punctaria* L. — In toto regno habitat.
v. *suppunctaria* Z. — I. Eger. III. Pozsony.
ab. *ruficiliaria* H.-S. — I. Budapest, Eger. II. Pécs. IV. Eperjes.

83. *linearia* Hb. — Ubique observata, regionibus VI. et VIII. exceptis.
v. *strabonaria* Z. — VII. Lipik.

Timandra Dup.

84. *amata* L. — Ubique frequens.

Pellonia Dup.

85. *vibicaria* Cl. — In toto regno frequens.
v. *strigata* Stgr. — I. Budapest, Parád. II. Pécs.
ab. *roseata* Ersch. — I. Budapest.
86. *sicanaria* Z. — Valde rara. VI. Banatus.
87. *calabraria* Z. — III. Bresztova, Igló. IV. Eperjes. VI. Mehádia. VIII. Fiume.
v. *tabidaria* Z. — VI. Versecz, Mehádia.

Abraxas Leach.

88. *grossulariata* L. — Ubique frequens.
89. *sylvata* Sc. — II. Csákvár. III. Pozsony, Nagy-Lévárd, Selmeczbánya, Bresztova. IV. Eperjes, Fajnavölgy. V. Nagyág. VI. Mehádia. VIII. Fiume.
90. *adustata* Schiff. — In toto regno frequens.
91. *marginata* L. — Ubique observata, regione VIII. excepta.
ab. *pollutaria* Hb. — I. Budapest, Peszér. II. Kőszeg, Győr. III. Gölniczbánya. IV. Eperjes. VII. Lipik.

Orthostixis Hb.

92. *cribraria* Hb. — II. Pécs. VI. Mehádia, Orsova, Versecz.

Bapta Stph.

93. *pictaria* Curt. — Rarior. II. Pécs. IV. Eperjes.
94. *bimaculata* F. — I. Budapest, Debreczen, Nagyvárad, Arad. III. Pozsony, Nagy-Lévárd, Teplicz, Gölniczbánya, Rozsnyó. IV. Eperjes. V. Nagyág. VI. Temesvár.
95. *temerata* Hb. — In toto regno observata, regione II. excepta.

Stegania Dup.

96. *dilectaria* Hb. — I. Budapest, Szeged, Nagyvárad. II. Pécs, Barcs, Drávafok, Pápa. III. Pozsony, Tavarnok. V. Nagyág, VI. Szabadka.
97. *cararia* Hb. — Valde rara. IV. Eperjes; exemplum unicum.

Cabera Tr.

98. *pusaria* L. — Ubique occurrit.
99. *exanthemata* Sc. — In toto regno observata.

Numeria Dup.

100. *pulveraria* L. — I. Debreczen, Nagyvárad, Peér. III. Pozsony, Nagy-Lévárd, Rozsnyó, Igló, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyszeben. Nagyág. VI. Bálincz. VII. Lipik, Josipdol.
101. *capreolaria* F. — III. Pozsony, Igló, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Oláh-Láposbánya, Nagyszeben. VII. Fužine.

Ellopia Tr.

102. *prosapiaria* L. — I. Budapest. II. Felső-Lövő. III. Pozsony, F.-Szarvas, Rozsnyó, Tátra, Igló. IV. Eperjes. V. Nagyág, Borszék.
ab. *prasinaria* Hb. — I. Budapest. III. Igló. IV. Eperjes. V. Oláh-Láposbánya.

Metrocampa Ltr.

103. *margaritaria* L. — In toto regno habitat.
104. *honoraria* Schiff. — Rara. III. Pozsony. IV. Eperjes.

Eugonia Hb.

105. *quercinaria* Hfn. — In regionibus I—V. et VII. observata.
ab. *infuscata* Stgr. — III. Pozsony.
ab. *carpinaria* Hb. — VII. Lipik.
106. *autumnaria* Wernb. — In reg. I., III—VI.
107. *alniaria* L. — I. Eger, Nagyvárad. II. F.-Lövő. III. Pozsony, Com. Bars, Selmeczbánya, Rozsnyó, Igló, Lőcse. IV. Eperjes, Com. Máramaros.
108. *erosaria* Bkh. — In regionibus I—V. et VIII. occurrit.
ab. *tiliaria* Hb. — I. Budapest, Parád, Nagyvárad. II. Pécs. III. Pozsony. IV. Eperjes. V. Nagyág. VII. Lipik.
ab. *unicoloria* Esp. — II. Pécs.
109. *quercaria* Hb. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Pécs. III. Pozsony, Selmeczbánya, N.-Maros, Kocsócz. IV. Eperjes. VIII. Fiume.

Selenia Hb.

110. *bilunaria* Esp. — Ubique observata, regione VI. excepta.
v. *juliaria* Hw. — I. Budapest. II. Pécs. III. Pozsony, Gölniczbánya. VII. Lipik.
111. *lunaria* Schiff. — I. Budapest, Eger, Nagyvárad. II. Pécs. III. Pozsony, Nagy-Lévárd, Rozsnyó, Gölniczbánya. IV. Eperjes, Bodrogköz. V. Nagyág, Nagyszeben.
v. *delunaria* Hb. — I. Budapest. II. Pécs. III. Pozsony. IV. Eperjes. V. Nagyszeben. VII. Lipik.
112. *tetralunaria* Hfn. — II. Pécs, Csákvár. III. Pozsony, Nagy-Lévárd, Lőcse, Gölniczbánya. IV. Eperjes. Diakovár.
v. *aestiva* Stgr. — II. Pécs. III. Pozsony, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyszeben.

Pericallia Stph.

113. *syringaria* L. — In reg. I—V. et VII. occurrit.

Therapis Hb.

114. *evonymaria* Schiff. — I. Budapest, Eger, Nagyvárad. II. Pécs. III. Pozsony, Kocsócz, Rozsnyó. IV. Eperjes. V. Nagyág, Nagyszeben.

Odontoptera Stph.

115. *bidentata* Cl. — I. Budapest. III. Selmeczbánya. IV. Eperjes, Bodrogköz. V. Nagyág.

Himera Dup.

116. *pennaria* L. — In reg. I—V. et VIII. observata.

Crocallis Tr.

117. *tusciaria* Bkh. — I. Budapest, Peszér. IV. Eperjes.

118. *elinguaria* L. — Ubique observata, regione VII. excepta.
ab. *trapezaria* B. — III. Pozsony.

Eurymene Dup.

119. *dolabraria* L. — In toto regno occurrit.

Angerona Dup.

120. *prunaria* L. — Ubique occurrit.
ab. *sordiata* Fssl. — I. Eger, Nagyvárad. II. Pécs. III. Pozsony, Gölniczbánya. IV. Eperjes, Com. Zemplén. VII. Lipik.

Urapteryx Leach.

121. *sambucaria* L. — In toto regno occurrit.

Rumina Dup.

122. *luteolata* L. — In reg. I—V., VII. et VIII.

Epione Dup.

123. *apiciaria* Schiff. — Ubique observata, regionibus II. et VI. exceptis.

124. *paralellaria* Schiff. — III. Pozsony, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyág, Kolozsvár.

125. *advenaria* Hb. — II. Pécs. III. Pozsony, Rozsnyó. IV. Eperjes, Nagy-Károly. VII. Lipik, Diakovár.

Hypoplectis Hb.

126. *adspersaria* Hb. — I. Nagyvárad, Peér. III. Rozsnyó. IV. Eperjes. V. Nagyág, Nagyszeben. VI. Mehádia. VIII. Fiume.

Caustoloma Ld.

127. *flavicaria* Hb. — In regionibus I—VII.

Venilia Dup.

128. *macularia* L. — In toto regno communis.
ab. *quadrimaculata* Hatch. — I. Budapest.

Eilicrinia Hb.

129. *cordiaria* Hb. — I. Budapest, Szeged, Nagyvárad. III. Pozsony. VI. Mehádia, Temesvár. VII. Com. Szerém, Lipik.
v. *Roeslerstammaria* Stgr. — I. Budapest. II. Sz.-Fehérvár. III. Pozsony. VI. Temesvár, Mehádia, Pancsova, Zimony. VIII. Fiume.

Macaria Curt.

130. *notata* L. — I. Budapest. II. Csákvár, Sopron. III. Pozsony, Nagy-Lévárd, Selmeczbánya, Tátra, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. N.-Szeben. VI. Temesvár.

131. *alternaria* Hb. — Ubique frequens, solum in regione VI. non observata.

132. *signaria* Hb. — III. Igló, Gölniczbánya. IV. Eperjes, Lungacsásza. V. Kolozsvár, Nagyszeben. VII. Josipdol.

133. *aestimaria* Hb. — Rarior. IV. Eperjes.

134. *liturata* Cl. — I. Budapest. III. Pozsony, Rozsnyó. IV. Eperjes.

Ploseria B.

135. *pulverata* Thnb. — IV. Eperjes.

Lignyoptera Ld.

136. *fumidaria* Hb. — I. Budapest.

Hibernia Latr.

137. *rupicapraria* Hb. — I. Budapest. III. Pozsony, Gölniczbánya. IV. Eperjes, Kassa. V. Nagyág.

138. *bajaria* Schiff. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Pécs. III. Pozsony. IV. Eperjes. V. Nagyág.

139. *leucophaearia* Schiff. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Pécs. III. Pozsony, Tavarnok, Rozsnyó, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyág. Nagyszeben.

140. *aurantiaria* Esp. — I. Budapest, Eger, Nagyvárad. II. Pécs. III. Pozsony, Tavarnok, Rozsnyó. IV. Eperjes. V. Nagyág, Nagyszeben.

141. *marginaria* Bkh. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Pécs. III. Pozsony, Selmeczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyág. Nagyszeben.

142. *Ankeraria* Stgr. — Rara. I. Budapest.

143. *defoliaria* Cl. — Ubique observata, regione VII. excepta.

Anisopteryx Stph.

144. *aceraria* Schiff. — I. Budapest, Eger. II. Pécs. III. Pozsony. IV. Eperjes. V. Nagyág, Szent-Gothárd.

145. *aescularia* Schiff. — I. Budapest, Eger, Nagyvárad. II. Pécs. III. Pozsony, Tavarnok, Rozsnyó, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyág, Nagyszeben. VIII. Fiume.

Phigalia Dup.

146. *pedaria* F. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Pécs, Felső-Lövő. III. Pozsony, Tavarnok, Rozsnyó, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyág, Nagyszeben.

Chondrosoma Anker.

147. *fiduciaria* Anker. — Valde rara. I. Budapest.

Biston Leach.

148. *hispidarius* F. — I. Budapest, II. Pécs. III. Pozsony, Tavarnok. IV. Eperjes. V. Nagyág, Nagyszeben.

149. *pomonarius* Hb. — I. Budapest, III. Pozsony, Selmeczbánya, Rozsnyó. IV. Eperjes.

150. *zonarius* Schiff. — I. Budapest, Eger, Nagyvárad. III. Pozsony, Tavarnok. IV. Eperjes. VIII. Fiume.

151. *alpinus* Sulz. — Rarus. VIII. Fiume.

152. *graecarius* Stgr. — Rarus. VIII. Fiume.

153. *hirtarius* Cl. — Ubique observatus, reg. IV. excepta.

154. *stratarius* Hfn. — In regionibus I—V. occurrit.

Amphidasys Tr.

155. *betularius* L. — Ubique habitat, solum regioni VII. deest.

Nychiodes Ld.

156. *lividaria* Hb. — Rara. VIII. Fiume.

Synopsia Hb.

157. *sociaria* Hb. — I. Budapest, Eger. II. Pécs. III. Pozsony. VI. Német-Szt-Péter. VII. Lipik. VIII. Fiume.

v. *propinquaria* Gn. — III. Pozsony.

Boarmia Tr.

158. *perversaria* B. — Valde rara. VIII. Fiume, exemplum unicum.

v. *correptaria* Z. — VIII. Fiume.

159. *cinctaria* Schiff. — Ubique plus-minus frequens.

160. *gemmaria* Brahm. — Ubique communis.

161. *Viertlii* Bohatsch. — Rara. I. Budapest. II. Pécs.

162. *secundaria* Esp. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Csákvár. III. Pozsony, Rózsahegy, Igló, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyág.

163. *abietaria* Hb. — III. Rózsahegy, Strecsnó, Rohács, Igló, Gölniczbánya. IV. Eperjes, Bártfa, Lungacsásza.

164. *umbraria* Hb. — Rara. I. Nagyvárad.

165. *repandata* L. — Ubique observata, regione VI. excepta.

ab. *conversaria* Hb. — III. Pozsony, Gölniczbánya. IV. Eperjes.

ab. *macula* Stgr. — IV. Eperjes.

166. *roboraria* Schiff. — I. Budapest, Szeged, Parád, Nagyvárad. II. Kőszeg. III. Pozsony, Tavarnok. IV. Eperjes. V. Nagyág, Nagyszeben.

167. *consortaria* F. — Ubique occurrit.

168. *angularia* Thnb. — I. Budapest. II. Pécs. III. Pozsony, Nagy-Lévárd. IV. Eperjes. V. Nagyág. VII. Lipik, Fužine. VIII. Fiume, Carlopago.

169. *lichenaria* Hfn. — I. Budapest, Parád. II. Pécs, F.-Lövő. III. Pozsony, Tavarnok, Gölniczbánya. IV. Eperjes. VII. Lipik, Josipdol.

170. *glabraria* Hb. — III. Igló. IV. Eperjes. VII. Lipik.

171. *selenaria* Hb. — Ubique occurrit.

v. *dianaria* Hb. — VIII. Fiume.

172. *crepuscularia* Hb. — Ubique frequens.

ab. *defessaria* Fr. — I. Budapest. II. Pécs, Csákvár. III. Pozsony. IV. Eperjes. V. Nagyszeben.

173. *consonaria* Hb. — III. Tátra, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyszeben.

174. *luridata* Bkh. — III. Pozsony, Nagy-Lévárd, Tavarnok. IV. Eperjes. V. Nagyszeben, Brassó.

175. *punctularia* Hb. — In toto regno observata, excepta regione VI.

Tephronia Hb.

176. *sepiaria* Hfn. — I. Budapest. III. Pozsony, Kocsócz. IV. Eperjes. VI. Bálincz. VIII. Fiume.

Pachycnemia Stph.

177. *hippocastanaria* Hb. — Rara. IV. Eperjes.

Gnophos Tr.

178. *Stevenaria* B. — Valde rara. VIII. Carlopago, specimen unicum.

179. *dumetata* Tr. — Rarior. I. Budapest. II. Pécs. III. Pozsony, Igló. V. Nagyág.

180. *furvata* F. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Pécs. III. Pozsony, Tavarnok. IV. Eperjes. V. Nagyág, Nagyszeben. VI. Báziás.

181. *respersaria* Hb. — Rara. VIII. Fiume.

182. *sartata* Tr. — Rara. VIII. Fiume.

183. *obscuraria* Hb. — I. Budapest. II. Pécs. III. Pozsony, Rozsnyó. IV. Eperjes. V. Nagyág. VIII. Fiume.

184. *ambiguata* Dup. — Rarior. IV. Eperjes.

185. *pullata* Tr. — I. Budapest. IV. Eperjes. V. Nagyág. VI. Mehádia.

186. *glaucinaria* Hb. — III. Igló, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyág. VI. Mehádia.

v. *supinaria* Mn. — VII. Sušak. VIII. Fiume.

187. *variegata* Dup. — Rarior. I. Budapest. IV. Eperjes. VI. Mehádia. VII. Sušak. VIII. Fiume.
188. *mucidaria* Hb. — Rara. VII. Josipdol. VIII. Fiume.
189. *serotinaria* Hb. — Rara. IV. Com. Máramaros. V. Nagyág.
190. *sordaria* Thnb. v. *mendicaria* H.-S. — III. Rozsnyó. IV. Com. Máramaros. VII. Velebit.
191. *dilucidaria* Hb. — III. Pozsony, Rozsnyó, Rózsahegy, Zsolna, Árvaváralja, Tátra, Igló, Gölniczbánya. IV. Eperjes, Lungacsácza, Fajnavölgy. V. Nagyág, Nagyszeben.
192. *obfuscaria* Hb. — Rara. V. Nagyág.
193. *operaria* Hb. — Rara. III. Pozsony.

Psodos Tr.

194. *coracina* Esp. — III. Montes Rohács et Tátra. IV. Eperjes.
195. *trepidaria* Hb. — Rara. III. Tátra.
196. *alpinata* Sc. — III. M. Rohács, Rozsnyó. IV. Eperjes, mons Pietrosz (com. Máramaros).
197. *quadrifaria* Sulz. — III. Mons Rohács. IV. Lungacsásza.

Fidonia Tr.

198. *fasciolaria* Rott. — I. Budapest, Kisujszállás, Debreczen. IV. Eperjes. V. Nagyszeben. VI. Temesvár. VIII. Fiume.
v. *tessularia* Metz. — VI. N.-Becskerek.
199. *carbonaria* Cl. — I. Budapest, Eger, Nagyvárad. III. Pozsony, Rozsnyó, Tátra. IV. Eperjes.
200. *roraria* F. — III. Pozsony, Tavarnok, Rozsnyó, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyág. VII. Zágráb.

Ematurga Ld.

201. *atomaria* L. — Ubique frequens.
ab. *unicoloraria* Stgr. — I. Budapest. II. Pécs. III. Gölniczbánya. V. Nagyszeben. VII. Lipik.

Bupalus Leach.

202. *pinarius* L. — I. Budapest. II. F.-Lövő. III. Pozsony, Nagy-Lévárd, Tavarnok, Selmeczbánya, Rozsnyó, Tátra. IV. Eperjes, Com. Máramaros. V. Nagyág.

Selidosema Hb.

203. *ericetaria* Vill. — I. Budapest. II. Pécs. III. Pozsony, Kocsócz. IV. Eperjes. V. Nagyág.

Halia Dup.

204. *wauaria* L. — In reg. I—V. et VIII. frequens.
205. *brunneata* Thnb. — II. Kőszeg. III. Rozsnyó, Rózsahegy, Bresztova, Tátra, Gölniczbánya. IV. Eperjes, Mons Gutin. V. Nagyág, Oláh-Láposbánya.

Diastictis Hb.

206. *artesiaria* F. — I. Budapest, Peszér. III. Pozsony, Tavarnok. IV. Eperjes. V. Nagyág. VII. Lipik.

Phasiane Dup.

207. *petraria* Hb. — I. Szeged, M.-Gyepes (com. Bihar). II. Zákány. III. Tavarnok, Igló, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyág. VII. Lipik, Josipdol.
208. *glarearia* Brahm. — Ubique frequens.
209. *clathrata* L. — Ubique frequens.
ab. *cancellaria* Hb. — IV. Eperjes.

Eubolia B.

210. *arenacearia* Hb. — I. Budapest, Peszér, Szeged, Parád, Nagyvárad. II. Pécs, Csákvár. III. Pozsony. IV. Eperjes. VI. Bálincz. VII. Josipdol.
v. *flavidaria* Ev. — I. Budapest, Parád. VI. Bálincz. VII. Vrdnik.
211. *murinaria* F. — I. Budapest, Peszér, Szeged, Parád, Nagyvárad. II. Pécs. III. Pozsony. IV. Eperjes. V. Mezőzáh, Nagyszeben. VII. Vrdnik, Josipdol. VIII. Fiume.
ab. *cineraria* Dup. — I. Budapest, Parád. II. Pécs, Csákvár. III. Pozsony.

Scodiona B.

212. *belgaria* Hb. v. *favillacearia* Hb. — Rara. V. Nagyág.
213. *conspersaria* F. — I. Budapest. II. Pécs. III. Pozsony. IV. Eperjes. V. Maros-Ujvár. VII. Josipdol. VIII. Fiume. Buccari.
v. *turturaria* B. — I. Budapest.

Cleogene B.

214. *lutearia* F. — Rarior. I. Budapest. III. Rozsnyó.
215. *niveata* Sc. — Rara. V. Nagyág.

Scoria Stph.

216. *lineata* Sc. — Ubique frequens.

Aspilates Tr.

217. *formosaria* Ev. — Valde rara. I. Budapest; exemplum unicum.
218. *gilvaria* F. — I. Budapest, Debreczen, Nagyvárad. III. Pozsony, Rozsnyó, Igló, Gölniczbánya. IV. Eperjes. VI. Mehádia.
219. *ochrearia* Rossi. — Rara. VIII. Fiume.
220. *strigillaria* Hb. — I. Debreczen, Nagyvárad. III. Pozsony, Tavarnok. IV. Eperjes. V. Nagyág, Nagyszeben. VI. Mehádia. VIII. Fiume.

Aplasta Hb.

221. *ononaria* Fssl. — IV. Eperjes. V. Nagyág. VIII. Fiume.

Sterrha Hb.

222. *sacraria* L. — Valde rara. VII. Velebit. VIII. Fiume.

Lythria Hb.

223. *purpuraria* L. — Ubique frequens.
v. *rotaria* F. — I. Budapest, Szeged. II. Csákvár. III. Pozsony, Tavarnok, Gölniczbánya.

Ortholitha Hb.

224. *coarctata* F. — I. Budapest, Nagyvárad. III. Pozsony. IV. Eperjes. V. Kolozsvár. VII. Josipdol. VIII. Fiume.
225. *plumbaria* F. — Ubique frequens.
226. *cervinata* Schiff. — I. Nagyvárad. III. Sztranszke (com. Trencsén), Gölniczbánya. IV. Eperjes.
227. *limitata* Sc. — In toto regno observata.
228. *moeniata* Sc. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Pécs. III. Pozsony, Znióváralja, Rozsnyó, Tátra, Igló, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyág, Nagyszeben. VIII. Fiume.
229. *bipunctaria* Schiff. — In toto regno habitat.

Mesotype Hb.

230. *virgata* Rott. — I. Budapest, Peszér. II. Pécs. III. Pozsony, Rozsnyó. IV. Eperjes. V. Kolozsvár, Nagyszeben. VI. Mehádia. VIII. Fiume.

Minoa B.

231. *murinata* Sc. — Ubique frequens.
ab. *cineraria* Stgr. — VII. Josipdol.
v. *cyparissaria* Mn. — VIII. Fiume.

Odezia B.

232. *atrata* L. — In regionibus III—VI.
233. *tibiale* Esp. — Rara. IV. Eperjes. VI. Mehádia.

Siona Dup.

234. *decussata* Bkh. — I. Budapest, Eger, Nagyvárad. III. Pozsony. VI. Ujvidék. VII. Vrdnik.
ab. *fortificata* Tr. — I. Budapest.

Lithostege Hb.

235. *griseata* Schiff. — I. Budapest, Szeged. II. Pécs, Sz.-Fehérvár, Csákvár, Mohács. III. Pozsony, Nagy-Lévárd, Tavarnok, Kocsócz, Rozsnyó. IV. Eperjes. VIII. Fiume.
236. *farinata* Hfn. — I. Budapest, Nagyvárad, Belényes, Szeged, Csongrád. II. Pécs. III. Pozsony, Nagy-Lévárd. IV. Eperjes. V. Brassó. VII. Diakovár. VIII. Fiume.

Anaitis Dup.

237. *praeformata* Hb. — II. Csákvár. III. Pozsony, Tavarnok, Rozsnyó, Igló, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyág, Nagyszeben. VI. Mehádia. VII. Josipdol.
238. *plagiata* L. — In toto regno observata.
v. *pallidata* Stgr. — I. Budapest. VI. Temesvár.
239. *simpliciata* Tr. — Rara. VI. Mehádia.
240. *paludata* Thnb. v. *imbutata* Hb. — I. Budapest. IV. Eperjes. V. Nagyág. VI. Com. Temes.

Chesias Tr.

241. *spartiata* Fssl. — Rarior. IV. Eperjes.
242. *rufata* F. — I. Budapest, Arad. IV. Eperjes. VIII. Fiume.

Lobophora Curt.

243. *polycommata* Hb. — I. Budapest. II. Pécs. III. Pozsony. IV. Eperjes.
244. *sertata* Hb. — Rarior. III. Pozsony. V. Nagyág.
245. *carpinata* Bkh. — I. Budapest. III. Pozsony, Gölniczbánya. IV. Eperjes.
246. *halterata* Hfn. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Pécs. III. Pozsony, Tavarnok, Selmeczbánya, Rozsnyó, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyág.
ab. *zonata* Thnb. — III. Pozsony.
247. *sexalisata* Hb. — Rarior. III. Pozsony, Gölniczbánya. IV. Eperjes. VII. Lipik.
248. *viretata* Hb. — Rarior. IV. Eperjes. VIII. Fiume.

Chimatobia Ld.

249. *brumata* L. — In toto regno.
250. *boreata* Hb. — II. Pécs. III. Pozsony, Gölniczbánya. IV. Eperjes. VII. Fužine.

Triphosa Stph.

251. *sabaudiata* Dup. — I. Oncsásza, Fonácza (com. Bihar). VI. Mehádia. VIII. Fiume.
252. *dubitata* L. — In toto regno occurrit.
ab. *cinereata* Stph. — VII. Lipik.

Eucosmia Stph.

253. *certata* Hb. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Csákvár. III. Pozsony, Tavarnok, Igló, Gölniczbánya. IV. Eperjes. VII. Josipdol.
254. *undulata* L. — I. Budapest, Eger. III. Pozsony, Com. Bars, Selmeczbánya, Rozsnyó, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Kisbánya.

Scotosia Stph.

255. *vetulata* Schiff. — In toto regno observata.
256. *rhamnata* Schiff. — Ubique occurrit.

257. *badiata* Hb. — I. Budapest. II. Pécs. III. Pozsony, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyág. VIII. Fiume.

Lygris Hb.

258. *reticulata* F. — Rara. III. F.-Szarvas. IV. Eperjes. V. Nagyág.

259. *prunata* L. — Ubique observata, regione VI. excepta.

260. *testata* L. — III. Tátra, Gölniczbánya. IV. Eperjes.

261. *populata* L. — Ubique observata, exceptis regionibus VI. et VIII.

ab. *musauaria* Frr. — III. Tátra.

262. *associata* Bkh. — Rarior. IV. Eperjes.

Cidaria Tr.

263. *dotata* L. — In toto regno observata, excepta regione VII.

264. *fulvata* Forst. — I. Budapest, Parád, Nagyvárad. II. Pécs. III. Pozsony, Rózsahegy, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyág. VIII. Fiume.

265. *ocellata* L. — Ubique occurrit, sed regioni VI. deest.

266. *bicolorata* Hfn. — I. Parád. III. Pozsony, Rozsnyó, Kocsócz, Bresztova, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Verespatak. VIII. Fiume.

267. *variata* Schiff. — Ubique observata, exceptis regionibus II. et VI.

v. *obeliscata* Hb. — I. Budapest. III. Pozsony. IV. Eperjes. VII. Josipdol.

ab. *stragulata* Hb. — III. Tátra, Gölniczbánya. V. Oláh-Láposbánya.

268. *juniperata* L. — III. Pozsony, Rózsahegy. IV. Eperjes. V. Nagyszeben. VII. Josipdol.

269. *cupressata* H.-G. — Rara. VIII. Fiume.

270. *siterata* Hfn. — In reg. I—V. VII. et VIII.

271. *miata* L. — In reg. I—IV. pluribus locis.

272. *taeniata* Stph. — Rara. III. Tátra.

273. *truncata* Hfn. — III. Tavarnok, Selmeczbánya, com. Zólyom, Rózsahegy, Igló. IV. Eperjes. V. Nagyág, Nagyszeben, Mons Magura (c. Kolozs).

ab. *perfuscata* Hw. — V. Nagyszeben.

274. *firmata* Hb. — Rarior. III. Poprád. IV. Eperjes.

275. *aptata* Hb. — Rarior. III. Gölniczbánya. V. Nagyág.

276. *olivata* Bkh. — I. Budapest. III. Pozsony, Rózsahegy, Gölniczbánya. IV. Eger. V. Nagyág. VI. Mehádia.

277. *viridaria* F. — I. Nagyvárad. II. Pécs. III. Pozsony. IV. Eperjes. V. Nagyág. VII. Lipik, Josipdol. VIII. Fiume.

278. *salicata* Hb. — III. Com. Zólyom, Igló, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Brassó. VI. Mehádia. VII. Josipdol.

v. *probaria* H.-S. — VIII. Fiume.

279. *didymata* L. — III. Tavarnok, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyág.

280. *cambrica* Curt. — Valde rara. IV. Com. Máramaros. VIII. Fiume.

281. *vespertaria* Bkh. — I. Budapest. III. Pozsony, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Kolozsvár, Nagyszeben, Nagyág.

282. *incursata* Hb. — Rarior. IV. Eperjes. VII. Plitvica.

283. *fluctuata* L. — Ubique frequens; in reg. VI. non observata.

284. *montanata* Bkh. — In toto regno occurrit.

285. *quadrifasciaria* Cl. — II. Kőszeg. III. Pozsony, Rozsnyó, Tátra, Igló, Gölniczbánya. IV. Eperjes, Bártfa. V. Kolozsvár, Nagyág. VII. Lipik, Josipdol. VIII. Fiume.

286. *ferrugata* Cl. — In reg. I. III. IV. V. VII. et VIII. pluribus locis.

ab. *spadicearia* Bkh. — III. Pozsony, Bresztova, Igló, Gölniczbánya. IV. Eperjes.

v. *unidentaria* Hw. — I. Com. Csongrád. III. Igló. IV. Eperjes. VI. Bálincz.

287. *suffumata* Hb. — Rarior. IV. Eperjes. V. Nagyág.

288. *pomoeraria* Ev. — III. Pozsony, Bresztova, Tátra, Igló, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyág. VII. Lipik. VIII. Fiume.

289. *designata* Rott. — II. Pécs. III. Pozsony, Igló, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyág. VII. Lipik.

290. *fluviata* Hb. — I. Budapest, Peszér, Szeged. IV. Eperjes. V. Kolozsvár, Nagyág, Nagyszeben, Szent-Gothárd. VII. Lipik. VIII. Fiume.

291. *vittata* Bkh. — Rara. IV. Eperjes.

292. *dilutata* Bkh. — In regionibus. I—IV. non rara.

ab. *obscurata* Stgr. — I. Budapest. II. Pécs. III. Pozsony, Gölniczbánya. IV. Eperjes.

ab. *autumnata* Gn. — IV. Eperjes.

293. *caesiata* Lang. — III. Rózsahegy, Sztranszke, Tátra, Igló, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyág, Nagyszeben, m. Magura, m. Vurvupiatra.

294. *cyanata* Hb. — Rara. III. F.-Szarvas. VI. Mehádia.

295. *tophaceata* Hb. — III. Gölniczbánya. IV. Eperjes. VI. Mehádia.

296. *achromaria* Lah. — Rara. VIII. Fiume.

297. *incultraria* H.-S. — Rara. VI. Mehádia.

298. *nebulata* Tr. — IV. Eperjes. VII. Fužine. VIII. Buccari.

299. *erberata* Sc. — III. F.-Szarvas, Koritnicza, Tátra. IV. Eperjes. V. Nagyág.

300. *senectaria* H.-S. — Rara. VIII. Fiume.

301. *frustata* Tr. — I. Budapest. IV. Eperjes. V. Nagyág.

302. *scripturata* Hb. — I. Szeged. IV. Eperjes. V. Nagyág. VI. Mehádia. VII. Plitvica. VIII. Fiume, Buccari.

303. *riguata* Hb. — I. Budapest, Peszér. Parád. II. Pécs. III. Pozsony. IV. Eperjes. VII. Vrdnik, Lipik. VIII. Fiume.
304. *adumbraria* H.-S. — Rara. VII. Fužine.
305. *picata* Hb. — II. Szaár. IV. Eperjes. V. Nagyág, P. Kamarás. VI. Mehádia. VII. Lipik.
306. *cucullata* Hfn. — In toto regno (reg. VI. excepta) occurrit.
307. *galiata* Hb. — Ubique habitat.
308. *rivata* Hb. — In reg. I. III—V. VII. et VIII.
309. *sociata* Bkh. — In regionibus I—V. et VII.
310. *unangulata* Hw. — I. Szeged. III. Tavarnok. IV. Eperjes. VII. Lipik.
311. *alaudaria* Frr. — III. Árvaváralja. IV. Eperjes.
312. *albicillata* L. — In toto regno habitat.
313. *procellata* F. — I. Budapest, Parád, Nagyvárad. II. Pécs. III. Pozsony. V. Nagyág, Nagyszeben. VII. Lipik, Zágráb.
314. *lugubrata* Stgr. — III. Pozsony, Tavarnok. IV. Eperjes. VII. Zágráb.
315. *hastata* L. — I. Budapest, Peszér. III. Pozsony, Rozsnyó, Kocsócz, Tátra, Igló, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyág, Nagyszeben.
v. *subhastata* Nolck. — I. Budapest. III. Tavarnok, Gölniczbánya. IV. Eger.
316. *tristata* L. — In toto regno (reg. VI. excepta) observata.
317. *luctuata* Hb. — II. Kőszeg. III. Pozsony, Rozsnyó, Rózsahegy, Bresztova, Igló, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyág.
318. *molluginata* Hb. — II. Kőszeg. III. Rózsahegy, Bresztova, Gölniczbánya. IV. Eperjes, Lungacsász. V. Nagyág, Oláh-Láposbánya. VII. Velebit.
319. *affinitata* Stph. — IV. Eperjes.
v. *turbaria* Stph. — IV. Eperjes. VI. Mehádia. VII. Zágráb.
320. *alchemillata* L. — In reg. I—V. VII. et VIII.
321. *hydrata* Tr. — I. Budapest, Debreczen. IV. Eperjes. VIII. Fiume.
322. *lugdunaria* H.-S. — Valde rara. I. Budapest. IV. Eperjes. VII. Lipik.
323. *unifasciata* Hw. ab. *aquilaria* H.-S. — I. Budapest, Peszér. III. Poprád, Gölniczbánya. IV. Eperjes.
324. *minorata* Tr. — Rarior. IV. Eperjes. V. Nagyág.
325. *adaequata* Bkh. — I. Budapest. III. Pozsony, Rózsahegy, Gölniczbánya. IV. Eperjes, Fajnavölgy. V. Nagyág, Malomviz. VII. Velebit. VIII. Fiume.
326. *albulata* Schiff. — In regionibus I. III—VIII.
327. *candidata* Schiff. — In toto regno observata.
328. *anseraria* H.-S. (*soldaria* Turati). — Valde rara. VII. Lipik, exemplum unicum.
329. *testaceata* Don. — IV. Eperjes. V. Oláh-Láposbánya.
330. *Blomeri* Curt. — Rarus. IV. Eperjes, Ungvár.
331. *decolorata* Hb. — I. Parád. Debreczen. III. Rozsnyó, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyág, P. Kamarás. VII. Lipik, Josipdol. VIII. Fiume.
332. *luteata* Schiff. — I. Budapest, Peszér, Nagyvárad. II. Sopron. III. Pozsony, Nagy-Lévárd, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyág. VI. Mehádia. VII. Vrdnik, Lipik. VIII. Buccari.
333. *obliterata* Hfn. — I. Eger, Parád. III. Pozsony, Rozsnyó, Gölniczbánya IV. Eperjes. VII. Lipik, Josipdol.
334. *bilineata* L. — Ubique frequens.
335. *sordidata* F. — In reg. II—VI. observata.
ab. *fusco-undata* Donz. — IV. Eperjes.
v. *infuscata* Stgr. — III. Tátra. IV. Eperjes.
336. *trifasciata* Bkh. — I. Budapest. III. Pozsony, Rozsnyó, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyág. VII. Josipdol. VIII. Fiume.
337. *literata* Don. — Rara. III. Igló.
338. *capitata* H.-S. — Rarior. III. Selmeczbánya. VI. Eperjes. V. Nagyág.
339. *silaceata* Hb. — III. Pozsony, Rózsahegy, Rozsnyó, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyág. VI. Mehádia. VII. Lipik.
ab. *insulata* Hw. — IV. Eperjes.
340. *corylata* Thnb. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Pécs. III. Pozsony. IV. Eperjes. V. Nagyág. VII. Lipik. VIII. Buccari.
341. *berberata* Schiff. — I. Budapest, Eger. III. Pozsony. IV. Eperjes. V. Nagyág. VII. Diakovár.
342. *nigrofasciaria* Göze. — I. Budapest, Nagyvárad, Arad. II. Pécs. III. Pozsony, Tavarnok. IV. Eperjes. V. Nagyág. VIII. Fiume.
343. *rubidata* F. — In regionibus I—V. VII. et VIII.
344. *sagittata* F. — III. Pozsony. IV. Eperjes. V. Nagyág.
345. *comitata* L. — Ubique frequens, sed in regione VII. hucusque non observata.
346. *lapidata* Hb. — Rara. IV. Eperjes. V. Nagyszeben. VI. Mehádia.
347. *polygrammata* Bkh. — I. Budapest, Peszér, Parád. III. Pozsony, Igló. IV. Eperjes. V. Nagyág, Nagyszeben. VII. Lipik. VIII. Fiume.
v. *conjunctaria* Ld. — Secundum Staudinger occurrit in Hungaria.
348. *aquata* Hb. — Rara. IV. Eperjes.
349. *vitalbata* Hb. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Pécs. III. Pozsony, Kocsócz. IV. Eperjes. V. Nagyág. VII. Lipik, Josipdol. VIII. Fiume, Buccari.
350. *corticata* Tr. — I. Budapest, II. Pécs, Csákvár.

III. Pozsony, Zólyom. VI. Mehádia. VII. Josipdol. VIII. Fiume.

351. *tersata* Hb. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Pécs. III. Pozsony, Kocsócz, Bresztova. IV. Eperjes. V. Nagyág. VII. Vrdnik, Lipik, Josipdol. VIII. Fiume.
v. *tersulata* Stgr. — IV. Eperjes.

352. *aemulata* Hb. — Rarior. III. Pozsony. IV. Eperjes.

353. *caligrapharia* H.-S. — Rara. VIII. Fiume

Collix Gn.

354. *sparsata* Tr. — I. Budapest, Parád. IV. Eperjes. VI. Bálincz. VII. Lipik.

Eupithecia Curt.

355. *fenestrata* Mill. — Valde rara. VII. Mons Badden ; specimen unicum.

356. *oblongata* Thnb. — Ubique frequens.

357. *Gueneata* Mill. — Rara. I. Budapest. II. Pécs.

358. *glaucomictata* Mn. — Valde rara. III. Verebély, (com. Bars) ; specimen unicum.

359. *irriguata* Hb. — I. Budapest, Debreczen. II. Pécs. III. Pozsony. VIII. Fiume.

360. *insigniata* Hb. — I. Budapest. II. Pécs. III. Pozsony. IV. Eperjes. V. Nagyág. VIII. Fiume.

361. *venosata* F. — III. Pozsony. VIII. Fiume.

362. *alliaria* Stgr. — Rara. I. Budapest.

363. *subnotata* Hb. — I. Budapest, Dabas, Szeged, Debreczen, Nagyvárad. II. Pécs. III. Pozsony. IV. Eperjes. V. Nagyág.

364. *pulchellata* Stph. v. *digitaliaria* Dietze. — Valde rara. VI. Resicza.

365. *linariata* F. — I. Budapest, Eger, Parád. II. Pécs, Sopron. III. Pozsony, Kocsócz, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Nagyág. VII. Plitvica.

366. *pusillata* F. — I. Budapest, Peszér. III. Kocsócz. IV. Eperjes, Vörösmart. VII. Josipdol.

367. *abietaria* Göze. — I. Budapest. III. Strecsnó, Bresztova. IV. Eperjes. V. Kolozsvár, Nagyág.

368. *debiliata* Hb. — I. Budapest, Miskolcz. II. Kőszeg. III. Pozsony, Selmeczbánya, Rozsnyó. IV. Eperjes.

369. *coronata* Hb. — Rara. VI. Nagy-Becskerek. VII. Lipik.

370. *rectangulata* L — Ubique habitat, reg. VI. excepta.
ab. *subaerata* Hb. — I. Miskolcz. III. Pozsony.
ab. *cydoniata* Bkh. — III. Pozsony. V. Nagyág.
ab. *nigrosericeata* Hw. — IV. Eperjes.

371. *chloerata* Mab. — Rarior. IV. Eperjes, Szatmár. V. Nagyszeben. VII. Lipik.

372. *scabiosata* Bkh. — Rara. IV. Eperjes.
ab. *obrutaria* H.-S. — VIII. Fiume.
ab. *orphnata* Bohatsch. — II. Pécs.

373. *denticulata* Tr. — I. Budapest. III. Bresztova. IV. Eperjes. V. Nagyág.

374. *millefoliata* Rössl. — I. Parád, Nagyvárad. II. Pécs. IV. Eperjes.

375. *succenturiata* L. — I. Budapest. II. Pécs. III. Pozsony. IV. Eperjes. VIII. Fiume
v. *subfulvata* Hw. — I. Budapest.
ab *oxydata* Tr. — I. Budapest. V. Nagyág.

376. *scopariata* Rbr. v. *Guinardaria* B. — Rara. VIII. Fiume.

377. *nanata* Hb. — III. Lucsivna. IV. Eperjes. VII. Josipdol.

378. *innotata* Hfn. — I. Budapest, Nagyvárad, Vaskoh. II. Pécs. III. Pozsony, Tavarnok, N. Bossán, Gölniczbánya. IV. Eperjes. VII. Josipdol. VIII. Fiume.
v. *fraxinata* Crew. — I. Budapest. II. Pécs.

379. *impurata* Hb. — III. F.-Szarvas, Bresztova. IV. Com. Máramaros. VIII. Fiume.

380. *semigrapharia* H.-S. — Rara. IV. Eperjes.

381. *graphata* Tr. — I. Budapest, Kalota, Szőllős (com. Bihar). II. Pécs. V. Puj.

382. *Mayeri* Mn. — Valde rara. IV. Eperjes.

383. *riparia* H.-S. — Rara. VIII. Fiume.

384. *isogrammaria* H.-S. — I. Budapest, Parád, Nagyvárad. II. Pécs. VI. Mehádia, Baziás, Krassova. VII. Lipik. VIII. Buccari.

385. *tenuiata* Hb. — I. Budapest. IV. Eperjes, Com. Máramaros.

386. *inturbata* Hb. — Valde rara. I. Budapest ; specimen unicum.

387. *plumbeolata* Hw. — I. Budapest, Parád. II. Pécs. III. Pozsony, Rozsnyó, Igló. IV. Eperjes, Com. Máramaros. VII. Vrdnik, Lipik, Josipdol. VIII. Fiume.

388. *undata* Frr. — Rara. VIII. Fiume, Martinšćica.

389. *valerianata* Hb. — IV. Eperjes, Lungacsásza. V. Nagyág.

390. *immundata* Z. — Rara. IV. Eperjes.

391. *satyrata* Hb. — III. Pozsony, F.-Szarvas. IV Eperjes. V. Nagyág. VII. Josipdol.

392. *veratraria* H.-S. — Rara. IV. Lungacsászā. VI. Mehádia.

393. *helveticaria* B. — Rarior. IV. Eperjes. VII. Josipdol.
v. *arceuthata* Frr. — IV. Eperjes. VI. Mehádia. VII. Josipdol.

394. *castigata* Hb. — I. Dabas, Parád. III. Pozsony, N.-Bossán, Gölniczbánya. IV. Eperjes. VII. Lipik, Josipdol.

395. *selinata* H.-S. — Rara. IV. Eperjes. VII. Lipik.

396. *vulgata* Hw. — I. Budapest, Parád, Gyöngyös,

P.-Ladány. III. Rozsnyó. Igló. IV. Eperjes. V. Nagyszeben, Nagyág. VII. Lipik.

397. *albipunctata* Hw. — Rara. III. Selmeczbánya. IV. Eperjes.

398. *actaeata* Walde. — Rara. I. Budapest. IV. Eperjes. V. Nagyszeben.

399. *assimilata* Gn. — Rara. V. Nagyág. VII. Lipik.

400. *minutata* Gn. — Rara. II. Sopron.

401. *absinthiata* Cl. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Pécs. III. Pozsony, Tavarnok, N.-Bossán, Gölniczbánya. IV. Eperjes. V. Kolozsvár, Nagyág. VIII. Fiume.

402. *pimpinellata* Hb. — I. Budapest. IV. Eperjes. V. Nagyág.

403. *euphrasiata* H.-S. — Rara. I. Budapest. II. Pécs.

404. *gemellata* H.-S. — Rara. VI. Mehádia. VIII. Fiume, Buccari.

405. *extraversaria* H.-S. — Valde rara. I. Budapest. Specimen unicum ex Hungaria cognitum.

406. *distinctaria* H.-S. — Rara. III. Tátrafüred. VI. Mehádia.

407. *indigata* Hb. — Rara. I. Isaszeg. V. Kolozsvár.

408. *lariciata* Frr. — Rarior. IV. Eperjes.

409. *exiguata* Hb. — Rara. V. Nagyág.

410. *lanceata* Hb. — Rara. IV. Eperjes.

411. *rosmarinata* Mill. — Valde rara. VIII. Fiume.

412. *sobrinata* Hb. — Rara. I. Budapest.

413. *pumilata* Hb. — I. Budapest. II. Pécs. III. Rozsnyó. VI. Mehádia. VII. Lipik, Josipdol. VIII. Fiume.

MICROLEPIDOPTERA.

Auctoribus Joanne Pável et Ferdinando Uhryk.

Fam. PYRALIDAE.

Subfamilia. PYRALINAE.

Cledeobia Dup.

1. *moldavica* Esp. — I. Budapest. VI. Herkulesfürdő. VIII. Fiume, Buccari ; hic illic rara.

2. *bombycalis* Schiff. — I. Budapest, Ujpest ; non rara.

3. *connectalis* Hb. — I. Budapest. III. Trencsén, Kocsócz (com. Trencsén) ; valde rara.

4. *brunealis* Tr. — I. Budapest, Csepel. VII. Ujbánya (com. Bars).

5. *honestalis* Tr. — I. Budapest, Kocsócz. VIII. Fiume ; frequens.

6. *angustalis* Schiff. — I. Budapest, Csepel. II. Sopron, Teplicz (com. Trencsén). V. Nagyág (com. Hunyad). VI. Szemenik (com. Krassó-Szörény) ; hic illic frequens.

Hypotia L.

7. *corticalis* Schiff. — VIII. Fiume.

Aglossa Latr.

8. *pinguinalis* L. — In omnibus regionibus.

9. *cuprealis* Hb. — VIII. Fiume.

Asopia Tr.

10. *rubidalis* Schiff. — I. Budapest. III. Kocsócz. VII. Josipdol (Károlyváros).

11. *incarnatalis* Z. — Secundum Wocke etiam Hungariæ incola.

12. *glaucinalis* L. — I. Budapest, Dabas. V. Nagyág. VII. Josipdol.

13. *regalis* Schiff. — I. Budapest. IV. Kassa. V. Nagyág. VIII. Fiume.

14. *costalis* F. — I. Budapest. II. Sopron. V. Nagyág. VII. Josipdol.

15. *farinalis* L. — In toto regno observata.

16. *domesticalis* Z. — I. Hortobágy (com. Hajdu).

Endotricha Z.

17. *flammealis* Schiff. — I. Budapest. II. Sopron. V. Nagyág. VII. Josipdol.

Talis Gn.

18. *quercella* Schiff. — I. Budapest. III. Kocsócz.

Scoparia Hw.

19. *ochrealis* Schiff. — VI. Kőszeg. V. Brassó. VII. Josipdol.

20. *centuriella* Schiff. — I. Montes Mátra ; Budapest. II. Kőszeg. III. Liptó.

21. *ambigualis* Tr. — I. Budapest, Montes Mátra. II. Kőszeg. V. Nagyág. VI. Oravicza.

22. *Zelleri* Wk. I. Budapest.

23. *ingratella* Z. — VII. Josipdol.

24. *dubitalis* Hb. — I. Budapest, Mátra. II. Sopron, Kőszeg. IV. Kassa, Mármaros. V. Nagyág. VII. Josipdol.

25. *phaeoleuca* Z. — VI. Torontál.

26. *valesialis* Dup. — Secundum Wocke in montosis Hungariæ occurrit.

27. *sudetica* Z. — I. Budapest. V. Kovászna; rara.
28. *truncicolella* Stt. — II. Kőszeg.
29. *crataegella* Hb. — VII. Josipdol.
30. *frequentella* Stt. — V. Nagyág. VIII. Fiume.
31. *pallida* Stph. — I. Budapest. Rara.

Heliothela Gn.

32. *atralis* Hb. — I. Budapest, Dabas. V. Nagyág, Szent-Gotthard (com. Szolnok-Doboka). VII. Josipdol.

Noctuomorpha Gn.

33. *normalis* Hb. — I. Budapest. II. Sopron. VII. Josipdol. VIII. Fiume.

Threnodes Gn.

34. *pollinalis* Schiff. — I. Budapest. II. Sopron. IV. Kassa. V. Nagyág, Brassó. VII. Josipdol. VIII. Fiume, Buccari.

Hercyna Tr.

35. *phrygialis* Hb. — V. Nagyág
ab. *sericealis* Hb. — II. Sopron.
36. *alpestralis* F. — V. Nagyág.

Ennychia Ld.

37. *albofascialis* Tr. — I. Budapest. VIII. Fiume.
38. *Ledereri* Stgr. — Teste O. Staudinger et Hungariæ incola.*

Phlyctaenodes Gn.

39. *pustulalis* Hb. — I. Budapest, Mártonkata, Isaszegh.

Odontia Dup.

40. *dentalis* Schiff. — I. Budapest. V. Nagyág. VII. Josipdol.

Algedonia Ld.

41. *luctualis* Hb. — V. Nagyág.

Eurrhypara Hb.

42. *urticata* L. — In omnibus regionibus occurrit.

Botys Tr.

43. *nigralis* F.—VII. Josipdol; nonunquam frequens.
44. *quadripunctalis* Schiff. — Secundum Herrich-Schäffer Hungariæ incola.
45. *octomaculata* F. — II. Sopron. V. Nagyág. VIII. Fiume.
46. *nyctemeralis* Hb. — Teste M. Wocke et Hungariæ incola.
47. *nigrata* Sc. — VII. Josipdol. VIII. Fiume.
48. *cingulata* Zs. — I. Budapest. II. Sopron. VI. Grebenácz (com. Krassó-Szörény). VII. Josipdol.
49. *fascialis* Hb. — I. Budapest. III. Kocsócz. V. Nagyág. VII. Josipdol.
50. *obfuscata* Sc. — I. Budapest. II. Kőszeg. III. Kocsócz. VIII. Fiume.
51. *aurata* Sc. — I. Budapest, (Montes Mátra). II. Sopron. III. Igló. V. Nagyág. VII. Josipdol. VIII. Fiume.
52. *falcatalis* Gn. — I. Budapest. VI. Szászka. Herkulesfürdő. VII. Josipdol. VIII. Fiume.
53. *purpuralis* L. — I. Budapest. II. Sopron. III. Kocsócz. IV. Homonna, Mármaros. V. Nagyág. VII. Josipdol. VIII. Fiume.
v. *ostrinalis* Hb. — I. Budapest.
54. *sanguinalis* L. — I. Budapest. V. Nagyág. VII. Josipdol, Crkvenica. VIII. Fiume, Portoré.
v. *virginalis* Dup. — VIII. Fiume, Martinšćica.
55. *castalis* Fr. — Teste Herrich-Schäffer in regione banatica (VI.).
56. *dulcinalis* Tr. — I. Budapest, Csepel; rara.
57. *caespitalis* Schiff. — I. Budapest. V. Kolozsvár, Nagyág, Kovászna. VII. Josipdol. VIII. Fiume, communis.
58. *manualis* Hb. — I. Budapest, circa urbem nonnunquam frequens.
59. *aerealis* Hb. — V. Nagyág.
60. *alpinalis* Schiff. — III. Tátra. IV. Mármaros. VI. Herkulesfürdő, in montosis frequens.
61. *uliginosalis* Stph. — Teste Herrich-Schäffer in Hungariæ montibus occurrit.
62. *nebulalis* Hb. — III. Tátra.
63. *polygonalis* Hb. — I. Budapest. II. Sopron. V. Nagyág; non rara.
64. *trinalis* Schiff. — I. Budapest. V. Nagyág, hic illic frequens.
65. *flavalis* Schiff. — V. Nagyág. VII. Josipdol VIII. Fiume; non rara.
66. *hyalinalis* Hb. — III. Trencsén-Teplicz, Igló, Szliács. V. Nagyág. VIII. Fiume.
67. *aurantiacalis* F. R. — I. Budapest. VIII. Fiume; non rara.
68. *repandalis* Schiff. — I. Budapest. V. Nagyág frequens.
69. *palustralis* Hb. — I. Tamási; a dno Kindermann circa pagum Tamasi anno 1840 detecta.
70. *nubilalis* Hb. — I. Budapest. II. Sopron. III. Igló. V. Nagyág, Kovászna, Szt-Gotthard. VI. Grebenácz. VII. Josipdol. VIII. Fiume.
71. *numeralis* Hb. — VIII. Fiume.
72. *fuscalis* Schiff. — I. Budapest, Csongrád, Debreczen. II. Sopron. III. Kocsócz, Igló. IV. Kassa.

* Berl. Ent. Zeitschr. 1870, pag. 193.

V. Szt-Gotthard. VII. Josipdol. VIII. Fiume, communis.

73. *terrealis* Tr. — I. Budapest. VIII. Fiume.

74. *crocealis* Hb. — IV. Marmaros. V. Nagyág. VII. Josipdol; hic illic frequens.

75. *testacealis* Z. — I. Budapest. VIII. Fiume, Buccari, Zengg.

76. *sambucalis* Schiff. — I. Budapest. II. Kőszeg, Sopron. IV. Kassa. V. Nagyág, Kovászna. VII. Josipdol. VIII. Fiume.

77. *verbascalis* Schiff. — I. Budapest, Mártonkáta, Debreczen. II. Sopron. V. Nagyág. VII. Josipdol. VIII. Fiume.

78. *rubiginalis* Hb. — I. Budapest, Debreczen. II. Sopron. IV. Selmeczbánya. V. Nagyág. VII. Josipdol. VIII. Fiume; quandoque frequens.

79. *fulvalis* Hb. — III. Igló. V. Nagyág, Szt-Gotthard. VI. Herkulesfürdő. VII. Josipdol, Fiume; communis.

80. *ferrugalis* Hb. — I. Budapest. V. Nagyág. VII. Josipdol. VIII. Fiume, frequens.

81. *prunalis* Schiff. — III. Igló. V. Nagyág. VII. Josipdol. VIII. Fiume; non rara.

82. *olivalis* Schiff. — V. Nagyág. VI. Herkulesfürdő. VII. Josipdol; rara.

83. *elutalis* Schiff. V. Nagyág; rara.

84. *institalis* Hb. Secundum H. Schäffer Hungariæ incola.

85. *pandalis* Hb. — III. Igló. V. Nagyág. VII. Josipdol; quandoque frequens.

86. *ruralis* Se. — I. Budapest, Debreczen. II. Sopron. III. Igló. V. Nagyág, Mező-Záh. VI. Krassó.

Eurycreon Ld.

87. *sticticalis* L. — I. Budapest, Nagy-Hortobágy. II. Sopron. V. Nagyág. VII. Josipdol. VIII. Fiume; communis.

88. *aeruginalis* Hb. — II. Pécs. VIII. Fiume; rara.

89. *clathralis* Hb. — VIII. Fiume, rara.

90. *turbidalis* Tr. — I. Budapest, VIII. Fiume; non rara.

91. *sulfuralis* Hb. — I. Budapest, Rákos, Csepel; frequens.

92. *palealis* Schiff. — In omnibus regionibus collecta.

93. *verticalis* L. — I. Budapest, Debreczen, Csongrád. III. Igló. V. Nagyág. VIII. Fiume; quandoque frequens.

Nomophila Hb.

94. *noctuella* Schiff. — I. Budapest. III. Igló. V. Nagyág, Kovászna. VII. Josipdol. VIII. Fiume; communis.

Psamotis Hb.

95. *pulveralis* Hb. — VII. Josipdol. VIII. Fiume.

Pionea Gn.

96. *forficalis* L. — I. Budapest. V. Nagyág. VIII. Fiume; hic-illic frequens.

Orobena Gn.

97. *aenealis* Schiff. — I. Budapest. II. Sopron. V. Nagyág. VI. Krassó. VII. Josipdol. VIII. Fiume; quandoque frequens.

98. *extimalis* Sc. — I. Budapest, Debreczen. V. Nagyág. VII. Josipdol. VIII. Fiume; communis.

99. *straminalis* Hb. — I. Budapest. V. Nagyág. VIII. Fiume.

100. *limbata* L. — I. Budapest, Debreczen. V. Nagyág; rara.

101. *politalis* Sc. — I. Budapest. VIII. Fiume, Martinšćica. VII. Josipdol.

102. *sophialis* F. — VI. Thermæ Herculis in valle Cserna. VII. Josipdol. VIII. Fiume; non rara.

103. *frumentalis* L. — I. Budapest. VII. Josipdol. VIII. Fiume; quandoque frequens.

Perinephele Hb.

104. *lancealis* Schiff. — V. Nagyág, VI. Grebenácz. Rara.

Diasemia Gn.

105. *literata* Sc. — In toto regno passim occurrit.

Metasia Gn.

106. *carnealis* Tr. — VIII. Fiume, Zengg; valde rara.

107. *ophialis* Tr. — I. Budapest. III. Szkalka, Kocsócz. V. Nagyág. VI. Thermæ Herculis; rara.

Stenia Gn.

108. *Bruguieralis* Dup. — VIII. Fiume.

109. *punctalis* F. — V. Nagyág, Kovászna, Szt-Gotthard.

Agrotera Schrk.

110. *nemoralis* Sc. — II. Sopron. V. Nagyág. VII. Josipdol; hic-illic frequens.

Hydrocampa Gn.

111. *stagnata* Dup. — I. Budapest. IV. Kassa. V. Szt-Gotthárd, Kovászna. VI. Titel; quandoque frequens.

112. *nymphaeata* L. — II. Sopron. V. Nagyág. VII. Josipdol. VIII. Fiume.

Parapoynx Hb.

113. *candidata* F. — I. Budapest; circa urbem frequens.

114. *stratiotata* L. — I. Budapest; quandoque frequ.

Cataclysta Hb.

115. *lemnata* L. — I. Budapest; V. Szt-Gotthard. VIII. Fiume, Passim in toto regno occurit.

Subfamilia. ACENTROPODINAE.

Acentropus Curt.

116. *niveus* Olivier. — I. Szabadka, Lacus Palicsi tó dictus. II. Tata-Tóváros; communis.

Subfamilia. CHILONINAE.

Scirpophaga Tr.

117. *praelata* Sc. — I. Budapest. V. Nagyág, Brassó.
118. *cinerea* Tr. — VI. Grebenácz, Oravicza; rara.

Schoenobius Dup.

119. *gigantellus* Schiff. — I. Budapest, frequens.
120. *forficellus* Thnb. — I. Budapest, Debreczen, V. Kovászna. VIII. Fiume; non rara.
121. *mucronellus* Schiff. — I. Budapest.

Chilo Zk.

122. *phragmitellus* Hb. — V. Szt-Gotthard.

Subfamilia. CRAMBINAE.

Ancylolomia Hb.

123. *contritella* L. — II. Sopron.
124. *palpella* Schiff. — I. Budapest; non rara.

Crambus F.

125. *alpinellus* Hb. — I. Budapest, Csepel; quandoque frequens.
126. *pallidellus* Dup. — I. Budapest; rara.
127. *candiellus* H. Sch. — I. Budapest. VIII. Fiume, Crkvenica.
128. *cerusellus* Schiff.— I. Budapest, Csepel, Peszér. V. Szamosfalva, Kovászna. VIII. Fiume, Crkvenica; hic-illic frequens.
129. *pascuellus* L. — I. Budapest. II. Sopron. III. Kocsócz, Igló. IV. Homonna, S.-A.-Ujhely. V. Nagyág, Szt-Gotthárd; quandoque frequens.
130. *silvellus* Hb. — IV. Beszkid. VIII. Fiume; non rara.
131. *pratellus* L. — I. Budapest. II. Sopron. III. Igló. IV. Marmaros. V. Nagyág. VI. Szemenik. VIII. Fiume.
132. *nemorellus* Hb. — VII. Josipdol; rara.
133. *lucellus* H.-S. — I. Budapest, Peszér, Csepel, Debreczen. VII. Josipdol; frequens.
134. *dumetellus* Hb. — II. Sopron. III. Igló. V. Nagyág, Kovászna. VII. Josipdol. VIII. Fiume; non rara.
135. *hortuellus* Hb. — I. Budapest. III. Kocsócz, Igló. VII. Josipdol; frequens.
136. *craterellus* Se. — In omnibus regionibus observata.
v. *cassentiniellus* Z.— VII. Josipdol. VIII. Fiume.
137. *chrysonuchellus* Sc. — Passim in toto regno communis.
138. *falsellus* Schiff. — I. Budapest. III. Igló. VIII. Fiume; non rara.
139. *verellus* Zk. — VI. Herkules-fürdő.
140. *pauperellus* Tr. — IV. Com. Maramaros. VI. Herkulesfürdő; frequens.
141. *pinellus* L. — I. Budapest. II. Sopron. V. Szt-Gotthard. VII. Josipdol; non rara.
142. *myellus* Hb. — II. Sopron. V. Nagyág, Szt-Gotthard. VIII. Fiume, Fužine; rara.
143. *margaritellus* Hb. — VIII. Fiume.
144. *radiellus* Hb. — I. Budapest, Csepel, quandoque frequens.
145. *fulgidellus* Hb. — I. Budapest; rara.
146. *acutangulellus* H.-S. —VIII. Fiume, St. Giorgio.
147. *fascelinellus* Hb. — VII. Josipdol. VIII. Fiume; non rara.
148. *jucundellus* H.-S. — I. Budapest; rara.
v. *festivellus* H.-S. — I. Budapest. VI. Herkulesfürdő; valde rara.
149. *Coulonellus* Dup. — IV. Com. Mármaros.
150. *orientellus* H.-S. — IV. Com. Mármaros. VI. Herkulesfürdő; rara.
151. *culmellus* L. — I. Budapest. II. Sopron. V. Nagyág, Kovászna. VII. Josipdol. VIII. Fiume.
152. *aureliellus* F.-R. — Sec. Herrich-Schäffer etiam in Hungaria occurrit.
153. *saxonellus* Zk. — I. Budapest. VII. Josipdol. VIII. Fiume; communis.
154. *inguinatellus* Schiff. — I. Budapest. II. Sopron. VII. Josipdol; quandoque frequens.
155. *geniculeus* H.-S. — I. Budapest; frequens.
156. *matricellus* Tr. — I. Budapest; in tota regione centrali occurit.
157. *contaminellus* Hb. — II. Sopron. VII. Josipdol. VIII. Fiume; frequens.
158. *poliellus* Tr. — I. Isaszegh.
159. *deliellus* Hb. — I. Budapest; circa urbem frequ.
160. *tristellus* (S. V.) F. — I. Budapest. II. Sopron. III. Igló. VII. Josipdol; quandoque frequens.
161. *luteellus* Schiff. — I. Budapest, Debreczen. III. Igló, Szliács. V. Peér (comit. Szilágy), Kovászna, Szt-Gotthard. VII. Josipdol. VIII. Fiume; communis.

162. *lithargyrellus* Hb. — I. Budapest, Isaszegh; quandoque frequens.
163. *perlellus* Sc. — I. Budapest. II. Sopron. III. Igló, Kocsócz, Koritnicza. IV. Com. Máramaros. V. Nagyág, Szt-Gotthard, Kovászna. VI. Szemenik. VII. Josipdol. VIII. Fiume, hic-illic frequens.
164. *rostellus* Lah. VI. Herkulesfürdő, Præter juga Alpium Armeniæque etiam in regione nostra banatica collecta.

Eromene Hb.

165. *bella* Hb. — I. Budapest. III. Kocsócz. VIII. Fiume, Buccari; rara.

Subfamilia PHYCINEAE.

Dioryctria Z.

166. *abietella* (S. V.) Zk. — I. Budapest. III. Strecs, (com. Trencsén); frequens.
167. *gregella* Ev. — I. Budapest. II. Teplicz (Pöstyén). Præter montium Uralensium et Sibiriæ etiam Hungariæ incola.

Nephopteryx Z.

168. *spissicella* F. — I. Budapest. II. Sopron, Kőszeg. VII. Josipdol; frequens.
169. *melliella* Man. — I. Budapest; circa urbem frequens.
170. *Metzneri* Z. — I. Budapest; valde rara.
171. *rhenella* Zk. — I. Budapest, Dabas; quandoque frequens.
172. *poteriella* Z. — VIII. Fiume, Tersato; rara.
173. *similella* Zk. — I. Debreczen; a J. Madarász prope urbem Debreczen 23 junii 1895 collecta.
174. *janthinella* Hb. — I. Budapest. VIII. Fiume; non rara.
175. *argyrella* (S. V.) F. — II. Sopron. VII. Josipdol. VIII. Fiume.

Etiella Z.

176. *zinkenella* Tr. — I. Budapest. VI. Herkulesfürdő. VIII. Fiume; hic-illic nonnunquam frequ.

Pempelia Hb.

177. *semirubella* Sc. — I. Budapest. II. Kőszeg. III. Igló. V. Brassó. VI. Oravicza. VII. Josipdol. VIII. Fiume; communis.
v. *sanguinella* Hb. — II. Sopron; non rara.
178. *sororiella* Z. — I. Budapest. VIII. Fiume. Siciliæ Andalusiæ et Hungariæ incola.
179. *cingillella* Z. — Secundum Herrich-Schäffer etiam in Hungaria collecta (Tom. IV. pag. 77.).
180. *hostilis* Stph. — I. Budapest, Ujpest; ubi nonnunquam frequens.
181. *betulae* Göze. — I. Budapest.
182. *fusca* Hn. — III. Liptó, Igló. VIII. Fiume; hic-illic frequens.
183. *faecella* Z. — II. Sopron; non rara.
184. *palumbella* (S. V.) F. — I. Budapest. VII. Josipdol. VIII. Fiume.
185. *albariella* Z. — I. Budapest. III. Szkalka, (com. Trencsén). Præter Hungariam etiam in regione Pontica occurrit.
186. *obductella* F. — I. Budapest. VIII. Fiume; frequ.
187. *adornatella* Tr. — VII. Josipdol. VIII. Fiume, Buccari.
188. *subornatella* Dup. — I. Budapest. VIII. Fiume, Martinšćica.
189. *ornatella* Schiff. — I. Budapest. II. Sopron. VII. Josipdol. VIII. Fiume; quandoque frequens.

Gymnancycla Z.

190. *canella* (S. V.) Hb. — I. Budapest; frequens.

Spermatophthora Ld.

191. *Hornigii* Ld. — In Hungariæ, Austriæ et Sareptæ collibus.

Ratasa H. Sch.

192. *allotriella* H.-S. — I. Budapest, Dömsöd. VI. Herkulesfürdő. Præter Hungariam et in Sarepta collecta; valde rara.

Catastia Hb.

193. *marginea* Schiff. — I. Budapest. II. Pécs. VI. Herkulesfürdő; Præter Hungariam in Germania et montibus Balcanicis observata.
v. *auriciliella* Hb. — II. Circa urbem Sopron; frequens.

Hypochalcia Hb.

194. *lignella* Hb. — VIII. Fiume; non rara.
195. *ahenella* (S. V.) Zk. — I. Budapest. II. Sopron. VII. Josipdol. VIII. Fiume, Buccari; frequens.
196. *rubiginella* Tr. — Secundum Wocke etiam in Hungaria collecta.
197. *affinella* H.-S. — Secundum Wocke etiam Hungariæ incola (225).
198. *dignella* Hb. — I. Budapest. VI. Herkulesfürdő. VII. Josipdol; valde rara.
199. *decorella* Hb. — I. Budapest, quandoque frequ.
v. *Germarella* Zk. — I. Budapest. II. Sopron. V. Nagyág; non rara.

Eucarphia Hb.

200. *vinetella* F. — I. Budapest, Csepel, Peszér. VIII. Fiume; hic-illic communis.

201. *illignella* Z. — I. Budapest.
202. *gilveolella* Tr. — Teste Herrich-Schäffer etiam in Hungaria habitat (Vol IV. p. 92.).

Epischnia Hb.

203. *prodromella* Hb. — I. Budapest. frequens.
204. *sareptella* H.-S. — I. Budapest.
205. *illotella* Z. — VIII. Fiume, Tersato ; non rara.

Brephia Hein.

206. *compositella* Tr. — I. Budapest. VI. Grebenácz. VII. Josipdol. VIII. Fiume, Tersato ; nonnunquam frequens.

Acrobasis Z.

207. *obtusella* Hb. — Secundum Wocke etiam in Hungaria observata.
208. *consociella* Hb. — II. Pécs. V. Nagyág. VII. Josipdol.
209. *tumidella* Zk. — II. Sopron.
210. *rubrotibiella* F. R. — VIII. Fiume, frequens.

Trachonitis Z.

211. *cristella* Hb. — I. Budapest. V. Nagyág. VI. Herkulesfürdő. VIII. Fiume ; non rara.

Myclois Z.

212. *rosella* Sc. — I. Budapest. II. Pécs. V. Nagyág. VII. Josipdol. VIII. Fiume, Tersato ; frequens.
213. *cirrigerella* Zk. — VII. Josipdol. VIII. Fiume, Buccari ; rara.
214. *deserticola* Stgr. — Teste R. Anker etiam in Hungaria degit.
215. *cribrum* Schiff. — Passim in toto regno collecta.
216. *crudella* Z. — I. Budapest ; non rara.
ab. *luridella* H.-S. — Ex Hungaria cognita.
v. *rufella* Dup. — I. Budapest. Præter Hungariam in Corsica et in Hispania occurit.
217. *dulcella* Z. — I. Budapest. VIII. Fiume.
218. *legatella* Hb. — VI. Herkulesfürdő ; non rara.
219. *suavella* Zk. — II. Sopron. VIII. Fiume, frequ.
220. *advenella* Zk. — VIII. Fiume.
221. *epelydella* Z. — V. Szt-Gotthárd. VII. Josipdol. VIII. Fiume ; rara.
222. *tetricella* (S. V.) F. — I. Budapest. VIII. Fiume, Martinšćica.

Glyptoteles Z.

223. *leucacrinella* Z. — VII. Josipdol.

Eccopisa Z.

224. *effractella* Z. — I. Budapest. VII. Josipdol.

Nyctegretis Z.

225. *achatinella* Hb. — I. Budapest. VIII. Fiume.

Ancylosis Z.

226. *cinnamomella* Dup. — I. Budapest. VII. Josipdol. VIII. Fiume, Tersato ; frequens.

Alispa Z.

227. *angustella* Hb. — VII. Josipdol. VIII. Fiume.

Zophodia Hb.

228. *convolutella* Hb. — Secundum M. Wocke etiam Hungariæ incola.

Euzophera Z.

229. *pinguis* Hw. — I. Budapest.
230. *biviella* Z. — VIII. Fiume.
231. *cinerosella* Z. — Teste Herrich-Schäffer etiam in Hungaria degit. (Tom. IV. pag. 105.).
232. *oblitella* Z. — I. Budapest ; circa urbem frequ.
233. *Welseriella* Z. Secundum M. Wocke et in Hungaria occurit.

Homoeosoma Curt.

234. *nebulella* Hb. — VII. Josipdol. VIII. Fiume.
235. *nimbella* Z. — I. Budapest. II. Sopron. VII. Josipdol. VIII. Fiume ; hic-illic frequens.
236. *binaevella* Hb. — VIII. Fiume.
237. *sinuella* F. — I. Budapest. VII. Josipdol. VIII. Fiume ; hic-illic frequens.

Ematheudes Z.

238. *punctella* Fr. — VIII. Fiume ; non rara.

Anerastia Hb.

239. *lotella* Hb. — VII. Josipdol, frequens.
240. *limbella* H.-S. — VIII. Fiume.

Ephestia Gn.

241. *elutella* Hb. — I. Budapest. III. Igló. VII. Josipdol. VIII. Fiume ; non rara.
242. *Kühniella* Z. — I. Budapest. Ujpest.
243. *abstersella* Z. — VIII. Fiume ; Præter Siciliam et in Hungaria occurrit.
244. *interpunctella* Hb. — I. Budapest. VII. Josipdol. VIII. Fiume.

Subfamilia GALLERIINAE.

Galleria F.

245. *mellionella* L. — I. Budapest. V. Nagyág. Fere in omni parte Regni occurrit.

Aphomia Hb.

246. *sociella* L. — II. Kőszeg. V. Mező-Záh. VII. Josipdol. VIII. Fiume ; hic-illic frequens.

Melissoblaptes Z.

247. *foedellus* Z. — I. Budapest, Debreczen.

248. *bipunctanus* Z. — Secundum H.-Schäffer etiam Hungariæ incola.

249. *anellus* Schiff. — I. Budapest ; circa urbem frequens.

Achroea Hb.

250. *grisella* F. — I. Budapest.

Fam. TORTRICIDAE.

Rhacodia Hb.

1. *caudana* F. — V. Nagyág.

Teras Tr.

2. *cristana* (S. V.) F. — III. Gács (com. Nógrád).

3. *hastiana* L. — I. Budapest ; non rara.
ab. *Byringerana* Hb. — I. Budapest.
ab. *scabrana* Hb. — I. Budapest.

4. *abietana* Hb. — III. Strecsnó (com. Trencsén) ; frequens.

5. *fimbriana* Thnb. — I. Budapest. Teste L. Anker etiam in Hungaria. *

6. *longiana* Schiff. — VIII. Fiume ; non rara.

7. *permutana* Dup. — I. Budapest. VIII. Fiume ; rara.

8. *variegana* Schiff. — I. Budapest. VII. Josipdol. VIII. Fiume, Buccari.

9. *boscana* F. — I. Budapest. VII. Josipdol. VIII. Fiume.

10. *parisiana* Gn. — I. Budapest ; nonnunquam frequens.

11. *literana* L. — I. Budapest ; non rara.
v. *squamana* F. — I. Budapest. VIII. Fiume.

12. *niveana* F. — II. Sopron. IV. Marmaros, frequ.

13. *sponsana* F. — VII. Josipdol.

14. *aspersana* Hb. — VII. Josipdol.

15. *ferrugana* (S. V.) Tr. — I. Budapest. II. Sopron. VIII. Fiume ; non rara.
v. *tripuntana* Hb. — Szt-Gotthárd, frequens.

16. *quercinana* Z. — II. Pécs. VII. Josipdol. VIII. Fiume, Tersato, Buccari.

17. *Forskaleana* L. — I. Budapest. VII. Josipdol. VIII. Fiume, Tersato ; hic-illic frequens.

18. *holmiana* L. — I. Budapest. V. Nagyág. VII. Josipdol. VIII. Fiume.

19. *contaminana* Hb. — IV. Kassa ; non rara.

20. *lorquiniana* Dup. — I. Budapest, circa urbem.

* Verh. d. zool.-bot. Ges. XXXIX. pag. 296. 1879.

Tortrix Tr.

Subgenus *Cacoecia* Hb.

21. *podana* Sc. — I. Budapest. V. Nagyág. VII. Josipdol. VIII. Fiume ; hic-illic frequens.

22. *crataegana* Hb. — I. Budapest. II. Sopron ; non rara.

23. *xylosteana* L. — I. Budapest. II. Sopron. III. Tátra, Lucsivna. V. Nagyág. VII. Josipdol. VIII. Fiume ; communis.

24. *rosana* L. — III. Igló. VII. Josipdol ; frequens.

25. *sorbiana*. — II. Sopron. V. Nagyág. VII. Josipdol. VIII. Fiume ; hic-illic frequens.

26. *semialbana* Gn. — I. Budapest. VII. Josipdol. VIII. Fiume, Buccari ; communis.

Subgenus *Pandemis* Hb.

27. *corylana* F. — I. Budapest. V. Nagyág ; non rara.

28. *ribeana* Hb. — I. Budapest. II. Sopron. VII. Josipdol.

29. *cinnamomeana* Tr. — V. Nagyág. VIII. Fiume ; rara.

30. *heparana* Schiff. — I. Budapest. II. Sopron. III. Igló. V. Nagyág, Szt.-Gotthárd. VII. Josipdol. VIII. Fiume ; communis.

31. *dumetana* Tr. — Secundum M. Wocke etiam in Hungaria.

Subgenus *Ptycholoma* Stph.

32. *lecheana* L. — I. Kalocsa II. Sopron. V. Nagyág. VII. Josipdol. VIII. Fiume.

Subgenus *Idiographis* Ld.

33. *inopiana* Hn. — VIII. Fiume.

34. *dumicolana* Z. — VIII. Fiume.

35. *musculana* Hb. — II. Sopron. V. Nagyág. VII. Josipdol. VIII. Fiume ; hic-illic frequens.

36. *unifasciana* Dup. — VIII. Fiume.

37. *strigana* Hb. — I. Budapest. V. Nagyág. VII. Josipdol. VIII. Fiume ; communis.
ab. *stramineana* H.-S. — VI. Herkulesfürdő. VIII. Fiume.

Subgenus *Choristoneura* Ld.

38. *diversana* Hb. — II. Sopron. III. Igló. VII. Josipdol. VIII. Fiume.

Subgenus *Lophoderus* Stph.

39. *ochreana* Hb. — I. Budapest. V. Nagyág. VII. Josipdol. VIII. Fiume ; hic-illic non rara.

40. *politana* Hn. — VII. Josipdol. VIII. Fiume.

41. *cinctana* Schiff. — I. Budapest. II. Sopron. VII. Josipdol ; nonnunquam frequens.

42. *asinana* Hb. — I. Budapest (Farkasvölgy). III. Kocsócz. VII. Herkulesfürdő. VIII. Fiume; rara.
43. *rigana* Sodof. — I. Budapest. V. Szt-Gotthard. VII. Josipdol. VIII. Fiume; frequens.
44. *oxyacanthana* H.-S.— VII. Josipdol. VIII. Fiume, Buccari.
45. *ministrana* L. — III. Tátra, Csorbai-tó, Igló. V. Nagyág. VII. Josipdol.

Subgenus *Heterognomon* Ld.

46. *bifasciana* Hb. — VII. Josipdol. VIII. Fiume; frequens.
47. *Convayana* F. — I. Budapest. VII. Josipdol. VIII. Fiume; hic-illic nonnunquam frequens.
48. *Bergmanniana* L. — V. Nagyág. VIII. Fiume; non rara.
49. *Loeflingiana* L. — I. Budapest. II. Sopron. VII. Josipdol. VIII. Fiume, Buccari; nonnunquam frequens.
50. *viridana* L.— Fere in omni parte Regni communis.
51. *pronubana* Hb. — VIII. Fiume, Zengg.
52. *viburniana* F. — I. Budapest, Rákos, Csepel, Peszér. VIII. Fiume; nonnunquam frequens.
53. *paleana* Hb. — VII. Josipdol.
54. *amplana* Hb. — I. Debreczen; nonnunquam frequens.
55. *Steineriana* S.-V. — VI.
v. *Dohrniana* H.-S. — Teste Herrich-Schäffer etiam Hungariæ incola.*
56. *rusticana* Fr. — I. Budapest. VII. Velebit. VIII. Fiume; non rara.
57. *Rolandriana* L. — I. Budapest. Præter juga montium Uralensium Lapponiam et Hungariam patriam suam profitetur.

Subgenus *Onoctra* Gn.

58. *Pilleriana* Schiff. — I. Budapest. IV. Tokaj, Kassa. VIII. Fiume; frequens.

Subgenus *Dichelia* Gn.

59. *artificana* H.-S. — VIII. Fiume.
60. *Treitschkeana* Tr. — VI. Herkulesfürdő. VIII. Fiume. (In Russia meridionali et in Hungaria!)
61. *Grotiana* F.— III. Igló. VII. Josipdol. VIII. Fiume; frequens.
62. *gnomana* Cl. — I. Budapest. VIII. Fiume; nonnunquam frequens.

Subgenus *Amphysa* Curt.

63. *Gerningana* Schiff. — I. Budapest. VII. Josipdol. VIII. Fiume; non rara.

* Tom. IV. p. 162, VI. p. 156.

Subgenus *Capua* Stph.

64. *favillaceana* Hb. — I. Budapest. VII. Josipdol. VIII. Fiume; frequens.

Sciaphila Tr.

Subgenus *Ablabia* Stph.

65. *osseana* Sc. — I. Budapest. V. Nagyág. VII. Josipdol; non rara.
66. *argentana* Cl. — III. Igló. IV. Com. Máramaros. V. Nagyág. VII. Josipdol; hic-illic frequens.

Subgenus *Sciaphila* Tr.

67. *longana* Hn. v. *luridalbana* H.-S.— VIII. Fiume, Buccari, Martinšćica.
68. *segetana* Z. — VIII. Fiume. (Siciliæ et Hungariæ incola!)
69. *Penziana* Hb. — III. Igló. IV. Com. Máramaros. V. Nagyág. VIII. Fiume; hic-illic non rara.
v. *styriacana* H.-S. — VII. Josipdol.
70. *chrysantheana* Dup. — VII. Josipdol.
71. *Wahlbomiana* L. — I. Budapest. VIII. Fiume; nonnunquam frequens.
v. *alticolana* Hb. — V. Szt-Gotthard.
v. *virgaureana* Tr. — I. Budapest. VII. Josipdol. VIII. Fiume, Fužine.
v. *minorana* H.-S. — VII. Fužine. VIII. Fiume.
v. *communana* H.-S. — VII. Josipdol.
v. *incertana* Tr. — I. Budapest. VIII. Fiume.
72. *pasivana* Hb.— IV. Com. Máramaros. VIII. Fiume; non rara.
73. *abrasana* Dup.—VII. Josipdol, Fužine. VIII. Fiume; hic-illic frequens.
74. *nubilana* Hb. — II. Kőszeg, Pécs. VII. Josipdol. VIII. Fiume.

Doloploca Hb.

75. *punctulana* Schiff. — I. Budapest. II. Sopron. VIII. Fiume, Martinšćica; frequens.

Cheimatophila Stph.

76. *tortricella* Hb. — II. Sopron. VIII. Fiume; nonnunquam frequens.

Olindia Gn.

77. *hybridana* Hb. — I. Budapest. II. Sopron. VII. Josipdol. VIII. Fiume, Martinšćica; frequens.
78. *Ulmana* Hb. — VIII. Fiume.

Cochylis Tr.

79. *margaritana* Hb. — I. Budapest, Sashegy; rara.
80. *lathoniana* Hb. — I. Budapest, Sashegy. VI. Herkulesfürdő. VIII. Fiume; non rara.
81. *hamana* L. — I. Budapest, Ujpest. V. Nagyág.

Kolozsvár, Szt-Gotthárd, Kovászna. VII. Josipdol. VIII. Fiume ; hic-illic frequens.

82. *zoegana* L. — I. Budapest. II. Sopron. V. Kovászna. VI. Titel. VII. Josipdol. VIII. Fiume ; communis.

83. *fulvana* F. — V. Nagyág. VI. Herkulesfürdő ; non rara.

84. *amiantana* Hb. — I. Budapest. III. Kocsócz. VIII. Fiume.

85. *purana* Gn. — I. Budapest. VIII. Fiume ; in Gallia meridionali et in Hungaria observata.

86. *callosana* H.-S. — VIII. Fiume. Præter Carinthiam et Corsicam etiam in regione adriatica occurrit.

87. *purgatana* Tr. — I. Budapest. VIII. Fiume ; non rara.

88. *Schreibersiana* Froel. — I. Budapest. VII. Josipdol. VIII. Fiume.

89. *ambiguella* Hb. — I. Budapest. VII. Josipdol. VIII. Fiume.

90. *straminea* Hw. — I. Budapest. VIII. Fiume ; frequens.

91. *hilarana* H.-S. — Teste M. Wocke et Hungariæ incola.

92. *jucundana* Dup. — VIII. Fiume. Præter regionem adriaticam etiam in Gallia et Sibiria collecta.

93. *Woliniana* Schleich. — Secundum M. Wocke etiam in Hungaria occurrit.

94. *coenosana* Man. — I. Budapest. VI. Titel. Præter Hungariam etiam circa urbem Sarepta collecta.

95. *elongana* F. R. — I. Budapest, Ó-Buda ; valde rara.

96. *impurana* Man. — VIII. Fiume. Præter Corsicam et in regione adriatica observata.

97. *dipoltella* Hb. — VI. Herkulesfürdő.

98. *zephyrana* Tr. — I. Budapest. VII. Grebenácz (com. Krassó-Szörény). VII. Josipdol ; frequens.

99. *rutilana* Hb. — VII. Josipdol.

100. *Kuhlweiniana* F. R. — Secundum M. Wocke etiam Hungariam incolit.

101. *Hartmanniana* Cl. — V. Nagyág. VII. Josipdol.

102. *aleella* Schulze. — I. Budapest. V. Nagyág. VII. Josipdol ; hic-illic nonnunquam frequens.

103. *Kindermanniana* Tr. — I. Budapest.

104. *sanguinana* Tr. — I. Budapest. VIII. Fiume. Præter Hungariam nullibi observata.

105. *francillana* F. — I. Budapest. VI. Grebenácz. VII. Josipdol. VIII. Fiume ; nonnunquam frequ.

106. *Smeathmanniana* F. — I. Budapest. IV. Com. Máramaros. VII. Josipdol. VIII. Fiume, Tersato ; frequens.

107. *Heydeniana* H.-S. — I. Budapest ; et in Italia centrali occurrit.

108. *coërcitana* Stgr. — I. Budapest ; (et in Andalusia occurrit).

109. *pudorana* Stgr. — I. Budapest ; et in Andalusia collecta.

110. *ciliella* Hb.—I. Budapest. VIII. Fiume ; non rara.

111. *roseana* Hw. — I. Budapest ; rara.

112. *purpuratana* H.-S. — I. Budapest.

113. *contractana* Z. — I. Budapest ; rara.

114. *rupicola* Curt. — I. Budapest. VIII. Buccari ; frequens.

115. *Mussehliana* Tr. — VII. Josipdol ; non rara.

116. *Manniana* F. R. — VIII. Fiume.

117. *ambiguana* Froel. — I. Budapest ; frequens.

118. *hybridella* Hb. — V. Szt-Gotthard, Peér (com. Szilágy.

119. *posterana* Z. — VIII. Fiume ; communis.

120. *salebrana* Man. — I. Budapest. (In Hungariæ et Bithyniæ collibus.)

121. *dubitana* Hb. — II. Sopron. VIII. Fiume ; nonnunquam frequens.

Phtheochroa Stph.

122. *rugosana* Hb. — VIII. Fiume ; non rara.

123. *Duponcheliana* Dup. — Teste M. Wocke etiam Hungariæ incola.

124. *amandana* H.-S. — I. Budapest. (In Germaniæ et Hungariæ collibus.)

Pygolopha Ld.

125. *lugubrana* Tr. — I. Budapest (a D. Kindermann detecta ; et in Sicilia occurrit).

Retinia Gn.

126. *Buoliana* Schiff. — I. Budapest. VIII. Fiume ; rara.

Penthina Tr.

127. *profundana* (S. V.) F.— VIII. Fiume ; frequens.

128. *salicella* L. — Fere in omni parte Regni observata.

129. *scriptana* Hb. — I. Budapest, frequens.

130. *capreana* Hb. — I. Budapest. III. Tátra. V. maros ; Nagyág.

131. *corticana* Hb. — V. Nagyág.

132. *Sauciana* Hb. — I. Budapest. IV. Com. Máramaros. VII. Josipdol. VIII. Fiume ; hic-illic frequens.

133. *variegana* Hb. — II. Pécs. III. Igló. V. Nagyág. VII. Josipdol. VIII. Fiume ; hic-illic frequens.

134. *pruniana* Hb. — I. Budapest. II. Sopron. III. Igló. IV. S.-A.-Ujhely, Ránk. V. Nagyág. VII. Josipdol. VIII. Fiume ; communis.

v. *pruneticolana* Z. — VIII. Fiume.

135. *ochroleucana* Hb. — I. Budapest. VIII. Fiume ; frequens.

136. *oblongana* Hn. — I. Budapest; non rara.
137. *gentiana* Hb. — V. Nagyág. VII. Josipdol.
138. *fuligana* Hb. — V. Nagyág. Præter Germaniam in regione transylvanica observata.
139. *lapideana* H.-S. — Sec. M. Wocke etiam Hungariæ incola.
140. *postremana* Z. — VII. Josipdol.
141. *turfosana* H.-S. — IV. Com. Máramaros.
142. *arbutella* L. — VII. Josipdol.
143. *capreolana* H.-S. — Teste M. Wocke etiam Hungariam incolit.
144. *striana* Schiff. — I. Budapest. II. Sopron. VII. Josipdol, Velebit. VIII. Fiume; communis.
145. *Branderiana* L. — I. Budapest; non rara.
146. *siderana* Tr. — III. Igló. IV. Com. Máramaros. VI. Herkulesfürdő.
147. *stibiana* Gn. — I. Budapest. VII. Josipdol. VIII. Fiume.
148. *Schulziana* F. — III. Koritnicza.
149. *olivana* Tr. — V. Nagyág.
150. *arcuella* Cl. — I. Budapest. II. Sopron. III. Igló. V. Nagyág. VIII. Fiume, Martinšćica. Passim in toto Regno communis.
151. *rivulana* Sc. — I. Budapest. II. Sopron. III. Igló. IV. Com. Máramaros, S.-A.-Ujhely. V. Nagyág. VII. Josipdol. VIII. Fužine. Fere in omnibus regionibus occurrit.
152. *umbrosana* Frr. — III. Igló. VII. Josipdol; non rara.
153. *urticana* Hb. — Passim in toto Regno frequ.
154. *lacunana* (S. V.) Dup. — I. Budapest. II. Sopron. IV. Com. Máramaros. VII. Josipdol. VIII. Fiume; hic-illic communis.
155. *rupestrana* Dup. — I. Budapest. VIII. Fiume, Martinšćica, Buccari; nonnunquam frequens.
156. *lucivagana* L. — Secundum M. Wocke etiam Hungariæ incola.
157. *cespitana* Hb. — I. Budapest. II. Sopron. V. Nagyág. VII. Josipdol. VIII. Fiume; hic-illic frequens.
158. *flavipalpana* H.-S. — VIII. Fiume, Hrast.
159. *Charpentierana* Hb. — IV. com. Máramaros.
160. *achatana* (S. V.) F. — I. Budapest. VII. Josipdol. VIII. Fiume; hic-illic frequens.
161. *trifoliana* Hb. — VIII. Fiume; rara.
162. *antiquana* Hb. — VI. Herkulesfürdő; frequens.

Aspis Tr.

163. *Uddmanniana* L. — I. Budapest. II. Sopron. V. Nagyág. VIII. Fiume.

Aphelia Stph.

164. *lanceolana* Hb. — I. Budapest. VII. Josipdol. VIII. Fiume; nonnunquam frequens.
165. *sareptana* H.-S. — I. Budapest; et in Sarepta occurrit.*
166. *furfurana* Hn. — I. Kalocsa.

Eudemis Hb.

167. *euphorbiana* Frr. — Secundum M. Wocke et Hungariæ incola.
168. *botrana* Schiff. — I. Budapest, VIII. Fiume; frequens.
169. *artemisiana* Z. — Teste. M. Wocke etiam Hungariæ incola.
170. *quaggana* Man. — VIII. Fiume; non rara.

Lobesia Gn.

171. *permixtana* Hb. — VIII. Fiume.

Petalea Gn.

172. *festivana* Hb. — I. Budapest. VIII. Fiume, Præter Hungariam etiam in Italia et Sardinia occurrit.

Grapholitha Tr.

Subgenus *Paedisca* Ld.

173. *infidana* Hb. — I. Budapest. III. Gács. (com Nógrád).
174. *lacteana* Tr. — I. Budapest. Rara.
175. *anserana* Hein.** — Præter Hungariam non observata.
176. *albidulana* H.-S. — I. Budapest. VIII. Fiume.
177. *Hornigiana* Ld. — I. Budapest, non rara.
178. *Hohenwartiana* (S. V.) Tr. — I. Budapest. III. Kocsócz. V. Nagyág. VII. Josipdol; nonnunquam frequens.
v. *jaceana* H.-S. — I. Budapest. IV. Comit. Máramaros. VIII. Fiume.
179. *coecimaculana* Hb. — I. Budapest. VII. Josipdol. VIII. Fiume; non rara.
180. *modicana* Z. — I. Budapest. VII. Josipdol; rara.
181. *hepaticana* Tr. — VII. Josipdol. VIII. Fiume.
182. *confusana* Mn. — I. Budapest. VII. Josipdol.
183. *hepatariana* H.-S. — Secundum H.-Schäffer etiam Hungariæ incola.
184. *graphana* Tr. — VIII. Fiume, Tersato; frequ.
185. *dalmatana* Rbl. — VIII. Buccari; rara.
186. *Kochiana* H.-S. — I. Budapest. VIII. Fiume; non rara.
187. *tedella* Cl. — III. Kocsócz. IV. Com. Máramaros. VII. Josipdol. VIII. Fužine.

* Rogenhoffer, Beiträge zur geog. Verbr. d. Lep. p. 392. 1869.

** Heinemann, Die Schm. Deutschl. u. Schw. II, 1 169.

188. *nisella* Cl. — I. Budapest, III. Igló. V. Nagyág; rara.
v. *pavonana* Don. — VI. Herkulesfürdő; rara.
189. *Penkleriana* F. R. — VIII. Fiume; non rara.
190. *solandriana* L. — II. Sopron.
v. *sinuana* Hb. — V. Nagyág; rara.
191. *tetraquetrana* Hw. — VII. Josipdol.
192. *immundana* F. R. — VII. Josipdol.
193. *bilunana* Hw. — I. Budapest. VIII. Fiume; non rara.
194. *similana* Hb. — I. Budapest. II. Sopron. VIII. Fiume.
195. *thapsiana* Z. — I. Budapest. VII. Josipdol. VIII. Fiume, Tersato; rara.
196. *incarnatana* Hb. — V. Nagyág. VI. Herkulesfürdő.
197. *suffusana* Z. — I. Budapest. VII. Josipdol. VIII. Fiume, Tersato; rara.
198. *tripunctana* (S. V.) F. — VII. Josipdol.
199. *cynosbana* F. — I. Budapest. II. Sopron. V. Nagyág. VII. Josipdol, Fužine.
200. *asseclana* Hb. — VII. Josipdol; non rara.
201. *mendiculana* Tr. — Alpium et Hungariæ collibus.
202. *Pflugiana* Hw. — I. Budapest. VI. Herkulesfürdő. VII. Josipdol. VIII. Fiume, frequens.
203. *cirsiana* Z. — V. Nagyág. VIII. Fiume, non rara.
204. *trigeminana* Stph. — I. Budapest.
205. *Brunichiana* (S. V.) Froel. — I. Budapest. III. Koritnicza. V. Nagyág. VII. Josipdol, Hrast. VIII. Fiume, Martinšćica; hic-illic frequens.
206. *turbidana* Tr. — V. Brassó. VI. Ribisvölgy, (com. Krassó-Szörény); rara.
207. *foenella* L. — I. Budapest. V. Nagyág, Szt-Gotthard.

Subgenus *Semasia* H. S.

208. *Messingiana* F. R. — I. Budapest, Csepel; rara.
209. *citrana* Hb. — I. Budapest, Csepel. VI. Titel, Herkulesfürdő. VII. Josipdol. VIII. Fiume; hic-illic frequens.
210. *pupillana* Cl. — VI. Herkulesfürdő; non rara.
211. *Metzneriana* Fr. — I. Budapest, Sziget-Csép, (com. Pest-Pilis). III. Igló; non rara.
212. *Wimmerana* Tr. — I. Budapest. II. Pécs, frequ.
213. *conterminana* H.-S. — I. Budapest.
214. *aspidiscana* Hb. — I. Budapest, II. Sopron. III. Igló. VIII. Fiume; hic-illic frequens.
215. *hypericana* Hb. — IV. Com. Máramaros. V. Nagyág. VII. Josipdol, Fužine. VIII. Fiume; frequens.
216. *albersana* Hb. — V. Nagyág; rara.
217. *tenebrosana* Dup. — I. Budapest.
218. *nebritana* Tr. — I. Budapest. II. Sopron. V. Kovászna. VIII. Fiume, Buccari; frequens.
219. *Lerneana* Tr. — I. Budapest.
220. *funebrana* Tr. — VII. Josipdol. VIII. Fiume; non rara.
221. *gemmiferana* Tr. — I. Budapest. VIII. Fiume.
222. *caecana* Sch. — VII. Josipdol. VIII. Fiume, Buccari.
223. *succedana* (S. V.) Froel. — I. Budapest, Budakesz. VII. Josipdol, Fužine. VIII. Fiume; hic-illic frequens.
224. *servillana* Dup. — I. Budapest. Præter Germaniam etiam in Hungaria collecta.
225. *juniperana* Mill. — I. Budapest; a R. Anker Budæ detecta.
226. *scopariana* H.-S. — VIII. Fiume.
227. *pactolana* Z. — I. Budapest. VII. Josipdol.
228. *Woeberiana* Schiff. — VIII. Fiume.
229. *compositella* F. R. — I. Budapest, Csongrád. VII. Josipdol. VIII. Fiume; non rara.
230. *leplastriana* Curt. — VIII. Fiume.
231. *duplicana* Zett. — VII. Josipdol, Fužine; rara.
232. *perlepidana* Hn. — V. Szt-Gotthárd. VII. Josipdol, Fužine.
233. *pallifrontana* L. — VIII. Fiume.
234. *fissana* Froel. — VIII. Fiume, Porto-Ré; non rara.
235. *inquinatana* Hb. — Sec. M. Wocke etiam Hungariæ incola
236. *dorsana* F. — VIII. Fiume; frequens.
237. *orobana* Tr. — I. Budapest; non rara.
238. *coronillana* Z. — I. Budapest. VI. Grebenácz. VIII. Fiume.
239. *aurana* F. — Teste M. Wocke etiam Hungariæ incola.

Carpocapsa Tr.

240. *pomonella* L. — I. Budapest. II. Sopron. IV. Kassa. V. Nagyág. VIII. Fiume. Passim in toto Regno communis.
241. *grossana* Hw. — VIII. Fiume; frequens.
242. *splendana* Hb. — I. Budapest. VIII. Fiume; non rara.
243. *Reaumuriana* Hein. — I. Budapest, Budakesz, a C. Kertész, collecta.
244. *amplana* Hb. — Fere in omni parte regni occurrit.

Coptoloma Ld.

245. *janthinana* Dup. — VIII. Fiume; non rara.

Phthoroblastis Ld.

246. *argyrana* Hb — V. Nagyág.
247. *plumbatana* Z. — I. Budapest. VIII. Fiume.
248. *costipunctana* v. *amygdalana*. VIII. Fiume, nonnunquam frequens

249. *salvana* Stgr. — Secundum M. Wocke etiam Hungariæ incola.
250. *motacillana* Z. — I. Budapest. VIII. Fiume.
251. *albugiana* Gn. — Teste M. Wocke etiam Hungariæ incola.
252. *Trauniana* Schiff. — I. Budapest. VI. Herkulesfürdő.
253. *flexana* Z. — VIII. Fiume ; rara.
254. *germmana* Hb. — VIII. Fiume.
255. *aurantiana* Mn. — I. Budapest ; a R. Anker circa urbem inventa.*
256. *Rhediella* Cl. — VIII. Fiume ; passim in toto regno occurrit.

Tmetocera Ld.

257. *ocellana* (S. V.) F. — I. Budapest. V. Nagyág. VII. Josipdol. VIII. Fiume ; non rara.

Steganoptycha H.-S.

258. *acerina* Dup. — I. Budapest.
259. *incarnana* Hw. — I. Budapest. VIII. Fiume, Tersato.
260. *simplana* F. R. — I. Budapest (Széchényi-hegy).
261. *delitana* F. — VIII. Fiume ; non rara.
262. *pauperana* Dup. — Secundum M. Wocke etiam in Hungaria occurrit.
263. *ramella* L. — I. Budapest.
264. *oppressana* Tr. — I. Budapest. VIII. Fiume ; rara.
265. *corticana* Hb. — II. Sopron. VIII. Fiume ; fere in omni parte regni observata.
266. *signatana* Dgl. — Secundum M. Wocke etiam Hungariæ incola.
267. *rufimitrana* H.-S. — I. Budapest. III. Likaoka.
268. *nanana* Tr. — IV. Com. Máramaros.
269. *binotana* Wk. — I. Budapest.
270. *ericetana* H.-S. — VII. Josipdol.
271. *fractifasciana* Hw. — I. Budapest, Budafok. VII. Josipdol. VIII. Fiume.
272. *hungaricana* H.-S. — I. Budapest ; præter Hungariam non observata.
273. *quadrana* Hb. — III. Gács. VIII. Fiume ; nonnunquam frequens.
274. *abiegana* Dup. — VIII. Novi.
275. *trimaculana* Don. — VIII. Fiume ; non rara.
276. *minutana* Hb. — I. Budapest, Rákos-Palota.

Phoxopteryx Tr.

277. *Mitterpacheriana* Schiff. — I. Budapest. II. Sopron. III. Igló. VIII. Fiume ; frequens.
278. *upupana* Tr. — III. Igló. VIII. Fiume.
279. *curvana* Z. — VIII. Fiume ; in toto Regno occurrit.
280. *laetana* F. — I. Budapest, Eger ; rara.
281. *diminutana* Hn. — I. Budapest.
282. *uncana* Hb. — VII. Josipdol ; frequens.
283. *unguicella* L. — I. Budapest. III. Igló. VII. Josipdol.
284. *siculana* Hb. — I. Budapest, Csepel. II. Sopron. VII. Josipdol. VIII. Fiume.
285. *comptana* Froel. — VIII. Fiume.
286. *lundana* F. — VII. Josipdol. VIII. Fiume ; frequ.
287. *myrtillana* Tr. — VI. Herkulesfürdő.
288. *derasana* Hb. — I. Budapest. V. Nagyág. VII. Josipdol. VIII. Fiume ; nonnunquam frequens.

Rhopobota Ld.

289. *naevana* Hb. — VIII. Fiume ; frequens.

Rhyacionia H.-S.

290. *hastiana* Hb. — VIII. Fiume ; non rara.

Dichrorampha Gn.

291. *sequana* Hb. — VII. Fužine.
292. *petiverella* L. — I. Budapest. III. Kocsócz. IV. S.-A.-Ujhely. — V. Nagyág, Kovászna. VII. Josipdol. VIII. Fiume ; hic-illic nonnunquam frequens.
293. *alpinana* Tr. — I. Budapest. VII. Josipdol. VIII. Fiume, Buccari.
294. *aurantiana* Stgr. — Teste M. Wocke etiam Hungariæ incola.
295. *distinctana* Hein. — VIII. Buccari.
296. *plumbagana* Tr. — VII. Josipdol. VIII. Fiume ; non rara.
297. *cinerosana* H.-S. — I. Budapest ; præter Hungariam nullibi collecta.
298. *Gruneriana* H.-S. — I. Budapest (etiam in Austria occurrit).
299. *Heegeriana* Dup. — I. Budapest.
300. *plumbana* Sc. — IV. Com. Máramaros. VII. Josipdol, Fužine, Velebit. VIII. Fiume.
301. *incursana* H.-S. — VI. Herkulesfürdő. VIII. Buccari.

Fam. TINEIDAE.

Subfamilia. CHOREUTINAE.

Choreutis Hb.

1. *dolosana* H.-S. — I. Budapest. VII. Josipdol. VIII. Fiume ; hic-illic frequens.
2. *Bjerkandrella* Thnb. — VIII. Buccari.

* Berl. Ent. Zeitschrift 1870, pag. 273—330.

3. *Myllerana* F. — I. Budapest (Sashegy). VII. Josipdol. VIII. Fiume ; non rara.
4. *stellaris* Z. — VI. Secundum H. Schäffer etiam in Hungaria occurrit.*

Simæthis Leach.

5. *nemorana* Hb. — VIII. Fiume.
6. *pariana* Cl. — Fere in toto Regno frequens.
7. *oxyacanthella* L. — IV. Com. Máramaros. VII. Josipdol. VIII. Fiume ; non rara.

Subfamilia. ATYCHINAE.

Atychia Latr.

8. *pumila* O. — III. Kocsócz. IV. Szomotor (com. Sáros).
9. *appendiculata* Esp. — I. Budapest, Rákospalota, Isaszeg, Csepel. III. Kocsócz ; nonnunquam frequens.
10. *nana* Tr. — Secundum S. Praun præter Siciliam et Dalmatiam etiam in Hungaria occurrit.

Subfamilia. TALAEPORINAE.

Talæporia Hb.

11. *politella* O. — I. Budapest.
v. *clandestinella* Z. — VIII. Fiume ; non rara.
12. *pseudobombycella* Hb. — I. Budapest. VII. Josipdol ; frequens.

Solenobia Z.

13. *triquetrella* F. R. — I. Budapest. III. Kocsócz. VII. Fužine.
14. *inconspicuella* Hofm. — I. Budapest (specimen Musæi Nationalis Hungarici est defectum, sed verosimiliter eandem speciem attinet).

Subfamilia. LYPUSINAE.

Lypusa Z.

15. *maurella* (S. V.) F. — I. Budapest. VII. Josipdol. VIII. Fiume.

Subfamilia. TINEINAE.

Melasina B.

16. *ciliaris* O. — III. Tátra, prope lacum Csorbai-tó ; valde rara.
17. *lugubris* Hb. — VI. Herkulesfürdő ; non rara.
18. *melana* H.-S. — VI. Herkulesfürdő ; rara.

Diplodoma Z.

19. *marginepunctella* Stph. — I. Budapest. VII. Velebit.

Xysmatodoma Z.

20. *melanella* Hw. — VIII. Fiume ; frequens.

Euplocamus Latr.

21. *anthracinalis* Sc. — Fere in omni parte Regni collecta.

Scardia Tr.

22. *boleti* F. — VII. Josipdol. VIII. Fiume ; frequens.
23. *tessulatella* Z. — VIII. Fiume ; non rara.
24. *boletella* Z. — Secundum M. Wocke etiam Hungariæ incola.

Ateliotum Z.

25. *hungaricellum* Z. — I. Budapest. (In Hungariæ et Sereptæ collibus).

Blabophanes Z.

26. *imella* Hb. — I. Budapest. VII. Josipdol. VIII. Fiume.
27. *ferruginella* Hb. — I. Budapest. VII. Josipdol. VIII. Fiume.
28. *monachella* Hb. — I. Budapest, Ujpest. V. Szt-Gothárd, Mező-Záh. VI. Herkulesfürdő ; non rara.
29. *rusticella*. — IV. Com. Máramaros. VII. Josipdol. VIII. Fiume ; nonnunquam frequens.

Tinea Z.

30. *fulvimitrella* Sodof. — VII. Josipdol ; frequens.
31. *Ankerella* Mn. — I. Budapest, Rákos ; non rara. Præter Hungariam non observata.
32. *tapezella* L. — I. Budapest. VIII. Fiume, frequ.
33. *arcella* F. — VII. Josipdol. VIII. Fiume, non rara.
34. *corticella* Curt. — IV. Com. Máramaros.
35. *parasitella* Hb. — III. Pöstyén. IV. S.-A.-Ujhely. VII. Josipdol.
36 *arcuatella* Stt. — Teste M. Wocke etiam Hungariæ incola.
37. *quercicolella* H.-S. — I. Budapest. V. Szt-Gotthárd. VIII. Fiume.
38. *granella* Z. — I. Budapest. VII. Josipdol. VIII. Fiume. Passim toto regno occurrit.
39. *cloacella* Hn. — VII. Fužine.
40. *albicomella* H.-S. — I. Budapest.
41. *pustulatella* Z. — VII. Velebit. VIII. Fiume, Buccari, frequens.
42. *confusella* H.-S. — VIII. Fiume.
43. *nigripunctella* Hn. — VIII. Fiume.
44. *parietariella* H.-S. — VIII. Fiume.

* Vol. V. pag. 96.

45. *relicinella* H.-S. — Secundum. M. Wocke in Hungariæ et Germaniæ collibus.
46. *misella* Z. — I. Budapest. II. Kőszeg. VII. Josipdol. VIII. Buccari ; frequens.
47. *fuscipunctella* Hw. — I. Budapest. VII. Josipdol. Fužine. VIII. Fiume ; nonnunquam frequens.
48. *pellionella* L. — Communis.
49. *lapella* Hb. — VII. Josipdol. VIII. Fiume, Tersato.
50. *simplicella* H.-S. — VIII. Buccari ; non rara.
51. *vinculella* H.-S. Teste M. Wocke etiam Hungariæ incola.
52. *argentimaculella* Stt. — I. Kalocsa ; frequens.

Lampronia Stph.

53. *morosa* Z. — Præter Hungariam in Angliæ et Germaniæ collibus.
54. *rubiella* Bjerkander. — VIII. Fiume ; non rara.

Incurvaria Hw.

55. *muscalella* F. — I. Budapest. II. Sopron. VII. Josipdol. VIII. Fiume ; frequens.
56. *pectinea* Hw. — I. Peszér. VIII. Fiume ; non rara.
57. *Koerneriella* Z. — III. Gács. VIII. Fiume.
58. *flavifrontella* Hein. — I. Budapest. III. Igló ; nonnunquam frequens.
59. *vetulella* Zett. — VII. Velebit.
60. *capitella* Cl. — IV. Ránk. V. Mons Vultrupietre (com Hunyad) ; frequens.
61. *Oehlmanniella* Fr. — VII. Josipdol. VIII. Fiume ; non rara.

Nemophora Hb.

62. *Swammerdamella* L. — I. Budapest. III. Igló. IV. Kassa. V. Nagyág. VII. Josipdol. VIII. Fiume ; communis.
63. *Panzerella* Hb. — VI. Herkulesfürdő ; non rara.
64. *Schwarziella* Z. — II. Sopron.
65. *pilulella* Hb. — VII. Josipdol. VIII. Fiume, frequ.
66. *pilella* F. — I. Budapest. VII. Josipdol, Fužine. VIII. Fiume, Buccari ; nonnunquam frequens.
67. *metaxella* Hb. — VIII. Fiume ; non rara.

Subfamilia. ADELINAE.

Adela Latr.

68. *fibulella* (S. V.) F. — III. Igló. VII. Josipdol. VIII. Fiume.
69. *leucocerella* Sc. — Secundum M. Wocke etiam in Hungaria occurrit.
70. *rufifrontella* Tr. — VII. Josipdol. VIII. Fiume.
71. *rufimitrella* Sc. — V. Nagyág. VIII. Fiume ; nonnunquam frequens.
v. *purpuratella* Z. — Præter Hungariam ignota.
72. *violella* Tr. — I. Budapest. III. Kocsócz. VII. Josipdol. VIII. Fiume, Martinšćicza ; frequens.*
73. *mazzolella* Hb. — I. Budapest ; rara.
74. *Ochsenheimerella* Hb. — Secundum M. Wocke etiam Hungariæ incola.
75. *Degeerella* L. — Fere in omnibus regionibus occurit.
76. *croesella* Sc. — II. Sopron. III. Kocsócz. V. Nagyág.
77. *religatella* Z. — VIII. Fiume.
78. *associatella* Z. — VIII. Fiume ; non rara.
79. *viridella* Sc. — II. Sopron. III. Kocsócz, Igló. VII. Josipdol. VIII. Fiume ; frequens.
80. *cuprella* (S. V.) Thnb. — V. Nagyág. VIII. Fiume ; frequens.

Nemotois Hb.

81. *metallicus* Poda.** — I. Budapest. V. Nagyág. nonnunquam frequens.
v. et ab. *aerosellus* Z. — VII. Josipdol. VIII. Fiume.
82. *Pfeifferellus* Hb. — Teste H.-Schäffer etiam Hungariæ incola.***
83. *Raddaëllus* Hb. — Præter Hungariam in Austriæ et Siciliæ collibus.
84. *cupriacellus* Hb. — V. Nagyág ; non rara.
85. *istrianellus* Stt. — VIII. Fiume ; rara.
86. *prodigellus* Z. — VI. Herkulesfürdő ; frequens.
87. *fasciellus* F. — I. Budapest. III. Szliács. IV. S.-A.-Ujhely. VI. Grebenácz. VIII. Fiume ; nonnunquam frequens.
88. *violellus* Z. — V. Nagyág.
89. *molellus* Hb. — I. Budapest ; frequens.
90. *minimellus* (S. V.) Z. — VI. Krassó. VII. Josipdol. VIII. Fiume.
91. *barbatellus* Z. — VIII. Fiume.
92. *Dumeriliellus* Dup. — VIII. Fiume ; rara.

Subfamilia. OCHSENHEIMERINAE.

Ochsenheimeria Hb.

93. *taurella* Schiff. — VIII. Fiume.

Subfamilia ACROLEPINAE

Acrolepia Curt.

94. *cariosella* Tr. — VI. Herkulesfürdő. VII. Josipdol ; non rara.
95. *vesperella* Z. — VIII. Buccari.

* Stett. Ent. Zeits. 1850, 155.
** Ins. Mus. Græc. pag. 94.
*** H.-S. Vol. V. pag. 100.

96. *perlepidella* Stt. — VIII. Fiume.
97. *granitella* Tr. — VII. Josipdol. VIII. Fiume ; non rara.

Roeslerstammia Z.

98. *Erxlebella* F. — VIII. Fiume.

Subfamilia. HYPONOMEUTINAE.

Scythropia Hb.

99. *crataegella* L. — I. Budapest. VII. Josipdol. VIII. Fiume ; non rara.

Hyponomeuta Z.

100. *Stannellus* Thnb. — Specimen Musaei Vindobonensis ex Hungaria oritur.
101. *vigintipunctatus* Retz.—VIII. Fiume ; non rara.
102. *plumbellus* Schiff. — VIII. Fiume, non rara.
103. *irrorellus* Hb. — VIII. Fiume. In toto Regno occurrit
104. *padellus* Z. — III. Szoholya (com. Hont), Szkáz, (com. Máramaros). VII. Josipdol. VIII. Fiume ; frequens.
105. *rorellus* Hb. — V. Nagyág. VII. Josipdol, Fužine. VIII. Fiume ; nonnunquam frequens.
106. *malinellus* Z. — III. Kocsócz, Igló. VI. Herkulesfürdő.
107. *Cagnagellus* Hb. — II. Sopron. III. Kocsócz. V. Nagyág. VII. Josipdol. VIII. Fiume ; hic-illic nonnunquam frequens.
108. *evonymellus* L. — III. Igló, Kocsócz. VIII. Fiume ; frequ.

Swammerdamia Hb.

109. *combinella* Hb. — VII. Josipdol. VIII. Fiume.
110. *compunctella* H.-S. — VI. Herkulesfürdő.
111. *griseocapitella* Stt. — VII. Josipdol.
112. *Heroldella* Tr. — I. Budapest. III. Kocsócz. VIII. Fiume.
113. *pyrella* Villers. — VII. Josipdol. VIII. Fiume, frequens.
114. *Zimmermannii* Nov. — IV. Tátra ; rara.

Prays Hb.

115. *oleellus* F. — VIII. Fiume.

Zelleria Stt.

116. *hepariella* Stt. — VIII. Fiume, frequens.

Argyresthia Hb.

117. *ephippella* F. — I. Budapest. VII. Josipdol. VIII. Fiume ; hic-illic frequens.
118. *nitidella* F. — I. Budapest. VI. Herkulesfürdő. VII. Josipdol ; non rara.
v. *ossea* Hw. — I Budapest.
119. *semitestacella* Curt. — VII. Josipdol.
120. *albistria* Hw. — VII. Josipdol. Pere in omnibus regionibus occurrit.
121. *spinella* Z. — VIII. Fiume ; rara.
122. *conjugella* Z. — VI. Herkulesfürdő ; non rara.
123. *mendica* Hw. — VII. Josipdol. VIII. Fiume.
124. *fundella* F.-R. — VIII. Fiume.
125. *abdominalis* Z. — VIII. Fiume.
126. *Goedartella* L. — VI. Herkulesfürdő ; frequens.
127. *arceuthina* L. — VII. Josipdol, non rara.
128. *illuminatella* Z. — VII. Josipdol. VIII. Fiume.

Subfamilia. PLUTELLINAE.

Eidophasia Stph.

129. *syenitella* H.-S. — VI. Ó-Gradiska VIII. Fiume.

Plutella Schrk.

130. *cruciferarum* Z. — Pasim in toto Regno occurrit.

Cerostoma Latr.

131. *vittella* L. — Fere in omnibus regionibus occurrit.
132. *sequella* Cl. — V. Nagyág ; non rara.
133. *sylvella* L. — VIII. Fiume ; frequens.
134. *lucella* F. — VII. Josipdol.
135. *alpella* Schiff. — Teste M. Wocke etiam in Hungaria habitat.
136. *persicella* F. — Fere in toto territorio regni.
137. *aspersella* L. — V. Nagyág. VII. Josipdol. VIII. Fiume.
138. *scabrella* L. — Secundum M. Wocke etiam Hungariæ incola.
139. *horridella* Tr. — II. Kőszeg. (Legit I. Pavel).
140. *nemorella* L. — Secundum M. Wocke et in Hungaria collecta.
141. *xylostella* L. — VIII. Fiume ; non rara.

Theristis Hb.

142. *mucronella* Sc. — I. Budapest, Ujpest. VIII. Fiume.

Subfamilia. ORTHOTAELINAE.

Orthotælia Stph.

143. *sparganella* Thnb. — V. Mező-Záh. Præter regionem transylvanicam non observata.

Subfamilia. CHIMABACCHINAE.

Dasystoma Curt.

144. *salicella* Hb. — VIII. Fiume ; non rara.

Chimabacche Z.

145. *phryganella* Hb.— Fere in toto Regno observata.
146. *fagella* (S. V.) F. — In omnibus regionibus collecta.

Subfamilia. GELECHIINAE.

Semioscopis Hb.

147. *anella* Hb. — III. Igló ; frequens.
148. *strigulana* (S. V.) F. — V. Nagyág ; non rara.
149. *avellanella* Hb. — Secundum M. Wocke etiam in Hungaria collecta.

Epigraphia Stph.

150. *Steinkellneriana* Schiff. — VII. Hrast. VIII. Fiume.

Psecadia Hb.

151. *sexpunctella* Hb. — I. Budapest. VII. Josipdol. VIII. Fiume ; frequens.
152. *pusiella* Roemer. — I. Budapest. II. Sopron. IV. Kassa. V. Nagyág.
153. *bipunctella* F. — I. Budapest. II. Sopron. V. Nagyág. VIII. Fiume ; nonnunquam frequens.
154. *funerella* F. — V. Nagyág. VII. Josipdol. VIII. Fiume ; non rara.
155. *decemguttella* Hb. — VII. Josipdol. VII. Fiume.
156. *chrysopyga* Z. — VIII. Zengg.

Depressaria Hw.

157. *costosa* Hn. — I. Budapest. V. Nagyág. VIII. Fiume, Martinšćica ; non rara.
158. *flavella* Hb. — III. Igló. V. Nagyág. VIII. Fiume ; frequens.
v. *Sparmanniana* F. — III. Gács.
159. *subpallorella* Stgr. — I. Budapest. In Hungariæ et Galliæ meridionalis collibus.*
160. *pallorella* Z. — I. Budapest.
161. *culcitella* H.-S. — Præter Germaniam etiam in Hungaria detecta.
162. *doronicella* Wk. — Secundum H.-Schäffer etiam Hungariæ incola.**
163. *assimilella* Fr. — II. Sopron. VII. Josipdol. VIII. Fiume, Tersatto.
164. *venusulella* Moesch.— I. Budapest. III. Kocsócz. Præter Hungariam et in Sarepta collecta.
165. *nanatella* Stt. — VIII. Fiume ; non rara.
166. *putridella* Schiff. — VI. Herkulesfürdő. Præter Germaniam solum apud nos in Regione banatica observata.
167. *arenella* Schiff. — II. Sopron. V. Nagyág. VIII. Fiume, Buccari ; hic-illic nonnunquam frequens.
168. *latorella* Schiff. — V. Nagyág.
169. *zephyrella* Hb. — Secundum H.-Schäffer etiam in Hungaria collecta.*
170. *adspersella* Kollar. — Præter Hungariam et in Austriæ Asiæque collibus.
171. *thapsiella* Z. — I. Budapest ; circa urbem non rara.
172. *ocellana* F. — VIII. Fiume.
173. *Alstroemeriana* Cl. — V. Nagyág.
174. *purpurea* Hw. — I. Budapest. VII. Josipdol. VIII. Fiume, Tersato, Martinšćica ; frequens.
175. *lutosella* H.-S. — VIII. Fiume.
176. *applana* F. — I. Budapest, Csepel, Isaszegh. V. Nagyág, Szt-Gotthard ; frequens.
177. *capreolella* Z. — VIII. Fiume ; frequens.
178. *angelicella* Hb. — Teste H.-Schäffer etiam Hungariæ incola.**
179. *cnicella* Tr. — VI. Herkulesfürdő.
180. *hypomarathri* Nick. — I. Budapest ; circa urbem non rara.
181. *furvella* Fr. — I. Budapest. Possim in toto regno occurrit.
182. *depressella* Hb. — I. Budapest. III. Kocsócz. VII. Josipdol. VIII. Fiume ; nonnunquam frequ.
183. *pimpinellae* Z. — Secundum M. Wocke et in Hungaria habitat.
184. *badiella* H.-S. — VIII. Fiume ; non rara.
185. *cervicella* H.-S. — Præter Austriam et in Hungaria occurrit.
186. *heracliana* De Geer. — Secundum M. Wocke etiam Hungariam incolat.
187. *corticinella* Z. — VI. Herkulesfürdő.
188. *chaerophylli* Z.— I. Budapest. V. Szt-Gotthárd ; nonnunquam frequens.
189. *artemisiae* Nick. — I. Budapest. III. Kocsócz.
190. *nervosa* Hn. — Specimen Musei Vindobonensis ex Hungaria orritur (1847).
191. *dictamnella* Tr. — I. Budapest ; frequens.
192. *marcella* Rbl. — I. Budapest.

Cryptolechia Z.

193. *sareptensis* Moeschl.— In Hungariæ et Sareptæ collibus.***

Gelechia Z.

194. *pinguinella* Tr. — VIII. Fiume.
195. *rhombella* Schiff. — Secundum M. Wocke etiam in Hungaria collecta.

* Berlin. ent. Zeits. 1870, 298.
** Tom. V. pag. 122.

* Tom. V. pag. 125.
** Tom. V. pag. 126.
*** Wien. ent. Mts. 1862, 141, T. 1. 14.

196. *tephriditella* Dup. — I. Budapest, Csepel; non rara.
197. *spurcella* H.-S. — I. Budapest. VII. Josipdol.
198. *Hungariae* Stgr. — In Hungaria detecta.*
199. *vepretella* Z. — VIII. Fiume.**
200. *distinctella* Z. — I. Budapest. VII. Fužine, Raduč. VIII. Fiume, Tersato; frequens.
201. *praeclarella* H.-S. — I. Budapest.
202. *scotinella* H.-S. — VII Josipdol.
203. *flavicomella* Z. — VII. Josipdol.
204. *velocella* Dup. — I. Budapest. VII. Josipdol VIII. Fiume.
205. *peliella* Tr. — VII. Josipdol.
206. *ericetella* Hb. — III. Gács. VII. Josipdol.
207. *lentiginosella* Z. — VIII. Fiume, Martinšćica.
208. *lutilabrella* Mn. — VIII. Fiume; frequens.
209 *malvella* Hb. — Secundum M. Wocke etiam in Hungaria observata.
210 *perpetuella* H.-S. — Teste M. Wocke et Hungariæ incola.
211. *solutella* Z. — VII. Josipdol, Fužine. VIII. Fiume; non rara.
212. *melaleucella* Const. — In Alpibus et Hungariæ collibus.
213. *diffinis* Hw. — I. Budapest. VIII. Fiume.
214. *scalella* Sc. — I. Budapest. V. Nagyág. VIII. Fiume.
215. *viduella* F. — I. Budapest.
216. *tessela* Hb. — I. Budapest. VI. Herkulesfürdő. VIII. Fiume, Tersato; frequens.
217. *cytisella* Tr. — I. Budapest. VIII. Josipdol. VIII. Fiume.

Brachmia Hein.

218. *nigricostella* Dup. — I. Budapest. VI. Herkulesfürdő. VIII. Fiume; non rara.

Bryotropha Hein.

219. *terrella* Hb. — III. Gács. VII. Josipdol, Fužine. VIII. Fiume; non rara.
220. *dryadella* Z. — Secundum M. Wocke etiam in Hungaria collecta.
221. *basaltinella* Z. — Teste M. Wocke etiam Hungariam incolit.

Lita Tr.

222. *inustella* H.-S. — I. Budapest.
223. *artemisiella* Fr. — I. Budapest, Budafok. VII. Josipdol. VIII. Fiume; non rara.
224. *atriplicella* F.-R. — I. Budapest.
225. *obsoletella* F.-R. — I. Budapest.
226. *tussilaginella* Hein. — Præter Helvetiam et Germaniam etiam in Hungaria collecta.
227. *murinella* H.-S. — Secundum M. Wocke etiam Hungariæ incola.
228. *acuminatella* Sircom. — VII. Fužine.
229. *ingloriella* Hein. — VIII. Fiume; non rara.
230. *Moritzella* Hb. — I. Eger. (Circa urbem a. L. Abafi-Aigner detecta).
231. *Hübneri* Hw. — I. Budapest.
232. *maculea* Hw. — VII. Josipdol.
233. *viscariella* Stt — Secundum. M. Wocke et Hungariæ incola.
234. *maculiferella* Dgl. — VI. Herkulesfürdő, rara.
235. *vicinella* Dgl. — VII. Josipdol.
236. *Kiningerella* H.-S. — I. Budapest; non rara.
237. *leucomelanella* Z. — VI. Herkulesfürdő. VII. Josipdol, Raduč.

Teleia Hein.

238. *vulgella* Hb. — III. Gács. VIII. Fiume.
239. *scriptella* Hb. — VII. Josipdol. VIII. Fiume.
240. *sequax* Hw. — VIII. Fiume.
241. *fugitivella* Z. — I Budapest.
242. *fugacella* Z. — I. Dömsöd; non rara.
243. *humeralis* Z. — I. Budapest. VIII. Fiume.
244. *proximella* Hb. — VII. Josipdol.
245. *notatella* Hb. — I. Budapest, Csepel. VII. Josipdol; frequens.
246. *Wagae* Now. — IV. Tátra.
247. *triparella* Z. — VII. Josipdol. VIII. Fiume, Buccari.
248. *luculella* Hb. — I. Budapest. VII. Josipdol. VIII. Fiume; hic-illic frequens.
249. *anguinella* H.-S. — Præter Hungariam etiam in Sarepta observata.*

Recurvaria H.-S.

250. *leucatella* Cl. — VII. Josipdol. VIII. Fiume.
251. *nanella* (S.-V.) Hb. — VIII. Fiume.

Poecilia Hein.

252. *albiceps* Z.— VII. Josipdol. VIII. Fiume; frequ.
253. *nigrinotella* Z. — I. Budapest. VI. Herkulesfürdő.

Argyritis Hein.

254. *pictella* Z. — VIII. Fiume; valde rara.
255. *superbella* Z. — Teste M. Wocke etiam Hungariæ incola.

* Berl. ent. Zeitsch. 1870, pag. 300.
** Stett. ent. Zeitsch. 1871, 64.

* H.-Schäffer, n. Schm. 159, pag. 31.

Nannodia Hein.

256. *stipella* Hb. — I. Budapest. VII. Josipdol. VIII. Fiume ; frequens.
v. *naeviferella* Dup. — Ibidem.
257. *Hermannella* F. — VII. Josipdol. VIII. Fiume.

Apodia Hein.

258. *bifractella* Dgl. — I. Budapest. VII. Josipdol.

Sitotroga Hein.

259. *cerealella* Olivier. — In toto Regno occurrit.

Ptocheuusa Hein.

260. *subocellea* Stph. — Fere in omnibus regionibus occurrit.
261. *inopella* — VII. Dragavölgy. VIII. Fiume ; rara.
262. *campicolella* Mn. — VIII. Fiume.

Parasia Dup.

263. *paucipunctella* Z. — VIII. Fiume.
264. *intestinella* Mn. — I. Budapest. Præter Bythiniam etiam in Hungaria collecta.
265. *neuropterella* Z. — VIII. Fiume. In toto Regno.

Ergatis Hein.

266. *subericinella* H.-S. — VII. Josipdol. VIII. Buccari.
267. *decurtella* Hb. — I. Bpest. VII. Josipdol. VIII. Fiume.

Doryphora Hein.

268. *carchariella* Z. — VII. Josipdol. VIII. Fiume.
269. *pulveratella* H.-S. — VII. Josipdol, Fužine. VIII. Fiume.
270. *Dziedusyckii* Now. — IV. Tátra.

Monochroa Hein.

271. *tenebrella* Hb. — VIII. Fiume.

Lamprotes Hein.

272. *atrella* Hw. — I. Budapest.

Anacampsis Curt.

273. *patruella* Mn. — I. Budapest. VIII. Fiume ; hic-illic frequens.
274. *coronillella* Tr. — I. Budapest. V. Szt-Gotthárd. VII. Josipdol. VIII. Fiume.
275. *biguttella* H.-S. — VII. Josipdol. VIII. Fiume.
276. *anthyllidella* Hb. — I. Budapest. VII. Josipdol. VIII. Fiume ; nonnunquam frequens.
277. *ligulella* Z. — III. Igló. VIII. Fiume ; communis.
278. *vorticella* Sc. — VIII. Fiume.
279. *cincticulella* H.-S. — VIII. Fiume, Martinšćica ; rara.
280. *taeniolella* Z. — Secundum M. Wocke etiam in Hungaria sæpe collecta.
281. *captivella* H.-S. — V. Szt-Gotthárd. VIII. Fiume, Buccari.
282. *lamprostoma* Z. — VIII. Fiume ; rara.
283. *splendens* Stgr. — I. Budapest.

Tachyptilia Hein.

284. *populella* ; Cl. — Fere in omnibus regionibus observata, communis.
285. *scintillella* F.-R. — I. Budapest. VIII. Fiume, Buccari.
286. *subsequella* Hb. — In toto Regno occurrit.

Brachycrossata Hein.

287. *cinerella* Cl. — I. Budapest. V. Szt-Gotthárd. VIII. Josipdol. VIII. Fiume ; non rara.
288. *tripunctella* Schiff. — VII. Fužine.

Stomopteryx Hein.

289. *detersella* Z. — I. Budapest. V. Szt-Gotthárd ; hic-illic frequens.

Ceratophora Hein.

290. *triannulella* H.-S. — I. Budapest ; frequens.
291. *rufescens* Hw. — Secundum M. Wocke etiam in Hungaria collecta.

Rhinosia Tr.

292. *Denisella* F. — I. Budapest. VII. Josipdol. VIII. Fiume ; hic-illic nonnunquam frequens.
293. *sordidella* Hb. — VI. Herkulesfürdő.
294. *ferrugella* Schiff. — I. Budapest. VII. Josipdol. VIII. Fiume.
295. *formosella* Hb. — I. Budapest. VII. Josipdol.

Cladodes Hein.

296. *dimidiella* Schiff. — V. Szt-Gotthárd. VII. Josipdol. VIII. Fiume ; frequens.
297. *gerronella* Z. — Fere in toto regno occurrit.
298. *rasilella* H.-S. — III. Igló. VII. Josipdol. VIII. Fiume.

Euteles Hein.

299. *Kollarella* Costa. — I. Budapest. VIII. Fiume, Tersato ; non rara.

Cleodora Curt.

300. *striatella* Hb. — I. Budapest. VII. Josipdol. VIII. Fiume ; rara.

Mesophleps H.-S.

301. *silacellus* Hb. — I. Budapest. VII. Josipdol.
302. *pudicellus* Mn. — I. Budapest. VIII. Fiume.

303. *trinotellus* H.-S. — Etiam in Hungaria observata.*

Ypsolophus F.

304. *renigerellus* Z. — VI. Herkulesfürdő.
305. *ustulellus* F. — VII. Josipdol; frequens.
306. *fasciellus* Hb. — II. Sopron. VII. Ribisvölgy. VII. Josipdol. VIII. Fiume; nonnunquam frequ.
307. *juniperellus* L. — VII. Josipdol. VIII. Fiume, Tersato, Martinšćica.
308. *barbellus* Hb. — I. Budapest; frequens.
309. *marginellus* F. — VII. Josipdol. VIII. Fiume, Martinšćica; nonnunquam frequens.

Nothris Hb.

310. *verbascella* Hb. — VII. Josipdol. VIII. Fiume.
311. *lemniscella* Z. — I. Budapest. III. Gács; rara.

Sophronia Hb.

312. *semicostella* Hb. — VII. Josipdol.
313. *Chilonella* Tr. — Secundum M. Wocke etiam in Hungariam habitat.
314. *Humerella* Schiff. — VIII. Fiume; non rara.
315. *sicariella* Z. — VII. Herkulesfürdő. VIII. Fiume.
316. *illustrella* Hb. — VII. Josipdol. VIII. Fiume.

Anarsia Z.

317. *spartiella* Schrk. — Secundum M. Wocke etiam in Hungaria collecta.
318. *lineatella* Z. — VIII. Fiume. Fere in omnibus regionibus occurrit.

Megacraspedus Z.

319. *dolosellus* Z. — I. Budapest. VII. Josipdol. VIII. Fiume, Martinšćica.
320. *separatellus* F.-R. — VIII. Fiume.
321. *binotellus* F.-R. — I. Budapest (Adalak). VII. Josipdol, Fužine. VIII. Fiume; hic-illic frequens.
322. *imparellus* F.-R. — I. Budapest. VIII. Fiume.
323. *lagopellus* H.-S. — I. Budapest.**

Chilopselaphus Mn.

324. *fallax* Mn. — I. Budapest. In Hungariæ et Sareptæ collibus.

Pterolonche Z.

325. *albescens* Z. — I. Budapest; circa urbem ad pedes montium.
326. *inspersa* Stgr. — In Hungariæ et Andalusiæ collibus.

* H.-Schäffer, n. Schm. 46. p. 6.
** Rogenhofer, Beitr. z. Verbr. d. Lepid. 1869.

Topeutis Hb.

327. *barbella* F. — I. Budapest. VI. Herkulesfürdő; nonnunquam frequens.
328. *criella* Tr. — II. Szegzárd. VIII. Fiume.
329. *labiosella* Hb. — VI. Herkulesfürdő.*

Carposina H.-S.

330. *scirrhosella* H.-S. — I. Budapest. VIII. Fiume.

Pleurota Hb.

331. *rostrella* Hb. — Fere in omnibus regionibus communis.
332. *pyropella* Schiff. — I. Budapest, Rákos. V. Nagyág. VI. Herkulesfürdő. VII. Josipdol; frequ.
333. *salviella* H.-S. — VII. Fužine. VIII. Fiume.
334. *brevispinella* Z. — VII. Ó-Gradiska.
335. *pungitiella* H.-S. — VII. Josipdol VIII. Fiume.
336. *Schlaegeriella* Z. — Secundum. M. Wocke etiam Hungariæ incola.
337. *aristella*. — I. Budapest. VII. Josipdol. VIII. Fiume; hic-illic frequens.
338. *bicostella* Cl. — I. Budapest. V. Nagyág. VIII. Fiume.

Holoscolia Z.

339. *forficella* Hb. — I. Budapest. VII. Josipdol. VIII. Fiume.

Protasis H.-S.

340. *punctella* Costa. — VII. Fužine. VIII. Fiume.

Hypercallia Stph.

341. *citrinalis* Sc. — III. Kocsócz. IV. Jeszeno (com. Zemplén). V. Nagyág. VII. Josipdol. VI. Herkulesfürdő; hic-illic frequens.

Lecithocera H.-S.

342. *luticornella* Z. — I. Budapest. VIII. Josipdol. VIII. Fiume.
v. *orsoviella* Hein. — VII. Ó-Gradiska.

Carcina Hb.

343 *quercana* F. — VII. Josipdol. VIII. Fiume; non rara.

Enicostoma Stph.

344. *lobella* Schiff. — I. Budapest. VIII. Fiume.

Symmoca Hb.

345. *signella* Hb. — I. Budapest. VIII. Fiume.
346. *albicanella* Z. — VII. Josipdol. VIII. Buccari.
347. *designella* H.-S. — In Hungaria detecta.**

* S. Praun Tin. Tab. VI. Fig. 7.
** H.-Schäffer Tom. V. pag. 111.

Cacochroa Hein.

348. *permixtella* H.-S. — Secundum M. Wocke etiam in Hungaria habitat.

Anchinia Hb.

349. *daphnella* Hb. — III. Igló. VII. Josipdol.

Harpella Schrk.

350. *forficella* Sc. — III. Igló. V. Nagyág, Kovászna. VI. Kukahegy (comit. Krassó-Szörény). VII. Josipdol. VIII. Fiume.

351. *Geoffroyella* L. — V. Nagyág. VIII. Fiume; frequens.

352. *Staintoniella* Z. — I. Budapest. VII. Josipdol. VIII. Fiume; hic-illic nonnunquam frequens.

353. *bractella* L. — I. Budapest, Ujpest. V. Nagyág. VI. Szemenik. VII. Josipdol. VIII. Fiume, Buccari.

Dasycera Hw.

354. *oliviella* F. — I. Budapest. VII. Josipdol. VIII. Fiume; non rara.

Oecophora Z.

355. *tinctella* Hb. — I. Bihar. III. Kocsócz. IV. Homonna. VIII. Josipdol. VIII. Fiume; hic-illic frequens.

356. *unitella* Hb. — Secundum H.-Schäffer etiam Hungariæ incola.*

357. *flavifrontella* Hb. — I. Budapest. VI. Herkulesfürdő. VII. Josipdol. VIII. Fiume; nonnunquam frequens.

358. *fuscescens* Hw. — I. Budapest; circa urbem non rara.

359. *stipella* L. — V. Nagyág. VII. Fužine. VIII. Fiume.

360. *similella* Hb. — V. Nagyág.

361. *cinnamomea* Z. — I. Budapest. VI. Herkulesfürdő.

362. *augustella* Hb. — Passim in toto Regno occurrit.

363. *Stroemella* F. — I. Budapest. VI. Herkulesfürdő.

364. *minutella* L. — IV. Com. Máramaros. VIII. Fiume.

365. *tripuncta* Hw. — Secundum M. Wocke etiam Hungariæ incola.

366. *formosella* (S. V.) F. — I. Budapest (Adalak). VIII. Fiume.

367. *lunaris* Hw. — I. Budapest (Adalak). VII. Josipdol.

368. *lambdella* Don. — VIII. Fiume, Tersato; non rara.

* Tom. V. pag. 138.

369. *Schaefferella* L. — I. Budapest (Adalak). V. Nagyág. VI. Herkulesfürdő; non rara.

370. *procerella* Schiff. — Secundum M. Wocke etiam in Hungaria collecta.

371. *Pokornyi* Nick. — I. Budapest.

Alloclita Stgr.

372. *recisella* Stgr. — VIII. Fiume.

Oegoconia Stt.

373. *quadripuncta* Hw. — V. Szt-Gotthárd. VIII. Fiume. VI. Herkulesfürdő, nonnunquam frequ.

Hypatima H.-S.

374. *inunctella* Z. — I. Budapest.

Blastobasis Z.

375. *phycidella* Z. — I. Budapest. VII. Josipdol. VIII. Fiume; hic-illic non rara.

Subfamilia. GLYPHIPTERYGINAE.

Glyphipteryx Hb.

376. *loricatella* Fr. — I. Budapest. Præter Hungariam etiam in Serbia collecta.

377. *Bergstraesserella* F. — v. *Pietruskii* Nov. — III. Tátra. Solum e montibus Carparthicis nota.

378. *Thrasonella* Sc. — I. Budapest, Csepel, Dabas. VII. Josipdol. VIII. Fiume; communis.

379. *equitella* Sc. — VII. Josipdol. VIII. Fiume, Martinšćica; non rara.

380. *Forsterella* F. — VII. Josipdol, Orehovica. VIII. Fiume.

381. *Fischerella* Z. — VIII. Fiume, Buccari; non rara.

Subfamilia GRACILARIINAE.

Gracilaria Z.

382. *alchimiella* Sc. — Ferre in omnibus regionibus communis.

383. *rhodinella* H.-S. — VIII. Fiume.

384. *stigmatella* F. — Fere in toto regno frequēns.

385. *fidella* Reutti. — I. Kalocsa.

386. *semifascia* Hw. — VIII. Fiume, Tersato; non rara.

387. *elongella* L. — VII. Josipdol. VIII. Fiume; communis.

388. *tringipennella* Z. — I. Budapest. VII. Josipdol. VIII. Fiume, Martinšćica; nonnunquam frequ.

389. *limosella* Z. — I. Budapest. VII. Josipdol. VIII. Fiume.

390. *syringella* F. — Fere in cunctis regionibus communis.

391. *magnifica* Stt. — VII. Josipdol.
392. *phasianipennella* Hb. — VII. Josipdol.
v. *quadruplella* Z. — I. Budapest; non rara.
393. *quadrisignella* Z. — VIII. Fiume. Martinšćica.
394. *auroguttella* Stph. — VIII. Fiume.
395. *cupediella* H.-S. — VIII. Fiume.
396. *ononidis* Z. — V. Szt-Gotthárd. VIII. Fiume.
397. *Kollariella* Z. — VII. Josipdol. VIII. Fiume.

Coriscium Z.

398. *Brongniartellum* F. — VII Josipdol. VIII. Fiume.
399. *cuculipennellum* Hb.— I. Budapest.VIII Fiume.
400. *sulphurellum* Hw. — VIII. Fiume.

Ornix Z.

401. *guttea* Hw. — I. Budapest. VIII. Fiume; non rara.
402. *anglicella* Stt. — I. Budapest; frequens.
403. *avellanella* Stt. — VII. Josipdol.
404. *finitimella* Z. — I. Budapest; nonnunquam frequens.
405. *torquillella* Z. — VII. Josipdol. VIII Fiume.
406. *anguliferella* Z. — VII. Josipdol, Velebit. VIII. Fiume; hic-illic frequens.
407. *ampliatella* Stt. — VIII. Fiume, Martinšćica.
408. *caudulatella* Z. — Secundum M. Wocke etiam in Hungaria collecta.

Subfamilia. COLEOPHORINAE.

Coleophora Z.

409. *badiipennella* Dup. — VII. Josipdol.
410. *unipunctella* Z. — I. Budapest, frequens
411. *limosipennella* Dup. — VIII. Fiume.
412. *flavipennella* H.-S. — VIII. Fiume.
413. *lutipennella* Z. — VIII. Fiume, Tersato.
414. *gryphipennella* Bouché. — Secundum M. Wocke etiam Hungariæ incola.
415. *nigricella* Stph. — VIII. Fiume; non rara.
416. *paripennella* Z. — VIII. Fiume, Tersato.
417. *Ledi* Stt. — VII. Josipdol.
418. *albitarsella* Z. — VII. Josipdol.
419. *alcyonipennella* Kollar. — VII. Josipdol VIII. Fiume.
420. *cuprariella* Z. — Teste M. Wocke etiam Hungariæ incola.
421. *Frischella* Z. — V. Nagyág.*
422. *deauratella* Z. — VII. Josipdol; non rara.
423. *Fabriciella* Vill. — VIII. Fiume.
424. *anatipennella* Hb. — I. Budapest. VII. Josipdol.
425. *palliatella* Zk. — Secundum M. Wocke et in Hungaria collecta.
426. *currucipennella* Z. — VII. Josipdol.
427. *serratulella* H.-S. — I. Budapest.
428. *auriciella* F. — VIII. Fiume.
429. *serenella* Z. — I. Budapest.
430. *coronillae* Z. — Secundum M. Wocke et in Hungaria observata.
431. *gallipennella* Z. — VI. Herkulesfürdő. VII. Josipdol
432. *vulnerariae* Z. — VII. Josipdol. VIII. Fiume; frequens.
433. *bilineella* H.-S.—VII. Josipdol.VIII. Fiume; non rara.
434. *ditella* Z. — VII. Josipdol.
435. *astragalella* Z. — I. Budapest. II. Sopron.
436. *colutella* F. — Secundum. M. Wocke præter Hungariam et in Gallia occurrit.
437. *fuscociliella* Z. — VII. Josipdol. VIII. Fiume; frequens.
438. *vicinella* Z. — Secundum M. Wocke etiam Hungariæ incola.
439. *conspicuella* Z. — VII. Josipdol.
440. *Lugduniella* Stt. — I. Budapest.
441. *vibicella* Hb. — II. Sopron. VIII. Fiume.
442. *stramentella* Z. — Secundum M. Wocke et in Hungaria collecta.
443. *ornatipennella* Hb. — I. Budapest. VIII. Fiume; hic-illic frequens.
444. *vulpecula* Z. — I. Budapest.*
445. *binotapennella* Dup. — I. Budapest.
446. *squalorella* Z. — I. Budapest, non rara.
447. *ballotella* F.-R. — VIII. Fiume.
448. *onopordiella* Z. — I. Budapest, (Buda); rara.
449. *leucapennella* Hb. — V. Nagyág. VII. Josipdol.
450. *genistae* Stt. — VI. Herkulesfürdő.
451. *bilineatella* Z. — Secundum H.-S. etiam in Hungaria collecta.
452. *arenariella* Z. — VIII. Fiume.
453. *onobrychiella* Z. — VIII. Fiume, et in aliis regionibus observata.
454. *niveicostella* Z. — VII. Josipdol. VIII. Fiume.
455. *albicostella* Dup. — VII. Josipdol. VIII. Fiume.
456. *trifariella* Z. — VIII. Fiume, Tersato, Martinšćica.
457. *flaviella* Mn. — VIII. Fiume.
458. *oriolella* Z. — VI. Herkulesfürdő. VII. Josipdol.
459. *laticostella* Mn. — VII. Josipdol.
460. *fringillella* Z. — Teste H.-S. etiam Hungariæ incola.**

* Erd. Muz. Évk. 1866—67. IV. 12. k. 16. ol.

* H.-S. Vol. V. p. 245.
** 698. Vol. V. pag. 242.

461. *saponariella* Heeger. — II. Sopron. VIII. Fiume.
462. *striolatella* Z. — Secundum M. Wocke etiam in Hungaria observata.
463. *onosmella* Brahm. — Fere in cunctis regionibus collecta.
464. *chamaedryella* Stt. — I. Budapest. III. Kocsócz. VII. Josipdol.
465. *Therinella* Tgstr. — I. Budapest. VIII. Fiume; non rara.
466. *troglodytella* Dup. — VII. Josipdol.
467. *Drymidis* Mn. — VIII. Fiume; præter regionem adriaticam ignota.*
468. *linearíella* Z. — VII. Josipdol. VIII. Fiume.
469. *silenella* H.-S. — I. Budapest; nonnunquam frequens.
470. *directella* Z. — I. Budapest; circa urbem non rara.
471. *motacillella* Z. — VIII. Fiume.
472. *argentula* Z. — VIII. Fiume.
473. *asteris* Mühlig. — I. Budapest; frequens.
474. *Otitae* Z. — II. Sopron; non rara.
475. *laripennella* Zett. — I. Budapest; frequens.
476. *flavaginella* Z. — I. Budapest; communis.
477. *murinipennella* Dup. — I. Budapest. VII. Josipdol. VIII. Fiume.
478. *caespititiella* Z. — VI. Herkulesfürdő.
479. *clypeiferrella* Hofm. — I. Budapest; communis.

Goniodoma Z.

480. *auroguttella* F.-R. — I. Budapest, frequens.

Subfamilia. LAVERNINAE.

Chauliodus Tr.

481. *Illigerellus* Hb. — I. Budapest. VIII. Fiume.
482. *Sourellus* H.-S. — VI. Herkulesfürdő.
483. *pontificellus* Hb. — VII. Josipdol. VIII. Fiume.
484. *strictellus* W. K. — Secundum M. Wocke etiam in Hungaria occurrit.
485. *chaerophyllellus* Goeze. — I. Budapest. VIII. Fiume.

Laverna Curt.

486. *festivella* Schiff. — I. Budapest.
487. *conturbatella* Hb. VII. Josipdol.
488. *lacteella* Stph. — III. Igló.
489. *miscella* Schiff. — VII. Josipdol. VIII. Fiume.
490. *rhamniella* Z. — I. Budapest. VII. Josipdol. VIII. Fiume.
491. *fulvescens* Hw. — III. Zsolna.

* Wien. ent. Mts. I. B. pag. 183.

492. *subbistrigella* Hw. — VI. Herkulesfürdő.
493. *epilobiella* Roemer. — V. Nagyág. VIII. Fiume.

Chrysoclista Stt.

494. *Linneella* Cl. — I. Budapest, Rákos-palota, Babad (com. Pest-Pilis); rara.
495. *aurifrontella* Hb. — VII. Josipdol. VIII. Fiume; rara.

Aechmia Stt.

496. *dentella* Z. — VIII. Fiume, Martinšćica.

Tinagma Z.

497. *perdicellum* Z. — VI. Herkulesfürdő. VII. Josipdol. VIII. Fiume; hic-illic frequens.
498. *balteolellum* F.-R. — VI. Herkulesfürdő. VIII. Fiume.
499. *transversellum* Z. — II. Visegrád.
500. *trivilellum* Rbl. — I. Budapest, Rákos-palota, Csepel.

Heydenia Hofm.

501. *fulviguttella* Z. — VIII. Fiume, Martinšćica.

Asychna Stt.

502. *modestella* Dup. — VII. Fužine. VIII. Fiume.
503. *aeratella* Z. — I. Budapest, (Ó-Buda). VII. Josipdol.

Ochromolopis Hb.

504. *ictella* H.-S. — VIII. Fiume, Tersato.

Stagmatophora H.-S.

505. *isabellella* Costa. — VIII. Fiume; valde rara.
506. *Nickerlii* Nick. — I. Budapest; non rara.
507. *pomposella* Z. — I. Budapest. VIII. Fiume, Martinšćica.
508. *serratella* Tr. — I. Budapest. VII. Josipdol. VIII. Fiume, Tersato; hic-illic frequens.
509. *albiapicella* H.-S. — I. Budapest. VII. Josipdol VIII. Fiume.

Pyroderces Z.

510. *argyrogrammos* Z. — I. Budapest. VII. Josipdol. VIII. Fiume.

Subfamilia. ELACHISTINAE.

Butalis Tr.

511. *obscurella* Sc. — III. Igló. VII. Josipdol; non rara.
512. *productella* Z. — I. Budapest. VIII. Buccari; communis.
513. *seliniella* Z. — I. Budapest. VII. Josipdol.
514. *aerariella* H.-S. — I. Budapest. VIII. Fiume, Buccari.

515. *tabidella* H.-S. — I. Budapest. VIII. Fiume, Buccari.
516. *flaviventrella* H.-S. — Secundum M. Wocke et in Hungaria collecta.
517. *vagabundella* H.-S. — VIII. Fiume.
518. *pascuella* Z. — I. Budapest. VII. Josipdol. VIII. Fiume; non rara.
519. *gravatella* Z. — VII. Josipdol. VIII. Fiume, Buccari.
520. *paullella* H.-S. — V. Nagyág
521 *parvella* H.-S. — II. Sopron. VIII. Buccari; rara.
522. *subselinella* Stgr. — II. Sopron.
523. *laminella* H.-S. — III. Igló. VIII. Buccari; non rara.
524. *cuspidella* Schiff. — V. Nagyág. VI. Krassova, Mons Kuka. VII. Josipdol. VIII. Fiume; frequens.
525. *Knochella* F. — VIII. Fiume.
526. *punctivitella* Costa. — VIII. Fiume.
527. *Emichi* Anker. — I. Budapest (Buda); rara Præter Hungariam nullibi observata.*
528. *Mülleri* Mn. — II. Sopron.
529. *restigerella* Z. — I. Budapest. III. Kocsócz. VIII Fiume; hic-illic frequens.
530. *chenopodiella* Hb. — I. Budapest V. Szt-Gotthárd. VII. Josipdol. VIII. Fiume; nonnunquam frequens
531. *inspersella* Hb. — VIII. Fiume, Martinšćica.
532. *siccella* Z. — VII. Josipdol.

Pancalia Curt.

533. *Latreillella* Curt. — Teste M. Wocke et Hungariæ incola.
534. *Leuwenhoekella* L. — Fere in omnibus Regni partibus observata.
535. *nodosella* Mn. — VIII. Fiume.

Endrosis Hb.

536. *lacteella* Schiff. — III. Kocsócz. VIII. Fiume, Buccari; hic-illic frequens.

Heliodines Stt.

537. *Roesella* L. — I. Budapest. VIII. Fiume.

Batrachedra Stt.

538. *praeangusta* Hw. — I. Budapest.
539. *Ledereriella* Z. — Specimen Musæi Vindobonensis ex Hungaria oritur.

Antispila Hb.

540. *Pfeifferella* Hb. — VII. Josipdol. VIII. Fiume; frequens.

* Stett. ent. Zeits. 1870. p. 143.

Heliozela H.-S.

541. *Stannella* F.-R. — VIII. Martinšćica. J. Man duo exempla legit.

Stephensia Stt.

542. *Brunichiella* L. — VII. Josipdol. VIII. Fiume, Martinšćica.

Elachista Stt.

543. *quadrella* Hb. — I. Budapest. VIII. Fiume.
544. *ornithopodella* Frey. — VIII. Fiume.
545. *magnificella* Tgstr. — VII. Josipdol.
546. *albifrontella* Hb. — Secundum M. Wocke et in Hungaria occurrit.
547. *cinereopunctella* Hw. — VIII. Buccari.
548. *airae* Stt. — Teste M. Wocke etiam Hungariæ incola.
549. *pullella* H.-S. — VII. Josipdol. VIII. Fiume, Buccari.
550. *parvulella* H.-S. — VIII. Fiume.
551. *nigrella* Hw. — VIII. Fiume.
552. *Bedellella* Sircom. — VI. Herkulesfürdő.
553. *pullicomella* Z. — VI. Herkulesfürdő.
554. *humilis* Z. — Sec. M. Wocke et in Hungaria occurrit.
555. *incanella* H.-S. — VIII. Fiume.
556. *griseella* Z. — I. Budapest. VII. Josipdol. VIII. Fiume.
557. *dispositella* Frey. — VI. Herkulesfürdő. VII. Josipdol. VIII. Fiume.
558. *cingillella* H.-S. — I. Budapest. VIII. Fiume.
559. *cinctella* Z. — VI. Herkulesfürdő. VII. Josipdol. VIII. Fiume; hic-illic non rara.
560. *revinctella* Z. — I. Budapest. VIII. Fiume, Martinšćica, Buccari.
561. *chrysodesmella* Z. — II. Visegrád. VIII. Fiume.
562. *gangabella* Z. — VII. Josipdol. VIII. Fiume, Tersato.
563. *zonariella* Tgstr. — VII. Josipdol. VIII. Fiume (Dragavölgy).
564. *cerusella* Hb. — VIII. Fiume (Dragavölgy).
565. *contaminatella* Z. — VIII. Fiume (Dragavölgy).
566. *pollinariella* Z. — VI. Herkulesfürdő. VII. Josipdol. VIII. Fiume; hic-illic frequens.
567. *collitella* Dup. — I. Budapest. VIII. Fiume, Martinšćica.
568. *subocellea* Stph. — I. Budapest. VI. Herkulesfürdő. VIII. Fiume; rara.
569. *disertella* H.-S. — VII. Josipdol. VIII. Fiume, Martinšćica, Dragavölgy.
570. *rudectella* Stt. — I. Budapest. VII. Josipdol. VIII. Fiume, Tersato.

571. *squamosella* H.-S. — I. Budapest. VIII. Fiume; non rara.
572. *constitella* Frey. — VII. Josipdol. VIII. Fiume; Tersato.
573. *rufocinerea* Hw. — VIII. Fiume, Tersato; frequens.
574. *anserinella* Z. — I. Budapest.
575. *disemiella* Z. — I. Budapest. VII. Josipdol.*
576. *dispilella* Z. — VII. Josipdol.
577. *triatomea* Hw. — VIII. Fiume; communis.
578. *dispunctella* Dup. — I. Budapest; rara.
579. *nitidulella* H.-S. — I. Budapest; rara.
580. *argentella* Cl. — I. Budapest (Sashegy). VII. Josipdol. VIII. Fiume; communis.
581. *pollutella* H.-S. — I. Budapest (Sashegy). VIII. Fiume; communis.
582. *subalbidella* Schlg. — VI. Herkulesfürdő. VII. Josipdol; hic-illic frequens.
583. *Hedemanni* Rbl. — I. Budapest.

Subfamilia. LITHOCOLLETINAE.

Bedellia Stt.

584. *somnulentella*. — I. Budapest.

Oenophila Stph.

585. *v-flavum* Hw. — I. Budapest.

Lithocolletis Z.

586. *roboris* Z. — VII. Josipdol. VIII. Fiume; nonnunquam frequens.
587. *hortella* F. — VII. Josipdol. VIII. Fiume.
588. *sylvella* Hw. — I. Budapest. VII. Josipdol. VIII. Fiume, Tersatto.
589. *abrasella* Z. — VII. Josipdol. VIII. Fiume.
590. *Cramerella* F. — I. Budapest. V. Kovászna. VIII. Fiume; hic-illic frequens.
591. *Haegeriella* Z. — VII. Josipdol.
592. *alniella* Z. — I. Budapest. VII. Josipdol.
593. *strigulatella* Z. — I. Budapest VIII. Fiume.
594. *ulmifoliella* Hb. — VII. Josipdol.
595. *fraxinella* Z. — I. Budapest. VIII. Fiume; frequens.
596. *pomifoliella* Z. — V. Kovászna. VII. Josipdol. VIII. Fiume, Tersato (vallis Draga), nonnunquam frequens.
597. *cerasicolella* H.-S. — I. Budapest.
598. *spinicolella* Stt. — Sec. M. Wocke etiam in Hungaria habitat.
599. *faginella* Z. — VIII. Buccari.
600. *illicifoliella* Z.—VIII. Fiume, Tersato; non rara.
601. *scitulella* Z. — VIII. Fiume, Martinšćica.
602. *quercifoliella* Z. — I. Budapest. VII. Josipdol. VIII. Fiume; frequens.
603. *messaniella* Z. — VIII. Fiume.
604. *delitella* Z. — I. Budapest. VIII. Fiume, Tersato.
605. *quinquenotella* Frey. — V. Szt-Gotthard. VII. Fužine.
606. *Froelichiella* Z. — VII. Josipdol.
607. *Kleemannella* F. — II. Sopron. VII. Josipdol. VIII. Fiume; frequens.
608 *Schreberella* F. — VIII. Fiume, Tersatto, Hrast.
609. *emberizaepennella* Bouché. — VIII. Fiume, Martinšćica.
610. *trifasciella* Hw. — VIII. Fiume; valde rara.
611. *pastorella* Z. — I. Budapest.
612. *populifoliella* Tr. — I. Budapest (Városliget). VIII. Fiume; communis.
613. *tremulae* Z. — I. Budapest, Ujpest; non rara.
614. *comparella* Z. — I. Budapest.

Tischeria Z.

615. *complanella* Hb. — I. Budapest. VII. Josipdol. VIII. Fiume; hic-illic frequens.
616. *Dodonaea* (Stt.) Heyd. — I. Budapest.
617. *marginea* Hw. — Fere in omni parte Regni occurrit
618. *gaunacella* Dup. — VI. Herkulesfürdő.
619. *angusticollella* Z. — VII. Josipdol. VIII. Fiume.

Subfamilia. LYONETINAE.

Lyonetia Hb.

620. *Clerkella* Z. — In toto regno possim occurrit.
621. *prunifoliella* Hb. — VIII. Fiume; rara.

Phyllocnistis Z.

622. *suffusella* Z. — V. Kovászna. VIII. Fiume.

Cemiostoma Z.

623. *spartifoliella* Hb. — VIII. Fiume.
624. *scitella* Z. — VIII. Fiume (vallis Draga); frequens.

Bucculatrix Z.

625. *nigricomella* Z. — VII. Fužine. VIII. Buccari, Fiume.
626. *ulmella* Z. — I. Budapest. VIII. Fiume; hic-illic frequens.
627. *crataegi* Z. — VI. Thermæ Herkulis. VII. Josipdol. VIII. Fiume, Hrast.
628. *Boyerella* Dup. — VII. Josipdol. VIII. Fiume, Buccari; hic-illic communis.
629. *frangulella* Goeze. — VIII. Fiume; fere in omnibus regionibus occurrit.

* Verhand. d. zool. bot. Ges. XVII, pag. 74.

630. *artemisiae* H.-S. (858.) — I. Budapest, Dömsöd. (In Fenniæ, Silesiæ et Hungariæ collibus.)
631. *gnaphaliella* Tr. — VII. Josipdol.
632. *thoracella* Thnbg. — VIII. Fiume; frequens.

Subfamilia. NEPTICULIDAE.

Opostega Z.

633. *salaciella* Tr. — V. Kovászna. VIII. Fiume.
634. *crepusculella* Z. — VII. Josipdol. VIII. Fiume.

Trifurcula Z.

635. *pallidella* Z. — III. Kocsócz. VII. Josipdol. VIII. Fiume; nonnunquam frequens.

Nepticula Z.

636. *subnitidella* Z. — VIII. Fiume, Martinšćica; frequens.
637. *anomalella* Goeze. — VIII. Fiume.
638. *Hübnerella* H.-S. — VIII. Fiume.
639. *argentipedella* Z. — I. Budapest. VIII. Fiume.
640. *argyropeza* Z. — I. Budapest. VIII. Buccari; nonnunquam frequens.

Fam. MICROPTERYGIDAE.

Micropteryx Hb.

1. *calthella* Z. — III. Igló. VII. Fužine, Josipdol. VIII. Fiume; hic-illic nonnunquam frequens.
2. *aruncella* Se. — I. Budapest. VII. Josipdol.
3. *myrtitella* Z. — VII. Ó-Gradiska.
4. *Paykullella* F. — VIII. Fiume.
5. *aureatella* Se. — VII. Fužine.
6. *Anderschella* H.-S. — VIII. Fiume; frequens.
7. *Thunbergella* F. — VI. Herkulesfürdő. VII. Ó-Gradiska.
8. *fastuosella* Z. — II. Sopron. VII. Josipdol. VIII. Fiume.

Fam. PTEROPHORIDAE.

Agdistis Hb.

1. *adactyla* Hb. — I. Budapest, Csepel, Dabas; non rara.

Cnaemidophorus Wallgr.

2. *rhododactylus* (S.-V.) F. — I. Budapest. II. Sopron. V. Nagyág. VIII. Fiume; frequens.

Platyptilia Hb.

3. *capnodactyla* Z. — I. Budapest. VII. Ó-Gradiska.
4. *ochrodactyla* Hb. — II. Sopron. V. Nagyág; frequens.
5. *Bertrami* Roessl. — Sec. M. Wocke etiam in Hungaria collecta.
6. *gonodactyla* Schiff. — V. Kovászna. VIII. Fiume.
7. *farfarella* Z. — I. Budapest, Csepel.
8. *Zetterstedtii* Z. — Fere in omni parte regni occurrit.
9. *tesseradactyla* Hb. — V. Nagyág.
10. *Metzneri* Z. — Teste M. Wocke et Hungariæ incola.

Amblyptilia Hb.

11. *acanthodactyla* Hb. — V. Nagyág. VIII Fiume.

Oxyptilus Z.

12. *tristis* Z. — VII. Josipdol. VIII. Fiume, Tersato.
13. *distans* Z. — VIII. Fiume, Martinšćica; frequens.
14. *pilosellae* Z. — VII. Fužine; non rara.
15. *hieracii* Z. — I. Budapest. VII. Josipdol;
16. *didactylus* L. — III. Kocsócz. VII. Josipdol, nonnunquam frequens.
17. *parvidactylus* Hw. — I. Budapest. II. Sopron. VIII. Fiume; hic-illic communis.

Mimæseoptilus Wallgr.

18. *phaeodactylus* Hb. — V. Nagyág.
19. *miantodactylus* Z. — I. Budapest. III. Kocsócz. VI. Herkulesfürdő, Buziás. VII. Ó-Gradiska.
20. *pelidnodactylus* Stein. — III. Igló. VII. Josipdol, frequens.
21. *serotinus* Z. — I. Budapest. V. Nagyág; nonnunquam frequens.
22. *zophodactylus* Dup. — I. Budapest; non rara.
23. *coprodactylus* Z. — I. Budapest. VIII. Fiume.
24. *plagiodactylus* Stt. — II. Sopron.
25. *graphodactylus* Tr. — V. Nagyág.
26. *pterodactylus* L. — I. Budapest. II. Sopron. III. Kocsócz, Igló, Lucsivna. V. Nagyág. VII. Josipdol. VIII. Fiume.
27. *stigmatodactylus* Z. — III. Kocsócz. VIII. Fiume; frequens.

Oedematophorus Wallgr.

28. *lithodactylus* Tr. — I. Budapest. V. Nagyág; nonnunquam frequens.

Pterophorus Wallgr.

29. *monodactylus* L. — I. Budapest. III. Igló; communis.

Leioptilus Wallgr.

30. *scarodactylus* Hb. — VI. Herkulesfürdő.
31. *Lienigianus* Z. — I. Budapest.
32. *tephradactylus* Hb. — Fere in omni parte regni occurrit.

33. *carphodactylus* Hb. — I. Budapest. VII. Josipdol. VIII. Fiume.
34. *microdactylus* Hb. — V. Nagyág. VIII. Fiume.
35. *brachydactylus* Tr. — I. Budapest. V. Nagyág. VIII. Fiume.

Aciptilia Hb.

36. *galactodactyla* Hb. — I. Budapest, Csepel, Isaszegh. V. Nagyág; frequens.
37. *xanthodactyla* Tr. — I. Budapest. VII. Josipdol. VIII. Fiume.
38. *xerodactyla* Z. — In Austriæ et Hungariæ collibus.
39. *tetradactyla* L. — I. Budapest, Isaszegh. II. Sopron. V. Nagyág. VII. Josipdol, Velebit; frequens.
40. *ischnodactyla* Tr. — I. Budapest.
41. *pentadactyla* L. — Fere in cunctis regionibus occurrit.
42. *baptodactyla* Z. — VIII. Fiume.

Fam. ALUCITIDAE.

Alucita Z.

1. *dodecadactyla* Hb. — I. Budapest. V. Szt-Gotthard.
2. *grammodactyla* Hb. — Sec. M. Wocke etiam Hungariæ incola.
3. *desmodactyla* Z. — VII. Josipdol.
4. *hexadactyla* L. — V. Nagyág. VII. Josipdol. VIII. Fiume; frequens.
5. *Hübneri* Wallgr. — VIII. Fiume, Martinšćica; fere in omnibus regionibus occurrit.

Conspectus familiarum, generum et specierum.

MACROLEPIDOPTERA.

Rhopalocera.

Familia	Genus	Species
1. Papilionidæ	3	5
2. Pieridæ	6	16
3. Lycænidæ	3	44
4. Erycinidæ	1	1
5. Libytheidæ	1	1
6. Apaturidæ	1	2
7. Nymphalidæ	5	43
8. Satyridæ	6	48
9. Hesperidæ	6	20

Heterocera.

10. Sphingidæ	6	20
11. Sesiidæ	5	32
12. Thyrididæ	1	1
13. Zygænidæ	2	25
14. Syntomidæ	2	3
15. Nyctetidæ	4	6
16. Lithosiidæ	7	31
17. Arctiidæ	9	25
18. Hepialidæ	1	6
19. Cossidæ	5	7
20. Cochliopodæ	1	2
21. Psychidæ	4	24
22. Liparidæ	9	16
23. Bombycidæ	3	21
24. Endromidæ	1	1
25. Saturniidæ	2	5
26. Drepanidæ	2	7
27. Notodontidæ	13	37
28. Cymatophoridæ	4	10
29. Noctuidæ	121	506
30. Brephidæ	1	3
31. Geometridæ	82	413
	327	1382

MICROLEPIDOPTERA.

1. Pyralidæ	67	250
2. Tortricidæ	27	301
3. Tineidæ	129	640
4. Micropterygidæ	1	8
5. Pterophoridæ	10	42
6. Alucitidæ	1	5
	235	1246

Summa

Familiarum	37
Generum	562
Specierum	2628

INDEX GENERUM.

Ordo. DIPTERA.

Auctore JOANNE THALHAMMER.

(Familia *Cecidomyidarum* a V. SZÉPLIGETI ; familia *Pulicidarum* a R. KOHAUT.)

Magyarország légyfaunája a hazai és külföldi irodalomban még mindig eléggé ismeretlen, mert Magyarországon, KOWARZ FERDINAND-ot kivéve, a legújabb időkig specialis művelőjök nem volt.

Egyes adatokat azonban már a mult század végén találunk hazánkból följegyezve. Így SCOPOLI leírja a *Bombylius minimus*-t Körmöczbánya vidékéről, SCHÖNBAUER a kártékony *Simulia columbatzensis*-t, KOY TOBIÁS pedig gyüjteményének betűrendes jegyzékében 95 fajt említ föl Budapest környékéről ; egyes elszórt adatokat még másutt is találunk.

FABRICIUS, SCHRANK és GMELIN ismeri a *Simulia columbatzensis*-t. MEIGEN jeles művében tizenhárom fajt sorol föl Magyarországból, de a pótló füzetekben kettőt visszavon, mint a melyek hazája Észak-Amerika, úgy hogy csak 11 faj marad meg, nevezetesen : *Simulia columbatzensis* SCHÖNB., *Pangonia maculata* F., *Tabanus ater* MG., *Lomatia Belzebul* F., *Bombylius ater* SCOP., *Dasypogon tristis* MG., *Dasypogon elongatus* MG., *Asilus maculatus* F., *Asilus pictus* MG., *Clitellaria villosa* F., *Platystoma umbrarum* F. Megjegyzi azonban LOEW, hogy az *Asilus pictus* MG. valószinűleg csak tévedésből került ebbe az enumeratióba. (Nachträge zu der ... Beschreibung d. europ. Asiliden p. 412.)

FRIVALDSZKY JÁNOS, 1851-ben a nemzeti muzeumhoz jutva, az összes rovarrendeket s igy a Dipterákat is gyüjtötte s azokat a nemzeti muzeumnak ajándékozván, alapját vetette meg a nemzeti muzeum ilynemű gyüjteményének, a melyekhez járultak később ama példányok, melyeket FRIVALDSZKY IMRE gyüjtői Kis-Ázsiából és Bulgáriából küldöttek volt s melyek FRIVALDSZKY IMRE gyüjteményeivel együtt vétel útján a nemzet tulajdonába kerültek.

Fauna Hungariæ Dipterorum ad hæc usque tempora tum apud patrios tum apud exteros auctores satis incognita permansit, quia, si FERDINANDUM KOWARZ excipias, vix fuit, qui hanc disciplinam profiteretur.

Verum quidem est jam sæculo præterito ad finem vergente et primis hujus sæculi annis pauca quædam indicia ad faunam patriam pertinentia inveniri. Sic SCOPOLI descripsit *Bombylium minimum* ex regione Körmöcziensi, SCHÖNBAUER famosam *Simuliam columbatzensem*, TOBIAS denique KOY in indice collectionis suæ, quam dicimus, alphabetico 95 species commemorat ex pomœrio budapestinensi ; alia quædam indicia sparsim apud alios inveniuntur.

FABRICIUS, SCHRANK et GMELIN *Simuliam columbatzensem* comminiscuntur. MEIGEN in celebri opere, quod de dipteris europæis composuit, tredecim species dipterorum enumerat Hungariæ incolas ; in supplemento vero duas earum delendas censet, utpote quæ Americam septentrionalem incolant, ita ut undecim tantum species hungaricæ maneant, scilicet : *Simulia columbatzensis* SCHÖNB., *Pangonia maculata* F., *Tabanus ater* MG., *Lomatia Belzebul* F., *Bombylius ater* SCOP., *Dasypogon tristis* MG., *Dasypogon elongatus* MG., *Asilus maculatus* F., *Asilus pictus* MEG., *Clitellaria villosa* F., *Platystoma umbrarum* F. Verumtamen, ut jam HERMANNUS LOEW in supplemento descriptioni Asilidarum Europæ adjecto notavit, non sine veritatis specie quis affirmaverit, *Asilum pictum* nonnisi per errorem in his locum habere potuisse.

IOANNES FRIVALDSZKY, cum anno 1851. ad res musæi nat. hung. tractandas accederet, omnium ordinum insecta colligebat, ideoque etiam dipteris dabat operam. Quæ musæo nationali donando initium fecit thesaurorum musæi dipterologicorum. His adde exemplaria ab iis, qui pro EMERICO FRIVALDSZKY in Bulgaria et Asia minora insecta collegerant,

Frivaldszky János főleg Budapest környékén, de Marmaros, Temes és Krassó-Szörény megyében is kutatott. A talált dipterák jegyzékét közölte is a Magyar tudom. akadémia Math. és természettudom. közleményeiben, valamint a Magyar orvosok és természetvizsgálók nagygyüléseinek munkálataiban. Két uj dipterát irt le, a *Nemotelus signatus*-t és a *Dioctria Kowarzi*-t.

Debreczen és környékének dipteráiból Török József közölt 85 fajt.

Mocsáry Sándor jeles hymenopterologusunk is sokat tett a magyar légyfauna ismertetése czéljából. Kutatott Zemplén, Ung, Bihar, Hajdu, Zólyom és Liptó megyében. Adatait a Magyar tud. Akadémia mathematikai és természettudományi közleményeiben publikálta.

Madarassy László a 70-es évek végén és a 80-as évek elején behatóan foglalkozott Magyarország legyeivel, le is írt nehány új fajt. Kár, hogy a Therevidák terjedelmes monographiáját, melynek kézirata a magyar nemzeti Muzeum állattári szakkönyvtárában van, be nem fejezhette. Tekintélyes gyüjteménye azért is igen érdekes, mert állatait nagy részben Kowarz határozta meg, kivel cserében összeköttetésben és élénk levelezésben állott.

A korán elhunyt Tömösvári Ödön leírta a *Thalassomyia congregata*-t az alsó Dunáról.

A Szt-Benedekrendi soproni katholikus főgymnasium egyik tanára 1878-ban névtelenül közölte Sopron vidékének és a Fertő-tó környékének légyfaunáját nagy szorgalommal szerkesztett és elég bő katalogusban.

Geyer Gyula rozsnyói tanár is foglalkozott dipterákkal. Phænologiai észleleteit közzétette a Magyar orvosok és természetvizsgálók nagygyüléseinek munkálataiban. Ugyanő szolgáltatta a rozsnyói adatokat, melyek Fritsch Károly «Jährliche Periode» czímű művében találhatók.

Trencsén környékén gyüjtött dr. Brancsik Károly megyei főorvos, a Szitnya hegyen pedig Petricskó Jenő beszterczebányai tanár, Erdélyben Bálint Sándor, a ki gyüjtésének eredményét közölte is. Hasonlóképen gyüjtött Czekelius dr. és Kimakovicz Mór, de gyüjteseik eredményét csak legujabb időben ismertették.

Van ugyan még néhány kisebb közlemény, mely transmissa, quæ cum reliquis ipsius thesauris entomologicis emptione in jus potestatemque rei publicæ venerunt.

Ad regiones quod attinet, Joannes Frivaldszky perlustravit præcipue regionem Budapestinensem, non tamen ita, ut non etiam in alias excurreret. Data opera insecta collegit in comitatibus Marmaros, Temes et Krassó-Szörény. Dipterorum, quæ invenit indicem publici juris fecit in fasciculis ab Academia hungarica editis: «Mathemat. és természettudományi közlemények» sicut etiam in actis conventus medicorum et rerum naturæ investigatorum. Dipterorum novas species descripsit duas: *Nemotelum signatum* et *Dioctriam Kowarzi*.

Dr. Josephus Török faunam debreczeniensem recensens dipterorum 85 species enumeravit.

Alexander Mocsáry, nomen inter Hymenopterologos celebre, multum contulit ad dipterologiam hungaricam illustrandam. Perlustravit Comitatus Zemplén, Ung, Bihar, Hajdu et Zólyom. Quæ collegerat, typis evulgavit in fasciculis Academiæ supra memoratis. Circa annum 1880. Ladislaus Madarassy accuratius tractavit diptera hungarica, descripsit etiam aliquot novas species, attamen monographiam Therevidarum, quam inceperat, cujusque autographum in bibliotheca zoologica Musæi Nationalis visitur, absolvere non potuit. Satis ampla collectio, quam dicimus, eo præcipue nomine consideratione digna est, quia dipterorum magnam partem Ferdinandus Kowarz suis nominibus insignivit, quocum dipterorum et literarum commercio conjunctus erat.

Edmundus Tömösváry, quem præmatura mors e vivis eripuit, descripsit novam Chironomidarum speciem regionem inferioris Danubii incolentem. Anonymus quidam professor gymnasii Soproniensis Ord. Sti. Benedicti anno 1878. indicem texuit dipterorum in finibus Soproniensibus et ad lacum Fertő collectorum.

Julius Geyer, professor rosnaviensis ex parte saltem dipteris operam dedit. Observationes phænologicas in Actis medicorum et rerum naturæ investigatorum publici juris fecit. Quæ in opere Dr. Caroli Fritsch «Jährliche Insectenperiode» de fauna rosnaviensi inveniuntur, magna ex parte, ab ipso subministrata sunt.

Dr. Carolus Brancsik Trencsinii diptera collegit Eugenius Petricskó, professor neosoliensis in monte Szitnya, Alexander Bálint in terra Siculorum. Quæ legerat, typis vulgavit. Pariter in Transsylvania collegerunt diptera Dr. Czekelius et Mauritius de Kimakovicz, quæ nuperrime publici juris facta sunt.

Habentur ecquidem nonnullæ aliæ pagellæ,

Dipterákra vonatkozik, de alig foglalnak magukban mást, mint a legközönségesebb fajokat.

Kowarz Nándor igen sok dipterát gyüjtött Magyarországban és pedig Losonczon és Mehádia környékén. A losonczi közül csak a Dolichopodidákat tette közzé a «Verhandlungen der K. K. zool. botan. Gesellschaft in Wien» című kiadványokban 1869-ben. A mehádiaiakat ugyanott közölte 1873-ban. Azon kivül tőle birunk egy enumeratiót, mely azokat a kétszárnyúakat foglalja magában, melyeket dr. Chyzer Kornél Zemplén megyében gyüjtött. Ezen enumeratio 754 fajt tartalmaz, melyek 100 génuszban oszlanak meg. Dr. Chyzer Kornél ugyanis fáradtságot nem ismerő szorgalommal kutatta Zemplénmegye faunáját, de a szomszéd Abauj és Sáros megyére is kiterjesztette figyelmét. Kár, hogy az enumeratióban az utóbbi megyékben, főleg a ránki és bártfai dipterák nincsenek fölvéve.

Igen tekintélyes gyüjteményt hozott össze Biró Lajos, mely jelenleg a Nemzeti Muzeum tulajdona. E gyüjtemény annál érdekesebb, mert a benne levő dipterák Magyarországnak igen különböző vidékeiről valók. Végre Pável János muzeumi gyüjtő is sok érdekes fajt szerzett Magyarországból, melyek szintén a Muzeum gyüjteményében vannak.

Legujabb időben dr. Kertész Kálmán muzeumi segédőr kiváló szorgalommal foglalkozik a magyar dipterologiával.

Itt vissza kell térnem Kowarz-hoz, kinek számos közleményében igen sok magyar dipterafajra akadunk s kiről joggal mondhatni, hogy a magyar dipterafauna ismertetésének szorgalmas előmozdítója volt. Igen sok uj állatot, melyet többnyire Kowarz fedezett föl Magyarországon, irt le dr. Loew Hermann.

A magyar dipterologia terén igen szép működést fejtett ki Strobl Gábor, admonti benczés tanár, kinek müveiben, főleg pedig «Dipteren Steiermarks» című dolgozatának 1. és 2. füzetében számos magyar eredetű dipteron fordul elő. Többi közleményeiben is nem ritkán találkozunk uj magyar fajok leirásával. Különös említést érdemel «Beiträge zur Dipterenfauna des oesterr. Litorale» és «Siebenbürgische Zweiflügler» című dolgozata. Az előbbi, mely a «Wiener entomologische Zeitung»-ban jelent meg, a magyar tengermellék légyfaunájára vonatkozó becses adatokat foglal magában. Az utóbbi Erdély, illetőleg a Cibinhegység dipteráiból 27 családquæ ad diptera pertinent enumeranda, quæ tamen præter species ubique divulgatas vix quidquam certi continent.

Dominus Ferdinandus Kowarz plurima in Hungaria collegit diptera in agro Losonczensi et apud Mehadiam et thermas Herculis. Losonczensia ex parte tantum enumeravit in actis Societatis zoologico-batanicæ Viennensis nonnisi Dolichopodidas complexus; mehadiensium index copiosior, utpote qui continet plus quam septingentas species, inter quas plurimæ novæ inveniuntur. Prodiit in lucem in iisdem actis anno 1873.

Idem auctor enumeravit diptera, quæ in thesauris Dris Cornelii Chyzer habentur, ex comitatu Zempléniensi orta. Elenchus iste septingentas quinquaginta quatuor species continet inter centum genera divisas. Dr. quippe Cornelius Chyzer diligentia eximia et studio nunquam languenti operam dedit faunæ comitatus Zempléniensis explorandæ imo etiam ad proximos abaujensem et sárosiensem studia sua et investigationes extendit. Dolendum certe in elencho supra memorato desiderari horum comitatuum diptera, quæ præcipue ex Ránk et Bártfa memoratu dignissima in thesauris iisdem habentur.

Amplam satis collectionem paravit Ludovicus Biró quæ nunc Musæi Nationalis est eaque eo præcipue nomine commemorari digna, quia diptera quibus constat, ex omnibus patriæ regionibus sunt collecta.

Joannes Pavel, in Musæo Nationali colligendis insectis destinatus eidem musæo multa intulit diptera.

Novissime Dr. Colomannus Kertész, custodi musæi adjunctus, magno studio hanc disciplinam profiteri cœpit.

Redeundum mihi hic est ad Kowarzium, cujus in elucubrationibus diptera hungarica plurima occurrunt, cuique jure in illustranda dipterologia hungarica maximas partes deferendas esse nemo negaverit.

Utilissimam paritur operam in explicanda fauna Hungariæ dipterologica posuit P. Gabriel Strobl, O. S. B. Abbatiæ Admontensis. In opere cui titulum fecit «Dipteren Steiermarks», tomo primo et secundo, diptera sat multa hungaricæ originis commemorat. In aliis ejusdem auctoris elucubrationibus non raro novarum specierum, quæ ad faunam patriam pertinent, descriptiones invenias. Præceteris commemoranda sunt: «Beiträge zur Dipterenfauna des œsterr. Litorale» et «Siebenbürgische Zweiflügler». Prior, quæ in pagellis «Wiener entomol. Zeitung» typis excusa est, abundat indiciis ad faunam regionis adriaticæ pertinentibus; posterior faunam Transsylvaniæ, præcipue vero montium Cibiniensium illustrat, enumeratis fere octingentis speciebus in ducenta nonaginta novem genera et

dot, összesen 299 génusszal, 799 fajjal és 58 fajváltozattal sorol föl. Két új faj *Dynatosoma inaequale* és *Sphegina Kimakoviczi*, leirásán kivül számos kritikai és synonymikai adatokkal bővelkedik.

Végül nem szabad említés nélkül hagyni dr. Schiner Rudolf-nak 1864—66-ig megjelent «Fauna austriaca, Diptera» czímű művét, melyben számos Magyarország légyfaunájára vonatkozó adat fordul elő.

A mi saját gyüjtésemet illeti, behatóbban kutattam ki Kalocsa környékét. Gyüjtő területem határai éjszak felé Duna-Pataj és Akasztó, keletre Vadkert, délfelé Nádudvar, nyugatfelé a Duna. Ezen entomologiai tekintetben igen szerencsés terület legérdekesebb része a kelet és délkelet felé terjedő, szikes foltokkal és mocsarakkal tarkázott homokbuczkás sikság, a melyen az *Apolysis eremophila* Lw. turkesztáni, és *Melanostolus nigrocilius* Lw. fajt gyüjtöttem. Ugyanott él az *Eutropha Thalhammeri* Strobl magyarországi faj.

A szomszéd Tolna vármegyében gyüjtöttem Dunaföldvárott, Pakson, Szegzárdon és Szálkán. Az utóbbi helyen birtokomba került *Sapromyza helvola* Beck., mely Becker tanusága szerint csak Oroszországból ismeretes. Hozzá tehetem, hogy az állatot Karinthiából is birom, hol a Lavant egyik mellékvölgyében gyüjtöttem. Baranyamegyében keveset gyüjtöttem Mohácson és Német-Bolyon, Zalamegyében Nagy-Kapornakon, Pozsony megyében Pozsonyban és Felső-Dióson, Veszprémmegyében Somlyó-Vásárhelyen, és Sümegen, Liptómegyében Rózsahegyen; azonkivül Eszéken is.

A mi Dunaföldvár dipterafaunáját illeti, nagy segítségemre volt kedves tanítványom, Berky József, ki nagy szorgalommal gyüjtötte szülővárosának dipteráit s készséggel rendelkezésemre bocsátotta.

Saját, körülbelül 3000 fajt tartalmazó gyüjteményemen kivül használtam Madarassy László és Biró Lajos gyüjteményét, valamint a Nemzeti Muzeum gazdag gyüjteménykatalogusát is. Madarassy gyüjteménye Kecskemét és vidékének faunáját tárja fel előttünk, Biró gyüjteményének főképpen érdekes azon része, mely Horvátországra és Fiuméra vonatkozik. Az ő fáradozása következtében tudtam fölvenni Pungur Gyula tanár Szilágymegyére vonatkozó adatait is. Trencsén megye faunájának ismeretét nagyrészben dr. Brancsik Károly szivességének köszönöm, ki összes dipteráit nekem adta ajándékul.

viginti septem familias divisis. Describuntur duæ species novæ, *Dynatosoma inaequale* et *Sphegina Kimakoviczi*, accedunt notæ criticæ et synonymicæ non infrequentes.

Denique silentio prætereundus non est Rudolphus Schiner, qui in opere «Fauna austriaca, Diptera» sat multa indicia accumulavit ad faunam Hungariæ pertinentia.

Quod ad proprias collectiones attinet, accuratius perscrutatus sum regionem Kalocsaensem, quatenus ad occasum Danubio, ad septentrionem agro Duna-Patajensi, ad orientem Vadkertensi, ad meridiem vero Nádudvariensi agro circumscribitur. Regio plane abundantissima, quod ad thesauros entomologicos attinet; consideratione quam maxima digna est ea pars, quæ inter pagos Akasztó, Vadkert, Keczel et Hajós ad austrum protenditur sabulosa, locis palustribus lacubusque salsuginosis distincta. Præter alias species eximias *Apolysis eremophila* Lw. (det. Becker) species turkestanica, *Melanostolus nigrocilius* Lw. (det. Strobl) species caucasica, et *Eutropha Thalhammeri* Strobl species hungarica ibidem occurrunt.

In proximo comitatu Tolnensi insecta legi apud Dunaföldvár, Paks, Szegzárd et Szálka, ubi inveni *Sapromyzam helvolam* Beck., quæ teste Beckero præterea tantummodo ex Russia nota est. Addendum tamen, eandem etiam in Carinthia inveniri, ubi eam in remoto vallis Lavantinæ angulo apud arcem Thürn inveni. In comitatu Baranya collegi diptera apud Német-Boly et Mohács, in comitatu Zala apud Nagy-Kapornak, in comitatu Pozsony apud urbem Pozsony et Felső-Diós, in comitatu Veszprémiensi apud Somló-Vásárhely, in Liptoviensi apud Rózsahegy, denique apud Eszék.

Ad faunam Dunaföldvariensem quod attinet, magno mihi auxilio fuit carissimus discipulus Josephus Berky, qui diptera agri patrii summa cum diligentia colligens mihi libentissime in usum tradidit.

Præter collectionem gymnasii Kalocsaensis fere ter mille species complectentem in hoc catalogo conscribendo usus sum collectione quondam Ladislai Madarassy et Ludovici Biró atque catalogo sat amplo Musæi Nationalis. Collectio Madarassyana faunam Kecskemétiensem exhibet, Biroiana præprimis in iis eximia est, quæ ad Croatiam et regionem adriaticam pertinent. Opera Ludovici Biró etiam iis uti potui, quæ Julius Pungur de fauna dipterologica comitatus Szilágyiensis annotavit. Faunam trencséniensem videre licuit saltem ex parte opera Dr. Caroli Brancsik, qui eximia comitate diptera a se collecta mihi dono dedit.

Hálás köszönettel kell megemlítenem azon dipterologusok nevét, kik törekvéseimben segítségemre voltak. Ezek: Handlirsch Ádám, dr. Brauer Frigyes, P. Stein, Kowarz Ferdinánd, Strobl Gábor és Becker Tivadar, Girschner Ernő. De nem szabad említés nélkül hagynom dr. Kertész Kálmán urat sem, ki a Nemzeti Muzeum kincseinek átkutatásában kiváló szivességgel segédkezett és a felfedezte *Himantostoma hungarica* Thalh., uj dipteront nekem átengedte. Fogadja érte e helyen is hálás köszönetem kifejezését.

Grati animi causa illorum virorum commemorare nomina, qui conatus meos adjuvarunt, offici mei duxi, ut Adamum Handlirsch, Ferdinandum Kowarz, P. Stein, Ernestum Girschner, Fridericum Brauer, Gabrielem Strobl, Theodorum Becker. Nec tacendus est Dr. Colomannus Kertész, qui pro ea, qua pollet, benignitate in explorandis thesauris Musæi Nationalis hungarici mihi auxilio fuit et ab ipso inventam speciem, nomine *Himantostoma hungaricum* literaturæ insertam mihi concessit. Cui etiam hoc loco gratias agendas esse duxi.

LITTERATURA.

1. *Adatok* Sopron légyfaunájához. (A pannonhalmi szent-Benedekrend soproni kath. főgymnasiuma értesítője az 1897/98. tanévben.)
2. Bálint Sándor. Jelentés az 1888. év nyarán a Székelyföldön tett rovartani kirándulás eredményéről. (Orvos. természettud. ért. 14. évf. 1889.).
3. Becker Theodor. Revison der Gattung Chilosia Mg. (Nova Acta d. Kais. Leop.-Carol. Deutschen Akad. d. Naturforscher. Halle 1894.)
4. — Dipterologische Studien.
   I. Scatomyzidæ 1894.
   II. Sapromyzidæ 1895.
   III. Lonchæidæ 1895.
   IV. Ephydridæ 1896.
   V. Pipunculidæ 1897. (Berliner entomologische Zeitschrift.)
5. Bezzi Mario. Eine neue europäische Stratiomyia-Art mit zum Theil roth gefärben Fühlern. (Wiener ent. Zeitung 1896.)
6. Biró Lajos. A Keleti Kárpátok vidékének jellemző rovarai. (A Magyarországi Kárpát-egyesület évkönyvei. 12. évf. 1885.)
7. Brauer F. et v. Bergenstamm. Die Zweiflügler des Kais. Museums zu Wien. (Denkschriften d. Kais. Akademie d. Wissenschaften in Wien 1880—1896.)
8. — Vorarbeiten zu einer Monographie der Muscaria schizometopa (excl. Anthomyidæ.). (Verhandlungen d. kk. zool.-bot. Gesellschaft in Wien 1893.).
9. Bunyitay Vincze. Nagyvárad természetrajza. Budapest 1890.
10. Csernv Béla. Gyulafehérvár környékének faunája. (Az alsó-fehérmegyei tört., régészeti és természettudományi egylet évkönyvei. I.—IV. 1888/9.)
11. Egger dr. Joh. Neue Zweiflügler d. oesterr. Fauna nebst anderen dipter. Beobachtungen. (Verhandlungen d. kk. zool.-bot. Gesellschaft in Wien 1854.)
12. Friedenfels E. Weitere Beobachtungen über Artemia salina u. die Salzburger Soolenteiche. (Verhandlungen und Mittheilungen d. siebenbürgischen Vereins f. Naturwissenschaften in Hermannstadt, 35. Jahrg. 1885.)
13. Fritsch Karl. Jährliche Periode der Insectenfauna von Österreich-Ungarn. I. Diptera. (Denkschriften d. kais. Akademie d. Wissenschaften in Wien. 34. B. I. Abth.)
14. Frivaldszky János. Adatok a magyarországi kétröpűek (Diptera) faunájához. A rablólegyek (Asilidæ). (A magy. orvosok és természetvizsgálók 13. nagygyülésének munkálatai 1870.)
15. — Állattani kirándulásaim Orsova, Mehádia és Korniareva vidékein. (A magyar orvosok és természetvizsgálók 16. nagygyülésének munkálatai 1873.)
16. — Adatok Marmaros vármegye faunájához. (A magyar tudományos Akadémia mathem. és természettudom. közleményei. 9. kötet. 1875.) Cum notis manuscriptis auctoris.
17. Frivaldszky János. Adatok Temes- és Krassó megyék faunájához. (A magyar tudományos akadémia mathem. és természettudományi közleményei. 13. kötet 1876.)
18. Fuss Károly. Notizen und Beiträge zur Insectenfauna Siebenbürgens. (Verhandlungen und Mittheilungen des siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften in Hermanstadt. 1874.)
19. Geyer Gyula. Adatok Rozsnyó vidékének faunájához phænologiai észleletekkel. (A magyar orvosok és természetvizsgálók 13. nagygyülésének munkálatai 1869.)
20. Herman Ottó. A mezőség. II. A mező-záh-tóháti, továbbá méhesi, báldi és mező-sályi tósorozat természetrajzi, jelesen állattani szempontból tárgyalva. (Erdélyi muzeumegylet évkönyvei 1871—73.)
21. — Állattani közlemények. (Erdélyi muzeumegylet közleményei. V. 1867.)
22. «*Honismertető*» czimű munka a bécsi 1873. közkiállitás magyar Catalogusának bevezető részében Frivaldszky János felsorolja Magyarország faunáját jellemző fajokat, kártékony és hasznos állatokat.
23. Horváth Géza. Jelentés az 1883. évben Magyarország területén fellépett kártékony rovarokról. Budapest 1884.
24. Jaennicke F. Beiträge zur Kenntniss der Tabaniden Europa's. (Berliner entom. Zeitschrift 1866.)
25. Kardos Károly. Marmaros vármegye egyetemes leirása Budapest 1876.
26. Kertész Kálmán dr. Über die Dipterengattung Pelecocera Mg. (Wiener entom. Zeitung. 1897.)
27. — Diplocentra anus Mg. (Természetrajzi füzetek 1898).
28. — Asphondylia Rübsaameni n. sp. (Természetrajzi füzetek 1898.)
29. Kowarz Ferdinand. Die Dipterengattung Lasiops Mg. ap. Rndl. (Mittheilungen des Münchener entom. Vereins 1880.)
30. — Notizen zu den europäischen Arten der Gattung Gonia Mg. (Wiener entom. Zeitung 1888.)
31. — Die europäischen Arten der Dipterengattung Sympycnus Lw. (Wiener entom. Zeitung 1889.)
32. — Adatok Zemplénmegyének természetrajzi ismeretéhez. (Dr. Chyzer Kornél gyüjteménye.)
33. — Die europäischen Arten der Gattung Lispe Latr. (Wiener entom Zeitung 1892.)
34. — Die europäischen Arten der Dipterengattung Eustalomyia m. (Wiener ent. Zeitung 1891.)
35. — Beitrag zur Dipterenfauna Ungarns. Verzeichniss der in der Umgebung von Losoncz gesammelten Dipteren. Dolichopoden. (Verhandlungen der kk. zool.-bot. Gesellschaft in Wien 1869.)
36. — Beitrag zur Dipterenfauna Ungarns. Verzeichniss der in der Umgebung von Herkulesbad und Orsova gesammelten Dipteren. (Verhandlungen der kk. zool.-bot. Gesellschaft in Wien 1873.)

37. Kowarz Ferdinand. Die Dipterengattung Argyra Macq. und Leucostola Löw. (Verhandlungen der kk. zool.-bot. Gesellschaft in Wien. 1878.)
38. — Die Dipterengattung Argyra. (Verhandlungen der kk. zool.-botan. Gesellschaft in Wien. 1879.)
39. — Dipterologische Notizen. (Verhandlungen der kk. zool.-botan. Gesellschaft in Wien. 1868.)
40. — Die Dipterengattung Medeterus Fisch. (Verhandlungen der kk. zool.-botan. Gesellschaft in Wien 1877.)
41. — Die Dipterengattung Chrysotus. (Verhandlungen der kk. zool.-botan. Gesellschaft in Wien 1874.)
42. — Die Coenosien mit unverkürzter sechster Längsader. (Winer entom. Zeitung 1893.)
43. — Beschreibung sechs neuer Dipterenarten. (Verhandlungen der kk. zool.-botan. Gesellschaft in Wien 1867.)
44. — Calliophrys, novum genus Cœnosiarum. (Wiener entom. Zeitung 1893.)
45. Koy Tobias. Alphabetisches Verzeichniss meiner Insectensammlung. Ofen 1800.
46. Loew Hermann. Die deutschen Arten der Gattung Azelia R.-D.
47. Loew Hermann. Über die europäischen Arten der Gattung Idia. (Stettiner ent. Zeitung 1844.)
48. — Zur Kenntniss der Ocyptera-Arten. (Stettiner ent. Zeitung 1844.)
49. — Noch einige Bemerkungen über die Gattung Ocyptera. (Stettiner ent. Zeitung. 1845.)
50. — Eine neue europäische Art der Gattung Metopia. (Stettiner entom. Zeitung 1848.)
51. — Kritische Untersuchungen der europäischen Arten des Genus Trypeta Mg. (Germars Zeitschrift f. Entomologie V. 1844.). Loew Hermann. Nachträge. (Stett. entom. Zeitung 1845.)
52. — Über die europäischen Raubfliegen (Diptera asilica). (Linnæa entomologica. II., III., IV.)
53. — Beschreibung europäischer Dipteren I., II., III. Halle 1869—73.
54. — Diptera nova in Pannonia inferiore et in confinibus Daciæ regionibus a Ferdinando Kowartzio capta. (Berliner ent. Zeitschrift 1873.)
55. — Dipterologische Mittheilungen. (Wiener entom. Monatschrift 1857.)
56. — Die europäischen Arten der Gattung Stenopogon. (Wiener ent. Monatschrift 1861.).
57. — Zehn neue Dipteren. (Wiener entomol. Monatschrift 1858.).
58. — Über die bisher in Schlesien aufgefundenen Arten der Gattung Chlorops Macq.
59. Madarassy László. Uj légyfajok. Diptera nova ex Hungaria. (Természetrajzi füzetek 1881.)
60. Margó Tivadar. Budapest és környéke, természetrajzi, orvosi és közművelődési leirása. Budapest 1879. In prima operis parte aves et insecta enumeravit Joannes Frivaldszky.
61. Mik Joseph. Dipterologische Beiträge zur «Fauna austriaca». (Verhandlungen der kk. zool.-botan. Gesellschaft in Wien 1867.)
62. — Beschreibungen neuer Dipteren. (Verhandlungen der kk. zool.-botan. Gesellschaft in Wien 1881.).
63. — Dipterologische Miscellen. (Wiener entom. Zeitung 1886, 1887, 1894, 1895.)
64. — Die Dipterengattung Pœcilobothrus Mik. (Wiener ent. Zeitung 1883.)
65. Über die Dipterengattung Pachystylum Macq. (Wiener entom. Zeitung 1891.)
66. — Bemerkungen zu den Dipterengattungen Pelecocera Mg. und Rhopalomera Wied. (Wiener entom. Zeitung 1895.)
67. — Einige dipterologische Bemerkungen. (Verhandlungen der kk. zool.-botan. Gesellschaft in Wien 1885.)
68. Mocsáry Sándor. Adatok Zemplén és Ung megyék faunájához. (A magy. tudom. Akadémia mathem. és természettudományi közleményei. 1877.)
69. Mocsári Sándor. Adatok Biharmegye faunájához. (A magy. tudom. Akadémia mathem. és természettud. közleményei 1875.)
70. — Bihar és Hajdu megyék hártya-, két-, reczés-, egyenes- és félröpüi. (A magyar tudom. Akadémia mathem. és természettudom. közleményei. 1877.)
71. — Adatok Zólyom és Liptó megyék faunájához. (A magyar tudom. Akadémia mathem. és természettud. közleményei 1878.)
72. Munk Manó. Herkulesfürdő és környéke 1872. Animalia in confinibus thermarum Herculis inventa recensuit Joannes Frivaldszky.
73. Nowicki Max dr. Beschreibung neuer Dipteren. (Verhandlungen der kk. zool.-botan. Gesellschaft in Wien 1867.)
74. — Beschreibung neuer Dipteren. Brünn 1868.
75. Petrogalli Arthur. Kirándulás Trencsén közvetlen környékére. (Trencsénmegyei természettudom. egyesület évkönyve. 1890.)
76. Pokorny Emmanuel. Eine neue Drosophila. (Mittheilungen des naturw. Vereins in Troppau 1896.)
77. Schnabl Joseph. Contributions à la faune diptérologique. (Horæ societ. entomol. rossicæ 1887.)
78. — Contributions à la faune dipterologique. (Horæ societ. entom. rossicæ 1888.)
79. Schiner Rudolf dr. Diptera austriaca I. II. (Verhandlungen der kk. zool.-botan. Gesellschaft in Wien. 1854. 1855.)
80. — Fauna austriaca. Diptera. I. II. Th. 1862—66.
81. Schönbauer J. Geschichte der schädlichen Kolumbatzer-Mücken im Banat als ein Beitrag zur Naturgeschichte von Ungarn. Wien 1795.
82. Scopoli J. A. Annus quintus historico-naturalis. Observationes zoologicæ. Lipsiæ 1792.
83. Strobl P. Gabriel, O. S. B. Dipteren von Steiermark I. Th. (Mittheilungen des naturwissenschaftlichen Vereins für Steiermark. 1892.)
84. — Beiträge zur Dipterenfauna des oesterr. Litorale. (Wiener entom. Zeitung 1893.)
85. — Interessante oesterr. Dolichopoden. (Wiener entom. Zeitung 1892.)
86. — Zur Kenntniss und Verbreitung der Phoriden Oesterreichs. (Wiener entom. Zeitung 1892.)
87. — Hilara longicornis n. sp. (Wiener entom. Zeitung 1894.)
88. — Neue œsterr. Muscidæ acalypteræ. (Wiener entom. Zeitung 1893.)
89. — Die œsterr. Arten der Gattung Hilara Mg. (Verhandlungen der kk. zool.-botan. Gesellschaft in Wien 1892.)
90. — Siebenbürgische Zweiflügler. (Verhandlungen und Mittheilungen des siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften in Hermannstadt 1896.)
91. Szalkay. Adatok Délmagyarország állatvilágához. (A délmagyarországi természettudom. társulat közlönye VI. köt. 3. füz. 1882.)
92. Thalhammer János S. J. Himantostoma hungaricum, dipteron novum ex Hungaria. (Természetrajzi füzetek 1897.)
93. — Elachiptera pubescens n. sp. dipterorum. (Természetrajzi füzetek 1898.)
94. Tömösváry Ödön. Thalassomyia congregata species dipterorum nova e familia Chironomidarum. (Természetrajzi füzetek 1883.)
95. — Délmagyarország állattani tekintetben. A dipterákat összeállitotta Mocsáry Sándor. (A magyar orvosok és természetvizsgálók Buziás-Temesvárott tartott 23. vándorgyülésének munkálatai 1886. Diptera enumeravit Alexander Mocsáry.)
96. Török József dr. Debreczen faunájának ismertetése. (A magyar orvosok és természetvizsgálók 14. nagygyülésének munkálatai. 1870.)
97. Wachtl Fr. Analytische Übersicht der europäischen Gattungen aus dem Verwandtschaftskreise von Echinomyia Dumeril nebst Beschreibung einer neuen Eudora. (Wiener entom. Zeitung 1894.)

Ordo. DIPTERA.

Fam. MYCETOPHILIDAE.

Zygoneura Meig.

1. *sciarina* Mg. — IV. S.-A.-Ujhely, Sárospatak, Tolcsva.

Sciara Meig.

2. *Thomae* L. — In omnibus regionibus communis.
3. *humeralis* Zett. — VI. Mehádia.
4. *proxima* Winn. — V. In monte Bucsecs.
5. *obscura* Winn. — V. In montibus Götzenberg et Negoi, Nagyszeben.
6. *annulata* Meig. — V. In montibus Götzenberg et Schuler.
7. *rufiventris* Mcq. — VI. Mehádia.
8. *analis* Egg. — II. Sopron. VII. Montes Karst. VIII. Buccari.
9. *carbonaria* Mg. ? — VI. Mehádia.
10. *Mannii* Winn. — VI. Mehádia.
11. *armata* Winn. — VIII. Buccari.
12. *nocticolor* Winn. — VI. Mehádia.
13. *brunnipes* Mg. — VI. Mehádia.
14. *insignis* Winn. — VI. Mehádia.
15. *alpicola* Winn. — VI. Mehádia.
16. *lugubris* Winn. — V. Götzenberg. VI. Mehádia.
17. *strigata* Staeg. — V. Bucsecs.
18. *quinquelineata* Mcq. — IV. S.-A.-Ujhely. V. Nagyszeben, Peleszarvad, montes Schuler.
19. *pauperata* Winn. — VI. Mehádia. VII. Karst (Visevica).
20. *praecox* Mg. v. *macilenta* Winn. — V. Vörös-torony, Götzenberg, Nagyszeben, Brassó.
21. *silvatica* Mg. — II. Sopron. V. Mons Bucsecs.
22. *strenua* Winn. — V. Montes Schuler.
23. *velox* Winn. — V. Montes Schuler.
24. *pulicaria* Mg. — II. Sopron.
25. *flavipes* Pz. — V. Mons Bucsecs.
26. *monticola* Winn. — V. In montibus Götzenberg et Orlát.
27. *umbratica* Zett. — VII. Montes Karst.
28. *triseriata* Winn. — I. Budapest.
29. *nitidicollis* Mg. — II. Sopron.
30. *militaris* Now. — III. Montes Tátra. IV. Bukócz.
31. *dispar* Winn. — III. Montes Tátra (Nowicki).
32. *saltuum* Winn. — III. Montes Tátra (Nowicki).
33. *unicolor* Winn. — III. Montes Tátra (Nowicki).
34. *moerens* Winn. — III. Montes Tátra (Nowicki).
35. *brevipalpis* Winn. — III. Montes Tátra (Nowicki).

Zygomyia Winn.

36. *pictipennis* Staeg. — V. Montes Bucsecs, Götzenberg.
37. *valida* Winn. — V. Montes Schuler.
38. *vara* Staeg. — V. Götzenberg.

Sceptonia Winn.

39. *nigra* Mg. — V. Götzenberg.

Cordyla Mg.

40. *crassicornis* Mg. — V. Montes Schuler.
41. *vitiosa* Winn. — V. Götzenberg.

Dynatosoma Winn.

42. *fuscicorne* Mg. — IV. Mons Vihorlat. V. Montes Bucsecs, Götzenberg. VII. Brušane.
43. *nobile* Lw. — V. Götzenberg. VI. Alpes Kernecska-Csóka (Com. Krassó-Szörény).
44. *cochleare* Strobl. — V. Montes Schuler.
45. *inaequale* Strobl. — V. Götzenberg.

Mycetophila Mg.

46. *punctata* Mg. — I. Budapest. III. Rozsnyó. IV. Tolcsva. V. Götzenberg, Nagyszeben, Tasnád. VI. Herkulesfürdő.
    v. *unicolor* Mg. — V. Götzenberg.
47. *lineola* Mg. — V. Montes Bucsecs, Götzenberg, Montes Schuler, Nagyszeben.
    v. *ruficollis* Mg. — V. Götzenberg.
48. *adumbrata* Mik. — V. Montes Schuler.
49. *vittipes* Zett. — V. Bucsecs, Götzenberg, montes Schuler.
50. *nebulosa* Stann. (?) — V. Bucsecs.
51. *bimaculata* F. — V. Montes Bucsecs, Götzenberg, Schuler.
52. *xanthopyga* Winn. — V. Götzenberg.
53. *rufescens* Zett. — V. Montes Schuler. VI. Herkulesfürdő.

54. *signata* Mg. — IV. S.-A.-Ujhely. V. Götzenberg, Gyulafehérvár, montes Schuler. VI. Resicza.
55. *marginata* Winn. — V. Bucsecs, Götzenberg.
56. *lunata* Mg. — V. Bucsecs, Gyulafehérvár.
57. *fraterna* Winn. — V. Bucsecs, montes Schuler.
58. *pumila* Winn. — IV. Tolcsva.
59. *biusta* Mg. — V. Bucsecs. VI. Herkulesfürdő.
60. *gratiosa* Winn. — V. Montes Bucsecs, Götzenberg, Schuler.
61. *luctuosa* Mg. — V. Bucsecs.
62. *hamata* Winn. — V. Götzenberg.
63. *tarsata* Winn. — V. Bucsecs.

Epicypta Winn.

64. *scatophora* Perris. — IV. S.-A.-Ujhely.

Exechia Winn.

65. *fungorum* Deg. — I. Kalocsa IV. Alsó-Bereczki. V. Nagyszeben.
66. *lateralis* Mg. — V. Nagyszeben.
67. *interrupta* Winn. — V. Nagyszeben.
68. *pallida* Winn. — IV. Tolcsva. V. Götzenberg.
69. *maculipennis* Stann. — V. Nagyszeben.

Phronia Winn.

70. *austriaca* Winn. — VII. Brušane.
71. *signata* Winn. — V. Götzenberg. VI. Herkulesfürdő.
72. *annulata* Winn. — V. Bucsecs, Götzenberg.
73. *tenuis* Winn. — V. Montes Bucsecs, Götzenberg, Schuler.
74. *nitidiventris* Wulp. — V. Bucsecs.
75. *rustica* Winn. — V. Bucsecs, montes Schuler.
76. *humeralis* Winn. — V. Bucsecs. VI. Herkulesfürdő.

Trichonta Winn.

77. *melanura* Staeg. — V. Bucsecs, Götzenberg.
78. *hamata* Mik. — V. Bucsecs, Götzenberg.

Brachycampta Winn.

79. *alternans* Zett. — V. Götzenberg.
80. *amoena* Winn. — VI. Herkulesfürdő.
81. *griseicollis* Staeg. — V. Götzenberg. VI. Herkulesfürdő.

Allodia Winn.

82. *crassicornis* Stann. — V. Götzenberg, montes Schuler. VI. Herkulesfürdő.
83. *punctipes* Staeg. — V. Montes Schuler.
84. *barbipes* Winn. — V. Bucsecs.
85. *ornaticollis* Mg. — V. Nagyszeben. VI. Herkulesfürdő. VII. Brušane, Karst, Križišće.
var. *grata* Mg. — V. Bucsecs, montes Schuler.

Rymosia Winn.

86. *signatipes* Wulp. — VII. Karst.
87. *cristata* Staeg. — V. Bucsecs.
88. *fenestralis* Mg. — I. Antrum Pestere.
89. *domestica* Mg. — V. Götzenberg.

Acnemia Winn.

90. *amoena* Winn. — VI. Herkulesfürdő.

Docosia Winn.

91. *valida* Winn. — V. Bucsecs, montes Schuler. VI. Herkulesfürdő.

Brachypeza Winn.

92. *bisignata* Winn. — VI. Resicza.

Coelosia Winn.

93. *flava* Staeg. — V. Bucsecs.

Glaphyroptera Winn.

94. *fascipennis* Mg. — IV. Kis-Azar, H.-Rokitó. VI. Herkulesfürdő.
95. *unicolor* Winn. — IV. Imreg, S.-A.-Ujhely.
96. *fasciola* Mg. — V. Bucsecs, montes Schuler.
97. *subfasciata* Mg. — V. Götzenberg. VII. Brušane.
98. *alternans* Winn. — V. Peleszarvad.
99. *bilineata* Winn. — IV. Tolcsva.
100. *Winthemi* Lehm. var. — V. Bucsecs.
101. *bimaculata* Mg. — IV. S.-A.-Ujhely.
102. *borealis* Winn. — VI. Herkulesfürdő.

Phthinia Winn.

103. *humilis* Winn. — V. Götzenberg.

Boletina Staeg.

104. *sciarina* Staeg. — IV. Sátoralja-Ujhely. V. Götzenberg, montes Schuler, Tasnád. VI. Herkulesfürdő. VII. Karst.
105. *dispar* Winn. — VII. Karst.

Leptomorphus Curtis.

106. *Walkeri* Curt. — IV. Vizakna. V. Montes Schuler.

Diadocidia Ruthe.

107. *ferruginosa* Mg. — V. Götzenberg.

Empalia Winn.

108. *vitripennis* Mg. — V. Montes Schuler.

Lasiosoma Winn.

109. *pilosa* Mg. — VI. Herkulesfürdő.
110. *rufa* Mg. — VI. Herkulesfürdő.

Polylepta Winn.

111. *splendida* Winn. — VI. Herkulesfürdő.

Empheria Winn.

112. *lineola* Mg. — VI. Herkulesfürdő.

Sciophila Mg.

113. *inanis* Winn. var. *cinerascens* Mcq. — V. Bucsecs.
114. *limbata* Winn. — V. Götzenberg, Nagyszeben. VI. Herkulesfürdő, Resicza.
115. *ornata* Mg. — V. Bucsecs, Montes Schuler.
116. *tumida* Winn. — II. Sopron.
117. *fraterna* Winn. — V. Götzenberg.
118. *nigriceps* Lw. — VI. Herkulesfürdő.
119. *pallens* Lw. — VI. Alpes Kernecska-Csóka.

Monoclona Mik.

120. *halterata* Staeg. — V. Götzenberg.

Bolitophila Mg.

121. *cinerea* Mg. — V. Montes Bucsecs, Götzenberg, Schuler. VI. Herkulesfürdő. VII. Brušane.
122. *bimaculata* Zett. — V. Götzenberg.

Macrocera Mg.

123. *fasciata* Mg. — II. Sopron. V. Götzenberg. VI. Herkulesfürdő.
124. *lutea* Mg. — VI. Herkulesfürdő.
125. *vittata* Mg. — VII. Karst.
126. *centralis* Mg. — II. Sopron.
127. *angulata* Mg. — I. Kalocsa.
128. *stigma* Curt. — V. Götzenberg. VI. Herkulesfürdő.
129. *crassicornis* Winn. — IV. S.-A.-Ujhely.

Plesiastina Winn.

130. *annulata* Mg. — I. Bánlaka. III. Losoncz.
131. *apicalis* Winn. — III. Losoncz.

Ditomyia Winn.

132. *fasciata* Mg. — V. Bucsecs, Götzenberg, Nagyszeben. VI. Herkulesfürdő.

Platyura Mg.

133. *marginata* Mg. — II. Csurgó.
134. *ochracea* Mg. — VI. Resicza.
135. *fasciata* Latr. — VI. Herkulesfürdő.
136. *basalis* Winn. — II. Sopron.
137. *dorsalis* Staeg. — VI. Herkulesfürdő.

Ceroplatus Bosc.

138. *lineatus* F. — II. Sopron. V. Bucsecs, Tasnád.
139. *tipuloides* Bosc. — VI. Vallis Cserna.
140. *sesioides* Wiblg. — V. Zilah.
141. *testaceus* Dalm. — V. Bucsecs.

Fam. BIBIONIDAE.

Scatopse Geoffr.

1. *pulicaria* Lw. — II. Sopron. V. Nagyszeben.
2. *notata* Linn. — I. Kalocsa, Kecskemét. II. Sopron. IV. S.-A.-Ujhely, Tolcsva. V. Peér, Tasnád, Zilah.
3. *recurva* Lw. — VI. Mehádia.

Dilophus Mg.

4. *vulgaris* Mg. — I. Debreczen, Kalocsa, Nagyvárad, Péczel. II. Sopron. IV. S.-A.-Ujhely. V. Nagyszeben, Tasnád-Szántó. VI. Mehádia.
5. *albipennis* Mg. — I. Budapest.
6. *humeralis* Zett. — IV. Turcsek. VII. Fužine.

Bibio Geoffr.

7. *pomonae* F. — I. Kalocsa. Rézbánya. II. Duna-Földvár, Sopron. III. Koritnicza, Mons Szitnya, Montes Tátra, Trencsén. IV. Mons Prasiva, Rabaskala. V. Bucsecs, Montes Cibinienses, Montes Schuler. VII. Vukovár.
8. *marci* L. — Communis.
9. *hortulanus* L. — Uti prior ubique occurrit.
10. *siculus* Lw. — I. Kalocsa.
11. *venosus* Mg. — II. Sopron. IV. S.-A.-Ujhely, S.-Patak, Tokaj. VI. Mehádia.
12. *reticulatus* Lw. — I. Budapest, Péczel. II. Sopron. V. Nagyszeben, Peér. VI. Mehádia.
13. *nigriventris* Hal. — IV. Vihorlat. VII. Fužine.
14. *hybridus* Hal. — IV. S.-A.-Ujhely.
15. *Johannis* L. — I. Budapest, Kalocsa. II. Sopron. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely. V. Tasnád. VII. Zágráb.
16. *varipes* Mg. — I. Budapest. II. Sopron. IV. Sárospatak. V. Nagyszeben. VIII. Crkvenica.
17. *clavipes* Mg. — I. Kalocsa. II. Sopron. VI. Csernagora, Csornakleva.
18. *laniger* Mg. — II. Sopron.
19. *globuliceps* Lw. — I. Budapest.
20. *macer* Lw. — VI. Börza (Com. Krassó-Szörény), Orsova.

Penthetria Mg.

21. *holosericea* Mg. — I. Budapest, Kecskemét. III. Rozsnyó.

Hesperinus Lw.

22. *imbecillus* Lw. — VI. Mehádia.

Fam. CHIRONOMIDAE.

Ceratopogon Mg.

1. *regulus* Winn. — V. Peleszarvad, Tasnád.
2. *bipunctatus* L. — I. Kecskemét. V. Peleszarvad. VI. Deliblat. VIII. Crkvenica.
3. *piceus* Winn. — I. Kecskemét.
4. *crassipes* Winn. — I. Kecskemét. V. Tasnád.
5. *brevipennis* Mcq. — IV. Tolcsva.
6. *lucorum* Mg. — I. Kecskemét. V. Peleszarvad.
7. *rostratus* Winn. —V. Görgény, Götzenberg, Peér, Peleszarvad, Szódemeter. VIII. Fiume
8. *flavolineatus* Strobl. — V. Götzenberg, montes Schuler. VIII. Fiume.
9. *fascipennis* Staeg. — I. Budapest, Kecskemét.
10. *pictipennis* Staeg. — IV. K.-Majtény. V. Tasnád.
11. *arcuatus* Winn. — V. Tasnád.
12. *pulicaris* L. — IV. Tolcsva. V. Peér, Tasnád.
13. *forcipatus* Winn. — IV. Imreg.
14. *ochraceus* Winn. — I. Budapest, Kecskemét.
15. *albicans* Winn. — I. Kecskemét.
16. *niveipennis* Mg. — I. Budapest, Kecskemét. V. Tasnád.
17. *nitidus* Winn. — I. Kecskemét. IV. Tolcsva. VI. Deliblat, Temes-Kubin.
18. *femoratus* F. — II. Sopron. IV. Vihorlat. V. Tasnád, Tasnád-Szántó.
19. *variegatus* Winn. — I. Kóly. V. Peleszarvad, Tasnád.
20. *flavipes* Mg. — IV. Imreg. V. Montes Cibinienses. Peleszarvad.
21. *tibialis* Mg. — IV. Imreg, Szomotor. V. Peleszarvad, Zilah.
22. *fasciatus* Mg. — I. Kóly. IV. Erdőbénye, S.-A.-Ujhely.
23. *lineatus* Mg. — IV. Imreg, Nagy-Károly.
24. *lateralis* Mg. — V. Götzenberg.
25. *venustus* Mg. — VI. Deliblat.
26. *pictus* Mg. — I. Nagyvárad. VI. Deliblat. VII. Gospić.
27. *solstitialis* Winn. — I. Budapest.
28. *ornatus* Mg. — I. Kecskemét.
29. *praeustus* Lw. — VI. Herkulesfürdő.
30. *gracilipes* Winn. — IV. S.-A.-Ujhely.
31. *formosus* Lw. — Auctore teste Hungariam incolit.

Thalassomyia Schin.

32. *congregata* Tömösváry. — VI. Kazánszoros, Szt-Helena.

Chironomus Mg.

33. *pusio* Mg. — V. Nagyszeben.
34. *plumosus* L. — In omnibus regionibus communis.
35. *ferrugineovittatus* Zett. — I. Budapest, Kalocsa, Kecskemét. IV. Homonna, Imreg, S.-A.-Ujhely. V. Tasnád. VI. Herkulesfürdő.
36. *aprilinus* Mg. — V. Peér, Tasnád.
37. *barbipes* Staeg. — I. Kecskemét. IV. Imreg.
38. *annularis* Mg. — I. Kecskemét. IV. Imreg. V. Tasnád.
39. *riparius* Mg. — I. Kalocsa, Kecskemét. II. Sopron. IV. Királyhelmecz. V. Nagyszeben, Tasnád. VI. Herkulesfürdő.
40. *tentans* F. — VII. Gospić.
41. *dispar* Mg. — II. Fertő, Sopron.
42 *tendens* F. — I. Kecskemét. II. Sopron. IV. Imreg. V. Tasnád.
43. *psittacinus* Mg. — II. Csurgó. IV. Alsó-Bereczki. V. Tasnád, Zilah. VII. Zimony.
44. *viridis* Mg. — I. Kecskemét. II. Sopron. IV. Imreg. V. Peér, Tasnád, Zilah.
45. *pedellus* Deg. — I. Budapest, Kecskemét. II. Sopron. IV. Imreg. V. Tasnád.
46. *brevitibialis* Zett. — IV. Imreg, Tokaj. V. Nagy-Ajta. Peleszarvad. VI. Deliblat, Kazánszoros. VII. Gospić, Pétervárad.
47. *pusillus* L. — I. Budapest, Kecskemét. V. Zilah.
48. *viridulus* L. — I. Kecskemét. V. Tasnád. VII. Gospić.
49. *virescens* Mg. — IV. Nagy-Károly. V. Peér. VII. Gospić.
50. *flexilis* L. — I. Budapest. IV. Tolcsva. V. Zilah.
51. *scalaenus* Schrk. — VI. Herkulesfürdő.
52. *histrio* F. — VII. Gospić.
53. *pictulus* Mg. — I. Budapest, Kecskemét. IV. Imreg. V. Tasnád.
54. *nubeculosus* Mg. — I. Budapest. V. Tasnád. VI. Herkulesfürdő.
55. *vernus* Mg. — IV. Imreg.
56. *latus* Staeg. — V. Tasnád.
57. *quadrimaculatus* Mg.— IV. Kis-Azar. V. Tasnád.
58. *maculipennis* Mg. — I. Budapest, Kecskemét. V. Peér.
59. *intermedius* Staeg. — I. Budapest, Kecskemét. IV. Kis-Majtény. V. Tasnád.
60. *venustus* Staeg. — II. Sopron. IV. Imreg, S.-A.-Ujhely, Szerencs. V. Tasnád. VI. Deliblat, Herkulesfürdő.
61. *opacus* Mg. — V. Nagyszeben, Negoi.
62. *minutus* Zett. — V. Negoi. VII. Gospić.
63. *coracinus* Zett. — IV. Nagymihály.
64. *atomarius* Zett. — VIII. Buccari, Crkvenica.
65. *ephippium* Zett. — I. Kecskemét. II. Visegrád. IV. Imreg. V. Peér.
66. *tremulus* L. — I. Kecskemét. V. Peleszarvad.

67. *barbicornis* F. — I. Budapest, Kecskemét. V. Tasnád.
68. *vibratorius* Mg. — VI. Herkulesfürdő.
69. *perniger* Zett. — V. Tasnád.
70. *obscurus* Mg. — VI. Herkulesfürdő.
71. *bipunctatus* Zett. — VI. Deliblat. VIII. Crkvenica.

Cricotopus Wulp.

72. *tibialis* Mg. — VII. Gospić.
73. *bicinctus* Mg. — I. Budapest, Kecskemét. II. Sopron. IV. S.-A.-Ujhely. V. Tasnád. VI. Resicza.
74. *motitator* L. — I. Kecskemét. II. Sopron. V. Tasnád.
75. *silvestris* F. — I. Budapest, Kecskemét, Visegrád. II. Sopron. V. Peleszarvad, Tasnád.
76. *ornatus* Mg. — VII. Pétervárad.

Camptocladius Wulp.

77. *byssinus* Schrk. — IV. Nagykároly. V. Nagyszeben, Tasnád-Szántó.
78. *aterrimus* Mg. — I. Kecskemét. II. Visegrád. V. Nagyszeben, Sződemeter, Tasnád.
79. *minimus* Mg. — I. Budapest, Kecskemét. V. Bucsecs.

Orthocladius Wulp.

80. *stercorarius* Deg. — I. Budapest, Kalocsa, Kecskemét. II. Sopron, Visegrád. IV. Imreg, Sárospatak, S.-A.-Ujhely. V. Zilah.
81. *sordidellus* Ztt. — II. Visegrád. VI. Krassó.

Tanytarsus Wulp.

82. *punctipes* Wied. — IV. Nagykároly. V. Tasnád, Tasnád-Szántó.
83. *flavipes* Mg. — IV. Nagykároly. V. Peleszarvad, Tasnád.
84. *gmundensis* Egg. — I. Budapest.

Eurycnemus Wulp.

85. *elegans* Mg. — I. Budapest, Kecskemét.

Tanypus Mg.

86. *nervosus* Mg. — IV. Imreg. V. Peleszarvad. VI. Herkulesfürdő.
87. *punctipennis* Mg. — II. Sopron. V. Peleszarvad, Tasnád. VI. Herkulesfürdő.
88. *culiciformis* L. — I. Kecskemét. IV. Imreg, S.-A.-Ujhely. V. Peleszarvad.
89. *plumipes* Fries. — I. Kalocsa.
90. *choreus* Mg. — I. Kecskemét. IV. S.-A.-Ujhely.
91. *varius* F. — I. Debreczen, Kecskemét. V. Tasnád. VI. Herkulesfürdő, Resicza.
92. *punctatus* F. — I. Kecskemét.
93. *carneus* F. — V. Tasnád. VI. Herkulesfürdő.
94. *monilis* L. — IV. Imreg. VI. Deliblat, Herkulesfürdő. VII. Gospić, Pétervárad.
95. *signatus* Zett. — IV. Sárospatak.
96. *melanops* Mg. — V. Tasnád.
97. *nigropunctatus* Staeg. — I. Kecskemét.
98. *nebulosus* Mg. — V. Nagyszeben.

Diamesa Mg.

99. *Waltlii* Mg. — V. Montes Cibinienses.

Fam. CULICIDAE.

Corethra Mg.

1. *plumicornis* F. — I. Debreczen, Kalocsa. IV. Imreg, Tolcsva. VI. Deliblat, Herkulesfürdő. VII. Eszék, Pétervárad.

Anopheles Mg.

2. *bifurcatus* L. — V. Peleszarvad.
3. *maculipennis* Mg. — I. Budapest, Debreczen, Kecskemét. III. Rozsnyó. IV. S.-A.-Ujhely. VI. Deliblat, Herkulesfürdő.
4. *nigripes* Staeg. — I. Kecskemét. V. Götzenberg. VI. Herkulesfürdő.

Culex L.

5. *annulatus* Schrk. — II. Sopron. III. Pozsony. V. Brassó.
6. *dorsalis* Mg. — I. Budapest, Kecskemét. IV. Tolcsva. VI. Grebenácz, Mehádia.
7. *vexans* Mg. — I. Kecskemét. III. Rozsnyó. V. Peleszarvad. VI. Grebenácz, Herkulesfürdő. VII. Gospić, Karst. VIII. Buccari, Crkvenica.
8. *cantans* Mg. — II. Csurgó. V. Peleszarvad. VI. Herkulesfürdő.
9. *annulipes* Mg. — I. Budapest, Csongrád. II. Csurgó, Sopron. IV. Imreg, Szerencs. V. Tasnád, Zilah, Vizakna.
10. *bicolor* Mg. — I. Budapest.
11. *nemorosus* Mg. — I. Budapest, Kalocsa, Nagyvárad. II. Sopron, Visegrád. III. Rozsnyó. IV. Tolcsva. V. Szilágy-Nagyfalu.
12. *pipiens* L. — Communis.
13. *ciliaris* L. — I. Budapest. II. Sopron. VI. Deliblat. VII. Brušane, Gospić.
14. *ornatus* Mg. — I. Budapest. IV. Rabaskala. V. Zilah. VI. Herkulesfürdő, Kazánszoros, Mehádia, Oravicza, Orsova. VII. Brušane.
15. *leucacanthus* Lw. — VI. Herkulesfürdő, Kazánszoros.

Fam. DIXIDAE.

Dixa Mg.

1. *maculata* Mg. — VI. Herkulesfürdő.

Fam. BLEPHAROCERIDAE.

Liponeura Lw.

1. *cinerascens* Lw. — III. Montes Tátra. VI. Mehádia.
2. *brevirostris* Lw. — III. Montes Tátra.

Blepharicera Mcq.

3. *fasciata* Westw. — VI. Bánlaka, Mehádia.

Orphnephila Hal.

4. *testacea* Ruthe. — III. Montes Tátra. VI. Mehádia.
5. *nigra* Lw. — III. Tátra. V. Bucsecs.

Fam. SIMULIDAE.

Simulia Latr.

1. *ornata* Mg. — II. Sopron. III. Rozsnyó. V. Brassó.
2. *reptans* L. — I. Kalocsa, Nagyvárad. II. Sopron. III. Lucski, Tátrafüred. V. Vöröstorony szoros, Mehádia. VII. Podsused, Zágráb.
   v. *variegata* Mg. — VI. Krassó.
3. *latipes* Mg. — VI. Mehádia.
4. *maculata* Mg. — I. Kecskemét. VI. Krassó.
5. *columbatzensis* Schönb. — VI. Com. Krassó.
6. *hirtipes* F. — III. Deményfalu. IV. Rabaskala. V. Montes Cibinenses, Negoi.
7. *argyreata* M. — I. Pomáz.
8. *subfasciata* Mg. — I. Budakesz.

Fam. PSYCHODIDAE.

Phlebotomus Rond.

1. *Papatasii* Scop. — VII. Novi. VIII. Carlopago, Crkvenica, Fiume, Zengg.

Trichomyia Curt.

2. *urbica* Curt. — VIII. Fiume.

Pericoma Curt.

3. *palustris* Mg. — I. Kalocsa.
4. *ocellaris* Mg. — V. Montes Schuler. VI. Herkulesfürdő.
5. *tristis* Mg. — VI. Herkulesfürdő.
6. *calceata* Mg. — VI. Herkulesfürdő.
7. *sexpunctata* Curt. — I. Budapest, Kalocsa. II. Sopron. III. Nyitra. IV. S.-A.-Ujhely. V. Gyulafehérvár, Peleszarvad.

Psychoda Latr.

8. *phalaenoides* L. — I. Budapest, Kalocsa. II. Sopron. V. Peér, Peleszarvad, Tasnád. VI. Herkulesfürdő.

Fam. RHYPHIDAE.

Rhyphus Latr.

1. *fenestralis* Scop. — I. Budapest, Kecskemét. II. Sopron. III. Kassa. IV. Homonna. V. Götzenberg, Nagyszeben, Peér, Tasnád.
2. *cinctus* F. — II. Sopron.

Fam. CECIDOMYIDAE.

Auctore V. Szépligeti.

Clinorrhyncha H. Lw.

1. *millefolii* Wachtl. — III. Ujbánya. (*Achillea Neilreichii* Kern.)

Lasioptera Meig.

2. *rubi* Heeg. — I. Budapest. II. Mons Gerecse. III. Ujbánya.
3. *eryngii* Vall. — I. Budapest, Monor, Szt-Endre, Montes Mátra. (*Eryngium campestre* L.) VI. Herkulesfürdő (Kowarz).
4. *populnea* Wachtl. — II. Siófok (*Populus canescens* Sm.).

Dasyneura Rond. (*Dichelomyia* Rübsaamen.)

5. *salicis* Schrk. — III. Borosznó (*Salix cinerea* L.). VI. Cséb (Com. Bács.). VIII. Lipovljane. (Com. Pozsega.)
6. *saliciperda* Duf. — Communis. I. Budapest. (*Salix fragilis* L.)
7. *rosaria* H. Lw. — Communis. I. Budapest. (*Salix alba* L.) III. Rajecz-Teplicz, Ujbánya, Borosznó, Dobsina. (*Salix alba, amygdalina, caprea* et *purpurea* L.)
8. *salicina* H. Lw. — III. Borosznó. (*Salix purpurea* L.)
9. *heterobia* H. Lw. — I. Budapest. (*Salix* div. sp.)
10. *acrophila* Winn. — I. Budapest. (*Fraxinus excelsior* L.)
11. *galii* H. Lw. — Communis. I. Budapest. (*Galium Aparine* L., *G. Mollugo* L., *G. verum* L., *G. Schultesii* West.) III. Montes Tátra (Drechselhäuschen). (*G. silvaticum* L.) VIII. Fiume. (*G. lucidum* All.) (Fr. Löw.).
12. *euphorbiae* H. Lw. — I. Budapest. (*Euphorbia Cyparissias* L.)
13. *urticae* Perr. — I. Budapest. (*Urtica dioica* L.)

14. *veronicae* Vall. — I. Montes Mátra. III. Szepes-Baldócz. (*Veronica Chamaedrys* L.)
15. *brassicae* Winn. — V. Kolozs-Monostor. (*Brassica Napus* L.)
16. *bryoniae* Bouché. — II. Balatonfüred (*Bryonia alba* L.)

Macrolabis Kieffer.

17. *pilosellae* Binnie. — I. Montes Pilis. (*Hieracium praealtum* L.)

Cistiphora Kieffer.

18. *hieracii* Fr. Lw. — VII. Laginac ad montem Velebit. (*Hieracium flexuosum* W. K.) (Fr. Löw.).
19. *sonchi* Fr. Lw. — I. Montes Mátra. (*Sonchus oleraceus* L.)

Rhopalomyia Rübsamen.

20. *millefolii* H. Lw. — I. Pomáz. III. Ujbánya. (*Achillea Neilreichii* A. Kern.)
21. *foliorum* H. Lw. — I. Budapest. (*Artemisia vulgaris* L.)
22. *artemisiae* Bouché. — I. Budapest. (*Artemisia campestris* L.)

Oligotrophus Latr.

23. *juniperina* L. — I. Budapest. III. Tátra-Füred. (*Juniperus communis* L.)
24. *corni* Gir. — Communis. Budapest. II. P.-Maróth. (*Cornus sanguinea* L.)
25. *capreae* Winn. — I. Montes Pilis. III. Tátra-Füred. (*Salix Caprea* L.)
26. *fagi* H. (*Mikiola* Kieff.) — Communis I. Budapest. III. Ujbánya, Borosznó. (*Fagus silvatica* L.)
27. *Hartigii* Liebl. — I. Budapest. (*Tilia platyphyllos* Scop.)
28. *piligerus* H. Lw. — Sat frequens. Budapest. (*Fagus silvatica* L.)
29. *poae* Bosc. — Montes Budenses et Pilisenses. (*Poa nemoralis* L.)
30. *destructor* Say. (Hesseni légy). In pluribus comitatibus noxius erat.

Asphondylia H. Lw.

31. *verbasci* Vall. — Sat communis. I. Budapest. (*Verbascum austriacum* Schott.)
32. *umbellatarum* Fr. Lw. *(Kiefferia.)* — Communis. I. Budapest, Parád. II. Siófok, Fonyód, P.-Maróth. III. Ujbánya, Borosznó. (*Daucus Carota* L., *Pimpinella Saxifraga* L., *Torilis Anthriscus* Gmel. et *Pastinaca sativa* L.)
33. *cytisi* Frauenfeld. — Communis. I. Budapest. (*Cytisus leucotrichus* Schur.). II. Ad lacum Fertő. (*Cytisus austriacus* L.) (Frauenfeld).
34. *melanopus* Kieff. — I. Budapest. II. Siófok. (*Lotus corniculatus* L.)
35. *Hornigi* Wachtl. — III. Borosznó. (*Thymus Chamaedrys* Fr.)
36. *Rübsaameni* Kert. — VI. Orsova. (*Ferula Heuffelii* Gris.)

Diplosis H. Lw.

37. *tremulae* Winn. — I. Budapest. III. Tátra. (*Populus alba* L. et *tremula* L.)
38. *loti* Geer. — I. Budapest, Parád. (*Lotus corniculatus* L.)
39. *tritici* Kirby. — I. Bánhegyes (Com. Békés.).
40. *corylina* Fr. Lw. — I. Budapest. (*Corylus Avellana* L.)
41. *dryobia* Fr. Lw. *(Macrodiplosis)* — I. Budapest. (*Quercus lanuginosa* Th.)
42. *Liebeli* Kieff. — I. Budapest. (*Quercus Robur* L.)
43. *globuli* Rübs. — I. Budapest. (*Populus tremula* L.) II. Siófok, P.-Maróth.
44. *tiliarum* Kieff. — I. Buda, Montes Pilisenses. (*Tilia ulmifolia* Scop. et T. *platyphyllos* Scop.) III. Borosznó.
45. *acerplicans* Kieff. *(Contarinia.)* — I. Budapest. (*Acer campestre* L.)
46. *marsupialis* Fr. Lw. — I. Budapest. II. Esztergom. III. Ujbánya. (*Prunus dom.* et *spinosa* L.)
47. *lonicerarum* Fr. Lw. — I. Budapest. III. Ujbánya. (*Sambucus Ebulus* L.)
48. *centaureae* Fr. Lw. — I. Budapest. (*Centaurea Sadleriana* Janka.)
49. *subterranea* Fr. — I. Budapest. (*Inula ensifolia* L.)
50. *Traili* Kieff. *(Contarinia.)* — I. Budapest (*Pimpinella Saxifraga* L.).
51. *volvens* Kieff. (*Macrodiplosis* Kieff.) — I. Budapest (*Quercus Robur* L.).
52. *subulifex* Kieff. *(Contarinia.)* — I. Budapest (*Quercus Cerris* L.).

Janetia Kieffer. (1896.)

53. *Szépligetii* Kieff. — I. Budapest (*Quercus Cerris* L.).
54. *cerris* Kollar. — Communis. I. Budapest (*Q. Cerris* L.).
55. *homocera* F. Lw. — I. Budapest (*Q. Cerris* L.).

Cecidomyia Aut.

56. *alni* Fr. Lw. — III. Borosznó. (*Alnus glutinosa* et *incana*.)
57. *carpini* Fr. Lw. — I. Budapest. (*Carpinus Betulus* L.)

58. *circinans* Gir. — Communis. I. Budapest, Parád. (*Quercus Cerris* L.) VI. Lippa.
59. *iteobia* Kieff. — I. Budapest. (*Salix cinerea* L.)
60. *marginemtorquens* Winn. — III. Borosznó. (*Salix cinerea* L.)
61. *lychnidis* Heyd. — I. Monor (*Melandrium album* Mill.)
62. *sisymbrii* Schrnk. — I. Budapest. III. Szepes-Baldócz. (*Nasturtium silvestre* L.). IV. Zemplén (Kowarz).
63. *affinis* Kieff. — I. Budapest. (*Viola odorata* et *hirta* L.)
64. *hyperici* Br. — III. Lucski (Com. Liptó). (*Hypericum perforatum* L.)
65. *tiliamvolvens* Rübs. — I. Budapest. (*Tilia platyphyllos* Scop.)
66. *oenophila* Haimh. — I. Budapest. (*Vitis vinifera* L.) II. Eger-Aracsa (Com. Zala).
67. *Löwii* Mik. — I. Budapest. (*Euphorbia Gerardiana* Jacqu.)
68. *crataegi* Winn. — Sat frequens. I. Budapest, Parád. (*Crataegus oxyacantha* L.)
69. *rosarum* Hard. — Frequens. I. Budapest. (*Rosa canina* L.)
70. *ulmariae* Br.—III. Dobsina. (*Spiraea Ulmaria* L.)
71. *onobrychidis* Br. — I. Budapest, Parád. (*Medicago falcata, sativa* L.)
72. *genisticola* Fr. Lw. — I. Budapest. (*Genista tinctoria* L.). III. Ujbánya. (*G. pilosa* L.)
73. *ignorata* Wachtl. — III. Borosznó. (*Medicago sativa* L.)
74. *ericina* Fr. Lw.—VIII. Velebit. (*Erica carnea* L.) (Fr. Löw.)
75. *bursaria* Br. — I. Budapest. (*Glechoma hirsuta* W. K.)
76. *oleae* Fr. Lw. — VIII. Fiume et Volosca. (*Olea Europaea* L.) (Fr. Löw.)
77. *thymicola* Kieff. — I. Budapest. (*Thymus Chamaedrys* Fr.)
78. *asperulae* Fr. Lw. — I. Budapest. (*Asperula cynanchica* L.)
79. *Réaumuriana* Fr. Lw. — Frequens. I. Budapest. (*Tilia* div. sp.)
80. *genistamtorquens* Kieff.— I. Budapest. (*Genista pilosa* L.)
81. *acercrispans* Kieff.— I. Budapest. (*Acer Pseudoplatanus* L.)
82. *galii* H. L. — II. P.-Maróth. (*Galium verum* L.)

Fam. TIPULIDAE.

Chionea Dalm.

1. *araneoides* Dalm. — IV. Runyina Com. Zemplén.

Erioptera Mg.

2. *atra* Mg. — I. Budapest, Visegrád.
3. *murina* Mg. — V. Zilah. VI. Herkulesfürdő.
4. *obscura* Mg. — I. Budapest, Visegrád.
5. *ochracea* Mg. — I. Kecskemét. IV. H.-Rokitó. V. Tasnád. VII. Brušane.
6. *appendiculata* Staeg. — V. Götzenberg. VI. Resicza.
7. *propinqua* Egg. — I. Budapest, Kecskemét, Visegrád.

Trichosticha Schin.

8. *maculata* Mg. — IV. H.-Rokitó. V. Götzenberg. VI. Herkulesfürdő, Krassó, Orsova.
9. *trivialis* Mg. — I. Debreczen, Visegrád.
10. *flavescens* L. — I. Visegrád. II. Sopron. IV. Bártfa. V. Tasnád.
11. *lutea* Mg. — I. Kecskemét. II. Sopron.
12. *fuscipennis* Mg. — I. Kecskemét. V. Tasnád. VI. Herkulesfürdő, Orsova.
13. *subfasciata* Lw. — I. Visegrád.
14. *pallens* Lw. — III. Tátra.

Cladura Lw.

15. *fuscula* Lw. — VI. Herkulesfürdő.

Spyloptera Rond.

16. *haemorrhoidalis* Zett. — VI. Brassó. VII. Vrdnik.

Dasyptera Schin.

17. *distincta* Egg. — I. Visegrád.
18. *lineata* Mg. — I. Kecskemét. II. Visegrád. V. Peér.
19. *nodulosa* Meg. — VI. Herkulesfürdő.

Rhypholophus Kolen.

20. *pentagonalis* Lw. — VI. Herkulesfürdő, Orsova.
21. *phryganopterus* Kolen. — I. Kecskemét.
22. *helveticus* Lw. *var.* — V. Bucsecs.

Gonomyia O. Sacken.

23. *pulchripennis* Lw. — I. Budapest. II. Ad lacum Fertő.
24. *tenella* Mg. — I. Kecskemét. IV. Szerencs, Tolcsva. V. Peleszarvad, Tasnád.
25. *scutellata* Egg. — IV. Rabaskala.
26. *lurida* Lw. — IV. H.-Rokitó.

Symplecta Mg.

27. *stictica* Mg. — I. Budapest, Kalocsa, Kecskemét. II. Sopron. V. Nagyszeben. Tasnád. VI. Herkulesfürdő.
28. *punctipennis* Mg. — I. Kecskemét. II. Sopron. IV. Tokaj. VI. Mehádia, Orsova.

29. *similis* Schum. — V. Nagyszeben. VI. Krassó.
30. *Frivaldszkyi* Madarassy. — I. Kecskemét.

Kowarzia Lw.

31. *grata* Lw. — I. Kecskemét. II. Ad lacum Fertő.

Tricyphona Zett.

32. *immaculata* Mg. — VI. Herkulesfürdő, Krassó.
33. *livida* Madarassy. — VI. Ferenczfalva, Krassó.

Dicranota Zett.

34. *bimaculata* Schum. — VI. Herkulesfürdő.
35. *brevitarsis* Bergroth. — V. Negoi.
36. *subtilis* Lw. — III. Tátra.

Ula Hal.

37. *pilosa* Schum. — I. Budapest, Kecskemét.

Amalopis Hal.

38. *tipulina* Egg. — IV. Bártfa.
39. *Schineri* Kolen. — V. Götzenberg.
40. *occulta* Mg. — VI. Krassó.

Pedicia Latr.

41. *rivosa* L. — II. Sopron. V. Negoi.

Penthoptera Schin.

42. *chirothecata* Scop. — II. Sopron. VII. Brušane.
43. *cimicoides* Scop. — II. Sopron. IV. Bártfa.

Trichocera Mg.

44. *maculipennis* Mg. — I. Budapest, Kecskemét. V. Tasnád.
45. *regelationis* Lin. — I. Budapest, Kecskemét, Péczel. V. Montes Cibinienses, Nagyszeben.
46. *annulata* Mg. — IV. Bártfa.
47. *hiemalis* Deg. — I. Budapest. V. Nagyszeben.
48. *fuscata* Mg. — I. Budapest, Kalocsa.

Ephelia Schin.

49. *mundata* Lw. — VI. Herkulesfürdő.

Idioptera Mcq.

50. *trimaculata* Zett. — IV. Bártfa. —VI. Herkulesfürdő.

Limnophila Mcq.

51. *hospes* Egg. — IV. Rabaskala. V. Negoi.
52. *nemoralis* Mg. — I. Budapest, Kecskemét. V. Peleszarvad, montes Schuler, Tasnád. VI. Herkulesfürdő, Resicza.
53. *plebeja* Mg. — VII. Brušane.
54. *fuscipennis* Mg. — I. Budapest. III. Tátra. IV. Bártfa, Nagymihály. VII. Gospić Mts. Karst.
55. *discicollis* Mg. — IV. Homonna. VI. Herkulesfürdő, Resicza.
56. *ferruginea* Mg. — III. Rozsnyó. IV. Bártfa. V. Tasnád.
57. *ochracea* Mg. — I. Kecskemét. IV. H.-Rokitó. V. Tasnád. VI. Herkulesfürdő.
58. *lucorum* Mg. — VI. Herkulesfürdő.
59. *fulvonervosa* Schum.— I. Kalocsa. IV. Rabaskala.
60. *placida* Mg. — IV. Bártfa.
61. *stigmosa* Mcq. — I. Budapest.
62. *lineola* Mg. — III. Rozsnyó.

Poecilostola Schin.

63. *angustipennis* Mg. — I. Budapest.
64. *pictipennis* Mg. — I. Budapest, Hajós, Kecskemét. II. Sopron. IV. Tokaj. V. Peér. VI. Herkulesfürdő.
65. *punctata* Mg. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Sopron. IV. Homonna. V. Szilágy-Nagyfalu, Tasnád.
66. *barbipes* Mg. — I. Budapest.

Epiphragma O. Sacken.

67. *picta* F. — I. Budapest. II. Sopron. IV. Perecseny. VI. Herkulesfürdő. VII. Karst.

Dactylolabis O. Sacken.

68. *dilatata* Lw. — VIII. Fiume.
69. *Frauenfeldi* Egg. — VI. Herkulesfürdő.
70. *tergestina* Egg. — VI. Herkulesfürdő. VII. Karst. VIII. Crkvenica.
71. *symplectoides* Egg. — VIII. Fiume.
72. *gracilipes* Lw. — VI. Herkulesfürdő. VII. Karst.
73. *sexmaculata* Mcq. — V. Negoi.

Rhicnoptila Now.

74. *Wodzickii* Now. — III. Tátra (Nowicki).

Elliptera Schin.

75. *omissa* Egg. — I. Kalocsa. V. Bucsecs. VI. Herkulesfürdő. VII. Croatia.
76. *hungarica* Madarassy. — VI. Herkulesfürdő.

Dicranoptycha O. Sacken.

77. *fuscescens* Schum. — IV. Imreg, Vihorlat. V. Tasnád. VII. Brušane, Gospić.
78. *microstigma* Sch. — VII. Montes Kapella.

Rhamphidia Mg.

79. *longirostris* Mg.—I. Budapest, Mátra. II. Sopron. IV. S.-A.-Ujhely.
80. *inornata* Mg. — I. Budapest.

Rhiphidia Mg.

81 *uniseriata* Schin. — V. Peleszarvad.

Limnobia Mg.

82. *quadrinotata* Mg. — I. Budapest, Kecskemét. IV. Bártfa. V. Tasnád.

83. *pannonica* Kow. — I. Kecskemét. III. Losoncz. V. Tasnád. VI. Herkulesfürdő.

84. *nubeculosa* Mg. — I. Budapest. II. Sopron. VI. Herkulesfürdő.

85. *flavipes* F. — I. Budapest. II. Sopron. IV. S.-A.-Ujhely. V. Bucsecs, montes Schuler, Tasnád. VI. Herkulesfürdő, Resicza. VII. Brušane, Vaganski Vrh.

86. *nigropunctata* Schum. — I. Budapest. II. Sopron. III. Koritnicza. V. Zilah.

87. *taurica* Strobl. — V. Negoi.

88. *xanthoptera* Mg. — V. Szt-Gotthardt. Tasnád. VI. Herkulesfürdő.

89. *tripunctata* F. — I. Budapest, Kecskemét, Nagyvárad. II. Sopron. IV. Erdőbénye, Rabaskala. V. Pele, Szilágy-Somlyó. VI. Herkulesfürdő. VII. Brušane, Gospić.

90. *ornata* Mg. — I. Budapest.

91. *chorea* Mg. — I. Budapest, Kecskemét. II. Sopron. IV. S.-A.-Ujhely. V. Nagyszeben, Tasnád. VI. Herkulesfürdő.

92. *dumetorum* Mg. — VI. Herkulesfürdő.

93. *trinotata* Mg. — I. Budapest, Kecskemét. IV. Bártfa. VI. Herkulesfürdő.

94. *modesta* Mg. — I. Budapest, Csongrád, Kecskemét. IV. Vihorlat. V. Zilah.

95. *macrostigma* Schum. — VI. Herkulesfürdő. VII. Karst.

96. *croatica* Egg. — VII. Croatia (apud Schiner).

97. *morio* F. — I. Budapest. VI. Herkulesfürdő.

98. *pilipennis* Egg. — VI. Herkulesfürdő.

99. *tristis* Schum. — V. Peleszarvad. VI. Herkulesfürdő.

100. *analis* Mg. — VI. Herkulesfürdő.

101. *decemmaculata* Lw. — VI. Herkulesfürdő, Kazán, Alpes Kernecska-Csóka (Com. Krassó-Szörény).

102. *stigma* Mg. — I. Kecskemét.

103. *albifrons* Mg. — V. Montes Schuler. VII. Karst.

Trochobola O. Sacken.

104. *caesarea* O.-Sacken. — IV. Orosz-Poruba.

Cylindrotoma Mcq.

105. *glabrata* Mg. — IV. Bártfa.

106. *distinctissima* Mg. — IV. Bártfa, Nagymihály, Rabaskala.

Ptychoptera Mg.

107. *scutellaris* Mg. — IV. Bártfa.

108. *albimana* F. — I. Budapest, Kalocsa, Kecskemét, Péczel. II. Sopron.

109. *contaminata* L. — I. Budapest, Debreczen, Kalocsa. II. Sopron. III. Rozsnyó. VII. Eszék.

110. *lacustris* Mg. — IV. Szőllőske.

111. *paludosa* Mg. — I. Kalocsa. II. Sopron. III. Rozsnyó. VI. Herkulesfürdő.

Dolichopeza Curt.

112. *silvicola* Curt. — VII. Brušane.

Pachyrhina Mcq.

113. *pratensis* L. — I. Budapest, Debreczen, Kalocsa, Kecskemét, Nagyvárad. II. Dunaföldvár, Sopron. III. Kassa, Késmárk, Lőcse. IV. Varannó. V. Nagyszeben, Peér, Tasnád. VI. Herkulesfürdő, Resicza.

114. *flavipalpis* Mg. — V. Nagyszeben.

115. *imperialis* Mg. — I. Beél, Budapest, Kecskemét, Nagyvárad. VI. Herkulesfürdő.

116. *crocata* L. — I. Budapest, Kalocsa. II. Sopron. IV. S.-A.-Ujhely. VI. Herkulesfürdő.

117. *lunulicornis* Schum. — IV. S.-A.-Ujhely. VI. Herkulesfürdő, Mehádia.

118. *quadrifaria* Mg. — I. Budapest. II. Sopron. IV. S.-A.-Ujhely. VI. Herkulesfürdő.

119. *analis* Schum. — V. Székely-Keresztur. VI. Herkulesfürdő.

120. *iridicolor* Schum. — I. Budapest, Kecskemét. III. Rozsnyó. IV. Imreg, Szomotor, Tolcsva. VII. Raduč. VIII. Crkvenica.

121. *scurra* Mg. — V. Peér, Tasnád.

122. *maculosa* Mg. — I. Budapest, Kecskemét. II. Sopron. IV. Kis-Azar, S.-A.-Ujhely. V. Pele, Tasnád.

123. *histrio* F. — In omnibus regionibus communis.

124. *aculeata* Lw. — I. Budapest. III. Tátra. VI. Herkulesfürdő, Resicza. VII. Raduč. VIII. Crkvenica.

125. *cornicina* L. — I. Beél, Budapest, Kecskemét, Nagyvárad, Rézbánya. III. Szliács. V. Zilah, Zovány. VI. Herkulesfürdő.

Nephrotoma Mg.

126. *dorsalis* F. — I. Kalocsa. II. Sopron. IV. Imreg, Tokaj.

Tipula L.

127. *gigantea* Schrk. — I. Budapest, Kalocsa, Vaskoh. II. Sopron. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Tolcsva. V. Zilah, O.-Valkó. VI. Ferenczfalva, Herkulesfürdő, Mehádia.

128. *nigra* L. — I. Budapest, Kecskemét, Maglód. II. Sopron. IV. Bártfa, Rabaskala. Szobráncz. V. Nagyszeben, Peleszarvad, Tasnád.
129. *lutescens* F. — V. Montes Cibinenses.
130. *vittata* Mg. — II. Sopron.
131. *tenuicornis* Schum. — VII. Karst.
132. *truncorum* Mg. — III. Rozsnyó. V. Nagyszeben. VI. Herkulesfürdő.
133. *pabulina* Mg. — VI. Herkulesfürdő.
134. *Winnertzi* Egg. — III. Montes Tátra. VII. Karst.
135. *heros* Egg. — IV. S.-A.-Ujhely. VI. Herkulesfürdő. VIII. Fiume.
136. *nervosa* Mg. — III. Chocs. V. Montes Cibinenses, Negoi.
137. *hortensis* Mg. — III. Rozsnyó. V. Montes Cibin.
138. *hortulana* Mg. — V. Montes Cibinienses.
139. *varipennis* Mg. — IV. Vihorlat. VI. Herkulesfürdő. VII. Karst. VIII. Crkvenica.
140. *pictipennis* Staeg. — II. Sopron. VI. Herkulesfürdő. VII. Karst.
141. *excisa* Schum. — VI. Capo Muntye.
v. *cinerea* Strobl. — Montes Cibinenses, Negoi, montes Schuler.
142. *scripta* Mg. — I. Beél, Budapest, Debreczen, Kecskemét, Nagyvárad, Rév, Rézbánya. II. Sopron. III. Koritnicza. V. Nagyszeben, montes Schuler. VII. Karst.
143. *nubeculosa* Mg. — I. Budapest. II. Sopron. IV. Rank. V. Tasnád. VII. Karst. VIII. Crkvenica.
144. *obsoleta* Mg. — IV. S.-A.-Ujhely.
145. *vernalis* Mg. — I. Budapest, Kecskemét, Nagyvárad. IV. S.-A.-Ujhely. V. Pele.
146. *cæsia* Schum. — I. Budapest. II. Sopron. III. Beszterczebánya. IV. Szőllőske.
147. *marginata* Mg. — I. Budapest. IV. S.-A.-Ujhely.
148. *lateralis* Mg. — I. Belényes, Budapest, Élesd, Nagyvárad. II. Sopron. IV. Páczin, S.-A.-Ujhely. Tolcsva. VI. Herkulesfürdő, Resicza.
149. *montium* Egg. — V. Nagyszeben.
150. *paludosa* Mg. — I. Budapest, Kecskemét. II. Sopren. IV. S.-A.-Ujhely. V. Tasnád.
151. *oleracea* L. — In omnibus regionibus frequens.
152. *nodicornis* Mg. — I. Budapest, Csepel, Kecskemét. VI. Herkulesfürdő.
153. *stigmatella* Schum. — I. Kecskemét. VI. Herkulesfürdő, Resicza.
154. *ochracea* Mg. — I. Budapest, Debreczen, Kalocsa, Kecskemét, Nagyvárad. II. Sopron. III. Rozsnyó, Szliács. IV. S.-A.-Ujhely. V. Nagyszeben. VI. Herkulesfürdő. VII. Brušane, Sveto Brdo, Raduč.
155. *cinerascens* Lw. — I. Budapest. IV. Bártfa. VI. Resicza.
156. *alpina* Lw. — V. Montes Schuler.
157. *peliostigma* Schum. — I. Budapest. II. Sopron. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely. VI. Ferenczfalva, Herkulesfürdő. VII. Brušane. VIII. Zengg.
158. *affinis* Schum. — VII. Brušane, Gospić. VIII. Buccari.
159. *fascipennis* Mg. — II. Sopron. IV. Erdőbénye, S.-A.-Ujhely, Tolcsva.
160. *variicornis* Schum. — VI. Herkulesfürdő.
161. *helvola* Lw. — IV. Imreg. V. Peleszarvad, Tasnád. VI. Herkulesfürdő, Plavisevica, Resicza.
162. *pannonica* Lw. — VI. Herkulesfürdő.
163. *truncata* Lw. — Herkulesfürdő, Orsova.
164. *bispina* Lw. — VI. Herkulesfürdő.

Ctenophora Mg.

165. *bimaculata* L. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Sopron. III. Koritnicza, Rozsnyó. IV. Vihorlat. V. Görcsön, Nagyszeben, Zilah. VI. Herkulesfürdő.
166. *atrata* L. — I. Budapest, Kecskemét, Nagyvárad. II. Sopron. III. Rozsnyó. IV. Szinnaikő, Sztropkó-Olyka, Vihorlat. V. Götzenberg, Magyarpatak. VI. Herkulesfürdő.
v. *ruficornis* Mg. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Sopron. V. Nagyszeben, Zilah.
167. *pectinicornis* L. — I. Budapest, Kalocsa, Kecskemét. II. Sopron. V. Szt-Erzsébet, Gregoriberg.
168. *flaveolata* F. — I. Budapest. III. Rozsnyó. V. Nagyszeben.
169. *guttata* Mg. — I. Budapest. II. Sopron. IV. Bártfa. VI. Herkulesfürdő.
170. *ornata* Mg. — I. Budapest, Kalocsa, Rézbánya. VI. Herkulesfürdő.
171. *festiva* Mg. — I. Debreczen, Kalocsa, Nagyvárad. IV. Bártfa. V. Nagyszeben. VI. Mehádia.
172. *elegans* Mg. — I. Kalocsa. IV. S.-A.-Ujhely. VI. Herkulesfürdő.

Fam. LONCHOPTERIDAE.

Lonchoptera Mg.

1. *lutea* Pz. — I. Budapest, Kalocsa. II. Dunaföldvár. III. Tátra. VI. Mehádia. VII. Eszék.
2. *trilineata* Ztt. — I. Kalocsa. V. Bucsecs, Götzenberg, montes Schuler. VII. Brušane, Montes Kapella.
3. *punctum* Mg. — I. Budapest, Gyón, Rákos-Csaba III. Tátra. V. Montes Cibinienses.
4. *lacustris* Mg. — I. Budapest, Kalocsa. VI. Deliblat. VII. Brušane. V. Nagyszeben.
5. *tristis* Mg. — I. Budapest, Gyón. III. Rózsahegy. V. Nagyszeben.

Fam. STRATIOMYIDAE.

Pachygaster Mg.

1. *ater* F. — Budapest, Kalocsa, Nagyvárad, Szeghalom. II. Bodajk, Dunaföldvár, Őszöd, Pápa, Sopron. III. Hermanecz, Trencsén. IV. Homonna, S.-A.-Ujhely. V. Mezőség. VI. Deliblat, Mehádia, Orsova. VII. Eszék. VIII. Fiume.
2. *Leachii* Curt. — I. Budapest. II. Barcs. III. Hermanecz. VI. Kazán. VIII. Fiume.

Nemotelus Geoffr.

3. *pantherinus* L. — I. Budapest, Debreczen, Kalocsa, Kecskemét, Nagyvárad, Péczel. II. Barcs, Dunaföldvár, Sopron. Tapolcza. IV. Szobráncz, Varannó. VI. Deliblat, Grebenácz, Oravicza, Orsova. VII. Eszék.
4. *globuliceps* Lw. — I. Budapest, Kalocsa. II. Balf, ad lacum Fertő, Sopron. VI. Retyezát.
5. *uliginosus* L. — I. Budapest, Kalocsa, Kecskemét, Peszér. II. Ad lacum Fertő, Őszöd. III. Parád. IV. Varannó.
6. *plagiatus* Schin. — I. Peszér. II. Balf, ad lacum Fertő. IV. S.-A.-Ujhely, Szobráncz. V. Tusnád.
7. *luteicornis* Egg. — II. Ad lacum Fertő.
8. *notatus* Zett. — II. Ad lacum Fertő.
9. *nigrinus* Fll. — I. Budapest, Kalocsa. II. Sopron. III. Turcsek. VII. Eszék.
10. *signatus* Friv. — I. Budapest, Debreczen, Hajós, Hild, Kalocsa, Kecskemét, Nagyvárad. II. Dunaföldvár, ad lacum Fertő. VI. Deliblát, Grebenácz, Oravicza.
11. *brevirostris* Mg. — II. Ad lacum Fertő. V. Vizakna.
12. *brachystomus* Lw. — II. Ad lacum Fertő.

Lasiopa Br.

13. *villosa* F. — I. Budapest, Debreczen, Nagyvárad. II. Őszöd, Pápa, Pécs, Sopron. III. Trencsén. IV. Páczin. V. Peér. VI. Allion, Deliblat, Mehádia, Resicza.
14. *calva* Mg. — I. Budapest, Hild, Péczel. II. Ad lacum Fertő, Sopron. V. Mezőség.
15. *tenuirostris* Lw. — III. Jaszenova. VI. Báziás. VII. Fruska-Gora. VIII. Buccari, Fiume.

Clitellaria Mg.

16. *Dahlii* Mg. — VI. Orsova. VIII. Fiume.

Ephippium Ltr.

17. *thoracicum* Ltr. — I. Budapest, Debreczen, Kalocsa, Vadkert. II. Dunaföldvár, Tapolcza. III. Pozsony, Trencsén. IV. Tokaj. VI. Mehádia. VIII. Fiume.

Oxycera Mg.

18. *trilineata* F. — I. Beél, Budapest, Debreczen, Kalocsa, Nagyvárad, Péczel. II. Dunaföldvár, ad lacum Fertő, Tapolcza. V. Gyeke. VI. Deliblat Mehádia, Orsova.
19. *terminata* Mg. — I. Kalocsa.
20. *leonina* Pz. — II. Sopron. IV. Tokaj. V. Tusnád. VI. Resicza.
21. *pardalina* Mg. — I. Kecskemét. V. Bucsecs.
22. *muscaria* F. — VII. Brušane. VIII. Crkvenica.
23. *dives* Lw. — III. In montibus Tátra.
24. *pulchella* Mg. — I. Budapest.
25. *Meigenii* Staeg. — I. Budapest, Kalocsa II. Sopron. III. Trencsén.
26. *Fallenii* Staeg. — VI. Resicza.
27. *limbata* Lw. — VI. Mehádia.

Alliocera Saund.

28. *clavicornis* Egg. — VII. Croatia. VIII. Fiume.

Stratiomyia Geoffr.

29. *chamaeleon* L. — I. Budapest, Debreczen, Kalocsa, Nagyvárad. II. Dunaföldvár, Pápa, Sopron, Tapolcza. III. Borosznó, Jaszenova, Koritnicza, Poprád, Trencsén. IV. Szobráncz, Tolcsva. V. Nagy-Ajta, Peér, Kolozsvár, Tusnád, Vizakna, Szénaverős (Zendrisch). VI. Deliblat, Grebenácz, Oravicza.
30. *cenisia* Mg. — I. Budapest, Kalocsa, Nagyvárad. II. Pécs, Sopron, Szálka. III. Szliács. VI. Herkulesfürdő.
31. *concinna* Mg. — V. Mezőség. VI. Mehádia.
32. *equestris* Mg. — I. Budapest, Kalocsa, Kecskemét. II. Sopron. V. Tasnád, Kis-Csűr, Vizakna.
33. *erythrocera* Egg. — III. Koritnicza, Rózsahegy, Trencsén. VI. Herkulesfürdő, Resicza. VII. Raduč.
34. *sublunata* Lw. — III. Tátra. V. Transsylvania.
35. *furcata* F. — I. Budapest, Nagyvárad, Peszér. II. Pápa, Sopron, Tapolcza. III. Jaszenova. IV. Páczin. V. Mezőség. VI. Báziás.
36. *longicornis* Scop. — I. Budapest, Kalocsa, Kecskemét, Maglód, Nagyvárad. II. Dunaföldvár, Kapornak, Sopron, Tapolcza. IV. S.-A.-Ujhely. V. Nagyszeben, Peér. VI. Deliblat, Orsova.
37. *riparia* Mg. — I. Debreczen, Kalocsa, Vadkert. II. Dunaföldvár.

Odontomyia Mg.

38. *tigrina* F. — I. Budapest, Kalocsa, Hajós. II. Duna-Örs, ad lacum Fertő. IV. Lelesz, Páczin. V. Mezőség.
39. *flavissima* Rossi. — I. Budapest, Peszér. VI. Mehádia. VIII. Carlopago.

40. *ornata* Mg. — I. Budapest, Kalocsa. II. Duna-Örs, ad lacum Fertő, Kup. IV. Szomotor. V. Mezőség.
41. *annulata* Mg. — I. Budapest, Peszér. II. Fertőpart. VI. Mehádia, Szemenik, Ulma.
42. *viridula* F. — Communis.
v. *interrupta* Mg. — V. Nagyszeben.
v. *jejuna* Pz. — I. Kalocsa. II. Dunaföldvár.
43. *hydroleon* L. — I. Budapest, Debreczen. II. Dunaföldvár. III. Beszterczebánya, Koritnicza, Szliács, Trencsén. IV. Tokaj. VI. Grebenácz, Korniaréva.
44. *angulata* Pz. — I. Budapest, Kalocsa, Kecskemét. II. Fertőpart. V. Nagyszeben, Vizakna. VI. Grebenácz. VII. Sveto Brdo, Vaganski Vrh.
45. *hydropota* Mg. — I. Budapest, Gyón, Kalocsa. IV. Tolcsva.
46. *argentata* F. — I. Budapest, Péczel. II. Ad lacum Fertő.
47. *hydrophila* Lw. — I. Budapest. VI. Grebenácz.
48. *periscelis* Lw. — VI. Orsova.

Sargus F.

49. *bipunctatus* Scop. — I. Budapest, Kalocsa. II. Budafok, ad lacum Fertő. III. Tátra.
50. *infuscatus* Mg. — II. Sopron, Szálka.
51. *cuprarius* L. — Ubique communis.
52. *nubeculosus* Zett. — I. Budapest.
53. *flavipes* Mg. — I. Rézbánya. III. Koritnicza.
v. *pedibus flavis.* — V. Vöröstorony szoros.

Chrysomyia Meg.

54. *formosa* Scop. — Ubique communis.
55. *melampogon* Zell. — I. Budapest, Kalocsa, Peszér. II. Pécs, Sopron, Szegzárd, Tapolcza. III. Trencsén. IV. Rokitó, Varannó. V. Nagy-Ajta. VI. Deliblat, Mehádia, Ulma. VII. Raduč. VIII. Buccari.

Microchrysa Lw.

56. *polita* L. — I. Budapest, Kalocsa, Kecskemét. II. Dunaföldvár, Pápa, Sopron. IV. Tolcsva. V. Nagyszeben.

Acanthomyia Schin.

57. *dubia* Zett. — IV. Csicsva.

Beris Latr.

58. *clavipes* L. — I. Budapest, Debreczen. II. Sopron. V. Nagyszeben. VI. Mehádia.
59. *chalybeata* Forst. — I. Rézbánya, Vaskoh. II. Sopron. III. Trencsén, Turcsek.
60. *fuscipes* Mg. — I. Kalocsa, Visegrád. II. Sopron. III. Trencsén. VI. Orsova, Steierlak.
61. *geniculata* Curt. — VI. Orsova, Resicza.
62. *Morrisii Dale.* — I. Budapest, Kalocsa, Kecskemét. II. Sopron. IV. Rabaskala. V. Götzenberg, montes Schuler.

Actina Mg.

63. *nitens* Latr. — I. Debreczen, Kalocsa, Nagyvárad. II. Sopron. III. Rozsnyó. IV. Lelesz. VI. Orsova.
64. *tibialis* Mg. — I. Budakesz, Kalocsa. II. Ad lacum Fertő.

Fam. XYLOPHAGIDAE.

Subula Mg.

1. *maculata* F. — I. Budapest, Kalocsa. IV. Kis-Azar.
2. *marginata* Mg. — I. Budapest, Kalocsa, Kecskemét. II. Dunaföldvár. IV. Alsó-Bereczki.
3. *varia* Mg. — I. Kalocsa. IV. Ungvár. VI. Orsova.

Xylophagus Mg.

4. *ater.* — VI. Mehádia, Resicza.
5. *cinctus* Deg. — III. In monte Szitnya teste D. Petricskó apud Petrogalli.

Coenomyia Latr.

6. *ferruginea* Scop. — I. Budapest, Debreczen. III. Znió-Váralja. IV. Rabaskala, Ungvár, Vihorlat. VI. Domoglet, Korniaréva, Mehádia. VII. Capella, Vaganski Vrh. VIII. Carlopago.

Fam. TABANIDAE.

Haematopota Mg.

1. *pluvialis* L. — Communissima.
2. *crassicornis* Whlb. — I. Kecskemét. IV. Páczin.
3. *italica* Mg. — Sparsim ubique occurrit.
4. *variegata* F. — I. Budapest, Kalocsa, Kecskemét. II. Sopron. VI. Resicza. VII. Samobor, Zágráb.

Hexatoma Mg.

5. *pellucens* F. — I. Kecskemét. III. Trencsén. VI. Resicza.

Tabanus L.

6. *aterrimus* Mg. — III. Koritnicza, Körmöczbánya, Mons Prasiva, Rozsnyó, Trencsén.
v. *auricinctus* Mg. — I. Debreczen.
v. *auripilus* Mg. — V. Negoi.
7. *montanus* Mg. — I. Beél, Budapest, Debreczen. III. Koritnicza. IV. Prasiva. V. Montes Cibinienses Görgény. VI. Mehádia. VIII. Fiume.

8. *luridus* Fll. — II. Ad lacum Fertő. IV. Vihorlat.
9. *solstitialis* Schin. — I. Budapest, Kalocsa, Nagyvárad. II. Ad lacum Fertő. IV. Páczin, S.-A.-Ujhely, Szomotor, Tokaj. V. Vizakna. VI. Grebenácz.
10. *lateralis* Megerle ap. Meig. — I. Kecskemét, Nagyvárad. II. Tapolcza. III. Rozsnyó. V. Vizakna. VI. Mehádia. VII. Josipdol. VIII. Fiume.
11. *nigricornis* Zett. — Teste Brauer Hungariæ incola.
12. *umbrinus* Hffgg. — VIII. Fiume.
13. *gigas* Herbst. — III. Pozsony, Nagy-Tapolcsány.
14. *plebejus* Fall. — I. Kecskemét.
15. *rusticus* F. — I. Budapest, Debreczen, Kalocsa, Kecskemét. II. Ad lacum Fertő, Pápa. III. Koritnicza, Nagy-Rőcze. IV. Mezőlaborcz, Páczin, S.-A.-Ujhely, Szobráncz, Szomotor. V. Vizakna. VI. Mehádia.
16. *fulvus* Mg. — I. Budapest, Kalocsa, Kecskemét. II. Ad lacum Fertő. III. Beszterczebánya, Koritnicza, Mons Prasiva, Rozsnyó, Szliács. IV. Homonna-Olyka, Tolcsva. V. Nagyszeben, Vizakna.
17. *lunatus* F. — I. Kecskemét.
18. *bifarius* Lw. — I. Budapest, Debreczen, Kecskemét, Nagyvárad. II. Ad lacum Fertő. IV. Tokaj. VIII. Fiume.
19. *quatuornotatus* Mg. — I. Budapest. II. Ad lacum Fertő. III. Szitnya. IV. S.-A.-Ujhely, Tállya, Tolcsva. V. Szt-Erzsébet. VI. Herkulesfürdő. VIII. Fiume.
20. *apricus* Mg. — III. Koritnicza, Mons Prasiva, Trencsén. VI. Mehádia.
21. *graecus* F. — I. Nagyvárad. II. Ad lacum Fertő. VI. Orsova. VII. Raduč. VIII. Buccari, Fiume.
22. *spodopterus* Mg. — I. Budapest. II. Dunaföldvár, ad lacum Fertő. III. Beszterczebánya, Koritnicza, Nagy-Rőcze, Prasiva, Szitnya. V. Montes Cibinienses, Szent-Erzsébet, Nagyszeben. VI. Krassova, Herkulesfürdő, Orsova, Resicza, Szemenik.
23. *sudeticus* Zett. — VI. Mehádia.
24. *bovinus* Lw. — I. Debreczen, Kalocsa. II. Dunaföldvár. V. Gyulafehérvár. VII. Eszék, Josipdol.
25. *bromius* L. — Communis.
26. *tergestinus* Egg. — I. Kalocsa. II. Tapolcza. IV. S.-A.-Ujhely, Vihorlat. VI. Krassova, Szemenik. VII. Josipdol.
27. *spectabilis* Lw. — I. Kalocsa. VI. Mehádia.
28. *autumnalis* L. — Communis.
29. *maculicornis* Ztt. — I. Beél. VII. Raduč.
30. *glaucopis* Mg. — III. Koritnicza, Prasiva. IV. S.-A.-Ujhely.
31. *cognatus* Lw. — VII. Josipdol.
32. *cordiger* Wied. ap. Mg. — I. Beél, Budapest, Élesd, Nagyvárad. V. Montes Cibinienses, Nagyszeben. VI. Orsova, Szemenik. VIII. Fiume.
33. *unifasciatus* Lw. — II. Ad lacum Fertő, Pécs.
34. *ater* Rossi. *Teste* Brauer etiam Hungariam et Croatiam incolit. — VIII. Fiume.
35. *paradoxus* Jaennicke. — Auctore teste in Hungaria lectus.
36. *rupium* Brauer. — V. In montibus Cibiniensibus legit Strobl.

Sylvius Mg.

37. *vituli* F. — Communis.
38. *hirtus* Lw. — V. Kolozsvár.

Chrysops Mg.

39. *marmoratus* Rossi. — I. Budapest, Kecskemét, Nagyvárad.
40. *perspicillaris* Lw. — I. Budapest. III. Parád. VI. Grebenácz.
41. *rufipes* Mg. — I. Dabas, Kalocsa.
42. *sepulcralis* F. — I. Kalocsa. III. Rózsahegy.
43. *quadratus* Mg. — I. Budapest, Debreczen, Kalocsa, Nagyvárad. II. Ad lacum Fertő. III. Jassenova. IV. Kapronca. V. Vizakna.
44. *caecutiens* L. — Communis.
45. *relictus* Mg. — Pariter communis.
46. *parallelogrammus* Zell. — I. Nagyvárad. IV. Nagymihály.

Pangonia Latr.

47. *marginata* F. — I. Budapest.
48. *maculata* Rossi. — Teste Schiner Hungariam colere dicitur.

Fam. LEPTIDAE.

Leptis F.

1. *scolopacea* L. — Communis.
2. *latipennis* Lw. — V. Götzenberg.
3. *strigosa* Mg. — I. Belényes, Budapest, Debreczen, Nagyvárad. II. Sopron, Szálka. IV. Vihorlat.
4. *maculata* Deg. — I. Budapest. IV. Simonka, Vihorlat. VI. Mehádia. VII. Teste Schiner Croatia.
5. *immaculata* Mg. — II. Sopron. III. Nagy-Rőcze. IV. Homonna-Olyka, Parnó, Szinna, Szobráncz. V. Kovászna.
6. *vitripennis* Mg. — In omnibus regionibus lecta.
7. *notata* Mg. — I. In montibus Biharienses. IV. Rabaskala. V. Negoi, montes Schuler.

8. *monticola* Egg. — I. Budapest.
9. *lineola* F. — II. Sopron. III. Rózsahegy, Rozsnyó.
10. *tringaria* L. — Communissima.
11. *conspicua* Mg. — In montanis ubique legitur.
12. *subpilosa* Beck. — Teste auctore Hungariæ incola.
13. *cingulata* Lw. — III. Trencsén.

Chrysopila Mcq.

14. *nubecula* Fll. — I. Budapest. III. Koritnicza, Nagy-Rőcze. V. Bucsecs, Götzenberg, Montes Schuler. VIII. Buccari.
15. *aurea* Mg. — I. Budapest. II. Sopron, Szálka. VI. Dognácska, Mehádia.
16. *nigrita* F. — I.. Budapest. II. Sopron. V. Orlát. VI. Báziás, Grebenácz.
17. *chlorophthalma* Lw. — I. Budapest. IV. Bresztó, Homonna. VI. Domuglet.
18. *luteola* Mg. — IV. Kukahegy.
19. *atrata* F. — I. Debreczen. II. Sopron, Szálka. III. Rozsnyó, Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely. VI. Krassó.
20. *helvola* Mg. — II. Sopron. IV. Bánszka, Erdőbénye, S.-A.-Ujhely, Vihorlat. V. Nagyszeben, Orlát.
21. *flaveola* Mg. — II. Sopron.
22. *maerens* Lw. — VI. Herkulesfürdő.

Atherix Mg.

23. *Ibis* F. — III. Trencsén. VI. Domoglet, Mehádia, Orsova.
24. *marginata* F. — II. Sopron. VI. Mehádia, Orsova.

Symphoromyia Frfld.

25. *melaena* Mg. — I. Budapest. III. Montes Tátra. VI. Domoglet, Mehádia, Orsova.
26. *crassicornis* Pz. — III. Montes Tátra. V. Vallis Tiszcsora. VI. Mehádia.
27. *immaculata* F. — VI. Mehádia, Orsova.
28. *lapidaria* Now. — III. Mons Babia-Gura.
29. *Wodzickii* Now. — III. Montes Tátra.

Spania Mg.

30. *grisea* Mg. — V. Mons Bucsecs.

Fam. ACROCERIDAE.

Oncodes Latr.

1. *zonatus* Erichs. — I. Budapest, Kalocsa, Péczel. II. Boglár, ad lacum Fertő. V. Brassó.
2. *varius* Ltr. — I. Budapest, Peszér. II. Ad lacum Fertő.
3. *apicalis* Mg. — II. Sopron.
4. *gibbosus* Lw. — I. Kalocsa. II. Ad lacum Fertő. V. Vizakna.

Fam. NEMESTRINIDAE.

Hirmoneura Mg.

1. *obscura* Mg. — VIII. Buccari.

Fam. ASILIDAE.

Leptogaster Mg.

1. *cylindricus* Deg. — Communis.
2. *nigricornis* Lw. — VI. Mehádia.
3. *guttiventris* Ztt. — I. Budapest. IV. Szomotor. VI. Orsova.
4. *pubicornis* Lw. — I. Budapest. IV. Jeszenő.

Dioctria Mg.

5. *rufithorax* Lw. — I. Budapest, Kalocsa.
6. *humeralis* Zell. — I. Budapest, Kalocsa. IV. Tokaj.
7. *longicornis* Mg. — I. Budapest, Kalocsa, Hajós. II. Sopron. IV. S.-A.-Ujhely. VI. Báziás, Mehádia.
8. *calceata* Mg. — I. Budapest, Isaszegh. VII. Dálya.
9. *Reinhardi* Mg. — I. Kalocsa. II. Tapolcza. III. Poprád.
10. *lata* Lw. — I. Budapest, Hajós, Kalocsa. VI. Herkulesfürdő.
11. *atricapilla* Mg. — I. Budapest, Budafok. II. Sopron, Szálka. III. Rozsnyó, Szitnya. VI. Mehádia.
12. *aurifrons* Mg. — I. Budapest. VI. Vallis Cserna Herkulesfürdő. VII. Dálya, Eszék.
13. *Hercyniae* Lw. — I. Budapest. II. Dunaföldvár.
14. *laeta* Lw. — VI. Herkulesfürdő.
15. *oelandica* L. — Communis.
16. *rufipes* Deg. — I. Budapest, Kalocsa, Nagyvárad. II. Sopron, Zircz. III. Trencsén. IV. Tokaj, Homonna, Vihorlat. VI. Orsova.
17. *flavipes* Mg. — II. Sopron.
18. *Baumhaueri* Mg. — I. Budapest.
19. *linearis* F. — I. Budapest, Kalocsa, Nagyvárad. II. Sopron. III. Rozsnyó. IV. S.-A.-Ujhely. VI. Herkulesfürdő. VII. Dálya, Eszék.
20. *lateralis* Mg. — I. Budapest, Bánfalva. IV. Sátor-Alja-Ujhely, Tokaj. VI. Grebenácz.
21. *Kowarzi* Friv. — VI. Capo-Muntye, Szemenik.
22. *liturata* Lw. — I. Budapest. III. Losoncz.

Dasypogon Mg.

23. *teutonus* L. — Ubique occurrit.
24. *diadema* F. — In omnibus regionibus inventus.

Saropogon Lw.

25. *axillaris* Lw. — VI. Mehádia.

Xiphocerus Mcq.

26. *glaucius* Rossi. — VI. Mehádia, Ulma.

Stenopogon Lw.

27. *coracinus* Lw. — Teste auctore Hungariæ incola.
28. *callosus* Wied. — I. Budapest, Hild, Keczel. II. Balf. VI. Grebenácz.
29. *sabaudus* F. — I. Budapest, Császártöltés, Peszér. II. Dunaföldvár, Paks. IV. Kövesd, Tokaj. VII. Dálya, Eszék.
30. *tristis* Mg. — Ipso auctore testante in Hungaria occurrit.
31. *elongatus* Mg. — I. Kalocsa. II. Sopron.
32. *ochreatus* Lw. — Teste Frivaldszky in Hungaria lectus.
33. *macilentus* Lw. — Teste Zeller apud Loew hungaricæ originis.

Stichopogon Lw.

34. *albofasciatus* Mg. — I. Császártöltés. VI. Mehádia, Orsova.
35. *elegantulus* Mg. — I. Akasztó, Budapest. IV. Szomotor. VI. Deliblat.
36. *barbistrellus* Lw. — I. Budapest. VI. Grebenácz.
37. *scaliger* Lw. — I. Budapest, Császártöltés. II. Dunaföldvár. VI. Grebenácz.

Holopogon Lw.

38. *clavipes* Lw. — I. Dabas, Kalocsa, Peszér. VI. Grebenácz, Ulma.
39. *dimidiatus* Mg. — I. Budapest. II. Dunaföldvár, ad lacum Fertő. IV. Tokaj.
40. *nigripennis* Mg. — I. Budapest. II. Ad lacum Fertő. IV. Barkó.
41. *fumipennis* Mg. — I. Budapest. II. Dunaföldvár, ad lacum Fertő. IV. Tokaj. VI. Mehádia.

Isopogon Lw.

42. *brevirostris* Mg. — VI. Mehádia.
43. *hottentotus* F. — I. Budapest.

Lasiopogon Lw.

44. *cinctus* F. — II. Sopron. VI. Herkulesfürdő, Korniaréva.
45. *montanus* Schin. — V. Montes Cibinienses.
46. *tarsalis* Lw. — I. Budapest.

Cyrtopogon Lw.

47. *lateralis* Fll. — III. Deményfalva, Koritnicza. VI. Orsova.
48. *maculipennis* Mcq. — III. Deményfalva, Koritnicza, Pozsony. V Montes Cibinienses.
49. *ruficornis* F. — I. Debreczen(?). III. Rozsnyó, Turócz-Szt-Márton. VI. Mehádia. VII. Kapella, Velebit.

Crobilocerus Lw.

50. *megilliformis* Lw. — VI. Domuglet, Herkulesfürdő, Orsova.

Laphria Mg.

51. *maroccana* F. — I. Dabas, Peszér. III. Nógrád, Trencsén. IV. Námesztó. VI. Mons Allion, Orsova. VIII. Carlopago.
52. *ephippium* F. — II. Sopron. III. Koritnicza, Rozsnyó, Trencsén. IV. Szinnaikő, Vihorlat. V. Montes Cibinienses, Tusnád. VI. Mehádia, Szemenik. VII. Raduč, Sveto Brdo.
53. *flava* L. — In montanis ubique occurrit, in planitie apud Nagyvárad lecta.
54. *gibbosa* L. — II. Sopron. VI. Mehádia.
55. *gilva* L. — II. Sopron, Kőszeg. V. Tusnád.
56. *ignea* Mg. — II. Sopron. III. Pozsony, Rozsnyó, Trencsén. V. Montes Cibinienses, VI. Resicza.
57. *fuliginosa* Pz. — Sparsim ubique occurrit.
58. *aurea* F. — Rarior. I. Péczel. II. Pécs. VI. Mehádia.
59. *vulpina* Mg. — Teste Frivaldszky etiam in Hungaria lecta.
60. *fimbriata* Mg. — Passim sed non frequenter invenitur.
61. *fulva* Mg. — In montanis sat frequens, rarior in planitie.
62. *marginata* L. — Sat communis.
    v. *nigra* Mg. — I. Nagyvárad. VI. Herkulesfürdő.
63. *dioctriaeformis* Mg. — I. Budapest. II. Sopron. VI. Mehádia.
64. *rufipes* Fll. — III. Koritnicza. VI. Mehádia.
65. *tibialis* Mg. — III. Rozsnyó.

Andrenosoma Rnd.

66. *atra* L. — In montanis sat frequens.

Asilus L.

67. *pictus* Meigen. — Ipso auctore teste Hungariam colit.
68. *punctipennis* Mg. — In planitie nondum lectus, sed satis frequens in montanis.
69. *setiger* Lw. — VI. Mehádia.
70. *spiniger* Zell. — Invenitur in toto regno.
71. *forcipula* Zell. — Communis.
72. *forcipatus* Lw. — IV. Homonna.

73. *praemorsus* Lw. — I. Kalocsa, Nagyvárad. II. Fertőpart, Sopron. VI. Orsova.
74. *bimucronatus* Lw. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Sopron. VI. Herkulesfürdő, Ulma.
75. *trigonus* Mg. — I. Debreczen, Kalocsa. II. Sopron, Tapolcza. Ceterum sat frequens esse videtur.
76. *basalis* Lw. — I. Kalocsa. V. Montes Cibinienses.
77. *stylifer* Lw. — I. Beél, Budapest. IV. Erdőbénye. VI. Jeselnicza, Orsova.
78. *bilobus* Lw. — IV. S.-A.-Ujhely. VI. Mehádia.
79. *bifurcus* Lw. — I. Budapest, Debreczen, Kalocsa. III. Pozsony. IV. Erdőbénye, Sátor-Alja-Ujhely, Szerencs, Tállya, Tokaj. VI. Mehádia, Orsova.
80. *cochleatus* Lw. — I. Budapest, Kalocsa. II. Sopron. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj.
81. *tricuspis* Lw. — VI. Mehádia. Rarus.
82. *rufibarbis* Mcq. — I. Budapest, Debreczen, Kalocsa, Nagyvárad. II. Sopron, Tapolcza.
83. *sinuatus* Lw. — I. Kecskemét. II. Sopron, ubi frequens esse perhibetur.
84. *annulipes* Brullé. — Vidi exemplar, cujus patria Hungaria asseritur, loci nomine non adjecto.
85. *gonatistes* Zell. — I. Budapest, Debreczen. IV. Kassa, Szomotor. VI. Grebenácz.
86. *rusticus* Mg. — In toto regno non infrequens.
87. *atricapillus* Fll. — Ubique satis frequenter invenitur.
88. *cyanopus* Lw. — I. Budapest, Beél, Kalocsa. IV. Barkó. VI. Jeselnicza, Mehádia, Orsova.
89. *lacinulatus* Lw. — III. Teste D. Petrogalli in regione Trencsiniensi lectus.
90. *modestus* Lw. — VI. Orsova.
91. *flavicornis* Ruthe. — I. Budapest, Kalocsa, Nagyvárad. II. Pécs. IV. Tolcsva. V. Montes Cibinienses.
92. *flavipes* Mg. — I. Budapest, Kalocsa. II. Sopron.
93. *Schineri* Egg. — I. Budapest, Kalocsa. II. Sopron. III. Trencsén.
94. *pallipes* Lw. — I. Kalocsa, Hild. II. Sopron. III. Trencsén.
95. *striatipes* Lw. — I. Budapest.
96. *erythrurus* Mg. — I. Budapest. Rarissimus.
97. *aemulus* Lw. — I. In montibus Bihariensibus legit Joannes Frivaldszky.
v. *setiventris* Ztt. — V. In montibus Cibiniensibus.
98. *cyanurus* Lw. — Satis frequens esse videtur in toto regno.
99. *socius* Lw. — IV. Simonka. V. Bucsecs, montes Cibinienses.
100. *cothurnatus* Mg. — I. Budapest. II. Kup. III. Rozsnyó. V. Kovászna.
101. *atripes* Lw. — I. Kalocsa. II. Sopron. III. Losoncz. V. Götzenberg. VI. Orsova.
102. *pyragra* Zell. — I. Beél, Budapest. III. Koritnicza, Lucsivna.
103. *cingulatus* F. — Communis.
104. *setosulus* Zell. — I. Budapest, Debreczen, Kalocsa. III. Szliács, Trencsén. IV. Tokaj. VI. Grebenácz.
105. *trifarius* Lw. — I. Budapest, Kalocsa. III. Rozsnyó. IV. Szatmár.
106. *germanicus* L. — Satis frequenter occurrit in montanis.
107. *varipes* Mg. — I. Budapest. II. Sopron. VI. Grebenácz, Ulma.
108. *rufinervis* Wied. — Non raro invenitur.
109. *albiceps* Mg. — In montanis rarior, in planitie passim occurrit.
110. *crabroniformis* L. — Sparsim ubique occurrit.

Fam. BOMBYLIDAE.

Anthrax Scop.

1. *Paniscus* Rossi. — I. Budapest, Debreczen, Kalocsa, Péczel. II. Sopron. IV. Kassa, Mád, Tállya.
2. *cingulatus* Schin. — I. Kalocsa, Péczel.
3. *flavus* Mg. — Communis.
4. *hottentotus* Lw. — I. Budapest. II. Sopron. III. Parád. VI. Grebenácz, Herkulesfürdő. VIII. Crkvenica.
5. *humilis* Ruthe. — I. Budapest. VI. Grebenácz, Herkulesfürdő.
6. *Ixion* F. — I. Budapest, Kalocsa. II. Dunaföldvár. VI. Mehádia, Orsova.
7. *afer* F. — I. Kalocsa, Peszér. II. Montes ad Lajtham. IV. Szomotor. VI. Deliblat. VIII. Buccari, Crkvenica.
8. *fenestratus* Fll. — II. Sopron. VI. Herkulesfürdő. VIII. Carlopago, Buccari, S.-Giorgio.
9. *maurus* L. — I. Budapest, Kalocsa, Nagyvárad. II. Sopron, Szálka. III. Parád, Szitnya. VI. Herkulesfürdő. VIII. Buccari, Crkvenica.
10. *morio* L. — Communis.
11. *velutinus* Mg. — I. Budapest. VI. Baziás, Herkulesfürdő, Orsova. VIII. Buccari.
12. *vagans* Lw. — I. Kalocsa.
13. *halteratus* Kow. — I. Kalocsa.
14. *perspicillaris* Lw. — VI. Herkulesfürdő.
15. *claripennis* Kow. — III. Losoncz, Miskolcz.

Exoprosopa Mcq.

16. *picta* Mg. — I. Budapest, Peszér. II. Pécs. III. Parád. VIII. Buccari, Crkvenica.
17. *italica* Mg. — VI. Herkulesfürdő.

18. *Cleomene* Egg. — I. Budapest, Peszér. II. Ad lacum Fertő. V. Szent-Erzsébet. VIII. Carlopago.
19. *capucina* F. — II. Német-Boly, Sopron. III. Parád. VI. Herkulesfürdő.
20. *Germari* Wied. — I. Budapest, Dabas. II. Sopron, Kapornak. III. Parád.
21. *Pandora* F. — III. Szliács.

Argyromoeba Schin.

22. *leucogaster* Mg. — I. Beél. II. Sopron. V. Kovászna. VI. Mehádia. VIII. Buccari, Crkvenica.
23. *aethiops* F. — I. Budakesz. VIII. Buccari, Crkvenica.
24. *tripunctata* Mg. — VIII. Buccari.
25. *binotata* Mg. — VIII. Fiume.
v. *subnotata* Mg. — VIII. Buccari, Fiume.
26. *sinuata* Fll. — I. Budapest, Debreczen, Kecskemét. II. Kőszeg, Sopron. III. Beszterczebánya, Rozsnyó, Szliács. IV. Erdőbénye. V. Tusnád, Kolozsvár, Szt-Erzsébet.
27. *trifasciata* Mg. — III. Koritnicza.
28. *varia* Germ. — II. Kup.

Mulio Latr.

29. *obscurus* F. — VIII. Carlopago, Crkvenica.

Chalcochiton Lw.

30. *Schineri* Now. — V. Vizakna. VI. Mehádia, Orsova, Radován.
31. *Pallasii* Lw. — I. Budapest.

Lomatia Mg.

32. *Belzebul* F. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Csorna, Czenk. III. Parád.
33. *Lachesis* Egg. — I. Budapest. II. Ad lacum Fertő. VI. Grebenácz.
34. *sabaea* F. — Communis.
35. *lateralis* Mg. — I. Kalocsa.
36. *Erynnis* Lw. — Ab auctore in Hungaria lecta.
37. *infernalis* Lw. — Teste auctore in Hungaria dicuntur lecta duo exemplaria.

Bombylius L.

38. *punctatus* F. — I. Budapest, Dabas, Kalocsa, Nagyvárad, Peszér. II. Tapolcza. VI. Ulma.
39. *ambustus* Wied. — Teste Schiner etiam in Hungaria inventus.
40. *ater* Scop. — Toto regno communis.
41. *pictus* Pz. — I. Budapest, Dabas, Nagyvárad. IV. Czéke. V. Nagyszeben. VII. Diakovár.
42. *discolor* Mg. — I. Budapest, Debreczen, Kalocsa, Nagyvárad. II. Sopron. III. Szitnya, Trencsén. IV. Tolcsva. V. Gyulafehérvár, Nagyszeben. VI. Herkulesfürdő, Krassó.
43. *medius* L. — I. Dabas, Debreczen, Kalocsa. III. Szitnya, Trencsén. IV. Tokaj. V. Nagyszeben. VI. Orsova, Ulma.
44. *posticus* Mg. — Musæum hungaricum patriæ originis exemplari gaudet.
45. *major* L. — I. Budapest, Debreczen, Kalocsa, Nagyvárad. II. Sopron. III. Szitnya, Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely. V. Nagyszeben. VI. Krassó, Orsova. VII. Montes Kapella.
46. *fimbriatus* Mg. — I. Budapest. VI. Herkulesfürdő.
47. *undatus* Mikan. — I. Budapest. IV. S.-A.-Ujhely.
48. *venosus* Mikan. — I. Budapest, Kalocsa, Visegrád. II. Dunaföldvár. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely.
49. *canescens* Mikan. — I. Kalocsa, Hild. III. Sellye, Trencsén. V. Nagyszeben.
50. *variabilis* Lw. — I. Budapest, Kalocsa. III. Trencsén. V. Nagyszeben.
51. *nubilus* Mikan. — I. Budapest, Kalocsa. II. Sopron, Tapolcza. III. Trencsén.
52. *quadrifarius* Lw. — I. Budapest, Peszér. V. Mező-Záh.
53. *fugax* Wied. — I. Budapest, Kalocsa. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Szomotor, Tolcsva. V. Nagyszeben, Szt-Erzsébet. VI. Ferenczfalva, Grebenácz, Orsova. VIII. Fiume.
54. *cinerascens* Mikan. — I. Budapest, Kalocsa, Nagyvárad. II. Kőszeg, Sopron. III. Pozsony, Rozsnyó, Trencsén. V. Nagyszeben, Szent-Erzsébet. VI. Orsova.
55. *fulvescens* Mg. — Communis.

Systoechus Lw.

56. *nitidulus* F. — I. Budapest, Peszér. III. Rozsnyó.
57. *sulphureus* Mikan. — I. Budapest, Debreczen, Kalocsa, Peszér. III. Beszterczebánya, Rozsnyó, Trencsén. V. Vöröstoronyszoros. VI. Grebenácz. VIII. Buccari, Carlopago, Crkvenica.
58. *ctenopterus* Mikan. — I. Budapest. III. Igló. IV. Szőllőske. V. Kovászna. VI. Mehádia.
59. *leucophaeus* Mg. — I. Budapest, Kalocsa, Nagyvárad. V. Peér. VI. Mehádia. VII. Carlopago, Sveto Brdo.
60. *hircanus* Wied. — I. Csepel.

Dischistus Lw.

61. *minimus* Schrk. — I. Dabas, Kalocsa. II. Sopron. III. Beszterczebánya. IV. Szomotor. VI. Deliblat, Herkulesfürdő.

Ploas Latr.

62. *virescens* F. — Communis.

Phthiria Mg.

63. *pulicaria* Mikan. — I. Budapest, Hild. II. Ad lacum Fertő. VIII. Buccari.
64. *canescens* Lw. — I. Apaj, Kalocsa.
65. *Gaedii* Mg. — I. Kalocsa. II. Ad lacum Fertő. VIII. Carlopago.

Tomomyza Wied.

66. *europaea* Lw. — VI. Mehádia.

Apolysis Lw.

67. *eremophila* Lw. — I. Kalocsa.

Toxophora Mg.

68. *maculata* Wied. — I. Isaszegh. VIII. Buccari, Crkvenica.

Fam. THEREVIDAE.

Xestomyza Wied.

1. *Kollari* Egg. — I. Nagyvárad.

Thereva Latr.

2. *praecox* Egg. — I. Budapest, Kecskemét. II. Ad lacum Fertő. VI. Krassó.
3. *lugubris* F. — I. Budapest.
4. *nobilitata* F. — I. Budapest, Kecskemét. II. Sopron.
5. *oculata* Egg. — V. Bucsecs. VI. Krassó.
6. *fulva* Mg. — I. Budapest. II. Sopron. III. Szliács, Trencsén. VI. Krassó.
7. *subfasciata* Schum. — II. Sopron.
8. *annulata* F. — I. Budapest, Debreczen, Kalocsa, Kecskemét. II. Sopron. VI. Mehádia.
9. *ursina* Whlb. — VI. Krassó.
10. *plebeja* L. — Communis.
11. *lugens* Lw. — I. Nagyvárad.
12. *marginula* Mg. — I. Budapest, Debreczen, Kalocsa, Kecskemét. VI. Krassó.
13. *apicalis* Wied. — I. Budapest, Kecskemét, Peszér. II. Dunaföldvár, ad lacum Fertő.
14. *arcuata* Lw. — I. Debreczen, Kalocsa, Nagyvárad. III. Rozsnyó, Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Szomotor. VI. Orsova.
15. *bipunctata* Mg. — I. Csepel.
16. *taeniata* Mg. — I. Budapest, Kecskemét. VI. Krassó.
17. *tuberculata* Lw. — I. Budapest, Debreczen, Nagyvárad.
18. *auricincta* Egg. — I. Budapest. II. Ad lacum Fertő. III. Felső-Diós, Trencsén.
19. *anilis* L. — I. Budapest.
20. *fuscipennis* Mg. — Teste L. Madarassy in Hungaria lecta.
21. *superba* Egg. — VI. Capo Muntye, Krassó, Szemenik.
22. *alpina* Egg. — III. Trencsén. V. Montes Cibinienses.
23. *nigripes* Lw. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Tapolcza. III. Trencsén.
24. *ardea* F. — I. Budapest, Kecskemét. II. Dunaföldvár. III. Felső-Diós, Trencsén. VI. Grebenácz, Mehádia, Orsova.
25. *eximia* Mg. — III. Trencsén. V. Nagyszeben. VI. Korniaréva.
26. *nigripennis* Ruthe. — I. Csepel.
27. *laticornis* Lw. — I. Budapest, Csepel, Kalocsa, Nádudvar. II. Dunaföldvár, Kup. VI. Deliblat.

Phycus Wlk.

28. *dispar* Mg. — VI. Orsova.

Fam. SCENOPINIDAE.

Scenopinus Latr.

1. *fenestratis* L. — I. Beél, Debreczen, Kalocsa, Kecskemét, Nagyvárad. II. Sopron. III. Trencsén. IV. Ladomér, Ungvár. VI. Orsova.
   v. *domesticus* Mg. — V. Montes Cibinienses.
2. *niger* Deg. — III. Rozsnyó. VI. Orsova.
3. *glabrifrons* Mg. — I. Beél, Budapest, Kalocsa. II. Sopron. VI. Grebenácz.

Fam. EMPIDAE.

Brachystoma Mg.

1. *vesiculosa* F. — V. Montes Cibinienses. VI. Mehádia, Orsova.

Hybos Mg.

2. *grossipes* L. — I. Montes Biharienses.
3. *culiciformis* F. — VII. Brušane.
4. *femoratus* Müll. — II. Sopron.
5. *fumipennis* Mg. — IV. Vihorlat. V. Montes Cibinienses. VI. Orsova.
6. *pilipes* Mg. — V. Bucsecs, montes Cibinienses.

Pteropsilus Rnd.

7. *muscarius* F. — I. Budapest. II. Ad lacum Fertő, ubi communis.

Cyrtoma Mg.

8. *nigra* Mg. — II. Sopron. V. Bucsecs, montes Cibinienses. VI. Mehádia, Orsova.
9. *spuria* Fll. — I. Budapest, Kalocsa. II. Szálka. V. Bucsecs, Negoi, montes Cibinienses.
10. *simplicipes* Ztt. — VI. Orsova.

Rhamphomyia Mg.

11. *platyptera* Pz. — II. Sopron, ubi rarissima.
12. *spissirostris* Fll. — I. Budapest, Kalocsa. IV. Málcza. VI. Mehádia, Orsova.
13. *flava* Fall. — V. Montes Cibinienses.
14. *sulcata* Fll. — I. Kalocsa, ubi vulgatissima. II. Sopron. VII. Diakovár. VIII. Buccari.
15. *villosa* Zett. — VII. Montes Kapella, Karst.
16. *nigripes* F. — II. Sopron. III. Rozsnyó. VI. Mehádia.
17. *atra* Mg. — I. Visegrád. II. Sopron. VI. Mehádia, Orsova.
18. *niveipennis* Ztt. — I. Budapest.
19. *hybotina* Ztt. — V. Montes Cibinienses, Bucsecs. VI. Mehádia.
20. *tristriolata* Now. — III. Montes Tátra.
21. *Loewii* Now. — III. Montes Tátra.
22. *luridipennis* Now. — III. Montes Tátra. VII. Vaganski Vrh.
23. *simulium* Now. — III. Montes Tátra.
24. *gibba* Fll. — IV. Rabaskala.
25. *anthracina* Mg. — I. Budapest. II. Sopron, Szálka. V. Montes Cibinienses, Negoi. VIII. Fiume.
26. *umbripennis* Mg. — IV. Tolcsva. VI. Mehádia, Orsova.
27. *stigmosa* Mcq. — VI. Mehádia, Orsova.
28. *flaviventris* Mcq.
v. *univittata* Strobl. — V. Montes Cibinienses.
29. *conformis* Kow. — I. Budapest. III. Losoncz. IV. Király-Helmecz, Námesztó, S.-A.-Ujhely.
30. *longipes* Mg. — V. Bucsecs, montes Cibinienses.
31. *setosa* Lw. — VI. Orsova.
32. *pennata* Mcq. — I. Budapest.
33. *leptopus* Lw. — VI. Plavisevicza.
34. *sphenoptera* Lw. — VI. Mehádia.
35. *pseudotrilineata* Strobl. — I. Kalocsa. II. Szegzárd.
36. *eupterota* Lw. — VII. Montes Karst.

Empis L.

37. *maculata* F. — I. Budapest, Kalocsa. II. Dunaföldvár, Sopron. III. Trencsén.
38. *confusa* Lw. — II. Tapolcza. VI. Herkulesfürdő.
39. *meridionalis* Mg. — II. Visegrád. III. Rozsnyó. VI. Mehádia.
40. *pilosa* Lw. — I. Budapest.
41. *tessellata* F. — I. Debreczen. III. Koritnicza, Tátraháza, Trencsén. IV. Kassa, Rabaskala. V. Montes Cibinienses. VI. Mehádia. VII. Sveto Brdo.
42. *bistortae* Mg. — V. Bucsecs, montes Cibinienses.
43. *ciliata* F. — I. Budapest.
44. *fumana* Egg. — VIII. Fiume.
45. *livida* L. — I. Debreczen, Szeghalom. II. Sopron. III. Deményfalva, Lucsivna, Rózsahegy, Trencsén. IV. Comitatus Zemplén, ubi communis. V. Kovászna. VI. Mehádia.
46. *borealis* L. — I. Budapest. III. Rozsnyó.
47. *rustica* Fll. — III. Koritnicza. V. Bucsecs, montes Cibinienses. VII. Vaganski Vrh, Sveto Brdo.
48. *albicans* Mg. — I. Budapest, Kalocsa. IV. S.-A.-Ujhely.
49. *fallax* Egg. — I. Budapest, Kalocsa, Nagyvárad. II. Sopron, Tapolcza. IV. Tokaj.
50. *opaca* F. — I. Kalocsa, Kecskemét. II. Sopron. III. Trencsén. V. Nagyszeben. VI. Mehádia.
51. *vitripennis* Mg. — I. Nagyvárad. II. Barcs, Sopron.
52. *hyalipennis* Fll. — V. Kovászna.
53. *pusio* Egg. — II. Sopron. V. Bucsecs, montes Cibinienses, Negoi, Vöröstoronyszoros. VI. Mehádia, Orsova.
54. *chioptera* Fll. — I. Budapest. II. Sopron, Szálka.
55. *pennaria* Fll. — I. Budapest, Kalocsa. VI. Mehádia, Orsova.
56. *decora* Mg. ap. Schin. — I. Budapest, Kalocsa. II. Sopron. III. Rozsnyó. IV. Tokaj. VI. Krassó, Mehádia.
57. *plumipes* L. — I. Budapest. II. Sopron. III. Rozsnyó. IV. S.-A.-Ujhely, S.-N.-Patak. VI. Mehádia, Orsova.
58. *pilipes* Mg. — V. Montes Cibinienses.
59. *discolor* Lw. — V. Montes Cibinienses.
60. *lutea* Mg. — VI. Krassó, Mehádia, Orsova. VII. Brušane.
61. *stercorea* L. — I. Budapest. II. Pécs, Sopron. V. Montes Cibinienses. VI. Mehádia, Orsova.
62. *vernalis* Mg. — II. Visegrád. IV. Erdőbénye. VII. Karst. VIII. Crkvenica.
63. *nana* Lw. — V. Götzenberg.
64. *lamellicornis* Beck. — V. Negoi, montes Cibinienses.
65. *florisomna* Lw. — V. Montes Cibinienses.
66. *scaura* Lw. — V. Montes Cibinienses.
67. *pulicaria* Lw. — V. Götzenberg.
68. *aestiva (?)* Lw. — V. Negoi, montes Cibinienses.
69. *rapida* Mg. — V. Montes Cibinienses.
70. *alpicola* Strobl. — V. Mons Negoi.
71. *monogramma* Mg. — VI. Mehádia, Orsova.
72. *punctata* Mg. — I. Budapest.
73. *trigramma* Mg. — I. Budapest, Kalocsa, Nagyvárad. II. Sopron. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely. V. Nagy-Ajta. VI. Mehádia, Orsova.
74. *grisea* Fll. — IV. Rabaskala. VII. Vaganski Vrh.
75. *nigritarsis* Mg. — VI. Mehádia, Orsova.
76. *truncata* Mg. — IV. Rabaskala.

77. *mesogramma* Lw. — IV. Simonka. VII. Brušane, Vaganski Vrh.
78. *leucopeza* Lw. — IV. Specus Veterani.
79. *levis* Lw. — VI. Herkulesfürdő.
80. *filata* Lw. — V. Montes Cibinienses. VI. Herkulesfürdő, Plavisevicza.
81. *melanotricha* Lw. — VI. Mehádia.
82. *crassa* Now. — III. Koritnicza, Tátra.
83. *setosa* Lw. — VI. Mehádia, Orsova.
84. *plebeja* Lw. — VI. Mehádia, Orsova.
85. *nitidiventris* Lw. — VI. Mons Kernecska-Csóka.
86. *semicinerea* Lw. — VIII. Crkvenica.
87. *univittata* Lw. — VIII. Crkvenica.
88. *aequalis* Lw. — VII. Karst.
89. *nitidissima* Strobl. — II. Visegrád.
90. *tanysphyra* Lw. — VI. Mehádia, Orsova.
91. *alampra* Lw. — VI. Mons Kernecska-Csóka.
92. *procera* Lw. — VI. Herkulesfürdő, Orsova.
93. *nepticula* Lw. — VI. Mehádia, Orsova.

Pachymeria Steph.

94. *femorata* F. — I. Budapest, Kalocsa, Rézbánya, Vaskóh. II. Sopron. III. Rozsnyó. VI. Orsova.
95. *palparis* Egg. — I. Budapest.
96. *nitida* Mg. — I. Budapest.
97. *Erberi* Now. — I. Csepel, Peszér.

Hilara Mg.

98. *litorea* Fll. — II. Sopron.
99. *abdominalis* Ztt. — VI. Domoglet.
100. *cornicula* Lw. — I. Keczel, Hajós. VI. Vallis Bachna.
101. *clypeata* Mg. — I. Hajós, Kalocsa. II. Sopron.
v. *brevifurca* Strobl. — V. Götzenberg.
102. *chorica* Fll. — II. Sopron.
103. *nigrina* Fll. — II. Sopron.
104. *pinetorum* Ztt.
v. *major* Strobl. — I. Keczel.
105. *bivittata* Strobl. — III. Turcsek. V. Götzenberg.
106. *diversipes* Strobl. — V. Montes Cibinienses.
107. *maura* F. — I. Budapest, Debreczen, Kalocsa. II. Sopron, Visegrád. VI. Mehádia, Orsova.
108. *lugubris* Ztt. — VI. Mehádia. VII. Brušane.
109. *pilosa* Ztt. — I. Hajós. III. Rozsnyó. VI. Mehádia.
110. *scrobiculata* Lw. — VI. Dubova.
111. *interstincta* Fll. — V. Bucsecs, montes Cibinienses.
112. *pruinosa* Mg. — II. Sopron.
113. *tetragramma* Lw. — VI. Orsova.
114. *pubipes* Lw. — V. Montes Cibinienses. VI. Kazánszoros.
115. *quadrivittata* Mg. — I. Kalocsa, Hajós, Keczel. VI. Mehádia, Orsova.
116. *pseudosartrix* Strobl. — I. Hajós.
117. *platyura* Lw. — VI. Mehádia.
118. *gallica* Fll. — I. Hajós, Keczel.
119. *lurida* Fll. — II. Sopron. III. Turcsek. VI. Mehádia, Orsova. VII. Brušane.
120. *heterogastra* Now. — III. Tátra. V. Bucsecs.
121. *magica* Mik. (*thoracica* Mcq. ?) — VI. Herkulesfürdő.
122. *eumera* Lw. — VI. Verendin (Com. Krassó-Szörény).
123. *cuneata* Lw. — VI. Plavisevicza.
124. *cilipes* Mg. — VI. Mehádia, Orsova. VIII. Buccari.
125. *aëronetha* Mik. — V. Bucsecs.
126. *longicornis* Strobl. — I. Budapest, Hajós.

Trichina Mg.

127. *velutina* Mcq. — I. Kalocsa. II. Sopron.
128. *clavipes* Mg. — V. Montes Cibinienses. VI. Mehádia.
129. *Zontacki* Now. — III. Tátra.

Oedalea Mg.

130. *infuscata* Lw. — VI. Mehádia, Orsova.
131. *Holmgreni* Ztt. — V. Bucsecs. VI. Mehádia.
132. *stigmatella* Ztt. — V. Montes Cibinienses. VI. Mehádia, Orsova.
133. *tristis* Scholtz. — V. Götzenberg.

Ocydromia Mg.

134. *glabricula* Fll. — I. Budapest. VI. Mehádia.
v. *scutellata* Mg. — V. Bucsecs; montes Cibinienses.

Euthynema Mcq.

135. *Gyllenhali* Ztt. — V. Montes Cibinienses.

Leptopeza Mcq.

136. *flavipes* Mg. — IV. S.-A.-Ujhely. VI. Mehádia, Orsova.
137. *sphenoptera* Lw. — II. Csurgó.

Kowarzia Mik.

138. *barbatula* Mik. — Auctore teste Hungariam incolit.
139. *plectrum* Mik. — V. Mons Bucsecs.

Heleodromia Mik.

140. *Wesmaeli* Mcq. — III. Rozsnyó.

Phaeobalia Mik.

141. *varipennis* Now. — III. Montes Tátra.
142. *picta* Strobl. — V. Negoi, montes Cibinienses.

Roederia Mik.

143. *longipennis* Mik. — Ipso auctore teste Hungariæ incola.

Eucelidia Mik.

144. *Zetterstedti* Wlk. — I. Budapest.

Philolutra Mik.

145. *aquilex* Lw. — V. Bucsecs.
146. *hygrobia* Lw. — VI. Mehádia, Orsova.
147. *fallaciosa* Lw. — VI. Mehádia.

Wiedemannia Mik.

148. *lamellata* Lw. — VI. Mehádia.
149. *rhynchops* Now. — III. Tátra.

Clinocera Mg.

150. *appendiculata* Zett. — V. Montes Cibinienses.
151. *tenella* Wilb. — VI. Mehádia.
152. *Robertii* Mcq. — VI. Mehádia.

Hemerodromia Mg.

153. *precatoria* Fll. — V. Götzenberg. VI. Mehádia, Orsova.
154. *melanocephala* v. *flavella* Ztt. — V. Götzenberg.

Ardoptera Mcq.

155. *guttata* Hal. — I. Kalocsa. VI. Mehádia.
156. *irrorata* F. — I. Budapest.

Trichopeza Rnd.

157. *longicornis* Mg. — V. Bucsecs. VI. Mehádia, Orsova.

Thamnodromia Mik.

158. *albiseta* Ztt. — V. Montes Cibinienses.

Sciodromia Hal.

159. *immaculata* Hal. — V. Götzenberg.

Drapetis Mg.

160. *aenescens* Wied. — I. Budapest, Kalocsa, Kecskemét, II. Dunaföldvár.
161. *setigera* Lw. — I. Budapest, Kalocsa, Kecskemét. IV. Kaponya. (Com. Zemplén.)
162. *flexuosa* Lw. — I. Budafok, Kalocsa. II. Dunaföldvár.
163. *nervosa* Lw. — V. Götzenberg.

Tachydromia Mg.

164. *Miki* Beck. — V. Götzenberg.
165. *ciliaris* Fll. — V. Bucsecs, Götzenberg, montes Cibinienses.
166. *flavipes* F. — I. Budapest, Kalocsa. II. Sopron. IV. Alsó-Bereczki. VI. Deliblat. VII. Mts. Kapella.
167. *straminipes* Ztt. — V. Bucsecs, Götzenberg.
168. *pectoralis* Fll. — V. Bucsecs, Götzenberg, montes Cibinienses.
169. *exilis* Mg. *var.* — V. Götzenberg, montes Cibinienses.
170. *lutea* Fll. — I. Budapest, Kalocsa. V. Götzenberg.
171. *stigmatella* Ztt. — V. Bucsecs.
172. *nigritarsis* Fll. — V. Götzenberg.
173. *fuscicornis* Ztt. — V. Montes Schuler.
174. *unguiculata* Ztt. — V. Montes Cibinienses.
175. *flavipalpis* Mg. — I. Budakesz.
176. *castanipes* Mg. — I. Budakesz.
177. *femoralis* Ztt. — VIII. Portoré.
178. *articulata* Mcq. — V. Götzenberg. VII. Brušane.
179. *pallidiventris* Mg. — II. Sopron. IV. S.-A.-Ujhely, Imreg. VIII. Crkvenica.
180. *bicolor* F. — I. Budapest. II. Sopron. VI. Mehádia.
181. *cursitans* F. — I. Budapest, Debreczen, Kalocsa. II. Sopron. V. Montes Cibinienses. VI. Mehádia.
182. *calceata* Mg. — VII. Gospić.
183. *candicans* Fll. — II. Sopron. VIII. Buccari.
184. *minuta* Mg. — I. Budapest, Visegrád, Kalocsa. II. Sopron, ad lacum Fertő. VI. Mehádia, Orsova.
185. *leucochaeta* Beck. — VII. Zengg.
186. *cothurnata* Mcq. — I. Budapest. V. Montes Cibinienses.
187. *maculipes* Mg. — I. Budapest. V. Montes Cibinienses.
188. *longiseta* Ztt. — V. Montes Cibinienses.
189. *major* Ztt. — I. Budapest, Kalocsa, Visegrád. III. Turcsek. IV. S.-A.-Ujhely, Vihorlat. V. Bucsecs, montes Cibinienses. VI. Mehádia.
190. *albiseta* Pz. — I. Kalocsa. VII. Brušane.
191. *agilis* Mg. — I. Kalocsa. V. Bucsecs. VI. Mehádia.
192. *annulata* Fll. — I. Budapest, Kalocsa. VI. Mehádia.
193. *annulipes* Mg. — VI. Mehádia.
194. *ventralis* Mg. — IV. Imreg.
195. *notata* Mg. — I. Budapest, Visegrád. IV. Szomotor.
196. *varia* Wlk. — I. Budapest, Kalocsa. IV. Alsó-Bereczki.
197. *connexa* Mg. — I. Budapest.
198. *pulicaria* Mg. — III. Lucski.

Tachypeza Mg.

199. *nubila* Mg. — V. Montes Cibinienses. VI. Herkulesfürdő, Orsova.
200. *nervosa* Mg. — III. Tátraháza.
201. *fuscipennis* Fll. — VI. Mehádia.

Tachysta Lw.

202. *annulimana* Mg. — IV. S.-A.-Ujhely. VI. Mehádia.

203. *sabulosa* Mg. — I. Kalocsa. IV. Kaponya.
204. *longipennis* Lw. — VI. Mehádia.
205. *aemula* Lw. — V. Götzenberg.

Fam. DOLICHOPIDAE.

Psilopus Mg.

1. *platypterus* F. — I. Kalocsa, Keczel. II. Dunaföldvár, Sopron. III. Losoncz, Rozsnyó. IV. Erdőbénye, Vihorlat. V. Bucsecs, montes Cibinienses. VI. Krassova, Orsova.
2. *Wiedemanni* Fll. — I. Kalocsa. IV. Imreg.
3. *lobipes* Mg. — III. Losoncz.
4. *ludens* Lw. — V. Negoi, Götzenberg.
5. *albifrons* Mg. — I. Budapest, Kalocsa. II. Sopron. IV. Imreg.
6. *gracilipes* Lw. — III. Tátra.
7. *euzonus* Lw. — II. Somlyó.
8. *longulus* Fll. — I. Kalocsa. V. Montes Cibinienses.
9. *bellus* Lw. — VI. Herkulesfürdő, Kernecska-Csóka.

Neurigona Rnd.

10. *pallida* Fll. — I. Kalocsa. II. Losoncz. VI. Mehádia, Orsova.
11. *suturalis* Fll. — VI. Mehádia.
12. *quadrifasciata* F. — II. Sopron. III. Zlatnó. IV. Szinna.
13. *Erichsoni* Ztt. — III. Losoncz. IV. Tolcsva.

Dolichopus Ltr.

14. *picipes* Mg. — II. Csurgó. III. Turcsek.
15. *melanopus* Mg. — IV. Mád.
16. *latelimbatus* Mcq. — I. Kalocsa, Nagyvárad. III. Losoncz. VI. Báziás, Grebenácz, Mehádia.
17. *excisus* Lw. — I. Budapest, Debreczen, Kalocsa. II. Sopron. III. Losoncz. IV. S.-A.-Ujhely. VI. Mehádia.
18. *claviger* Stann. — III. Rozsnyó. VI. Mehádia, Orsova.
19. *confusus* Ztt. — II. Csurgó.
20. *lepidus* Staeg. — III. Rozsnyó.
21. *nubilus* Mg. — II. Sopron. III. Losoncz. IV. S.-A.-Ujhely. VI. Mehádia.
22. *discifer* Ztt. — I. Nagyvárad, Rév, Beél. III. Rozsnyó.
23. *plumipes* Scop. — I. Nagyvárad. II. Sopron. III. Losoncz, Lucsivna, Szitnya. IV. Erdőbénye, Mád, S.-A.-Ujhely. VI. Mehádia.
24. *pennatus* Mg. — III. Losoncz, Rozsnyó. V. Vörös-torony szoros. VI. Mehádia.
25. *acuticornis* W. — II. Csurgó.
26. *longicornis* Stann. — III. Losoncz.
27. *nitidus* Fll. — I. Kalocsa. II. Sopron. IV. Tolcsva. VI. Mehádia.
28. *griseipennis* Stann. — I. Kalocsa. II. Sopron. III. Losoncz. IV. Tolcsva. VI. Mehádia. VII. Brušane.
29. *simplex* Mg. — I. Kalocsa, Nagyvárad. II. Sopron. III. Losoncz. IV. Alsó-Bereczki. VI. Mehádia, Orsova.
30. *arbustorum* Stann. — V. Kovászna. VII. Brušane.
31. *festivus* Hal. — I. Kalocsa. II. Sopron. III. Losoncz, Rozsnyó. IV. Erdőbénye, Szőllőske, Tolcsva. VI. Mehádia.
32. *trivialis* Hal. — I. Kalocsa. II. Dunaföldvár. III. Nagy-Rőcze. IV. Tolcsva. V. Götzenberg.
33. *notabilis* Ztt. — VI. Deliblat.
34. *linearis* Mg. — I. Nagyvárad.
35. *longitarsis* Stann — III. Rozsnyó, Turcsek.
36. *aeneus* Deg. — I. Beél, Debreczen, Kalocsa, Nagyvárad, Tenke. II. Sopron. III. Losoncz, Rozsnyó. V. Gyulafehérvár, Götzenberg, Orlát. VI. Mehádia. VII. Brušane.
37. *fastuosus* Hal. — III. Rozsnyó.
38. *vitripennis* Mg. — IV. S.-N.-Patak.
39. *argyrotarsis* Whlb. — III. Losoncz.
40. *popularis* Wied. — I. Debreczen. III. Turcsek.
41. *signifer* Hal. — I. Kecskemét. III. Losoncz. VI. Mehádia.
42. *campestris* Mg. — VI. Mehádia, Orsova.
43. *salicetorum* Lw. — III. Rozsnyó. VI. Mehádia.
44. *Braueri* Now. — III. Tátra.

Tachytrechus Stann.

45. *ocior* Lw. — III. Losoncz.
46. *insignis* Stann. — II. Sopron, Rozsnyó. VI. Mehádia, Orsova.
47. *ripicola* Lw. — I. Kalocsa, II. Dunaföldvár. VI. Mehádia.
48. *Kowarzi* Mik. — III. Losoncz.
49. *genualis* Lw. — III. Losoncz. VI. Mehádia.
50. *notatus* Stann. — I. Kalocsa.

Poecilobothrus Mik.

51. *nobilitatus* Lw. — I. Budapest, Debreczen. II. Sopron, Kapornak. III. Losoncz, Szitnya. VII. Brušane.
52. *monialis* Lw. — III. Tátra.
53. *ducalis* Lw. — I. Kecskemét. III. Losoncz. VI. Deliblat.
54. *comitialis* Kow. — I. Budapest. II. Bodajk. III. Losoncz. VI. Deliblat.
55. *regalis* Mg. — I. Budapest, Kalocsa, Aszód, Vadkert. III. Losoncz. VI. Deliblat, Mehádia.
56. *principalis* Lw. — I. Budapest, Kalocsa, Nagyvárad, Szeghalom. VI. Kazán.

Sybistroma Mg.

57. *nodicornis* Mg. — II. Sopron. III. Losoncz. VI. Mehádia.
58. *setosa* Schin. — III. Losoncz.
59. *moerens* Lw. — VI. Vallis Gráczka, Herkulesfürdő, Orsova.

Hercostomus Lw.

60. *nigricornis* Mg. — II. Pápa.
61. *bicingulatus* Zett. — I. Kalocsa.
62. *rusticus* Mg. — I. Budapest, Kalocsa. III. Rozsnyó.
63. *blepharopus* Lw. — VI. Mehádia.
64. *cretifer* Wlk. — I. Kalocsa. VI. Mehádia.
65. *longiventris* Lw. — VI. Mehádia, Orsova.
66. *germanus* Wied. — I. Kalocsa. II. Sopron. V. Bucsecs, montes Cibinienses.
67. *chaerophylli* Mg. — V. Montes Cibinienses, Kovászna.
68. *fumipennis* Wied. — I. Kalocsa. II. Dunaföldvár, Sopron. VI. Mehádia.
v. *pulchriceps* Lw. — I. Kalocsa. II. Dunaföldvár.
69. *chrysozygos* Wied. — I. Kalocsa, Nagyvárad. II. Sopron. III. Losoncz, Rozsnyó. VI. Mehádia.

Hypophyllus Lw.

70. *crinipes* Staeg. — VI. Mehádia, Orsova.
71. *discipes* Ahrens. — VI. Mehádia.
72. *sphenopterus* Lw. — II. Sopron. VI. Mehádia, Orsova.
73. *obscurellus* Fll. — III. Losoncz, Rozsnyó.
74. *sciaphilus* Lw. — III. Losoncz.

Gymnopternus Lw.

75. *celer* Mg. — III. Losoncz, Rozsnyó. VI. Mehádia.
76. *Sahlbergi* Ztt. — V. Montes Cibinienses.
77. *atrovirens* Lw. — II. Sopron. III. Losoncz. VI. Mehádia.
78. *nigroplantis* Stann. — III. Losoncz. VI. Mehádia, Orsova.
79. *convergens* L. — II. Ad lacum Fertő.
80. *plagiatus* Lw. — II. Ad lacum Fertő.
81. *nanus* Mcq. — III. Losoncz.
82. *caudatus* Lw. — VI. Mehádia.
83. *inornatus* Lw. — VI. Mehádia.
84. *fulvicaudis* Wlk. — III. Losoncz. IV. Imreg.
85. *exarticulatus* Lw. — VI. Mehádia.
86. *vivax* Lw. — V. Montes Cibinienses.
87. *fugax* Lw. — V. Montes Cibinienses.
88. *brevicornis* Staeg. — V. Bucsecs, Götzenberg.
89. *aerosus* Fll. — V. Götzenberg.

Lamprochromus Mik.

90. *elegans* Mg. — III. Losoncz.

Asyndetus Lw.

91. *varus* Lw. — A Domino Kowarz in Hungaria inventus.

Diaphorus Mg.

92. *vitripennis* Lw. — V. Ad ripam Alutæ.
93. *latifrons* Lw. — V. Montes Cibinienses.
94. *Hoffmanseggi* Lw. — III. Rozsnyó.
95. *disjunctus* Lw. — III. Losoncz.
96. *tripilus* Lw. — III. Losoncz. VI. Mehádia, Orsova.
97. *oculatus* Fll. — VI. Mehádia.
98. *lugubris* Lw. — VI. Mehádia, Orsova.
99. *nigricans* Mg. — VI. Mehádia.
100. *halteralis* Lw. — III. Losoncz.

Melanostolus Lw.

101. *melancholicus* Loew. — Auctore teste a Domino Kowarz in Hungaria detectus.
102. *nigrocilius* Lw. — I. Akasztó.

Chrysotus Mg.

103. *neglectus* Wied. — V. Montes Cibinienses, Orlát.
104. *cilipes* Mg. — I. Kalocsa. III. Losoncz. V. Orlát, Götzenberg. VI. Mehádia.
105. *pulchellus* Kow. — I. Kalocsa. IV. Erdőbénye.
106. *femoratus* Ztt. — V. Götzenberg, Orlát.
107. *cupreus* Mcq. — I. Budapest, Debreczen, Kalocsa. II. Sopron. III. Losoncz. IV. Erdőbénye. VI. Mehádia.
108. *suavis* Lw. — I. Budapest, Kalocsa. II. Sopron. III. Losoncz. V. Ad ripam Alutæ. VI. Mehádia. VIII. Fiume.
109. *laesus* Wied. — I. Kalocsa. II. Sopron. III. Losoncz, Rozsnyó. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj. V. Orlát, Götzenberg, Ripa Alutæ. VI. Mehádia, VII. Zimony.
110. *varians* Kow. — IV. Imreg.
111. *gramineus* Fll. — III. Losoncz. V. Bucsecs, Götzenberg, Orlát.
112. *niger* Lw. — III. Losoncz. V. Ad ripam Alutæ. VI. Mehádia.

Chrysotimus Lw.

113. *molliculus* F. — I. Kalocsa. III. Losoncz.

Nematoproctus Lw.

114. *distendens* Mg. — I. Nagyvárad. III. Losoncz. VI. Mehádia.
115. *praesectus* Lw. — III. Losoncz.

Lasyargyra Mik.

116. *diaphana* F. — I. Akasztó, Hajós, Kalocsa, II. Sopron, Szálka, Szegzárd. III. Losoncz. Rozsnyó. VI. Mehádia.

Argyra Mcq.

117. *Hofmeisteri* Lw. — II. Sopron. III. Losoncz. VI. Herkulesfürdő.
118. *leucocephala* Mg. — II. Sopron. III. Losoncz. VI. Mehádia.
119. *argyria* Mg. — I. Akasztó, Kalocsa. II. Sopron, Szegzárd, Szálka.
120. *argentina* Mg. — III. Losoncz. VI. Mehádia.
121. *confinis* Ztt. — III. Losoncz. VI. Mehádia.
122. *auricollis* Mg. — V. Montes Cibinienses, Götzenberg.
123. *atriceps* Lw. — Losoncz.
124. *grata* Lw. — III. Losoncz, Rozsnyó.

Leucostola Lw.

125. *vestita* Wied. — I. Kalocsa. II. Sopron. IV. Varannó. VI. Mehádia.

Porphyrops Mg.

126. *antennatus* Carl. non Schin. — I. Budapest, Kalocsa. III. Losoncz. VI. Herkulesfürdő.
127. *spinicoxus* Lw. — I. Debreczen, Kalocsa. II. Sopron. III. Losoncz. VI. Mehádia.
128. *fascipes* Mg. — I. Budapest, Kalocsa. III. Losoncz, Rozsnyó. IV. Tokaj. VI. Mehádia.
129. *nemorum* Mg. — III. Losoncz, Salgótarján. IV. Tokaj, S.-N.-Patak. VI. Mehádia.
130. *micans* Mg. — I. Kalocsa. II. Barcs, Dunaföldvár. III. Losoncz. IV. Tolcsva. V. Ad ripam Alutæ. VI. Mehádia.
131. *nasutus* Fll. — III. Losoncz. VI. Mehádia.
132. *penicillatus* Lw. — II. Sopron. III. Losoncz. IV. Tokaj. VI. Mehádia.
133. *pectinatus* Lw. — V. Ad ripam Alutæ.
134. *praerosus* Lw. — VI. Mehádia.
135. *crassipes* Mg. — V. Götzenberg.

Aphrosylus Wlk.

136. *venator* Lw. — VIII. Fiume.

Xiphandrium Lw.

137. *fissum* Lw. — V. Bucsecs.
138. *caliginosum* Mg. — I. Rákoscsaba. III. Losoncz. VI. Mehádia, Orsova.
139. *monotrichum* Lw. — VI. Mehádia.
140. *appendiculatum* Ztt. — III. Losoncz, Rozsnyó. VI. Mehádia.
141. *sagax* Gerst. — VI. Mehádia.

Syntormon Lw. ap. Schin.

142. *metallicum* Lw. — III. Losoncz, teste Kowarz rarissimum.
143. *denticulatum* Ztt. — I. Kalocsa. III. Losoncz.
144. *pallipes* F. — I. Kalocsa, Kecskemét. II. Dunaföldvár, Sopron. III. Losoncz. VI. Mehádia.
145. *metathesis* Lw. — I. Kalocsa.
146. *pumilum* Mg. — III. Losoncz. IV. Sátoralja-Ujhely.
147. *spicatum* Lw. — VI. Mehádia, Orsova.
148. *biseriatum* Lw. — VI. Mehádia.
149. *subinerme* Lw. — III. Losoncz.
150. *monile* Wlk. — VI. Mehádia.
151. *Zelleri* Lw. — VI. Mehádia.
152. *sulcipes* Mg. — V. Montes Cibinienses.

Medeterus Fisch.

153. *plumbellus* Mg. — I. Kalocsa. II. Dunaföldvár.
154. *micaceus* Lw. — III. Losoncz. IV. Tokaj. V. Orlát.
155. *chrysotimiformis* Kow. — I. Budapest, Kalocsa.
156. *muralis* Mg. — III. Losoncz. VI. Mehádia.
157. *glaucellus* Kow. — VI. Orsova, Kazán.
158. *obscurus* Zett. — III. Tátra.
159. *diadema* L. — I. Kalocsa, Monor. II. Sopron. III. Rozsnyó.
160. *ambiguus* Ztt. — III. Tátra.
161. *dendrobaenus* Kow. — I. Budakesz.
162. *jaculus* Mg. — I. Debreczen. III. Losoncz. IV. S.-A.-Ujhely.
163. *tenuicauda* Lw. — I. Budapest. II. Ad lacum Fertő.
164. *truncorum* Mg. — III. Losoncz.
165. *dichaetus* Kow. — V. Orlát.
166. *pallipes* Ztt. — Teste Kowarz etiam in Hungaria occurrit.

Hydrophorus Whlb.

167. *inaequalipes* Mcq. — II. Sopron. III. Losoncz. IV. Szomotor. VI. Mehádia.
168. *litoreus* Fll. — I. Palics. III. Losoncz.
169. *balticus* Mg. — I. Debreczen, Kalocsa. III. Losoncz. IV. Rabaskala, Vihorlat. V. Montes Cibinienses, Negoi. VI. Mehádia, Orsova.
170. *viridis* Mg. — I. Kalocsa. II. Dunaföldvár.
171. *notatus* F. — I. Budapest, Hajós, Nagyvárad, Tenke. IV. Kis-Azar, Tolcsva, Szerencs.

Liancalus Lw.

172. *virens* Scop. — II. Dunaföldvár, Sopron. VI. Mehádia, Orsova, specus Pisznicza.

Campsicnemus Wlk.

173. *magius* Lw. — I. Kalocsa.
174. *pusillus* Mg. — III. Losoncz, ubi rarissimus.
175. *scambus* Fll. — III. Losoncz.
176. *curvipes* Fll. — III. Losoncz. V. Montes Cibinienses, ad ripam Alutæ. VI. Mehádia.

177. *umbripennis* Lw. — III. Losoncz. V. Götzenberg, la Dusch, Nagyszeben. Negoi. VI. Mehádia.
178. *lumbatus* Lw. — III. Losoncz. VI. Mehádia.
179. *marginatus* Lw. — III. Losoncz, ubi teste Kowarz rarissimus.
180. *varipes* Lw. — III. Losoncz. VI. Mehádia, Orsova.

Sympycnus Lw.

181. *cirrhipes* Wlk. — In montibus Carpathicis.
182. *brevimanus* Lw. — III. Tátra. V. Montes Cibinienses.
183. *aeneicoxus* Mg. — III. Losoncz.
184. *annulipes* Mg. — III. Losoncz. IV. Imreg. VI. Mehádia.
185. *spiculatus* Gerst. — III. Zlatnó, Tátra.
186. *pullatus* Kow. — Teste Kowarz Hungariæ incola, a Gabriele Strobl in Transsylvania lectus.

Teuchophorus Lw.

187. *calcaratus* Mg. — III. Losoncz.
188. *monacanthus* Lw. — VI. Mehádia, Orsova.
189. *pectinifer* Kow. — III. Losoncz; valde rarus.

Xanthochlorus Lw.

190. *tenellus* Wied. — I. Kalocsa. II. Sopron. III. Losoncz.

Thinophilus Whlb.

191. *flavipalpis* Hal. — I. Akasztó, Kalocsa, Vadkert, vulgatissimus.
192. *ruficornis* Hal. — I. Kecskemét.

Oncopygius Lw.

193. *distans* Lw. — VI. Vallis Cserna, Mehádia, Orsova.
194. *magnificus* Lw. — Ut prior.

Fam. PHORIDAE.

Gymnophora Mcq.

1. *arcuata* Mg. — I. Budapest, Kalocsa. II. Sopron. III. Rozsnyó. V. Tasnád. VI. Herkulesfürdő.

Trineura Mg.

2. *aterrima* F. — I. Kalocsa. III. Rozsnyó. IV. Imreg. V. Montes Cibinienses. VI. Herkulesfürdő. VIII. Fiume.
3. *stictica* Mg. — V. Montes Cibinienses.

Phora Latr.

4. *florea* F. — I. Kalocsa. VI. Herkulesfürdő.
5. *abdominalis* Fll. — VII. Buccari.
6. *mordellaria* Fll. — VI. Herkulesfürdő.
7. *urbana* Mg. — IV. Szomotor.
8. *bicolor* Mg. — II. Sopron. V. Orlát.
9. *flava* Fll. *var.* — V. Bucsecs.
10. *brachyneura* Egg. — V. Götzenberg.
11. *spinosissima* Strobl. — I. Budapest.
12. *interrupta* Ztt. — V. Götzenberg.
13. *flexuosa* Egg. — II. Sopron.
14. *sordidipennis* L. — VII. Eszék.
15. *fuscipes* Meg. — V. Montes Cibinienses.
16. *palposa* Zett. — V. Miebelsberg.
17. *Giremdii* Egg. — V. Montes Cibinienses.
18. *crassicornis* Mg. — VI. Herkulesfürdő.
19. *nigricornis* Egg. — I. Budapest, Kalocsa. III. Rozsnyó.
20. *perennis* Mg. — Rozsnyó. IV. Homonna.
21. *ciliata* Zett. — V. Bucsecs, montes Cibinienses.
22. *pulicaria* Fll. — I. Budapest, Csepel, Kalocsa. II. Sopron.
    v. *rufipes* Mg. — I. Kalocsa. II. Sopron. IV. S.-A.-Ujhely, Sárospatak. V. Götzenberg, Tasnád. VI. Herkulesfürdő.
    v. *heracleellae* Bouché. — II. Sopron. V. Montes Cibinienses.
    v. *nigra* Mg. — V. Bucsecs.
    v. *pumila* Mg. — V. Montes Cibinienses.
    v. *luctuosa* Mg. — V. Bucsecs.
23. *sordida* Ztt. — I. Budapest.
24. *minor* Ztt. — II. Pápa.
25. *flavicoxa* Ztt. — V. Bucsecs.
26. *nitidifrons* Strobl. — I. Kalocsa.
27. *xanthozona* Strobl. — I. Kalocsa. V. La Dusch.

Fam. PLATYPEZIDAE.

Callomyia Mg.

1. *humeralis* Lw. — II. Neszider.
2. *amoena* Mg. — IV. Perecseny. VI. Mehádia, Orsova.
3. *antennata* Ztt. — VI. Mehádia, Orsova.
4. *elegans* Mg. — VI. Mehádia.

Platypeza Mg.

5. *atra* Fll. — VI. Mehádia.
6. *holosericea* M. — I. Kalocsa. V. Götzenberg.
7. *superba* Kow. — III. Losoncz.
8. *barbata* Kow. — Losoncz.

Opetia Fll.

9. *nigra* M. — V. Orlát.

Fam. PIPUNCULIDAE.

Nephrocerus Zett.

1. *flavicornis* Ztt. — II. Szegzárd.

Pipunculus Latr.

2. *melanostotus* Beck. — II. Ad lacum Fertő.
3. *horridus* Beck. — I. Budapest. VIII. Crkvenica.
4. *terminalis* Thoms. — I. Budapest.
5. *Kowarzi* Beck. — VIII. Buccari.
6. *pannonicus* Beck. — VIII. Buccari.
7. *sericeus* Beck. — V. Transsylvania.
8. *zonatus* Ztt. — I. Budapest.
9. *fuscipes* Zett. — I. Budapest, Kalocsa. VI. Mehádia.
10. *varipes* Mg. — V. Götzenberg.
11. *Thomsoni* Beck. — VI. Ferenczfalva. VIII. Buccari.
12. *ater* Mg. — I. Kalocsa.
13. *campestris* Latr. — I. Kalocsa. V. Gyulafehérvár.
14. *sylvaticus* Mg. — I. Budapest, Kalocsa. IV. Perecseny. V. Götzenberg. VI. Mehádia. VIII. Fuzsine.
15. *nigritulus* Ztt. — I. Budapest. V. Kovászna. VII. Velebit.
16. *semifumatus* Kow. — VI. Mehádia.
17. *xanthocerus* Kow. — V. Montes Cibinienses.
18. *rufipes* Mg. — IV. Perecseny.
19. *xanthopus* Thoms. — I. Budapest.
20. *haemorrhoidalis* Ztt. — V. Bucsecs.

Protechus Rnd.

21. *villosus* v. Ros. — II. Visegrád.

Chalarus Walk.

22. *holosericeus* Mg. — V. Montes Cibinienses.

Fam. SYRPHIDAE.

Bacha F.

1. *elongata* F. — I. Kalocsa, Budapest. II. Dunaföldvár, Sopron, Tapolcza. III. Nagy-Rőcze, Trencsén. V. Bucsecs. VI. Mehádia.
2. *obscuripennis* Mg. — II. Dunaföldvár. V. Bucsecs.

Sphegina Mg.

3. *clunipes* Fll. — I. Kalocsa, Meziád, Rézbánya. II. Dunaföldvár, Sopron. V. Montes Cibinienses. VI. Korniaréva, Mehádia, Orsova.
4. *Kimakowiczi* Strobl. — V. Montes Cibinienses.

Ascia Mg.

5. *podagrica* F. — Passim occurrit.
   v. *lanceolata* Mg. — I. Beél, Bibarczfalva, Kalocsa, Nagyvárad. III. Trencsén. IV. Bresztó. VI. Mehádia.
6. *dispar* Mg. — V. Orlát.
7. *floralis* Mg. — I. Beél, Kalocsa, Tenke. II. Szálka.
   v. *quadripunctata* Mg. — I. Kalocsa.
8. *interrupta* Mg. — I. Csepel.

Doros Mg.

9. *conopseus* F. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Ad lacum Fertő.
10. *destillatorius* Mik. — VI. Bánság.

Xanthogramma Schin.

11. *citrofasciatum* Deg. — I. Budapest, Kalocsa. II. Sopron. III. Rozsnyó, Trencsén. IV. Tokaj. VI. Negotin, Krassó, Resicza.
12. *ornatum* Mg. — Ubique occurrit.
   v. *dives* Rond. — I. Kalocsa. V. Nagyszeben. VI. Oravicza. VIII. Fiume.

Melithreptus Lw.

13. *scriptus* L. — Ubique communis.
   v. *dispar* Lw. — Ubique cum stirpe.
   v. *nigricoxus* Zett. — II. Dunaföldvár. V. Nagyszeben, Orlát.
   v. *strigatus* Staeg. —
14. *nitidicollis* Staeg. — I. Dabas, Kecskemét. II. Őszöd.
15. *menthastri* L. — I. Kalocsa. II. Dunaföldvár. V. Orlát.
   v. *pictus* Mg. — I. Kalocsa. V. Bucsecs, Orlát.
   v. *taeniatus* Mg. — I. Kalocsa, Kecskemét, Nagyvárad. II. Sopron. III. Rozsnyó. IV. Homonna, Szobráncz, Vihorlat. V. La Dusch, Vizakna. VI. Grebenácz.
   v. *dubius* Ztt. — III. Trencsén. V. Vizakna.
16. *nitidulus* Zett. — VI. Deliblat.

Pelecocera Mg.

17. *tricincta* Mg. — I. Csepel. II. Szegzárd.
18. *latifrons* Lw. — I. Montes Budenses.

Chamaesyrphus Mik.

19. *scaevoides* Fll. — I. Budapest.

Didea Meg.

20. *alneti* Fll. — III. Ad lacum Csorba, Koritnicza.
21. *fasciata* Meg. — I. Budapest, montes Biharienses. III. Koritnicza.
22. *intermedia* Lw. — II. Sopron. V. Montes Cibinienses.

Catabomba O. S.

23. *selenitica* Mg. — I. Kalocsa. III. Nagy-Rőcze. V. Bucsecs, Negoi. VI. Mehádia, Orsova.
24. *pyrastri* L. — Communis.
   v. *unicolor* Curt. — Pápa. III. Rózsahegy.

Syrphus F.

25. *glaucius* L. — In montanis sat communis.
26. *laternarius* Mill. — III. Tátraháza, Trencsén. IV. Rabaskala.
27. *tricinctus* Fll. — I. Rézbánya. II. Sopron. III. Rozsnyó, Nagy-Rőcze. VI. Krassó.
28. *venustus* Mg. — I. Kalocsa. II. Sopron.
29. *macularis* Zett. — I. Budapest. V. Negoi. VII. Karst.
30. *topiarius* Mg. — I. Kalocsa. V. Montes Cibinienses. VI. Ferenczfalva, Korniaréva, Mehádia.
31. *lunulatus* Mg. — I. Csepel, Montes Biharienses. III. Rozsnyó. V. Montes Cibinienses. VI. Krassó, Mehádia, Orsova.
v. *obscurus* Ztt. — I. Peszér. V. Montes Cibinienses.
32. *albostriatus* Fll. — I. Kalocsa. Rézbánya. II. Sopron. III. Nagy-Rőcze. V. Tusnád. VI. Korniaréva.
33. *annulipes* Ztt. — III. Rozsnyó. V. Montes Cibinienses.
34. *bifasciatus* F. — I. Kalocsa. II. Sopron. VI. Mehádia, Orsova.
35. *balteatus* Deg. — Ubique frequens.
36. *lineola* Ztt. — III. Trencsén. V. Montes Cibinienses.
37. *vittiger* Ztt. — Budapest. III. Rozsnyó. IV. Vihorlat.
38. *grossulariae* Mg. — I. Budapest, Kalocsa. II. Nagy-Rőcze. IV. Mező-Laborcz. V. Tusnád.
39. *diaphanus* Ztt. — II. Sopron. VI. Domoglet, Stájerlak.
40. *ochrostoma* Zett. — I. Debreczen, Nagyvárad, Rézbánya. III. Lucsivna. IV. Homonna. VI. Korniaréva.
41. *nitidicollis* Mg. — I. Kalocsa, Péczel. II. Sopron. VI. Mehádia, Orsova.
v. *nitens* Zett. — V. Montes Cibinienses.
42. *excisus* Lw. — I. Kalocsa. II. Sopron. V. Vizakna. VIII. Buccari.
43. *auricollis* Mg. — VI. Mehádia.
44. *ribesii* L. — Communissimus.
v. *vitripennis* Mg. — Ubique cum priore invenitur.
45. *cinctellus* Zett. — II. Sopron. III. Rozsnyó. IV. Szathmár.
46. *crenatus* Meg. — V. Nagy-Ajta.
47. *leiophthalmus* Schin. VI. Domoglet.
48. *arcuatus* Fll. — I. Kalocsa. II. Sopron. III. Ad lacum Csorba, Lucsivna.
v. *lapponicus* Zett. — V. Montes Cibinienses.
49. *corollae* F. — Sat communis.
v. *fulvifrons* Meg. — V. Montes Cibinienses, Vizakna. VIII. Fiume.
50. *luniger* Mg. — I. Budapest, Kalocsa. III. Koritnicza. V. Montes Cibinienses. VI. Mehádia, Deliblat.
51. *Braueri* Egg. — I. Budapest. V. Montes Cibinienses.
52. *sexguttatus* Mg. — II. Sopron.
53. *lasiophthalmus* Zett. — I. Kalocsa. VI. Mehádia, Orsova.
54. *maculicornis* Ztt. — IV. Alsó-Bereczki.
55. *umbellatarum* F. — I. Rézbánya. II. Sopron. III. Koritnicza.
56. *triangulifer* Zett. — I. Kalocsa.
57. *decorus* Mg. — VI. Mehádia, Orsova.

Melanostoma L.

58. *hyalinatum* Fll. — III. Lucsivna, Rozsnyó. VI. Mehádia, Orsova.
59. *dubium* Ztt. — IV. Kis-Azar.
60. *barbifrons* Fll. — I. Budapest, Péczel.
61. *ambiguum* Fll. — I. Kalocsa. VI. Mehádia, Orsova.
62. *mellinum* L. — Ubique frequens.
v. *mellarium* Mg. — V. Vizakna.
63. *gracile* Mg. — I. Kalocsa. V. Montes Cibinienses. VI. Mehádia, Orsova.

Platycheirus St. Farg. et Serv.

64. *dilatatus* Mcq. — V. Negoi.
65. *albimanus* Mg. — I. Budapest, Kalocsa. V. Montes Cibinienses, Nagyszeben. VI. Mehádia, Orsova.
66. *scutatus* Mg. — I. Ad specum Fonácza. II. Sopron. VI. Mehádia.
67. *podagratus* Ztt. — I. Budapest.
68. *fulviventris* Mg. — I. Budapest, Kalocsa. II. Őszöd.
69. *peltatus* Mg. — III. Koritnicza, Rozsnyó, Trencsén. IV. Perecseny. V. Montes Cibinienses.
70. *clypeatus* Mg. — I. Budapest, Kalocsa. II. Őszöd. IV. Szomotor, Tállya.
71. *ferrugineus* Mcq. — VI. Mehádia.

Spathiogaster Rndi.

72. *ambulans* Fll. — V. Orlát.

Pyrophaena Schin.

73. *ocymi* F. — IV. Tátraháza.
74. *rosarum* F. — I. Kalocsa.

Chilosia Mg.

75. *oestracea* L. — Sparsim ubique occurrit.
76. *variabilis* Pz. — Ex omnibus regionibus ad notatam inveni.

77. *canicularis* Pz. — Ubique satis frequens esse videtur.
v. *rufitarsis* Ztt. — III. Nagy-Rőcze. V. Montes Cibinienses.
v. *dilutior* Strobl. — V. Nagyszeben.
78. *flavipes* Pz. — V. Nagyszeben, Szt-Erzsébet.
79. *intonsa* Lw.—I. Budapest. II. Sopron. III. Koritnicza, Szliács, Trencsén. IV. Tokaj.
80. *pigra* Lw.—I. Nagyvárad. II. Sopron. III. Koritnicza, Szliács. VI. Mehádia.
81. *barbata* Lw. — VI. Mehádia, Orsova.
82. *frontalis* Lw. — III. Trencsén. IV. Rabaskala.
83. *velutina* Lw. — II. Sopron.
84. *sparsa* Lw. — II. Sopron. III. Rozsnyó.
85. *personata* Lw. — I. Kalocsa, Budapest. IV. Rabaskala.
86. *derasa* Lw. — IV. Rabaskala.
87. *antiqua* Mg. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Sopron. VI. Herkulesfürdő.
88. *caerulescens* Mg.—I. Beél, Nagyvárad. III. Koritnicza, Szliács.
89. *soror* Zett. — I. Beél, Nagyvárad. II. Sopron. IV. Erdőbénye. VI. Mehádia, Orsova. VIII. Fiume.
90. *scutellata* Fll. — I. Nagyvárad, Rézbánya. II. Sopron. III. Koritnicza. IV. Vihorlat. V. Nagyszeben, Vöröstorony szoros. VI. Mehádia, Orsova.
91. *Loewii* Beck. — I. Budapest. II. Sopron.
92. *melanopa* Zett. — VI. Mehádia.
93. *latifacies* Lw. — VI. Krassova, Mehádia.
94. *cynocephala* Lw. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Sopron. III. Beszterczebánya.
95. *impressa* Lw. — I. Montes Biharienses. II. Sopron. IV. Rabaskala. V. Montes Cibinienses. VI. Krassó, Mehádia.
96. *longula* Zett. — VI. Krassó.
97. *pulchripes* Lw. — I. Kalocsa. II. Sopron. III. Nagy-Rőcze, Rozsnyó.
98. *viduata* F.—I. Budapest, Nagyvárad. II. Sopron. III. Koritnicza. IV. Erdőbénye, Sátoralja-Ujhely. VI. Mehádia.
99. *morio* Zett. — I. Budapest. VI. Mehádia.
100. *mutabilis* Fll. — I. Budapest, Nagyvárad. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely. V. Nagyszeben, Götzenberg, Vöröstorony szoros. VI. Mehádia, Orsova.
101. *fasciata* Egg. — IV. Rabaskala.
102. *chrysocoma* Mg. — I. Kalocsa.
103. *grossa* Fll. — I. Budapest, Kalocsa. II. Sopron. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely. V. Nagyszeben.
104. *chloris* Mg. — I. Kalocsa. III. Pozsony.
105. *proxima* Zett. — I. Budapest, Kalocsa. II. Sopron. IV. Erdőbénye, Páczin.
106. *vernalis* Fll. — III. Nagy-Rőcze.
107. *praecox* Ztt.—I. Budapest, Kalocsa. II. Sopron. IV. S.-A.-Ujhely, Czéke, Nagymihály. VI. Mehádia, Orsova.
108. *pygmaea* Mcq. — VI. Mehádia.
109. *rufipes* Mcq. — I. Budapest.
110. *dimidiata* Ztt. — I. Budapest.
111. *brachycoma* Egg. — Exemplaria musæi nationalis in Hungaria lecta.
112. *albipila* Mg. — I. Budapest.
113. *gigantea* Ztt. — VI. Mehádia.
114. *Zetterstedti* Beck. — VI. Orsova.
115. *glirina* Rndi. — IV. S.-A.-Ujhely.
116. *lenta* Beck. — I. Budapest.
117. *nasutula* Beck. — I. Budapest.
118. *correcta* Beck. — III. Szliács.
119. *conops* Beck. — VI. Krassó.
120. *psilophthalma* Beck. — III. Tátra.
121. *pascuorum* Beck. — VI. Orsova.
122. *polita* Beck. — III. Tátra.
123. *rotundiventris* Beck. et
124. *stupida* Beck. — Hungaricæ originis, uti schedæ exemplaribus musæi nationalis suffixæ testantur.

Leucozona Schin.

125. *lucorum* L. — I. Montes Biharienses. III. Trencsén. IV. Simonka, Vihorlat. V. Görgény.

Eriozona Först.

126. *syrphoides* Fll. — V. Mezőség.

Rhingia Scop.

127. *rostrata* L. — Sparsim ubique occurrit.
128. *campestris* Mg. — I. Montes Biharienses, Nagyvárad. II. Sopron. IV. Homonna, Rabaskala, S.-A.-Ujhely, Vihorlat.

Brachyopa Mg.

129. *arcuata* Pz. — I. Kalocsa. VI. Mehádia, Orsova.
130. *bicolor* Fll. — I. Kalocsa. II. Sopron. IV. Rabaskala. V. Nagyszeben. VI. Mehádia.
131. *ferruginea* Fll. — I. Budapest. VIII. Fiume.
132. *conica* Pz. — III. Tátraháza.

Volucella Geoffr.

133. *bombylans* Mg. — II. Sopron. III. Koritnicza, Lucsivna, Szitnya, Trencsén. IV. Rabaskala, Rokitó, Vihorlat. V. Szt-Erzsébet. VI. Korniaréva.
v. *haemorrhoidalis* Ztt. — III. Trencsén.
v. *plumata* Deg. — I. Kalocsa. II. Sopron. III. Lucsivna, Szitnya, Trencsén.
v. *mystacea* L. — V. Szt-Erzsébet.
134. *pellucens* L. — Toto regno communis.

135. *inflata* F. — I. Nagyvárad. II. Kapornak, Sopron, Tapolcza. V. Kolozsvár. VI. Vallis Cserna, Korniaréva, Mehádia.
136. *zonaria* Poda. — Sparsim per totam ditionem.
137. *inanis* L. — Communis.

Myiolepta Newn.

138. *luteola* Gmel. — I. Budapest, Kalocsa. II. Sopron. IV. Mező-Laborcz. VI. Mehádia. VIII. Fiume.
139. *vara* Pz. — II. Sopron. V. Mezőség. VI. Mehádia, Orsova.

Sericomyia Mg.

140. *borealis* Fll. — III. Koritnicza, Lucsivna, Trencsén. V. Montes Cibinienses.
141. *lappona* L. — III. Trencsén. IV. Rokitó. V. Montes Cibinienses.

Arctophila Schin.

142. *mussitans* F. — II. In montibus ad Lajtham. IV. Tolcsva.
143. *bombyformis* Fll. — II. Sopron III. Koritnicza, Lucsivna. IV. Vihorlat. V. Montes Cibinienses.

Eristalis Latr.

144. *sepulcralis* L. — Communis.
145. *aeneus* Scop. — Communis.
146. *tenax* L. — Inter omnes frequentissime occurrit.
v. *campestris* Mg. — I. Nagyvárad. III. Trencsén. V. Nagyszeben, vallis Riu-Vadului, Vizakna. VII. Eszék. VIII. Fiume.
v. *hortorum* Mg. — V. Bucsecs, Nagy-Ajta.
147. *similis* Fll. — IV. S.-A.-Ujhely.
148. *intricarius* L. — I. Budapest, Debreczen, Kalocsa, Nagyvárad. II. Kapornak, Sopron, Szálka. III. Pozsony, Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely.
149. *arbustorum* L. — Frequentissimus.
150. *pascuorum* Rndi. — IV. S.-A.-Ujhely.
151. *jugorum* Egg. — III. Koritnicza, Szitnya, Trencsén. IV. Tátraháza. V. Montes Cibinienses.
152. *rupium* F. — I. Budapest, Kalocsa. II. Somlyó-Vásárhely. III. Lucsivna, Trencsén. IV. Rokitó. V. Mezőség.
153. *nemorum* L. — Ubique legitur.
154. *horticola* Deg. — I. Kalocsa. II. Kapornak, Szegzárd. VI. Mehádia, Orsova.
155. *pratorum* Mg. — I. Kalocsa. II. Sopron.
156. *alpinus* Pz. — II. Sopron. IV. Rokitó. V. Nagyszeben.
157. *cryptarum* F. — III. Koritnicza.
158. *pertinax* Scop. — I. Kalocsa. II. Kapornak, Szegzárd. III. Trencsén. V. Nagyszeben, Tusnád.

Myiathropa Rndi.

159. *florea* L. — Communis.
160. *nigrotarsata* Schin. — II. Sopron. III. Trencsén. VII. Buccari, Raduč.

Helophilus Mg.

161. *hybridus* Lw. — I. Budapest.
162. *trivittatus* F. — Communis.
163. *pendulus* L. — I. Kalocsa. II. Dunaföldvár, Sopron. III. Koritnicza, Lucsivna, Pozsony. IV. Rabaskala, Szatmár. V. Mezőség. VI. Mehádia, Orsova.
164. *peregrinus* Lw. — I. Kalocsa. II. Dunaföldvár, Sopron. VIII. Fiume.
165. *frutetorum* F. — I. Akasztó, Hajós. II. Ad lacum Fertő, Sopron.
166. *versicolor* F. — I. Akasztó, Hajós. II. Sopron. V. Mezőség.
167. *lunulatus* Mg. — I. Akasztó.
168. *vittatus* Mg. — II. Ad lacum Fertő.
169. *transfugus* L. — I. Akasztó, Hajós.

Eurymyia Big.

170. *lineata* F. — II. Sopron.

Mallota Mg.

171. *vittata* Mg. — II. Ad lacum Fertő.
172. *eristaloides* Lw. — I. Budapest. VI. Domoglet, Mehádia.

Merodon Mg.

173. *equestris* F. — I. Ad specum Oncsásza, Rézbánya. VI. Mehádia, Orsova.
174. *clavipes* F. — I. Budapest, Dabas, Keczel, Peszér. II. Sopron. IV. S.-A.-Ujhely. V. Mezőség. VI. Mehádia, Orsova.
v. *toto corpore nigra*: I. Keczel, Hild (prædium).
175. *aberrans* Egg. — VI. Mehádia, Orsova.
176. *avidus* Rossi. — I. Kalocsa. II. Sopron. VI. Mehádia. VIII. Fiume.
177. *nigritarsis* Rndi. — I. Budapest. II. Ad lacum Fertő. VI. Mehádia. VIII. Fiume, Buccari.
178. *spinipes* F. — I. Budapest, Kalocsa. II. Ad lacum Fertő. III. Trencsén. V. Mezőség. VI. Mehádia, Orsova.
179. *armipes* Rndi. — I. Akasztó, Budapest. VI. Mehádia, Orsova.
180 *ruficornis* Mg. — Budapest.
181. *cinereus* F. — I. Montes Biharienses. V. Montes Cibinienses, Götzenberg. VI. Mehádia.
182. *analis* Mg. — I. Budapest, Kalocsa. VIII. Fiume.
183. *funestus* Mg. — VI. Domoglet, Mehádia, Orsova.

184. *albifrons* Mg. — I. Debreczen. II. Kup. VI. Mehádia. VII. Croatia teste Schiner. VIII. Crkvenica.
185. *aeneus* Mg. — I. Budapest. VI. Mehádia. VIII. Karst.
186. *rufus* Mg. — I. Budapest. II. Sopron. VIII. Fiume.
187. *hoplistes* Lw. — I. Budapest.
188. *submetallicus* Rndi. — I. Budapest. IV. S.-A.-Ujhely.

Tropidia Mg.

189. *milesiformis* Fll. — I. Kalocsa. II. In montibus ad Lajtham. IV. Homonna.

Milesia Latr.

190. *splendida* Rossi. — VIII. Fiume.

Spilomyia Mg.

191. *diophthalma* L. — II. Sopron. VI. Mehádia,
192. *bombylans* F. — VI. Mehádia, Resicza. Orsova.

Temnostoma St. Fg. et Serv.

193. *saltuum* F. — I. Budapest, Kalocsa. II. Sopron. VI. Mehádia. VIII. Fiume.
194. *vespiformis* L. — I. Montes Biharienses, Kalocsa. II. Sopron. III. Lucsivna, Rozsnyó, Trencsén. IV. Vihorlat. V. Montes Cibinienses. VI. Mehádia, Resicza.
195. *speciosa* Rossi. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Sopron. III. Trencsén. VI. Mehádia.

Xylota Mg.

196. *segnis* L. — Ubique communis.
197. *pigra* F. — I. Montes Biharienses.
198. *confinis* Zett. — I. Budapest. VI. Krassó.
199. *lenta* Mg. — Communiter occurrit.
200. *rufipes* Lw. — VI. Herkulesfürdő, Orsova.
201. *abiens* Mg. — III. Koritnicza. VI. Herkulesfürdő.
202. *ignava* Pz. — I. Budapest. III. Trencsén. V. Montes Cibinienses. VI. Mehádia, Orsova.
203. *femorata* L. — III. Trencsén. IV. Vihorlat, Sátoralja-Ujhely. V. Götzenberg, Nagyszeben. VI. Mehádia, Orsova.
204. *curvipes* Lw. — VI. Vallis Bachna, Mehádia, Orsova.
205. *nemorum* F. — Vulgaris.
206. *bifasciata* Mg. — III. Lucsivna. VI. Mehádia.
207. *sylvarum* L. — Communis.
208. *florum* F. — Communis.

Syritta S. Fg. et Serv.

209. *pipiens* L. — Ubique satis vulgata.

Brachypalpus Mcq.

210. *Meigenii* Schin. — IV. S.-A.-Ujhely. VI. Mehádia.
211. *eunotus* Lw. — VI. Meteriss.
212. *angustus* Egg. — IV. Szőllőske.
213. *valgus* Pz. — I. Budapest, Kalocsa. II. Sopron. IV. Czeke. VI. Mehádia.

Criorhina Mcq.

214. *berberina* F. — II. Sopron. IV. Rabaskala, Vihorlat. VI. Vallis Cserna, Mehádia.
215. *asilica* Fll. — II. Sopron. V. Götzenberg. VI. Báziás, vallis Cserna, Korniaréva, Orsova.
216. *oxyacanthae* Mg. — IV. Rabaskala, Vihorlat. VI. Mehádia, Orsova.
217. *floccosa* Mg. — II. Sopron, ad lacum Fertő. VI. Vallis Cserna, Mehádia.
218. *fallax* L. — III. Tátrafüred. V. Montes Cibinienses.

Plocota S. Fg. et Serv.

219. *apiformis* Schrnk. — II. Sopron.

Eumerus Mg.

220. *ovatus* Lw. — I. Csepel, Dabas. V. Nagyszeben. VI. Mehádia.
221. *annulatus* Pz. — V. Mons Allion, Mehádia, Orsova.
222. *tarsalis* Lw. — IV. Rabaskala, S.-N.-Patak. V. Vallis Cserna, Grebenácz, Krassó, Mehádia, Orsova.
223. *sinuatus* Lw. — I. Budapest. VI. Krassó.
224. *tricolor* F. — II. Paks, Sopron. VI. Deliblat, Korniaréva, Mehádia.
225. *subulonum* Fall. — I. Budapest. VI. Stájerlak.
226. *longicornis* Lw. — I. Budapest.
227. *ornatus* Mg. — IV. Tolcsva.
228. *lunulatus* Mg. — I. Kalocsa. II. Pápa. IV. Alsó-Bereczki, Szobráncz. VI. Grebenácz.
229. *basalis* Lw. — I. Rákos. VI. Mehádia, Orsova.
230. *angustifrons* Lw. — VI. Mehádia.
231. *pulchellus* Lw. — VI. Mehádia, Orsova. VIII. Fiume.

Chrysochlamys Rndi.

232. *cuprea* Scop. — I. Budapest, Kalocsa. II. Kapornak, Sopron. III. Rozsnyó. IV. S.-A.-Ujhely. Szőllőske, Tállya. VI. Mehádia, Oravicza, Orsova.
233. *ruficornis* F. — II. Sopron. V. Nagyszeben.
234. *nigrifrons* Egg. — I. Kalocsa. II. Sopron.

Orthoneura Mcq.

235. *elegans* Mg. — I. Budapest.
236. *nobilis* Mcq. — II. Ad lacum Fertő. III. Rozsnyó. VI. Mehádia.

237. *brevicornis* Lw. — I. Budapest, Császártöltés. II. Sopron.
238. *frontalis* Lw. — I. Császártöltés. II. Ad lacum Fertő.

Chrysogaster Mg.

239. *splendida* Mg. — I. Akasztó, Budapest, Császártöltés, Kecskemét, Peszér. II. Sopron. VI. Mehádia. VIII. Fiume.
240. *metallina* F. — I. Budapest, Kalocsa, Nagyvárad. II. Ad lacum Fertő. IV. S.-A.-Ujhely.
241. *viduata* L. — I. Kalocsa. II. Sopron. III. Rózsahegy, Rozsnyó. IV. Homonna.
242. *coemeteriorum* L. — I. Belényes, Rézbánya. II. Dunaföldvár, Sopron. III. Koritnicza, Trencsén. IV. Rabaskala V. Ad fluvium Sztrigy. VI. Mehádia.
243. *basalis* Lw. — V. Orlát, vallis Riu-Vadului. VI. Mehádia.
244. *Macquarti* Lw. — I. Kecskemét, Kalocsa. VI. Herkulesfürdő.
245. *chalybeata* Mg. — II. Dunaföldvár, Kapornak.

Triglyphus Lw.

246. *primus* Lw. — VI. Mehádia, Orsova.

Pipizella Rndi.

247. *virens* F. — Ubique communis.
v. *maculipennis* Mg. — V. Nagyszeben.
v. *varipes* Mg. — I. Kalocsa. V. Vöröstorony szoros, Vizakna. VIII. Fiume.
248. *annulata* Mcq. — I. Beél, Kalocsa, Nagyvárad. II. Sopron. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj. V. Nagy-Ajta. VI. Báziás.

Pipiza Fll.

249. *festiva* Mg. — I. Beél. Kalocsa, Nagyvárad. II. Sopron. III. Trencsén. VI. Mehádia.
250. *noctiluca* L. — I. Budapest. II. Sopron. IV. Tokaj. V. Nagyszeben. VII. Karst.
251. *luteitarsis* Ztt. — I. Budapest.
252. *signata* Mg. — I. Budapest. VI. Mehádia.
253. *notata* Mg. — II. Sopron.
254. *chalybeata* Mg. — IV. Kassa.
255. *fenestrata* Mg. — II. Ad lacum Fertő.
256. *funebris* Mg. — II. Sopron.
257. *lugubris* F. — I. Rákos. IV. Erdőbénye.
258. *quadrimaculata* Pz. — I. Budakesz. V. Orlát.
259. *austriaca* Mg. — I. Kalocsa, Csepel.
260. *anthracina* Mg. — II. Sopron.

Cnemodon Egg.

261. *fulvimanus* Mg. — I. Kalocsa.

Pennium Phil.

262. *carbonarium* Mg. — I. Kalocsa.

Heringia Rndi.

263. *Zetterstedti* Rndi. — III. Trencsén.

Psilota Mg.

264. *anthracina* Mg. — VI. Brassó. VII. Fužine.

Paragus Latr.

265. *tibialis* Fll. — I. Budapest, Kalocsa, Nagyvárad. IV. Tokaj. VI. Mehádia, Deliblat. VII. Fužine. VIII. Crkvenica.
v. *obscurus* Mg. — V. Vöröstorony szoros.
266. *cinctus* Schin. — I. Kalocsa, Nagyvárad. V. Mezőség.
267. *albifrons* Fll. — I. Kalocsa, Nagyvárad. II. Dunaföldvár, Sopron. III. Felső-Diós, Pozsony, Trencsén. VI. Mehádia. VII. Eszék. VIII. Fiume.
268. *quadrifasciatus* Mg. — I. Kalocsa. II. Siófok. VIII. Buccari.
269. *lacerus* Lw. — I. Kalocsa.
270. *bimaculatus* Wied. — I. Budapest. IV. S.-A.-Ujhely. VI. Deliblat.
271. *bicolor* F. — I. Budapest, Kalocsa. IV. S.-A.-Ujhely. VI. Orsova. VII. Buccari. VIII. Fiume.
v. *taeniatus* Mg. — VIII. Fiume.
v. *testaceus* Mg. — VIII. Fiume.
272. *pulcherrimus* Strobl. — VIII. Fiume.

Chrysotoxum Mg.

273. *fasciolatum* Deg. — II. Sopron. III. Trencsén. V. Montes Cibinienses.
274. *arcuatum* L. — III. Rozsnyó. IV. Homonna, Vihorlat. V. Montes Cibinienses. VI. Mehádia.
275. *silvarum* Mg. — I. Budapest. II. Ad lacum Fertő. III. Trencsén. IV. Homonna, Vihorlat. V. Vizakna. VI. Mehádia, Orsova.
276. *intermedium* Mg. — I. Kalocsa. III. Szitnya. IV. Rabaskala. VI. Mehádia, Korniaréva, Orsova.
277. *bicinctum* L. — Commune.
278. *lineare* Ztt. — I. Kalocsa. II. Öszöd.
279. *festivum* L. — Ubique invenitur.
280. *vernale* Lw. — I. Budapest, Kalocsa, Nagyvárad, Rézbánya. II. Sopron. III. Rozsnyó. IV. Rabaskala. V. Kis-Csür, Kis-Disznód. VI. Mehádia.
281. *octomaculatum* Curt. — I. Nagyvárad. II. Sopron. IV. Erdőbénye, Nagymihály. V. Nagyszeben. VI. Grebenácz.
282. *elegans* Lw. — I. Budapest. II. Szegzárd, Tapolcza. III. Trencsén. VI. Mehádia.

Psarus Latr.

283. *abdominalis* F. — I. Budapest, Kalocsa, Nagyvárad. II. Kapornak, Szegzárd. III. Nagy-Rőcze, Parád, Rozsnyó. IV. Kis-Azar. V. Mezőség. VI. Mehádia.

Callicera Pz.

284. *aenea* F. — VIII. Fiume.

Microdon Mg.

285. *devius* L. — I. Budapest, Kalocsa, Nagyvárad, Szeged. II. Sopron. IV. Vallis Fajna, Varannó. VI. Krassó. VIII. Buccari.

286. *mutabilis* L. — II. Sopron. III. Rozsnyó. VI. Mehádia.

287. *latifrons* Lw. — V. Mezőség. VI. Mehádia, Orsova.

Ceria F.

288. *conopsoides* L. — I. Kalocsa, Szeged. II. Dunaföldvár, Pécs, Sopron, Szegzárd. IV. Tolcsva. V. Nagyszeben. VI. Mehádia. VII. Buccari, Eszék.

289. *subsessilis* Latr. — I. Kalocsa. II. Tapolcza. V. Mezőség. VI. Mehádia.

290. *tridens* Lw. — VI. Turn-Severin.

291. *vespiformis* Latr. — I. Budapest. VI. Krassó. VIII. Fiume.

Fam. CONOPIDAE.

Dalmannia R. Desv.

1. *aculeata* L. — I. Budapest, Dabas, Kalocsa. IV. S.-A.-Ujhely, Szomotor. VII. Buccari, Dálya, Eszék.

2. *punctata* F. — I. Budapest, Kalocsa. II. Ad lacum Fertő. IV. S.-A.-Ujhely. VI. Mehádia.

3. *marginata* Mg. — IV. S.-A.-Ujhely.

Myopa F.

4. *stigma* Mg. — I. Kalocsa. V. Mezőség.

5. *variegata* Mg. — II. Balf.

6. *picta* Pz. — I. Budapest, Kalocsa, Pilis-Szántó. III. Trencsén.

7. *buccata* L. — I. Budapest, Kalocsa, Kecskemét. II. Sopron. VI. Ulma.

8. *fasciata* Mg. — I. Budapest. V. Vizakna. VI. Mehádia.

9. *testacea* L. — Communis.

10. *polystigma* Rndi. — II. Sopron. IV. Szomotor.

11. *dorsalis* F. — I. Dabas, Kalocsa, Nagyvárad. II. Sopron, Tapolcza. VI. Krassó.

12. *occulta* Mg. — I. Kalocsa. II. Dunaföldvár. III. Parád.

13. *maculata* Mcq. — I. Debreczen.

Sicus Scop.

14. *ferrugineus* L. — In montanis ubique sat frequenter inveniter.

Glossigona Rndi.

15. *bicolor* Mg. — I. Budapest, Dabas, Kalocsa, Nagyvárad, Peszér. II. Sopron. III. Parád. IV. Szomotor. VI. Grebenácz.

Oncomyia R. Desv.

16. *distincta* Mg. — I. Budapest. IV. Tokaj.

17. *atra* F. — Sat Communis.

18. *pusilla* Mg. — I. Kalocsa. II. Sopron. V. Bucsecs. VIII. Fiume.

19. *Sundevalli* Ztt. — I. Budapest, Kalocsa, Kecskemét. II. Dunaföldvár.

Zodion Latr.

20. *cinereum* F. — Commune.

21. *notatum* Mg. — I. Budapest, Kalocsa. II. Sopron. IV. Homonna. VI. Mehádia.

Conops L.

22. *capitatus* Lw. — I. Budapest. III. Trencsén.

23. *coronatus* Rndi. — III. Rozsnyó.

24. *scutellatus* Mg. — I. Budapest.

25. *vesicularis* L. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Sopron. III. Koritnicza.

26. *quadrifasciatus* Deg. — I. Budapest, Debreczen. II. Sopron. III. Tátraháza, Hermanecz, Lucsivna, Trencsén.

27. *ceriaeformis* Mg. — I. Debreczen.

28. *flavifrons* Mg. — II. Pápa.

29. *strigatus* Mg. — II. Sopron.

30. *insignis* Lw. — I. Budapest. VI. Grebenácz. VII. Eszék, Karst.

31. *flavipes* L. — I. Debreczen, Rézbánya. II. Sopron. III. Koritnicza, Lucsivna, Trencsén. IV. Tolcsva. V. Brassó, Gyulafehérvár, Götzenberg. VIII. Fiume.

Physocephala Schin.

32. *lacera* Mg. — VI. Grebenácz.

33. *pusilla* Mg. — I. Budapest, Besnyő. VI. Grebenácz.

34. *chrysorrhoea* Lw. — I. Debreczen, Palota.

35. *variegata* Mg. — VI. Grebenácz.

36. *vittata* F. — I. Nagyvárad, Palota. II. Sopron, Szegzárd. III. Szliács, Trencsén. V. Vöröstorony szoros, Vizakna. VI. Mehádia.

37. *fraterna* Lw. — I. Nagyvárad. III. Parád. IV. S.-A.-Ujhely. V. Vöröstorony szoros, Kis-Csür.

38. *rufipes* F. — I. Budapest. III. Rozsnyó. V. Tusnád. VI. Orsova.
39. *truncata* Lw. — I. Budapest, Nagyvárad. V. Bibarczfalva.

Fam. OESTRIDAE.

Gastrophilus Leach.

1. *equi* F. — I. Debreczen
2. *haemorrhoidalis* L. — I. Isaszeg. III. Trencsén.
3. *nasalis* L. — I. Budapest. VI. Comitatus Temes.
4. *pecorum* F. — Teste Schiner ex Hungaria.
5. *inermis* Brauer. — II. E regione lacus Fertő.

Hypoderma Latr.

6. *bovis* Deg. — I. Debreczen. III. Rozsnyó, Trencsén. V. Gyulafehérvár, montes Cibinienses.
7. *Actaeon* Brauer. — II. Visegrád.

Oestrus L.

8. *ovis* L. — I. Kalocsa, Debreczen. II. Boglár. V. Gyulafehérvár, montes Cibinienses. VI. Grebenácz.
9. *purpureus* Brauer. — VI. Grebenácz, Ulma.
10. *maculatus* Wied. — Teste Brauer Hungariæ incola.

Pharyngomyia Schin.

11. *picta* Mg. — Exemplaria Musæi Nationalis ex Hungaria orta.

Fam. MUSCIDAE.

A) CALYPTERAE.

Subf. MEIGENIINAE.

Meigenia Schin.

1. *bisignata* Mg. — I. Kalocsa, Szeghalom. III. Rozsnyó. V. Bucsecs. VI. Mehádia, Orsova.
   v. *quadrimaculata* Mg. — V. Montes Cibinienses.
   v. *immaculata* R. Desv. — V. Bucsecs, montes Cibinienses.
2. *majuscula* Rndi. — VI. Mehádia.
3. *floralis* Mg. — I. Kalocsa. IV. Szomotor, Tokaj. V. Götzenberg, Orlat, Vöröstorony szoros. VIII. Fiume.
4. *egens* Egg. — I. Kalocsa.

Viviania Rndi.

5. *pacta* Mg. — I. Kalocsa. II. Sümeg.

Platychira BB.

6. *pupparum* F. — I. Kalocsa. II. Sopron. III. Pozsony, Rozsnyó.

Subf. MASICERATINAE.

Conogaster BB.

7. *nubilis* Rndi. — I. Kalocsa.

Masicera Rndi.

8. *silvatica* Fll. — I. Debreczen, Kalocsa. II. Sopron. IV. Tolcsva.
9. *pratensis* Schin. — I. Kalocsa. II. Dunaföldvár, Sopron, Tapolcza. VI. Mehádia. VIII. Fiume.

Dexodes BB.

10. *machairopsis* BB. — I. Kalocsa.
11. *spinuligerus* Rndi. — VIII. Fiume.
12. *agilis* Mg. — I. Debreczen, Kalocsa, Nagyvárad. V. Vöröstorony szoros.

Megalochaeta BB.

13. *ambulans* Mg. — I. Kalocsa.

Eupogona Rndi.

14. *setifacies* Rndi. — II. Német-Boly.

Gymnochaeta R. Desv.

15. *viridis* Fll. — III. Rozsnyó, Trencsén. IV. Vihorlat. VI. Resicza.

Exorista BB.

16. *vetula* Mg. — II. Sopron. III. Rozsnyó. VI. Mehádia.

Parexorista BB.

17. *cheloniae* Rndi. — I. Kalocsa. V. Nagyszeben.
18. *mitis* Mg. — II. Dunaföldvár.
19. *rutila* Rndi. — I. Kalocsa.
20. *affinis* Fll. — VI. Mehádia, Orsova.
21. *fimbriata* Mg. — I. Kalocsa. II. Sopron. VI. Mehádia, Orsova.
22. *temera* Rndi. — I. Hajós, Kalocsa.
23. *aemula* Mg. — I. Kalocsa.
24. *confinis* Mg. — III. Rozsnyó.
25. *lucorum* Mg. — I. Kalocsa. VI. Mehádia, Orsova.
26. *dubia* BB. — I. Kalocsa.
   v. *excavata* Ztt. — VIII. Fiume.
27. *flavicans* Rndi. — I. Hajós, Kalocsa. II. Sopron. VIII. Fiume.
28. *acanthina* Rndi. — I. Kalocsa.
29. *antennata* BB. — I. Kalocsa.
30. *aberrans* Rndi. — IV. S.-A.-Ujhely.

Hemimasicera BB.

31. *ferruginea* Rndi. — I. Kalocsa. VIII. Fiume.
   v. *properans* Rndi. — VIII. Fiume.

Nemorilla Rndi.

32. *maculosa* Mg. — I. Hajós. II. Sümeg.
33. *floralis* Rndi. — I. Keczel.
34. *notabilis* Mg. — I. Hajós. VI. Mehádia, Orsova.

Ceromasia Rndi.

35. *florum* Rndi. — I. Kalocsa. II. Sopron. VI. Mehádia. VIII. Fiume.
36. *juvenilis* Rndi. — I. Kalocsa.

Paraphorocera BB.

37. *doris* Mg. — I. Kalocsa. II. Tapolcza.
38. *senilis* Rndi. — I. Kalocsa.
39. *virilis* Rndi. — I. Kalocsa.

Subf. MYXEXORISTINAE.

Myxexorista BB.

40. *libatrix* Pz. — II. Sopron.

Blepharidea BB.

41. *vulgaris* Fll. — I. Kalocsa, Nagyvárad. II. Sopron. III. Nagy-Rőcze. IV. S.-A.-Ujhely. VI. Mehádia. VIII. Fiume.
v. *stridens* Rndi. — VIII. Fiume.

Ceratochaeta BB.

42. *prima* BB. — VIII. Fiume.

Subf. PHOROCERATINAE.

Frontina Mg.

43. *taeta* Mg. — I. Kalocsa. II. Sopron, Szálka. III. Trencsén.

Prosopaea Rndi.

44. *nigricans* Egg. — I. Kalocsa. VIII. Fiume.

Staurochaeta BB.

45. *gracilis* Egg. — I. Kalocsa.

Parerynnia BB.

46. *vibrissata* Rndi. — IV. Tokaj.

Gaedia Mg.

47. *connexa* Mg. — V. Brassó.

Doria Rndi.

48. *nigripalpis* Rndi. — I. Kalocsa. VII. Eszék.

Machaira BB.

49. *serriventris* Rndi. — I. Kalocsa. II. Sopron. VI. Mehádia, Orsova. VIII. Fiume.

Tritochaeta BB.

50. *polleniella* Rndi. — I. Kalocsa. VIII. Fiume.

Phorocera Rndi.

51. *cilipeda* Rndi. — I. Kalocsa. VI. Mehádia, Orsova.

Bothria Rndi.

52. *pascuorum* Rndi. — I. In monte Nagyszál.

Setigena BB.

53. *assimilis* Fll. — I. Kalocsa. II. Sopron.
v. *grandis* Rndi. — I. Kalocsa.
54. *caesifrons* Schin. — I. Kalocsa. II. Sopron. IV. Imreg. VI. Mehádia, Orsova.

Eggeria Schin.

55. *fasciata* Egg. — I. Kalocsa, Keczel.

Paraseligena BB.

56. *segregata* Rndi. — I. Kalocsa. II. Sopron. IV. Mád. V. Görgény.

Campylochaeta Rndi.

57. *obscura* Schin. — I. Kalocsa.

Subf. BLEPHARIPODINAE.

Blepharipoda BB.

58. *scutellata* Rndi. — I. Kalocsa. III. Rozsnyó. VI. Mehádia, Orsova.

Crossocosmia Mik.

59. *flavoscutellata* Schin. — VI. Mehádia, Orsova.

Argyrophylax BB.

60. *atropivora* Rndi. — I. Kalocsa. VIII. Fiume.
61. *cursitans* Rndi. — VIII. Fiume.
62. *pupiphaga* Rndi. — V. Nagyszeben.

Sisyropa BB.

63. *lucorum* Rndi. — VI. Mehádia, Orsova.
64. *excisa* Mg. — I. Budapest. Kalocsa. II. Barcs. VIII. Fiume.
v. *excavata* Zett. — VIII. Fiume.

Chaetolyga Rndi.

65. *xanthogastra* Rndi. — III. Trencsén.
66. *amoena* Mg. — VI. Mehádia.
67. *quadripustulata* Schin. — I. Hajós.
68. *erythrura* Schin. — I. Kalocsa. II. Kapornak.
69. *cilicrura* Rndi. — I. Kalocsa.
70. *nigrithorax* Egg. — II. Sopron.

Subf. EUTACHININAE.

Eutachina BB.

71. *larvarum* L. — I. Debreczen, Kalocsa. VIII. Buccari.
72. *glossatorum* Rndi. — I. Kalocsa.
73. *Winnertzi* BB. — I. Kalocsa.

Microtachina BB.

74. *erucarum* Schin. — I. Kalocsa. V. Brassó. VIII. Fiume.
75. *nympharum* Rndi. — I. Kalocsa. VIII. Fiume.

Chaetotachina BB.

76. *rustica* Mg. — I. Kalocsa. IV. S.-A.-Ujhely, Szőllőske. V. Vallis Riu Vadului. VI. Mehádia, Orsova.

Tricholyga Rndi.

77. *major* Rndi. — I. Kalocsa.
78. *lasiommata* Mg. — I. Montes Budenses.

Subf. RHINOMETOPIINAE.

Stomatomyia BB.

79. *filipalpis* Rndi. — VIII. Fiume.
80. *acuminata* Rndi. — I. Kalocsa.

Subf. GERMARIINAE.

Germaria RD.

81. *ruficeps* Fll. — I. Kalocsa.

Subf. GONIINAE.

Gonia Mg.

82. *atra* Mg. — I. Kalocsa.
83. *fasciata* Mg. — I. Kalocsa. II. Dunaföldvár.
84. *divisa* Mg. — I. Kalocsa. II. Dunaföldvár, Sopron. III. Rozsnyó.
85. *capitata* Deg. — I. Kalocsa. II. Dunaföldvár, Őszöd.
86. *ornata* Mg. — I. Kalocsa. II. Sopron. VI. Mehádia, Orsova.
87. *cilipeda* Rndi. — I. Kalocsa. IV. Tokaj.
88. *Försteri* Mg. et
89. *maculipennis* Egg. — Teste Kowarz etiam Hungariam incolunt.

Pseudogonia BB.

90. *cinerascens* Rndi. — I. Kalocsa. II. Dunaföldvár.

Onychogonia BB.

91. *flaviceps* Ztt. — III. Trencsén.

Spallanzania Rndi.

92. *hebes* Rndi. — I. Kalocsa. V. Vizakna. VI. Mehádia, Orsova.

Cnephalia Rndi.

93. *bisetosa* BB. — I. Kalocsa, Keczel. II. Dunaföldvár, Sopron. V. Mehádia, Orsova.

Subf. PACHYSTYLINAE.

Pachystylum Schin.

94. *arcuatum* Mik. — III. Losoncz. V. Montes Cibinienses.

Subf. BAUMHAUERIINAE.

Baumhaueria Mg.

95. *goniaeformis* Mg. — I. Kalocsa. II. Dunaföldvár. VI. Mehádia, Orsova.

Thelimorpha BB.

96. *vertiginosa* Fll. — I. Kalocsa.

Brachychaeta BB.

97. *spinigera* Rndi. — I. Kalocsa.

Subf. POLIDEINAE.

Somoleja Rnd.

98. *rebaptizata* Rnd. — V. Vallis Riu-Vadului.

Subf. PSEUDODEXIINAE.

Melanota Rndi.

99. *volvolus* F. — I. Budapest, Kalocsa. II. Dunaföldvár, Sopron, Szálka. IV. Jeszenő. V. Orlát. VI. Mehádia, Orsova. VII. Eszék.

Macquartia BB.

100. *nitida* Ztt. — I. Montes Budenses, Kalocsa.
101. *chalconota* Wied. — I. Kalocsa. II. Dunaföldvár. VI. Mehádia, Orsova. VII. Eszék.
102. *affinis* Schin. — VII. Eszék.
103. *grisea* Schin. — I. Kalocsa. V. Montes Cibinienses. VI. Mehádia.
104. *rufipes* Mg. — I. Kalocsa.
105. *chalybeata* Mg. — II. Sopron. VI. Mehádia, Orsova.
106. *nigrita* Fll. — IV. Tolcsva. VI. Mehádia, Orsova.
107. *dispar* Fall. — VI. Mehádia, Orsova.

Loewia Egg.

108. *setibarba* Egg. — VI. Mehádia, Orsova.
109. *brevifrons* Rndi. — IV. Velejte.

Morinia Rndi.

110. *melanoptera* Mg. — I. Budapest, Kalocsa.
111. *nana* Mg. — I. Budapest, Kalocsa. II. Dunaföldvár. IV. Erdőbénye, S.-A.-Ujhely, Tokaj. V. Orlát. VI. Mehádia. VII. Eszék.
112. *anthracina* Schin. — III. Trencsén,

Mintho R. Desv.

113. *compressa* Rndi. — I. Kalocsa. II. Somlyó.
114. *praeceps* Rndi. — I. Kalocsa, Nagyvárad. II. Sopron. III. Rozsnyó. VI. Grebenácz, Mehádia. VII. Eszék.
115. *lacera* Rndi. — V. Nagyszeben.

Degeeria Mg.

116. *ornata* Mg. — I. Kalocsa.

Thelaira R. Desv.

117. *nigripes* Mg. — I. Kalocsa.
118. *leucozona* Mg. — I. Kalocsa. II. Sopron. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj. VI. Mehádia. Orsova. VII. Eszék.

Subf. PYRRHOSIINAE.

Plagiopsis BB.

119. *soror* Egg. — VIII. Fiume.

Demoticus Mq.

120. *plebejus* Fll. — I. Kalocsa. IV. Erdőbénye. VI. Vallis Cserna, Korniaréva. VII. Eszék. VIII. Buccari.

Sesiophaga BB.

121. *glirina* Rndi. — I. Kalocsa.

Aphria R. Desv.

122. *longirostris* Mg. — I. Kalocsa. II. Dunaföldvár. VII. Eszék. VIII. Carlopago.

Chrysosoma R. Desv.

123. *auratum* Fll. — VI. Resicza. VIII. Fiume.

Rhinotachina BB.

124. *sybarita* Mg. — I. Kalocsa. VIII. Fiume.
125. *proletaria* Egg. — VIII. Fiume.

Hystrichoneura BB.

126. *frontata* Boh. — II. Sopron, Tapolcza. III. Nagy-Rőcze. VIII. Fiume.

Leskia R. Desv.

127. *aurea* Fll. — I. Kalocsa, Szeghalom. II. Sopron. IV. Erdőbénye. V. Peér, Vallis Riu Vadului. VI. Mehádia, Resicza. VIII. Fiume.

Myobia R. Desv.

128. *fenestrata* Mg. — VI. Mehádia, Orsova.
129. *longipes* Mg. — I. Kalocsa.
130. *inanis* Fll. — I. Beél, Kalocsa, Nagyvárad. II. Sopron. IV. Nagyszeben, Vallis Riu Vadului. VI. Vallis Cserna, Korniaréva.
131. *pacifica* Mg. — I. Kalocsa. II. Dunaföldvár.
132. *diaphana* Rndi. — V. Nagyszeben.

Zophomyia Mcq.

133. *temula* Mg. — I. Budapest, Kalocsa. II. Dunaföldvár, Kapornak, Sopron. IV. S.-A.-Ujhely. VI. Mehádia, Orsova.

Subf. PSEUDOMINTHOINAE.

Olivieria R. Desv.

134. *appennina* Rndi. — I. Kalocsa.
135. *lateralis* F. — Ubique vulgata esse videtur.

Cylindrogaster Rndi.

136. *sanguinea* Mg. — VIII. Fiume.

Subf. OCYPTERINAE.

Ocyptera Latr.

137. *bicolor* Oliv. — Ubique occurrit.
138. *excisa* Lw. — I. Budapest. IV. Tokaj. V. Kis-Csür (?). Kraku-Stancsului. VI. Mehádia.
139. *pilipes* Lw. — I. Budapest. V. Ad ripam Alutae. VIII. Fiume.
140. *brassicaria* Fll. — Ubique divulgata.
141. *intermedia* Mg. — I. Nagyvárad. II. Dunaföldvár.
142. *cylindrica* F. — I. Kalocsa. II. Dunaföldvár, Őszöd, Sopron. IV. S.-A.-Ujhely. VI. Vallis Cserna, Grebenácz, Korniaréva.
143. *interrupta* Mg. — I. Nagyvárad. II. Dunaföldvár, Sopron. IV. Szobráncz. VIII. Fiume.
144. *scalaris* Lw. — VIII. Fiume.

Ocypterula Rndi.

145. *pusilla* Mg. — I. Kalocsa, Keczel. II. Dunaföldvár. IV. Tokaj. VIII. Fiume.

Exogaster Rndi.

146. *rufifrons* Lw. — I. Budapest. VIII. Fiume.

Lophosia Mg.

147. *fasciata* Mg. — VI. Resicza.

Subf. MICROPALPINAE.

Cuphocera Mcq.

148. *ruficornis* Mcq. — VIII. Fiume.
149. *pyrogaster* Rndi. — VIII. Fiume.

Micropalpus Mcq.

150. *vulpinus* Schin. — II. Sopron, Szálka.
151. *fulgens* Mg. — VI. Mehádia.
152. *comptus* Fll. — I. Akasztó.
153. *haemorrhoidalis* Mg. — I. Kalocsa. II. Dunaföldvár, Sopron, Sümeg. III. Nagy-Rőcze.
154. *pictus* Mg. — I. Kalocsa. II. Sopron.
155. *frater* Rndi. — II. Sümeg.

Subf. ERIGONINAE.

Erigone R. Desv.

156. *radicum* F. — II. Sopron. III. Trencsén. V. Montes Cibinienses Vallis Riu-Vadului.
157. *strenua* Mg. — I. Kalocsa.
158. *vivida* Zett. — I. Kalocsa.
159. *caesia* Fll. — I. Kalocsa. II. Dunaföldvár. IV. Rabaskala.
160. *rudis* Fll. — I. Kalocsa. IV. Rabaskala.
161. *consobrina* Mg. — IV. Prasiva, Rabaskala.
162. *connivens* Zett. — I. Kalocsa. V. Brassó.

Subf. TACHININAE.

Fabricia R. Desv.

163. *ferox* Mg. — II. Sopron. III. Nagy-Rőcze, Szliács. V. Montes Cibinienses. VII. Eszék, Zágráb.

Eudora R. Desv.

164. *Friedrichii* Wachtl. — VI. Mehádia.

Pelleteria R. Desv.

165. *tessellata* Mg. — Ubique communis.
166. *ferina* Zett. — III. Szitnya. V. Tusnád, Vizakna.

Tachina Mg.

167. *grossa* L. — I. Budapest, Debreczen. II. Sopron, Tapolcza. III Borosznó, Rozsnyó. IV. Homonna-Olyka, Vihorlat.
168. *Marklini* Ztt. — III. Trencsén.
169. *fera* L. — Communis.
170. *conjugata* Rndi. — IV. S.-A.-Ujhely.
171. *magnicornis* Schin. — Ubique nec raro legitur.

Clairvillia R. Desv.

172. *ocypterina* Schin. — V. Montes Cibinienses.

Servillia R. Desv.

173. *lurida* F. — I. In monte Nagyszál. II. Sopron. III. Rozsnyó. IV. Erdőbénye. VI. Mehádia.
174. *ursina* Mg. — II. Sopron. III. Rozsnyó.
175. *Brunneri* Lw. — VI. Vaskapu.

Subf. PLAGIINAE.

Plagia Mg.

176. *ambigua* Fll. — VI. Mehádia, Orsova.
177. *ruralis* Fll. — I. Kalocsa. II. Paks. VI. Mehádia.
178. *curvinervis* Schin. — I. Kalocsa.

Cyrtophlebia Rndi.

179. *nigripalpis* Rndi. — VI. Mehádia, Orsova.

Ptilopareia BB.

180. *marginata* Mg. — II. Sopron.

Paraplagia BB.

181. *trepida* Mg. — I. Nagyvárad, Rév. VI. Mehádia, Orsova.

Subf. TRYPTOCERINAE.

Siphona Mg.

182. *cristata* F. — I. Kalocsa. II. Dunaföldvár. VI. Mehádia.
183. *geniculata* Mg. — I. Kalocsa. II. Dunaföldvár, Kapornak, Sopron. IV. Erdőbénye, Páczin. VI. Mehádia.
184. *cinerea* BB. — I. Kalocsa.

Thryptocera Mg.

185. *latifrons* Mg. — I. Kalocsa. II. Sopron. III. Rozsnyó.

Bigonichaeta Rndi.

186. *setipennis* Fll. — I. Kalocsa.

Trichopareia BB.

187. *seria* Mg. — VI. Mehádia, Orsova.

Admontia BB.

188. *blanda* Fll. — II. Dunaföldvár. V. Orlát.

Gymnopareia BB.

189. *exoleta* Mg. — II. Sopron.
190. *tibialis* Rndi. — VIII. Fiume.

Urophylla BB.

191. *leptotrichopa* BB. — I. Kalocsa.

Roeselia R. D.

192. *antiqua* Fll. — II. Dunaföldvár.

Hypostena Mg.

193. *procera* Mg. — I. Kalocsa.
194. *medorina* Schin. — III. Rozsnyó. VI. Mehádia, Orsova.

Phorichaeta Rndi.

195. *lugens* Mg. — I. Budapest, Hajós. II. Sopron. VI. Orsova.
196. *fuliginaria* Rndi. — I. Akasztó, Kalocsa.
197. *carbonaria* Pz. — I. Budapest, Kalocsa. II. Sopron.
198. *succincta* Mg. — VI. Mehádia.
199. *cunctans* Mg. — VI. Mehádia.

Anachaetopsis BB.

200. *ocypterina* Ztt. — II. Sopron.

Subf. SCHINERIINAE.

Schineria Rndi.

201. *tergestina* Rndi. — IV. S.-A.-Ujhely. VIII. Fiume.

Subf. GYMNOSOMATINAE.

Gymnosoma Fll.

202. *rotundatum* L. — Ubique commune.
v. *costatum* Pz. — VIII. Fiume.
203. *ramulosum* Madarassy. — VI. Ferenczfalva, Resicza.

Stylogymnomyia BB.

204. *nitens* Mg. — I. Kalocsa. II. Dunaföldvár. VIII. Fiume.

Subf. PHANIINAE.

Syntomogaster Schin.

205. *convexus* Ztt. — I. Kalocsa.
206. *pannonicus* Lw. — VI. Herkulesfürdő, Plavisevicza.
207. *singularis* Egg. — II. Sopron.

Cercomyia BB.

208. *curvicauda* Fll. — I. Kalocsa. II. Dunaföldvár, Sopron. III. Rozsnyó. VI. Mehádia, Orsova.

Besseria Rob. Desv.

209. *melanura* Mg. — I. Kalocsa, Nagyvárad. II. Sopron. VIII. Fiume.

Phaniosoma Rndi.

210. *appennina* Rndi. — VI. Mehádia, Orsova.

Evibrissa Rndi.

211. *obscuripennis* Mg. — I. Montes Biharienses. II. Sopron, Szálka. III. Borosznó.

Phania Rndi.

212. *vittata* Mg. — II. Szálka. VII. Eszék.

Psalida Rndi.

213. *simplex* Fll. — I. Kalocsa. IV. Tolcsva. VI. Mehádia.
214. *analis* Mg. — VI. Mehádia, Orsova.
215. *brevis* Rossi. — VIII. Fiume.

Labidogyne BB.

216. *grandis* BB. — II. Ad lacum Fertő.
217. *biguttata* Mg. — II. Ad lacum Fertő. VII. Eszék. VIII. Fiume.
218. *ocypterina* R. Desv. — VIII. Fiume.

Subf. PHASIINAE.

Himantostoma Lw.

219. *hungarica* Thalh. — I. Apaj.

Cistogaster Latr.

220. *globosa* F. — I. Kalocsa. II. Sopron. III. Nagy-Rőcze, Pozsony. VIII. Fiume.

Xysta Mg.

221. *cana* Mg. — I. Kalocsa. VI. Mehádia, Orsova.
222. *holosericea* F. — I. Kalocsa. II. Dunaföldvár.

Phasia Latr.

223. *rostrata* Egg. — VI. Vallis Cserna, Korniaréva. VIII. Fiume.
224. *analis* F. — Ubique occurrit.
225. *crassipennis* Mg. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Sopron. III. Pozsony, Rozsnyó, Szliács. VI. Jassenova. VII. Eszék.
v. *dissimilis* Rndi. — V. Brassó, Kolozsvár. Szt-Erzsébet.
226. *sola* Rndi. — I. Kalocsa.

Ananta Mg.

227. *lateralis* Mg. — I. Budapest, Kalocsa. II. Sopron.
228. *nebulosa* Schin. — II. Sopron.

Allophora Girschner.

229. *hemiptera* F. — I. Kalocsa, Rézbánya. II. Sopron, Szálka. III. Pozsony. V. Kolozsvár. VI. Mehádia.
230. *aurigera* Egg. — II. Sopron.

Hyalomyia Girschner.

231. *obesa* F. — I. Kalocsa. IV. Homonna. VI. Mehádia, Orsova.
v. *aurulans* Mg. — II. Sopron. V. Montes Cibinienses.

232. *muscaria* Fll. — VI. Mehádia.
233. *atropurpurea* Schin. — II. Sopron. III. Nagy-Rőcze.

Parallophora Girschner.

234. *pusilla* Mg. — I. Apaj, Budapest, Kalocsa. II. Sopron. VI. Mehádia, Orsova.

Phorantha Rndi.

235. *subcoleoptrata* L. — I. Kalocsa. II. Kapornak, Sopron. VI. Mehádia.

Clytia Mcq.

236. *continua* Pz. — II. Dunaföldvár, Sopron. III. Pozsony. IV. S.-A.-Ujhely. V. Götzenberg.
237. *helvola* Mg. — II. Sopron.
238. *latifrons* Strobl. — VIII. Fiume.

Eliozeta Rndi.

239. *pellucens* Fll. — I. Kalocsa, Nagyvárad, Tenke. II. Sopron. IV. Homonna. V. Nagyszeben.
240. *tephra* Mg. — I. Kalocsa.

Lithophasia Girschner.

241. *hyalipennis* Fll. — I. Kalocsa. II. Sopron, Szálka.

Subf. TRIXINAE.

Trixa Mg.

242. *oestroidea* R. Desv. — V. Montes Cibinienses.

Fortisia Rndi.

243. *foeda* Mg. — II. Sopron. VI. Mehádia, Orsova.

Redtenbacheria Sch.

244. *insignis* Egg. — I. Hild. II. Ad lacum Fertő.

Subf. PHYTOINAE.

Phyto R. Desv.

245. *melanocephalus* Mg. — I. Kalocsa. II. Dunaföldvár. VIII. Fiume.
246. *parvicornis* Mg. — I. Kalocsa.

Melanophora Mg.

247. *roralis* L. — I. Kalocsa. II. Sopron. VI. Mehádia.
248. *atra* Mcq. — I. Kalocsa.

Microtricha Mik.

249. *punctulata* Wulp. — I. Hajós.

Halidaya Egg.

250. *argentea* Egg. — II. Ad lacum Fertő.
251 *aurea* Egg. — II. Sopron.

Stevenia Rndi.

252. *limbata* Mg. — VI. Mehádia, Orsova.
253. *maculata* Mg. — I. Kalocsa, Bánlaka. II. Dunaföldvár. VII. Eszék.

Catharosia Rndi.

254. *nigrisquama* Ztt. — I. Kalocsa.
255. *acuticornis* Rndi. — I. Kalocsa.

Subf. SYLLEGOPTERINAE.

Syllegoptera Rndi.

256. *ocypterata* Mg. — I. Kalocsa. II. Dunaföldvár. VI. Mehádia, Orsova.

Subf. RHINOPHORINAE.

Ptilochaeta Rndi.

257. *femoralis* Mg. — II. Dunaföldvár. VI. Mehádia, Orsova. VII. Eszék. VIII. Fiume.
v. *signata* Mik. — VII. Eszék. VIII. Fiume.

Rhinophora R. Desv.

258. *atramentaria* Mg. — I. Kalocsa. II. Dunaföldvár, Sopron.
259. *melania* Mg. — II. Sopron. VI. Mehádia. VIII. Carlopago.
260. *inornata* Lw. — VI. Mehádia, Orsova.
261. *lepida* Mg. — I. Kalocsa.

Styloneuria BB.

262. *Mannii* BB. — I. Kalocsa.

Brachycoma Rndi.

263. *devia* Fll. — V. Brassó.

Subf. ANCYSTROPHORINAE.

Clista Rndi.

264. *ignota* BB. — I. Kalocsa.

Subf. SARCOPHAGINAE.

Tephromyia BB.

265. *tessellata* Egg. — I. Kalocsa. V. Nagyszeben. VIII. Fiume.
266. *cinerea* Schin. — VI. Mehádia, Orsova. VIII. Fiume.

Zeuxia Mg.

267. *tessellata* Egg. — I. Hajós, Keczel.

Tapinomyia BB.

268. *piliseta* BB. — I. Kalocsa.

Cynomyia R. Desv.

269. *mortuorum* L. — I. Budapest. III. Koritnicza, Rozsnyó, Szitnya. IV. Rabaskala, Vihorlat. V. Negoi, montes Cibinienses.

Onesia R. Desv.

270. *sepulcralis* Mg. — I. Kalocsa. II. Dunaföldvár, Sopron. IV. Mád, Rabaskala, Sátoralja-Ujhely. V. Bucsecs, Montes Cibinienses, Nagyszeben.
271. *floralis* R. Desv. — I. Kalocsa. II. Őszöd, Sopron, Tapolcza. IV. Erdőbénye. V. Orlát.
272. *gentilis* Mg. — III. Trencsén. IV. Kis-Azar.
273. *cognata* Mg. — II. Sopron. VIII. Fiume.
274. *coerulea* Mg. — IV. Vihorlat.

Sarcophaga Mg.

275. *coerulescens* Rndi. — Communis.
v. *carnaria* Rndi. — VIII. Fiume.
v. *matertera* Rndi. — VIII. Fiume.
276. *atropos* Mg. — I. Kalocsa. II. Dunaföldvár. III. Koritnicza. VIII. Fiume.
v. *filia* Rndi. — I. Kalocsa. VIII. Fiume.
v. *noverca* Rndi. — I. Kalocsa. II. Kapornak.
v. *agricola* Mg. — VIII. Fiume.
v. *privigna* Rndi. — I. Kalocsa. III. Nagy-Rőcze. V. Domuk, Görgény.
277. *soror* Rndi. — I. Kalocsa.
278. *albiceps* Mg. — I. Kalocsa. II. Sopron. IV. S.-N.-Patak. VIII. Fiume.
279. *melanura* Mg. — III. Koritnicza, Szliács. V. Götzenberg. VIII. Fiume.
280. *vagans* Mg. — II. Sopron.
281. *pumila* Mg. — I. Kalocsa. II. Sopron. VI. Herkulesfürdő.
282. *socrus* Rndi. — I. Kalocsa. VIII. Fiume.
283. *clathrata* Mg. — VIII. Fiume.
284. *setipennis* Rndi. — VIII. Fiume.
285. *consobrina* Bell. — VIII. Fiume.
286. *obfuscata* Mg. — I. Kalocsa.
287. *dissimilis* Mg. — I. Kalocsa. IV. Rabaskala, S.-A.-Ujhely. Tállya.
288. *nurus* Rndi. — II. Sopron. IV. Homonna, S.-A.-Ujhely. V. Nagyszeben. VIII. Fiume.
289. *haemorrhoidalis* Fll. — I. Beél, Debreczen, Nagyvárad. VIII. Fiume.
290. *erythrura* Schin. — IV. Erdőbénye, Páczin, S.-A.-Ujhely, Tolcsva.
v. *consanguinea* Rndi. — I. Kalocsa.
291. *proxima* Rndi. — I. Kalocsa.
292. *haemorrhoa* Mg. — III. Nagy-Rőcze. IV. Sátoralja-Ujhely. VI. Mehádia, Orsova.
v. *vulnerata* Schin. — VIII. Fiume.
v. *nepos* Rndi. — I. Kalocsa.
293. *haematodes* Mg. — I. Nagyvárad. IV. Sátoralja-Ujhely. V. Bucsecs. VI. Mehádia.

Blaesoxypha Lw.

294. *grylloctona* Lw. — I. Kalocsa.

Theria R. Desv.

295. *muscaria* Mg. — I. Kalocsa. VI. Mehádia. VIII. Fiume.

Atropidomyia BB.

296. *parvula* Port. — VI. Vallis Sessemin prope Mehadiam ; mons Kernecska Csóka.

Rhinomorinia BB.

297. *sarcophagina* Schin. — I. Kalocsa.
298. *trifasciata* Mcq. — I. Kalocsa. VIII. Fiume.

Ptilozeuxia BB.

299. *brachycera* BB. — I. Kalocsa.

Wohlfartia BB.

300. *magnifica* Schin. — I. Budapest, Kalocsa. II. Dunaföldvár, Őszöd. V. Nagy-Ajta.
301. *Meigenii* Schin. — I. Kalocsa. VI. Mehádia.

Heteronychia BB.

302. *chaetoneura* BB. — I. Kalocsa.

Agria Mcq.

303. *hungarica* BB. — I. Szolnok.

Sarcophila Rndi.

304. *latifrons* Fll. — I. Kalocsa. II. Dunaföldvár, Őszöd. III. Nagy-Rőcze. VIII. Fiume.

Nyctia R. Desv.

305. *halterata* Pz. — I. Kalocsa. II. Sopron IV. S.-A.-Ujhely. VIII. Fiume.
v. *Servillei* R. Desv. — VIII. Fiume.
v. *caminaria* Pz. — VIII. Fiume.
306. *claripennis* R. Desv. — VII. Croatia teste Schiner.

Subf. MILTOGRAMMINAE.

Miltogramma Rndi.

307. *ruficornis* Schin. — VIII. Fiume.
308. *pilimana* Rndi. — VI. Mehádia. VIII. Fiume.
309. *oestracea* Mg. — I. Kalocsa. IV. Vihorlat. V. Ad ripam Alutae. VI. Mehádia.
310. *punctata* Mg. — I. Kalocsa.
311. *Contarinii* Rndi. — VIII. Fiume.
312. *Germari* Mg. — IV. Szomotor.

Metopodia BB.

313. *grisea* Mg. — I. Kalocsa.
314. *intricata* Mg. — II. Sopron. IV. Tokaj. VIII. Fiume.

Apodacra Mcq.

315. *pulchra* Egg. — I. Kalocsa.

Paragusia Schin.

316. *Frivaldszkyi* Schin. — I. Akasztó, Budapest, Kalocsa, Keczel.

Winnertzia Egg.

317. *Loewii* Rndi. — I. Budapest, Debreczen, Hajós, Keczel. IV. Szomotor.

Phylloteles Lw.

318. *pictipennis* Lw. — I. Budapest. VI. Grebenácz.

Metopia Mg.

319. *leucocephala* Rssi. — I. Kalocsa. II. Dunaföldvár, Mohács, Paks, Sopron. IV. Alsó-Bereczki. VI. Mehádia.
320. *argyrocephala* Mg. — I. Keczel. IV. Imreg, Szomotor. VI. Mehádia, Orsova.
321. *campestris*. Fll. — VI. Mehádia.
322. *Staegeri* Rndi. — IV. Szomotor.

Subf. PARAMACRONYCHIINAE.

Arrenopus BB.

323. *piligena* Rndi. — I. Kalocsa.

Heteropterina Mcq.

324. *multipunctata* Rndi. — I. Kalocsa.
325. *heteroneura* Mg. — I. Kalocsa.

Sphixapata Rndi.

326. *conica* Fll. — I. Kalocsa. II. Dunaföldvár. III. Nagy-Rőcze. IV. Szomotor, Tokaj. VI. Mehádia.
327. *lineola* Rndi. — I. Kalocsa. IV. Szomotor.
328. *albifrons* Rndi. — IV. Szomotor. VIII. Fiume.

Brachymera BB.

329. *rugosa* Mik. — I. Kalocsa.

Nemoraea Rndi.

330. *conjuncta* Rndi. — I. Kalocsa. II. Sopron.
331. *nupta* Rndi. — II. Sopron.

Pachyophthalmus BB.

332. *signatus* Mg. — VI. Mehádia, Orsova. VIII. Fiume.

Subf. MACRONYCHIINAE.

Macronychia Rndi.

333. *agrestis* Fll. — VI. Mehádia.

Dexiosoma Rndi.

334. *longifacies* Rndi. — I. Kalocsa. II. Dunaföldvár. Sopron. IV. Szomotor.
335. *canina* F. — II. Barcs, Sopron.

Subf. DEXIINAE.

Dolichodexia BB.

336. *rufipes* BB. — VI. Mehádia.

Estheria R. Desv.

337. *cristata* Mg. — I. Kalocsa. II. Dunaföldvár. VII. Eszék.

Myiostoma R. Desv.

338. *pectinatum* Mg. — III. Rozsnyó.

Phorostoma Rndi.

339. *subrotundatum* Rndi. — VI. Vaskapu. VIII. Fiume.

Syntomocera Schin.

340. *brevicornis* Egg. — I. Kalocsa.

Syrostoma Rondi.

341. *latum* Egg. — III. Szliács. VIII. Fiume.

Dexia Mg.

342. *rustica* Fll. — I. Kalocsa. II. Dunaföldvár, Paks, Szálka. III. Nagy-Rőcze, Rózsahegy, Trencsén.

Gymnodexia BB.

343. *Steinii* BB. — Auctoribus testibus Hungariæ incola.

Gymnobasis BB.

344. *microcera* Rndi. — I. Kalocsa. VI. Mehádia. VIII. Fiume.

Subf. PARADEXIINAE.

Prosena St. Farg. et Serv.

345. *sybarita* Mg. — I. Budapest, Kalocsa. II. Sopron. V. Brassó, Bucsecs, Orlát. VI. Vallis Cserna. Mehádia.
346. *longirostris* Egg. — I. Kalocsa. II. Sopron. III. Rozsnyó.

Dinera Rndi.

347. *flavicornis* Mg. — VI. Mehádia, Orsova.
348. *grisescens* Fll. — I. Belényes, Kalocsa, Nagy-

várad. II. Dunaföldvár, Sopron. III. Nagy-Rőcze. VI. Mehádia, Orsova.

349. *rufifrons* Rndi. — IV. S.-A.-Ujhely.

Myiocera R. Desv.

350. *ferina* Fll. — In omnibus regionibus occurrit.

351. *carinifrons* Fll. — I. Kalocsa. II. Dunaföldvár, Sopron. III. Nagy-Rőcze, Rozsnyó. V. Brassó, Götzenberg, Kolozsvár, Bucsecs. VI. Mehádia.

352. *interrupta* Meg. — Bucsecs.

Subf. MORPHOMYINAE.

Morphomyia Rndi.

353. *caliendrata* Rndi. — I. Budapest, Kalocsa.

Subf. RHYNCHOMYINAE.

Rhynchomyia R. Desv.

354. *columbina* Heffgg. — IV. Berzászka. VI. Mehádia, Orsova.

355. *cyanescens* Lw. — VI. Mehádia, Orsova.

Subf. RHINIINAE.

Idia Mg.

356. *lunata* F. — VI. Mehádia.

357. *speciosa* Lw. — Teste Loew Hungariam incolit.

Subf. MUSCINAE.

Stomoxys Geoffr.

358. *calcitrans* L. — Ubique divulgata.

Haematobia R. Desv.

359. *stimulans* Mg. — I. Debreczen, Kalocsa. III. Győr. V. Orlát.

Lyperosia Rndi.

360. *irritans* L. — I. Kalocsa. II. Dunaföldvár. IV. S.-A.-Ujhely, Szomotor.

Pollenia R. Desv.

361. *rudis* F. — Communissima.
v. *varia* Mg. — I. Budapest, Kalocsa. II. Dunaföldvár, Őszöd. V. Nagyszeben.

362. *vespillo* Mg. — Communis.

363. *atramentaria* Mg. — Communis.

364. *depressa* Mg. — IV. Kövesd.

Myiospila Rndi.

365. *meditabunda* F. — I. Kalocsa, Szeghalom. II. Dunaföldvár, Sopron. III. Nagy-Rőcze. V. Negoi. VI. Mehádia, Orsova.

Graphomyia R. Desv.

366. *maculata* Scop. — Communis.

Musca L.

367. *domestica* L. — Ubique divulgata.

368. *corvina* F. — Vulgatissima.

369. *tempestiva* F. — I. Budapest, Kalocsa. II. Dunaföldvár, Sopron. IV. Szomotor. V. Nagy-Ajta. VIII. Fiume.

Plaxemyia Rob. Desv.

370. *vitripennis* Mg. — Communis.

371. *phasiaeformis* Mg. — I. Nagyvárad.

Cyrtoneura Mcq.

372. *hortorum* Wied. — Communis.

373. *pascuorum* Mg. — I. Kalocsa. II. Dunaföldvár, Sopron. III. Nagy-Rőcze. VI. Mehádia.

374. *stabulans* F. — Vulgatissima.

375. *pabulorum* Fll. — I. Kalocsa. II. Dunaföldvár, Kapornak, Paks. III. Nagy-Rőcze. V. Nagyszeben.

376. *simplex* Lw. — VI. Mehádia.

377. *caesia* Mg. — I. Kalocsa. VI. Mehádia.

378. *assimilis* Fll. — I. Kalocsa.

Mesembrina Mg.

379. *mystacea* L. — II. Sopron. III. Deménfalva. V. Montes Cibinienses.

380. *meridiana* L. — In montanis frequentissima.

Pyrellia R. Desv.

381. *cadaverina* L. — I. Debreczen, Kalocsa. II. Dunaföldvár. III. Nagy-Rőcze. V. Brassó. Nagyszeben, Tusnád, Vizakna. VI. Mehádia. VIII. Fiume.

382. *cyanicolor* Ztt. — V. Orlát.

383. *serena* Mg. — V. Bucsecs, Götzenberg, Nagy-Ajta, Nagyszeben, vallis Riu-Vadului.

384. *aenea* Ztt. — I. Beél, Nagyvárad. III. Nagy-Rőcze. VI. Jaszenova, Mehádia.

Lucilia R. Desv.

385. *regina* Mg. — I. Debreczen. V. Brasssó, Nagyszeben. VI. Mehádia. VIII. Fiume.

386. *nobilis* Mg. — I. Kalocsa. V. Nagyszeben. VI. Mehádia. VIII. Fiume.

387. *caesar* L. — Communissima.

388. *ruficeps.* Mg. — I. Kalocsa. II. Őszöd, Sopron.

389. *sericata* Mg. — II. Őszöd. IV. S.-A.-Ujhely.

390. *cornicina.* Fll. — I. Debreczen, Nagyvárad. II. Sopron. III. Rozsnyó. IV. Erdőbénye, Sátoralja-Ujhely, Szőlőske. V. Brassó, Nagyszeben, Orlát. VI. Mehádia.

391. *silvarum* Mg. — I. Kalocsa. II. Őszöd, Sopron. IV. Alsó-Bereczki, S.-A.-Ujhely.
392. *albiceps* Mg. — I. Beél, Debreczen, Nagyvárad.
393. *illustris* Mg. — VIII. Fiume.

Calliphora R. Desv.

394. *vomitoria* L. — Communis.
395. *erythrocephala* Mg. — Communissima.
396. *grönlandica* Ztt. — V. Nagyszeben.
397. *azurea* Fll. — II. Dunaföldvár. VIII. Fiume.

Dasyphora R. Desv.

398. *versicolor* Mg. — I. Kalocsa. V. Montes Cibinienses.
399. *pratorum* Mg. — Communis.
v. *saltuum* Rndi. — VIII. Fiume.

Subf. ANTHOMYINAE.

Polyetes Rndi.

400. *lardaria* F. — I. Debreczen, Kalocsa. II. Ad lacum Fertő. V. Montes Cibinienses. VI. Mehádia. VIII. Fiume.
401. *albolineata* Fll. — III. Rozsnyó.

Aricia R. Desv.

402. *lucorum* Fll. — I. Kalocsa. II. Ad lacum Fertő. III. Rozsnyó. VI. Mehádia. Orsova.
403. *obscurata* Mg. — I. Kalocsa. V. Bucsecs, Orlát.
404. *van der Wulpii* Schnabl.
v. *4. Strobl.* — V. Negoi.
v. *5. Strobl.* — V. Götzenberg.
405. *lugubris* Mg. — III. Montes Tátra.
406. *serva* Mg. — III. Rozsnyó. V. Montes Cibinienses.
v. *annosa* Ztt. — V. Bucsecs, Orlát.
407. *marmorata* Ztt. — III. Montes Tátra. V. Montes Cibinienses VI. Mehádia.
408. *longipes* Ztt. — I. Montes Biharienses, Kalocsa. V. Bucsecs, montes Cibinienses.
409. *umbratica* Mg. — V. Ad fontem Szamos, montes Cibinienses. VI. Mehádia.
410. *variabilis* Fll. — V. Montes Cibinienses.
411. *signata* Mg. — I. Kalocsa. V. Nagyszeben.
412. *semicinerea* Wied. — V. Bucsecs, montes Cibinienses. VI. Mehádia.
413. *laeta* Fll. — III. Rozsnyó. VI. Mehádia.
414. *fuscata* Fll. — III. Tátra. VI. Mehádia.
415. *perdita* Mg. — I. Kalocsa. III. Losoncz.
416. *trigonalis* Mg. — VI. Mehádia, Orsova.
417. *erratica* Fll. — I. Debreczen, Kalocsa. III. Rozsnyó. VI. Mehádia.
418. *errans* Mg. — III. Tátra. V. Orlát.
419. *vagans* Fll. — III. Koritnicza, Rozsnyó, Szitnya. VIII. Fiume.
420. *pallida* F. — I. Debreczen, Kalocsa. V. Nagyszeben. VI. Mehádia.
421. *scutellaris* Fll. — VI. Mehádia, Orsova.
v. *stolata* Rndi. — V. Götzenberg.
422. *diaphana* Wied. — I. Budapest, Kalocsa, Peszér. VI. Herkulesfürdő, Orsova.
423. *variegata* Mg. — III. Tátra. VI. Mehádia.
424. *carbo* Schin. — VI. Mehádia.
425. *incana* Wied. — III. Tátra.
426. *meridionalis* Rndi. — I. Kalocsa.
427. *trimaculata* Bouché. — VI. Mehádia.
428. *pura* Lw. — VI. Mehádia, Orsova.
429. *quadrinotata* Mg. — III. Nagy-Rőcze.

Spilogaster Mcq.

430. *notata* Fll. — I. Debreczen, Nagyvárad. III. Rozsnyó.
431. *dispar* Fll. — V. Bucsecs, montes Cibinienses.
432. *vespertina* Fll. — VI. Mehádia, Orsova.
433. *carbonella* Zett. — V. Bucsecs.
434. *nigrinervis* Zett. — V. Montes Cibinienses.
435. *duplicata* Mg. — I. Kalocsa, Nagyvárad. V. Montes Cibinienses. VI. Mehádia, Orsova.
v. *duplaris* Zett. — V. La Dusch.
436. *quadrum* Mg. — I. Beél, Debreczen, Kalocsa, Nagyvárad.
437. *angelicae* Scop. — VI. Mehádia. VIII. Fiume.
438. *urbana* Mg. — VI. Mehádia, Orsova.
439. *pagana* F. — VI. Mehádia, Orsova.
440. *impuncta* Fll. — I. Beél, Kalocsa, Nagyvárad.
441. *uliginosa* Fll. — VI. Mehádia, Orsova.
442. *calceata* Rndi. — I. Kalocsa. V. Montes Cibinienses.
443. *Sundevalli* Zett. — V. Bucsecs, montes Cibinienses.
444. *cothurnata* Rndi. — I. Kalocsa. VI. Vallis Sessemin (Com. Krassó-Szörény).
445. *exul* Ztt. — I. Kalocsa.
446. *consimilis* Fll. — VI. Mehádia, Orsova.

Limnophora R. Desv.

447. *quadrimaculata* Fll. — VI. Mehádia, Orsova.
448. *pertusa* Mg. — VI. Mehádia, Orsova.
449. *tetra* Mg. — III. Rózsahegy.
450. *fratercula* Zett. v. — V. Bucsecs.
451. *solitaria* Ztt. — V. Montes Cibinienses.
452. *didyma* Ztt. *ap.* Schin. — V. Vöröstorony szoros. Ad ripam Alutæ.
453. *atramentaria* Mg. — V. Bucsecs, montes Cibinienses.

Trichopticus Rndi.

454. *hirsutulus* Ztt. — V. Bucsecs. Montes Cibinienses.
455. *aculeipes* Ztt. — V. Bucsecs, montes Cibinienses.
456. *subrostratus* Ztt. — V. Bucsecs.
457. *eriophtalmus* Zett. — III. Losoncz.

Drymeia Mg.

458. *hamata* Fll. — II. Ad lacum Fertő. V. Montes Cibinienses.

Hydrotaea R. Desv.

459. *occulta* Mg. — VI. Mehádia, Orsova.
460. *ciliata* F. — III. Nagy-Rőcze.
461. *meteorica* L. — I. Debreczen, Kalocsa. V. Montes Cibinienses. VI. Mehádia.
462. *irritans* Fll. — V. Montes Cibinienses.
463. *armipes* Fll. — I. Kalocsa. V. Bucsecs, Vöröstorony szoros. VI. Mehádia.
464. *dentipes* F. — VI. Mehádia, Orsova.
465. *dentimana* Mg. — VI. Mehádia, Orsova.
466. *amoena* Lw. — VI. Kazán.
467. *silvicola* Lw. — VI. Mehádia, Orsova.

Ophyra R. Desv.

468. *leucostoma* Fll. — Communis.
469. *anthrax* Mg. — V. Brassó.

Eriphia Mg.

470. *cinerea* Mg. — VI. Mehádia, Orsova.

Homalomyia Bouché.

471. *canicularis* L. — I. Budapest, Kalocsa, Nagyvárad. V. Nagyszeben. VI. Mehádia, Orsova.
472. *manicata* Mg. — V. Bucsecs, montes Cibinienses.
473. *scalaris* F. — I. Budapest, Kalocsa, Kecskemét. II. Dunaföldvár, Tapolcza. V. Nagyszeben. VI. Mehádia. VIII. Fiume.
474. *armata* Mg. — VI. Mehádia, Orsova.
475. *sociella* Zett. — V. Montes Cibinienses.
476. *incisurata* Zett. — I. Kalocsa. II. Dunaföldvár. VI. Mehádia, Orsova. VIII. Fiume.
477. *lepida* Wied. — VI. Mehádia, Orsova.
478. *carbonella* Stein. — V. Montes Cibinienses.
479. *serena* Zett. — I. Kalocsa. II. Dunaföldvár. V. Montes Cibinienses. VI. Mehádia.
480. *coracina* Lw. — VI. Herkulesfürdő.
481. *fasciculata* Lw. — VI. Herkulesfürdő.
482. *obesa* Lw. — VI. Mehádia, Orsova.
483. *minutipalpis* Stein. — I. Kalocsa.
484. *herniosa* Rndi. — VI. Mehádia, Orsova.

Azelia Rndi.

485. *Staegeri* Zett. — VI. Mehádia, Orsova.
486. *cilipes* Hal. — V. Montes Cibinienses. VI. Krassó, Mehádia.
487. *Zetterstedti* Rndi. — VI. Mehádia, Orsova.
488. *aterrima* Mg. — VI. Mehádia, Orsova.
489. *gibbera* Mg. — Teste Loew Hungariæ incola.
490. *Macquarti* Staeg. — III. Losoncz. V. Bucsecs.
491. *monodactyla* Lw. — III. Losoncz.
492. *triquetra* Mcq. — VI. Krassó.

Eustalomyia Kow.

493. *hilaris* Fll. — V. Nagyszeben. VI. Mehádia.
494. *festiva* Ztt. — III. Rozsnyó.
495. *histrio* Zett. — III. Rozsnyó.
496. *vittipes* Zett. — IV. Tolcsva.

Hydrophoria Rndi.

497. *divisa* Mg. — I. Kalocsa. III. Rozsnyó.
498. *conica* Wied. — I. Kalocsa, Budapest, Kecskemét. V. Montes Cibinienses. VI. Mehádia.
499. *socia* Fll. — I. Kecskemét. V. Nagyszeben. VI. Mehádia.

Hylemyia R. Desv.

500. *maculata* Mcq. — VI. Mehádia.
501. *variata* Fll. — I. Budapest. V. Bucsecs, montes Cibinienses. VI. Krassó, Mehádia, Orsova.
v. *ruralis* Mg. — V. Götzenberg.
502. *strigosa* Fll. — I. Kalocsa. II. Dunaföldvár. III. Rozsnyó. VI. Mehádia.
503. *lasciva* Zett. — V. Bucsecs, Vöröstorony szoros.
504. *nigrimana* Mg. — I. Kalocsa. II. Dunaföldvár. VI. Mehádia.
505. *flavipennis* Fll. (?). — V. Montes Cibinienses.
506. *praepotens* Wied. — I. Budapest. II. Kőszeg.
507. *antiqua* Mg. — I. Debreczen, Kecskemét.
508. *platura* Mg. — V. Montes Cibinienses. VI. Krassó.
509. *cinerella* Mg. — I. Budapest, Kalocsa, Kecskemét.
510. *coarctata* Fll. — III. Rozsnyó.
511. *pullula* Zett. — I. Budapest, Kalocsa. V. Nagyszeben. VI. Krassó.
512. *nigrescens* Rndi. — I. Budapest. VI. Krassó.

Acanthiptera Rndi.

513. *inanis* Fll. — I. Kalocsa.

Anthomyia Mg.

514. *vittigera* Ztt. — V. Götzenberg. VI. Mehádia.
515. *transversa* Fll. — I. Kalocsa.
516. *Winthemi* Mg. — I. Kalocsa. III. Rozsnyó. V. Götzenberg.
517. *mitis* Mg. — III. Rozsnyó. VI. Mehádia.
518. *bicolor* Wied. — VI. Mehádia, Orsova.

519. *hyoscyami* Deg. — VI. Mehádia.
520. *pluvialis* L. — Ubique communis.
v. *procellaria* Rndi. — Cum stirpe.
v. *imbrida* Rndi. — V. Montes Cibinienses.
521. *zonata* Ztt. — V. Götzenberg.
522. *albicincta* Fll. — I. Budapest, Kalocsa, Kecskemét, Nagyvárad. V. Götzenberg. VI. Mehádia.
523. *pratincola* Pz. — I. Budapest, Kalocsa.
524. *cinerella* Fll. — I. Kalocsa. V. Vizakna. VIII. Fiume.
525. *humerella* Ztt. — III. Rozsnyó. V. Bucsecs, Montes Cibinienses. VI. Krassó.
526. *sulciventris* Rndi. — III. Rozsnyó. V. Bucsecs, montes Cibinienses. VI. Krassó.
v. *alpina* Strobl. — V. Montes Cibinienses.
527. *cilicrura* Rndi. — I. Kalocsa, Kecskemét. V. Bucsecs, Nagyszeben, Negoi. VI. Mehádia.
528. *floralis* Fll.—V. Götzenberg. VI. Mehádia, Orsova.
529. *radicum* L. — I. Beél, Debreczen, Nagyvárad, Kalocsa. V. Kis-Csür, Nagyszeben. VI. Mehádia.
530. *varicolor* Mg. — I. Budapest.
531. *impudica* Rndi. — I. Kalocsa.
532. *flavipes* Fll. — V. Montes Cibinienses.
533. *maculipes* Ztt. — V. Montes Cibinienses.
534. *schisticolor* Ztt. — VI. Mehádia, Orsova.
535. *pratensis* Mg. — V. Bucsecs. VI. Mehádia.
536. *sepia* Mg. — I. Kalocsa. V. Montes Cibinienses.
537. *lactucae* Bouché. — I. Debreczen. III. Rozsnyó. VI. Mehádia.
538. *longula* Fll. — V. Orlát.
539. *ignota* Rndi. — V. Montes Cibinienses.
540. *striolata* Mg. — V. Nagyszeben, montes Cibinienses.
541. *discreta* Mg. — V. Bibarczfalva, montes Cibinienses.
542. *rufipes* Mg. — I. Debreczen.
543. *cardui* Mg. — I. Beél, Budapest, Debreczen, Nagyvárad. V. Montes Cibinienses. VI. Mehádia.
544. *triplex* Lw. — VI. Kazán.
545. *corvina* Lw. — VI. Vallis Gráczka, Orsova.
546. *ciliatocostata* Ztt. — III. Szitnya.
547. *villipes* Mg. — VI. Mehádia.
548. *polystigma* Mg. — VI. Mehádia.
549. *paralleliventris* Ztt. — VI. Mehádia.

Hylephila Rndi.

550. *buccata* Fll. — I. Budapest, Kalocsa.
551. *unilineata* Ztt. — I. Budapest.
552. *conformis* Fll. — I. Debreczen.

Hammomyia Rndi.

553. *albescens* Zett. — I. Kalocsa. II. Dunaföldvár. III. Rozsnyó. VI. Herkulesfürdő.

Chelisia Rndi.

554. *monilis* Mg. — I. Kalocsa, Kecskemét. VI. Mehádia, Orsova.

Hoplogaster Rndi.

555. *mollicula* Fll. — I. Kalocsa. V. Bucsecs, montes Cibinienses. VI. Mehádia.
v. *cinctula* Rndi. — V. Montes Cibinienses.
556. *biocellata* Zett. — V. Bucsecs.
557. *remotella* Zett. — V. Bucsecs.

Coenosia Mg.

558. *alma* Mg. — VI. Mehádia, Orsova.
559. *pictipennis* Lw. — I. Kalocsa, Vadkert. VI. Deliblat.
560. *tricolor* Zett. — I. Kalocsa. V. Montes Cibinienses. VI. Mehádia.
561. *decipiens* Mg. — I. Kalocsa, Kecskemét.
562. *pedella* Fll. — I. Kalocsa. VI. Mehádia.
563. *nigridigita* Rndi. — I. Kalocsa. V. Montes Cibinienses.
564. *nana* Ztt. — VI. Mehádia, Orsova.
565. *geniculata* Fll. — V. Bucsecs, Orlát.
v. *pygmaea* Fll. — V. Orlát.
566. *bilineella* Zett. — V. Bucsecs, montes Cibinienses.
567. *albatella* Ztt. — I. Kalocsa, Keczel, Vadkert.
568. *humilis* Mg. v. *pulicaria* Ztt. — V. Bucsecs, Orlát.
569. *articulata* Ztt. — V. Orlát.
570. *triangula* Fll. — V. Vöröstorony szoros, ad ripam Alutæ. VI. Mehádia, Orsova.
571. *pacifica* Mg. —V. Vöröstorony szoros, ad ripam Alutæ.
572. *globuliventris* Ztt. — I. Kalocsa, Keczel, Hild. II. Dunaföldvár. V. Ad ripam Alutæ, Orlát, Vöröstorony szoros. VI. Mehádia.
573. *tigrina* F. — I. Budapest, Kalocsa, Nagyvárad. VI. Mehádia.
v. *leonina* Rndi. — I. Budapest, Kalocsa. V. Orlát. VI. Mehádia.
v. *pardalina* Rndi. — VI. Mehádia.
574. *intermedia* Fll. — V. Orlát.
v. *b.* — V. Montes Cibinienses.
575. *meditata* Fll. — V. Orlát.

Eutrichola Kow.

576. *inornata* Lw. — I. Kalocsa. VI. Zimony.

Mycophaga Rndi.

577. *fungorum* R. Desv. — V. Götzenberg. VI. Mehádia, Orsova.

Schoenomyza Hal.

578. *litorella* Fll. — I. Kalocsa, Kecskemét. II. Dunaföldvár. V. Bucsecs, Orlát, montes Cibinienses.

Chirosia Rndi.

579. *fallax* Lw. — I. Kalocsa. VI. Orsova.

Myopina R. Desv.

580. *reflexa* Rndi. — I. Esztergom. Kalocsa. II. Dunaföldvár. VI. Mehádia, Orsova.

Calliophrys Kow.

581. *pulchriceps* Lw. — VI. Mehádia, Orsova.

582. *riparia* Fll. — I. Kalocsa. II. Dunaföldvár. VI. Mehádia, Orsova.

Dialyta Mg.

583. *atriceps* Lw. — VI. Mehádia.

Lispe Latr.

584. *simplicissima* Lw. — VI. Mehádia.

585. *tentaculata* Deg. — I. Kalocsa, Kecskemét, Peszér. II. Dunaföldvár. III. Rozsnyó. V. Vöröstorony szoros, ad ripam Alutæ. VI. Mehádia. VII. Eszék. VIII. Fiume.

586. *litorea* Fll. — I. Kalocsa. II. Dunaföldvár. V. Vöröstorony szoros, ad ripam Alutæ.

587. *superciliosa* Lw. — I. Kalocsa. VI. Mehádia.

588. *melaleuca* Lw. — I. Budapest, Kalocsa. II. Dunaföldvár. VII. Eszék.

589. *leucomelaena* Kow. — I. Kalocsa. II. Dunaföldvár. VII. Eszék.

590. *apicalis* Mik. — I. Kalocsa. VII. Eszék.

591. *consanguinea* Lw. — I. Kalocsa. II. Dunaföldvár. V. Ad ripam Alutæ, Vöröstorony szoros. VII. Eszék.

592. *nana* Mcq. — I. Kalocsa, Vadkert.

593. *tenuipalpis* Ztt. — I. Kalocsa. VII. Eszék.

594. *flavicincta* Lw. v. *unicolor* Strobl. — V. Vöröstorony szoros, ad ripam Alutæ.

Atherigona Rndi.

595. *varia* Mg. — I. Kalocsa, Kecskemét. II. Dunaföldvár. VI. Krassó, Mehádia.

B) ACALYPTERAE.

Subf. SCATOMYZINAE.

Cordylura Fll.

596. *pudica* Mg. — V. Bölön (Com. Háromszék).

597. *pubera* L. — I. Kalocsa, Visegrád. II. Sopron. IV. S.-A.-Ujhely, Imreg.

598. *ciliata* Mg. — VI. Herkulesfürdő.

599. *umbrosa* Lw. — I. Budapest, Kalocsa, Rákos. II. Dunaföldvár. III. Losoncz.

600. *biseta* Lw. — I. Kalocsa.

Parallelomma Beck.

601. *albipes* Fll. — I. Foktő. IV. Bártfa, Imreg. VI. Herkulesfürdő.

Phrosia R. Desv.

602. *albilabris* F. — I. Budapest, Kalocsa, Kecskemét, Nagyvárad. II. Kapornak. III. Trencsén. IV. Bártfa, Bresztó, Szobráncz, Tolcsva. V. Somlyó-Ujlak, Tasnád, Zsibó. VI. Herkulesfürdő, VII. Eszék.

Cnemopogon Rndi.

603. *apicalis* Mg. — I. Budapest, Kalocsa. V. Bölön (Com. Háromszék), Brassó.

Orthochaeta Beck.

604. *pilosa* Ztt. — II. Sopron.

Megaphthalma Beck.

605. *pallida* Fll. — V. Montes Cibinienses.

Amaurosoma Beck.

606. *flavipes* Fll. — I. Budapest, Kalocsa.

Norellia R. Desv.

607. *striolata* Mg. — I. Ad specum Oncsásza. IV. Bártfa, Vihorlat. V. Montes Cibinienses. VI. Berszászka.

608. *alpestris* Schin. — VII. Fužine.

609. *spinimana* Mg. — I. Budapest, Kalocsa, Jászberény, Kecskemét, Rákos. II. Sopron, Szálka. III. Rozsnyó. IV. Mád, Nagy-Mihály, S.-A.-Ujhely. V. Peér, Tasnád. VI. Herkulesfürdő.

610. *liturata* Mg. — IV. Rabaszkala, Szinnaikő. V. Bucsecs, montes Cibinienses.

611. *flavicauda* Mg. — V. Götzenberg.

Achantolena Rndi.

612. *spinipes* Mg. — I. Budapest. VII. Herkulesfürdő.

Acanthocnema Beck.

613. *glaucescens* Lw. — VI. Herkulesfürdő.

Tricopalpus Rndi.

614. *fraternus* Mg. — I. Kalocsa, Kecskemét.

615. *punctipes* Mg. — I. Kalocsa.

Scatophaga Mg.

616. *scybalaria* L. — I. Budapest, Kalocsa. II. Sopron, Visegrád. IV. Gesztely, Imreg, Páczin, Nagy-Mihály, Tolcsva.

617. *inquinata* Mg. — II. Dunaföldvár, Sopron. III. Rozsnyó. IV. Erdőbénye, S.-A.-Ujhely. VI. Herkulesfürdő.
618. *analis* Mg. — II. Sopron.
619. *lutaria* F. — I. Budapest, Kalocsa, Kecskemét. II. Sopron. III. Nagy-Rőcze, Rozsnyó, Szitnya. IV. S.-A.-Ujhely. V. Bucsecs, Nagyszeben, montes Cibinienses.
620. *stercoraria* L. — In tota ditione vulgatissima.
621. *merdaria* F. — I. Kalocsa, Kecskemét. III. Rozsnyó. V. Bucsecs, Nagyszeben, montes Cibinienses, Zilah.
622. *squalida* Mg. — I. Kalocsa. IV. Orosz-Ruszka V. Montes Cibinienses, Negoi. VI. Herkulesfürdő.
623. *maculipes* Zett. — IV. Tokaj.
624. *suilla* Mg. — I. Budapest. IV. Gesztely, Imreg.

Clidogastra Mcq.

625. *anthrax* Schin. — V. Montes Cibinienses.

Fucellia R. Desv.

626. *fucorum* Fll. —VIII. Buccari, Carlopago, Zengg, Fiume.
627. *muscaria* Ztt. (?) — I. Kalocsa.

Subf. HELOMYZINAE.

Helomyza Fll.

628. *gigantea* Mg. — I. Budapest, Kecskemét. VI. Herkulesfürdő.
629. *maxima* Schin. — I. Kalocsa.
630. *inornata* Lw. — V. Montes Cibinienses.
631. *affinis* Mg. — I. Budapest, Kalocsa. IV. Bártfa, Szinnaikő, Tolcsva. V. Pele. VI. Herkulesfürdő. VIII. Fiume.
632. *flava* Mg. — I. Budapest, montes Mátra. IV. Nagy-Károly.
633. *ustulata* Mg. — II. Sopron. V. Nagyszeben. VI. Herkulesfürdő.
634. *similis* Mg. — I. Budapest, Kalocsa. II. Sopron. VI. Herkulesfürdő.
635. *olens* Mg. — I. Kalocsa. V. Montes Cibinienses, Peér. VI. Herkulesfürdő.
636. *univittata* v. Ros. — I. Kalocsa. II. Szálka. V. Montes Cibinienses. VI. Herkulesfürdő.
637. *pilimana* Lw. — III. Montes Tátra. V. Montes Cibinienses.
638. *Zetterstedti* Lw. — II. Sopron. IV. Vihorlat. V. Montes Cibinienses.
639. *nemorum* Mg. — I. Kalocsa. V. Bucsecs, montes Cibinienses.
640. *apicalis* Schin. — I. Kalocsa.
641. *rufa* Fll. *apud* Schin. — I. Kalocsa. II. Sopron. III. Nagy-Rőcze, Rozsnyó.
642. *montana* Lw. — V. Bucsecs, montes Cibinienses.

Allophyla Lw.

643. *atricornis* Mg. — II. Sopron. III. Javorina, Rozsnyó. IV. Bártfa. V. Montes Cibinienses.

Eccoptomera Lw.

644. *longiseta* Mg. — I. Kalocsa. V. Nagyszeben.
645. *emarginata* Lw. — VI. Herkulesfürdő.
646. *pallescens* Mg. — VI. Resicza.
647. *scutellaris* Ztt. — I Antrum Fericse.

Oecothea Lw.

648. *fenestralis* Fll. — IV. S.-A.-Ujhely. VI. Herkulesfürdő.

Blepharoptera Lw.

649. *inscripta* Mg.—V. Bucsecs, montes Cibinienses.
650. *spectabilis* Lw. — I. Budapest, Kalocsa.
651. *serrata* L. — I. Kalocsa, Kecskemét. Antrum Pestere. II. Tapolcza. IV. S.-A.-Ujhely, Tárkány. VI. Herkulesfürdő, Resicza.
652. *variabilis* Lw. — V. Negoi, montes Cibinienses. VI. Resicza.
653. *caesia* Mg. — IV. Tokaj. VI. Herkulesfürdő.
654. *modesta* Mg. — VI. Herkulesfürdő.
655. *ruficauda* Zett. — I. Specus Fericse, Kalocsa, Nagyvárad.
656. *brachyptera* Lw. — VI. Mehádia.
657. *ruficornis* Mg. — V. Montes Cibinienses.

Heteromyza Fll.

658. *oculata* Fll. — I. Budapest, antrum a Josepho archiduce nominatum, antrum Pestere. III. Turócz. IV. Aggtelek, Kassa. VIII. Fiume.

Tephrochlamys Lw.

659. *rufiventris* Mg. — I. Kalocsa. IV. S.-A.-Ujhely, Szomotor. VI. Mehádia.
660. *flavipes* Zett. — I. Budapest. II. Visegrád. V. Bucsecs, Tasnád. VI. Resicza.
661. *laeta* Mg. — VI. Mehádia.
662. *tarsalis* Ztt. — II. Szegzárd.

Heteroneura Fll.

663. *flava* Mg. — V. Bucsecs, Montes Cibinienses, Nagyszeben.

Lucina Mg.

664. *fasciata* Mg. — I. Budapest, Kalocsa. VI. Gombos, Mehádia.

Neottiphilum Frfld.

665. *praeustum* Mg. — II. Sopron.

Subf. DRYOMYZINAE.

Dryomyza Fll.

666. *flaveola* F. — I. Budapest, Kalocsa, montes Mátra, Nagyvárad. II. Sopron. III. Tátrafüred. IV. Simonka, Tolcsva. VI. Mehádia.
v. *Zavadzkyi* Schum. — IV. S.-A.-Ujhely.
667. *anilis* Fll. — I. Montes Mátra. II. Sopron. III. Tátrafüred. VI. Mehádia.

Subf. SCIOMYZINAE.

Phaeomyia Schin.

668. *nigripennis* F. — I. Kecskemét, Pilis, Pilis-Szántó, Rákos. II. Pécs, Sopron. VI. Mehádia. VII. Croatia.
669. *leptiformis* Schin. — I. Budapest.

Sciomyza Fll.

670. *testacea* Mg. — I. Kalocsa. IV. Bereczki.
671. *lata* Schin. — I. Kalocsa, Kecskemét, Rákos. II. Dunaföldvár. III. Rozsnyó. VII. Eszék.
672. *nigrimana* Mg. — I. Hajós.
673. *simplex* Fll. — I. Kalocsa.
674. *bifasciella* Fll. — I. Foktű, Kalocsa.
675. *dorsata* Zett. — I. Kalocsa, Nagyvárad. II. Dunaföldvár, Sopron. IV. Kassa. V. Görcsön, Sz.-Nagyfalu.
676. *albocostata* Fll. — I. Kalocsa, Kecskemét. IV. Ránk. V. Montes Cibinienses.
677. *obtusa* Fll. — I. Kalocsa.
678. *griseola* Fll. — I. Akasztó, Hajós, Kalocsa. IV. Bresztó. VII. Eszék.
679. *ventralis* Fll. — V. Montes Cibinienses.
680. *rufiventris* Mg. — I. Kalocsa. V. Bucsecs, montes Cibinienses.
681. *cinerella* Fll. — I. Budapest, Kalocsa, Kecskemét, Rákos. II. Sopron. IV. Szobráncz. V. Peleszarvad. VI. Mehádia. VII. Eszék.
682. *dubia* Fll. — II. Szálka. IV. Bártfa. V. Montes Cibinienses. VI. Mehádia.
683. *nana* Fll. — I. Kalocsa, Kecskemét.
684. *Schönherri* Fll. — I. Kalocsa. II. Bellye V. Nagyszeben. VII. Eszék.
685. *ruficeps* Ztt. — I. Budapest, Kecskemét. V. Peér.

Cormoptera Schin.

686. *limbata* Mg. — I. Kalocsa. II. Dunaföldvár. VII. Eszék.

Subf. TETANOCERINAE.

Tetanocera Latr.

687. *elata* F. — II. Pécs. IV. Bártfa, Szobráncz, Vihorlat. VI. Herkulesfürdő.
688. *laevifrons* Lw. — IV. Bártfa, Mons Pop-Iván, Vihorlat.
689. *sylvatica* Mg. — I. Kalocsa. II. Kapornak, Sopron. IV. Bártfa.
690. *ferruginea* Fll. — I. Kalocsa. II. Dunaföldvár, Sopron. IV. Erdőbénye, S.-A.-Ujhely, Varannó. V. Peleszarvad. VI. Herkulesfürdő.
v. *robusta* Lw. — I. Kalocsa. IV. Sátoralja-Ujhely.
691. *vittigera* Schin. — I. Kalocsa, Rákos. II. Sopron. IV. Imreg.
692. *punctata* F. — I. Budapest, Kalocsa. II. Szegzárd. IV. Jeszenő, S.-A.-Ujhely.
693. *reticulata* F. — In omnibus regionibus satis frequens.
694. *umbrarum* L. — I. Kalocsa, Rákos. II. Bellye, Dunaföldvár, Sopron. V. Peér.
695. *coryleti* Scop. — I. Kalocsa, montes Mátra. II. Sopron, Szálka. III. Nagy-Rőcze. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely. V. Montes Cibinienses.
696. *punctulata* Scop. — Communis.
697. *unicolor* Lw. — I. Kalocsa. IV. Bártfa.
698. *chaerophylli* F. — VI. Herkulesfürdő.

Limnia R. Desv.

699. *marginata* F. — I. Budapest, Kalocsa, Nagyvárad. II. Dunaföldvár, Sopron. III. Trencsén. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely. V. Cseke, Sz.-Nagyfalu. VI. Herkulesfürdő. VII. Eszék.
700. *catenata* Lw. — I. Budapest, Kalocsa, Kecskemét. II. Barcs, Komárom, Sopron. III. Nagy-Rőcze.
701. *unguicornis* Scop. — Communis.
702. *rufifrons* F. — I. Nagyvárad.
703. *obliterata* F. — I. Budapest, Kalocsa, Kecskemét. II. Szálka. IV. Bártfa.

Elgiva.

704. *albiseta* Scop. — I. Budapest, Kalocsa. II. Dunaföldvár, Pécs, Sopron. IV. S.-A.-Ujhely, Szomotor, Szőllőske. VI. Krassó.
705. *dorsalis* F. — I. Kalocsa. IV. Homonna.
706. *lineata* Fll. — I. Kecskemét.
707. *rufa* Pz. — I. Kalocsa. II. Sopron.
708. *cucullaris* L. — I. Kalocsa. II. Sopron.

Sepedon Latr.

709. *sphegeus* F. — I. Budapest, Kalocsa, Ráczkeve. II. Dunaföldvár, Sopron, Zákány. IV. Szőllőske. VI. Orsova.
710. *spinipes* Scop. — I. Budapest, Kalocsa, Kecskemét. II. Dunaföldvár, Sopron. IV. Bártfa, Erdőbénye, S.-A.-Ujhely. VII. Eszék.

Subf. DORYCERINAE.

Dorycera Mg.

711. *graminum* F. — IV. S.-A.-Ujhely. VIII. Fiume.

Trigonometopus Mcq.

712. *frontalis* F. — I. Kalocsa. II. Bellye.

Subf. ORTALINAE.

Pteropoecila Lw.

713. *lamed.* Schrk. — I. Budapest, Hajós. III. Pozsony, Trencsén. IV. Tolcsva. VI. Krassó, Herkulesfürdő.

Carmocaris Lw.

714. *bucephala* Mg. — II. Sopron.

Ptilonota Lw.

715. *centralis* F. — I. Hajós, Kalocsa. II. Dunaföldvár. VI. Mehádia. VII. Eszék.

716. *guttata* Mg. — I. Kecskemét.

Ortalis Fll.

717. *genualis* Lw. — I. Budapest.

718. *ornata* Mg. — I. Budapest, Kalocsa. II. Sopron. V. Vizakna.

719. *ruficeps* F. — II. Sopron, Tapolcza. III. Nagy-Rőcze. IV. Sárospatak. S.-A.-Ujhely, Tolcsva. VI. Krassó, Mehádia.

720. *gangraenosa* F. — IV. S.-A.-Ujhely.

721. *laevigata* Lw. — VI. Kazán.

722. *Kowarzi* Lw. — V. Nagyszeben. VI. Orsova.

Systata Lw.

723. *rivularis* F. — I. Kalocsa. IV. Homonna.

Pteropaectria Lw.

724. *paludum* Fll. — I. Hajós, Kalocsa.

725. *palustris* Mg. — I. Budapest, Kalocsa, Kecskemét. II. Sopron. IV. Szobráncz. VI. Krassó. VII. Eszék.

726. *parva* Lw. — I. Kalocsa.

727. *frondescentiae* L. — I. Hajós, Kalocsa, Kecskemét. II. Sopron.

728. *germinationis* Rossi. — II. Sopron. VIII. Fiume.

Tephronota Lw.

729. *rufipes* Mg. — IV. S.-A.-Ujhely.

Ceroxys Mcq.

730. *picta* Mg. — I. Akasztó, Kalocsa, Vadkert. V. Nagy-Ajta, Vizakna.

731. *crassipennis* F. — II. Dunaföldvár. IV. Bártfa. V. Zilah.

732. *omissa* Mg. — I. Akasztó, Kalocsa, Kecskemét. II. Sopron.

733. *unicolor* Lw. — I. Budapest.

734. *acuticornis* Lw. — I. Budapest, Kalocsa, Kecskemét, montes Mátra, Vadkert. II. Sopron. VII. Eszék.

Anacampta Lw.

735. *urticae* L. — I. Hajós. II. Sopron.

736. *hyalinata* Pz. — I. Budapest, Kalocsa. II. Dunaföldvár, Sopron, Tapolcza. IV. Homonna, S.-A.-Ujhely. VI. Temesvár.

Rivellia R. Desv.

737. *syngenesiae* F. — I. Kalocsa, Kecskemét. II. Dunaföldvár, Sopron. V. Montes Cibinienses.

Platystoma Mg.

738. *umbrarum* F. — VIII. Fiume.

739. *tegularia* Lw. — VI. Mehádia.

740. *biseta* Lw. — IV. Szőllőske, Tolcsva. VI. Mehádia.

741. *seminationis* F. — I. Beél, Budapest, Kalocsa, Kecskemét, Nagyvárad. II. Sopron, Szegzárd. III. Hermanecz. IV. Czéke, Kassa, S.-A.-Ujhely. VI. Oravicza. VII. Eszék.

742. *pubescens* Lw. — I. Budapest. IV. S.-A.-Ujhely.

Myennis Lw.

743. *fasciata* F. — I. Kalocsa. II. Dunaföldvár. IV. Homonna.

Subf. ULIDIINAE.

Seoptera Krb.

744. *vibrans* L. — In omnibus regionibus lecta.

Ulidia Mg.

745. *apicalis* Mg. — I. Speciem hanc meridionalem A. Mocsáry legit apud urbem Kecskemét.

746. *erythrophthalma* Mg. — I. Kalocsa. II. Dunaföldvár, Kapornak, Sopron, Szegzárd. III. Hermanecz, Nagy-Rőcze, Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Tolcsva. VII. Eszék.

747. *nigripennis* Lw. — I. Budapest. III. Hermanecz.

Chrysomyza Fll.

748. *demandata* F. — Communis.

Subf. SAPROMYZINAE.

Sapromyza Fall.

749. *illota* Lw. — I. Kalocsa. IV. Rabaskala. V. Montes Cibinienses.

750. *praeusta* Fall. — I. Hajós, Kalocsa, Nagyvárad. II. Sopron. III. Trencsén. IV. Imreg. VI. Krassó, Mehádia. VII. Eszék.
751. *affinis* Zett. — V. Bucsecs, montes Cibinienses.
752. *biumbrata* Lw. — IV. Imreg. VI. Mehádia.
753. *interstincta* Fall. — I. Kalocsa.
754. *multipunctata* Fall. — I. Beél, Belényes, Kalocsa. II. Dunaföldvár, Sopron. III. Rozsnyó. VII. Eszék.
755. *decempunctata* Fall. — I. Budapest, Kalocsa. II. Sopron. V. Montes Cibinienses. VI. Krassó, Mehádia.
756. *notata* Fall. — I. Hajós, Kalocsa. II. Sopron.
757. *sexpunctata* Mg. — I. Élesd, Rév. IV. Nagy-Károly, Tokaj. V. Peleszarvad.
758. *muricata* Beck. — VIII. Fiume.
759. *quadripunctata* L. — I. Budapest, Kalocsa, Kecskemét, Nagyvárad, Tenke. II. Dunaföldvár, Sopron. III. Rozsnyó, Szliács, Trencsén. IV. Tokaj. V. Peleszarvad, Zilah. VII. Eszék.
760. *bipunctata* Mg. — I. Debreczen, Kecskemét, Peszér. II. Sopron, Szálka. III. Nagy-Rőcze. IV. S.-A.-Ujhely.
761. *longipennis* F. — I. Debreczen, Kalocsa, Kecskemét. II. Dunaföldvár, Sopron. IV. Tolcsva. VI. Mehádia. VII. Eszék.
762. *lupulina* F. — Communis.
763. *fasciata* Fll. — I. Budapest, Kalocsa, Nagyvárad. II. Dunaföldvár, Szálka, Szegzárd. IV. Homonna, Imreg, Tokaj. VI. Mehádia. VIII. Fiume.
764. *subvittata* Lw. — I. Kalocsa. V. Peleszarvad. VIII. Fiume.
765. *plumicornis* Fall. — I. Beél, Budapest, Kalocsa, Keczel, Kecskemét. II. Dunaföldvár. VI. Mehádia. VIII. Fiume.
766. *flaviventris* Costa. — I. Budapest, Kecskemét. VI. Mehádia.
767. *abbreviata* Beck. — I. Kalocsa, Keczel. II. Dunaföldvár.
768. *helvola* Beck. — II. Szálka.
769. *obsoleta* Fall. — I. Kalocsa.
770. *apicalis* Lw. — I. Budapest, Kalocsa, Kecskemét. III. Rozsnyó. IV. Czéke.
771. *basalis* Zett. — I. Kalocsa. V. Montes Cibinienses.
772. *Loewii* Schin. — V. Montes Cibinienses.
773. *albiceps* Fall. — II. Dunaföldvár.
774. *decipiens* Lw. — I. Kalocsa. IV. Tokaj.
775. *simplex* Lw. — I. Kalocsa, Keczel.
776. *pallidiventris* Fall. — I. Kalocsa. VI. Mehádia.
777. *quadricincta* Beck. — Hungaria meridionalis.
778. *minor* Beck. — I. Kalocsa.
779. *laeta* Zett. — I. Kalocsa. V. Bucsecs, montes Cibinienses.
780. *rorida* Fall. — I. Kalocsa. II. Dunaföldvár. IV. Erdőbénye, Rabaskala, Vihorlat. V. Bucsecs, montes Cibinienses. VI. Krassó, Mehádia.
781. *difformis* Lw. — I. Kalocsa. IV. Vihorlat. V. Bucsecs, montes Cibinienses. VI. Mehádia.
782. *tetrachaeta* Lw. — VI. Kazán.

Peplomyza Hal.

783. *Wiedemanni* Lw. — I. Budapest, Kalocsa. II. Dunaföldvár, Sopron. V. Montes Cibinienses. VI. Kazán. VII. Eszék.
784. *Baumhaueri* Lw. — I. Budapest, Kalocsa. II. Dunaföldvár, Sopron. III. Trencsén. V. Nagy-Ajta. VII. Eszék.

Lauxania Fall.

785. *cylindricornis* F. — I. Kalocsa, Nagyvárad. IV. S.-A.-Ujhely. V. Montes Cibinienses.
786. *Elisae* Mg. — I. Debreczen, Nagyvárad. IV. Jeszenő. V. Peleszarvad.
787. *aenea* Fall. — In omnibus regionibus divulgata.
788. *nitens* Lw. — I. Kecskemét. VI. Herkulesfürdő.

Paroecus Beck.

789. *signatipes* Lw. — I. Budapest, Kalocsa, Kecskemét, Keczel. II. Dunaföldvár.

Subf. LONCHAEINAE.

Palloptera Fall.

790. *saltuum* L. — IV. Rabaskala.
791. *ustulata* Fall. — II. Szegzárd. VI. Mehádia.
792. *umbellatarum* F. — II. Sopron. V. Montes Cibinienses.
793. *parallela* Lw. — I. Budapest.
794. *arcuata* Mg. — I. Kalocsa.
795. *ephippium* Zett. — I. Kalocsa.

Lonchaea Fall.

796. *lasiophthalma* Mcq. — I. Budapest, Kalocsa. II. Dunaföldvár, Szegzárd.
797. *dasyops* Mg. — VI. Mehádia.
798. *fumosa* Egg. — II. Sopron.
799. *Deutschi* Zett. — VI. Mehádia.
800. *palposa* Zett. — II. Dunaföldvár.
801. *scutellaris* Rndi. — I. Kalocsa. V. Montes Cibinienses.
802. *laticornis* Mg. — I. Kalocsa.
803. *fugax* Beck. — I. Kalocsa.
804. *tarsata* Fall. — I. Kalocsa.
805. *parvicornis* Zett. — I. Kalocsa.

806. *vaginalis* Fall. — I. Kalocsa, Kecskemét. II. Dunaföldvár. IV. Bereczki, Laskócza, S.-A.-Ujhely, Tolcsva. V. Peleszarvad, Tasnád. VI. Mehádia.
807. *inaequalis* Lw. — I. Beél, Nagyvárad. V. Montes Cibinienses. VI. Mehádia, Plavisevicza.

Subf. TRYPETINAE.

Platyparea Lw.

808. *poeciloptera* Schrk. — I. Kalocsa. II. Alcsut, Sopron. IV. Nagy-Mihály. VI. Krassó.
809. *discoidea* F. — II. Sopron.

Aciura R. Desv.

810. *femoralis* R. Desv. — I. Budapest. V. Vöröstorony szoros, Vizakna.

Acidia R. Desv.

811. *lucida* Fall. — I. Budapest, Kalocsa, Kecskemét. VII. Eszék.
812. *cognata* Wied. — I. Kalocsa. II. Szegzárd. VII. Eszék.
813. *heraclei* L. — I. Budapest, Kalocsa, Kecskemét. II. Dunaföldvár, Sopron. VII. Eszék.
814. *lychnidis* F. — VI. Mehádia.

Spilographa Lw.

815. *abrotani* Mg. — VI. Mehádia.
816. *alternata* Fall. — I. Kalocsa.
817. *Meigenii* Lw. — I. Budapest.

Rhagoletis Lw.

818. *cerasi* L. — I. Budapest, Kalocsa. II. Dunaföldvár, Sopron.

Trypeta Mg.

819. *jaceae* R. Desv. — I. Budapest, Kalocsa. II. Dunaföldvár, Sopron. V. Bucsecs, montes Cibinienses, Vöröstorony szoros, Peleszarvad.
820. *falcata* Scop. — I. Budapest, Kalocsa, Kecskemét. II. Dunaföldvár, Sopron. IV. S.-A.-Ujhely. VI. Mehádia. VII. Eszék.
v. *punctata* Schrk. — I. Kalocsa.
821. *onotrophes* Lw. — I. Budapest. V. Bucsecs, montes Cibinienses. VI. Krassó.
822. *cornuta* F. — IV. S.-A.-Ujhely.
823. *distans* Lw. — II. Pécs.
824. *arctii* Lw. — II. Peleszarvad.
825. *tussillaginis* F. — II. Dunaföldvár, Sopron. III. Rozsnyó. V. Tasnád.
826. *colon* Mg. — I. Budapest, Kalocsa, Kecskemét. II. Dunaföldvár, Sopron. IV. Tokaj. VI. Vallis Cserna, Orsova.
827. *ruficauda* F. — II. Sopron. III. Nagy-Rőcze. IV. Simonka. V. Bibarczfalva, Peleszarvad.
828. *acuticornis* Lw. — I. Budapest.
829. *serratulae* L. — I. Akasztó, Kecskemét. II. Dunaföldvár.
830. *virens* Lw. — Teste Schiner Hungariam incolit.
831. *lappae* Cederhj. — II. Sopron.

Urophora R. Desv.

832. *solstitialis* L. — I. Budapest, Kalocsa, Kecskemét. II. Dunaföldvár, Sopron. IV. Homonna-Olyka. V. Montes Cibinienses.
833. *stylata* F. — I. Kalocsa. IV. Homonna, Tolcsva. VI. Krassó.
834. *affinis* Frfld. — I. Kalocsa. IV. Tokaj.
835. *cardui* L. — I. Kalocsa. IV. Jeszenő.
836. *terebrans* Lw. — VI. Mehádia.
837. *quadrifasciata* Mg. — I. Kalocsa, Nagyvárad. II. Dunaföldvár, Sopron. IV. S.-A.-Ujhely, Tállya, Tolcsva. V. Bucsecs, Orlát, Nagyszeben. VI. Krassó.
838. *eriolepidis* Lw. — I. Kalocsa. II. Dunaföldvár. IV. Jeszenő.
839. *aprica* Fall. — I. Montes Budenses, Kalocsa. II. Sopron, Tapolcza.

Myopites Bréb.

840. *inulae* v. Ros. — VI. Vallis Cserna.

Ensina R. Desv.

841. *sonchi* L. — I. Kalocsa. II. Dunaföldvár, Sopron. IV. Kövesd, S.-A.-Ujhely. V. Apácz, Orlát, vallis Alutæ. VI. Krassó.

Carphotricha Lw.

842. *guttularis* Mg. — I. Kalocsa. IV. Nagy-Mihály, S.-A.-Ujhely. V. Peér. VI. Mehádia.
843. *pupillata* F. — IV. Jeszenő. V. Montes Cibinienses. VI. Mehádia.

Oxyphora R. Desv.

844. *miliaria* Schrk. — I. Budapest, Dabas, Kalocsa. II. Dunaföldvár. Sopron. III. Rozsnyó. IV. Homonna. V. Orlát, Tasnád, Vöröstorony szoros. VI. Mehádia. VII. Eszék.
845. *Schneideri* Lw. — VI. Mehádia.
846. *corniculata* Fll. — I. Kalocsa. III. Rozsnyó, Szitnya.
847. *trimaculata* Geoffr. — IV. S.-A.-Ujhely.
848. *biflexa* Lw. — III. Szitnya. IV. Imreg.
849. *Schefferi* Frfld. — III. Mons Szitnya.

Sphenella Lw.

850. *marginata* Fll. — I. Kalocsa. II. Dunaföldvár.

Oxyna R. Desv.

851. *pantherina* Fll. — I. Kalocsa. III. Rozsnyó. IV. Tolcsva. V. Bibarczfalva, Nagy-Ajta, Orlát. VI. Mehádia.

852. *flavipennis* Lw. — I. Kalocsa, Nagyvárad. II. Dunaföldvár. IV. Sárospatak, Sátoralja-Ujhely, Comit. Mármaros. V. Orlát, Tasnád, Nagy-Ajta. VI. Krassó.

v. *corticina* Rndi. — V. Orlát.

853. *proboscidea* Lw. — I. Belényes, Budapest, Nagyvárad. IV. Homonna, S.-A.-Ujhely. V. Brassó, Orlát, mons Perbete. VI. Mehádia.

854. *doronici* Lw. — V. Bucsecs, Montes Cibinienses.

855. *punctella* Rndi. — I. Kalocsa.

856. *producta* Lw. — V. Vallis Alutæ. VI. Krassó.

857. *elongatula* Lw. — I. Kalocsa. II. Sopron. IV. Tolcsva. V. Nagyszeben, Zilah.

858. *bullans* Wied. — I. Kalocsa. V. Vallis Alutæ.

Tephritis Lw.

859. *arnicae* L. — IV. S.-A.-Ujhely.

860. *conura* Lw. — V. Orlát.

861. *ruralis* Lw. — V. Nagy-Ajta, Tasnád.

862. *cincta* Lw. — VI. Mehádia.

863. *dioscurea* Lw. — I. Kalocsa. II. Dunaföldvár. V. Bucsecs, montes Cibinienses. VI. Krassó.

864. *leontodontis* Deg. — I. Kalocsa. II. Dunaföldvár, Sopron. IV. Rabaskala. V. Vallis Alutæ.

865. *bardanae* Mg. — I. Kalocsa. IV. Tolcsva. V. Zilah.

866. *hyoscyami* L. — I. Kalocsa. II. Sopron.

867. *postica* Lw. — II. Sopron. IV. Homonna. VI. Mehádia.

868. *valida* Lw. — Teste Stein (apud Loew) Hungariæ incola.

869. *nigricauda* Lw. — I. Budapest.

870. *pulchra* Lw. — IV. S.-A.-Ujhely. V. Orlát, Vizakna.

Urellia Lw.

871. *eluta* Mg. — I. Kalocsa, Kecskemét. II. Dunaföldvár, Kapornak. VI. Krassó. VII. Eszék.

872. *cometa* Lw. — I. Budapest, Kalocsa, Kecskemét. II. Dunaföldvár, Kapornak, Szegzárd.

873. *stellata* Fuessli. — I. Kalocsa, Kecskemét, Rákos. V. Brassó. VII. Eszék.

874. *amoena* Frfld. — I. Kalocsa, Kecskemét, Rákos. II. Dunaföldvár.

Anomoia Wlk.

875. *antica* Wied. — VI. Mehádia.

Subf. SEPSINAE.

Sepsis Fall.

876. *punctum* F. — I. Budapest, Kalocsa. II. Dunaföldvár, Sopron. III. Trencsén. IV. Sárospatak, S.-A.-Ujhely, Tokaj, Tolcsva. V. Peleszarvad, Tasnád. VI. Mehádia. VIII. Fiume.

877. *violacea* Mg. — I. Budapest, Kalocsa, Kecskemét. III. Rozsnyó. IV. Parnó, S.-A.-Ujhely. V. Montes Cibinienses, Peleszarvad. VII. Eszék. VIII. Fiume.

878. *cynipsea* L. — I. Budapest, Kalocsa. II. Dunaföldvár, Sopron. IV. S.-A.-Ujhely, Szerencs, Szomotor, Tokaj. V. Bucsecs, montes Cibinienses, Negoi, Nagyszeben, Peleszarvad. VI. Mehádia. VII. Eszék.

v. *nigripes* Mg. — V. Bucsecs. Orlát.

v. *incisa* Strobl. — V. Götzenberg.

879. *flavimana* Mg. — II. Sopron. VIII. Fiume.

880. *pectoralis* Mcq. — V. Orlát. VI. Krassó.

881. *biflexuosa* Strobl. — I. Kalocsa.

882. *pilipes* Lw. — I. Kalocsa. V. Bucsecs.

883. *annulipes* Mg. — I. Kalocsa.

Nemopoda R. Desv.

884. *cylindrica* F. — I. Budapest, Kalocsa, Kecskemét. II. Dunaföldvár, Sopron, Szálka. IV. Erdőbénye, Szerencs, Tokaj, comit. Marmaros. V. Nagyszeben. VI. Mehádia. VII. Eszék.

885. *stercoraria* R. Desv. — IV. Parnó. V. Bucsecs. VI. Mehádia.

Themira R. Desv.

886. *putris* Mg. — I. Budapest, Kalocsa, Kecskemét. II. Dunaföldvár, Sopron.

887. *minor* Hal. — I. Kalocsa. II. Dunaföldvár. Sopron.

888. *Fallenii* Staeg. — I. Kalocsa. II. Sopron. V. Nagy-Ajta.

Saltella R. Desv.

889. *scutellaris* Fall. — I. Kalocsa, Kecskemét. II. Dunaföldvár, Sopron. VIII. Fiume.

890. *chaerophylli* Schrk. — VI. Mehádia.

Piophila Fall.

891. *nigriceps* Mg. — VI. Mehádia.

892. *affinis* Mg. — IV. Sárospatak. V. Montes Cibinienses.

893. *casei* L. — I. Budapest, Debreczen, Kalocsa, Nagyvárad. IV. Sárospatak. V. Gyulafehérvár, Szilágy-Nagyfalu. VI. Mehádia.

894. *nigrimana* Mg. — VI. Mehádia.

Madiza Fall.

895. *glabra* Fall. — I. Kalocsa. II. Dunaföldvár. VI. Mehádia.

Mycetaulus Lw.

896. *bipunctatus* Fall. — I. Kalocsa. V. Montes Cibinienses.

Lissa Mg.

897. *loxocerina* Fall. — II. Sopron. IV. S.-A.-Ujhely.

Subf. TANYPEZINAE.

Tanypeza Fall.

898. *longimana* Fall. — I. Kalocsa, Vadkert. II. Dunaföldvár. VII. Eszék.

Calobata Mg.

899. *calceata* Fall. — II. Sopron. IV. Tolcsva. V. Nagyszeben. VI. Mehádia.
900. *ephippium* F. — I. Kalocsa. IV. Varannó. V. Bibarczfalva, montes Cibinienses. VI. Mehádia.
901. *cibaria* L. — I. Kalocsa. II. Sopron. IV. Tolcsva. V. Zilah.
902. *adusta* Lw. — VI. Mehádia.
903. *trivialis* Lw. — VI. Mehádia.

Micropeza Mg.

904. *corrigiolata* L. — In omnibus regionibus invenitur.
905. *angustipennis* Lw. — VI. Mehádia.

Subf. PSILINAE.

Loxocera Mg.

906. *aristata* Pz. — I. Rákos. III. Trencsén.
907. *fulviventris* Mg. — IV. Bártfa,
908. *nigrifrons* Mcq. — I. Budapest.
909. *albiseta* Schrk. — I. Kecskemét. II. Sopron. IV. Erdőbénye, S.-A.-Ujhely.

Platystyla Mg.

910. *Hoffmanseggi* Mg. — I. Budapest. III. Tátrafüred.

Chyliza Fall.

911. *atriseta* Mg. — IV. Sátoralja-Ujhely. VI. Mehádia.
912. *annulipes* Mg. — VI. Mehádia.
913. *leptogaster* Pz. — I. Kalocsa. II. Dunaföldvár. VII. Eszék.
914. *vittata* Mg. — IV. Nagy-Károly, Rabaskala.

Psila Mg.

915. *obscuritarsis* Lw. — III. Turcsek.
916. *fimetaria* L. — II. Sopron. III. Rozsnyó, Trencsén. IV. Bártfa. V. Montes Cibinienses, Peleszarvad. VI. Mehádia.
917. *Audouini* Zett. — V. Montes Cibinienses.
918. *rufa* Mg. — IV. Mons Pop Iván.
919. *abdominalis* Schum. — IV. Bártfa.
920. *humeralis* Zett. — V. Bucsecs, montes Cibinienses.
921. *debilis* Egg. — VI. Krassó.
922. *morio* Ztt. — I. Kalocsa. V. Bucsecs.
923. *rosae* F. — I. Kalocsa, Kecskemét. II. Dunaföldvár. VI. Mehádia. VII. Eszék.
924. *nigricornis* Mg. — VI. Mehádia.
925. *villosula* Mg. — I. Kalocsa.

Subf. CHLOROPINAE.

Platycephala Fall.

926. *umbraculata* Mg. — I. Kalocsa, Rákos. II. Dunaföldvár, Sopron. VI. Resicza. VII. Eszék.
927. *planifrons* F. — I. Kalocsa, Rákos, Szeghalom. II. Dunaföldvár. VII. Eszék.

Meromyza Mg.

928. *pratorum* Mg. — I. Kalocsa. II. Dunaföldvár. IV. S.-A.-Ujhely, Sárospatak. V. Peleszarvad, VII. Eszék.
929. *variegata* Mg. — I. Kalocsa. II. Dunaföldvár, Kapornak, Sopron. IV. Szomotor, Tokaj. V. Orlát, Peleszarvad, Szödemeter, vallis Alutæ. VIII. Fiume.
930. *laeta* Mg. — I. Budapest, Kalocsa. II. Dunaföldvár, Sopron. IV. Szomotor. V. Orlát, Tasnád, Zilah. VIII. Fiume.
931. *saltatrix* L. — I. Kalocsa. II. Dunaföldvár. Sopron. IV. Erdőbénye, S.-A.-Ujhely, Szomotor, Tokaj. V. Orlát.
v. *nigriventris* Mcq. — I. Kecskemét. IV. Nagy-Károly. V. Peér. VI. Krassó.

Capnoptera Lw.

932. *fumipennis* Lw. — I. Kecskemét. VI. Krassó.

Anthracophaga Lw.

933. *strigula* F. — I. Kalocsa. II. Dunaföldvár, Sopron.
934. *frontosa* Mg. — I. Kalocsa.

Centor Lw.

935. *Cereris* Fll. — I. Budapest, Kalocsa. II. Dunaföldvár, Sopron. IV. Homonna, S.-A.-Ujhely, Szomotor. VI. Mehádia.
936. *myopinus* Lw. — I. Kalocsa. II. Dunaföldvár. IV. Orosz-Ruszka, Sátoralja-Ujhely, Szomotor, Tokaj, Tolcsva. V. Montes Cibinienses, Peleszarvad.
937. *nudipes* Lw. — I. Kalocsa. V. Montes Cibinienses. VI. Krassó.

Eurina Mg.

938. *pubescens* Mg. — I. Kalocsa.
939. *calva* Egg. — I. Budapest, Kalocsa.

Haplegis Lw.

940. *tarsata* Fall. — I. Kalocsa. II. Dunaföldvár.
941. *divergens* Lw. — I. Kalocsa.

Diplotoxa Lw.

942. *messoria* Fall. — I. Budapest, Kalocsa, Kecskemét. II. Dunaföldvár, Sopron. IV. Erdőbénye. VI. Mehádia.
943. *inconstans* Lw. — V. Montes Cibinienses.
944. *approximatinervis* Zett. — II. Sopron.

Chlorops Mg.

945. *rufina* Zett. — I. Kalocsa.
946. *didyma* Ztt. — I. Kalocsa. II. Sopron. IV. Szomotor.
947. *geminata* Mg. — V. Montes Cibinienses.
948. *humilis* Lw. — V. Orlát.
949. *nasuta* Schrk. — I. Kalocsa. II. Sopron. IV. S.-A.-Ujhely. Mons Pop-Iván. VI. Krassó.
950. *pannonica* Strobl. — I. Kalocsa.
951. *minuta* Lw. — I. Kalocsa. V. Montes Cibinienses. VI. Mehádia.
952. *speciosa* Mg. — V. Orlát.
953. *serena* Lw. — I. Budapest. IV. Tolcsva. VI. Krassó, Mehádia.
954. *taeniopus* Mg. — I. Budapest, Kalocsa, Kecskemét. V. Montes Cibinienses. VI. Mehádia.
955. *binotata* Lw. — V. Tasnád-Szántó.
956. *dasycera* Lw. — IV. Tolcsva.
957. *ringens* Lw. — I. Kalocsa.
958. *circumdata* Mg. — II. Sopron.
959. *lineata* F. — II. Sopron.

Chloropisca Lw.

960. *glabra* Mg. — I. Budapest, Kalocsa.
961. *ornata* Mg. — I. Kalocsa. IV. Ránk. V. Montes Cibinienses, Nagyszeben, Tasnád-Szántó. VI. Mehádia. VII. Eszék.
962. *rufa* Mg. — I. Kalocsa. V. Montes Cibinienses, Peér, Zilah.

Lipara Mg.

963. *lucens* Mg. — I. Kalocsa, Nagyvárad.
964. *rufitarsis* Lw. — I. Kalocsa.

Selachops Whlb.

965. *flavicincta* Whlb. teste Schiner Hungariam incolit.
966. *encoelocera* Lw. — V. Tasnád.

Eutropha Lw.

967. *ingrata* Lw. — V. Montes Cibinienses.
968. *Thalhammeri* Strobl. — I. Akasztó, Hajós, Keczel.
969. *maculata* Lw. — Auctore teste etiam in Hungaria inventur.

Camarota Mg.

970. *flavitarsis* Mg. — I. Kalocsa. IV. S.-A.-Ujhely.

Oscinis Latr.

971. *albiseta* Mg. — I. Kalocsa. V. Montes Cibinienses.
972. *albidipennis* Strobl. — VIII. Fiume.
973. *maura* Fall. — I. Kalocsa, Zombor. II. Sopron. III. Rozsnyó. IV. Szomotor. V. Orlát, Peleszarvad.
v. *vindicata* Mg. — V. Montes Cibinienses.
974. *frit* L. — I. Kalocsa. II. Dunaföldvár. III. Nagy-Bélicz. IV. Szomotor. V. Csik-Szereda, Peleszarvad, Bucsecs, montes Cibinienses. VII. Eszék.
v. *pusilla* Mg. — I. Kalocsa. III. Nagy-Rőcze. IV. Szomotor, Tokaj. V. Peér, Sződemeter, Tasnád, Zilah, montes Cibinienses.
v. *nigripes* Strobl. — V. Orlát.
975. *quinquangula* Lw. — VI. Orsova.
976. *abdominalis* Zett. — VI. Mehádia.
977. *annulifera* Ztt. — IV. Szomotor, Tokaj. V. Peér, Peleszarvad, Sződemeter, Tasnád.
978. *fulviventris* Mg. — V. Peleszarvad.
979. *lineella* Fall. — I. Kalocsa.
980. *sulcella* Zett. — I. Kalocsa.

Gaurax Lw.

981. *plumiger* Mg. — IV. Imreg.

Siphonella Mcq.

982. *diplotoxoides* Strobl. — V. Montes Cibinienses.
983. *pumilionis* Bjerkand. — V. Montes Cibinienses.
984. *palposa* Fall. — V. Orlát.
985. *nucis* Perris. — I. Kalocsa. V. Nagyszeben.
986. *sordidissima* Strobl. — I. Kalocsa.

Elachiptera Meg.

987. *cornuta* Fll. — I. Budapest, Kalocsa, Kecskemét. II. Dunaföldvár. III. Trencsén. IV. Imreg, Homonna, Tolcsva. V. Nagyszeben, Peleszarvad. VI. Mehádia.
988. *brevipennis* Mg. — I. Kalocsa. IV. S.-A.-Ujhely.
989. *pubescens* Thalh. — I. Kalocsa. II. Dunaföldvár.

Campsocera Schin.

990. *numerata* Haeg. — I. Kalocsa. III. Losoncz.

Subf. EPHYDRINAE.

Dichaeta Mg.

991. *caudata* Fall. — I. Budapest, Kalocsa. II. Dunaföldvár, Kapornak. IV. S.-A.-Ujhely, Szoboszló. V. Nagyszeben.
992. *brevicauda* Lw. — I. Budapest, Kalocsa.

Notiphila Fall.

993. *nigricornis* Stenh. — I. Kalocsa. II. Dunaföldvár. V. Transsylvania (teste Becker); VI. Mehádia.
994. *guttiventris* Stenh. — V. Teste Becker in Transsylvania lecta.
995. *venusta* Lw. — I. Kalocsa. II. Ad lacum Fertő. IV. Erdőbénye.
996. *riparia* Mg. — I. Kalocsa, Kecskemét. II. Dunaföldvár, Sopron. IV. Erdőbénye, S.-A.-Ujhely. VI. Mehádia. VII. Eszék.
997. *cinerea* Fall. — I. Budapest, Kalocsa. II. Dunaföldvár, Kőszeg, Sopron. IV. Erdőbénye, Kis-Azar, S.-A.-Ujhely. V. Peleszarvad. VI. Mehádia. VII. Eszék.
998. *dorsata* Stenh. — VI. Mehádia.
999. *annulipes* Stenh. — IV. Rad. V. Peleszarvad.

Trimerina Mcq.

1000. *nigella* Mg. — I. Kalocsa, Kecskemét. IV. Terebes. V. Orlát.

Allotrichoma Beck.

1001. *laterale* Beck. — Teste auctore etiam in Hungaria invenitur.

Gymnopa Fall.

1002. *subsultans* F. — I. Budapest, Kalocsa, Kecskemét. II. Dunaföldvár, Sopron. IV. Nagy-Mihály, Tokaj. V. Tasnád.

Discomyza Mg.

1003. *incurva* Fall. — I. Kalocsa. II. Dunaföldvár. IV. Homonna.

Ilythaea Hal.

1004. *spilota* Curt. — I. Kalocsa.

Athyroglossa Lw.

1005. *glabra* Mg. — I. Kalocsa. II. Dunaföldvár. V. Vallis Alutæ. VI. Herkulesfürdő.
1006. *nudiuscula* Lw. — VI. Herkulesfürdő.
1007. *ordinata* Beck. — VI. Orsova.

Ephygrobia Schin.

1008. *apicalis* Perris. — I. Kalocsa. Semel lecta in horto archiepiscopali.
1009. *leucostoma* Mg. — I. Kalocsa.
1010. *compta* Mg. — I. Budapest, Kalocsa, Kecskemét. II. Dunaföldvár. V. Tasnád. VI. Herkulesfürdő, Krassó.
1011. *nitidula* Fall. — I. Kalocsa. IV. Mons Pop-Iván. V. Peleszarvad, Vallis Alutæ.
1012. *obscuripes* Lw. — I. Kalocsa.
1013. *polita* Mcq. — I. Kalocsa, Kecskemét. IV. Tolcsva. V. Nagyszeben, montes Cibinienses, vallis Alutæ, Peér, Peleszarvad, Tasnád. VI. Krassó.

Clasiopa Stenh.

1014. *obscurella* Fall. — I. Kalocsa, Kecskemét. IV. Bereczki. V. Nagyszeben. VI. Mehádia.
1015. *dimidiatipennis* Strobl. — V. Bucsecs,
1016. *nigerrima* Strobl. — V. Bucsecs, montes Cibinienses.
1017. *pulicaria* Hal. — I. Kalocsa, Kecskemét. V. Montes Cibinienses, Peleszarvad. VI. Mehádia.
1018. *fulgida* Beck. — VI. Orsova.
1019. *calceata* Mg. — IV. Homonna, Tolcsva. VI. Mehádia.
1020. *aurifacies* Strobl. — I. Kalocsa.
1021. *glaucella* Stenh. — I. Kalocsa. V. Ad ripam Alutæ.
1022. *plumosa* Fall. — V. Montes Cibinienses.
1023. *xanthocera* Lw. — V. Ad ripam Alutæ.
1024. *costata* Lw. — I. Kecskemét.

Hydrellia R. Desv.

1025. *laticeps* Stenh. — V. Orlát.
1026. *fulviceps* Stenh. — I. Kalocsa. VI. Mehádia.
1027. *grisea* Stenh. — I. Budapest, Kecskemét.
1028. *discolor* Stenh. — I. Kalocsa.
1029. *griseola* Fall. — I. Budapest, Kalocsa. II. Sopron. IV. Ránk, mons Pop-Iván, Tolcsva. V. Bucsecs, montes Cibinienses, Nagyszeben, Zilah. VI. Mehádia.
1030. *flavicornis* Fall. — I. Kalocsa.
1031. *ranunculi* Hal. — IV. Tolcsva. V. Bucsecs, Montes Cibinienses, Peleszarvad, Zilah.
1032. *albilabris* Mg. — IV. S.-A.-Ujhely.
1033. *transsylvana* Beck. — V. Brassó.
1034. *chrysostoma* Mg. — I. Kalocsa. II. Sopron.
1035. *modesta* Lw. — VI. Mehádia.
1036. *nigricans* Stenh. — V. Orlát, vallis Alutæ. VI. Mehádia.

Philygria Stenh.

1037. *sexmaculata* Beck. — II. Dunaföldvár.
1038. *stictica* Mg. — I. Kecskemét.

Hyadina Hal.

1039. *nitida* Mcq. — V. Orlát.
1040. *guttata* Hal. — I. Kalocsa, Kecskemét.

Pelina Hal.

1041. *aenea* Fall. — I. Kalocsa, Kecskemét. V. Tasnád-Szántó.

Ochthera Latr.

1042. *mantis* Deg. — I. Budapest, Kalocsa. II. Dunaföldvár, Kőszeg.

Halmopota Hal.

1043. *salinarum* Bouché. — IV. Rónaszék.

Caenia R. Desv.

1044. *palustris* Fall. — I. Kalocsa, Kecskemét. II. Dunaföldvár, Sopron. VII. Eszék.
1045. *fumosa* Stenh. — I. Kalocsa.

Parydra Stenh.

1046. *pusilla* Mg. — I. Kalocsa. VI. Mehádia.
1047. *fossarum* Hal. — I. Kalocsa. II. Sopron. VI. Mehádia.
1048. *aquila* Fall. — I. Kalocsa, Kecskemét. III. Rozsnyó. IV. Szomotor. V. Montes Cibinienses. VI. Mehádia.
1049. *coarctata* Fall. — I. Kalocsa, Kecskemét. II. Dunaföldvár, Sopron. III. Rozsnyó. VI. Mehádia.
1050. *quadripunctata* Mg. — I. Kalocsa, Kecskemét. V. Nagyszeben. VI. Mehádia.
1051. *litoralis* Mg. — III. Rozsnyó. V. Montes Cibinienses. VI. Mehádia.
1052. *obliqua* Beck. — VII. Karlovac (Com. Verőcze).
1053. *cognata* Lw. — VI. Mehádia.

Ephydra Fall.

1054. *breviventris* Lw. — I. Konyár (Com. Bihar).
1055. *riparia* Fall. — I. Budapest, Kalocsa. VI. Mehádia.
1056. *micans* Hal. — I. Kalocsa.

Scatella R. Desv.

1057. *sibilans* Hal. — I. Budapest, Kalocsa, Kecskemét. V. Montes Cibinienses.
1058. *dichaeta* Lw. — I. Kecskemét. IV. Ránk.
1059. *quadrata* Fall. — I. Kalocsa. IV. S.-A.-Ujhely.
1060. *sorbillans* Hal. — I. Budapest, Kalocsa, Kecskemét. V. Montes Cibinienses, vallis Alutæ. VI. Mehádia.
1061. *callosicosta* Bezzi. — VI. Orsova.
1062. *silacea* Lw. — V. Montes Cibinienses.
1063. *aestuans* Hal. — I. Kalocsa.
v. *gilva* Lw. — I. Kalocsa.
1064. *stagnalis* Fall. — I. Kalocsa, Kecskemét. II. Sopron. III. Rozsnyó. V. Nagyszeben, Tasnád, vallis Alutæ. VI. Mehádia.
1065. *indistincta* Beck. — V Torda.

Scatophila Beck.

1066. *signata* Lw. — Teste Becker etiam in Hungaria lecta.
1067. *despecta* Hal. — V. Montes Cibinienses.

Subf. DROSOPHILINAE.

Stegana Mg.

1068. *curvipennis* Fall. — I. Kalocsa. VI. Mehádia.

Phortica Schin.

1069. *variegata* Fall. — I. Kalocsa. VI. Mehádia. VII. Eszék.

Gitona Mg.

1070. *distigma* Mg. — I. Kalocsa. II. Dunaföldvár, Sopron. IV. S.-A.-Ujhely. VII. Eszék, Zágráb.

Leucophenga Mik.

1071. *maculata* Duf. — VI. Mehádia.

Drosophila Fall.

1072. *glabra* Fall. — II. Sopron.
1073. *obscura* Fall. — V. Nagyszeben. VI. Mehádia.
1074. *transversa* Fall. — I. Kalocsa. IV. Bereczki, S.-A.-Ujhely. VI. Krassó, Mehádia.
v. *phalerata* Mg. — I. Kalocsa. IV. Tolcsva. V. Nagyszeben.
1075. *funebris* F. — I. Budapest, Kalocsa, Kecskemét II. Sopron. IV. Erdőbénye, S.-A.-Ujhely. V. Nagyszeben, Tasnád. VI. Mehádia.
1076. *rufifrons* Lw. — VI. Mehádia, Orsova.
1077. *fenestrarum* Fall. — I. Kalocsa. IV. Tolcsva V. Peleszarvad.
v. *melanogaster* Mg. — I. Kalocsa. II. Sopron. VI. Herkulesfürdő.
1078. *Johni* Pokorny. — VII. Croatia.
1079. *tristis* Fall. — VI. Mehádia.
1080. *ampelophila* Lw. — VI. Mehádia.
1081. *litoralis* Mg. — IV. Sárospatak, S.-A.-Ujhely
1082. *graminum* Fall. — I. Kalocsa, Kecskemét. II. Dunaföldvár. V. Montes Cibinienses, Bucsecs, Nagyszeben. VI. Krassó, Mehádia.
v. *griseola* Zett. — I. Kalocsa. V. Montes Cibinienses, Nagyszeben.

Asteia Mg.

1083. *concinna* Mg. — V. Peleszarvad.
1084. *amoena* Mg. — I. Kalocsa. V. Peleszarvad.

Dicraeus Lw.

1085. *obscurus* Lw. — VI. Orsova.

Subf. GEOMYZINAE.

Leptomyza Mcq.

1086. *nitida* Mg. — V. Montes Cibinienses.

Scyphella R. Desv.

1087. *lutea* Fall. — I. Kalocsa, Kecskemét. II. Sopron. IV. S.-A.-Ujhely. VI. Mehádia.

1088. *flava* L. — I. Kalocsa. II. Sopron. IV. Nagymihály. V. Borzás, Tasnád. VI. Mehádia.

1089. *latifrons* Lw. — VI. Mehádia.

Opomyza Fall.

1090. *germinationis* L. — I. Kalocsa, Kecskemét. II. Dunaföldvár, Sopron. V. Montes Cibinienses, Zilah. VI. Mehádia. VII. Eszék.

1091. *florum* F. — Ubique communis.

1092. *Nataliae* Egg. — VI. Herkulesfürdő.

Balioptera Lw.

1093. *combinata* L. — I. Kalocsa. II. Sopron. V. Tasnád, Zilah. VI. Krassó.

1094. *tripunctata* Fall. — I. Kalocsa, Rákos. II. Dunaföldvár. IV. Erdőbénye, Tolcsva. V. Bucsecs, Nagyszeben. VI. Krassó, Mehádia. VII. Eszék.

v. *braccata* Rndi. — V. Nagyszeben.

1095. *venusta* Mg. — II. Sopron.

Geomyza Fall.

1096. *marginella* Fall. — I. Budapest, Kalocsa, Vadkert. VI. Krassó.

Diplocentra Lw.

1097. *anus* Mg. — I. Gyón. VI. Deliblat.

Diastata Mg.

1098. *punctum* Mg. — I. Kalocsa, Vadkert.

1099. *inornata* Lw. — VI. Mehádia.

1100. *obscurella* Fall. — I. Kalocsa. Vadkert.

Subf. OCHTHIPHILINAE.

Ochthiphila Fall.

1101. *spectabilis* Lw. — II. Sopron.

1102. *coronata* Lw. — II. Dunaföldvár, ad lacum Fertő. IV. Szomotor, Tolcsva. V. Peleszarvad. VIII. Fiume.

1103. *polystigma* Mg. — I. Kalocsa. II. Dunaföldvár, Sopron. IV. Szőllőske. V. Peleszarvad.

1104. *geniculata* Zett. — I. Kalocsa. VI. Krassó.

1105. *juncorum* Fall. — I. Kalocsa. II. Dunaföldvár. IV. Rabaskala. VI. Mehádia. VIII. Fiume.

1106. *aridella* Fall. — I. Kalocsa. II. Dunaföldvár. Sopron. IV. Szomotor, Tokaj. V. Peleszarvad. VI. Krassó.

Leucopis Mg.

1107. *griseola* Fall. — I. Akasztó. Kalocsa.

Subf. MILICHINAE.

Lobioptera Whlb.

1108. *speciosa* Mg. — VI. Herkulesfürdő.

1109. *ludens* Whlb. — VI. Mehádia.

Phyllomyza Fll.

1110. *securicornis* Fll. — I. Kalocsa.

Cacoxenus Lw.

1111. *indagator* Lw. — I. Kalocsa.

Subf. AGROMYZINAE.

Desmometopa Lw.

1112. *M—nigrum* Zett. — I. Budapest, Kalocsa, Kecskemét. IV. S.-A.-Ujhely, Szomotor. VIII. Fiume.

1113. *M—atrum* Mg. — I. Budapest, Kalocsa.

Agromyza Fall.

1114. *obscurella* Fall. — I. Kalocsa. VI. Mehádia.

1115. *lutea* Mg. — I. Kalocsa. V. Peleszarvad.

1116. *pusilla* Mg. — I. Kalocsa, Kecskemét. IV. Szobráncz. V. Peér, Peleszarvad, Sződemeter.

1117. *abiens* Zett. — VI. Mehádia.

1118. *capitata* Zett. — VIII. Fiume.

1119. *geniculata* Fall. — I. Kalocsa. VI. Mehádia.

1120. *reptans* Fall. — I. Kalocsa. VI. Mehádia.

1121. *nigripes* Mg. — V. Peleszarvad.

1122. *errans* Mg. — VI. Mehádia.

1123. *aeneiventris* Fall. — IV. Erdőbénye, Imreg. Tokaj. VI. Mehádia.

1124. *cunctans* Mg. — IV. Szomotor, Tokaj.

1125. *morionella* Zett. — V. Peleszarvad, Sződemeter, Tasnád.

1126. *lateralis* Mcq. — V. Peleszarvad.

1127. *grossicornis* Zett. — V. Peleszarvad.

1128. *trivittata* Lw. — VI. Herkulesfürdő.

1129. *variceps* Zett. — I. Kalocsa.

1130. *atripes* Zett. — I. Kalocsa.

1131. *frontella* Rndi. — I. Kalocsa.

1132. *nigrella* Rndi. — I. Kalocsa.

Leiomyza Mg.

1133. *laevigata* Mg. — IV. Szerencs.

Ceratomyza Schin.

1134. *denticornis* Fall. — I. Kalocsa. VI. Mehádia.
1135. *acuticornis* Mg. — I. Kalocsa. VIII. Fiume.
1136. *femoralis* Mg. — IV. Bártfa. V. Peleszarvad.

Phytomyza Fall.

1137. *elegans* Mg. — I. Kalocsa.
1138. *flava* Fall. — V. Peleszarvad.
1139. *albipennis* Fall. — VI. Mehádia.
1140. *obscurella* Fall. — V. Peér. VI. Mehádia.
1141. *flavicornis* Fall. — I. Kalocsa, Kecskemét.
1142. *flavoscutellata* Fall. — I. Kalocsa. V. Peleszarvad. VI. Mehádia.
1143. *pullula* Zett. — V. Peleszarvad.
1144. *affinis* Fall. — III. Rozsnyó. VI. Mehádia.
1145. *crassiseta* Zett. — IV. Imreg.
1146. *abdominalis* Zett. — V. Peleszarvad.

Subf. BORBORINAE.

Borborus Mg.

1147. *geniculatus* Mcq. — I. Kalocsa. IV. Mons Pop-Iván, S.-A.-Ujhely. V. Montes Cibinienses, Zilah.
1148. *suillorum* Hal. — I. Kalocsa. III. Rozsnyó. VI. Mehádia.
1149. *nitidus* Mg. — I. Kalocsa. VI. Mehádia.
1150. *niger* Mg. — I. Kalocsa, Kecskemét. II. Sopron. III. Rozsnyó. IV. S.-A.-Ujhely. V. Nagyszeben. Tasnád.
1151. *equinus* Fall. — I. Kalocsa. II. Dunaföldvár, Sopron. III. Rozsnyó. IV. Helmecz, mons Pop Iván, Szomotor. V. Montes Cibinienses, Nagyszeben. VI. Krassó.
1152. *vitripennis* Mg. — IV. Szomotor.
1153. *fimetarius* Mg. — I. Kalocsa, Kecskemét. IV. Nagy-Mihály. V. Bucsecs, Tasnád.
1154. *limbinervis* Rndi. — IV. S.-A.-Ujhely. V. Bucsecs, Nagyszeben. VI. Krassó.
1155. *costalis* Zett. — V. Bucsecs.

Heteroptera Mcq.

1156. *acutangula* Zett. — V. Bucsecs.

Sphaerocera Latr.

1157. *subsultans* F. — I. Kalocsa, Kecskemét. II. Dunaföldvár, Sopron. IV. Kis-Azar, Málcza, S.-A.-Ujhely. V. Bucsecs, Zilah. VI. Mehádia.
1158. *pusilla* F. — I. Kalocsa. V. Montes Cibinienses. VI. Mehádia.

Limosina Mcq.

1159. *limosa* Fall. — I. Kalocsa, Kecskemét. II. Sopron. III. Rozsnyó. IV. Mád, Sárospatak, S.-A.-Ujhely. V. Bucsecs, Orlát, vallis Alutæ. VI. Mehádia.
1160. *fontinalis* Fall. — I. Kalocsa, Kecskemét. V. Montes Cibinienses, Nagyszeben, vallis Alutæ. VI. Krassó.
1161. *roralis* Rndi. — IV. Imreg. V. Bucsecs, Nagyszeben, montes Cibinienses, Tasnád. VIII. Fiume.
1162. *ferruginata* Stenh. — VI. Mehádia.
1163. *puerula* Rndi. — V. Nagyszeben.
1164. *ochripes* Mg. — I. Kalocsa, Kecskemét. IV. S.-A.-Ujhely. V. Bucsecs, montes Cibinienses, Peleszarvad.
1165. *curtiventris* Stenh. — V. Bucsecs.
1166. *obtusipennis* Stenh. — V. Montes Cibinienses.
1167. *pusio* Zett. — II. Sopron.
1168. *coxata* Stenh. — VI. Mehádia.
1169. *heteroneura* Hal. — I. Kalocsa.
1170. *nana* Rndi. — I. Kalocsa. V. Peleszarvad.
1171. *cilifera* Rndi. — I. Budapest.
1172. *humida* Hal. — V. Nagyszeben, montes Cibinienses. VI. Mehádia.
1173. *crassimana* Hal. — V. Bucsecs, Nagyszeben, montes Cibinienses. VI. Mehádia.
1174. *rufilabris* Stenh. — V. Nagyszeben.

Fam. HIPPOBOSCIDAE.

Hippobosca Linné.

1. *equina* Lin. — I. Budapest, Debreczen, Nagyvárad, Kalocsa. II. Kapornak. III. Rozsnyó. IV. S.-A.-Ujhely, Sztropkó-Olyka, Ladomér, Ungvár. V. Tasnád, Görcsön, Gyulafehérvár.
2. *cunicosa* Madarassy. — I. Kecskemét.

Olfersia.

3. *ardea* Mg. — I. Szalacs (in plumis Nyctiardeæ nycticoracis).

Ornithomyia Latreille.

4. *avicularia* Lin. — I. Budapest, Nagyvárad, Pestere. IV. Szinna (Pernis apivorus). V. Szakácsi, Görcsön, Szilágy-Nagyfalu.
5. *tenella* Rogenh. — I. Budapest. (Canis vulpes.)

Stenopteryx, Leach.

6. *hirundinis* Lin. — I. Kalocsa. III. Vihnye. (Hirundo rustica). V. Pele (ex nido Hirundinis urbicae). VI. Krassova, Resicza.

Lipoptena Nitzsch.

7. *cervi* L. — I. Sz.-Endre, Visegrád, Gödöllő. (In Cervo elapho et capreolo.)

Melophagus Latreille.

8. *ovinus* L. — Communis in Ovibus arietibus.

Fam. BRAULIDAE.

Braula Nitzsch.

1. *coeca* Nitzsch. — In apibus mellificis. I. Rákospalota, Kecskemét. V. Tasnád, Gyulafehérvár.

Fam. NYCTERIBIIDAE.

Nycteribia Latreille.

1. *vexata* Lin. — I. Antrum ad Meziád (Com. Bihar).
2. *Dufourii* Westw. — I. Antrum ad Meziád.

Fam. PULICIDAE.

Auctore R. Kohaut.

Pulex L.

1. *irritans* L. — Communis in homine; in canibus et felibus domesticis sparsim.
2. *globiceps* Taschenberg. — In vulpibus et melibus.
3. *fasciatus* Bosc d'Antic. — Legit anno 1888. Prof. J. Paszlavszky e nido Myoxi dryadis in captivitate viventis.
4. *gallinae* Bouché. — In gallinis, hirundinibus et aliis avibus utcunque communis.
5. *melis* Walker. — In melibus, nonnunquam et in vulpibus.
6. *sciurorum* Bouché. — Communis in sciuris.
7. *canis* Dugés. — Communis in canibus et felibus; nonnunquam et hominis parasita.
8. *erinacei* Bouché. — Communis in Erinaceo europæo.

Typhlopsylla Taschenberg.

9. *octactenus* Kolenati. — Communis; fere omnium specierum Vespertilionum parasita.
10. *hexactenus* Kolenati. — In Plecoto aurito.
11. *pentactenus* Kolenati. — In Plecoto aurito non rara.
12. *dictenus* Kolenati. — Valde rara; specimen unicum in Vesperugine noctula inveni.
13. *musculi* Dugés. — Communis in muribus musculis.
14. *typhlus* Motschulsky. — De Spalace typhlo legit Dr. A. Lendl.
15. *assimilis* Taschenberg. — In Talpis et Arvicolarum speciebus non rara.
16. *gracilis* Taschenberg. — Communis in Talpis europæis.

ADDITAMENTA AD LITTERATURAM.

98. Frauenfeld Georg. Zoologische Miscellen. (Verh. der zool.-bot. Ges. XXIII. 1873. p. 185. — Asphondylia cytisi.)
99. Kieffer J. J. Diagnoses de deux espèces nouvelles de Cecidomyites. (Bull. Soc. Entom. de France 1896, No 10, p. 236—237. — *Janetia* (n. gen.) *Szépligetii* n. sp.)
100. Lipovniczky G. A hesseni légy Tolnamegyében. (Rovartani Lapok, I. 1884. p. 231.)
101. Löw Franz. Beitr. z. Naturgeschichte d. gallenerzeug. Cecidomyiden. (Verh. d. zool.-bot. Ges. XXXV. 1885, p. 493. — Cecid. ericina et hieracii.)
102. — Mittheil. üb. neue und bekannte Cecidomyiden. (Ib. XXXVIII. 1888. p. 237. — Cecid. galii.)
103. — Zwei neue Cecidomyia-Arten. (Berl. Ent. Zeit. XXIX. p. 109. — Cecid. Oleæ.)
104. M. K. Rovartani állomás Közl. I. 1891—92. (Cecid. salicis, destructor et tritici.)
105. Szaniszló Albert dr. A repczének egy rovarellenségéről. (Mezőgazdasági Szemle, 1885. III. p. 264. — Cecid. brassicæ.)
106. Szépligeti Győző. Adatok a gubacsok elterjedésének ismeretéhez. (Természetrajzi Füzetek, XIII. 1890. p. 12—25.)
107. — Adatok a magy. gubacsok ismeretéhez. (Term. Füzetek, XVIII. 1895. p. 214—219.)

Conspectus familiarum, generum et specierum.

Familia	Genus	Species
1. Mycetophilidæ	35	141
2. Bibionidæ	5	22
3. Chironomidæ	10	99
4. Culicidæ	3	15
5. Dixidæ	1	1
6. Blepharoceridæ	3	5
7. Simulidæ	1	8
8. Psychodidæ	4	8
9. Rhyphidæ	1	2
10. Cecidomyidæ	11	82
11. Tipulidæ	37	172
12. Lonchopteridæ	1	5
13. Stratiomyidæ	15	64
14. Xylophagidæ	3	6
15. Tabanidæ	6	48
16. Leptidæ	5	30
17. Acroceridæ	1	4
18. Nemestrinidæ	1	1
19. Asilidæ	15	110
20. Bombylidæ	14	68
21. Therevidæ	3	28
22. Scenopinidæ	1	3
23. Empidæ	30	205
24. Dolichopidæ	32	194
25. Phoridæ	3	27
26. Platypezidæ	3	9
27. Pipunculidæ	4	22
28. Syrphidæ	56	291
29. Conopidæ	8	39
30. Oestridæ	4	11
31. Muscidæ	382	1174
32. Hippoboscidæ	6	8
33. Braulidæ	1	1
34. Nycteribiidæ	1	2
35. Pulicidæ	2	16
	706	2921

Summa

Familiarum	35
Generum	706
Specierum	2921

INDEX GENERUM.

Ordo. HEMIPTERA.

Conscripsit Dr. G. Horváth.

(Subordo Aptera a R. Kohaut.)

A magyarországi Félfedelűekre (Hemiptera) vonatkozó legrégibb adatokat Marsili Alajos grófnak 1726-ban «Danubius Pannonico-Mysicus» czímen megjelent művében találjuk. A nagyszabású mű hatodik kötetének 121-ik lapján ugyanis «Cimex» néven hazánkból valamelyik Pentatomida-faj (talán a *Dolycoris baccarum* L.) rajza van közölve; a 125-ik lapon pedig «Tipulae» néven három vízi poloska van lerajzolva, melyeket Bács vármegyében Zsablya mellett («in palude prope Sablia») találtak, és melyek közül az egyik talán a *Corixa coleoptrata* Fabr., a másik kettő talán a *Plea minutissima* Fabr. fajhoz tartozik.

Első kutatóink Linné szellemében Piller Mátyás és Mitterpacher Lajos budai egyetemi tanárok voltak, a kik 1783-ban négy hazai Homoptera-faj leirását és színes rajzát közölték. De Grossinger János még 1794-ben is Linné előtti módszerrel tárgyalta a Hemipterák ismertetését.

A legelső rovarász, ki hazánkban a Hemipterákat rendszeresen gyüjtötte, Koy Tóbiás volt. Rovargyüjteménye, melynek jegyzékét 1800-ban nyomtatásban kiadta, 86 Hemiptera-fajt tartalmazott; ezek, hét faj kivételével, mind Buda környékéről származtak.

A XIX. század első negyedében a magyarországi Hemipterákkal alig foglalkozott valaki. Csak 1811-ben érintette területünket Germar Frigyes Ernő hallei egyetemi tanár, midőn Dalmátországba utazott, mely alkalommal Fiume mellett néhány Hemipterát is gyüjtött.

A jelen század második negyedében indult meg csak dr. Frivaldszky Imre működésével Hemiptera-faunánknak valamivel rendszeresebb s azóta meg nem szakadó kutatása. Frivaldszky Imre a többi rovarok mellett figyelmet fordított erre a rovarrendre is. Ő maga nem foglalkozott ugyan tüzetesebben a Hemipterák tanulmányozásával, de a gyüjtött anyagot tudományos feldolgozás végett külföldi szakemberekkel, főleg Herrich-Schäffer-rel, kisebb részben Fieber-rel közölte.

Hemiptera Hungariæ primus attigit Comes Aloys. Ferd. Marsili in opere anno 1726 edito, quod «Danubius Pannonico-Mysicus» inscribitur. In volumine VI. pag. 121. auctor imaginem æri incisam speciei cuiusdam Pentatomidarum (fortasse *Dolycoris baccarum* L.), nomine «Cimex» appellatæ, protulit, et in pag. 125. «Tipulas» tres delineavit «in palude prope Sablia» (Zsablya in Comitatu Bács) lectas, quarum una forsitan *Corixa coleoptrata* Fabr. est, reliquæ duæ vero *Pleae minutissimae* Fabr. subiungendæ videntur.

E nostris scrutatoribus Hemipterorum rationem ac viam a Linnaeo profectam primi secuti sunt: Math. Piller et Lud. Mitterpacher, Universitatis literarum Budensis professores, qui anno 1783 descriptiones et imagines coloratas quatuor Homopterorum indigenorum præbuerunt. Joann. Bapt. Grossinger contra etiam anno 1794 in tractandis Hemipteris methodo ante-Linnæanæ inhæsit.

Entomologus iure primus dicendus, qui præter alia Insecta etiam Hemiptera patriæ nostræ non solum oblata occasione, sed accurate et diligenter investigavit, Tobias Koy fuit. Thesaurus eius, cuius indicem anno 1800 in publicum dedit, 86 Hemipterorum species continuit, plerasque — exceptis speciebus 7 — in regione Budensi collectas.

Lustris quinque primis sæculi huius studiis hemipterologicis apud nos parum operæ dabatur. Solus E. Fr. Germar anno 1811 — in Dalmatiam proficiscens — attigit territorium nostrum ad urbem Fiume, ubi aliquot Hemipterorum species collegit.

Insequentibus quinque lustris huius sæculi scrutationem Faunæ Hemipterorum sat prosperam suscepit Dr. Emericus Frivaldszky, qui præter alia Insecta etiam ordini Hemipterorum operam dedit. Ipse hunc Insectorum ordinem proprie non examinabat quidem, sed collecta Hemiptera extraneis, huius scientiæ peritis, præsertim Herrich-Schäffer-io nec non Fieber-io subministrabat, qui viri

ben Fieber-rel közölte, a kik aztán az új vagy nevezetesebb fajokat dolgozataikban leirták.

A 40-es években Frivaldszky Imré-n kivül még dr. Sadler József magy. nemz. múzeumi őr és egyetemi tanár is érdeklődni kezdett a Hemipterák iránt. Sadler, ámbár tulajdonképen botanikus volt, nemcsak gyűjtötte e rovarokat, hanem szándéka volt ebbeli gyüjtéseinek eredményét irodalmilag is közzétenni. Erre vonatkozó dolgozata, mely «Cimicidium Hungariæ et Croatiæ cum littorali Hungarico species novæ, aut rariores. Decas I.» czim alatt 10 faj leirását tartalmazta, és melyhez egy rézmetszetű tábla is járult volna,* a szerzőnek 1849-ben bekövetkezett halála miatt kiadatlan maradt, és, úgy látszik, elveszett.

Bartsch Eduárd 1846-ban Sárosmegyéből három közönséges Heteroptera-fajt emlitett fel.

Az 50-es és 60-as években már többen foglalkoztak hazánkban Hemipterák gyüjtésével. A legnagyobb buzgalmat fejtette ki akkor ez irányban Frivaldszky János, a ki eleinte Budapest környékén, utóbb az ország különböző vidékein Coleopterákon kívül a többi rovarrendeket és így a Hemipterákat is nagy szorgalommal gyüjtögette. Az általa gyüjtött anyag, mely mind a magy. nemz. múzeumba került, annál becsesebb volt, mert Frivaldszky János volt az első magyar entomologus, a ki a gyüjtött rovaroknál a gyüjtés helyét és idejét pontosan feljegyezte.

Az erdélyi részek Hemipteráit Bielz Albert és kivált Fuss Károly méltatták figyelmükre. Ez utóbbi 1862-ben egy külön értekezésben foglalta össze az ottani gyüjtések eredményeit. Gyüjteménye, melyet legnagyobbrészt Fieber határozott meg, halála után a magy. nemz. múzeum birtokába került.

Dr. Mayr Gusztáv 1859—1861-ig mint pesti reáliskolai tanár nagy buzgalommal gyüjtötte Budapest környékének Hemipteráit is; sőt itt több új fajt is fedezett fel, melyet azután Kirschbaum és Fieber vezetett be a tudományba. Dr. Mayr különben már 1853-ban felsorolt Bielz Albert-től gyüjtött erdélyrészi Hemipterákat, 1858-ban pedig a Tingitidák földrajzi elterjedéséről szóló értekezésében közölt magyarországi adatokat.

Dr. Kéry Imre 1859-ben Aradmegye hegyes vidékének leirásában négy Hemiptera-fajról emlékezett meg.

Mann József a bécsi cs. k. udvari muzeum gyüjtője 1853-ban Fiume, 1859-ben Mehádia és 1866-ban a zágrábmegyei Josipdol környékén buvárkodott és sok Hemipterát is gyüjtött össze. Anker Rudolf

* Hanák János, Az állattan története és irodalma Magyarországban. Pest, 1849. p. 151.

illustres species novas vel peculiares in suis operibus in lucem proferebant.

Sub annum 1840 et annis sequentibus, præter Emericum Frivaldszky etiam Dr. Jos. Sadler, Musæi Nationalis Hungarici custos et professor Universitatis studiorum, thesaurum Hemipterorum sibi contulit. Dr. Sadler quamquam imprimis amabilem artem herbariam tractabat, non solum Hemipteris colligendis dedit operam, sed summam studiorum suorum in hoc genere etiam typis mandare voluit. Opusculum eius «Cimicidium Hungariæ et Croatiæ cum littorali Hungarico species novæ, aut rariores. Decas I.», quod decem specierum descriptiones tabula æri incisa illustratas continebat,* post mortem auctoris, anno 1849, ineditum mansit et verisimiliter periit.

Ed. Bartsch anno 1846 e Comitatu Sáros tres Cimices protulit.

Decennio huius sæculi sexto et annis insequentibus iam viri complures navarunt operam in nostra patria colligendis Hemipteris. Fervorem assiduitate plenum adhibuit his rebus Joann. Frivaldszky, initio in regionibus Budapestinensibus, postea in variis Regni partibus, præter Coleoptera, etiam Insecta reliquorum ordinum sedulo colligens, quæ omnia nunc in Musæo Nationali Hungarico asservantur. Collectio hæc ea de causa quoque summam meretur laudem, quod Joann. Frivaldszky primus inter Hungaricos entomologos collecta Insecta notis tempus et locum inventionis spectantibus subornaverit.

In parte Regni transsylvanica A. Bielz et præsertim C. Fuss egregia fuerunt industria in Hemipteris colligendis. Fuss anno 1862 specimina ibi collecta etiam literis evulgavit.

Dr. G. Mayr, annis 1859—61 scholae superioris realis Pestinensis professor, summa cum diligentia collegit etiam Hemiptera regionis Budapestinensis speciesque nonnullas detexit novas, quas Kirschbaum et Fieber in scientiam introduxere. Dr. Mayr iam prius, anno 1853 enumeravit Hemiptera nonnulla ab A. Bielz in Transsylvania collecta, anno 1858 vero in dissertatione de distributione geographica Tingitidarum specierum originis hungaricæ mentionem fecit.

Dr. E. Kéry anno 1859 in descriptione regionis montanæ Comitatus Arad quatuor species Hemipterorum protulit.

Jos. Mann, a Musæo Cæsareo Vindobonensi ad colligenda Insecta obligatus, anno 1853 in vicinis urbis Fiume, 1859 prope Mehadiam, 1866 circa Jo-

* Hanák János, Az állattan története és irodalma Magyarországban. Pest, 1849. p. 151.

1854-ben Temesmegyében Ulmánál tett némi gyüjtéseket. Abban az időtájban látogatta meg Mehádiát Stein J. P. E. Frdr. berlini entomologus és ott a többi között a *Prostemma aeneicolle* fajt fedezte fel. Kovács Gyula magy. nemz. múzeumi őr 1855- és 1857-ben, Májer Móricz cziszt. r. gymn. tanár 1865-ben gyarapította a magy. nemz. múzeumot csekélyebb Hemiptera-készletekkel.

Mindeme gyüjtések daczára a Magyar Birodalom Hemiptera-faunájának ismerete még igen tökéletlen és hiányos volt. Mert ámbár Frivaldszky Imre szereplése óta lassanként mindig több entomologus akadt, a ki hazánkban a Hemipterákra is ügyet vetett, de azért mégsem volt senki, a ki kizárólag vagy legalább kiválólag e rovarrend tanulmányozására adta volna magát. Erre a feladatra vállalkoztam én, midőn 1868-ban speciális szakmámnak a Hemipterák természetrajzát választottam. Az alatt a 30 év alatt, mely azóta lefolyt, bejártam hazánknak legnagyobb részét, meglátogattam a magyar birodalomnak majdnem valamennyi vármegyéjét és mindenütt szorgalmasan gyüjtöttem Hemipterákat, megfigyelvén nemcsak földrajzi elterjedésöket, hanem életmódjokat és összes biologiai viszonyaikat is. Ebbeli megfigyeléseim és tanulmányaim egy részét 1870 óta számos kisebb-nagyobb dolgozatban tettem közzé.

Az utolsó negyedszázad alatt már elég számosan gyüjtöttek hazánkban Hemipterákat. Többen irodalmilag is ismertették gyüjteséiket. Igy Frivaldszky János Mehádia és Orsova vidékéről, továbbá Máramaros, Temes és Krassó megyéből, nemkülönben Budapest környékéről, Herman Ottó az erdélyi Mezőségről és Kolozsvár környékéről, Mocsáry Sándor Bihar, Hajdu, Zemplén, Ung, Zólyom és Liptó megyéből, dr. Brancsik Károly Trencsén és Liptó megyéből s Fiume környékéről, Biró Lajos a Keleti-Kárpátokból és Kecskemét környékéről, dr. Tömösváry Ödön Dél-Magyarországból, Petrogalli Arthur tanár Zólyom és Bars megyéből, dr. Cserni Béla tanár Gyulafehérvár környékéről és dr. Bálint Sándor a Székelyföldről közölt adatokat. Dr. Török József Debreczen, Korlević Antal tanár Fiume és Sabransky Henrik Pozsony környékének Hemipteráit jegyezte fel. Dr. Borbás Vincze, dr. Chyzer Kornél, Friedenfels Jenő, Sajó Károly és Wény János egyes megfigyelésekkel mozdították elő a magyarországi Hemiptera-fauna ismeretét.

Aránylag csekélyebb értékűek, mert sok esetben megbízhatatlanok azok a jegyzékek, melyek egyes városok és megyék helyi monografiájában jutottak nyilvánosságra. Ilyen Fiume (1869) Győrmegye (1874), Máramarosmegye (1876), Szombathely

sipdol in Comitatu Zágráb non pauca Insecta variorum ordinum conquisivit. Rud. Anker anno 1854 ad Ulmam in Comitatu Temes collectionis gratia versatus est. Eodem tempore obiit Mehadiam J. P. E. Fr. Stein Berolinensis et ibidem speciem novam *Prostemma aeneicolle* invenit. Jul. Kovács Musæi Nationalis Hungarici custos annis 1855 et 1857, M. Májer, Ordinis Ciscerciensis professor anno 1865 species aliquot, haud numerosas quidem, Musæo Nationali Hungarico dono dederunt.

Nihilominus notitia Faunæ Hemipterorum Hungaricæ, quam maxime manca atque imperfecta mansit. Nam quamquam inde a temporibus Emerici Frivaldszky diem de die augebatur numerus entomologorum illorum, qui etiam Hemiptera legebant: nemo fuit tamen, qui uni huius egregii ordinis studio penitus aut imprimis saltem se dederit. Hanc finem mihi proposui, quum anno 1868 ad Hemiptera præsertim colligenda et subtilius examinanda me contuli. Ex eo tempore, per 30 annos, in omnibus fere Hungariæ partibus et Comitatibus ipse legebam Hemiptera et non tantum eorum distributionem geographicam, sed etiam biologiam, quæ dicitur, cognoscere curabam. Observationes meas et summam studiorum in commentationibus numerosis divulgavi et in lucem edidi.

Novissimis 25 annis huius sæculi iam multi legerunt Hemiptera in Regno nostro et nonnulli indices specierum collectarum etiam prelo subiecerunt. Etenim id agebant: Joann. Frivaldszky circa Mehadiam et Orsovam, in Comitatibus Máramaros, Temes et Krassó et in vicinis urbis Budapest, O. Herman in parte Regni transsylvanica Mezőség dicta et ad Kolozsvár, A. Mocsáry in Comitatibus Bihar, Hajdu, Zemplén, Ung, Zólyom et Liptó, Dr. C. Brancsik in Comitatibus Trencsén et Liptó et in Regione Fiumana, L. Biró in Carpathis orientalibus et circa urbem Kecskemét, Dr. E. Tömösváry in Hungaria meridionali, A. Petrogalli in Comitatibus Zólyom et Bars, Dr. B. Cserni circa urbem Gyulafehérvár et Dr. A. Bálint in Terra Siculorum (Székelyföld). Dr. J. Török urbis Debreczen, A. Korlević regionis Fiumanæ, H. Sabransky regionis Posoniensis Hemiptera typis mandaverunt. Dr. V. Borbás, Dr. C. Chyzer, E. Friedenfels, C. Sajó, J. Wény quoque eximie contulerunt ad Faunam Hemipterorum Hungariæ melius cognoscendam.

Parva tantum fide et nonnisi cum grano salis accipiendæ sunt enumerationes Hemipterorum illæ, quæ diversis monographiis urbium comitatuumque continentur. Tales monographiæ sunt: urbis Fiume (1869), Comitatus Győr (1874), Comitatus Máramaros (1876), urbium Szombathely (1880) et Debre-

(1880), Debreczen (1882), Hajdumegye (1882), Nagyvárad (1890) és Aradmegye (1893) monografiája. Az a Hemiptera-jegyzék, mely Fiume és a magyar-horvát tengerpart legujabb leirásában (1897) található, nem egyéb mint Korlević Antal tanár 10 évvel előbb megjelent dolgozatának egyszerű másolata, megtoldva egynéhány közönségesebb Homoptera felemlitésével.

A Hemipterák alsórendű képviselőivel, az Aphidákkal és Coccidákkal hazánkban eddig csak kevesen foglalkoztak. Leszámítva Koy Tóbiás első feljegyzéseit és saját megfigyeléseimet, csak Szépligeti Győző és Henrich Károly közölt a magyarországi Aphidákra vonatkozó adatokat. Egyes Aphida-fajokról Kertész József, Krécsy Béla és dr. Szaniszló Albert tettek közléseket. Vida Károly az elevenszülő Aphidák petefészkének és petéjének fejlődését vizsgálta.

Az utolsó 20 év alatt a külföldi szakemberek közül többen irtak le magyarországi fajokat, u. m. Reuter O. M. Helsingforsban, dr. Puton Ágost Remiremontban, Lethierry Lucián Lilleben, dr. Löw Ferencz Bécsben, Douglas J. W. és Scott J. Londonban.

Ez alatt az időszak alatt egész sora akadt oly hazai buvároknak is, kik a Magyar Birodalom Hemiptera-faunájának kifürkészésén buzgón munkálkodtak, anélkül azonban, hogy gyüjtéseik eredményét irodalmilag is közzétették volna. Legelső helyen kell ezek közül dr. Hensch Andor kartársamat megemlítenem, ki az ország több vidékén nagy szorgalommal és sok szerencsével igen gazdag anyagot gyüjtött és faunánkat sok érdekes felfedezéssel gyarapította. Nagyobb számu Hemipterát gyüjtöttek továbbá: Csiki Ernő, Hoffmann Antal alezredes, Jablonowski József, dr. Kertész Kálmán, Kuthy Dezső, dr. Langhoffer Ágost, Pável János, Pungur Gyula, Raisz Gizella, Thalhammer János és Vellay Imre. Sok becses adatot szolgáltattak hol kisebb, hol nagyobb gyüjtésekkel még a következők is: Apfelbeck Viktor, dr. Daday Jenő, Damin Narczisz, dr. Entz Géza, Geyer Gyula, Kaszás Ferencz, Kelecsényi Károly, Kenderesy Dénes, dr. Madarász Gyula, Méhely Lajos, Ormay Sándor, Petricskó Jenő, Redl Gusztáv, Szilády Zoltán, Vadászfy Jenő, Wachsmann Ferencz, gróf Wass Béla, Xántus János és mások.

Abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy az utolsó évtizedekben hazánk területén gyüjtött Hemipterák legnagyobb részét magam is láthattam és megvizsgálhattam. Ezeket az adatokat saját gyüjteseim eredményével egyesítve s a régebbi adatokat kellő kritikával felhasználva, az alábbiakban elég hű

czen (1882), Comitatus Hajdu (1882), urbis Nagyvárad (1890) et Comitatus Arad (1893). Enumeratio illa Hemipterorum, quæ in descriptione recentissima regionis Fiumanæ et litoralis hungarico-croatici invenitur, nil est, nisi exemplum simplex commentationis a professore A. Korlević, iam decem ante annis editæ, adiectis nonnullis Homopteris vulgaribus.

Aphididis et Coccidis nostris cognoscendis ad hoc tempus pauci tantum scrutatores operam navavere. Præter adnotationes Tobiae Koy-i observationesque meas tantum V. Szépligeti et C. Henrich indicia quædam fecerunt. De speciebus nonnullis Aphididarum J. Kertész et B. Krécsy et Dr. A. Szaniszló nuntios quosdam attulerunt. C. Vida dissertavit de evolutione ovarii ovique Aphididarum viviparum.

Inter 20 annos temporum nostrorum ex eruditis Hemipterologiæ cultoribus exteris complures descripserunt Hemiptera originis hungaricæ: O. M. Reuter, Dr. A. Puton, L. Lethierry, Dr. F. Löw, J. W. Douglas, J. Scott.

Hoc temporis tractu maiorem iam habemus numerum scrutatorum, qui de explorandis Faunæ indigenæ Hemipteris optime meruerunt, etiamsi de Insectis his non scripserunt. Primus inter eos nominandus est Dr. A. Hensch, qui varias Regni partes summa cum diligentia et favente fortuna scrutatus est et illustribus speciebus in lucem prolatis Faunam ditavit nostram. Hemiptera non pauca collegerunt porro: E. Csiki, A. Hoffmann, J. Jablonowski, Dr. C. Kertész, D. Kuthy, Dr. A. Langhoffer, J. Pável, J. Pungur, Gisella Raisz, J. Thalhammer, E. Vellay. Indicia sat pretiosa subministrarunt etiam collectionibus suis minoribus maioribusve: V. Apfelbeck, Dr. E. Daday, N. Damin, Dr. G. Entz, J. Geyer, F. Kaszás, C. Kelecsényi, D. Kenderesy, Dr. J. Madarász, L. Méhely, A. Ormay, E. Petricskó, G. Redl, Z. Szilády, E. Vadászfy, F. Wachsmann, com. B. Wass, J. Xántus etc.

Contigit mihi, novissimis decenniis pleraque in Regno Hungariæ ab aliis collecta Hemiptera inspicere. Hæc si eis adiungam, quæ ipse collegi nuntiosque aliorum critice tractabo, Faunæ Hemipterorum Hungariæ imaginem satis veram me expressurum censeo. Nam sine ulla superlatione affirmare possum, Regnum Hungariæ totum, quod Hemiptera attinet, inter omnes Europæ terras quam maxime æqualiter et perfecte exploratum esse, quum nullus sit Comitatus, ex quo omnino desint Hemipterorum indicia.

Hemipterorum species 1540 infra enumerabo, quæ incolæ sunt Regni Hungariæ ne minime quidem dubii.

képét adhatom a Magyar Birodalom Hemiptera-faunájának. Minden túlzás nélkül merem állítani, hogy hazánk hemipterologiai tekintetben ez idő szerint Európa valamennyi országa között aránylag a legtökéletesebben és legegyenletesebben van átkutatva. Nincs a Magyar Birodalomnak egyetlen oly vármegyéje sem, a melyből adataink ne lennének.

Az alább közölt névsor összesen 1540 Hemipterafajt tartalmaz, mint a melyeknek előfordulása nálunk biztosan meg van állapítva. Ez a másfél ezernyi faj Hemiptera-faunánknak következő állatföldrajzi képét adja:

Fajaink főtömege a palearktikus faunaterületen általánosan el van terjedve. Ehhez az alapvető főtömeghez járul még aztán három különböző bélyegű és származású csoport, megadván ekként faunánknak háromféle jellemző alkotó elemét. Ez a háromféle jellemző elem 1. a mediterrán, 2. a keleteurópai és 3. a közép-, illetőleg északeurópai jellemző fajokból kerül ki.

Hazánk földrajzi fekvésének és orografiai viszonyainak megfelelően legszámosabbak ezek közül a mediterrán fajok. Ha azon a nyolcz régión, a melyre e munkában a Magyar Birodalom fel van osztva, végig tekintünk, azt tapasztaljuk, hogy nem csak az Adriai-tenger keskeny partszegélyét képező VIII. régióban, melynek tisztán mediterrán faunája van, hanem a többi hét régióban is sok mediterrán alak fordul elő. Legszámosabbak ezek az I. és VI. régióban, valamint a VII. régió keleti részében, de nem hiányzanak az északi régiókban sem. Faunánknak éppen az is egyik sajátságos jellemvonása, hogy a déli fajok aránylag igen messze felmennek északra. Így még a III. régióban is előfordulnak: *Podops curvidens* Costa, *Capsus rutilus* H.-Sch., *Byrsoptera cylindricollis* Costa és *Zygina nivea* M. R. Még több déli faj hatol fel északra a IV. régióban, péld. *Dimorphopterus Spinolae* Sign., *Oxycarenus collaris* M. R., *Plinthisus hungaricus* Horv., *Stygnocoris faustus* Horv., *Brachysteles rufescens* Costa, *Miris sericans* Fieb., *Dicraneura stigmatipennis* M. R., *Zygina fasciaticollis* Rey, *Tettigia Orni* L., *Tettigometra fusca* Fieb., *Helicoptera parnassia* Stål, *Trioza mesomela* Flor stb.

Igen különös jelenség hazánkban egyes déli fajoknak szigetszerű, izolált előfordulása. Ilyenek az I. régióban: *Sternodontus affinis* Westw., *Bagrada stolida* H.-Sch. és *Spathocera tuberculata* Horv.; a II. régióban *Reuteria Marqueti* Put. és *Cicada plebeja* Scop.; a IV. régióban: *Phyllontocheila ragusana* Fieb. és *Corixa parallela* Fieb.; az V. régióban: *Gerris Costae* H.-Sch. stb.

Pars maxima specierum nostrarum in territorio Faunæ palæarcticæ fere ubique diffusa est. Ad hoc Faunæ nostræ fundamentum accedunt tres ingenio et origine diversæ cohortes: 1. species mediterraneæ, 2. species Europam orientalem, 3. species Europam mediam septentrionalemque inhabitantes.

Situ geographico et conformationi orographicæ Hungariæ convenienter, numerosissimæ sunt inter has species mediterraneæ. Regiones illas octo intuenti, in quas Regnum Hungariæ in hoc opere partitum est, statim patescit, non solum in regione VIII., quæ partem quandam orae angustæ Maris Adriatici complectitur et species mediterraneas solas alit, sed etiam in reliquis septem regionibus species mediterraneas, non paucas quidem inveniri posse. Quæ species creberrime occurrunt in regionibus I. et VI., porro in parte orientali regionis VII., non desunt tamen etiam in regionibus septentrionalibus. Hoc enim imprimis Fauna nostra excellit, quod species terras calidas incolentes etiam regiones septentrionales nostras attingunt et ingrediuntur. Exempli gratia proponi possunt: *Podops curvidens* Costa, *Capsus rutilus* H.-Sch., *Byrsoptera cylindricollis* Costa, *Zygina nivea* M. R., quæ etiam in regione III. inveniuntur. Maiore adhuc numero specierum regiones calidas inhabitantium insignitur regio septentrionalis IV., e quibus commemorentur: *Dimorphopterus Spinolae* Sign., *Oxycaraenus collaris* M. R., *Plinthisus hungaricus* Horv., *Stygnocoris faustus* Horv., *Brachysteles rufescens* Costa, *Miris sericans* Fieb., *Dicraneura stigmatipennis* M. R., *Zygina fasciaticollis* Rey, *Tettigia Orni* L., *Tettigometra fusca* Fieb., *Helicoptera parnassia* Stål, *Trioza mesomela* Flor, etc.

Commemoratione dignum, imo aliqua parte mirandum est species quasdam terrarum calidiorum apud nos in singulis modo regionibus occurrere, ut: *Sternodontus affinis* Westw., *Bagrada stolida* H.-Sch., *Spathocera tuberculata* Horv. in regione I.; *Reuteria Marqueti* Put. et *Cicada plebeja* L. in regione II.; *Phyllontocheila ragusana* Fieb. et *Corixa parallela* Fieb. in regione IV.; *Gerris Costae* H.-Sch. in regione V.

Deinde Fauna Hemipterorum nostra eo insignis est, quod speciebus non paucis Europæ orientalis propriis ornatur. Numerosissimæ sunt hæ species orientales in planitiebus sabulosis et sodam continentibus regionum I. et VI., quæ quoad momenta physica et meteorologica cum planitiebus Rossiæ meridionalis conveniunt. Huius generis Hemiptera Faunæ nostræ singularia sunt: *Phimodera fumosa* Fieb. et *amblygonia* Fieb., *Eurygaster dilaticollis* Dohrn, *Stibaropus Henkei* Jak., *Sciocoris del-*

Faunánknak második jellemző vonása a kelet-európai fajok megjelenésében nyilvánul. Legszámosabbak a keleti fajok az I. és VI. régió homokos és szikes lapályain, melyek fizikai és éghajlati viszonyaikra nézve a déloroszországi sikságokkal megegyeznek. Ilyen jellemző fajok: *Phimodera fumosa* Fieb. és *amblygonia* Fieb., *Eurygaster dilaticollis* Dohrn, *Stibaropus Henkei* Jak., *Sciocoris deltocephalus* Fieb., *Geocoris siculus var. arenarius* Jak., *Diomphalus hispidulus* Fieb., *Acetropis longirostris* Put., *Hyoidea notaticeps* Reut., *Globiceps sordidus* Reut., *Campylomma simillima* Jak., *Paredrocoris pectoralis* Reut., *Corixa Rogenhoferi* Fieb. és *Acocephalus elongatus* Leth.

Más régiókban is előfordulnak: *Cryptadius angustatus* Baer., *Dolycoris varicornis* Jak., *Scolopostethus Lethierryi* Jak., *Piesma Salsolae* Beck. és *Kochiae* Beck., *Serenthia minuta* Horv., *Poeciloscytus brevicornis* Reut., *Anapus longicornis* Jak., *Orthotylus Schoberiae* Reut., *Solenoxyphus fuscovenosus* Fieb., *Amblytylus concolor* Jak., *Psallus pumilus* Jak., *Plagiognathus bipunctatus* Reut. és *pictus* Fieb., *Chlorita tessellata* Leth. és *bipunctata* Osch.

A hegyes és dombos vidékeken honos keleti fajok közül a VI. régióban élnek: *Trochiscocoris rotundatus* Horv., *Lygaeus Tristrami* D. S., *Phyllontocheila ciliaris* Put. és *Hebrus montanus* Kol.; az V. régióban: a *Trochiscocoris rotundatus*-on kivül még a *Cicadetta adusta* Hag. és *Cixius desertorum* Fieb. Említést érdemelnek továbbá az I. régióból *Odontoscelis hispidula* Jak., *Phyllontocheila Tingis caucasica* Jak., *Orthocephalus bilineatus* Jak. és *Caloscelis Wallengreni* Stål; a II. és IV. régióból *Trioza dichroa* Scott; a IV—VII. régióból pedig *Tettigometra depressa* Fieb.

A közép- és északeurópai fajok nálunk jobbára az országot félkörben övező Kárpátok hegyvidékein, tehát a III., IV. és V. régióban és a VI. régió keleti részében fordulnak elő. De megtaláljuk őket, legalább részben a VII. régió nyugati részén emelkedő hegyekben is, a Karszt, Kapella és Velebit hegységekben.

Mintegy 100 ilyen közép- és északeurópai faj él a Kárpátokban és kiágazásaikban. Említést érdemelnek közülök: *Trapezonotus anorus* Flor, *Nabis flavomarginatus* Scholtz és *limbatus* Dahlb., *Piezostethus formicetorum* Boh., *Dichrooscytus intermedius* Reut., *Psallus Kolenatii* Flor és *lapponicus* Reut., *Criocoris nigripes* Fieb., *Corixa cavifrons* Thoms., *Erythria Montandoni* Put. és *Trioza Cerastii* H. Löw.

A Magas-Tátrában és vidékén tenyésznek: *Acalotocephalus* Fieb., *Geocoris siculus var. arenarius* Jak., *Diomphalus hispidulus* Fieb., *Acetropis longirostris* Put., *Hyoidea notaticeps* Reut., *Globiceps sordidus* Reut., *Campylomma simillima* Jak., *Paredrocoris pectoralis* Reut., *Corixa Rogenhoferi* Fieb., *Acocephalus elongatus* Leth.

Regiones etiam alias incolunt: *Cryptadius angustatus* Baer., *Dolycoris varicornis* Jak., *Scolopostethus Lethierryi* Jak., *Piesma Salsolae* Beck. et *Kochiae* Beck., *Serenthia minuta* Horv., *Poeciloscytus brevicornis* Reut., *Anapus longicornis* Jak., *Orthotylus Schoberiae* Reut., *Solenoxyphus fuscovenosus* Fieb., *Amblytylus concolor* Jak., *Psallus pumilus* Jak., *Plagiognathus bipunctatus* Reut. et *pictus* Fieb., *Chlorita tessellata* Leth. et *bipunctata* Osch.

E speciebus orientalibus regiones montanas collinasque inhabitantibus vivunt: in regione VI. *Trochiscocoris rotundatus* Horv., *Lygaeus Tristrami* D. S., *Phyllontocheila ciliaris* Put. et *Hebrus montanus* Kol.; in regione V. præter *Trochiscocorim rotundatum* etiam *Cicadetta adusta* Hag. et *Cixius desertorum* Fieb. Mentione dignæ sunt porro species e regione I.: *Odontoscelis hispidula* Jak., *Phyllontocheila caucasica* Jak., *Orthocephalus bilineatus* Jak. et *Caloscelis Wallengreni* Stål; e regionibus II. et IV.: *Trioza dichroa* Scott; e regionibus IV—VII. vero *Tettigometra depressa* Fieb.

Species Europam mediam septentrionalemque inhabitantes apud nos præsertim in Carpathis, ergo in regionibus III., IV. et V. et in parte orientali regionis VI. reperiuntur. Sed occurrunt illæ, pro parte saltem, etiam in montibus partis occidentalis regionis VII., Karst et Kapella et Velebit nominatis.

E speciebus his Carpathos eorumque ramos incolunt circiter 100 quarum mentione dignæ videntur: *Trapezonotus anorus* Flor, *Nabis flavomarginatus* Scholtz et *limbatus* Dahlb., *Piezostethus formicetorum* Boh., *Dichrooscytus intermedius* Reut., *Psallus Kolenatii* Flor et *lapponicus* Reut., *Criocoris nigripes* Fieb., *Corixa cavifrons* Thoms., *Erythria Montandoni* Put., *Trioza Cerastii* H. Löw.

Altam-Tatram eiusque vicina non egrediuntur: *Acalypta nigrina* Fall., *Psallus luridus* Reut., *Salda oculata* Müll., *Dicranotropis divergens* Kb., *Trioza abdominalis* Flor., *Chrysanthemi* Löw et *Cirsii* Löw.

In Carpathis orientalibus solis reperiuntur: *Acompocoris alpinus* Reut., *Scoloposcelis pulchella* Zett., *Pachytomella parallela* Mey., *Loxops coccinea* Mey., *Brachyarthrum limitatum* Fieb., *Deltocephalus notatifrons* Kb., *Aphalara nebulosa* Zett., *subpunctata* Först. et *affinis* Zett.

lypta nigrina Fall., *Psallus luridus* Reut., *Salda oculata* Müll., *Dicranotropis divergens* Kb., *Trioza abdominalis* Flor., *Chrysanthemi* Löw és *Cirsii* Löw.

A Keleti-Kárpátokban észleltettek: *Acompocoris alpinus* Reut., *Scoloposcelis pulchella* Zett., *Pachytomella parallela* Mey., *Loxops coccinea* Mey., *Brachyarthrum limitatum* Fieb., *Deltocephalus notatifrons* Kb., *Aphalara nebulosa* Zett., *subpunctata* Först. és *affinis* Zett.

Vannak azonban a Kárpátokban egyes oly fajok is, melyek a középeurópai hegyvidékeken vagy Észak-Európában nem élnek, hanem csak távolabb helyeken találhatók. Igy a Magas-Tátrából leirt *Polymerus carpathicus* Horv. és *Salda nobilis* Horv. azon kivül csak Szibériából, a *Horváthia hieroglyphica* M. R. pedig a Keleti-Kárpátokon kivül csak a Pyrenéusokból ismeretes.

A Kárpátok hegylánczának jellemző fajai közül a szomszéd Romániában, illetőleg Galicziában is élnek: *Odontoplatys bidentulus* H.-Sch., *Criocoris longicornis* Reut. és *Salda Brancsikii* Reut.

A Kárpátokban észlelt közép- és északeurópai fajoknak mintegy $^1/_3$ része előfordul a VII. régió nyugoti részén fekvő hegységekben is. De vannak itt azonkivül oly fajok is, melyek a Kárpátokban eddig még nem találtattak. Ilyenek: *Sehirus impressus* Horv., *Carpocoris melanocerus* M. R., *Elatophilus stigmatellus* Zett., *Orthotylus obscurus* Reut. stb. Kiválóan érdekes itt két északi faj, a *Myrmecophyes albo-ornatus* Stål és *Dicyphus constrictus* Boh. megjelenése.

Még feltünőbb néhány északeurópai fajnak előfordulása déli jellemű vidékeinken, t. i. az I. és VI. régióban és a VII. régió keleti részében. E fajok: *Piezostethus parvulus* Reut., *Neocoris nigritulus* Zett., *Calligypona albicollis* Sahlb., *Eurybregma nigrolineata* Scott és *Delphax Fieberi* Scott.

Az erdélyrészi konyhasós tavak kizárólagos speczialitása a *Corixa Fussi* Fieb. Az ottani konyhasós területeket jellemzik: *Orthotylus rubidus* Put., *Salda lateralis* Fall., *Anoterostemma Ivanoffi* Leth. és *Rhinocola bicolor* Scott, tehát mind oly fajok, melyek csak Dél-Oroszország hasonló helyein és a Földközi-tenger partvidékein honosak.

A mi a Magyar Birodalomban eddig észlelt Hemiptera-fajoknak az egyes régiók szerinti eloszlását illeti, 239 faj mind a nyolcz régióban találtatott.

Sajátos, azaz oly fajokban, melyek a többbi régióban nem fordulnak elő, leggazdagabb az I. régió; mert ennek 106 ilyen sajátos faja van. Legszegényebb a II. régió 13 sajátos fajjal. A III. régióból 35, a IV.-ből 35, az V.-ből 44, a VI.-ból 30 és a

Vivunt tamen in Carpathis etiam species quædam, paucæ quidem, quæ regionibus montanis Europæ mediæ et Europæ septentrionali desunt, inveniuntur vero in terris procul a nobis sitis. In Alta-Tatra primo in lucem prolatæ species: *Polymerus carpathicus* Horv. et *Salda nobilis* Horv. præterea ad hoc tempus non nisi in Sibiria inventæ sunt, *Horváthia hieroglyphica* M. R. vero præter Carpathos orientales e Pyrenæis montibus tantum innotuit.

E speciebus Carpathorum propriis etiam in terris vicinis, et quidem in Romania vel in Halicia vivunt: *Odontoplatys bidentulus* H.-Sch., *Criocoris longicornis* Reut., *Salda Brancsikii* Reut.

Circiter tertia pars specierum Europam mediam septentrionalemque incolentium et in Carpathis observatarum, occurrit etiam in montibus occidentalibus regionis VII. Sed reperiuntur hic præterea species aliæ, quæ in regionibus Carpathicis adhuc inventæ non sunt: *Sehirus impressus* Horv., *Carpocoris melanocerus* M. R., *Elatophilus stigmatellus* Zett., *Orthotylus obscurus* Reut. etc. Mentionem separatam merentur hic species duæ septentrionales: *Myrmecophyes albo-ornatus* Stål et *Dicyphus constrictus* Boh.

Valde mirandum est, quod species nonnullæ Europæ septentrionalis in tractibus satis calidis apud nos, et quidem in regionibus I. et VI. et in parte orientali regionis VII. occurrunt. Species hæ sunt: *Piezostethus parvulus* Reut., *Neocoris nigritulus* Zett., *Calligypona albicollis* Sahlb., *Eurybregma nigrolineata* Scott, *Delphax Fieberi* Scott.

Lacuum salinorum partis Regni transsylvanicæ propria et celeberrima species est *Corixa Fussi* Fieb. Hoc territorium salsum insigne est speciebus: *Orthotylus rubidus* Put., *Salda lateralis* Fall., *Anoterostemma Ivanoffi* Leth., *Rhinocola bicolor* Scott, quæ tantum locis similibus Rossiæ meridionalis et in oris Maris Mediterranei domi sunt.

Quod attinet Hemipterorum in Regno Hungariæ collectorum secundum regiones distributionem, species 239 in omnibus octo regionibus inventæ sunt.

Numero specierum sibi propriarum, in aliis regionibus vero ad hoc tempus non observatarum, præcellit regio I., quæ earum 106 habet. Hac in re reliquæ regiones ita se excipiunt: regio VIII. cum 95, V. cum 44, III. et IV. utraque cum 35, VI. cum 30, VII. cum 23, II. cum 13 speciebus propriis.

Regio VIII. non solum speciebus propriis locuples est, sed etiam eo insignis, quod ei desunt species 76, reliquis omnibus regionibus communes. Montes iuncti copulatique in oris Maris Adriatici

VII. régióból 23 oly faj került, mely a többi régióban hiányzik.

A VIII. régiónak 95 oly faja van, melyet a többi 7 régióban még nem sikerült felfedezni; ellenben 76 oly faj, mely valamennyi többi régióban előfordul, innen hiányzik. Az Adriai-tenger partvidékén hirtelen felemelkedő hegytömegek e régió déli faunáját az ország belsejének hasonló faunájától teljesen elszakítják; a mediterrán fajok terjedése befelé a zord hegyvidéken úgy látszik legyőzhetetlen akadályokba ütközik. Egyes fajok, mint: *Peribalus strictus* Fabr., *Oxycarenus Lavaterae* Fabr., *Scolopostethus cognatus* Fieb., *Calocoris fuscescens* Reut., *Deltocephalus bispinatus* Then, *Tettigia Orni* L., *Hysteropterum immaculatum* Fabr. és *Psylla suturalis* Horv., többé-kevésbbé behatolnak ugyan a VII. régió szélébe is, de terjedésök a Karszt hegyvidékén csakhamar megszakad. Csak egy déli faj van, az *Alloeonotus fulvipes* Scop., mely mind a meleg klimáju tengermelléken, mind Horvátország nyugati részének hegyeiben egyaránt otthonos. Elég különös, hogy ugyanitt még három oly déli faj is tenyészik (*Micrelytra fossularum* Rossi, *Camponotidea Saundersi* Put., *Salda amplicollis* Reut.), melyet a VIII. régióban eddig még nem sikerült felfedeznünk.

Az egyes régiókat jellemző fajok felsorolását mellőzve, végre csak azokról a fajokról akarok megemlékezni, melyeket Magyarországon kivül eddig másutt még sehol sem találtak, s melyeket ez oknál fogva hazánk kizárólagos fajainak lehet tekinteni. Ilyen fajunk van összesen 47. De közülük 21 faj az ország határszéli vidékein fordul elő; e miatt igen valószinű, hogy a velünk szomszéd országokban is tenyészik. Igy a Kárpátokban élnek és valószinüleg Galicziában, illetőleg Romániában is honosak: *Psallus chrysopsilus* Reut., *Salda Henschii* Reut., *Deltocephalus quadrivirgatus* Horv., *Stiroma montana* Horv., *Trioza coriacea* Horv. és *Greisigeri* Horv. Alkalmasint Szerbiában is előfordulnak: *Galeatus syrmiensis* Horv., *Litoxenus tenellus* Reut., *Micronecta pusilla* Horv., *Zygina ochroleuca* Horv., *Cixius granulatus* Horv., *Peltonotellus punctifrons* Horv. és *Aphalara conspersa* Löw. Dalmácziában és Ausztria tengerparti vidékein bizonyára nem fognak hiányzani: *Triphleps Horváthi* Reut., *Typhlocyba ficaria* Horv., *Zyginella albifrons* Horv., *Zygina dorsalis* Horv. és *discolor* Horv., *Tettigometra sororcula* Horv., *Psylla suturalis* Horv. és *Trioza fraudatrix* Horv.

A többi 26 faj közül homoktalajú rónáinkon élnek: *Emblethis brachynotus* Horv., *Piesma Silenes* Horv., *Amblytylus testaceus* Reut., *Aconura*

subito assurgentes Faunam meridionalem huius regionis a Fauna simili Regni interioris penitus intercludunt; in regionibus his montanis asperis species mediterraneæ impedimentis invictis prohiberi videntur, ne Hungariam interiorem versus diffundantur. Species nonnullæ, ut: *Peribalus strictus* Fabr., *Oxycarenus Lavaterae* Fabr., *Scolopostethus cognatus* Fieb., *Calocoris fuscescens* Reut., *Deltocephalus bispinatus* Then, *Tettigia Orni* L., *Hysteropterum immaculatum* Fabr., *Psylla suturalis* Horv. plus minusve transgrediuntur quidem fines regionis VII., sed regiones montanas montium Karst non excedunt. E speciebus meridionalibus unam solam cognovimus, *Alloeonotum fulvipedem* Scop. quidem, quæ pariter in Litorali calido atque in partibus montium Croatiæ occidentalibus domi est. Satis mirum est, quod hic tres adhuc species meridionales inveniuntur (*Micrelytra fossularum* Rossi, *Camponotidea Saundersi* Put., *Salda amplicollis* Reut.), quas in regione VIII. hucusque non contigit nobis detegere.

Ab enumeratione specierum illarum, quibus singulæ regiones imprimis ornantur et insigniuntur, me abstinens, specierum illarum modo mentionem faciam, quæ extra limites Hungariæ usque ad hoc tempus non sunt inventæ et quas propterea patriæ nostræ unius proprias esse putamus. Tales habemus species 47. Sed ex his 21 in terminis Regni Hungariæ et prope ab eis inveniuntur; quapropter vix dubitari potest, quin species hæ etiam in terris finitimis vivant. In montibus Carpathicis collectæ sunt et verisimiliter etiam in Halicia aut in Romania occurrere possunt species: *Psallus chrysopsilus* Reut., *Salda Henschii* Reut., *Deltocephalus quadrivirgatus* Horv., *Stiroma montana* Horv., *Trioza coriacea* Horv. et *Greisigeri* Horv. Probabiliter etiam Serbiam incolunt: *Galeatus syrmiensis* Horv., *Litoxenus tenellus* Reut., *Micronecta pusilla* Horv., *Zygina ochroleuca* Horv., *Cixius granulatus* Horv., *Peltonotellus punctifrons* Horv., *Aphalara conspersa* Löw. In Dalmatia et in Litorali Austriaco haud abesse opinor species has: *Triphleps Horváthi* Reut., *Typhlocyba ficaria* Horv., *Zyginella albifrons* Horv., *Zygina dorsalis* Horv. et *discolor* Horv., *Tettigometra sororcula* Horv., *Psylla suturalis* Horv. et *Trioza fraudatrix* Horv.

E speciebus reliquis 26 planitierum nostrarum sabulosarum sunt incolæ: *Emblethis brachynotus* Horv., *Piesma Silenes* Horv., *Amblytylus testaceus* Reut., *Aconura margaritacea* Horv. et *quadrum* H.-Sch., *Deltocephalus fugax* Horv., *pygmaeus* Horv. et *ornaticeps* Horv., *Parabolocratus*

margaritacea Horv. és *quadrum* H.-Sch., *Deltocephalus fugax* Horv., *pygmaeus* Horv. és *ornaticeps* Horv., *Parabolocratus arenarius* Horv., *Idiocerus humilis* Horv., *Pediopsis vicina* Horv., *Ommatidiotus inconspicuus* Stål, *Tropidocephala Andropogonis* Horv., *Kelisia Henschii* Horv., *Delphax Mocsáryi* Horv., *Aphalara Kochiae* Horv., *Amblyrrhina maculata* Löw és *Trioza versicolor* Löw. Azt hiszem, hogy ezeknek nagy része a déloroszországi pusztákról is meg fog kerülni.

Sőt tekintettel arra, hogy a Hemipterák többnyire mind igen nagy elterjedési körrel birnak, feltehető, hogy még a többi kizárólagos magyar faj a szomszéd országokban előbb-utóbb szintén fel fog fedeztetni. E fajok a következők: *Dictyonota Henschi* Put., *Corixa Fussi* Fieb., *Cicadula tetrasticta* Horv., *Thamnotettix placidus* Horv., *Deltocephalus Chyzeri* Horv., *Cicadetta transsylvanica* Fieb., *Hysteropterum Dohrnii* Kb. és *Eurysa clypeata* Horv.

Mielőtt a Magyar Birodalom Hemipteráinak rendszeres felsorolására térnék, előrebocsátom még a reájuk vonatkozó irodalmi dolgozatok jegyzékét.

Budapest, 1897. deczember 31-én.

arenarius Horv., *Idiocerus humilis* Horv., *Pediopsis vicina* Horv., *Ommatidiotus inconspicuus* Stål, *Tropidocephala Andropogonis* Horv., *Kelisia Henschii* Horv., *Delphax Mocsáryi* Horv., *Aphalara Kochiae* Horv., *Amblyrrhina maculata* Löw, *Trioza versicolor* Löw. Credo, maximam harum specierum partem etiam in desertis sabulosis Rossiæ meridionalis inveniri posse.

Denique, si spectamus, plerasque species Hemipterorum per ampla spatia esse diffusas, sine ullo dubio admittere possumus, reliquas quoque species, quæ nunc Hungariæ propriæ videntur, in terris finitimis serius ocius in lucem prolatum iri. Species hæ sunt: *Dictyonota Henschi* Put., *Corixa Fussi* Fieb., *Cicadula tetrasticta* Horv., *Thamnotettix placidus* Horv., *Deltocephalus Chyzeri* Horv., *Cicadetta transsylvanica* Fieb., *Hysteropterum Dohrnii* Kb., *Eurysa clypeata* Horv.

Antequam enumerationem systematicam Hemipterorum Regni Hungariæ incipiam, conspectum scriptorum, quæ species patriam nostram incolentes spectant, præmittendum esse censeo.

Budapestini, die 31. Decembris 1897.

LITTERATURA.

1. Bálint Sándor, Jelentés az 1888-ik év nyarán Székelyföldön tett rovartani gyüjtő kirándulás eredményéről. (Orvos-természettud. Értesítő. Kolozsvár. XIV. 1889. p. 266—280.)
2. Bartsch Eduárd, Sárosmegye helyirata. Eperjes, 1846.
3. Biró Lajos, Darázs-gyilkos poloska. (Rovartani Lapok. I. 1884. p. 141—142.)
4. — A Keleti-Kárpátok vidékének jellemző rovarfajai. (A magyarországi Kárpátegyesület Évkönyve. XI. 1884. p. 124—132.)
5. — Kirándulás a Pop-Ivánra. I—II. (Rovartani Lapok. II. 1885. p. 30—36 et 55—59.)
6. — Zabpusztító levéltetű. (Ibid. p. 127.)
7. — Kecskemét állatvilága. (Ifj. Bagi László, Kecskemét multja és jelene. I. rész. Kecskemét, 1896. p. 157—209.)
8. Borbás Vincze dr., Bodobácsok a szőrös daravirágon. (Rovartani Lapok. II. 1885. p. 108.)
9. Brancsik Károly dr., Trencsén megye Hemipteráinak felsorolása. (A Trencsénmegyei Természettud. Egylet Évkönyve. I. 1878. p. 29—33.)
10. — Adatok Trencsén megye Hemiptera faunájához. (Ibid. III. 1880. p. 23—30.)
11. — Zoologisch-botanische Wanderungen. I—VIII. (Ibid. III—IX. 1880—1887.)
12. — Adatok Trencsénmegye Hemiptera faunájához. I. Toldalék. (Ibid. IX. 1887. p. 55—56.)
13. — Additamenta ad Faunam Comitatus Trencsiniensis. (Ibid. XIII—XIV. 1891. p. 43—46.)
14. — Adatok Magyarország faunájához. (Ibid. XV—XVI. 1893. p. 97—108.)
15. Chyzer Kornél dr., Ritka kéregpoloska. (Rovartani Lapok. II. 1885. p. 173.)
16. Cserni Béla dr., Gyulafehérvár környékének faunája. (Az alsófehérmegyei történelmi, régészeti és természettudományi társulat első évkönyve. 1888. p. 73—104.)
17. Douglas J. W., Notes on some British and exotic Coccidæ. No. 18. (The Entomologist's Monthly Magazine. 1890. p. 318—319.)
18. Emich Gusztáv, A mező- és kertgazdaságra káros rovarok. Budapest, 1884. I. füzet.
19. Fieber Franz Xav., Entomologische Monographien. Prag, 1844.
20. — Genera Hydrocoridum. Pragæ, 1851.
21. — Rhynchotographien. Prag, 1851.
22. — Criterien zur generischen Theilung der Phytocoriden. (Wiener Entomolog. Monatschrift. II. 1858. p. 289—347.)
23. — Die europäischen Hemiptera. Wien, 1861.
24. — Neuere Entdeckungen in europäischen Hemipteren. (Wiener Entomolog. Monatschrift. VIII. 1864. p. 65—86, 205—234 et 321—335.)
25. — Synopse der europ. Arten Tettigometra. (Verhandl. der k. k. zoolog.-botan. Gesellschaft in Wien. XV. 1865. p. 561—572.)
26. — Synopse der europäischen Deltocephali. (Ibid. XIX. 1869. p. 201—222.)
27. — Les Cicadines d'Europe. Traduit de l'allemand par Ferd. Reiber. (Revue et Magasin de Zoologie. 1875—1879.)
28. Földi János, Természeti História. I. Az állatok országa. Pozsony, 1801.
29. Friedenfels, E. v., Ueber Artemia salina und andere Bewohner der Soolenteiche von Salzburg. (Verhandl. und Mittheilung. des siebenbürg. Vereins für Naturwissenschaften. XXX. 1880. p. 112—117.)
30. — Weitere Beobachtungen über Artemia salina und die Salzburger Soolenteiche. (Ibid. XXXV. 1885. p. 24—31.)
31. Fritsch Karl, Jährliche Periode der Insectenfauna von Österreich-Ungarn. V. Die Schnabelkerfe (Rhynchota). (Denkschriften der mathem.-naturwiss. Classe der kais. Akademie der Wissenschaften. Wien. XLII. 1880. p. 217—255.)
32. Frivaldszky Imre, Jellemző adatok Magyarország faunájához. (A Magyar Tudományos Akadémia Évkönyvei. XI. 1865. No. 4.)
33. Frivaldszky János, A Herkulesfürdő és környékén élő Állatok. (Munk Manó, A Herkulesfürdő és környéke. Pest, 1872. p. 85—108.)
34. — Állattani kirándulásaim Orsova, Mehádia és Korniareva vidékein. (A magyar orvosok és természetvizsgálók Herkulesfürdőben tartott XVI. nagygyülésének Munkálatai. Budapest, 1873. p. 197—243.)
35. Adatok Máramaros vármegye faunájához. (Mathem. és Természettud. Közlemények. IX. 1873. p. 183—232.)
36. — Adatok Temes és Krassó megyék faunájához. (Ibid. XIII. 1876. p. 285—378.)
37. — Budapest és környéke állattani tekintetben: Rovarok. (Dr. Gerlóczy Gyula és Dr. Dulácska Géza, Budapest és környéke természetrajzi, orvosi és közmivelődési leirása. Budapest, 1879. Első rész. p. 337—403.)
38. Fuss Carl, Beitrag zur siebenbürgischen Insektenfauna. (Verhandl. und Mittheilung. des siebenbürg. Vereins für Naturwissenschaften. III. 1852. p. 73—80.)
39. — Beitrag zur Orthopteren- und Hemipterenfauna Siebenbürgens. (Ibid. IV. 1853. p. 40—46.)
40. — Beitrag zur Insectenfauna Siebenbürgens. (Ibid. VI. 1855. p. 20—26.)
41. — Zur Rhynchoten-Fauna Siebenbürgens. (Ibid. XIII. 1862. p. 3—19.)
42. Germar, Ernst Friedrich, Reise nach Dalmatien und in das Gebiet von Ragusa. Leipzig und Altenburg, 1817.
43. — Species Cicadarium enumeratæ sub genera distributæ. (Thon Archiv. II. 1830. p. 1—8 [37—44] et 45—57.)
44. Grossinger Joann. Bapt., Universa Historia Physica Regni Hungariæ. Posonii et Comaromii, 1794. Tom. IV.
45. Henrich C., Verzeichnis der in der näheren Umgebung von Hermannstadt beobachteten Aphiden. (Verhandl. und Mittheilung. des siebenbürg. Vereins für Naturwissenschaften. XLV. 1896. p. 23—31.)
46. Herman Ottó, A Mezőség. I. A Hódos- vagy Szarvastó és környéke. (Az Erdélyi Muzeum-Egylet Évkönyvei. V. 1871. p. 8—29.)
47. — Állattani közlemények. V. (Ibid. p. 92—96.)
48. — A Mezőség. II. A Mező-Záh-Tóháti, továbbá Méhesi, Báldi és Mező-Sályi tósorozat. (Ibid. VI. 1872. p. 42—67.)
49. Herrich-Schäffer, G. A. W. Dr., Faunæ Insectorum Germaniæ initia. Fasc. 111—190. Regensburg, 1829—1844.
50. — Die Wanzenartigen Insecten. Vol. IV, V, VII et IX. Nürnberg, 1839—1853.
51. Horváth Géza, Adatok a hazai félröpüek ismeretéhez. (Mathem. és Természettud. Közlemények. VIII. 1870. p. 1—14.)
52. — A magyar fauna pajzsos félröpüi. (A magyar orvosok és természetvizsgálók Herkulesfürdőben tartott XVI. nagygyülésének Munkálatai. Budapest, 1873. p. 243—253.)
53. — Kérdés a magyar állatkedvelőkhöz. (Természettud. Közlöny. VI. 1874. p. 24.)

54. — Hogy hivják a Pyrrhocoris apterust Magyarországban? (Ibid. p. 124—125.)
55. — Neue Heteroptera aus Ungarn. (Berlin. Entomolog. Zeitschrift. XVIII. 1874. p. 332—336.)
56. — Énumeration des Tingides de Hongrie. (Petites Nouvelles Entomologiques. I. 1874. p. 432.)
57. — Diagnose d'un Hémiptère nouveau de Hongrie. (Ibid. p. 455.)
58. — Monographia Lygæidarum Hungariæ. Magyarország bodobácsféléinek magánrajza. Budapest, 1875.
59. — Diagnoses de deux Hémiptères nouveaux de la famille des Capsides. (Petites Nouvelles Entomologiques. II. 1876. p. 15.)
60. — Die Hemipteren-Gattung Plinthisus (Westw.) Fieb. (Verhandl. der k. k. zoolog.-botan. Gesellschaft in Wien. XXVI. 1876. p. 721—736.)
61. — Az 1876-ik évben hazánkból leirt új félröpü fajokról. (Természetrajzi Füzetek. I. 1877. p. 25—27.)
62. — Piezocranum, novum genus Capsidarum. (Ibid. p. 92—93.)
63. — A manna-kabócza hazánkban. (Ibid. p. 93—94.)
64. — A szamosfalvi sóstavakban élő rovarokról. (Ibid. p. 94.)
65. — A magyarországi rablópoloskák átnézete. (Ibid. p. 136—151.)
Synopsis des Réduvides de Hongrie. (Ibid. p. 182—185.)
66. — Aphidák. (Ibid p. 234—235.)
67. — Magyarország vizenjáró poloskái. (Ibid. II. 1878. p. 126—137.)
Die Wasserläufer der ungarischen Hemipteren-Fauna. (Ibid. p. 183—190.)
68. — Hemipterologiai Közlemények. (Ibid. IV. 1880. p. 184—192.)
69. — A buza és árpa gyökerén élő Schizoneura-fajról. (Ibid. p. 275—276.)
70. — Remarques sur divers Hémiptères. (Annales de la Société entomologique de France. 1881. Bull. p. 33—35.)
71. — Hemiptera nova vel minus cognita. (Természetrajzi Füzetek. V. 1881. p. 39—42 et 217—225.)
72. — Ueber einige Lygæiden. (Wiener Entomolog. Zeitung. I. 1882. p. 143—149.)
73. — Jelentés az országos phylloxera-kisérleti állomás évi működéséről. Vol. I—V. Budapest, 1882—1886.
Rapport annuel de la Station Phylloxérique Hongroise. I. Budapest, 1882.
74. — A régi görögök «phtheir» nevü rovaráról. (Természettudományi Közlöny. XIV. 1882. p. 116—119.)
75. — A rozskalászokat károsító levéltetvek. (Ibid. p. 383.)
76. — Révision du genre Eremocoris Fieb. (Revue d'Entomologie. II. 1883. p. 1—12.)
77. — Az Eremocoris-fajok magánrajza. (Magy. Tud. Akad. Értekezések a természettudományok köréből. XIII. 1883. No. 2. p. 1—30.)
78. — Sur les migrations des Pucerons. (Revue d'Entomologie. II. 1883. p. 64—67.)
79. — A phylloxera és a téli hideg. (Mathem. és Természettudományi Értesitő. I. 1883. p. 267—272.)
Le phylloxera et le froid d'hiver. (Mathem. und Naturwiss. Berichte aus Ungarn. I. 1884. p. 224—229.)
80. — Die europäischen Podoparien. (Wiener Entomolog. Zeitung. II. 1883. p. 133—138 et 161—167.)
81. — Note sur le genre Tetraneura. (Revue d'Entomologie. II. 1883. p. 310—312.)
82. — Aphida-peték nagy tömegben. (Rovartani Lapok. I. 1884. p. 21—22.)
83. — Diagnoses Hemipterorum. I—II. (Természetrajzi Füzetek. VIII. 1884. p. 9—15 et 315—320.)
84. — Ueber Centrocoris variegatus Kolen. und seine Verwandten. (Wiener Entomolog. Zeitung. III. 1884. p. 111—115.)
85. — Zabpusztító levéltetvek. (Rovartani Lapok. I. 1884. p. 143—145.)
86. — A magyarországi vizenjáró poloskákról. (Ibid. p. 187—188.)
87. — Jelentés az 1883-ik évben Magyarország területén fellépett és megfigyelt kártékony rovarokról. Budapest, 1884.
88. — Gyertyafénynél fogott vizi poloskák. (Rovartani Lapok. II. 1885. p. 44—45.)
89. A paréjpoloska és színváltozatai. (Ibid. p. 74—81.)
La Punaise des choux et ses variétés. (Ibid. p. XII—XIV.)
90. — A bodobácsok biologiájához. (Ibid. p. 108—109.)
91. — Egy gubacsképző levéltetü biologiája. (Ibid. p. 153—160.)
La biologie d'un Puceron gallicole. (Ibid. p. XXII—XXIII.)
92. — A paréjpoloska ős alakja. (Ibid. p. 172.)
93. — A magyarországi Chermes-fajokról. (Ibid. p. 188—190.)
94. — A magyarországi szunyogpoloskák. (Ibid. p. 200—208.)
Les Bérytiens de la Hongrie. (Ibid. p. XXVI—XXVII.)
95. — Poloskákban élősködő legyek. (Ibid. p. 238—239.)
96. — Hémiptères nouveaux. (Revue d'Entomologie. IV. 1885. p. 320—324.)
97. — A magyarországi Psyllidákról. (Mathem. és Természettudományi Közlemények. XXI. 1886. p. 291—320.)
98. — Nouvelle révision du genre Plinthisus. (Revue d'Entomologie. V. 1886. p. 215—222.)
99. — A magyarországi kéregpoloskák. (Rovartani Lapok. III. 1886. p. 153—159.)
Les Aradides de la Hongrie. (Ibid. p. XXII.)
100. — A bab gyökértetvéről. (Ibid. p. 225—226.)
101. — A gubacsképző levéltetvek mézgás váladékáról. (Mathem. és Természettud. Értesitő. V. 1887. p. 130—136.)
Die Excremente der gallenbewohnenden Aphiden. (Wiener Entomolog. Zeitung. VI. 1887. p. 249—254.)
102. — Note emitterologiche : I. Tavola analitica delle specie paleartiche del genere Stenocephalus, Latr. (Bulletino della Società Entomologica Italiana. XIX. 1887. p. 278—281.)
103. — Izlet u Podsused u zagrebačkoj okolici mjeseca novembra. (Glasnik hrvatskoga naravoslovnoga družtva. II. 1887. p. 267—274.)
104. — Matériaux pour servir à l'étude des Hémiptères de la faune paléarctique. (Revue de'Entomologie. VII. 1888. p. 168—189.)
105. — Uebersicht der europäischen Cymus-Arten. (Wiener Entomolog. Zeitung. VII. 1888. p. 309—310.)
106. — Essai monographique sur le genre Trigonosoma. (Revue d'Entomologie. VIII. 1889. p. 33—49.)
107. — Notes synonymiques et géographiques sur les Hémiptères paléarctiques. (Ibid. p. 325—331.)
108. — Synopsis des Nysius paléarctiques. (Ibid. IX. 1890. p. 185—191.)
109. — Az akáczfák paizstetvéről. (Mathem. és Természettud. Értesitő. IX. 1891. p. 156—164.)
110. — Synopsis of the genus Scolopostethus. (The Entomologist's Monthly Magazine. 1891. p. 116—119.)
111. — Hemipterološki izlet u Primorje i na Plitvička jezera. (Glasnik hrvatskoga naravoslovnoga družtva. VI. 1891. p. 29—49.)
112. — Trois Bérytides nouveaux. (Revue d'Entomologie. X. 1891. p. 47—49.)
113. — A gubacsképző levelészek. (Emlékkönyv a kir. magy. természettudományi társulat félszázados jubileumára. Budapest, 1892. p. 353—362.)
114. — Sur l'existence des séries parallèles dans le cycle biologique des Pemphigiens. (Comptes rendus de l'Académie des Sciences. Paris. 1892. I. p. 842—844.)
115. — Nouvelle révision du genre Scolopostethus. (Revue d'Entomologie. XI. 1892. p. 253—256.)
116. — A ködkárok kérdéséhez. (Természettud. Közlöny. XXIV. 1892. p. 601—602.)
117. — Uebersicht der Hemipteren-Gattung Campylostira Fieb. (Wiener Entomolog. Zeitung XI. 1892. p. 309—313.)

118. — Sur la stridulation de «Spathocera laticornis» Schill. (Feuille des Jeunes Naturalistes. 1894. p. 90.)
119. — Notes sur quelques Capsides. (Revue d'Entomologie. XIII. 1894. p. 190—193.)
120. — Sur le Piezocranum simulans Horv. (Ibid. p. 283—284.)
121. — Révision des Sehirus noirs. (Ibid. XIV. 1895. p. 128—130.)
122. — Hémiptères nouveaux d'Europe et des pays limitrophes. (Ibid. p. 152—165.)
123. — — Species generis Pionosomus Fieb. (Természetrajzi Füzetek. XVIII. 1895. p. 39—41.)
124. — Az aranytermő szőlők meséje. (Természettud. Közlöny. XXVII. 1895. p. 505—514.)
125. — Eine alte und drei neue Aphiden-Gattungen. (Wiener Entomolog. Zeitung. XV. 1896. p. 1—7.)
126. — Sur la capture des Cigales. (Annales de la Société entomologique de France. 1896. Bull. p. 170.)
127. — Hemiptera nova palæarctica. (Természetrajzi Füzetek. XIX. 1896. p. 322—329.)
128. — Description d'Hémiptères nouveaux et notes diverses. (Revue d'Entomologie. XVI. 1897. p. 81—95.)
129. — Species generis Galeatus Curt. (Természetrajzi Füzetek. XX. 1897. p. 455—460.)
130. — Homoptera nova ex Hungaria. (Ibid. p. 620—643.)
131. Kardos Károly, Máramaros megye állatrajzi ismertetése. (Szilágyi István, Máramaros vármegye egyetemes leirása. Budapest, 1876. p. 211—235.)
132. Kertész József, Kártékony rovarok Borsodmegyében. (Rovartani Lapok. III. 1886. p. 79.)
133. — Rovarkárok Borsodmegyében 1886-ban. (Ibid. p. 226—227.)
134. Kertész Mirsa, Nagyvárad és vidékének állatvilága. (Bunyitay Vincze, Nagyvárad természetrajza. Budapest, 1890. p. 135—244.)
135. Kéry Imre dr., Honunk legkeletiebb, Arad vármegyéhez tartozó hegyes vidékének leirása. (Magyar Akadémiai Értesitő. Mathem. és Természettud. osztályok. 1859. p. 3—67.)
136. Kirschbaum, C. L. Dr., Die Cicadinen der Gegend von Wiesbaden und Frankfurt a. M. nebst einer Anzahl neuer oder schwer zu unterscheidender Arten aus anderen Gegenden Europa's. Wiesbaden, 1868.
137. Koch C L., Die Pflanzenläuse Aphiden. Nürnberg, 1854—1857.
138. Korlević A., Popis raznokrilih rilčara (Rhynchota Heteroptera) okolice riečke. (Glasnik hrvatskoga naravoslovnoga družtva. II. 1887. p. 37—44.)
139. Koy Tobias, Alphabetisches Verzeichniss meiner Insecten-Sammlung. Ofen, 1800.
140. Krécsy Béla, Az akáczfa levél-tetű tömeges megjelenéséről. (Rovartani Lapok. III. 1886. p. 148.)
141. Kriesch János, Állattani utazási jelentések az 1870. és 1872-ik évről. (Mathem. és Természettud. Közlemények. X. 1872. p. 201—220.)
142. Kunc Adolf dr., Szombathely—Savaria — rend. tanácsú város Monographiája. Szombathely, 1880.
143. Lethierry L., Description de deux Cicadines nouvelles. (Revue d'Entomologie. IV. 1885. p. 111—112.)
144. — Description d'un nouveau genre d'Homoptères d'Europe et note sur le Delphax lugubris. (Ibid. XI. 1892. p. 69—70.)
145. Löw Franz Dr., Zur Systematik der Psylloden. (Verhandl. der k. k. zoolog.-botan. Gesellschaft in Wien. XXVIII. 1878. p. 585—610.)
146. — Beschreibung von zehn neuen Psylloden-Arten. (Ibid. XXXI. 1881. p. 255—268.)
147. — Neue Beiträge zur Kenntniss der Psylliden. (Ibid. XXXVI. 1886. p. 149—170.)
148. — Uebersicht der Psylliden von Oesterreich-Ungarn mit Einschluss von Bosnien und der Herzegowina, nebst Beschreibung neuer Arten. (Ibid. XXXVIII. 1888. p. 5—40.)
149. Marsili, Aloys. Ferd. Com., Danubius Pannonico-Mysicus observationibus geographicis, astronomicis, hydrographicis, historicis, physicis perlustratus et in sex Tomos digestus. Tom. VI. Hagæ Comitum et Amstelodami, 1726.
150. Matisz János, A Karszt-lejtő és a tengerpart állatvilága. (Dr. Sziklay János és Dr. Borovszky Samu, Magyarország vármegyéi és városai: Fiume és a magyar-horvát tengerpart. Budapest, 1897. p. 401—449.)
151. Mayr, Gustav Dr., Beiträge zur Insectenfauna Siebenbürgens. (Verhandl. und Mittheilung. des siebenbürg. Vereins für Naturwissenschaften. IV. 1853. p. 141—143.)
152. — Beitrag zur geographischen Verbreitung der Tingideen. (Verhandl. der k. k. zoolog.-botan. Gesellschaft in Wien. VIII. 1858. p. 567—572.)
153. Melichar, L. Dr., Cicadinen (Hemiptera-Homoptera) von Mittel-Europa. Berlin, 1896.
154. — Homopterologische Notizen. (Wiener Entomolog. Zeitung. XVI. 1897. p. 147—148.)
155. Méry Étel, Győr megye állatvilága. (Fehér Ipoly, Győr megye és város egyetemes leirása. Budapest, 1874. p. 133—157.)
156. Mocsáry Sándor, Adatok Biharmegye faunájához. (Mathem. és Természettud. Közlemények. X. 1872. p. 163—200.)
157. — Adatok Zemplén és Ung megyék faunájához. (Ibid. XIII. 1875. p. 131—185.)
158. — Bihar és Hajdu megyék hártya-, két-, reczés-, egyenes- és félröpüi. (Ibid. XIV. 1876. p. 37—79.)
159. — Adatok Zólyom és Liptó megyék faunájához. (Ibid. XV. 1878. p. 223—263.)
160. Petrogalli Artur, Kirándulás Trencsén közvetlen környékén. (A Trencsénmegyei Természettud. Egylet Évkönyve. VIII. 1886. p. 93—99.)
161. — Kirándulás a Nagy Fátra «Hermánd» nevű völgyébe. (Ibid. IX. 1887. p. 57—83.)
162. — Kirándulás a Szitnyára. (Ibid. XI—XII. 1890. p. 132—146.)
163. Piller Math. et Mitterpacher Lud., Iter per Poseganam Sclavoniæ provinciam. Budæ, 1783.
164. Porzsolt Ádám, A körtefa-tetű. (Gyümölcsészeti és Konyhakertészeti Füzetek. V. 1884. p. 256—258.)
165. Puton A. Dr., Descriptions de trois Hémiptères nouveaux. (Revue d'Entomologie. XI. 1892. p. 71—72.)
166. Reuter O.-M., Diagnoses præcursoriæ. (Petites Nouvelles Entomologiques. II. 1876. p. 21—22.)
167. — Sur le Capsus 4-guttatus Kirschb. (Ibid. p. 26.)
168. — Diagnoses præcursoriæ Hemipterorum Heteropterorum. (Ibid. p. 33—34.)
169. — Hemiptera Gymnocerata Europæ. Tom. I—V. Helsingforsiæ, 1878—1896.
170. — Analecta hemipterologica. (Berlin. Entomolog. Zeitschrift. XXV. 1881. p. 155—196.)
171. — Monographia Anthocoridarum orbis terrestris. Helsingforsiæ, 1884.
172. — Species Capsidarum regionis palæarcticæ. (Annales de la Société entomologique de Belgique. XXXIX. 1885. p. XLII—XLVIII.)
173. — Notes géographiques sur les Hémiptères paléarctiques. (Revue d'Entomologie. IX. 1890. p. 237—245.)
174. — Species novæ generis Acanthia F., Latr. (Ibid. X. 1891. p. 21—27.)
175. — Species palæarcticæ generis Acanthia Fabr., Latr. (Acta Societatis Scientiarum Fennicæ. XXI. 1895. No. 2.)
176. Sabransky Heinrich, Ein Beitrag zur Kenntniss der Rhynchoten-Fauna von Pressburg. (A pozsonyi természettudományi és orvosi egyesület Közleményei. 1891. p. 16—24.)
177. Sajó Karl, Die bisher unbekannte makroptere Form von Plinthisus convexus Fieb. (= hungaricus Horv.) (Entomologische Nachrichten. VI. 1880. p. 141—142.)

178. — Entomologische Bilder aus den ungarischen Flugsandsteppen. I—II. (Ibid. VI. 1880. p. 198—202 et VIII. 1882. p. 1—10.)
Rovarászati képek a magyar alföld futóhomok-pusztáiról. (Rovarászati Lapok. I. 1883. p. 6—8, 20—24, 37—40 et 56—61.)
179. — Die bisher unbekannte makroptere Form von Blissus Doriæ Ferr. (Entomologische Nachrichten. VI. 1880. p. 235—238.)
180. — Weitere Funde von makropteren Exemplaren des Plinthisus convexus Fieb. und die Larven dieser Art. (Ibid. p. 238—240.)
181. Schuk József dr., Hajdu megye állatvilágának rövid áttekintése. (Dr. Varga Géza, Hajdumegye leirása. 1882. p. 142—160.)
182. Scott John, Description of a new species of the family Psyllidæ. (The Entomologist's s Monthly Magazine. XVI. 1879. p. 84—85.)
183. Simonkai Lajos dr., Aradvármegye és Arad szabad királyi város természetrajzi leirása: III. Aradmegye és Aradváros állatvilága. Arad, 1893.
184. Stål C. Dr., Beitrag zur Kenntniss der Fulgoriden. (Stettin. Entomolog. Zeitung. XXIV. 1863. p. 230—251.)
185. Stein J. P. E. Frdr., Die Gattung Prostemma Laporte. (Berlin Entomolog. Zeitschrift. I. 1857. p. 81—96.)
186. Szaniszló Albert dr., Egy új levéltetű faj, mely buza- és árpagyökéren élődik. (Természetrajzi Füzetek. IV. 1880. p. 192—196.)
Eine der Gerste und dem Weizen schädliche neue Aphidenart. Schizonevra cerealium. (Ibid. p. 233.)
187. Szépligeti Győző, Adatok a budapest-vidéki Növénytetvek faunájának ismeretéhez. (Rovarászati Lapok. I. 1883. p. 1—5 et 17—20.)
188. — Adatok a gubacsok elterjedésének ismeretéhez, különös tekintettel Budapest környékére. (Természetrajzi Füzetek. XIII. 1890. p. 12—25.)
189. — Adatok a magyarországi gubacsok ismeretéhez. (Ibid. XVIII. 1895. p. 214—219.)
190. Tömösváry Ödön dr., Délmagyarország állattani tekintetben. (Dr. Breuer Ármin, Helyrajzi emlékmű a magyar orvosok és természetvizsgálók Buziás-Temesvárott megtartott XXIII. vándorgyűlésére. Temesvár, 1886. p. 124—165.)
191. Török József dr., Debrecen rovarfaunájának ismertetése. V. Félröpűek. (A magyar orvosok és természetvizsgálók Aradon tartott XV. nagygyűlésének munkálatai. Pest, 1872. p. 216—219.)
192. — Debreczen Rovarfaunája. (Dr. Zelizy Dániel, Debreczen szabad királyi város egyetemes leirása. Debreczen, 1882. p. 181—213.)
193. Vida Károly, Az elevenszülő Aphisok petefészkének és petéjének fejlődése. (Orvos-természettud. Értesítő. Kolozsvár. X. 1885. p. 99—140.)
194. Wény János, Rovarászat gyertyafénynél. (Rovartani Lapok. II. 1885. p. 42—44.)

Scripta auctorum anonymorum:

195. Fiume és környékének tájrajza. Orvosi, statistikai stb. tekintetben. Pest, 1869.
196. Jelentés az 1886—1889. években felmerült erdei rovarkárokról. (A m. k. állami rovartani állomás Közleményei. I. 1891. Fasc. 5.)
197. Jelentés az 1884—1889. években felmerült gazdasági rovarkárokról. (Ibid. I. 1892. Fasc. 8.)
198. Jelentés az 1890—1893. években felmerült gazdasági rovarkárokról. (Ibid. I. 1894. Fasc. 11.)
199. Jelentés az 1890—1893. években felmerült erdei rovarkárokról. (Ibid. I. 1895. Fasc. 12.)

Ordo. HEMIPTERA.

Subordo. HETEROPTERA.

Sectio. GEOCORISAE.

Fam. PENTATOMIDAE.

Coptosoma Lap.

1. *scutellatum* Geoffr. (*globus* Fabr.) — Per totum regnum sat frequens.

Thyreocoris Schr.

(*Corimelaena* White.)

2. *scarabaeoides* L. — Per totum regnum sat frequens.

Odontoscelis Lap.

3. *fuliginosa* L. — I. Budapest, Tahi-Tótfalu, Ecseg, Debreczen, Nagyvárad. II. Felcsúth, Turony. III. Pozsony, Szkala. IV. Nagymihály. V. Kolozsvár, Mezőség, Szent-Erzsébet, Brassó. VI. Jazova. VII. Ruma, Fužine. VIII. Fiume, Zengg.
   var. *litura* Fabr. — III. Pozsony. V. Szucsák. VI. Korniaréva.
   var. *dorsalis* Hahn. — I. Torbágy. II. Almádi. VI. Jazova.
   var. *carbonaria* Zett. — III. Trencsén-Teplicz. VII. Fužine.
4. *dorsalis* Fabr. — I. Budapest, Kis-Szent-Miklós, Péczel, Monor, Dabas, Kecskemét, Keczel, Szeged, Hadház. II. Duna-Örs. III. Pozsony. VI. Grebenácz. VII. Plitvica. VIII. Cirkvenica, Zengg.
5. *hispidula* Jak. — I. Budapest.

Phimodera Germ.

6. *galgulina* H.-Sch. — I. Budapest, Csepel, Rákos-Palota, Kis-Szent-Miklós, Monor, Kecskemét, Keczel, Dorozsma, Szeged. IV. Szomotor. VI. Duplaj.
7. *fumosa* Fieb. — I. Budapest.
8. *amblygonia* Fieb. — I. Ecseg.

Odontotarsus Lap.

9. *grammicus* L. — In omnibus regionibus passim haud rarus.

Psacasta Germ.

10. *exanthematica* Scop. — I. Haud rara. II. Székesfehérvár, Badacsony, Pécs, Pozsony, Beszterczebánya. IV. Torna, Körtvélyes (Torna), S.-A.-Ujhely. V. Déva, Szász-Sebes. VI. Jaszenova, Deliblat. VII. Zágráb, Dálya. VIII. Grižane.
11. *tuberculata* Fabr. — I. Budapest.
12. *neglecta* H.-Sch. — I. Budapest, Rákos-Palota, Péczel, Isaszeg, Monor, Kalocsa, Foktű. II. Székesfehérvár. VI. Orsova, Mehádia.

Eurygaster Lap.

13. *maura* L. — Per totum regnum vulgaris.
   var. *picta* Fabr. — Ibidem simul cum stirpe.
   var. *nigra* Fieb. — IV. Homonna-Rokitó.
14. *nigro-cucullata* Goeze (*nigra* Fabr.) — I. Budapest, Péczel, Örkény, Debreczen. II. Zircz, Sopron. III. Zay-Ugrócz. VI. Fehértemplom, Pancsova. VIII. Fiume.
   var. *picta* Antess. — II. Simontornya. VII. Varasd-Teplicz.
   var. *hottentotta* H.-Sch. (nec Fabr.) — Per totum regnum sat frequens.
15. *Schreiberi* Montd. — VIII. Fiume, Orehovica.
16. *dilaticollis* Dohrn. — I. Budapest, Rákos-Palota, Kis-Szent-Miklós, Monor, Örkény, Kun-Szent-Miklós, Kalocsa.

Trigonosoma Lap.

17. *rusticum* Fabr. (*aeruginosum* Cyrill.) — I. Budapest, Kis-Szent-Miklós, Péczel, Farkasd,

Szeged, Horgos. II. Öszöd. VI. Deliblat. VIII. Fiume.

Cryptadius Fairm.

(*Crypsinus* Dohrn.)

18. *angustatus* Baer. — I. Budapest, Rákos-Palota, Kecskemét, Kun-Szent-Miklós, Szeged, Tápé, Puszta-Poó, Ecseg, Nyiregyháza. IV. S.-A.-Ujhely, Forró. VI. Szabadka, Jazova.

Vilpianus Stål.

19. *Galii* Wolff. — I. Passim haud rarus. II. Simontornya, Pécs. IV. Passim obvius. V. Szilágy-Nagyfalu, Kis-Torony. VI. Baziás, Berzászka. VII. Josipdol. VIII. Buccari, Grižane, Zengg.

Sternodontus M. R.

20. *affinis* Westw. (*obtusus* M. R.) — I. Szent-Mártonkáta. — Dr C. Brancsik (14) speciem hanc e regione III. Com. Trencsén enumeravit; sed valde dubito, ut species hæc meridionalis in regione illa septentrionali re vera occurrat.

Ancyrosoma Am. Serv.

21. *albolineatum* Fabr. — VI. Baziás, Berzászka, Orsova, Mehádia. VII. Vrdnik. VIII. Fiume, Sušak, Buccari, Cirkvenica, Novi, Zengg, Jablanac, Carlopago.

Tholagmus Stål.

22. *flavolineatus* Fabr. — VIII. Martinšćica, Cirkvenica, Novi, Zengg, Carlopago.

Graphosoma Lap.

23. *semipunctatum* Fabr. — VIII. Fiume, Buccari, Cirkvenica, Zengg, Carlopago.

24. *lineatum* L. — Per totum regnum frequens.

Derula M. R.

25. *flavoguttata* M. R. — II. Simontornya, Csibrák, Pécs, Üszög. VI. Baziás, Berzászka, Plavisevicza. VIII. Novi.

Podops Lap.

26. *inuncta* Fabr. — In toto regno minus rara.

27. *curvidens* Costa. — I. Budapest, Rákos-Palota, Kalocsa, Keczel. II. Keszthely. III. Balassa-Gyarmat. VII. Károlyváros.

28. *rectidens* Horv. — I. Szeged.

Stibaropus Dall.

29. *Henkei* Jak. — I. Budapest.

Byrsinus Fieb.

30. *fossor* M. R. — I. Budapest, Kecskemét, Horgos.

Cydnus Fabr.

31. *flavicornis* Fabr. — I. Kecskemét, Keczel. VI. Grebenácz.

32. *nigrita* Fabr. — Per totum regnum sat frequens. (*Cydnus femoralis* H.-Sch. false ut species hungarica enumeratus [Frivaldszky, 32] est = *Pangaeus bilineatus* Say, Americæ septentrionalis incola).

Geotomus M. R.

33. *punctulatus* Costa. — I. Kecskemét.

34. *elongatus* H.-Sch. — I. Kalocsa, Keczel, Dorozsma. VII. Zágráb.

Brachypelta Am. Serv.

35. *aterrima* Forst. — Per totum regnum haud rara.

Sehirus Am. Serv.

36. *luctuosus* M. R. — In regionibus I—V. et VII. passim inventus.

37. *morio* L. (*affinis* H.-Sch.) — I. Rákos-Palota, Kalocsa, Hódmező-Vásárhely. II. Fadd. III. Pozsony. IV. Szomotor. VI. Ulma, Kubin.

38. *parens* M. R. — I. Budapest.

39. *ovatus* H.-Sch. — I. Budapest, Rákos-Palota, Szeged, Eger. III. Pozsony.

40. *sexmaculatus* Ramb. — In toto regno haud rarus.

41. *bicolor* L. — In omnibus regionibus frequens.

42. *dubius* Scop. — I. Budapest. V. Szent-Gothárd, Mező-Záh, Szent-Erzsébet. VII. Vrdnik, Breze. VIII. Buccari, Cirkvenica.

var. *melanopterus* H.-Sch. — In omnibus regionibus sat frequens.

43. *impressus* Horv. — VII. Fužine: Višnjevica.

44. *biguttatus* L. — Per totum regnun passim occurrit.

var. *concolor* Nickerl. — I. Debreczen. V. Borszék. VIII. Fiume.

Gnathoconus Fieb.

45. *albomarginatus* Goeze. — In toto regno haud rarus.

46. *picipes* Fall. — I. Budapest, Szeged, Dorozsma, Horgos. III. Lucski, Késmárk. V. Brassó. VI. Dunaszoros. VII. Josipdol, Garešnica.

var. *fumigatus* Costa. — VII. Vaganski Vrh.

Ochetostethus Fieb.

47. *nanus* H.-Sch. — I. Passim frequens. II. Szent-Lőrincz (Baranya). IV. Páczin. VI. Orsova, Deliblat. VII. Ruma. VIII. Fiume.

Menaccarus Am. Serv.

48. *arenicola* Scholtz. — I. Passim sat frequens. IV. Szomotor. VI. Deliblat, Grebenácz, Duplaj.

Sciocoris Fall.

49. *deltocephalus* Fieb. — I. Budapest, Rákos-Palota, Kis-Szent-Miklós, Felső-Pakony, Dános, Örkény, Kecskemét, Keczel, Szeged. VI. Deliblat, Grebenácz, Duplaj. — Etiam in Rossia meridionali occurrit.
50. *macrocephalus* Fieb. — I. Budapest, Monor, Kecskemét, Kalocsa, Keczel. VI. Palics, Deliblat.
51. *distinctus* Fieb. — I. Budapest, Rákos-Palota, Kis-Szent-Miklós, Örkény, Kecskemét, Kalocsa, Foktű, Szeged. II. Nezsider. IV. Forró, Komjáti, S.-A.-Ujhely, Szomotor, Szőllőske, Csicsva. VII. Gjurgjevac.
52. *microphthalmus* Flor. — Per totum regnum passim obvius.
53. *umbrinus* Wolff. — IV. Vihorlat.
54. *homalonotus* Fieb. — I. Budapest, Dorozsma. II. Keszthely, Tapolcza. V. Déva. VI. Kazán. VIII. Fiume, Buccari, Novi, Zengg.
55. *sulcatus* Fieb. — I. Passim haud rarus. VI. Mehádia, Orsova, Plavisevicza, Berzászka, Duplaj, Grebenácz. VII. Ruma. VIII. Fiume, Orehovica.
56. *cursitans* Fabr. (*terreus* Schrk.) — Per totum regnum frequens.

Dyroderes Spin.

57. *umbraculatus* Fabr. (*marginatus* Fabr.) — I. Budapest, Torbágy, Péczel, Gödöllő, Farkasd, Kalocsa, Nagyvárad. II. Duna-Örs. V. Szilágy-Nagyfalu. VI. Csákova, Ó-Moldova. VII. Eszék, Ruma.

Aelia Fabr.

58. *acuminata* L. — Per totum regnum vulgaris.
59. *Klugii* Hahn. — VII. Raduć. (False etiam e regione V. enumerata [Fuss, 41]; specimen in collectione Fussiana sub hoc nomine asservatum ad speciem præcedentem pertinet.)
60. *rostrata* Boh. — In toto regno haud rara.

Neottiglossa Curt.

61. *flavomarginata* Luc. — VI. Orsova.
62. *pusilla* Gmel. (*inflexa* Wolff.) — In regionibus I—VI. passim occurrit.
var. *lineolata* M. R. — VI. Orsova.
63. *bifida* Costa. — VIII. Fiume, Novi, Zengg.
64. *leporina* H.-Sch. — Per totum regnum sat frequens.

Stagonomus Gorski.

65. *pusillus* H.-Sch. — In omnibus regionibus passim obvia, sed minus frequens.
66. *italicus* Gmel. (*bipunctatus* Fabr.) — I. Budapest, Péczel, Hadház, Nyiregyháza. V. Sat frequens. VI. Resicza, Berzászka. VII. Lipik, Zágráb, Károlyváros, Josipdol, Otočac. VIII. Fiume, Sušak, Buccari, Novi, Zengg.

Eusarcoris Hahn.

67. *aeneus* Scop. — Per totum regnum sat frequens.
var. *spinicollis* Put. — I. Szeged. VI. Fehértemplom.
var. *ventralis* Horv. — IV. Tavarna. V. Méhes.
68. *melanocephalus* Fabr. — In omnibus regionibus passim occurrit.
69. *inconspicuus* H.-Sch. — Per totum regnum haud rarus.

Rubiconia Dohrn.

70. *intermedia* Wolff. — In toto regno passim obvia.

Staria Dohrn.

71. *lunata* Hahn. — In omnibus regionibus sat frequens.

Peribalus M. R.

72. *vernalis* Wolff. — Per totum regnum haud rarus.
73. *strictus* Fabr. (*distinctus* Fieb.) — VII. Čavle. VIII. Fiume, Sušak, Orehovica, Draga, Podvežica, Martinšćica, Novi, Zengg.
74. *sphacelatus* Fabr. — In toto regno sat frequens. (*albipes* Fabr. = *congener* Fieb. dubiose e V. Nagy-Csűr? enumeratus [Fuss. 41] in Hungaria vix occurrit; specimen e IV. Lenke sub hoc nomine enumeratum [Horváth, 51] est = *P. sphacelatus* Fabr.)

Carpocoris Kol.

75. *fuscispinus* Boh. — In omnibus regionibus occurrit.
76. *purpureipennis* De Geer (*nigricornis* Fabr.) — Per totum regnum vulgaris.
77. *melanocerus* M. R. — VII. Fužine: Višnjevica.
78. *lunulatus* Goeze (*lynx* Fabr.) — In toto regno passim occurrit, præsertim var. *pusio* Kol.
79. *varius* Fabr. — VIII. Novi.
var. *lunula* Fabr. — VIII. Fiume, Cirkvenica, Grižane, Novi, Zengg.

Dolycoris M. R.

80. *baccarum* L. — Per totum regnum vulgaris.
81. *varicornis* Jak. — I. Dorozsma. II. Nezsider.

Palomena M. R.

82. *viridissima* Poda. — II. Keszthely. III. Király-Lehota, Felka, Késmárk. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely. V. Passim obvia. VIII. Fiume.

var. *simulans* Put. — III. Király-Lehota. IV. Komarócz. V. Szilágyfő-Keresztur, Brassó.

83. *prasina* L. — Per totum regnum frequens.

var. *subrubescens* Gorski. — I. Kecskemét, Eger, Debreczen. II. Simontornya. IV. Kassa, Szádellő, Bodókő, S.-A.-Ujhely, Szőllőske. V. Tasnád, Görcsön. VI. Ulma. VII. Pregrada. VIII. Fiume, Buccari.

Chlorochroa Stål.

(*Pitedia* Reut.)

84. *juniperina* L. — In regionibus I—VII. passim frequens.

85. *pinicola* M. R. — III. Trencsén, Késmárk. V. Görgény. VII. Pregrada.

Nezara Am. Serv.

86. *Heegeri* Fieb. — VIII. Fiume, Sv.-Jelena.

87. *Millieri* M. R. — VIII. Pećine.

88. *viridula* L. — VIII. Fiume, Martinšćica, Buccari, Cirkvenica, Grižane, Novi.

var. *torquata* Fabr. — VIII. Fiume, Buccari, Cirkvenica, Novi, Sv.-Juraj.

var. *aurantiaca* Costa. — VIII. Fiume.

Piezodorus Fieb.

89. *lituratus* Fabr. (*incarnatus* Germ.) — In toto regno haud rarus.

var. *alliaceus* Gorski. — Per totum regnum frequens.

var. *roseus* Gorski. — I. Budapest, Pomáz. VIII. Fiume, Buccari.

Rhaphigaster Lap.

90. *nebulosa* Poda (*grisea* Fabr.). — Per totum regnum frequens.

Pentatoma Ol.

(*Tropicoris* Hahn.)

91. *rufipes* L. — In omnibus regionibus sat frequens.

Eurydema Lap.

92. *ornatum* L. — Per totum regnum vulgare, cum varietatibus: *Hoffmannseggi* Gorski, *ventrale* Kol., *pectorale* Fieb. et *dissimile* Fieb.

var. *Fallénii* Gorski. — VI. Baziás.

93. *festivum* L. — In toto regno sat vulgare, cum varietatibus: *pictum* H.-Sch. et *decoratum* H.-Sch.

var. *mehadiense* Horv. — I. Farkasd, Kecskemét. VI. Mehádia. VIII. Draga.

var. *Christophi* Jak. — IV. S.-A.-Ujhely.

94. *Fieberi* Schumm. (*dominulus* H.-Sch.) — I. Budapest, Visegrád. II. Bodajk. III. Trencsén, Koritnyicza, Király-Lehota, Felka. IV. Torna, S.-A.-Ujhely, Tarczal, Tokaj.

var. *herbaceum* H.-Sch. — III. Király-Lehota. IV. S.-A.-Ujhely, Tarczal.

95. *dominulus* Scop. (*festivum* Fieb.) — I. Nagyvárad. III—V. Passim obvium. VII. Zágráb, Podsused, Károlyváros.

96. *oleraceum* L. — Per totum regnum vulgare, cum varietatibus: *consimile* Horv., *triguttatum* Horv. et *annulatum* Fall.

var. *paradoxum* Horv. — I. Békás-Megyer.

var. *atavus* Horv. — I. Farkasd, Békés-Gyula. III. Lucski.

var. *insidiosum* M. R. — IV. S.-A.-Ujhely.

var. *nigripes* Horv. — IV. Bártfa.

Bagrada Stål.

97. *stolida* H.-Sch. — I. Budapest.

Trochiscocoris Reut.

(*Trochiscus* Jak.)

98. *rotundatus* Horv. — V. Brassó. VI. Orsova, Plavisevicza. — Etiam Caucasum inhabitat.

(*hemipterus* Jak. in Hungaria haud occurrit; specimina sub hoc nomine e VI. Plavisevicza enumerata [Tömösváry, 190] ad speciem præcedentem pertinent.)

Pinthaeus Stål.

99. *sanguinipes* Fabr. — I. Budapest, Szeged. III. Pozsony, Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Kis-Azar, Homonna, Nagybánya. V. Lotrióra, Kerczisóra. VII. Zágráb, Eszék. VIII. Zengg.

Picromerus Am. Serv.

100. *bidens* L. — In regionibus I—VII. passim occurrit.

101. *conformis* H.-Sch. — I. Budapest, Kis-Szent-Miklós, Arad. II. Pécs.

Arma Hahn.

102. *custos* Fabr. — In regionibus I—VII. haud rara.

Troilus Stål.

(*Podisus* M. R., nec H.-Sch.)

103. *luridus* Fabr. — I. Budakesz, Pilis-Csaba, Szeged, Eger. II. Zircz. III. Selmeczbánya, Koritnyicza, Kis-Kriván, Késmárk. IV—V. Passim obvius. VII. Károlyváros, Josipdol.

Rhacognathus Fieb.

104. *punctatus* L. — I. Passim minus frequens. IV. Körtvélyes (Torna), Mád. V. Kolozsvár, Görgény, Oláh-Toplicza, Nagyszeben, Nagy-Csűr, Váralja-Hátszeg. VI. Mehádia. VII. Eszék.

Jalla Hahn.

105. *dumosa* L. — I—III. Passim sat rara. IV. Áj, S.-A.-Ujhely. V. Kolozsvár, Ratosnya, Borszék, Brassó, Kerczisóra. VII. Eszék, Ruma.
var. *nigriventris* Fieb. — I. Budapest.

Zicrona Am. Serv.

106. *coerulea* L. — Per totum regnum frequens.

Acanthosoma Curt.

107. *haemorrhoidale* L. — In omnibus regionibus passim occurrit.

Elasmostethus Fieb.

108. *dentatus* De Geer. — II. Sárvár. III. Trencsén, Felka, Késmárk. IV. Szádellő, Komjáti, Simonka. V. Zilah, Korojesd. VII. Josipdol, Magna-Capella. VIII. Fiume.

Elasmucha Stål.

109. *ferrugata* Fabr. — I. Budapest, Eger. III. Mons Manin (Trencsén), Késmárk. IV. Bártfa, Szádellő. VII. Josipdol. VIII. Fiume.
110. *interstincta* L. — I. Budapest, Kalocsa. II—V. Passim frequens. VII. Gjurgjevac, Károlyváros, Josipdol. VIII. Fiume.
111. *grisea* L. — I. Kalocsa. III. Késmárk. VII. Josipdol.

Cyphostethus Fieb.

112. *tristriatus* Fabr. — Per totum regnum passim frequens.

Fam. COREIDAE.

Phyllomorpha Lap.

1. *laciniata* Vill. — VI. Orsova.

Centrocoris Kol.

2. *spiniger* Fabr. — VI. Orsova, Plavisevicza. VIII. Sušak, Cirkvenica, Grižane, Novi.
3. *variegatus* Kol. — I. Budapest, Gödöllő, Solt, Szeged, Mező-Kovácsháza, Dévaványa. II. Badacsony, Komárom-Tarján. VI. Orsova. VII. Eszék, Ruma. VIII. Fiume, Sušak, Buccari, Cirkvenica, Zengg.

Spathocera Stein.

4. *laticornis* Schill. — I. Budapest, Péczel, Farkasd, Miskolcz. IV. Kassa, Torna, S.-A.-Újhely. V. Tasnád, Tövis, Hátszeg. VI. Mehádia, Orsova. VII. Ruma, Gjurgjevac, Zágráb.
5. *tuberculata* Horv. — I. Gödöllő. — Occurrit præterea etiam in Hercegovina.
6. *lobata* H.-Sch. — I. Budapest, Kis-Szent-Miklós, Gödöllő, Monor, Kecskemét. III. Pozsony. VI. Jazova, Mehádia, Plavisevicza.
7. *obscura* Germ. — I. Budapest, Rákos-Palota, Kis-Szent-Miklós, Csepel, Örkény, Kecskemét. VI. Duplaj.
(*Dalmanni* Schill. in Hungaria hucusque haud inventa; specimen sub hoc nomine e VI. Mehádia enumeratum [Frivaldszky, 34] re vera ad *S. lobatam* H.-Sch. pertinet.)

Enoplops Am. Serv.

8. *scapha* Fabr. — I—V. Passim obvia. VII. Zágráb.

Syromastes Latr.

9. *marginatus* L. — Per totum regnum vulgaris.
var. *fundator* H.-Sch. — VIII. Cirkvenica.
var. *inermis* Kol. — II. Pécs.

Verlusia Spin.

10. *rhombea* L. — Per totum regnum frequens.

Gonocerus Latr.

11. *Juniperi* H.-Sch. — In omnibus regionibus passim sat frequens.
12. *acutangulatus* Goeze (*venator* Fabr.) — In toto regno passim frequens.

Pseudophloeus Burm.

13. *Fallénii* Schill. — I. Haud rarus. II. Simontornya. III. Pozsony. VI. Duplaj, Kazán. VII. Gjurgjevac. VIII. Fiume.

Bathysolen Fieb.

14. *nubilus* Fall. — Per totum regnum sat frequens.

Arenocoris Hahn.

15. *spinipes* Fall. — II. Zala-Szent-Gróth. III. Losoncz, Selmeczbánya, Trencsén, Lucski, Késmárk, Igló. IV. Bártfa, Komjáti, Salánk. V. Kolozsvár, Nagy-Ajta, Borszék. VII. Pregrada. VIII. Fiume.

Nemocoris Sahlb.

16. *Fallénii* Sahlb. — I. Kalocsa.

Ceraleptus Costa.

17. *lividus* Stein. — I. Budapest, Kis-Szent-Miklós, Monor, Bánhegyes, Nagyvárad, Debreczen. IV. S.-A.-Ujhely. V. Szilágy-Nagyfalu, Peér, Szent-Gothárd, Mező-Záh, Kis-Torony, Sellemberk. VI. Fehértemplom, Coronini. VII. Gjurgjevac.
18. *obtusus* Brull. (*squalidus* Costa). — I. Budapest, Monor, Kecskemét, Kalocsa. II. Pécs. VI. Oravicza, Orsova. VIII. Cirkvenica, Carlopago.
19. *gracilicornis* H.-Sch. — In toto regno passim occurrit.

Loxocnemis Fieb.

20. *dentator* Fabr. — VIII. Fiume, Cirkvenica.

Bothrostethus Fieb.

21. *annulipes* Costa var. *sabulicola* Horv. — I. Budapest, Kis-Szent-Miklós, Kecskemét. III. Sztranszke. V. Szent-Erzsébet. VI. Deliblat, Grebenácz. VII. Gjurgjevac.

Coreus Fabr.

22. *scabricornis* Panz. — In regionibus I—VII. passim occurrit.
23. *hirticornis* Fabr. —VI. Plavisevicza, Rumunyest. VII. Breze. VIII. Fiume, Sušak, Podvežica, Buccari, Cirkvenica, Novi, Zengg, Carlopago.
24. *denticulatus* Scop. — Per totum regnum frequens.
25. *Spinolae* Costa. — VI. Orsova, Plavisevicza. VIII. Fiume, Sušak, Orehovica, Cirkvenica, Novi, Zengg.

Micrelytra Lap.

26. *fossularum* Rossi. — VII. Josipdol, Fužine.

Camptopus Am. Serv.

27. *lateralis* Germ. — In toto regno passim haud rarus.

Megalotomus Fieb.

28. *junceus* Scop. (*limbatus* Klug.) — IV. Túr-Terebes, Batarcs, Com. Mármaros. VII. Vrdnik, Zágráb, Károlyváros.

Alydus Fabr.

29. *calcaratus* L. — Per totum regnum sat frequens.

Stenocephalus Latr.

30. *medius* M. R. — I—V. Passim sat rarus. VII. Zágráb.
31. *agilis* Scop. — Per totum regnum frequens.
32. *albipes* Fabr. (*neglectus* H.-Sch.) — In toto regno haud rarus.

Therapha Am. Serv.

33. *Hyoscyami* L. — Per totum regnum frequens.

Corizus Fall.

34. *abutilon* Rossi. — In omnibus regionibus valde frequens, cum varietatibus: *flavicans* Fieb. et *pictus* Fieb.
35. *crassicornis* L. — Per totum regnum vulgaris. var. *subtomentosus* Rey. — I. Budapest, Hajdu-Nánás. IV. Kis-Gércze.
36. *hyalinus* Fabr. — I. Budapest, Jász-Kerekegyház, Kecskemét, Kalocsa. II. Simontornya. IV. Varannó. V. Tövis. VI. Coronini. VII. Pétervárad, Ó-Pazua, Kraj, Pregrada, Stalak, Breze. VIII. Haud rarus.
37. *maculatus* Fieb. — I. Szeged, Algyő. IV. S.-A.-Ujhely, Varannó, Homonna-Rokitó. V. Zilah, Oravicza, Rumunyest. VII. Ruma, Kupinovo, Zágráb, Károlyváros.
38. *subrufus* Gmel. (*capitatus* Fabr.) — Per totum regnum sat frequens.
39. *conspersus* Fieb. — In omnibus regionibus passim occurrit.
40. *distinctus* Sign. — I. Budapest, Farkasd, Peszér, Kecskemét, Szeged, Ér-Mihályfalva. IV. S.-A.-Ujhely. V. Rozsnyó, Zajzon. VI. Jaszenova. VII. Zágráb, Podsused.
41. *parumpunctatus* Schill. — Per totum regnum vulgaris.
42. *rufus* Schill. — IV. Czéke. VII. Zágráb.
43. *tigrinus* Schill. — In regionibus I—II. et IV—VII. passim sat frequens.

Maccevethus Dall.

44. *lineola* Fabr. (*errans* Fabr.) — I. Budapest, Budafok, Kis-Szent-Miklós, Vácz. II. Duna-Földvár, Pécs. IV. S.-A.-Ujhely, Sáros-Patak, Tarczal VI. Gombos. VII. Čerević, Vrdnik. VIII. Haud rarus.

Agraphopus Stål.

45. *Lethierryi* Stål. — VIII. Carlopago.

Myrmus Hahn.

46. *miriformis* Fall. — In regionibus I—VII. sat frequens.

Chorosoma Curt.

47. *Schillingi* Schumm. — I. Frequens. II. Székesfehérvár, Tata, Szulok. IV. Tarczal, Szomotor. VI. Palics, Jazova, Deliblat, Grebenácz, Duplaj. VIII. Novi, Zengg.

Fam. BERYTIDAE.

Neides Latr.

1. *tipularius* L. — Per totum regnum frequens. var. *immaculatus* Westh. — I. Budapest, Gödöllő, Hadház, Nagyvárad. II. Nagy-Kapornak. V. Zilah. VI. Grebenácz, Berzászka. VII. Vrdnik, Pregrada.
(*favosus* Fieb. apud nos haud occurrit; specimina sub hoc nomine ex Hungaria enumerata [Mocsáry, 156, 158, Horváth, 94] ad varietatem præcedentem pertinent.)

Berytus Fabr.

2. *hirticornis* Brull. — I. Gödöllő, Kalocsa. III. Vallis Vratna. IV. Torna, Varannó. VI. Orsova. VII. Verőcze, Ruma, Ivanec.
3. *clavipes* Fabr. — I. et III—VI. Haud rarus. VII. Károlyváros, Stalak. VIII. Fiume. Specimen unicum macropterum ad III. Lucski.
4. *minor* H.-Sch. — In regionibus I—V. et VII. sat frequens. VIII. Fiume.
5. *consimilis* Horv. — I. Szeged. II. Szent-Lőrincz (Baranya). V. Tasnád. VI. Deliblat, Ó-Moldova. VII. Lipik, Ruma, Károlyváros, Varasd.
6. *montivagus* Mey. — In regionibus I—VI. passim frequens.
var. *rotundatus* Flor. — IV. Torna, Szécs-Keresztúr.
7. *Signoreti* Fieb. — I. Budapest. III. Késmárk, Kubra. IV. S.-A.-Ujhely, Varannó.
8. *striola* Ferr. (*procerus* Horv.) — I. Budapest, Rákos-Palota. VII. Vrdnik. VIII. Zengg.
9. *crassipes* H.-Sch. — I. Budapest, Rákos-Palota. II. Balf. III. Késmárk. V. Görgény.
10. *geniculatus* Horv. — I. Frequens. II. Duna-Örs. III. Pozsony. VI. Deliblat, Grebenácz, Duplaj. VIII. Zengg.
11. *distinguendus* Ferr. — VI. Deliblat, Grebenácz, Duplaj. VIII. Cirkvenica.

Cardopostethus Fieb.

12. *annulosus* Fieb. — I. Budapest. II. Kám. IV. Parnó. V. Tasnád.

Metatropis Fieb.

13. *rufescens* H.-Sch. — I. Isaszeg, Monyásza. IV. Erdőbénye. V. Görgény, Kerczisóra. VI. Mehádia. VII. Daruvár, Zágráb, Károlyváros.

Metacanthus Costa.

14. *elegans* Curt. — Per totum regnum obvius, sed minus frequens.

Fam. LYGAEIDAE.

Tropidothorax Bergr.
(*Melanospilus* Stål.)

1. *leucopterus* Goeze (*venustus* H.-Sch.). — I. Montes Biharienses. II. Keszthely. III. Szepes-Olaszi. IV. Szádellő. V. Kolozsvár, Ohába, Nagyszeben, Brassó, Rozsnyó. VI. Ulma.

Lygaeus Fabr.

2. *equestris* Fabr. — Per totum regnum frequens.
3. *saxatilis* Scop. — In omnibus regionibus frequens.
4. *pandurus* Scop. — VIII. Sušak, Buccari, Zengg.
5. *albomaculatus* Goeze (*apuans* Rossi.). — Per totum regnum sat frequens.
6. *Tristrami* D. S. — VI. Orsova.
7. *superbus* Poll. (*punctatoguttatus* Fabr.) — In regionibus I, III—VI. et VIII. haud rarus.

Lygaeosoma Spin.

8. *reticulatum* H.-Sch. — In regionibus I—IV. et VI—VIII. sat frequens.

Arocatus Spin.

9. *melanocephalus* Fabr. — I. Budapest, Szeged. II. Pécs. VII. Ruma.
10. *Roeselii* Schumm. — I. Budapest. VII. Zágráb, Varasd.
(*Caenocoris Nerii* Germ. irrite ex Hungaria enumeratus [Herrich-Schäffer, 50, IX. Index p. 117] apud nos haud occurrit.)

Orsillus Dall.

11. *depressus* M. R. — I. Budapest, Örkény, Peszér, Kalocsa. II. Pécs. VI. Grebenácz. VIII. Vežica.

Nysius Dall.

12. *Jacobeae* Schill. — III—V. Passim frequens. VII. Mons Plešivica.
13. *Thymi* Wolff. — In regionibus I—VI. frequens.
14. *Ericae* Schill. — I. Budapest, Szeged, Ecseg, Nagyvárad. III. Szliács. VI. Duplaj. VIII. Cirkvenica.
15. *cymoides* Spin. — VIII. Buccari, Novi.
16. *graminicola* Kol. — VIII. Buccari, Martinšćica, Cirkvenica, Novi.
17. *Senecionis* Schill. — Per totum regnum vulgaris.
18. *lineatus* Costa (*helveticus* H.-Sch.) — I. Haud rarus. II. Pilis-Marót, Lajta-Bruck, Dörgicse, Simontornya. III. Szent-György (Pozsony), Kés-

márk. IV. Komjáti, Görgő, Varannó, Szomotor. VI. Orsova, Albrechtsdorf. VII. Vrdnik.

var. *brunneus* Fieb. — IV. S.-A.-Ujhely.

19. *punctipennis* H.-Sch. — In regionibus I—V. et VII. passim minus rarus.

Cymus Hahn.

20. *claviculus* Fall. — Per totum regnum frequens.

21. *melanocephalus* Fieb. — In toto regno sat frequens.

22. *glandicolor* Hahn. — In regionibus I—V. et VII. passim occurrit.

23. *obliquus* Horv. — IV. Bártfa, Csicsva, Kőrösmező. II. Zircz. V. Szakácsi, Görgény, Tihucza, Medgyes, Brassó, Tömös. VII. Lipik, Károlyváros, Josipdol.

Ischnorhynchus Fieb.

24. *Resedae* Pz. — Per totum regnum passim frequens.

var. *flavicornis* Duda. — I. Szeged, Nagyvárad. II. Darány, Szulok. IV. Forró, Széphalom. V. Puj, Brassó.

(*geminatus* Fieb. apud nos nondum repertus; insectum sub hoc nomine e III. monte Szitnya enumeratum [Petrogalli, 162] verisimiliter ad varietatem præcedentem pertinet.)

Ischnodemus Fieb.

25. *sabuleti* Fall. — In toto regno haud rarus.

Dimorphopterus Stål.

26. *Spinolae* Sign. var. *geniculatus* Horv. — I. Budapest, Monor, Örkény, Peszér, Keczel, Sajó-Kaza, Szendrő. II. Simontornya, Siófok, Nezsider. IV. Mád, S.-A.-Ujhely, Varannó. V. Tasnád, Peér. VI. Temesvár, Mehádia.

Blissus Burm.

27. *Doriae* Ferr. — I. Sat frequens. II. Duna-Örs. VI. Jazova.

Henestaris Spin.

28. *halophilus* Burm. (*geocoriceps* Antess.) — In regionibus I—II. et IV—VI. passim frequens.

29. *laticeps* Curt. — VIII. Buccari, Novi.

Geocoris Fall.

30. *erythrocephalus* Lep. — In regionibus omnibus, præsertim in meridionalibus haud rarus.

31. *grylloides* L. — I. Passim haud frequens. II. Nezsider. III. Kis-Kriván. IV. Sáros-Patak, Szomotor. VI. Duplaj. Specimen unicum macropterum ad I. Kecskemét.

32. *dispar* Waga. — I. Péczel, Peszér. II. Simontornya, Lajta-Bruck. III. Késmárk. IV. Torna. VI. Banatus (Fieber, 19). VII. Josipdol.

33. *siculus* Fieb. — II. Nezsider. VIII. Novi, Zengg.

var. *mediterraneus* Put. — VIII. Martinšćica, Novi.

var. *arenarius* Jak. — I. Budapest, Kecskemét, Szeged, Horgos. VI. Palics.

34. *albipennis* Fabr. — In regionibus I—IV. et VI—VII. passim occurrit.

Holcocranum Fieb.

35. *Saturejae* Kol. — I. Szolnok, Foktű. VII. Eszék.

Chilacis Fieb.

36. *Typhae* Perr. — I. Szeged. IV. Szatmár-Németi. V. Mezőség. VI. Titel.

Heterogaster Schill.

37. *rufescens* H.-Sch. — I. Kalocsa, Szeged, Debreczen. II. Simontornya. IV. Varannó, Barkó. VI. Oravicza, Szvinicza. VII. Ruma, Károlyváros, Josipdol. VIII. Fiume, Cirkvenica.

var. *bicolor* Kol. — IV. Tolcsva, Varannó. V. Kolozsvár, Szucsák, Medgyes. VIII. Novi.

var. *cinnamomea* Horv. — I. Mező-Keresztes (Bihar).

38. *affinis* H.-Sch. — I. Budapest, Péczel, Farkasd, Kalocsa. II. Simontornya, Almádi. III. Trencsén. IV. Torna, Áj, Tolcsva, S.-A.-Ujhely. V. Szükerék, Szent-Gothárd, Medgyes. VI. Grebenácz, Baziás. VII. Pétervárad, Vrdnik, Ruma.

var. *rubricata* Put. — I. Budapest, Szendrő. V. Csopea. VII. Pétervárad.

39. *Artemisiae* Schill. — Per totum regnum haud rara.

40. *Urticae* Schill. — In omnibus regionibus frequens.

Platyplax Fieb.

41. *Salviae* Schill. — In toto regno passim occurrit.

Camptotelus Fieb.

42. *lineolatus* Schill. — I. Passim haud rarus. III. Pozsony. IV. Forró, Torna. VI. Deliblat, Grebenácz. VII. Ruma, Gjurgjevac.

43. *costalis* H.-Sch. — I. Budapest, Rákos-Palota, Isaszeg, Csepel. III. Pozsony.

Microplax Fieb.

44. *interrupta* Fieb. — I. Passim obvia. II. Simontornya. IV. Kassa, Torna, Körtvélyes (Torna), Szomotor. V. Görgény. VI. Deliblat. VII. Ruma, Vrdnik, Gjurgjevac, Károlyváros.

45. *albofasciata* Costa. — VIII. Novi.

Brachyplax Fieb.

46. *palliata* Costa. — I. Budapest, Szeged. VII. Ruma. VIII. Novi.
var. *linearis* Scott. — I. Budapest.

Metopoplax Fieb.

47. *Origani* Kol. — In regionibus I—VII. sat frequens.
var. *fuscinervis* Stål. (*cingulata* Horv.) — I. Budapest, Kecskemét. III. Pozsony. VI. Orsova.
(*ditomoides* Costa apud nos haud occurrit; specimina sub hoc nomine ex Hungaria descripta [Herrich-Schäffer, 50, Horváth, 58] ad speciem præcedentem pertinent.)

Oxycarenus Fieb.

48. *Lavaterae* Fabr. — VII. Fužine. VIII. Fiume.
49. *collaris* M. R. — In regionibus I—II. et IV—VII. haud rarus.
50. *modestus* Fall. — I. Csepel, Kalocsa. III. Késmárk. IV. Körtvélyes (Torna). V. Nagyszeben, Holczmány.

Macroplax Fieb.

51. *Preyssleri* Fieb. — I. Budapest. II. Nezsider, Tapolcza, Pécs. III. Zsolna, Késmárk. IV. Passim sat rara. V. Szent-Gothárd, Tusnád, Gyergyó-Szent-Miklós, Brassó. VI. Duplaj. VII. Passim obvia. VIII. Fiume.
52. *fasciata* H.-Sch. — I. Budapest. VIII. Fium e Martinšćica.

Paromius Fieb.

53. *leptopoides* Baer. — VIII. Grižane.
54. *gracilis* Ramb. — VIII. Grižane.

Pamera Say.
(*Plociomerus* Am. Serv.)

55. *fracticollis* Schill. — In regionibus I—II. et IV—VIII. passim occurrit.
56 *lurida* Hahn. — III. Trencsén, Koritnyicza, Késmárk. IV. Körtvélyes (Torna). V. Görgény. VIII. Fiume.

Ligyrocoris Stål.

57. *contractus* Say (*sylvestris* Fall. nec L.) — III. Tátra, Késmárk, Szepes-Béla.

Rhyparochromus Curt.

58. *antennatus* Schill. — I. Budapest. II. Nezsider. III. Trencsén, Lucski, Késmárk. IV. Passim obvius. V. Sztána, Szent-Erzsébet, Lotrióra. VII. Varasd, Garešnica, Károlyváros, Breze, Gospić.
59. *hirsutus* Fieb. — I. Budapest, Farkasd. II. Nezsider. III. Trencsén. IV. Kőrösmező. V. Sző-Demeter, Szucsák, Lotrióra. VI. Grebenácz. VIII. Fiume.
60. *praetextatus* H.-Sch. — In omnibus regionibus passim occurrit.
61. *dilatatus* H.-Sch. — I. Budapest. III. Pozsony, Késmárk. V. Zilah, Nagy-Csűr, Szent-Erzsébet, Czód, Brassó. VII. Zágráb, Pregrada, Križ, Gjurgjevac, Breze, Gospić.
62. *chiragra* Fabr. — Per totum regnum vulgaris.
var. *nigricornis* D. S. — I. Monor, Keczel. IV. Kassa. V. Görgény.

Icus Fieb.

63. *angularis* Fieb. var. *hungaricus* Horv. — I. Budapest.

Tropistethus Fieb.

64. *holosericeus* Scholtz. — In toto regno sat frequens.
65. *gentilis* Horv. — VII. Ruma.

Pterotmetus Am. Serv.

66. *staphylinoides* Burm. — In regionibus I—VII. passim haud rarus.

Ischnocoris Fieb.

67. *hemipterus* Schill. — I. Passim haud rarus. II. Keszthely. III. Trencsén. IV. Passim obvius. V. Somlyó-Ujlak, Görcsön. VI. Mehádia, Jeselnicza, Krassova. VII. Károlyváros.
68. *punctulatus* Fieb. — I. Budapest, Rákos-Palota. II. Balatonfüred. IV. S.-A.-Ujhely. V. Déva. VIII. Zengg, Jablanac, Carlopago.

Macrodema Curt.

69. *micropterum* Curt. — III. Késmárk. VIII. Fiume (specimen macropterum).

Pionosomus Fieb.

70. *opacellus* Horv. — I. Budapest, Szent-Endre, Isaszeg, Monor, Dános, Örkény, Peszér, Kecskemét, Szeged, Horgos, Hadház, Ér-Mihályfalva. VI. Rém.
(*varius* Wolff apud nos haud occurrit; specimina hungarica sub nomine *Macrodema varium* descripta [Horváth, 58] ad speciem præcedentem pertinent.)

Lamprodema Fieb.

71. *maurum* Fabr. — I. Passim haud rarum. II. Soóly. III. Pozsony, Igló. IV. Tokaj, Szomotor.

V. Szilágy-Nagyfalu, Nagyszeben. VI. Jazova. VII. Eszék, Ó-Pazua.

Plinthisus Fieb.

72. *pusillus* Scholtz. — I. Budapest, Rákos-Palota, Monor. II. Veszprém, Nezsider. III. Kubra, Késmárk. IV. Forró, Komjáti, S.-A.-Ujhely, Szomotor. VI. Duplaj. VII. Károlyváros, Gospić. Specimen unicum macropterum ad IV. Körtvélyes (Torna).

73. *hungaricus* Horv. — In regionibus I., II., IV., VI. et VIII. passim sat frequens.

74. *mehadiensis* Horv. — VI. Mehádia, Orsova.

75. *brevipennis* Latr. — I. Budapest, Gödöllő, Farkasd, Kalocsa. II. Simontornya. III. Trencsén. IV. Passim sat rarus. VI. Mehádia, Ferenczfalva. VII. Verőcze, Zágráb, Károlyváros, Gospić. VIII. Tersatto, Orehovica, Martinšćica.

Lasiosomus Fieb.

76. *enervis* H.-Sch. — III. Szoblahó. VI. Mehádia, Plavisevicza.

Acompus Fieb.

77. *rufipes* Wolff. — I. Passim obvius. II. Nezsider. III. Kis-Kriván, Chocs, Com. Szepes, Putnok. IV. Szádellő, Szinnaikő, Ungvár, Szatmár-Németi. V. Brassó. VI. Plavisevicza. VII. Ruma, Károlyváros, Fužine. Forma macroptera rarissima.

Stygnocoris D. S.

(*Stygnus* Fieb.)

78. *rusticus* Fall. — In regionibus I—VII. passim occurrit.

79. *pedestris* Fall. — I. Passim obvius. II. Simontornya, Zircz. III. Trencsén, Lucski, Késmárk. IV. Bártfa, Körtvélyes (Torna), S.-A.-Ujhely, Szinnaikő, Kőrösmező. V. Tasnád, Somlyó-Ujlak, Zilah. VI. Mehádia, Ferenczfalva. VII. Verőcze, Károlyváros.

80. *pygmaeus* Sahlb. — I. Budapest, Nagy-Kovácsi, Isaszeg, Nagy-Kőrös. II. Simontornya. III. Tátra, Késmárk, Oroszlánkő. V. Törcsvár. VII. Ivanec, Károlyváros. VIII. Sv.-Juraj.

81. *faustus* Horv. — I. Budapest, Monor. IV. S.-A.-Ujhely. VIII. Sušak, Cirkvenica, Zengg.

82. *fuligineus* Geoffr. (*arenarius* Hahn). — Per totum regnum frequens.

Lasiocoris Fieb.

83. *anomalus* Kol. — VIII. Fiume, Cirkvenica, Zengg, Jablanac.

Peritrechus Fieb.

84. *geniculatus* Hahn. — In regionibus I—VI. passim occurrit.

85. *gracilicornis* Put. — In regionibus I—II. et IV—VIII. haud rarus.

86. *nubilus* Fall. — Per totum regnum vulgaris. var. *tibialis* Horv. — VI. Jazova.

87. *ambiguus* Horv. — I. Budapest, Rákos-Palota, Farkasd, Szolnok, Ecseg, Kecskemét, Kalocsa, Foktű, Szent-Benedek, Szeged. VI. Tataháza, Jazova, Plavisevicza.

88. *sylvestris* Fabr. (*luniger* Schill.) — I. Őrkény, Eger, Székelyhid, Kóly. II. Gödre-Szent-Márton. III. Késmárk. IV. Varannó, Beregszász. V. Tasnád, Nagyszeben. VII. Verőcze, Ludbreg, Zágráb, Károlyváros, Gospić.

Hyalochilus Fieb.

89. *dolosus* Horv. — VIII. Zengg.

Microtoma Lap.

90. *atrata* Goeze (*carbonaria* Rossi). — I—II. et IV—VI. Haud rara. VIII. Fiume.

Trapezonotus Fieb.

91. *anorus* Flor. — III. Selmeczbánya, Késmárk. IV. Kapnikbánya. V. Sztána.

92. *agrestis* Fall. — I—VII. Sat frequens. VIII. Fiume.

93. *dispar* Stål. — In regionibus I—VII. sat frequens.

94. *Ullrichii* Fieb. — II. Szent-Lőrincz (Baranya). III. Trencsén. V. Görgény. VI. Orsova, Oravicza, Zlaticza, Duplaj. VII. Zágráb, Josipdol. VIII. Fiume, Vratnik.

Sphragisticus Stål.

95. *nebulosus* Fall. — In regionibus I. et III—IV. passim occurrit.

Calyptonotus D. S.

96. *Rolandri* L. — In regionibus I—V. et VII—VIII. haud rarus.

Aphanus Lap.

97. *validus* Horv. — I. Budapest, Péczel. V. Kolozsvár, Benedekfalva.

98. *consors* Horv. — I. Keczel. II. Pécs. V. Szilágy-Somlyó.

99. *lynceus* Fabr. — In regionibus I—VII. sat frequens.

100. *quadratus* Fabr. — In regionibus I—II. et IV—VIII. frequens.

101. *Reuteri* Horv. — VIII. Fiume, Pećine, Buccari, Cirkvenica, Novi, Zengg, Carlopago.
102. *saturnius* Rossi. — VIII. Jablanac.
103. *confusus* Reut. (*pineti* Fieb. nec H.-Sch.) — In toto regno haud rarus.
104. *alboacuminatus* Goeze (*pedestris* Pz.). — Per totum regnum vulgaris.
105. *vulgaris* Schill. — In omnibus regionibus vulgaris.
106. *Pini* L. — Per totum regnum vulgaris.
107. *phoeniceus* Rossi. — In toto regno frequens.
var. *sanguineus* D. S. — I. Budapest, Csepel, Isaszeg, Szendrő. II. Tapolcza, Felső-Örs. V. Nagyszeben. VI. Mehádia, Orsova, Duplaj. VII. Fužine. VIII. Frequens.

Beosus Am. Serv.

108. *quadripunctatus* Müll. (*erythropterus* Brull.) In regionibus I—II. et VI—VIII. passim occurrit.
109. *maritimus* Scop. (*luscus* Fabr.) — Per totum regnum frequens.

Emblethis Fieb.

110. *ciliatus* Horv. — I, II, IV. et VI. Passim haud rarus. VII. Gjurgjevac.
111. *Verbasci* Fabr. — Per totum regnum sat frequens.
var. *bullans* Put. — I. Kalocsa.
112. *brachynotus* Horv. — I. Budapest, Rákos-Palota, Isaszeg. II. Kajdacs.
113. *griseus* Wolff. — In regionibus I—IV. et VI—VIII. frequens; in regione V. hucusque haud inventus.
var. *bullatus* Fieb. — In regionibus I—II. et IV. simul cum stirpe.
114. *denticollis* Horv. — In regionibus I—III. et VI. passim haud rarus.
var. *anodon* Horv. — I. Budapest, Farkasd, Kalocsa, Szeged.

Gonianotus Wolff.

115. *marginepunctatus* Wolff. — I. Budapest, Visegrád. II. Balatonfüred, Soóly, Vilonya, Keszthely.

Diomphalus Fieb.

116. *hispidulus* Fieb. — VI. Jazova, Padé.

Eremocoris Fieb.

117. *plebejus* Fall. — I. Budapest. III. Selmeczbánya, Trencsén, Zsolna, Király-Lehota, Késmárk, Igló. IV. Varannó, V.-Csemernye. V. Brassó. VII. Varasd, Ivanec, Gjurgjevac, Károlyváros, Fužine.
118. *podagricus* Farr. — In regionibus I—VII. passim occurrit.
var. *alpinus* Garb. — IV. Csicsva. VIII. Fiume.
119. *erraticus* Fabr. — III. Késmárk, Igló.
120. *fenestratus* H.-Sch. — I. Budapest, Kecskemét, Szeged. II. Pilis-Marót. III. Trencsén. IV. Varannó, Csicsva. VI. Grebenácz, Duplaj. VII. Zágráb, Károlyváros. VIII. Fiume, Orehovica, Buccari, Cirkvenica.

Drymus Fieb.

121. *pilipes* Fieb. — VII. Verőcze, Gospić.
122. *pilicornis* M. R. — II. Keszthely. III. Késmárk, Trencsén, Oroszlánkő. VII. Károlyváros.
123. *confusus* Horv. — I. Szeged. II. Keszthely. III. Szepes-Olaszi. VI. Mehádia. VII. Verőcze.
124. *sylvaticus* Fabr. — I—VII. Haud rarus. VIII. Orehovica.
var. *picinus* Rey. — In regionibus I—VII. passim occurrit.
125. *brunneus* Sahlb. — I. Ujpest, Kalocsa, Nagyvárad. II. Zircz, Nezsider. III. Trencsén, Koritnyicza, Tátra, Késmárk. IV. Szinna, Hoverla. V. Passim obvius. VII. Eszék, Verőcze, Ludbreg, Varasd.

Scolopostethus Fieb.

126. *pictus* Schill. — I. Haud rarus. II. Nezsider. III. Trencsén. IV. Tokaj, Nagymihály, Varannó. V. Zilah, Székely-Keresztúr, Nagyszeben. VI. Fehértemplom. VII. Eszék, Križ, Samobor. VIII. Fiume, Sušak, Buccari.
var. *antennalis* Horv. — I. Ujpest, Rákos-Palota, Kalocsa.
127. *grandis* Horv. — II. Zircz. VI. Mehádia. VIII. Martinšćica, Buccari.
128. *affinis* Schill. — Per totum regnum frequens.
129. *Thomsoni* Reut. — In regionibus I—VII. haud rarus.
130. *decoratus* Hahn. — In regionibus I—VII. passim occurrit.
131. *cognatus* Fieb. — V. Malomviz. VI. Mehádia. VII. Raduć. VIII. Martinšćica, Sv.-Juraj.
132. *puberulus* Horv. — I. Budapest. II. Nezsider. IV. Szádellő, Szőllőske. VII. Varasd.
133. *Lethierryi* Jak. — I. Rákos-Palota, Szolnok, Kecskemét. II. Nezsider.
134. *pilosus* Reut. — In regionibus I—VII. passim occurrit. Specimen unicum macropterum ad II. Pápa.

Notochilus Fieb.

135. *hamulatus* Thoms. (*obscurior* Rey.) — In regionibus I—VII. passim haud rarus.
136. *contractus* H.-Sch. — VIII. Fiume, Sušak, Martinšćica, Buccari, Cirkvenica

Gastrodes Westw.

137. *Abietis* L. — In regionibus III—V. et VII. passim frequens.

138. *ferrugineus* L. — I. Budapest, Eger. II. Sopron, Balf. III. Haud rarus. V. Kis-Talmács. VII. Gjurgjevac, Fužine. VIII. Vratnik.

Scantius Stål.

139. *aegyptius* L. — VIII. Fiume, Jablanac.

Pyrrhocoris Fall.

140. *apterus* L. — Per totum regnum vulgaris.

141. *marginatus* Kol. — I—VI. Passim haud rarus. VIII. Fiume.

Fam. TINGITIDAE.

Piesma Lep. Serv.

1. *quadrata* Fieb. — I—II. et IV—VI. Passim sat frequens. VIII. Fiume, Pećine. Etiam forma brachyptera (*dilatata* Jak.).

2. *variabilis* Fieb. — VIII. Carlopago.

3. *Salsolae* Beck. — I—II. et VI. Passim frequens. IV. Berettő (Zemplén).

4. *Kochiae* Beck. — I. Sat frequens. II. Székesfehérvár, Dunaföldvár. IV. Tarczal, Tokaj. VI. Deliblat. Specimen unicum macropterum (*Fieberi* Jak.) ad II. Székesfehérvár.

5. *Silenes* Horv. — I. Kecskemét, Szeged. VI. Duplaj.

6. *maculata* Lap. — Per totum regnum valde frequens.

7. *capitata* Wolf. — In omnibus regionibus obvia, sed minus frequens, quam præcedens.

Serenthia Spin.

8. *atricapilla* Spin. — I. Szeged, Dorozsma. VI. Deliblat.

9. *ruficornis* Germ. — VII. Gjurgjevac, Károlyváros.

10. *femoralis* Thoms. — IV. Varannó-Csemernye. V. Kolozs.
var. *confusa* Put. — In regionibus I—VII. frequens.

11. *laeta* Fall. — I. Ér-Mihályfalva. IV. Aranyos-Patak. VII. Zágráb.

12. *minuta* Horv. — I. Budapest, Monor, Örkény, Peszér. IV. Gálszécs. VI. Deliblat.

Campylosteira Fieb.

13. *Falléni* Fieb. — I. Szent-Endre.

14. *verna* Fall. — I. Budapest, Rákos-Palota, Kalocsa. III. Késmárk. V. Lotrióra, Tihucza.
var. *latipennis* Horv. — IV. Tokaj.

Acalypta Westw.
(*Orthosteira* Fieb.)

15. *Musci* Schr. — In regionibus II—VII. passim occurrit.
var. *ditata* Put. — Ibidem simul cum stirpe.

16. *cervina* Germ. — III. Mons Sztrazsó (Com. Trencsén). VII. Verőcze, Com. Pozsega, Károlyváros, Kutina.
var. *angustula* Horv. — II. Zircz. III. Késmárk.

17. *platychila* Fieb. — I. Péczel, Szent-Benedek. VII. Károlyváros.

18. *nigrina* Fall. — III. Késmárk. VII. Károlyváros.

19. *macrophthalma* Fieb. — In regionibus I—VII. passim minus rara.

20. *gracilis* Fieb. — I. Passim sat frequens. III. Pozsony. IV. Szerencs, Tolcsva, Szomotor. VI. Jazova. Forma macroptera (*recticosta* Thoms.) rara: I. Budapest.

21. *parvula* Fall.—I. Budapest, Lunka. III. Pozsony, Vallis Vratna. IV. S.-A.-Ujhely. VI. Mehádia. VII. Verőcze, Fužine.

Dictyonota Curt.

22. *tricornis* Schrk. (*crassicornis* Fall.) — Per totum regnum passim occurrit.
var. *erythrophthalma* Germ. — In regionibus I—VII. inventa.

23. *strichnocera* Fieb. — I. Passim sat rara. II. Villány. III. Késmárk. IV. Tarczal, Szomotor. V. Nagy-Csűr, Berethalom. VI. Grebenácz, Berzászka, Kazán. VIII. Fiume.

24. *Henschi* Put. — I. Budapest.

Derephysia Spin.

25. *foliacea* Fall. — I. Budapest, Miskolcz, Kalocsa. II. Keszthely. III. Kis-Kriván, Késmárk. IV. Bártfa. V. Kis-Torony, Balánbánya. VII. Verőcze, Károlyváros, Sv.-Brdo, Medak, Raduć. VIII. Fiume, Cirkvenica.
var. *Birói* Horv. — VIII. Sv.-Juraj.

26. *cristata* Pz. — I. Monor. IV. Tokaj.

Galeatus Curt.

27. *sinuatus* H.-Sch. — IV. Szerencs, Forró. V. Székely-Keresztúr.

28. *Komaroffii* Jak. (*debilis* Montd.) — I. Budapest.

29. *syrmiensis* Horv. — VII. Vrdnik.

30. *angusticollis* Reut. (*spinifrons* H.-Sch. nec Fall.) — IV. Körtvélyes (Torna).

31. *spinifrons* Fall. (*affinis* H.-Sch.) — I. Passim

sat frequens. IV. Szomotor. VI. Grebenácz, Deliblat. VII. Pazarište. VIII. Fiume.

32. *maculatus* H.-Sch. — I. Budapest. IV. Tokaj, Varannó, Bánszka. Forma brachyptera (*subglobosus* H.-Sch.): I. Budapest. IV. Szerencs.

Tingis Fabr.

33. *Pyri* Fabr. — Per totum regnum frequens.

Copium Thunb.
(*Eurycera* Lap.)

34. *cornutum* Thunb. (*clavicorne* Houtt. nec L.) — In omnibus regionibus passim occurrit.

35. *Teucrii* Host. — I. Budapest, Budaörs. III. Trencsén, Dubnicz. IV. Torna. VIII. Fiume, Buccari.

Phyllontocheila Fieb.

36. *ampliata* Fieb. — I. Kalocsa. II. Szegszárd, Zircz, Nezsider. V. Szamosfalva.

37. *Cardui* L. — Per totum regnum frequens.
var. *cognata* Fieb. — Ibidem simul cum stirpe.

38. *auriculata* Costa. — In regionibus I—II. et IV—VII. haud rara.

39. *angustata* H.-Sch. — IV. Torna, Tolcsva, S.-A.-Ujhely, Czéke, Kis-Azar, Vinna, Varannó, Aranyos-Patak, Beregszász. VII. Eszék, Verőcze, Daruvár, Kőrös, Medak.
var. *sympathica* Horv.—IV. Torna, S.-A.-Ujhely, Nagymihály, Varannó, Beregszász. V. Tasnád.

40. *testacea* H.-Sch. — I. Kalocsa. III. Pozsony. V. Tasnád, Oláh-Valkó. VI. Mehádia, Deliblat.

41. *ciliata* Fieb. — I—V. Passim obvia. VI. Mehádia. VIII. Orehovica.

42. *ciliaris* Put. — VI. Berzászka, Szvinicza, Plavisevicza.

43. *ragusana* Fieb. — IV. Csicsva.

44. *grisea* Germ. — I. Passim haud rara. V. Márpod, Nagy-Csűr. VI. Deliblat.

45. *crispata* H.-Sch. — I. Passim minus rara. II. Simontornya, Lajta-Bruck. IV. Körtvélyes (Torna), Tarczal, Tokaj, Sáros-Patak. V. Tasnád. VI. Mehádia, Orsova, Berzászka. VII. Pétervárad, Verőcze, Gjurgjevac, Ludberg.

46. *capucina* Germ. — Per totum regnum sat frequens.
var. *gracilis* H.-Sch. — I. Budapest, Peszér. IV. Almás. VII. Vrdnik.

47. *Kiesenwetteri* M. R. — I. Budapest.

48. *angusticollis* H.-Sch. — In regionibus I—VII. passim occurrit.

49. *maculata* H.-Sch. — I. Passim haud rara. VI. Deliblat. VII. Plitvica.

50. *caucasica* Jak. — I. Farkasd, Szeged.

51. *geniculata* Fieb.—In regionibus I—V. et VII. passim inventa.

Catoplatus Spin.

52. *Fabricii* Stål (*costatus* Fall. nec Fabr.) — I—V. Passim obvius. VII. Lipik. VIII. Fiume.

53. *flavipes* Horv. (*Horváthi* Put.) — I. Budapest. II. Pécs. VI. Mehádia.

54. *carthusianus* Goeze (*Eryngii* Latr.) — In regionibus I—IV, VI. et VIII. haud rarus.

55. *melanocephalus* Pz. (*Eryngii* Fieb.) — I. et IV. Haud rarus. V. Nagy-Enyed, Nagy-Csűr, Hátszeg. VII. Vrdnik.

Physatocheila Fieb.

56. *quadrimaculata* Wolff. — I. Göd. III. Com. Trencsén, Késmárk. IV. Körtvélyes (Torna), Homonna, Szinna, Nagy-Brezsnicze. V. Dicső-Szent-Márton, Törcsvár. VII. Varasd. VIII. Fiume.

57. *dumetorum* H.-Sch. — In regionibus I—V. et VII—VIII. minus rara.

58. *simplex* H.-Sch. — I. Peszér, Bátya. III. Trencsén. VII. Pétervárad, Ludbreg, Stalak.

59. *scapularis* Fieb. — In regionibus I—VII. passim haud rara.

Monanthia Lep. Serv.

60. *Echii* Schrk. (*Wolffii* Fieb.) — Per totum regnum valde frequens.

61. *Lupuli* H.-Sch. — I. Budapest, Hadház, II. Nagy-Kanizsa. III. Késmárk. IV. Torna, Áj, Komjáti, Bártfa, Szomotor. V. Tusnád, Görgény, Tihucza. VI. Titel. VII. Kőrös, Gjurgjevac, Károlyváros, Mrzla vodica.

62. *nassata* Put. — I. Budapest, Kis-Szent-Miklós, Örkény.

63. *Putoni* Montd. — I. Budapest.

64. *platyoma* Fieb. — I. Budapest, Kis-Szent-Miklós, Kecskemét, Szeged. II. Duna-Földvár. VI. Grebenácz, Berzászka.

65. *Humuli* Fabr. — III. Selmeczbánya. IV. Torna, Zsarnó. VII. Gjurgjevac, Károlyváros.

66. *Symphyti* Vall. (*vesiculifera* Fieb.) — In regionibus I—VII. sat frequens.

67. *rotundata* H.-Sch. (*Echii* Fabr.) — I. Passim haud rara. II. Siófok, Soóly, Vilonya, Nezsider. III. Pozsony. IV. Tokaj, S.-A.-Ujhely. V. Kis-Torony. VI. Mehádia.

Monosteira Costa.

68. *unicostata* M. R. — I. Budapest, Rákos-Palota, Örkény, Kecskemét, Kalocsa, Keczel, Szeged. II. Siófok. VI. Deliblat, Duplaj, Fehértemplom. VII. Verőcze, Ruma.

Fam. ARADIDAE.

Aradus Fabr.

1. *versicolor* H.-Sch. — I. Péczel, Pilis-Szántó, Torbágy. II. Pécs, Zircz. III. Pozsony, Szoblahó. IV. Passim obvius, sed rarus. VI. Resicza, Német-Bogsán, Mehádia, Orsova. VII. Verőcze, Kutina, Varasd, Zágráb, Károlyváros, Gospić.
2. *cinnamomeus* Pz. — I. Kis-Szent-Miklós. III. Trencsén, Késmárk. IV. Széphalom, Szőllőske. VII. Gjurgjevac, Károlyváros, Fužine.
3. *pallescens* H.-Sch. — VII. Varasd.
4. *depressus* Fabr. — Per totum regnum passim occurrit.
5. *truncatus* Fieb. — III. Pozsony. V. Sztána, Felső-Torja. VI. Mehádia, Stájerlak.
6. *distinctus* Fieb. — I. Rákos-Palota, Péczel, Monor, Örkény, Solt, Mező-Kovácsháza, Nagyvárad, Hadház. II. Pápa. IV. Szin. VII. Križ.
7. *dilatatus* Duf. — Per totum regnum haud rarus.
8. *betulinus* Fall. — I. Nagyvárad. III. Késmárk. IV. Suliguli. V. Borszék, Görgény. VI. Mehádia.
9. *corticalis* L. — In regionibus I—V. et VII. haud rarus.
   var. *annulicornis* Fabr. — In regionibus I—VII. passim obvius.
10. *sordidus* Horv. — I. Budapest.
11. *lugubris* Fall. — II. Gödre-Szent-Márton. III. Trencsén. IV. Bártfa. V. Görgény, Borszék, Tusnád, Czód, Kis-Talmács. VI. Mehádia. VII. Zágráb, Károlyváros.
12. *varius* Fabr. — III. Szoblahó, Lucski. IV. Bártfa, Pietrosz. V. Görgény, Nagy-Csűr. VI. Mehádia.
13. *Brenskei* Reut. — I. Kalocsa. II. Alcsuth, Zircz, Pápa, Vadé, Gödre-Szent-Márton. VI. Mehádia. VII. Plitvica.
14. *Betulae* L. — In regionibus I—VII. haud rarus.
15. *Reuterianus* Put. — VIII. Zengg.

Brachyrhynchus Lap.

16. *Tremulae* Büttn. — I. Szent-Mártonkáta. II. Vadé, Visz. III. Trencsén. IV. Szinnaikő. V. Hátszeg, Felső-Farkadin, Malomviz. VI. Mehádia. VII. Verőcze, Daruvár.

Aneurus Curt.

17. *laevis* Fabr. — In regionibus I—VII. haud rarus.

Fam. HEBRIDAE.

Hebrus Curt.

1. *pusillus* Fall. — I. Budapest, Kalocsa, Foktű, Szoboszló, Com. Szabolcs. II. Zánka, Keszthely. III. Zsolna, Csorbaitó. IV. Passim obvius. V. Nagyszeben, Nagy-Csűr, Malomviz. VI. Palics, Zombor, Pancsova. VII. Károlyváros. VIII. Fiume.
2. *montanus* Kol. — VI. Mehádia.
3. *ruficeps* Thoms. — I. Rákosfalva, Kecskemét, Ér-Mihályfalva. II. Nezsider. III. Késmárk. IV. Torna, Szomotor, Varannó, Szatmár-Németi, Kis-Majtény. V. Malomviz. VI. Pancsova. VII. Varasd, Károlyváros.

Fam. GERRIDIDAE.

(HYDROMETRIDAE.)

Mesovelia M. R.

1. *furcata* M. R. — IV. Torna. V. Görcsön, Gyeke, Mező-Záh. VI. Pékla.

Hydrometra Latr.

2. *stagnorum* L. — Per totum regnum passim occurrit.

Microvelia Westw.

3. *pygmaea* Duf. — VII. Károlyváros. VIII. Orehovica.
4. *Schneideri* Scholtz. — III. Késmárk. IV—V. Passim haud rara. VI. Palics, Zombor, Pékla. VII. Károlyváros.

Velia Latr.

5. *rivulorum* Fabr. — VI. Baziás, Szent-Helena. VIII. Buccari, Cirkvenica.
6. *currens* Fabr. — II. Nagy-Kapornak. III. Selmeczbánya, Trencsén, Késmárk, Rozsnyó. IV. Passim obvia. V. Magyarpatak. VI. Orsova. VII. Vrdnik. VIII. Fiume. Forma macroptera rarissima : III. Losoncz. IV. Körtvélyes (Torna).

Gerris Fabr.

7. *rufoscutellatus* Latr. — I. Budapest, Rákos-Palota. II. Tapolcza, Balf. III. Oszada, Tátra, Késmárk. IV—V. Passim minus frequens.
8. *paludum* Fabr. — I. Haud frequens. II. Bodajk, Keszthely, Balf. III. Kis-Tapolcsány, Oszada. IV—V. Passim obvia. VI. Gombos, Osztrovo, Sikevicza. VII. Zimony, Vrdnik, Eszék, Zágráb, Fužine.
9. *najas* De. Geer. — II. Veszprém.
10. *Costae* H.-Sch. — V. Zilah, Zsibó, Egrespatak, Szent-Gothárd, Tihucza, Magura (Kolozs). VIII. Fiume, Sušak, Orehovica, Draga, Buccari.
11. *thoracicus* Schumm. — Per totum regnum frequens.
12. *asper* Fieb. — I. Szeged. II. Tapolcza, Sopron. IV. Szerencs, Tokaj, S.-A.-Ujhely, Varannó, Bánszka, Körtvélyes (Torna). V. Tasnád, Zilah, Mező-Záh, Nagyszeben. VII. Zágráb.

13. *gibbifer* Schumm. — I. Kalocsa, Szeged. III. Haud rara. V. Zilah, Mező-Záh. VI. Klopodia, Sikevicza. VIII. Fiume, Podvežica, Orehovica, Draga, Zengg.
var. *flaviventris* Put. — VIII. Orehovica.
14. *lacustris* L. — Per totum regnum frequens.
15. *odontogaster* Zett. — In regionibus I—VII. haud rara.
16. *argentatus* Schumm. — I. Budapest, Kalocsa, Foktű, Szeged. II. Passim obvia. III. Késmárk. IV. Haud rara. V. Szilágy-Nagyfalu, Gyeke, Mező-Záh. VI. Zombor. VII. Zágráb.

Fam. PHYMATIDAE.

Phymata Latr.

1. *crassipes* Fabr.—Per totum regnum sat frequens.

Fam. REDUVIIDAE.

Ploiariola Reut.

1. *vagabunda* L. — I. Rákos-Palota, Farkasd. III. Stubnya. IV. Szinna.
2. *culiciformis* De Geer. — I. Budapest, Rákos-Palota, Kalocsa, Szeged. II. Karancs, Duna-Örs. III. Vallis Vratna, Késmárk. IV. Bártfa, Bély. V. Tasnád, Nagyszeben, Kis-Disznód, Puj. VII. Ruma, Verőcze, Károlyváros. VIII. Fiume.

Ploiaria Scop.

(*Cerascopus* Heinek.)

3. *domestica* Scop. — VIII. Fiume.

Metapterus Costa.

4. *linearis* Costa. — II. Nezsider, Pécs, Mánfa, Gödre-Szent-Márton. VI. Langenfeld, Orsova. VII. Verőcze, Károlyváros. VIII. Orehovica.

Pygolampis Germ.

5. *bidentata* Goeze.—I—II. Passim obvia. III. Kubra, Késmárk. IV. Bártfa, Varannó, Tokaj. V. et VII. Passim minus rara. VIII. Orehovica, Cirkvenica.

Oncocephalus Klug.

6. *pilicornis* H.-Sch. — VIII. Fiume, Orehovica, Martinšćica.
(*squalidus* Rossi apud nos vix occurrit; specimen ut hungaricum descriptum [Horváth, 65] verisimiliter non ex Hungaria oritur.)

Holotrichius Burm.

7. *denudatus* Costa (*Cyrilli* Costa). — VIII. Fiume (Brancsik, 14).

Reduvius Fabr.

8. *personatus* L. — Per totum regnum sat frequens.

Peirates Serv.

9. *hybridus* Scop. — In omnibus regionibus haud rarus.

Harpactor Lap.

10. *niger* H.-Sch. — I. Budapest, Farkasd, Székudvar. II. Pécs. VII. Ruma. — Etiam in Tauria occurrit.
11. *annulatus* L. — Per totum regnum minus frequens.
12. *iracundus* Poda. — In regionibus I—VII. sat frequens.
var. *rubricus* Germ. — VII. Josipdol, Magna-Capella, Velebit, Gospić. VIII. Frequens.
(*erythropus* L. = *haemorrhoidalis* Fabr. in Hungaria hucusque haud inventus; species sub nomine *Reduvius haemorrhoidalis* e Comitatu Győr enumerata [Méry, 155] verisimiliter eadem est cum specie præcedente.)
(*lividigaster* M.° R. irrite e III. monte Szitnya enumeratus [Petrogalli, 162] in Hungaria haud occurrit.)

Coranus Curt.

13. *aegyptius* Fabr. — VIII. Fiume, Sušak, Orehovica, Podvežica, Buccari, Cirkvenica, Zengg, Carlopago.
14. *contrarius* Reut. — I. Budapest, Kis-Szent-Miklós, Isaszeg, Farkasd, Monor, Kecskemét, Dorozsma, Hajdu-Dorog, Ér-Mihályfalva. VI. Palics, Deliblat. Specimen unicum macropterum ad: I. Budapest.
15. *tuberculifer* Reut. — VIII. Zengg.
16. *subapterus* De Geer. — I. Passim obvius. III. Pozsony. IV. S.-A.-Ujhely. V. Zilah, Szilágyfő-Keresztur, Maros-Ujvár, Nagyszeben. VI. Palics, Grebenácz. VIII. Zágráb, Pregrada.

Nagusta Stål.

17. *Goedelii* Kol. — II. Balf, Csurgó, Gödre-Szent-Márton, Pécs, Nagy-Harsány. V. Zilah. VI. Plavisevicza, Orsova.

Prostemma Lap.

18. *guttula* Fabr. — Per totum regnum obvium, sed minus frequens.
19. *aeneicolle* Stein. — I. Passim sat rarum. II. Mánfa. III. Selmeczbánya, Szoblahó, Sztraczena, Rozsnyó. IV. Passim obvium. V. Tasnád, Zilah, Czód, Nagyszeben, Hátszeg. VI. Mehádia, Ora-

vicza. VII. Ruma, Verőcze, Kőrös, Zágráb. VIII. Fiume.

20. *sanguineum* Rossi. — I. Passim haud rarum. II. Tapolcza. III. Pozsony, Pöstyén, Szoblahó. IV. Komjáti, Szomotor. V. Nagyszeben, Hátszeg. VI. Resicza. VIII. Fiume, Cirkvenica, Carlopago.

Alloeorhynchus Fieb.

21. *flavipes* Fieb. — I. Budapest, Kis-Szent-Miklós, Farkasd, Örkény, Miskolcz, Kóly. II. Soóly. III. Kis-Kriván, Chocs. IV. Kassa, Torna, Körtvélyes (Torna), S.-A.-Ujhely, Tolcsva. VI. Mehádia, Ó-Moldova. VII. Pétervárad, Verőcze, Ludbreg, Károlyváros.

Nabis Latr.

22. *apterus* Fabr. (*brevipennis* Hahn). — In omnibus regionibus sat rarus.

23. *lativentris* Boh. — Per totum regnum valde frequens.

24. *flavomarginatus* Scholtz. — III. Koritnyicza, Késmárk, Szepes-Béla. IV. Varannó, Kőrösmező. V. Görgény, Borszék, Csik-Szent-Domokos, Tihucza.

25. *limbatus* Dahlb. — I. Nagyvárad. II. Lajta-Bruck. III. Tátra, Késmárk. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely.

26. *ferus* L. — In omnibus regionibus vulgaris.

27. *rugosus* L. — Per totum regnum valde frequens.

28. *brevis* Scholtz. — In regionibus I—VII. haud rarus.
(*ericetorum* Scholtz in Hungaria hucusque nondum repertus; specimen sub hoc nomine e IV. Derenk enumeratum [Horváth, 51] est = *rugosus* L.)

Fam. CIMICIDAE.

Ceratocombus Sign.

1. *coleoptratus* Zett. — I. Rákos-Palota, Örkény. III. Kis-Kriván.

Cryptostemma H.-Sch.

2. *alienum* H.-Sch. — III. Tátra, Javorina, Késmárk, Com. Trencsén. V. Hátszeg.

Cimex L.

3. *lectularius* L. — Per totum regnum frequens.

4. *improvisus* Reut. — VI. Mehádia, specimen unicum in pratis.

5. *Hirundinis* Jen. — II. Pécs. V. Nagy-Enyed, Tasnád, Pele. VI. Ó-Ogradena.

Lyctocoris Hahn.

6. *campestris* Fabr. — In omnibus regionibus sat frequens.
var. *dimidiatus* Spin. — II. Kup. IV. Kis-Azar, Szinnaikő.
var. *pictus* Fieb. — IV. Orosz-Poruba, Szinnaikő, Perecseny.

Piezostethus Fieb.

7. *galactinus* Fieb. — I. Budapest. V. Zilah. VII. Károlyváros.

8. *formicetorum* Boh. — III. Isztebnik.

9. *parvulus* Reut. — VI. Ó-Moldova.

10. *obliquus* Costa. — I. Budapest, Kis-Szent-Miklós, Monor, Kecskemét. II. Soóly. VIII. Novi, Carlopago.

11. *cursitans* Fall. — In regionibus I—VII. haud rarus.

Ectemnus Fieb.

12. *reduvinus* H.-Sch. — I. Budapest, Rákos-Palota. II. Badacsony. IV. Forró. V. Hátszeg.

Temnostethus Fieb.

13. *pusillus* H.-Sch. — I. Budapest, Farkasd, Horgos, Nagyvárad. II. Magyar-Óvár, Köpcsény. III. Trencsén, Lucski, Késmárk. IV. Forró, Szalánez, Szőllőske, Bodrog-Olaszi. V. Görcsön, Görgény-Szent-Imre, Tihucza. VII. Fužine.

Elatophilus Reut

14. *stigmatellus* Zett. — VII. Károlyváros.

Anthocoris Fall.

15. *confusus* Reut. — I. Ujpest. III. Késmárk. IV. Homonna, Szinna, Szatmár-Németi. V. Görcsön. VI. Bozovics. VII. Fužine.

16. *nemoralis* Fabr. — In omnibus regionibus haud rarus.
var. *austriacus* Fabr. — VI. Baziás.

17. *Minki* Dohrn. — I. Passim obvius. II. Simontornya, Lelle, Fonyód, Tapolcza. III. Bazin. IV. Forró, Nagymihály, Kapnikbánya. VI. Titel, Baziás. VII. Zágráb, Podsused. VIII. Sušak, Cirkvenica, Bribir, Novi.
var. *simulans* Reut. — I. Budapest. IV. Sztropkó. VIII. Novi.

18. *gallarum ulmi* De Geer. — In regionibus I., II., IV—VI. et VIII. sat frequens.
var. *melanocerus* Westh. — V. Szent-Gothárd.

19. *sylvestris* L. — In regionibus I. et III—VII. frequens.

20. *limbatus* Fieb. — II. Simontornya. III. Lucski. IV. S.-A.-Ujhely, Ungvár. V. Nagy-Csűr. VII. Pétervárad, Károlyváros.

Tetraphleps Fieb.

21. *vittata* Fieb. — III. Késmárk. IV. Szaláncz, Széphalom. V. Nagy-Csűr. VII. Varasd-Teplicz.

Acompocoris Reut.

22. *alpinus* Reut. — V. Domuk.
23. *pygmaeus* Fall. — III. Trencsén, Tátra, Késmárk. VIII. Fiume.

Triphleps Fieb.

24. *nigra* Wolff. — Per totum regnum vulgaris.
25. *Horváthi* Reut. — I. Csány, Eger. II. Simontornya. III. Pozsony. IV. Forró, Csécs, Varannó, Királyháza. V. Szilágy-Nagyfalu. VI. Titel. VIII. Ubique frequens.
26. *majuscula* Reut. — In regionibus I—VII. sat frequens.
27. *minuta* L. — In toto regno frequens.

Brachysteles M. R.

28. *rufescens* Costa. — I. Kalocsa. II. Pápa, Tihany. IV. S.-A.-Ujhely, Kassa.
29. *parvicornis* Costa. — VIII. Fiume.

Xylocoris Duf.

30. *ater* Duf. — I. Budapest, Kecskemét, Szeged. II. Csurgó, Zákány. III. Késmárk. IV. Passim obvius. V. Tasnád. VIII. Fiume.

Scoloposcelis Fieb.

31. *pulchella* Zett. — V. Görgény.

Microphysa Westw.

32. *pselaphiformis* Curt. — I. Eger. III. Késmárk, Tátra, Trencsén. V. Nagy-Csűr.
33. *elegantula* Baer. — III. Trencsén, Igló.

Myrmedobia Baer.

34. *tenella* Zett. — III. Csorba, Késmárk, Szepes-Béla. IV. Bártfa. V. Szakácsi, Görgény. VIII. Fiume.
35. *coleoptrata* Fall. var. *subtruncata* Rey. — VIII. Fiume.

Fam. CAPSIDAE.

Pithanus Fieb.

1. *Maerkeli* H.-Sch. — I. Farkasd. II. Pelérd. III. Pozsony, Késmárk. IV. Vihorlat, Szinna. V. Zilah. VII. Károlyváros, Stalak.

Myrmecoris Gorski.

2. *gracilis* Sahlb. — I. Budakesz. IV. Szomotor, Varannó-Csemernye. V. Tasnád.

Camponotidea Reut.

3. *Saundersi* Put. — VII. Magna-Capella.

Acetropis Fieb.

4. *carinata* H.-Sch. — In regionibus I—VI. passim haud rara.
5. *longirostris* Put. — I. Ecseg, Hódmező-Vásárhely. VI. Jazova, Szaján.

Miris Fabr.

6. *calcaratus* Fall. — Per totum regnum frequens.
var. *virescens* Fieb. — Ibidem simul cum stirpe.
7. *virens* L. — In regionibus I. et III—VIII. frequens.
var. *testaceus* Reut. — Ibidem simul cum stirpe.
var. *fulvus* Reut. — I. Bogács, Diósgyőr. IV. Torna. V. Nagy-Ajta. VIII. Pećine.
8. *laevigatus* L. — Per totum regnum vulgaris.
var. *grisescens* Fall. — IV. Szádellő, Varannó, Mező-Laborcz.
var. *virescens* Fall. — Cum stirpe frequens.
9. *sericans* Fieb. — IV. Szádellő. VIII. Fiume, Sušak.
10. *holsatus* Fabr. — In regionibus III—V. et VII. minus frequens.

Notostira Fieb.

11. *erratica* L. — Per totum regnum vulgaris.
var. *ochracea* Fieb. — Ibidem simul cum stirpe.

Megaloceraea Fieb.

12. *linearis* Fuessl. (*longicornis* Fall.) — In omnibus regionibus sat frequens.

Trigonotylus Fieb.

13. *ruficornis* Geoffr. — Per totum regnum vulgaris.
14. *pulchellus* Hahn. — I. Kis-Szent-Miklós, Felső-Pakony, Horgos. II. Sárbogárd, Simontornya, Tihany. III. Pozsony.

Teratocoris Fieb.

15. *antennatus* Boh. var. *dorsalis* Fieb. — I. Rákos-Palota. II. Keszthely.

Leptopterna Fieb.

16. *ferrugata* Fall. — In regionibus I—VII. haud rara.
17. *dolabrata* L. — Per totum regnum sat frequens.
var. *aurantiaca* Reut. — Ibidem simul cum stirpe.

Monalocoris Dahlb.

18. *Filicis* L. — I. Kalocsa. II. Badacsony. III. Zsolna, Tátra, Késmárk. IV—V. Passim sat frequens.

VI. Mehádia, Kazán, Sikevicza, Szent-Heléna. VII. Zágráb, Károlyváros, Ostrovica, Breze, Stalak, Plitvica. VIII. Fiume, Sušak, Vratnik.

Bryocoris Fall.

19. *Pteridis* Fall. — III. Tátra. IV. Bártfa, Nagybánya, Kapnikbánya, Pietrosz. V. Tihucza. VI. Mehádia. VII. Károlyváros, Breze.

Pantilius Curt.

20. *tunicatus* Fabr. — I. Budapest. II. Pécs. III. Tavarnok, Ajnácskő, Késmárk, Rajecz, Trencsén. IV. Komjáti, Körtvélyes (Torna), Nagymihály. V. Zilah, Görcsön, Szilágyfő-Keresztur. VII. Varasd-Teplicz, Zágráb, Breze.

Dionconotus Reut.

(*Dioncus* Fieb.)

21. *neglectus* Fabr. — VI. Mehádia. VII. Com. Pozsega, Zágráb, Josipdol.

Lopus Hahn.

22. *cingulatus* Fabr. (*albomarginatus* Hahn.) — III. Stefultó. IV. Körtvélyes (Torna). VII. Josipdol. VIII. Fiume.

23. *gothicus* L. — Per totum regnum sat frequens.

24. *mat* Rossi. — VIII. Fiume, Orehovica.

(*infuscatus* Brull. in Hungaria hucusque nondum repertus; Dr. C. Brancsik [14] speciem hanc meridionalem per errorem e III. Com. Trencsén enumeravit.)

Horváthia Reut.

25. *hieroglyphica* M. R. (*vittata* Horv.) — IV. Alpes Maramarosienses: Turkul, Pietrosz, Pop-Iván, Serban. V. Görgény: Mezőhavas, Kerczisóra: Szteán varosz.

Miridius Fieb.

26. *pallidus* Horv. — VIII. Novi.

Phytocoris Fall.

27. *incanus* Fieb. — I. Budapest, Monor. VI. Deliblat, Duplaj.

28. *ustulatus* H.-Sch. — I. Budapest, Békás-Megyer, Visegrád, Budafok. II. Dörgicse, Pécs. IV. Torna, Almás, Körtvélyes (Torna), Szádvár, Tolcsva. VI. Ujvidék. VII. Čerević, Vrdnik. VIII. Fiume, Sv.-Jelena, Cirkvenica.

29. *varipes* Boh. — In regionibus I—VII. vulgaris; in regione VIII. hucusque haud inventus.

30. *Ulmi* L. — Per totum regnum sat frequens.

31. *parvulus* Reut. — VIII. Novi.

32. *Pini* Kb. — III. Sztranszke, Lucski, Csorba Tátrafüred, Késmárk. IV. Bártfa. V. Borszék, Zernest, Bucsecs. VII. Pregrada.

33. *Reuteri* Saund. — I. Budapest, Dános. II. Keszthely. IV. Áj. VII. Zágráb. VIII. Novi.

34. *dimidiatus* Kb. — II. Pécs. III. Késmárk. IV. Barkó, Szinnaikő, Kapnikbánya.

35. *confusus* Reut. — V. Zilah.

36. *Populi* L. — I. Ujpest, Péczel. III. Pozsony. VII. Fužine.

37. *longipennis* Flor. — III. Késmárk. IV. Bártfa. V. Székely-Keresztur.

38. *Tiliae* Fabr. — I. Budapest, Kis-Szent-Miklós, Dorozsma. II. Fadd, Zircz. III. Trencsén, Nemes-Podhrágy. VIII. Fiume.

39. *meridionalis* H.-Sch. (*Signoreti* Perr.) — I. Budapest. II. Simontornya. VIII. Novi.

Megacoelum Fieb.

40. *Beckeri* Fieb. — I. Budapest, Péczel, Farkasd. IV. Körtvélyes (Torna). VIII. Pećine.
var. *ruficeps* Reut. — VI. Mehádia.

41. *infusum* H.-Sch. — I. Bakta (Heves). II. Pécs.

Adelphocoris Reut.

42. *quadripunctatus* Fabr. — I. Rákos-Palota, Farkasd, Nagyvárad: Püspökfürdő. III. Beszterczebánya, Stubnya, Tátra. IV. Passim obvius. VI. Vinga, Pancsova.

43. *lineolatus* Goeze (*Chenopodii* Fall.) — Per totum regnum vulgaris.

44. *ticinensis* Mey. — I. Passim haud rarus. II. Badacsony, Nezsider. IV. Tokaj, S.-A.-Ujhely, Szőllőske. VI. Zenta, Pancsova, Albrechtsdorf, Deliblat, Mehádia. VIII. Eszék, Pétervárad, Zimony, Kupinovo.

45. *detritus* Fieb. — III. Tarnócz. IV. Zsalobina. V. Kovászna, Törcsvár. VI. Kazán, Korniaréva.

46. *vandalicus* Rossi. — Per totum regnum frequens.
var. *Humuli* Schumm. — I. Budapest. IV. Orosz-Ruszka.

47. *Reicheli* Fieb. — I. Debreczen. III. Szilicze. IV. S.-A.-Ujhely, Parnó, Juszko-Volya, Királyháza, Batarcs. V. Nagyszeben, Nagy-Csűr, Nagy-Ajta, Beszterczе. VII. Passim obvius. VIII. Fiume.

48. *seticornis* Fabr. — Per totum regnum frequens.
var. *plagifer* Reut. — Ibidem simul cum stirpe.

Calocoris Fieb.

49. *bipunctatus* Fabr. (*norvegicus* Gmel.) — In regionibus I—IV. et VI—VIII. passim haud rarus.

50. *angularis* Fieb. — VI. Mehádia, Orsova, Plavisevicza. VII. Breze, Stalak, Kuterevo, Mrzla vodica, Gospić. VIII. Fiume, Buccari, Novi, Zengg, Vratnik.

51. *roseomaculatus* De Geer. — I. Budapest, Kis-Szent-Miklós. II. Haláp. III—IV. Passim sat frequens. V. Magura (Kolozs), Déva, Resinár, Lomány, Tusnád, Kovászna, Borszék. VII. Josipdol.

52. *alpestris* Mey. — I. Rézbánya. III. Mons Szitnya, Zsolna, Tátra. IV. Bártfa. V. Görgény, Bucsecs. VI. Korniaréva. VIII. Zágráb, Vaganski Vrh.

53. *affinis* H.-Sch. — Per totum regnum passim sat frequens.

54. *nebulosus* Fieb. — VIII. Orehovica.

55. *fuscescens* Reut. — VII. Gospić. VIII. Fiume, Sušak, Orehovica, Podvežica, Buccari, Novi, Zengg.

56. *vicinus* Horv. — V. Nagy-Enyed, Kis-Disznód. VI. Mehádia, Orsova, Plavisevicza, Baziás, Oravicza. (False etiam e III. Trencsén [Brancsik, 9, 10] et e IV. Homonna, Szobráncz [Mocsáry, 157] enumeratus.)

57. *ventralis* Reut. — VI. Mehádia.

58. *fulvomaculatus* De Geer. — I. Budapest, Kalocsa, Nagyvárad. III. Trencsén, Csorba, Tátrafüred, Késmárk. IV—VI. Passim haud rarus. VII. Károlyváros.

59. *biclavatus* H.-Sch. — Per totum regnum sat frequens.

var. *Schillingi* Scholtz. — Ibidem simul cum stirpe.

60. *sexguttatus* Fabr. — III. Selmeczbánya, Hermánd, Trencsén, Tátrafüred, Késmárk. IV. Bártfa, Vihorlat, Rabaszkala. V. Passim haud rarus. VI. Mehádia. VII. Sv.-Brdo, Vaganski Vrh.

61. *variegatus* Müll. (*striatellus* Fabr.) — I. Passim sat rarus. III. Szélakna, Mons Szitnya. IV. S.-A.-Ujhely, Kis-Azar, Tavarna, Nagy-Károly. V. Passim obvius. VII. Zágráb, Josipdol. VIII. Fiume, Buccari.

62. *Schmidtii* Fieb. — I. Budapest, Péczel. II. Pápa, Zircz. IV. Nagy-Károly. V. Görgény. VI. Mehádia. VII. Ruma, Josipdol.

63. *pilicornis* Panz. — I. Sat frequens. II. Kup. III. Selmeczbánya, Szklenó. IV. Bártfa. VI. Prilipecz. VII. Ruma.

Alloeonotus Fieb.

64. *fulvipes* Scop. (*distinguendus* H.-Sch.) — VII. Károlyváros, Josipdol, Stalak, Breze, Kriviput, Gospić. VIII. Fiume, Orehovica, Buccari, Zengg.

var. *separandus* Horv. — VIII. Josipdol, Kriviput, Gospić, Raduć.

Odontoplatys Fieb.

65. *bidentulus* H.-Sch. — III. Tátra, Késmárk. IV. Bártfa, Borsa. V. Zilah, Görgény, Nagy-Csűr, Szent-Erzsébet, Nagy-Talmács, Nagy-Disznód, Vöröstorony, Korojesd. VI. Mehádia.

(*Grypocoris Meyeri* Kol. ut species generis *Calocoris* e VI. Mehádia enumeratus [Tömösváry, 190] apud nos haud occurrit.)

(*Homodemus M-flavum* Goeze = *marginellus* Fabr. in Hungaria nondum repertus. Specimina e regione IV. sub hoc nomine commemorata [Frivaldszky, 35] ad *Horváthiam hieroglyphicam* M. R., specimina e regione VI. enumerata [Frivaldszky, 36] ad *Brachycoleum scriptum* Fabr. pertinent)

Pycnopterna Fieb.

66. *striata* L. — I. Budapest, Péczel. II. Pécs. III. Tavarnok, Mons Szitnya, Trencsén. IV. Bártfa, Orosz-Ruszka, Kis-Azar. V. Haud rara. VI. Mehádia. VII. Zágráb, Károlyváros, Josipdol, Sv.-Brdo, Vaganski Vrh. VIII. Fiume.

Actinonotus Reut.

67. *pulcher* H.-Sch. — V. Oláh-Toplicza. VII. Karst: Ostri Vrh.

Brachycoleus Fieb.

68. *scriptus* Fabr. — Per totum regnum frequens.

69. *Steini* Reut. VI. Mehádia.

Stenotus Jak.

(*Oncognathus* Fieb.)

70. *binotatus* Fabr. — Per totum regnum sat frequens.

Dichrooscytus Fieb.

71. *intermedius* Reut. — III. Lucski, Tátrafüred. IV. Kőrösmező. V. Borszék, Lomány.

72. *rufipennis* Fall. — III. Csorba, Tátrafüred, Késmárk, Szepes-Béla.

Lygus Hahn.

73. *pabulinus* L. — II. Pápa, Szegszárd. III—V. Passim obvius. VI. Mehádia. VII. Zágráb, Mrzla vodica.

74. *viridis* Fall. — III. Késmárk. V. Szent-Gothárd, Görgény.

75. *contaminatus* Fall. — III. Késmárk. IV. Jászó, Áj. V. Málnás.

76. *apicalis* Fieb. — VIII. Buccari, Cirkvenica.

var. *inops* Horv. — VIII. Buccari, Portoré, Cirkvenica, Grižane, Novi.

77. *Spinolae* Mey. — I. Nagyvárad: Felixfürdő. III. Késmárk. VI. Mehádia. VIII. Fiume, Podvežica, Novi.

78. *lucorum* Mey. — I. Passim haud rarus. II. Simontornya, Bodajk. III. Késmárk. IV. Sat frequens. V. Zilah, Görcsön, Szilágy-Somlyó, Szt-Gothárd, Felső-Bajom, Déva. VI. Albrechtsdorf. VII. Zimony, Kupinovo, Zágráb, Breze, Ljeskovac.

79. *limbatus* Fall. — I. Budapest, Szeged, Com. Szabolcs. III. Késmárk. IV. Varannó-Csemernye. V. Görgény. VI. Mehádia. VII. Károlyváros.

80. *pratensis* L. — Per totum regnum vulgaris.
var. *gemellatus* H.-Sch. — Ibidem simul cum stirpe.
var. *campestris* Fall. (nec L.) — Ibidem ut præcedens.

81. *atomarius* Mey. — V. Zernest. VI. Marilla.

82. *rubricatus* Fall. — I. Bihar-Füred. III. Passim haud rarus. IV. Bártfa, Kőrösmező. V. Passim obvius. VI. Marilla. VII. Ljeskovac.

83. *cervinus* H.-Sch. — VII. Fužine.

84. *montanus* Schill. — III. Késmárk, Tátrafüred. VII. Stalak.

85. *Foreli* Mey. — IV. Salánk. VI. Orsova.

86. *campestris* L. (*Pastinacae* Fall.) — I. Passim obvius. II. Simontornya, Nagy-Kanizsa. III. Késmárk. IV. Haud rarus. V. Görcsön, Ratosnya, Tihucza, Kerczisóra. VI. Fehértemplom, Plavisevicza, Mehádia. VII. Vrdnik, Daruvár, Žutalokva. VIII. Fiume.

87. *Kalmi* L. — Per totum regnum vulgaris.
var. *flavovarius* Fabr. — Ibidem simul cum stirpe.
var. *pauperatus* H.-Sch. — Ut varietas præcedens.

88. *rubicundus* Fall. — In regionibus I. et III—VIII. haud rarus.

Camptozygum Reut.

89. *Pinastri* Fall. — III. Késmárk, Tátrafüred. IV. Zsalobina. VIII. Fiume.

Cyphodema Fieb.

90. *instabile* Luc. — VIII. Fiume, Novi.

Poeciloscytus Fieb.

91. *cognatus* Fieb. — In regionibus I., II., IV. et VI—VII. sat frequens. V. Tihucza.

92. *vulneratus* Wolf. — In regionibus I—IV. et VI—VII. haud rarus.

93. *Asperulae* Fieb. — I. Passim minus rarus. II. Simontornya, Pécs. IV. Almás (Torna), Forró, Bodókő, S.-A.-Ujhely. V. Kolozsvár, Nagy-Enyed, Szt-Gothárd. VI. Petrovoszelo, Deliblat, Duplaj. VIII. Cirkvenica, Buccari.

94. *unifasciatus* Fabr. — Per totum regnum frequens.

95. *brevicornis* Reut. — I. Sat frequens. II. Előszállás, Fonyód. V. Mező-Záh. VI. Deliblat, Grebenácz, Fehértemplom.

Polymerus Hahn.

96. *carpathicus* Horv. — III. Késmárk. V. Nagy-Csűr.

97. *nigrita* Fall. — I. Budapest, Nagyvárad. II. Pápa. III. Pozsony, Késmárk. IV. Varannó-Csemernye. V. Kolozsvár, Zilah, Mező-Záh, Görgény. VI. Mehádia, Orsova, Berzászka, Rumunyest.

98. *holosericeus* Hahn. — I. Kalocsa, Nagyvárad, Miskolcz. II. Tata, Zircz. III. Késmárk. IV—VI. Passim obvius, sed minus frequens. VII. Diakovár, Pozsega, Zágráb.

Charagochilus Fieb.

99. *Gyllenhali* Fall. — In omnibus regionibus frequens.

Liocoris Fieb.

100. *tripustulatus* Fabr. — Per totum regnum vulgaris.
var. *nepeticola* Reut. — I. Kalocsa. II. Simontornya, Zircz. VI. Mehádia. VIII. Sušak, Cirkvenica.

Camptobrochis Fieb.

101. *punctulata* Fall. — Per totum regnum haud rara.

102. *lutescens* Schill. — I—VII. Haud rara. VIII. Buccari.

Capsus Fabr.

103. *ruber* L. (*laniarius* L.) — Per totum regnum frequens.
var. *danicus* Fabr. — Ibidem simul cum stirpe.
var. *tricolor* Fabr. — Ut varietas præcedens.

104. *olivaceus* Fabr. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa, Nagyvárad. II. Pécs, Zala-Szent-Gróth. III. Pozsony. IV. Körtvélyes (Torna), Szádvár, Nagymihály. V. Kolozsvár, Görgény-Szent-Imre, Brassó. VI. Mehádia. VII. Josipdol.
var. *fallax* Horv. — V. Görgény-Szent-Imre.
var. *larvatus* Horv. — I. Isaszeg. II. Szegszárd. IV. Nagymihály. V. Görgény-Szent-Imre, Petrozsény. VI. Resicza.

105. *trifasciatus* L. — I. Budapest, Budakesz, Péczel, Farkasd, Arad. II. Pécs. III. Ujbánya, Késmárk. IV. Körtvélyes (Torna), S.-A.-Ujhely, Szinna. V. Zilah, Göde-Mesterháza, Brassó. VII. Ruma, Josipdol.
var. *regalis* Horv. — I. Péczel, Gödöllő. IV. Körtvélyes (Torna).
var. *bipartitus* Horv. — IV. Körtvélyes (Torna).
var. *rufipes* Fabr. — I. Budapest, Isaszeg. III. Pozsony. IV. Körtvélyes (Torna), Szádvár, Szinna.
var. *annulatus* Germ. — I. Budapest, Péczel, Kalocsa. IV. Körtvélyes (Torna). V. Nagy-Talmács, Borszék.
106. *schach* Fabr. — VIII. Fiume.
107. *rutilus* H.-Sch. — I—II. Passim haud rarus. III. Ujbánya. VI. Grebenácz, Plavisevicza, Orsova. VII. Josipdol.
var. *bellicosus* Horv. — I. Budapest. VI. Orsova.
108. *scutellaris* Fabr. — VI. Ulma, Orsova.
var. *morio* Boh. — Ibidem cum stirpe.
109. *annulipes* H.-Sch. — I. Kalocsa. III. Tátrafüred.

Rhopalotomus Fieb.

110. *ater* L. — I. Dombiratos. IV. Torna. V. Szilágy-Nagyfalu, Palota-Ilva. VI. Mehádia.
var. *tyrannus* Fabr. — Per totum regnum sat frequens.
var. *semiflavus* L. — I—V. Haud rarus. VI. Rumunyest. VII. Zágráb.

Alloeotomus Fieb.

111. *gothicus* Fall. — III. Késmárk. V. Nagyszeben, Kis-Talmács. VII. Josipdol. VIII. Fiume, Vratnik.

Stethoconus Flor.

112. *mamillosus* Flor. — II. Simontornya. IV. Parnó.

Bothynotus Fieb.

113. *pilosus* Boh. — I. Budapest.

Plagiorhamma Fieb.

114. *suturalis* H.-Sch. — I. Budapest, Rákos-Palota, Dános, Szeged. IV. Tarczal, Szomotor. VIII. Meja.

Allodapus Fieb.
(*Eroticoris* D. S.)

115. *rufescens* H.-Sch. — I. Budapest, Rákos-Palota. II. Vörs. III. Pozsony, Késmárk.

Omphalonotus Reut.

116. *quadriguttatus* Kb. — I. Budapest, Budafok, Rákos-Palota, Szeged. II. Simontornya. VII. Verőcze.

Systellonotus Fieb.

117. *triguttatus* L. — In toto regno passim occurrit.

Mimocoris Scott.

118. *coarctatus* M. R. — VIII. Fiume, Buccari, Novi.

Pilophorus Hahn.

119. *cinnamopterus* Kb. — I. Budapest. III. Késmárk. VIII. Vratnik.
120. *clavatus* L. — III. Trencsén, Lucski, Tarnócz, Késmárk. IV. Torna, S.-A.-Ujhely, Széphalom, Varannó. V. Zilah, Törcsvár, Bucsecs. VII. Lokve, Ljeskovac, Plitvica.
121. *perplexus* D. S. — Per totum regnum haud rarus.
122. *pusillus* Reut. — In regionibus I—II. et VI—VIII. passim occurrit.
123. *confusus* Kb. — In regionibus I—VII. minus rarus; in regione VIII. nondum inventus.

Cremnocephalus Fieb.

124. *albolineatus* Reut. (*umbratilis* Fabr.) — III. Sztranszke, Deményfalva, Tátrafüred, Késmárk. IV. Bártfa. VIII. Fiume.

Myrmecophyes Fieb.

125. *albo-ornatus* Stål. — VII. Raduć.

Hyoidea Reut.

126. *notaticeps* Reut. — I. Budapest, Csepel.

Anapus Stål.

127. *longicornis* Jak. (*arenarius* Horv.) — I. Budapest, Rákos-Palota, Kóly. IV. Tarczal. VI. Jazova, Grebenácz.

Euryopocoris Reut.

128. *nitidus* Mey. — I. Debreczen, Nyiregyháza.

Orthocephalus Fieb.

129. *brevis* Panz. — I. Budapest, Szendrő. III. Rajecz, Tátra, Késmárk. IV—V. Passim obvius. VI. Orsova.
130. *mutabilis* Fall. — III. Rajecz.
131. *Ferrarii* Reut. — V. Zilah, Szucsák, Alsó-Zsuk, Csik-Szent-Domokos. VI. Pancsova, Zlaticza, Berzászka, Plavisevicza.
132. *saltator* Hahn. — Per totum regnum frequens.
133. *bilineatus* Jak. — I. Budapest.
134. *bivittatus* Fieb. — I. Budapest, Csepel, Rákos-Palota, Farkasd, Monor, Peszér, Kecskemét, Keczel, Szendrő. II. Szegszárd. IV. Mád, Tarczal, S.-A.-Ujhely, Szomotor.

135. *vittipennis* H.-Sch. — In omnibus regionibus sat frequens.

Pachytomella Reut.

136. *parallela* Mey. — IV. Kőrösmező, Pop-Iván.

Piezocranum Horv.
(*Lamprella* Reut.)

137. *simulans* Horv. (*punctatipenne* Reut.) — I. Budapest, Keczel, Szendrő. IV. S.-A.-Ujhely. VI. Orsova. VII. Ruma.

Strongylocoris Costa.

138. *niger* H.-Sch. — I. Budapest, Ujpest, Szendrő. IV. Tarczal. V. Nagy-Enyed. VII. Károlyváros. VIII. Fiume.

139. *leucocephalus* L. — In omnibus regionibus sat frequens.

Halticus Hahn.

140. *apterus* L. — Per totum regnum vulgaris.

141. *pusillus* H.-Sch. — In regionibus I—II. et IV—VIII. passim haud rarus.

142. *saltator* Geoffr. (*erythrocephalus* H.-Sch.) — I. Budapest, Hadház. IV. Tolcsva. V. Szilágy-Nagyfalu, Nagyszeben. VI. Deliblat, Berzászka, Plavisevicza.

143. *luteicollis* Panz. — In omnibus regionibus haud rarus.
var. *propinquus* H.-Sch. — I. Mező-Kovácsháza. III. Trencsén. IV. Szerencs, Varannó, Nagy-Tarna. V. Tasnád.

Macrolophus Fieb.

144. *nubilus* H.-Sch. — I. Ménes. II. Lajta-Bruck. IV. Torna, Kövesd, Bártfa. V. Nagy-Csűr, Bucsecs, Tihucza. VII. Károlyváros, Breze. VIII. Martinšćica, Buccari, Cirkvenica, Novi, Zengg.

145. *glaucescens* Fieb. — IV. Torna.

Dicyphus Fieb.

146. *pallidus* H.-Sch. — IV. Bártfa. VII. Károlyváros.

147. *constrictus* Boh. — VII. Breze.

148. *errans* Wolff. — Per totum regnum passim occurrit.

149. *Stachydis* Reut. — I. Budapest, Ménes. II. Sárvár. IV. Szádellő, Bártfa. V. Görgény, Brassó, Nagyszeben. VI. Mehádia, Coronini, Szent-Helena, Sikevicza, Oravicza. VII. Zágráb.

150. *geniculatus* Fieb. — I. Budapest, Rákos-Palota. VI. Orsova. VIII. Novi.

151. *globulifer* Fall. — In regionibus I. et III—VIII. sat frequens; in regione II. hucusque haud inventus.

152. *annulatus* Wolff. — VIII. Fiume.

Campyloneura Fieb.

153. *virgula* H.-Sch. — I. Budapest. VIII. Orehovica.

Cyllocoris Hahn.

154. *histrionicus* L. — In regionibus I—V. et VII—VIII. passim occurrit.

155. *flavoquadrimaculatus* De Geer (*flavonotatus* Boh.) — In regionibus I. et IV—VII. haud rarus.

Aëtorhinus Fieb.

156. *angulatus* Fall. — III. Stubnya, Késmárk. IV. Passim obvius. V. Borgo-Prund, Görgény, Székely-Keresztúr, Kovászna, Barczaság, Törcsvár. VII. Zágráb, Pregrada, Fužine.

Globiceps Latr.

157. *sphegiformis* Rossi. — In omnibus regionibus passim minus rarus.

158. *sordidus* Reut. — I. Budapest, Rákos-Palota, Monor.

159. *cruciatus* Reut. (*flavomaculatus* Fieb., nec Fabr.) — Per totum regnum sat frequens.

160. *flavomaculatus* Fabr. (*selectus* Fieb.) — II. Zircz. III. Trencsén, Lucski, Tátra, Késmárk. IV—V. Passim obvius. VII. Mrzla vodica, Ljeskovac. VIII. Fiume.

Mecomma Fieb.

161. *ambulans* Fall. — III. Tátra, Késmárk, Javorina.

Cyrtorrhinus Fieb.

162. *Caricis* Fall. — III. Késmárk.

Orthotylus Fieb.

163. *obscurus* Reut. — VII. Breze.

164. *virens* Fall. — II. Szent-Lőrincz (Baranya). III. Stubnya, Tarnócz, Késmárk. IV. Somodi, S.-A.-Ujhely. V. Törcsvár. VI. Mehádia.

165. *flavinervis* Kb. — IV. Körtvélyes (Torna), Varannó-Csemernye, Bártfa.

166. *marginalis* Reut. (*nassatus* Fall., nec Fabr.) — In regionibus I. et III—VII. passim haud rarus.

167. *nassatus* Fabr. (*striicornis* Kb.) — I. Budapest, Kis-Szent-Miklós, Mende, Szeged. IV. S.-A.-Ujhely. VI. Versecz, Pancsova. VIII. Novi.

168. *viridinervis* Kb. — I. Farkasd, Nagyvárad. III. Késmárk.

169. *prasinus* Fall. — I. Kalocsa.

170. *quercicola* Reut. — I. Farkasd, Kis-Szt-Miklós.
171. *diaphanus* Kb. — II. Tata.
172. *flavosparsus* Sahlb. — Per totum regnum frequens.
173. *virescens* D. S. (*chloropterus* Kb.) — VIII. Fiume.
174. *Schoberiae* Reut. — I. Szeged. IV. S.-A.-Ujhely.
175. *rubidus* Put. — V. Szamosfalva, Drassó, Felső-Bajom.
176. *palustris* Reut. — VIII. Novi.
177. *ericetorum* Fall. — VII. Breze.

Litoxenus Reut.

178. *tenellus* Reut. — VI. Ó-Moldova.

Loxops Fieb.

179. *coccinea* Mey. — V. Brassó.

Heterotoma Latr.

180. *merioptera* Scop. — In omnibus regionibus passim obvia, sed minus frequens.

Platytomatocoris Reut.

181. *planicornis* H.-Sch. — IV. Nagy-Szőllős.

Heterocordylus Fieb.

182. *tumidicornis* H.-Sch. — I. Budapest, Nagyvárad, Eger. II. Pécs, Oroszvár. III. Ujbánya, Isztebnik, Késmárk. IV—V. Passim obvius. VI. Oravicza, Baziás. VII. Károlyváros. VIII. Fiume.
183. *Genistae* Scop. — Per totum regnum sat frequens.
184. *farinosus* Horv. — VIII. Fiume.
185. *leptocerus* Kb. — I. Budapest. II. Pécs. VI. Grebenácz.
186. *tibialis* Hahn. — II. Pécs, Turony. VI. Dunaszoros.
187. *erythrophthalmus* Hahn. — I. Budapest.

Malacocoris Fieb.

188. *chlorizans* Panz. — I. Budapest, Budakesz, Farkasd. III. Késmárk. IV. Körtvélyes (Torna), Jabloncza. V. Tasnád. VII. Vrdnik, Varasd-Teplicz. VIII. Buccari.

Reuteria Put.

189. *Marqueti* Put. — II. Simontornya. VIII. Novi.

Onychumenus Reut.

190. *decolor* Fall. — I. Gödöllő, Kis-Szent-Miklós. II. Nagy-Kapornak. III. Lucski, Késmárk. IV—V. Passim sat frequens. VII. Vrdnik.

Eurycolpus Reut.

191. *flaveolus* Stål. — I. Budapest. III. Késmárk. IV. Almás. V. Nagy-Csűr, Homoród, Brassó.

Oncotylus Fieb.

192. *setulosus* H.-Sch. — I. Budapest, Budafok, Kis-Szent-Miklós, Kecskemét. II. Bodajk, Szegszárd. IV. Jabloncza, S.-A.-Ujhely, Szőllőske, Tokaj. V. Tövis, Nagy-Csűr. VI. Versecz, Deliblat, Baziás, Orsova.
193. *viridiflavus* Goeze. — I. Budapest, Debreczen. V. Zilah.

Acrotelus Reut.

194. *Loewii* Reut. — VI. Petrovoszelo.

Conostethus Fieb.

195. *salinus* Sahlb. — I. Budapest, Soroksár, Farkasd, Kecskemét, Bugacz, Szeged, Hódmező-Vásárhely, Nyiregyháza, Heves. V. Torda. VI. Jazova, Padé, Tisza-Hegyes.
(*roseus* Fall. apud nos hucusque haud inventus; specimen sub hoc nomine e regione V. commemoratum [Fieber, 23, Fuss, 41] ad speciem præcedentem pertinet.)

Solenoxyphus Reut.

196. *fuscovenosus* Fieb. — I. Szoboszló, Dorozsma. II. Sárbogárd.

Placochilus Fieb.

197. *seladonicus* Fall. — III. Késmárk. V. Szucsák. VII. Zágráb.

Hoplomachus Fieb.

198. *Thunbergi* Fall. — In omnibus regionibus sat frequens.

Tinicephalus Fieb.

199. *hortulanus* Mey. — I. Budapest, Szendrő. II. Pécs. V. Gyergyó-Szent-Miklós. VII. Breze.

Megalocoleus Reut.

(*Macrocoleus* Fieb.)

200. *pilosus* Schr. (*Tanaceti* Fall.) — VI. Orsova.
201. *exsanguis* H.-Sch. — I. Budapest, Szeged. II. Fonyód. IV. Szomotor. V. Szucsák. VI. Grebenácz, Baziás.
202. *Mellae* Reut. — VII. Vrdnik.
203. *dissimilis* Reut. — I. Budapest, Farkasd. II. Pécs. IV. Tarczal. VI. Jazova.

204. *molliculus* Fall. — I. Monor. III. Trencsén. IV. Torna. V. Szucsák, Barczaság. VII. Ostrovica, Žutalokva, Otočac, Gospić.
205. *ochroleucus* Kb. — In regionibus I—VII. minus frequens.
206. *longirostris* Fieb. — I. Budapest, Isaszeg, Hódmező-Vásárhely. VI. Jazova, Padé.

Amblytylus Fieb.

207. *nasutus* Kb. — In regionibus I—VI. passim haud rarus.
208. *concolor* Jak. — I. Sat frequens. II. Duna-Földvár, Szegszárd, Magyar-Óvár, Oroszvár. IV. Tarczal. VI. Mehádia, Jazova, Padé. VII. Vrdnik.
209. *testaceus* Reut. — I. Budapest, Szeged.
(*affinis* Fieb. in Hungaria hucusque haud repertus; specimen sub hoc nomine e III. Zsolna enumeratum [Brancsik, 10] ad *A. nasutum* Kb. pertinet.)

Macrotylus Fieb.

210. *quadrilineatus* Schrk. — III. Pozsony, Com. Trencsén. IV. Szádellő, Körtvélyes (Torna), Kapnikbánya. V. Zilah, Tusnád, Törcsvár, Cetate Boli. VI. Mehádia. VII. Daruvár, Zágráb, Podsused, Delnice, Breze.
211. *elevatus* Fieb. — I. Budapest.
212. *Herrichii* Reut. — Per totum regnum passim haud rarus.
213. *solitarius* Mey. — I. Budapest, Szeged. IV. Körtvélyes (Torna). VI. Orsova. VII. Vrdnik.
214. *Horváthi* Reut. — In regionibus I., II., IV. et VI—VII. passim obvius.
215. *Paykulii* Fall. — In regionibus III—V. et VII—VIII. haud rarus.
216. *atricapillus* Scott. — VIII. Martinšćica, Buccari, Cirkvenica, Novi.

Harpocera Curt.

217. *thoracica* Fall. — In toto regno passim occurrit.

Byrsoptera Spin.

218. *rufifrons* Fall. — Per totum regnum sat frequens.
219. *cylindricollis* Costa. — I. Budapest, Szent-Endre, Farkasd. II. Magyar-Óvár. III. Ujbánya. VI. Fehértemplom, Zlaticza, Plavisevicza, Orsova. VIII. Novi.

Brachyarthrum Fieb.

220. *limitatum* Fieb. — IV. Máramaros: Csernagora.

Phylus Hahn.

221. *melanocephalus* L. — I. Budapest, Isaszeg. II. Pécs. IV. Jabloncza, Nagy-Károly. V. Pele-Szarvad, Nagyszeben, Nagy-Csűr. VI. Orsova.
222. *Coryli* L. — Per totum regnum haud rarus.
223. *plagiatus* H.-Sch. — III. Késmárk. IV. Bártfa.

Plesiodema Reut.

224. *pinetellum* Zett. — III. Tátra. (Irrite e VIII. Fiume commemoratum [Brancsik, 14]).

Psallus Fieb.

225. *Kolenatii* Flor. — III. Késmárk, Tátrafüred, Sztranszke. V. Domuk.
226. *ambiguus* Fall. — I. Eger. III. Tátra, Késmárk. IV. Körtvélyes (Torna), Kis-Azar. V. Görgény, Kovászna.
227. *betuleti* Fall. — I. Budapest. V. Görgény.
228. *chrysopsilus* Reut. — III. Tátra, Késmárk. IV. Kőrösmező.
229. *obscurellus* Fall. — III. Késmárk, Mons Manin (Trencsén).
230. *Laricis* Reut. — I. Kalocsa. III. Pozsony, Késmárk, Tátrafüred.
231. *variabilis* Fall. — I. Budapest, Gödöllő, Kalocsa. II. Köpcsény. III. Pozsony. IV—V. Passim obvius. VI. Szvinicza. VIII. Fiume, Podvežica, Buccari.
232. *simillimus* Kb. — IV. Bártfa, Csicsva.
233. *Quercus* Kb. — I. Budapest, Gödöllő, Keczel. II. Pécs. III. Pozsony. IV. Torna. V. Zilah. VI. Orsova. VIII. Sušak, Buccari.
234. *Scholtzii* Fieb. — III. Tátra, Késmárk. V. Törcsvár.
235. *lepidus* Fieb. — I. Budapest, Horgos. III. Rajecz.
236. *Fallénii* Reut. (*roseus* Fall., nec Fabr.) — III. Késmárk.
237. *varians* H.-Sch. — IV. Körtvélyes (Torna), Bártfa, Kis-Azar, Tolcsva. V. Halmosd, Görgény, Kovászna, Málnás, Nagy-Csűr. VI. Mehádia. VII. Kriviput. VIII. Fiume, Buccari, Cirkvenica, Novi, Zengg.
238. *diminutus* Kb. — I. Budapest. II. Simontornya. III. Com. Trencsén. IV. Körtvélyes (Torna), Csicsva. V. Nagy-Csűr. VIII. Buccari.
239. *luridus* Reut. — III. Tátrafüred, Késmárk.
240. *lapponicus* Reut. — III. Lucski, Csorba, Tátrafüred. IV. Bártfa. V. Gyergyó-Vasláb. VII. Breze.
241. *pinicola* Reut. — III. Sztranszke, Lucski, Csorba, Tátrafüred. IV. Bártfa, Kőrösmező. V. Lomány.

242. *roseus* Fabr. — III. Késmárk. IV. Kőrösmező. VII. Ljeskovac.
243. *vitellinus* Scholtz. — III. Tátrafüred. V. Tihucza.
244. *salicellus* Mey. — IV. Bártfa, Körtvélyes (Torna), Jabloncza.
245. *Absinthii* Scott. — VIII. Martinšćica, Novi.
246. *pumilus* Jak. — I. Budapest, Szeged. V. Torda, Szamosfalva. VII. Čerević.

Atractotomus Fieb.

247. *tigripes* M. R. — In omnibus regionibus haud rarus.
248. *Mali* Mey. — I. Budapest, Gödöllő, Kalocsa. II. Pécs, Köpcsény. III. Trencsén, Késmárk. IV. Jászó, Szinna. V. Zilah, Görgény, Borgo-Prund. VI. Futtak, Mehádia.
249. *magnicornis* Fall. — III. Rajecz, Stubnya, Lucski, Tátrafüred, Késmárk, Dobsina. IV. Bártfa, S.-A.-Ujhely. V. Domuk. VI. Korniaréva. VII. Breze.

Criocoris Fieb.

250. *nigripes* Fieb. (*tarsalis* Reut.) — III. Pozsony, Késmárk, IV. Bártfa, Körtvélyes (Torna). V. Görgény, Tihucza, Csik-Szent-Domokos, Zernest, Vöröstorony. VI. Zlaticza. VII. Stalak.
251. *longicornis* Reut. — III. Késmárk. V. Görcsön.
252. *crassicornis* Hahn. — Per totum regnum haud rarus.
253. *apicalis* Reut. — VIII. Fiume, Sušak.
254. *sulcicornis* Kb. — I. Budapest, Rákos-Palota, Gödöllő, Szeged. II. Tata, Nagy-Kapornak, Szent-Lőrincz (Baranya). IV. Almás, S.-A.-Ujhely, Szőllőske, Varannó. V. Pele-Szarvad, Alsó-Zsuk. VI. Mehádia. VII. Vrdnik. VIII. Fiume, Cirkvenica.

Plagiognathus Fieb.

255. *bipunctatus* Reut. — I. Budapest, Kis-Szent-Miklós, Isaszeg, Kalocsa, Kecskemét, Paulis, Gyoma, Nyiregyháza. II. Tata, Szent-Lőrincz (Baranya). IV. S.-A.-Ujhely, Szőllőske. VI. Temesvár, Ujvidék. VII. Pétervárad, Ó-Pazua.
var. *picticornis* Horv. — I. Budapest, Isaszeg, Bánhegyes. II. Szent-Lőrincz (Baranya). V. Drassó, Tövis, Mező-Záh, Görgény. VI. Jazova, Orsova.
256. *alpinus* Reut. — I. Fadd, Miskolcz. III. Stubnya, Lucski, Ajnácskő. IV. Torna, Szádellő, Körtvélyes (Torna), Somodi. V. Déva, Ratosnya. VI. Plavisevicza. VII. Vrdnik, Ljeskovac.
257. *pictus* Fieb. — I. Farkasd. V. Mező-Záh. VI. Jazova.
258. *Chrysanthemi* Wolff (*viridulus* Fall.). — Per totum regnum frequens.
259. *fulvipennis* Kb. — In regionibus I. et III—VIII. haud rarus; in regione II. hucusque haud repertus.
260. *arbustorum* Fabr. — Per totum regnum sat frequens.
var. *brunnipennis* Mey. — Ibidem simul cum stirpe.
261. *albipennis* Fall. — In omnibus regionibus frequens.
var. *lanuginosus* Jak. — I. Budapest. IV. Torna, Szinna. V. Szamosfalva. VIII. Cirkvenica.
var. *pallidus* Dahlb. — I. Budapest, Pusztaszer. II. Sárbogárd, Badacsony. IV. Forró, Mád, Varannó. V. Zilah. VIII. Grižane.
(*fusciloris* Reut. apud nos haud occurrit; specimina sub hoc nomine ex Hungaria commemorata [Horváth, 119] sunt = *P. bipunctatus* Reut. var. *picticornis* Horv.)

Atomoscelis Reut.

262. *onustus* Fieb. — In regionibus I—IV. et VI. passim frequens.

Chlamydatus Curt.

263. *pulicarius* Fall. — I—VI. Valde frequens. VII. Pregrada. VIII. Fiume.
264. *pullus* Reut. — In regionibus I—VII. frequens.
265. *saltitans* Fall. — I. Budapest, Péczel, Ecseg, Bánhegyes, Szoboszló, Hadház, Kóly. III. Pozsony, Késmárk. IV. Torna, Körtvélyes (Torna), Tolcsva, Tárkány, Czigánd, Lasztócz. V. Görgény.
266. *evanescens* Boh. — I. Budapest. III. Trencsén. IV. Szádellő.

Neocoris D. S.

267. *nigritulus* Zett. — I. Kecskemét.
268. *Bohemani* Fall. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa, Szeged. II. Zákány. III. Trencsén, Késmárk. IV. S.-A.-Ujhely, Szinnaikő. VI. Ujvidék. VII. Pétervárad, Eszék.

Campylomma Reut.

269. *Verbasci* H.-Sch. — Per totum regnum haud rara.

270. *simillima* Jak. — I. Budapest, Kecskemét. VI. Deliblat.

Sthenarus Fieb.

271. *dissimilis* Reut. — IV. Bártfa.
272. *modestus* Mey. — II. Pécs. VI. Mehádia.
273. *maculipes* Reut. — I. Budapest, Gödöllő. VI. Orsova.
274. *Roseri* H.-Sch. — I. Kis-Szent-Miklós, Péczel, Gödöllő, Szeged. II. Pápa. III. Trencsén, Késmárk. IV. Torna, Szőllőske, Varannó. VI. Resicza, Mehádia, Deliblat. VII. Vrdnik, Zágráb. VIII. Fiume.
275. *Rotermundi* Scholtz. — I. Budapest, Kalocsa, Szeged. II. Fadd. IV. S.-A.-Ujhely.

Paredrocoris Reut.

276. *pectoralis* Reut. — I. Budapest, Budafok, Kis-Szent-Miklós, Péczel, Farkasd. VI. Duplaj.

Asciodema Reut.

277. *obsoletum* D. S. — V. Brassó.

Tuponia Reut.

278. *prasina* Fieb. — III. Késmárk. IV Bártfa, Varannó-Csemernye, Zsalobina, Dobra. V. Domuk, Tömös, Törcsvár, Felek, Rea, Hátszeg.

Isometopus Fieb.

279. *intrusus* H.-Sch. — V. Görgény-Szent-Imre. VI. Orsova. VII. Vrdnik.

Fam. SALDIDAE.

Salda Fabr.

1. *litoralis* L. — III. Pozsony.
2. *oculata* Müll. (*flavipes* Fabr.) — III. Trencsén, Turcsek, Tátra, Késmárk, Szepes-Béla.
3. *Brancsikii* Reut. — III. Vallis Vratna, Késmárk, Szepes-Béla.
4. *riparia* Fall. — III. Tátra, Lucsivna, Deményfalva.
5. *nobilis* Horv. — III. Tátra, Késmárk.
6. *variabilis* H.-Sch. — III. Kékkő, Trencsén, Tátra, Késmárk. IV. Sáros, Orosz-Ruszka, Szinnaikő. V. Mező-Záh. Torda, Porcsesd, Czód, Ponor, Petrozsény, Livazény. VIII. Fiume.
   var. *connectens* Horv. — V. Zilah. VI. Baziás.
7. *scotica* Curt. — III. Trencsén, Vallis Vratna, Vriczkó, Znióváralja, Koritnyicza, Tátra, Késmárk, Javorina. IV. Szinna, Kőrösmező. V. Szurduk, Ohába, Livazény, Retyezát. VI. Mehádia. VIII. Fiume.
8. *Henschii* Reut. — III. Késmárk, Szepes-Béla.
9. *orthochila* Fieb. — II. Zircz. III. Trencsén, Koritnyicza, Lucski, Lacus Csorbaënsis, Tátra, Késmárk, Javorina. IV. Kőrösmező, Kapnikbánya. V. Zilah, Görgény, Tihucza, Bucsecs, Malomviz.
10. *amplicollis* Reut. — VII. Gospić.
11. *saltatoria* L. — I—V. Sat frequens. VII. Mrzla vodica. VIII. Fiume.
12. *C-album* Fieb. — I. Ujpest. II. Duna-Örs. III. Pozsony, Vallis Vratna, Liptó-Tepla, Tátra, Késmárk. IV. Bártfa, Szádellő, Tokaj. V. Görgény, Brassó. VI. Mehádia. VII. Mrzla vodica.
13. *melanoscela* Fieb. — I. Budapest, Kecskemét, Hadház, Com. Szabolcs. II. Csopak, Duna-Örs. III. Tátra, Késmárk. IV. Passim frequens. V. Déva, Felső-Farkadin. VI. Mehádia, Szent-Helena, Baziás, Palics. VII. Vrdnik, Ruma, Fužine. VIII. Novi.
14. *opacula* Zett. var. *marginella* Put. (nec Fieb.) — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa, Foktű, Dorozsma, Szeged, Dombiratos. II. Simontornya, Keszthely, Duna-Örs. IV. Passim haud rara. VIII. Novi.
15. *pilosella* Thoms. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa, Debreczen, Hadház, Nyiregyháza. II. Velencze, Almádi. IV. Torna, Szín, S.-A.-Ujhely, Czéke, Szomotor, Páczin, Szerencs. V. Szamosfalva, Szt-Gothárd. VI. Palics, Pancsova, Kubin, Grebenácz.
16. *pallipes* Fabr. — In regionibus I—VII. frequens.
   var. *dimidiata* Curt. — I. Kalocsa, Hadház, Nyiregyháza. III. Pozsony, Lacus Csorbaënsis. IV. Rad. VI. Pancsova, Baziás. VIII. Novi.
   var. *luctuosa* Westh. — I. Budapest, Kalocsa, Eger, Nyiregyháza. IV. Tokaj, Páczin, Czéke. VII. Eszék.
17. *arenicola* Scholtz. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa, Szegvár. III. Vallis Vratna, Felka, Késmárk. IV. Czéke, Szomotor. V. Zilah, Oltszem, Tömös, Ponor, Livazény, Borbátvíz, Ohába. VI. Resicza, Mehádia.
   var. *connectens* Reut. — I. Kalocsa. III. Késmárk. V. Déva, Tusnád. VII. Ostrovica.
   var. *simulator* Reut. — I. Budapest. II. Badacsony, Mocsolád. III. Tátra, Késmárk.
18. *xanthochila* Fieb. — I. Kecskemét, Kalocsa, Foktű.
19. *lateralis* Fall. — V. Szamosfalva, Torda, Persány.
   var. *pulchella* Curt. — Ibidem cum stirpe.

var. *eburnea* Fieb. — V. Szamosfalva, Torda, Vizakna, Székely-Udvarhely.

20. *cincta* H.-Sch. — I—IV. Passim haud rara. VI. Berzászka. VII. Ruma, Varasd.

21. *Cocksii* Curt. — I. Rákos-Palota, Kis-Szent-Miklós, Kalocsa, Hadház. II. Simontornya, Keszthely, Pápa, Nezsider. III. Késmárk, Szepes-Béla. IV. Torna, Tolcsva. V. Zilah, Székely-Udvarhely, Nagyszeben, Nagy-Csűr. VII. Eszék, Károlyváros, Mrzla vodica.

(*bifasciata* Thoms. apud nos haud occurrit; species sub hoc nomine ex Hungaria commemorata [Puton, Synopsis des Hémiptères-Hétéroptères de France I. p. 195] est = *S. Brancsikii* Reut.)

Leptopus Latr.

22. *marmoratus* Goeze (*boopis* Geoffr.). — II. Felső-Örs, Balaton-Füred. III. Késmárk. IV. Torna, Komjáti, Szerencs, Tokaj, Szőllőske. VI. Mehádia. VII. Pétervárad.

Erianotus Fieb.

23. *lanosus* Duf. — Specimina duo in Hungaria (forsitan ad VI. Mehádiam) collecta in Museo Berolinensi asservantur.

Sectio. HYDROCORISAE.

Fam. NAUCORIDAE.

Aphelocheirus Westw.

1. *aestivalis* Fabr. — III. Tátra: Lacus «Hosszutó» dictus. VII. Pregrada.

Naucoris Fabr.

2. *cimicoides* L. — Per totum regnum frequens.

Fam. NEPIDAE.

Nepa L.

1. *cinerea* L. — In toto regno frequens.

Ranatra Fabr.

2. *linearis* L. — I—VI. Frequens. VIII. Orehovica.

Fam. NOTONECTIDAE.

Notonecta L.

1. *glauca* L. — Per totum regnum valde frequens. var. *maculata* Fabr. (*umbrina* Fieb.) — VIII. Orehovica.

2. *lutea* Müll. — I. Debreczen.

Plea Leach.

3. *minutissima* Fabr. — In omnibus regionibus passim frequens.

Fam. CORIXIDAE.

Corixa Geoffr.

1. *Geoffroyi* Leach. — I—VI. Haud rara. VII. Ó-Pazua. VIII. Fiume.

2. *affinis* Leach (*atomaria* Fieb.). — I. Budapest, Rákos-Palota, Kun-Szent-Miklós, Kecskemét, Kalocsa, Szeged. II. Tapolcza. III. Trencsén. VI. Doroszló, Károlyfalva.

3. *Fussi* Fieb. — V. Szamosfalva, Torda, Felső-Bajom, Vizakna.

4. *hieroglyphica* Duf. — Per totum regnum vulgaris.

5. *Sahlbergi* Fieb. — II. Csibrák. V. Kolozsvár, Nagy-Ajta, Nagyszeben.

6. *Linnéi* Fieb. — In regionibus I—II. et IV—VI. haud rara.

7. *limitata* Fieb. — IV. Passim minus rara. V. Szilágy-Nagyfalu, Görcsön, Szamosfalva, Mező-Záh, Mező-Czikud, Nagy-Ajta, Nagyszeben. VI. Csősztelek, Pancsova. VIII. Orehovica.

8. *semistriata* Fieb. — III. Késmárk. IV. Bártfa, Czéke, Tokaj. V. Gyeke.

9. *parallela* Fieb. — IV. Bréb.

10. *striata* L. — Per totum regnum sat frequens.

11. *Fallénii* Fieb. — In regionibus I—VII. frequens; in regione VIII. hucusque haud reperta.

12. *distincta* Fieb. — I. Budapest, Rákos-Palota.

13. *moesta* Fieb. — III. Késmárk. VIII. Orehovica.

14. *Fabricii* Fieb. — In regionibus II—VI. et VIII. passim haud rara.
var. *nigrolineata* Fieb. — Ibidem simul cum stirpe.

15. *praeusta* Fieb. — IV. Bártfa.

16. *concinna* Fieb. — I. Budapest, Szent-Endre, Kecskemét, Szeged, Gyoma, Hadház, Com. Szabolcs. II. Bodajk, Berhida. III. Rozsnyó. IV. Szerencs. V. Szent-Gothárd. VI. Károlyfalva, Grebenácz, Fehértemplom, Kubin, Pancsova.

17. *cavifrons* Thoms. — III. Lacus Csorbaënsis. V. Lacus «Szent-Anna tó» dictus.

18. *Rogenhoferi* Fieb. — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa, Tápé, Szentes. V. Szamosfalva, Felső-Bajom. VI. Titel, Károlyfalva, Fehértemplom, Kubin, Pancsova.
19. *coleoptrata* Fabr. — I. Budapest, Kalocsa, Hódmező-Vásárhely, Hadház, Com. Szabolcs. III. Trencsén. IV. Tokaj, Király-Helmecz, Páczin, S.-A.-Ujhely. V. Gyeke, Brassó. VI. Pékla. Tria specimina macroptera (*fasciolata* M. R.) ad I. Budapest. V. Görcsön et VI. Fehértemplom. (*dentipes* Thoms. in Hungaria hucusque haud reperta; species sub hoc nomine e III. Trencsén enumerata [Brancsik, 12] est = *Geoffroyi* Leach.)

Micronecta Kirkaldy.

(*Sigara* Leach, nec Fabr.)

20. *Scholtzi* Fieb. — I. Budapest, Kalocsa. V. Mező-Záh, Görcsön.
21. *pusilla* Horv. — I. Nyiregyháza. VI. Titel, Károlyfalva, Fehértemplom.
22. *minutissima* L. — III. Késmárk. IV. Gercsely.
23. *distans* Rey. — V. Mező-Czikud, Gyeke.

Subordo. HOMOPTERA.

Sectio. AUCHENORHYNCHA.

Fam. JASSIDAE.

Alebra Fieb.

1. *albostriella* Fabr. — I. Budapest, Farkasd, Makó. II. Zircz, Simontornya, Pécs. III. Nemes-Podhrágy, Trencsén. IV. Szala, Imreg. V. Tasnád, Görgény, Besztercze. VI. Orsova. VII. Verőcze, Breze. VIII. Buccari, Sv.-Jelena, Selce, Novi.
var. *fulveola* H.-Sch.—V. Besztercze. VII. Vrdnik.
var. *discicollis* H.-Sch. — II. Zircz.

Erythria Fieb.

2. *Manderstjernae* Kb. — III. Trencsén, Tátra, Késmárk, Javorina. IV. Kapnikbánya. V. Görgény, Retyezát. VII. Stalak.
3. *Montandoni* Put. — III. Késmárk. IV. Szádelő, Kapnikbánya. V. Zilah, Kásapatak.
4. *aureola* Fall. — III. Lucski. VII. Podsused, Károlyváros.

Dicraneura Hardy.

5. *stigmatipennis* M. R. — IV. Csicsva. VIII. Novi.
6. *agnata* Leth. — III. Stubnya. IV. Varannó.
7. *flavipennis* Fabr. — I. Peszér. II. Székesfehérvár, Simontornya. IV. S.-A.-Ujhely, Varannó.
8. *mollicula* Boh. — In regionibus I—II. et IV—VII. minus rara.
9. *citrinella* Zett. — III. Lucski, Késmárk.
10. *Fieberi* Löw. — III. Árvaváralja, Oszadka. IV. Juszko-Volya, Szécs-Polyánka, Gyula. V. Zilah, Görgény. VI. Fehértemplom.
11. *sinuata* Then. — VIII. Fiume.

Chlorita Fieb.

12. *flavescens* Fabr. — Per totum regnum valde frequens.
13. *viridula* Fall. — In regionibus I—II. et IV—VIII. haud rara.
14. *tessellata* Leth. — I. Budapest, Göd, Monor, Peszér, Kecskemét, Szeged. II. Siófok, Fonyód. VI. Deliblat.
15. *vittata* Leth. — I. Pusztaszer. IV. S.-A.-Ujhely, Torna, Hidvég-Ardó. V. Mező-Czikud. VI. Versecz. VIII. Fiume, Buccari, Cirkvenica, Novi, Zengg.
16. *bipunctata* Osch. (*frontalis* Leth.) — I. Budapest, Farkasd, Gyoma. II. Simontornya, Szilas-Balhás, Szent-Lőrincz (Baranya). IV. S.-A.-Ujhely, Széphalom. V. Nagy-Enyed, Szent-Gothárd. VI. Deliblat.

Empoasca Walsh.

(*Kybos* Fieb.)

17. *smaragdula* Fall. — Per totum regnum sat frequens.

Eupteryx Curt.

18. *vittata* L. — Nagyvárad: Félixfürdő. IV. S.-A.-Ujhely, Tavarna, Ránk, Bártfa. V. Görgény, Tihucza, Kerczisóra. VI. Coronini.
19. *Wallengreni* Stål — I. Budapest, Göd, Szendrő. II. Zircz, Szilas-Balhás. III. Borosznó, Stubnya, Lucski. IV—V. Passim haud rara. VI. Grebenácz, Zlaticza. VII. Vrdnik, Lipik, Zágráb, Kraj.
20. *Artemisiae* Kb. — IV. S.-A.-Ujhely, Hidas-Németi. V. Szamosfalva. VI. Berzászka.
21. *Germari* Zett. — III. Stubnya, Lucski, Tátrafüred, Késmárk, Tátraháza.
22. *Loewii* Then. — V. Brassó.
23. *concinna* Germ. — I. Budapest, Farkasd. II. Zircz. IV. Szécs-Polyánka, Bánszka. VII. Vrdnik. VIII. Cirkvenica, Selce.
24. *pulchella* Fall. — II. Zircz, Simontornya. IV. S.-A.-Ujhely. V. Besztercze.

25. *tenella* Fall. — I. Budapest. II. Duna-Földvár. VI. Versecz.
26. *ornata* Leth. — V. Görgény, Tihucza.
27. *atropunctata* Goeze (*Carpini* Geoffr.) — In regionibus I—VII. valde frequens; in regione VIII. nondum inventa.
28. *aurata* L. — I. Felső-Tárkány. II. Pápa, Sárvár. III. Késmárk, Tátraháza. IV. Szádellő, Csicsva. V. Passim frequens. VI. Mehádia, Szvinicza. VII. Zágráb, Sv.-Križ.
29. *Urticae* Fabr. — In regionibus I—VII. vulgaris.
30. *immaculatifrons* Kb. — II. Simontornya, Sárvár. V. Tihucza.
31. *Curtisii* Flor. — Per totum regnum frequens.
32. *Melissae* Curt. — II. Haud rara. III. Ajnácskő. IV. Torna, Szádellő, Juszko-Volya, Zsalobina. V. Szent-Gothárd, Gyeke, Mező-Záh, Ratosnya. VI. Ujvidék, Baziás. VII. Pétervárad, Ljeskovac, Plitvica. VIII. Fiume, Martinšćica, Novi, Zengg.
33. *Zelleri* Kb. (*Putoni* Leth.) — VIII. Sušak, Martinšćica, Buccari, Cirkvenica, Selce, Novi. (*Filicum* Newm. apud nos hucusque haud reperta; specimen irrite sub hoc nomine e VII. Plitvica enumeratum [Horváth, 111] est = *Zygina alneti* Dahlb.)

Typhlocyba Germ.

34. *cruenta* H.-Sch. — IV. Kapnikbánya.
35. *sexpunctata* Fall. — I. Budapest. II. Zircz. VI. Kazán.
36. *nitidula* Fabr. — I. Budapest.
37. *ficaria* Horv. — VIII. Fiume, Buccari, Cirkvenica, Selce, Novi.
38. *candidula* Kb. — I. Budapest, Rákos-Palota, Göd.
39. *Rosae* L. — Per totum regnum sat frequens.
40. *salicicola* Edw. — I. Budapest. IV. Szécs-Polyánka. V. Brassó.
41. *Hippocastani* Edw. — IV. Varannó.
42. *Lethierryi* Edw. — II. Zircz. IV. Bánszka. V. Görgény, Besztercze, Tihucza. VII. Breze.
43. *gratiosa* Boh. — II. Sárvár.
44. *callosa* Then. — VII. Breze.
45. *Ulmi* L. — I. Budapest, Sajó-Kaza. V. Görgény.
46. *Quercus* Fabr. — I. Farkasd. II. Zircz. IV. Szala, Bánszka. V. Besztercze. VII. Vrdnik.
47. *tenerrima* H.-Sch. — I. Budapest, Gödöllő, Kis-Szent-Miklós. II. Simontornya, Pécs, Sárvár. VIII. Buccari, Sv.-Jelena, Cirkvenica, Selce.

Zyginella Löw.

48. *pulchra* Löw. — VII. Podsused. VIII. Fiume, Martinšćica, Novi.
49. *albifrons* Horv. — VIII. Sv.-Juraj.
var. *erubescens* Horv. — Ibidem cum stirpe.

Zygina Fieb.

50. *alneti* Dahlb. — IV. Varannó. V. Besztercze, Tihucza, Tömös. VII. Plitvica.
51. *ochroleuca* Horv. — VI. Orsova.
52. *dorsalis* Horv. — II. Simontornya. VIII. Buccari, Selce.
53. *nivea* M. R. — I. Kis-Szent-Miklós, Kecskemét, Szeged.
var. *punctulum* M. R. — I. Budapest, Kis-Szent-Miklós, Kecskemét. III. Ujbánya.
var. *Tithide* Ferr. — I. Budapest, Rákosfalva, Kecskemét, Bugacz, Szeged, Foktű.
54. *scutellaris* H.-Sch. — I. Paulis. V. Csik-Szent-Domokos. VI. Deliblat. VIII. Fiume, Sušak, Martinšćica, Cirkvenica, Novi, Zengg, Carlopago.
55. *Signoreti* Leth. — VI. Duplaj.
56. *Tamaricis* Put. — V. Rea, Csik-Szent-Domokos, Domuk.
57. *parvula* Boh. — Per totum regnum minus rara.
58. *versuta* Melich. — VIII. Fiume.
59. *fasciaticollis* Rey. — IV. Szőllőske. VIII. Cirkvenica.
60. *bisignata* M. R. — VIII. Sušak, Selce, Novi.
61. *Krueperi* Fieb. — II. Simontornya. VIII. Martinšćica, Buccari, Sv.-Jelena, Cirkvenica, Selce.
62. *rorida* M. R. — VIII. Fiume, Buccari, Cirkvenica.
63. *rosea* Flor. — I. Budapest. VII. Podsused.
64. *flammigera* Geoffr. (*blandula* Rossi.) — I. Budapest, Kis-Szent-Miklós. II. Sárvár, Pécs. IV. S.-A.-Ujhely. VII. Podsused.
var. *suavis* Rey. — I. Farkasd, Kecskemét, Szeged. IV. Tarczal.
65. *Tiliae* Geoffr. — I. Budapest. II. Sárvár. IV. Bereczki. VI. Marilla. VII. Podsused.
66. *angusta* Leth. — I. Budapest, Kis-Szent-Miklós. IV. Tolcsva, Kapnikbánya. V. Tasnád.
67. *discolor* Horv. — VIII. Selce, Jablanac.
68. *simplex* Ferr. — I. Nagy-Kovácsi.
69. *Frauenfeldi* Leth. — I. Budapest.
70. *Hyperici* H.-Sch. — I. Budapest, Monor. II. Simontornya. IV. Varannó.

Gnathodus Fieb.

71. *punctatus* Thunb. — Per totum regnum valde frequens.
72. *angustus* Then. — I. Budapest, Dunakesz, Monor, Jász-Kerekegyház. II. Simontornya, Szilas-Balhás, Badacsony. VII. Breze. VIII. Fiume, Martinšćica, Sv.-Jelena, Grižane.

Cicadula Zett.

73. *Cyanae* Boh. — IV. Tarczal, Széphalom.

74. *Warioni* Leth. — I. Isaszeg, Felső-Pakony. II. Simontornya. IV. Varannó, Juszko-Volya. V. Szamosfalva, Szent-Gothárd, Borgo-Prund, Tömös, Felső-Bajom, Drassó, Déva. VI. Ujvidék.

75. *sexnotata* Fall. — Per totum regnum vulgaris.
var. *diminuta* Leth. — I. Kecskemét, Dorozsma. II. Simontornya, Kup. IV. Varannó. V. Zilah, Pele-Szarvad. VII. Vrdnik.

76. *punctifrons* Fall. — I. Szeged, Nagyvárad, Miskolcz. II. Simontornya, Zákány. III. Kis-Kriván, Lucski, Késmárk. IV. Szikszó, Málcza, Varannó-Csemernye. VI. Futtak. VII. Pétervárad.
var. *repleta* Fieb. — II. Zákány. IV. S.-A.-Ujhely.

77. *tetrasticta* Horv. — II. Zákány.

78. *variata* Fall. — III. Késmárk. IV. Kassa. V. Szent-Gothárd. VI. Titel.

79. *metria* Flor. — III. Pozsony.

Grypotes Fieb.

80. *pinetellus* Boh. — III. Stubnya.

81. *illyricus* Kb. — I. Budapest. VI. Deliblat, Grebenácz, Berzászka, Orsova. VII. Vrdnik. VIII. Fiume, Orehovica, Buccari.

Doratura Sahlb.

82. *impudica* Horv. — I. Budapest, Budafok, Paulis, Eger, Szendrő. II. Pécs. IV. Torna, Szádvár, Szőllőske, Tarczal, Király-Helmecz, Királyháza. V. Szamosujvár, Szükerék, Szucsák, Medgyes. VI. Versecz, Baziás. VII. Pétervárad.

83. *stylata* Boh. — In regionibus I—VII. sat frequens; in regione VIII. hucusque haud inventa.

84. *homophyla* Flor. — In regionibus I—II. et IV—VIII. haud rara.

Aconura Leth.

85. *pallifrons* Horv. — VI. Deliblat, Duplaj, Berzászka.

86. *margaritacea* Horv. — I. Göd.

87. *quadrum* H.-Sch. (*Putoni* Leth.) — I. Budapest, Kecskemét, Horgos. II. Fonyód.

Henschia Leth.

88. *acuta* Löw (*seticauda* Leth.) — I. Budapest.

Graphocraerus Thoms.

89. *ventralis* Fall. — In regionibus I—VII. passim minus rara. VIII. Fiume.

Phlepsius Fieb.

90. *intricatus* H.-Sch. — I. Budapest, Visegrád, Szendrő. II. Pécs. IV. Torna. VI. Baziás. VII. Vrdnik. VIII. Fiume, Cirkvenica, Selce, Novi, Jablanac.

Thamnotettix Zett.

91. *fenestratus* H.-Sch. — In regionibus I—II. et IV—VIII. haud rarus.
var. *guttulatus* Kb. (*nervosus* Fieb.) — In omnibus regionibus obvius, sed sat rarus.

92. *cyclops* M. R. — I. Budapest, Göd. II. Simontornya. IV. Forró. V. Tasnád. VIII. Novi.

93. *lineatus* Fabr. — I. Budapest. II. Zircz. III. Késmárk. IV. Komjáti, Szádvár, Körtvélyes (Torna), S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Varannó, Királyháza, Gyula. V. Kásapatak, Mező-Záh, Székely-Udvarhely, Brassó, Kis-Torony. VI. Berzászka. VII. Vrdnik.

94. *fuscovenosus* Ferr. — I. Nagyvárad. III. Ujbánya. IV. Széphalom, Nagy-Szőllős, Batarcs, Nagy-Tarna. V. Zilah, Nagyszeben, Brassó. VII. Ruma, Vrdnik. VIII. Fiume, Novi.
var. *bipunctatus* Ferr. — I. Nagyvárad. II. Pécs. IV. Széphalom. VII. Vrdnik.
var. *inornatus* Horv. — II. Badacsony, Pécs. IV. Tolcsva, Széphalom. VII. Vrdnik. VIII. Fiume.

95. *Lauri* Horv. — VIII. Fiume, Buccari.

96. *opacus* Kb. — I. Dános, Tisza-Földvár.

97. *vittiventris* Leth. (ut *Cicadula*) — I. Kis-Szent-Miklós, Isaszeg, Kecskemét, Szeged. II. Tata. IV. Mátészalka. VIII. Cirkvenica.

98. *tenuis* Germ. — I. Passim obvius. II. Székesfehérvár, P.-Szent-Mihály, Vár-Palota, Soóly, Simontornya. III. Nyir. IV. Szikszó, Szomotor, Velejte. V. Nagyszeben.

99. *coronifer* Marsh. — I. Budapest, Isaszeg, Kecskemét, Dorozsma, Ménes, Hajdu-Nánás. II. Simontornya, Magyar-Óvár. IV. S.-A.-Ujhely. VI. Károlyfalva, Jaszenova, Pancsova. VII. Pétervárad. VIII. Cirkvenica.

100. *coroniceps* Kb. — I. Nagyvárad: Püspökfürdő. II. Velencze. VIII. Kraj.

101. *placidus* Horv. — II. Simontornya.

102. *croceus* H.-Sch. — In regionibus I—II. et IV—VIII. haud rarus.

103. *attenuatus* Germ. — I. Budapest, Rákos-Palota, Szendrő. II. Simontornya, Gödre-Szent-Márton, Soóly, Ruszt. III. Magyar-Bél. IV. Torna, Varannó, Csicsva. V. Tasnád, T.-Szántó, Szent-Gothárd.

104. *splendidulus* Fabr. — II. Sárvár. IV. Bártfa. V. Besztercze.

105. *torneellus* Zett. — I. Budapest, Isaszeg. IV. Bártfa. V. Görgény.

106. *affinis* Fieb. — I. Budapest. II. Simontornya, Dörgicse, Soóly. IV. S.-A.-Ujhely.

107. *abietinus* Fall. — I. Bihar-Füred. III. Passim haud rarus. IV. Pop-Iván. V. Egrespatak, Görgény, Borszék, Domuk, Törcsvár. VII. Ljeskovac.
108. *cruentatus* Panz. — III. Trencsén, Késmárk. IV. S.-A.-Ujhely, Zbojna. VII. Plitvica.
109. *Preyssleri* H.-Sch. — I. Budapest, Gödöllő. III. Lucski, Késmárk. IV. Varannó.
110. *quadrinotatus* Fabr. — In regionibus I—VII. passim haud rarus.
111. *frontalis* H.-Sch. — I. Rákos-Palota. II. Simontornya.
112. *vitripennis* Flor. — I. Budapest, Gödöllő, Farkasd, Kecskemét, Szendrő. II. Siófok, Simontornya, Pécs. IV. Forró, Tokaj, S.-A.-Ujhely, Salánk. V. Kolozsvár, Nagy-Enyed. VI. Duplaj. VIII. Novi.
113. *sulphurellus* Zett. — I. Rákos-Palota, Szeged, Szarvas, Ménes. II. Simontornya. III. Stubnya, Árvaváralja. IV. S.-A.-Ujhely, Kapnikbánya. VI. Csősztelek, Deliblat, Grebenácz, Pancsova. VII. Ruma.
114. *biguttatus* Fall. — II. Zircz. III. Késmárk. V. Zilah. VI. Mehádia.
115. *erythrostictus* Leth. — I. Budapest, Nagy-Kovácsi, Nagy-Kőrös. II. Pécs. III. Ujbánya, Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Halmi. V. Vörös-torony. VI. Orsova. VII. Gospić.
116. *subfusculus* Fall. — I. Budapest, Farkasd. II. Zircz, Kup, Badacsony, Villány, Turony, Sopron. III. Kis-Kriván, Lucski, Szlován, Késmárk, Tátraháza. IV—V. Passim obvius. VI. Marilla, Belobreszka, Mehádia. VII. Vrdnik, Károlyváros, Fužine, Gospić, Vaganski vrh. VIII. Fiume, Martinšćica.
117. *dilutior* Kb. — VIII. Fiume, Buccari, Novi.
118. *simplex* H.-Sch. — I. Budapest. III. Rajecz, Lucski, Csorba, Tátrafüred, Késmárk. IV. Bártfa, Komjáti, Pop-Iván. V. Passim minus frequens.

Athysanus Burm.

119. *stactogalus* Fieb. — I. Budapest, Mende. II. Simontornya. IV. Zsalobina. V. Domuk, Sepsi-Szent-György, Ilyefalva, Baróth, Törcsvár, Felek.
120. *flavovarius* H.-Sch. — III. Szlován. IV. Bártfa, Derenk. V. Haud rarus. VI. Deliblat.
121. *argentatus* Fabr. — I. Budapest, Rákos-Palota, Békás-Megyer. II. Bodajk, Nezsider. IV. Torna, Komjáti, Felső-Schönborn. V. Torda.
122. *interstitialis* Germ. — In regionibus I—II. et IV—VII. haud rarus.
123. *taeniaticeps* Kb. — I. Kecskemét.
124. *striola* Fall. — I. Passim sat frequens. II. Velencze, Simontornya. III. Ujbánya. IV. S.-A.-Ujhely, Varannó. V. Zilah, Szent-Gothárd, Görgény, Tihucza, Déva. VI. Deliblat, Fehértemplom, Ujvidék. VII. Ruma, Vrdnik, Plitvica. VIII. Martinšćica.
125. *striatulus* Fall. — I. Budapest, Isaszeg, Gyoma, Megyes-Bodzás, Makó. II. Simontornya, Szilas-Balhás. III. Tátrafüred. IV. S.-A.-Ujhely, Szádellő. V. Besztercze. VI. Berzászka. VII. Ruma, Stenjevec dolnji, Károlyváros.
126. *obscurellus* Kb. — In regionibus I—VI. et VIII. haud frequens.
127. *Schenckii* Kb. — I. Budapest, Gyón. IV. Forró, Szádellő, Tarczal. V. Szilágy-Nagyfalu. VIII. Zengg.
128. *cognatus* D. S. — I. Budapest. IV. S.-A.-Ujhely, Varannó.
129. *quadrum* Boh. — Specimen unicum e Hungaria ortum in Musæo Nationali Hungarico asservatur.
130. *plebejus* Zett. — Per totum regnum frequens.
131. *distinguendus* Kb. — I. Szentes. III. Szent-György (Pozsony), Stubnya, Lucski, Árvaváralja. IV. S.-A.-Ujhely, Varannó, Körtvélyes (Torna). V. Zilah. VII. Zágráb, Pétervárad, Ruma. VIII. Frequens.
132. *aemulans* Kb. — I. Budapest, Bánhegyes, Nagyvárad, Beél. II. Szegszárd, Nagy-Kanizsa. IV. S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Radvány, Czigánd, Varannó, Bártfa, Beregszász.
133. *ochrosomus* Kb. — I. Budapest. II. Simontornya, Balaton-Szent-György. IV. S.-A.-Ujhely, Varannó. V. Tihucza. VIII. Fiume, Sušak.
134. *onustus* Ferr. — I. Budapest. III. Borosznó, Tátra. IV. Varannó. V. Tihucza.
135. *modestus* Melich. — VIII. Buccari, Sv.-Jelena, Cirkvenica, Selce, Zengg.
136. *obsoletus* Kb. — I. Budapest, Kis-Szent-Miklós. II. Bodajk, Simontornya, Szt-Lőrincz (Baranya). III. Stubnya, Tátraháza, Ajnácskő. IV. Torna. VII. Verőcze, Károlyváros, Oštarije. VIII. Cirkvenica, Novi.
var. *convexus* Kb. — VIII. Fiume (Brancsik, 14).
137. *procerus* H.-Sch. — I. Budapest, Budafok. IV. S.-A.-Ujhely. VI. Deliblat, Berzászka.
138. *ignoscus* Melich. — I. Budapest, Kis-Szent-Miklós, Monor, Peszér. II. Simontornya. IV. Tarczal. V. Kolozsvár. VI. Deliblat, Grebenácz, Orsova. VII. Čerević.
139. *pallens* Zett. — III. Tátra, Késmárk. V. Görgény, Tihucza.
140. *impictifrons* Boh. — I. Budapest, Békás-Megyer, Monor, Peszér, Hadház. II. Székesfehérvár, Szulok. IV. Almás, Tolcsva, S.-A.-Ujhely, Szőllőske, Salánk. V. Rozsnyó. VI. Deliblat.

141. *luridus* Ferr. — VIII. Buccari, Novi.
142. *brevipennis* Kb. — III. Késmárk. IV. Varannó. VI. Pékla.
(*variegatus* Kb. in Hungaria nondum repertus; species sub hoc nomine e regione VIII. enumerata [Horváth 111, Brancsik 14] est = *distinguendus* Kb.)

Goniagnathus Fieb.

143. *brevis* H.-Sch. — In regionibus I. et IV—VIII. sat frequens.
144. *guttulinervis* Kb. — I. Rákos-Palota, Örkény.

Jassus Fabr.

145. *atomarius* Germ. — I. Budapest, Farkasd, Keczel. II. Tata, Kúp. III. Pozsony. IV. Tokaj. V. Somlyó-Csehi, Bürgezd, Nagy-Enyed, Brassó. VI. Berzászka. VII. Károlyváros. VIII. Buccari, Cirkvenica, Novi.
146. *commutatus* Fieb. — I. Budapest, Göd, Gödöllő, Gyón, Horgos, Nagyvárad: Püspökfürdő. II. Pécs, Villány. III. Ujbánya. IV. Varannó, Tállya, Körtvélyes (Torna). VI. Jazova, Oravicza. VII. Vrdnik.
147. *Mayri* Kb. — I. Budapest, Békás-Megyer, Farkasd, Szeged, Békés-Gyula. II. Simontornya. IV. S.-A.-Ujhely, Szőllőske, Imreg. V. Dicső-Szent-Márton. VI. Baziás, Berzászka, Plavisevicza, Orsova. VIII. Fiume.
148. *furcatus* Ferr. — I. Budapest, Göd, Nagyvárad: Püspökfürdő. II. Simontornya. IV. Torna. V. Déva, Szilágy-Nagyfalu. VIII. Buccari, Cirkvenica, Grižane, Novi.
149. *mixtus* Fabr. — I. Budapest, Isaszeg. II. Zircz, Pécs. IV. Bártfa, Juszko-Volya, Rokitó. V. Besztercze. VII. Vrdnik, Plitvica. VIII. Fiume, Novi.
150. *modestus* Scott. — VI. Orsova. VIII. Novi.
151. *abbreviatus* Leth. — II. Berhida. VII. Károlyváros.

Platymetopius Burm.

152. *cornutus* H.-Sch. — I. Kóka.
153. *acicularis* M. R. (*albolimbatus* Kb.) — VIII. Novi.
154. *rostratus* H.-Sch. — I. Budapest, Rákos-Palota, Paulis. IV. Bodókő, Varannó. V. Nagy-Enyed. VII. Čerević.
155. *guttatus* Fieb. — I. Budapest. IV. Körtvélyes (Torna). VIII. Novi, Zengg.
156. *filigranus* Scott. — I. Budapest, Rákos-Palota, Isaszeg. V. Besztercze. VII. Vrdnik.
157. *undatus* De Geer. — In regionibus I—II. et IV—VIII. haud rarus.

Deltocephalus Burm.

158. *costalis* Fall. — IV. Szőllőske.
159. *Phragmitis* Boh. — I. Budapest, Rákos-Palota, Örkény, Szeged. II. Simontornya, Nezsider. V. Nagy-Csűr.
var. *lugens* Horv. — I. Szeged.
160. *rotundiceps* Leth. — VIII. Cirkvenica.
161. *formosus* Boh. — I. Budapest, Szeged. IV. S.-A.-Ujhely. VI. Pancsova.
var. *Steini* Fieb. — II. Simontornya. IV. S.-A.-Ujhely, Ág-Csernő.
var. *gutticollis* Horv. — IV. Torna, Szécs-Polyánka, Varannó.
162. *socialis* Flor. — In regionibus I—VII. haud rarus.
var. *onustus* Fieb. — I. Budapest, Isaszeg. II. Simontornya. IV. S.-A.-Ujhely.
163. *ocellaris* Fall. — In regionibus I—VI. haud rarus.
164. *calceolatus* Boh. — III. Csorba. V. Nagy-Enyed, Brassó. VII. Plitvica.
165. *Frauenfeldi* Fieb. — I. Budapest. V. Nagy-Enyed.
166. *fugax* Horv. — VI. Duplaj.
167. *multinotatus* Boh. — I. Budapest, Szendrő. II. Simontornya. III. Lucski. V. Pele-Szarvad, Medgyes. VII. Pétervárad. VIII. Fiume.
var. *Mayri* Fieb. — III. Késmárk.
168. *pygmaeus* Horv. — I. Göd.
169. *notatifrons* Kb. — IV. Pop-Iván.
170. *repletus* Fieb. — VIII. Fiume, Sušak, Martinšćica, Sv.-Jelena, Novi.
171. *picturatus* Fieb. — In regionibus I—VII. sat frequens.
172. *Flori* Fieb. — In regionibus I—VII. haud rarus.
173. *bispinatus* Then. — VII. Breze. VIII. Fiume, Buccari, Cirkvenica, Grižane, Selce, Novi.
174. *pictipennis* Kb. — I. Budapest, Soroksár, Kecskemét, Heves, Eger, Nyiregyháza. II. Simontornya. VI. Tisza-Hegyes, Jazova.
175. *varipennis* H.-Sch. — I. Kecskemét.
176. *ornaticeps* Horv. — I. Monor, Peszér, Nagy-Kőrös.
177. *notatus* Melich. — I. Budapest. IV. Tarczal.
178. *Horváthi* Then (ut *Thamnotettix*). — IV. Varannó, Szala.
179. *pulicaris* Fall. — In regionibus I—VII. sat frequens; in regione VIII. nondum repertus.
180. *striatus* L. — Per totum regnum vulgaris.
181. *Linnéi* Fieb. — I. Budapest, Szendrő. II. Pécs. III. Pozsony, Ajnácskő. IV. Torna, Túr-Terebes. VI. Baziás.

182. *interstinctus* Fieb. — I. Budapest, Szendrő, Nyiregyháza. V. Gyergyó-Szent-Miklós, Nagy-Csűr. VIII. Fiume, Sv.-Jelena, Cirkvenica, Grižane, Selce, Zengg.

183. *languidus* Flor. — I. Budapest, Budafok, Rákos-Palota, Nagy-Kovácsi, Göd, Peszér, Szendrő. II. Simontornya, Szent-Lőrincz (Baranya), Oroszvár. III. Tátrafüred, Lucski. IV. Szomotor. V. Szucsák, Gyergyó-Szent-Miklós. VI. Baziás. VII. Čerević.

184. *abdominalis* Fabr. — In regionibus I—VII. haud rarus.

185. *ensatus* Then. — I. Budapest, Szendrő. IV. Körtvélyes (Torna). V. Nagy-Enyed. VI. Plavisevicza.

186. *hypochlorus* Fieb. — I. Budapest, Budakesz, Budafok, Kis-Szent-Miklós, Csörög, Farkasd, Szendrő. II. Pécs. IV. Tokaj, S.-A.-Ujhely. VI. Baziás.

187. *collinus* Dahlb. — In regionibus I—VII. sat frequens.

188. *assimilis* Fall. — III. Késmárk.

189. *cephalotes* H.-Sch. — I. Isaszeg. III. Kis-Kriván. IV. Tarczal, Ránk, Vehécz, Bánszka, Juszko-Volya, Rokitó. V. Görgény, Gyergyó-Szent-Miklós, Tihucza, Kovászna. VI. Zlaticza. VII. Vrdnik, Varasd-Teplicz.

190. *medius* M. R. (*Reiberi* Put.) — VII. Breze.

191. *striifrons* Kb. — I. Békás-Megyer, Nagyvárad: Félixfürdő. II. Simontornya, Badacsony, Nagy-Kanizsa. III. Szent-György (Pozsony), Modor, Ujbánya, Ajnácskő. IV. Passim obvius. V. Diósad, Tövis. VI. Zlaticza. VII. Zágráb, Varasd-Teplicz. VIII. Martinšćica, Novi.

192. *pascuellus* Fall. — I. Budapest, Isaszeg. II. Simontornya, Nagy-Kanizsa. III. Borosznó, Stubnya, Ajnácskő. IV. Hidvég-Ardó, Zsarnó, Szécs-Polyánka, Varannó, Nagy-Szőllős, Gyula, Halmi.

193. *Chyzeri* Horv. — I. Gödöllő, Göd, Farkasd. IV. Tarczal, S.-A.-Ujhely.

194. *quadrivirgatus* Horv. — IV. Pop-Iván.
(*distinguendus* Flor in Hungaria hucusque haud repertus; specimina sub hoc nomine ex VI. Oravicza enumerata [Frivaldszky, 36] ad speciem novam, nondum descriptam pertinent.)

Eupelix Germ.

195. *cuspidata* Fabr. — I. Budapest, Rákos-Palota, Csepel, Gyón, Nyiregyháza. IV. Forró, S.-A.-Ujhely, Páczin, Nagymihály. VI. Grebenácz. VIII. Fiume, Cirkvenica.

196. *producta* Germ. — I. Budapest, Budakesz, Kis-Szent-Miklós, Isaszeg, Kecskemét, Szeged, Horgos. II. Szilas-Balhás, Kup. III. Stubnya. IV. Szomotor. VI. Duplaj. VII. Gospić. VIII. Fiume, Sušak, Novi.

197. *spathulata* Germ. — I. Budapest, Rákos-Palota, Kis-Szent-Miklós. II. Kup, Tihany, Badacsony. III. Késmárk. IV. S.-A.-Ujhely, Páczin, Mező-Laborcz. V. Tusnád. VI. Palics, Deliblat, Berzászka, Kazán.

Errhomenellus Put.
(*Errhomenus* Fieb.)

198. *brachypterus* Fieb. — I. Bihar-Füred. III. Késmárk. V. Semesnye. VII. Ruma, Verőcze, Podsused, Károlyváros, Mons Risnjak.

Strongylocephalus Flor.

199. *agrestis* Fall. — II. Nezsider. IV. S.-A.-Ujhely, Királyháza.

Acocephalus Germ.

200. *nervosus* Schrk. (*striatus* Fabr.) — Per totum regnum vulgaris.

201. *bifasciatus* L. — I. Budapest, Kis-Szent-Miklós, Vácz, Nagyvárad. III. Kis-Kriván, Sztranszke, Lazan, Csorba, Késmárk, Szepes-Béla. IV. Bártfa, Szádellő. V. Tihucza, Borszék, Felső-Bajom. VI. Ferenczfalva, Mehádia. VII. Ruma, Stalak.

202. *trifasciatus* Geoffr. — I. Budapest, Kecskemét, Hadház. III. Lucski, Ilasócz. IV. Szádellő, Szádvár, S.-A.-Ujhely, Szomotor, Szerencs. V. Passim obvius. VI. Orsova. VII. Ruma, Károlyváros, Francikovac. VIII. Fiume, Cirkvenica, Grižane, Novi.

203. *elongatus* Leth. — I. Budapest, Békás-Megyer, Szent-Endre, Rákos-Palota, Göd, Monor, Peszér, Kecskemét, Keczel. VI. Deliblat, Grebenácz, Duplaj.

204. *albifrons* L. — I. Rákos-Palota, Kalocsa, Mezőtur. III. Stubnya, Rajecz, Kis-Kriván, Késmárk. IV. Csécs, Rokitó, Királyháza, Kapnikbánya. V. Zilah, Görcsön, Méhes, Mező-Záh, Felső-Bajom. VI. Mehádia. VII. Ruma, Károlyváros. VIII. Fiume, Buccari, Cirkvenica, Zengg, Carlopago.

205. *fuscofasciatus* Goeze (*Serratulae* Fabr.). — I. Budapest, Ménes. II. Velencze, Veszprém, Almádi. III. Ujbánya, Késmárk. IV. Nagymihály, Barkó, Varannó, V.-Csemernye. V. Szilágy-Nagyfalu, Somlyó-Csehi, Szucsák. VI. Grebenácz, Plavisevicza. VII. Vrdnik.
var. *vicarius* Horv. — IV. Rónaszék. V. Nagyszeben.

206. *histrionicus* Fabr. — I. Budapest, Szent-Endre, Gödöllő, Farkasd, Sár. II. Pécs, Almádi, Nagy-Kapornak, Nezsider. V. Torda, Szamosfalva, Besztercze. VI. Plavisevicza. VII. Károlyváros.

207. *rivularis* Germ. — III. Stubnya, Lucski, Tátra, Késmárk. IV. Vehécz, Barkó, Szomotor. V. Tasnád, Tusnád, Zajzon. VII. Ruma.

Anoterostemma Löw.

208. *Ivanoffi* Leth. — V. Szamosfalva, Torda, Drassó, Szent-Gothárd.

Fieberiella Sign.

209. *Flori* Stål. — I. Budapest, Dános. IV. S.-A.-Ujhely, Széphalom. VIII. Fiume, Grižane, Novi.

Selenocephalus Germ.

210. *obsoletus* Germ. — Per totum regnum sat frequens.

211. *pallidus* Kb. (*stenopterus* Sign.) — I. Budapest. VIII. Sv.-Jelena, Cirkvenica, Grižane, Novi, Zengg.

Paramesus Fieb.

212. *nervosus* Fall. — In regionibus I—II. et VI—VII. haud rarus.

213. *reticulatus* Horv. — I. Budapest. VI. Károlyfalva, Kubin.

Dorydium Burm.

214. *lanceolatum* Burm. — VIII. Fiume.

Parabolocratus Fieb.

215. *arenarius* Horv. — I. Rákos-Palota, Monor, Kecskemét, Dorozsma, Szeged. VI. Deliblat.
(*glaucescens* Fieb. in Hungaria haud occurrit; specimina sub hoc nomine e I. Dorozsma enumerata [Horváth, 107] ad speciem præcedentem pertinent.)

Penthimia Germ.

216. *nigra* Goeze (*atra* Fabr.) — In regionibus I—V. et VII—VIII. haud rara.
var. *haemorrhoa* Schrk. — I. Budapest, Isaszeg. II. Badacsony, Sopron. III. Nagy-Maros. IV. Körtvélyes (Torna), Tokaj, Sáros-Patak. V. Szilágy-Nagyfalu, Szamosujvár, Nagyszeben, Vöröstorony.
var. *ruficollis* Fabr. — I. Budapest, Solt. II. Haláp, Pécs. VII. Vrdnik. VIII. Fiume.

Euacanthus Lep. Serv.

217. *interruptus* L. — In regionibus I—VII. sat frequens.

218. *acuminatus* Fabr. — I. Budapest, Monor. II. Tapolcza. III. Vihnye, Borosznó, Tátrafüred, Késmárk. IV—V. Sat frequens. VI. Deliblat, Krassova, Ferenczfalva, Plavisevicza, Mehádia. VII. Ruma, Vrdnik, Mons Risnjak, Breze. VIII. Fiume.

Tettigonia Ol.

219. *viridis* L. — In regionibus I—VII. valde frequens. VIII. Fiume, Cirkvenica.

Idiocerus Lewis.

220. *scurra* Germ. — Per totum regnum frequens.

221. *nobilis* Fieb. — I. Budapest, Örkény. II. Bodajk, Keszthely.

222. *salicicola* Flor. — I. Kecskemét, Szeged.

223. *Brusinae* Horv. — VIII. Buccari, Novi.

224. *exaltatus* Fabr. (*notatus* Fabr.) — I. Budapest, Kis-Szent-Miklós, Visegrád, Nagyvárad. III. Szliács, Tátrafüred. IV. Somodi. VI. Baziás. VII. Ruma. VIII. Fiume, Buccari, Novi.

225. *adustus* H.-Sch. — II. Sárvár. III. Stubnya, Tátraháza. IV. Varannó-Csemernye.

226. *varius* Fabr. — III. Stubnya, Lucski. V. Bagos.

227. *Herrichii* Kb. — I. Budapest, Kalocsa, Foktű. II. Simontornya, Soóly. III. Oszadka. IV—V. Passim haud rarus. VI. Grebenácz. VII. Podsused.

228. *tibialis* Fieb. — VIII. Fiume, Buccari, Sv.-Jelena, Cirkvenica, Novi, Sv.-Juraj, Jablanac.

229. *affinis* Fieb. — I. Budapest, Kalocsa, Eger. II. Alcsuth, Sárvár. III. Tavarnok. IV. Torna, Nagymihály, Csicsva, Homonna. VII. Eszék, Diakovár.

230. *poecilus* H.-Sch. — I. Kalocsa. II. Sopron. IV. Forró, Parnó. VIII. Fiume, Cirkvenica.

231. *humilis* Horv. — I. Szeged, Vacs. VI. Deliblat.

232. *lituratus* Fall. — In regionibus I—V. et VII—VIII. sat frequens.

233. *laminatus* Flor. — III. Trencsén.

234. *fasciatus* Fieb. — I. Budapest.

235. *cognatus* Fieb. — I. Budapest, Budafok, Göd, Peszér, Kecskemét. III. Nemes-Podhrágy.

236. *ustulatus* M. R. — I. Budapest, Kis-Szent-Miklós, Örkény, Kecskemét, Szeged, Paulis. II. Siófok, Simontornya. IV. Sáros-Patak, Homonna. V. Szent-Gothárd. VI. Deliblat, Duplaj, Ujvidék. VII. Pétervárad, Podsused.

237. *confusus* Flor. — III. Késmárk. IV. Imreg. VII. Breze.

238. *albicans* Kb. — I. Budapest, Szeged. VI. Deliblat, Pancsova.

239. *aurulentus* Kb. — I. Bugacz. III. Trencsén. IV. Forró, S.-A.-Ujhely, Nagymihály. VI. Marilla. VII. Podsused. VIII. Cirkvenica, Selce, Novi.

240. *Populi* L. — I. Gödöllő. II. Zircz, Üszög. III. Rajecz, Késmárk, Tátraháza, Dobsina. IV. Bártfa, Varannó, Komjáti. V. Zilah, Semesnye, Szucsák. VII. Breze.

Macropsis Lewis.

241. *microcephala* H.-Sch. — I. Budapest. II. Szilas-Balhás, Pécs. IV. Tarczal. V. Zilah, Szilágy-Somlyó, Görcsön. VI. Berzászka. VII. Pétervárad, Vrdnik.

242. *lanio* L. — In omnibus regionibus sat frequens.
var. *brunnea* Fieb. — I. Isaszeg. II. Pécs. IV. Szala, Torna, Szőllőske, Bártfa. VI. Orsova. VIII. Selce, Novi.

243. *scutellaris* Fieb. — I. Farkasd. II. Simontornya. VII. Ruma. VIII. Fiume, Novi.
var. *purpurata* Horv. — I. Makó. II. Simontornya. VIII. Novi, Zengg.

Bythoscopus Germ.

244. *Alni* Schrk. — II. Zircz, Kám. III. Stubnya, Késmárk, Tátraháza. IV. Körtvélyes (Torna), Bártfa, Varannó-Csemernye, Szaláncz. V. Székely-Keresztur, Görgény, Tömös, Vizakna. VI. Mehádia.

245. *flavicollis* L. — I. Budapest. II. Pécs, Villány, Sopron. III. Mons Szitnya, Kis-Kriván, Tátrafüred, Késmárk. IV—V. Passim frequens. VI. Bozovics. VII. Breze, Gospić. VIII. Fiume, Buccari.

246. *rufusculus* Fieb. — III. Késmárk. V. Törcsvár. VII. Breze.

Pediopsis Burm.

247. *Tiliae* Germ. — II. Zircz. VI. Mehádia. VII. Vrdnik. VIII. Orehovica.

248. *cerea* Germ. — III. Stubnya, Lucski, Késmárk. IV. Varannó-Csemernye. V. Görgény, Ratosnya, Törcsvár. VI. Mehádia.

249. *fuscinervis* Boh. — IV. Tolcsva, Bártfa, Halmi.

250. *glandacea* Fieb. — I. Sár. III. Késmárk, Kis-Kriván. VIII. Novi.

251. *vicina* Horv. — I. Kis-Szent-Miklós, Szeged. VI. Deliblat.

252. *virescens* Fabr. — Per totum regnum frequens.
var. *graminea* Fabr. — Ibidem cum stirpe sat frequens.
var. *nassata* Germ. — I. Szeged, Horgos, Dombiratos. III. Rajecz, Késmárk. IV. Torna, Imreg, Bártfa. V. Zilah, Görgény, Ratosnya, Oláh-Toplicza, Tihucza. VI. Mehádia. VII. Vrdnik, Károlyváros.
var. *notatifrons* Rey. — IV. S.-A.-Ujhely, Varannó-Csemernye, Fekete-Patak. V. Görgény, Tömös.
var. *dimidiata* Fieb. — V. Görgény.
var. *marginata* H.-Sch. — IV. Ránk, Szinna. V. Görgény. VI. Mehádia.

253. *impura* Boh. — I. Budapest. VI. Deliblat.

254. *Megerlei* Fieb. — II. Badacsony. IV. Forró, S.-A.-Ujhely. V. Szilágy-Nagyfalu, Zajzon.

255. *scutellata* Boh. — I. Budapest, Nagyvárad, Bél. II. Zircz, Lajta-Bruck. IV. Torna, Jabloncza, Csécs, S.-A.-Ujhely, Nagy-Szőllős. VI. Károlyfalva, Baziás. VII. Pétervárad, Ruma. VIII. Fiume.

256. *dispar* Fieb. — I. Budapest. VI. Deliblat.

257. *nana* H.-Sch. — In omnibus regionibus haud rara.
var. *cretacea* Fieb. — I. Farkasd, Eger. II. Szegszárd. IV. Forró, Somodi, Varannó, Mád, Tarczal, Salánk, Halmi. VI. Deliblat. VII. Zágráb, Varasd-Teplicz, Vrdnik, Breze. VIII. Fiume.

Agallia Curt.

258. *sinuata* M. R. — In regionibus I—III. et VI—VIII. haud rara.

259. *reticulata* H.-Sch. — I. Budapest, Gödöllő, Felső-Tárkány, Szendrő. II. Simontornya, Tapolcza. IV. Torna, Körtvélyes (Torna), Perecseny, Kapnikbánya. V. Mező-Záh. VI. Szvinicza, Plavisevicza, Orsova, Mehádia. VII. Čerević, Vrdnik, Lipik, Zágráb. VIII. Novi.

260. *brachyptera* Boh. — I. Isaszeg. III. Lucski, Tátra, Késmárk. IV. Kassa, Velejte.

261. *limbata* Kb. — VII. Com. Pozsega, Plitvica.

262. *minuta* Melich. — VI. Mehádia.

263. *venosa* Fall. — Per totum regnum frequens.
var. *aciculata* Horv. — V. Kolozsvár, Nagy-Enyed.

Ledra Fabr.

264. *aurita* L. — I. Budapest, Csepel, Péczel. III. Selmeczbánya. IV. Körtvélyes (Torna), Kassa, Velejte. V. Zilah, Brassó, Felső-Kercz. VI. Dognácska. VII. Diakovár. VIII. Fiume, Buccari, Cirkvenica, Zengg.

Megophthalmus Curt.

265. *scanicus* Fall. — I. Budapest. II. Simontornya, Pécs. III. Borosznó, Stubnya. IV—V. Passim obvius. VI. Zlaticza, Jeselnicza, Orsova, Mehádia. VII. Ruma, Vrdnik, Károlyváros. VIII. Fiume, Buccari, Cirkvenica, Novi, Sv.-Juraj.

Ulopa Fall.

266. *reticulata* Fabr. — III. Pozsony. VII. Ivanec, Károlyváros, Gospić.

267. *trivia* Germ. — In regionibus I—VII. haud rara; in regione VIII. nondum inventa.

Fam. MEMBRACIDAE.

Centrotus Fabr.

1. *cornutus* L. — Per totum regnum minus frequens.
var. *turcicus* Kb. — Hungaria (Fieber, 27).

Gargara Am. Serv.

2. *Genistae* Fabr. — In omnibus regionibus sat frequens.

Fam. CERCOPIDAE.

Triecphora Am. Serv.

1. *vulnerata* Germ. — I. Eger. III—IV. Passim obvia. V. Görgény, Brassó, Kerczisóra, Nagyszeben, Retyezát. VI. Marilla, Bozovics. VII. Zágráb, Károlyváros. VIII. Fiume.
var. *helvetica* Melich. — IV. Vihorlat.
2. *mactata* Germ. — Per totum regnum frequens.
3. *arcuata* Fieb. — V. Oláh-Valkó. VIII. Fiume.
(*sanguinolenta* L. in Hungaria hucusque haud reperta; specimina sub hoc nomine e V. Kerczisóra enumerata [Fuss, 41] ad *T. vulneratam* pertinent.)

Lepyronia Am. Serv.

4. *coleoptrata* L. — In regionibus I—VII. frequens. VIII. Orehovica.

Aphrophora Germ.

5. *corticea* Germ. — III. Késmárk, Lucski.
6. *Salicis* De Geer. — I. Budapest, Ujpest. II. Szent-Lőrincz (Baranya), Badacsony, Pápa, Sopron. III—V. Passim sat frequens. VI. Deliblat, Pancsova. VII. Haud rara. VIII. Fiume, Grižane.
7. *Alni* Fall. — Per totum regnum vulgaris.

Ptyelus Lep. Serv.

8. *minor* Kb. — Per totum regnum sat frequens.
9. *lineatus* L. — I. Budapest, Békás-Megyer, Gödöllő. II. Simontornya, Zircz, Kám. III. Késmárk. IV—V. Passim haud rarus. VI. Deliblat. VII. Ruma, Károlyváros, Vaganski vrh.
10. *exclamationis* Thunb. — I. Budapest. II. Lajta-Bruck.
11. *albipennis* Fabr. — I. Budapest. III. Késmárk.
12. *campestris* Fall. — In regionibus I—II. et IV—VIII. minus frequens.
13. *spumarius* L. — Per totum regnum vulgaris. Etiam varietates: *ustulatus* Fall., *leucophthalmus* L., *biguttatus* Fabr., *lateralis* L., *leucocephalus* L., *marginellus* Fabr., *fasciatus* Fabr., *lineatus* Fabr., *pallidus* Schrk., *Populi* L. et *rufescens* Melichar.

Fam. CICADIDAE.

Tettigia Kol.

1. *Orni* L. — I. Budapest. II. Kis-Örs, Com. Győr. III. Nagy-Maros. IV. Tolcsva, Halmi. V. Szilágy-Somlyó, Kolozsvár. VI. Oravicza, Baziás, Berzászka, Plavisevicza, Orsova. VII. Breze. VIII. Fiume, Buccari, Cirkvenica, Bribir, Novi, Zengg.

Cicada L.

2. *plebeja* Scop. — II. Kis-Örs. VIII. Fiume, Buccari, Cirkvenica, Bribir, Novi, Zengg, Jablanac, Carlopago. (Specimen e III. Trencsén enumeratum [Brancsik, 10] vix in regione illa septentrionali captum fuisse censeo.)

Tibicen Latr.

3. *haematodes* Scop. — I. Budapest, Budakesz, Pilis-Csaba. II. Com. Győr. III. Nagy-Maros, Rozsnyó. VI. Mehádia, Orsova. VII. Fužine. VIII. Fiume, Buccari, Carlopago.

Cicadatra Kol.

4. *atra* Ol. — VI. Berzászka. VII. Vrdnik.

Cicadetta Kol.

5. *annulata* Brull. — VI. Dunaszoros.
6. *adusta* Hag. — V. Szilágy-Nagyfalu, Nagy-Csűr.
7. *Megerlei* Fieb. — VI. Mehádia. VII. Vrdnik, Eszék, Com. Pozsega.
8. *dimissa* Hag. — VIII. Fiume.
9. *montana* Scop. — I. Budapest, Budakesz. II. Pécs. III. Pozsony. IV. S.-A.-Ujhely, Varannó, Bártfa. V. Kolozsvár, Dicső-Szent-Márton, Nagy-Csűr, Fenyőfalva, Nagy-Talmács, Vöröstorony, Brassó.
10. *transsylvanica* Fieb. — V. Szucsák.
11. *Brullei* Fieb. — VIII. Fiume, Buccari.
12. *tibialis* Panz. — I. Budapest, Budakesz, Páty, Szent-Endre, Szent-Mártonkáta, Nagyvárad. II. Kis-Örs, Pécs. V. Szilágy-Nagyfalu, Mező-Záh, Nagy-Csűr. VI. Szvinicza. VII. Ruma, Vrdnik. VIII. Fiume, Draga, Buccari.

Fam. FULGORIDAE.

Tettigometra Latr.

1. *fusca* Fieb. — I. Budapest. IV. Körtvélyes (Torna).
2. *depressa* Fieb. — IV. Perecseny. V. Szent-Gothárd. VI. Mehádia. VII. Vrdnik.

3. *atra* Hagenb. — I. Budapest. IV. S.-A.-Ujhely, Forró, Komjáti. V. Déva. VI. Mehádia.
4. *sulphurea* M. R. — I. Budapest. II. Pápa. V. Déva.
var. *mendax* Horv. — I. Budapest. VII. Pétervárad, Podsused.
5. *virescens* Panz. — VII. Podsused. VIII. Buccari, Martinšćica.
var. *concolor* Fieb. — I. Budapest, Gödöllő, Örkény. VIII. Pećine.
var. *bicolor* Am. — VIII. Fiume, Buccari.
6. *fuscipes* Fieb. — I. Budapest. II. Sárbogárd. III. Selmeczbánya. IV. Torna, S.-A.-Ujhely. V. Szucsák, Mező-Záh, Székely-Keresztúr, Ohába. VII. Varasd-Teplicz, Károlyváros, Gospić.
7. *laeta* H.-Sch. (*lepida* Fieb.) — I. Budapest, Szendrő. II. Dörgicse. V. Transsylvania (Fieber, 27). VIII. Fiume.
8. *impressopunctata* Duf. — I. Budapest, Rákos-Palota. II. Haláp, Balf. III. Modor, Késmárk. IV. Körtvélyes (Torna), Varannó, Vehécz, S.-A.-Ujhely. V. Passim obvia. VII. Varasd-Teplicz, Pregrada. VIII. Fiume.
9. *macrocephala* Fieb. — IV. Körtvélyes (Torna), Parnó.
10. *obliqua* Panz. — Per totum regnum haud rara.
var. *platytaenia* Fieb. — I. Budapest, Isaszeg, Nagy-Kovácsi. II. Soóly, Pécs. IV. Torna. V. Besztercze, Brassó. VII. Varasd-Teplicz, Vrdnik.
var. *tritaenia* Fieb. — II. Simontornya. III. Modor. IV. Torna, S.-A.-Ujhely, Szőllőske. V. Brassó. VI. Futtak. VIII. Novi.
var. *bimaculata* Fieb. — I. Budapest. IV. Körtvélyes (Torna). VIII. Sušak, Meja, Novi.
11. *griseola* Fieb. — VI. Mehádia (Fieber, 25, 27).
12. *sordida* Fieb. — I. Gödöllő, Gyoma. IV. Forró, Encs, Bodókő. VI. Duplaj.
13. *sororcula* Horv. — VIII. Zengg.

Myndus Stål.

14. *musivus* Germ. — I. Szeged, Mindszent, Tisza-Füred, Nagyvárad : Püspökfürdő. II. Szegszárd. IV. Tokaj, S.-A.-Ujhely, Imreg, Varannó, V.-Csemernye. V. Alsó-Zsuk. VI. Grebenácz. VII. Károlyváros. VIII. Fiume.

Helicoptera Am. Serv.

15. *parnassia* Stål. — IV. Erdő-Bénye. VI. Mehádia.
16. *marginicollis* Spin. — I. Budapest, Nagyvárad : Püspökfürdő. II. Tapolcza. VI. Mehádia, Orsova, Plavisevicza, Deliblat. VII. Vrdnik.

Cixius Latr.

17. *pilosus* Ol. — I. Budapest, Bogács, Kóly. IV. Forró, S.-A.-Ujhely, Kis-Azar, Velejte, Varannó. V. Tasnád, Oláh-Valkó, Zilah. VI. Mehádia. VIII. Fiume.
var. *infumatus* Fieb. — III. Gerencsér. IV. Kis-Azar. VIII. Fiume.
18. *desertorum* Fieb. — V. Kolozsvár.
19. *nervosus* L. — In omnibus regionibus haud rarus.
var. *fasciatus* Fieb. — VII. Gospić. VIII. Fiume.
20. *Heydeni* Kb. — V. Görgény.
21. *brachycranus* Scott. — VIII. Fiume, Martinšćica, Buccari, Novi, Jablanac.
22. *pallipes* Fieb. — I. Kecskemét. IV. S.-A.-Ujhely. VI. Ujvidék. VII. Pétervárad, Zimony. VIII. Zengg.
var. *fumipennis* Horv. — VIII. Buccari.
23. *cunicularius* L. — I. Budapest, Ménes. II. Zircz, Lajta-Bruck. III. Beszterczebánya, Borosznó. IV—V. Passim obvius. VII. Zágráb, Károlyváros, Delnice. VIII. Fiume.
var. *fuscus* Fieb. — IV. Com. Máramaros. VIII. Fiume.
24. *stigmaticus* Germ. — I. Budapest, Kalocsa. III. Tátraháza. IV. Bártfa, Vihorlat, Pietrosz. V. Zilah, Felső-Bajom. VI. Mehádia, Oravicza. VII. Zágráb, Károlyváros. VIII. Cirkvenica.
25. *simplex* H.-Sch. — I. Budapest. IV. Varannó, Juszko-Volya.
26. *granulatus* Horv. — VI. Kazán.
27. *similis* Kb. — I. Budapest.

Hyalesthes Sign.

28. *obsoletus* Sign. — I. Budapest, Orosháza, Mező-Kovácsháza, Szendrő. III. Nagyszombat, Nemes-Podhrágy. IV. Forró, Halmi. V. Torda. VI. Károlyfalva, Berzászka, Kazán, Orsova. VII. Vrdnik, Ruma. VIII. Fiume, Cirkvenica, Novi.
29. *luteipes* Fieb. — I. Budapest. VI. Plavisevicza. VII. Pétervárad, Ruma. VIII. Buccari, Novi, Sv.-Juraj.
var. *Scotti* Ferr. — I. Budapest, Farkasd. II. Simontornya. IV. Forró, Torna, Gyula. V. Tasnád, Mező-Záh, Nagy-Enyed. VI. Orsova. VII. Vrdnik. VIII. Buccari, Sv.-Jelena, Cirkvenica, Grižane, Novi.

Oliarus Stål.

30. *melanochaetus* Fieb. — I. Budapest. VII. Komorsko-Moravice. VIII. Novi.
31. *major* Kb. — Hungaria (Kirschbaum, 136).
var. *roridus* Fieb. — VI. Plavisevicza.

32. *splendidulus* Fieb. — I. Budapest, Budafok, Horgos. IV. Körtvélyes (Torna). V. Görcsön, Zajzon. VIII. Buccari, Cirkvenica, Novi.
33. *pallens* Germ. — I. Budapest, Gyón, Szeged, Nagyvárad, II. Badacsony, Nezsider. IV. Forró, Tarczal. VII. Ruma.
34. *leporinus* L. (*pallidus* Fieb.) — I. Budapest, Szeged, Orosháza. IV. Forró. V. Szucsák. VI. Oravicza, Fehértemplom. VII. Kupinovo.
35. *Panzeri* Löw (*leporinus* Fieb., nec L.) — I. Budapest, Kis-Szent-Miklós, Szeged. II. Szent-Lőrincz (Baranya). III. Boroszno, Isztebnik. IV. Passim obvius. V. Szucsák, Tömös. VI. Haud rarus. VII. Ruma, Verőcze. VIII. Fiume, Cirkvenica.
36. *quinquecostatus* Fieb. — In regionibus I—II. et IV—VI. haud rarus. VIII. Novi.
37. *cuspidatus* Fieb. — In regionibus I—VII. sat frequens.
38. *apiculatus* Fieb. — I. Budapest. VI. Versecz.

Almana Stål.

39. *hemiptera* Costa. — VIII. Zengg.

Dictyophora Germ.

40. *pannonica* Germ. — I. Sat frequens. II. Pécs. VI. Palics, Deliblat, Grebenácz.
var. *rosea* Fieb. — I. Budapest, Kis-Szent-Miklós, Kecskemét.
41. *multireticulata* M. R. — I. Budapest, Békás-Megyer, Gödöllő. II. Simontornya. VIII. Fiume, Pećine, Martinšćica, Selce, Cirkvenica, Grižane, Novi.
42. *europaea* L. — Per totum regnum frequens.

Trypetimorpha Costa.

43. *fenestrata* Costa. — I. Göd, Örkény, Peszér. Forma macroptera (*psyllipennis* Costa) rarissima.

Caloscelis Lap.

44. *Bonellii* Latr. — VIII. Martinšćica, Buccari, Cirkvenica, Novi, Jablanac.
45. *Wallengreni* Stål. — I. Budapest, Szeged. Etiam forma macroptera.

Peltonotellus Put.
(*Peltonotus* M. R.)

46. *quadrivittatus* Fieb. — VIII. Fiume, Sušak, Martinšćica, Buccari, Sv.-Jelena, Grižane, Novi.
47. *punctifrons* Horv. — VI. Grebenácz. VII. Vrdnik.

Ommatidiotus Spin.

48. *dissimilis* Fall. — I. Rákos-Palota, Peszér, Gyoma.
49. *inconspicuus* Stål. — I. Budapest, Rákos-Palota, Göd, Monor, Örkény, Peszér, Nagy-Kőrös. II. Simontornya.

Mycterodus Spin.

50. *confusus* Stål. — I. Nagyvárad, Debreczen. IV—VI. Passim minus rarus. VII. Vrdnik, Ruma. — Etiam in Serbia occurrit.
51. *nasutus* H.-Sch. — In regionibus I—VI. sat frequens.

Issus Fabr.

52. *dilatatus* Ol. (*luteus* Fieb.) — VIII. Fiume, Vežica, Buccari, Cirkvenica, Novi.
53. *coleoptratus* Fabr. — I. Diósgyőr. III. Nagy-Őcze, Késmárk, Kis-Kriván, Trencsén. IV. Torna, Körtvélyes (Torna), Jabloncza. VI. Baziás, Jeselnicza. VII. Ruma, Zágráb, Breze.
54. *muscaeformis* Schrk. (*frontalis* Fieb.) — I. Péczel, Debreczen. II. Pécs. III. Koritnyicza. IV. Szádellő, Körtvélyes (Torna), S.-A.-Ujhely, Olyka, Szinna, Bártfa. V. Zilah, Görgény, Gödemesterháza. VI. Jeselnicza. VII. Lipik, Raduć, Sveto-Brdo. VIII. Fiume, Cirkvenica, Zengg.
(*tendinosus* Spin. in Hungaria hucusque haud inventus; specimen sub hoc nomine e VI. Jeselnicza enumeratum [Frivaldszky, 34] ad speciem præcedentem pertinet).

Hysteropterum Am. Serv.

55. *grylloides* L. — VIII. Buccari, Novi.
56. *latifrons* Fieb. — II. Rév-Fülöp. VI. Baziás, Ó-Moldova, Szent-Helena, Berzászka, Coronini, Plavisevicza, Orsova, Mehádia.
57. *fuscovenosum* Fieb. — VIII. Martinšćica, Sv.-Jelena, Cirkvenica, Novi, Jablanac.
58. *immaculatum* Fabr. — VII. Breze. VIII. Fiume, Sušak, Buccari, Cirkvenica, Novi, Zengg.
59. *Dohrnii* Kb. — I. Budapest. V. Kolozsvár, Szucsák, Zilah, Szent-Gothárd, Nagy-Enyed, Nagy-Csűr.

Asiraca Latr.

60. *clavicornis* Fabr. — Per totum regnum sat frequens.

Araeopus Spin.

61. *crassicornis* Fabr. — I. Budapest. II. Lajta-Bruck. V. Szilágy-Nagyfalu. VII. Vrdnik.

Tropidocephala Stål.

62. *Andropogonis* Horv. — VI. Deliblat.

Megamelus Fieb.

63. *notula* Germ. — I. Rákos-Palota. III. Késmárk. IV. Varannó, S.-A.-Ujhely, Széphalom, Sáros-Patak. V. Szent-Gothárd. VII. Károlyváros.

Stenocranus Fieb.

64. *lineola* Germ. — I. Budapest, Gödöllő, Monor, Alberti-Irsa, Nyiregyháza, Kóly. II. Simontornya, Sopron, Nezsider. IV. Körtvélyes (Torna), Varannó. V. Peér, Pele, Szent-Gothárd. VII. Varasd.

65. *fuscovittatus* Stål. — I. Budapest. II. Simontornya. III. Pozsony.

Kelisia Fieb.

66. *pallidula* Boh. — I. Rákos-Palota, Göd. II. Csáktornya, Nezsider.

67. *Scotti* Fieb. — I. Rákos-Palota. II. Nezsider.

68. *Henschii* Horv. — I. Budapest, Göd.

69. *perspicillata* Boh. — I. Budapest, Isaszeg. VII. Károlyváros.

70. *Brucki* Fieb. — I. Kecskemét. VI. Deliblat.

71. *guttula* Germ. — I. Rákos-Palota, Göd, Felső-Pakony, Örkény, Nagy-Kőrös, Kecskemét, Szeged. II. Fonyód, Tihany. III. Boroszno.

72. *guttulifera* Kb. — I. Budapest, Rákos-Palota, Farkasd, Nagyvárad: Félixfürdő. II. Simontornya. III. Tátra. IV. S.-A.-Ujhely, Varannó. V. Szent-Gothárd. VI. Duplaj, Plavisevicza. VIII. Vrdnik, Károlyváros.

Chloriona Fieb.

73. *unicolor* H.-Sch. — I. Csepel. II. Simontornya. V. Kis-Sármás, Székely-Udvarhely, Felső-Bajom. VI. Deliblat.

74. *glaucescens* Fieb. — II. Simontornya.

75. *prasinula* Fieb. — I. Rákos-Palota, Csepel. II. Simontornya, Nezsider, Lajta-Bruck. V. Mező-Záh, Mező-Sályi, Felső-Bajom. VI. Fehértemplom.

Chlorionoidea Löw.

76. *flava* Löw. — VIII. Novi (specimen macropterum), Sv.-Juraj.

Calligypona Sahlb.

77. *albicollis* Sahlb. — I. Rákos-Palota, Miskolcz. VI. Fehértemplom, Kubin, Pancsova, Titel. VII. Ruma.

Euidella Put.

(*Euides* Fieb.)

78. *speciosa* Boh. — I. Budapest, Csepel, Peszér, Szeged, Arad. VI. Fehértemplom, Kubin, Pancsova. VII. Fužine.

Eurybregma Scott.

79. *nigrolineata* Scott. — I. Budapest, Rákos-Palota, Péczel, Farkasd.

Eurysa Fieb.

80. *lineata* Perr. — I. Budapest, Isaszeg, Farkasd. II. Pécs, Kup. V. Brassó. VI. Deliblat. VII. Ruma. VIII. Fiume, Novi.

81. *clypeata* Horv. — I. Bugacz, Dorozsma. II. Velencze. V. Szamosfalva, Tövis.

Conomelus Fieb.

82. *lepidus* Boh. — I. Budapest, Kis-Szent-Miklós. II. Simontornya, Badacsony.

83. *limbatus* Fabr. — III. Stubnya, Tátra, Késmárk. IV. Torna, Nagy-Szőllős, Batarcs, Fekete-Ardó, Halmi, Kis-Gércze. V. Zilah. VII. Károlyváros. VIII. Buccari.

Delphax Fabr.

84. *discolor* Boh. — III. Tátrafüred. IV. Pop-Iván. V. Görgény.

85. *pellucida* Fabr. — In regionibus I—VII. frequens; in regione VIII. nondum reperta.

86. *striatella* Fall. — Per totum regnum frequens.

87. *elegantula* Boh. — I. Budapest, Rákos-Palota, Göd, Kis-Szent-Miklós, Monor, Farkasd, Felső-Tárkány. II. Simontornya, Kup. III. Gerencsér. IV. Passim sat frequens. V. Tasnád, Peér, Görgény, Brassó. VII. Ruma, Verőcze, Károlyváros.

88. *minuscula* Horv. — I. Budapest, Kis-Sz.-Miklós, Gyón, Kecskemét, Pusztaszer, Dorozsma, Szeged, Megyes-Bodzás, Paulis. II. Tata, Simontornya. VI. Deliblat. VIII. Novi.

89. *albostriata* Fieb. — I. Isaszeg, Peszér, Gyón, Kecskemét, Farkasd, Sajó-Sz.-Péter. II. Simontornya. IV. Passim haud rara. V. Tasnád, Peér, Pele-Szarvad, Szucsák, Gyergyó-Szent-Miklós. VI. Zombor.

90. *propinqua* Fieb. — In regionibus I—III. et V—VIII. haud rara; in regione IV. hucusque haud inventa.

91. *sordidula* Stål. — II. Zircz, Pápa, Oroszvár. III. Kis-Tapolcsány. IV. Kassa, Juszko-Volya, Nagymihály. V. Bölön, Brassó.

92. *collina* Boh. — I. Csepel, Nagyvárad: Felixfürdő. III. Pozsony. IV. Passim obvia. V. Szőcs-Demeter, Szt-Gothárd, Görgény, Borgó-Prund, Tihucza. VII. Vrdnik. VIII. Fiume, Orehovica, Martinšćica, Cirkvenica, Novi, Zengg.

93. *obscurella* Boh. — II. Pápa. III. Árvaváralja. IV. S.-A.-Ujhely, Varannó. VII. Stalak.

94. *palliceps* Horv. — I. Göd. VI. Grebenácz. VIII. Fiume, Sušak, Sv.-Jelena.

95. *forcipata* Boh. — III. Késmárk. IV. Bártfa. V. Görgény, Tihucza.

96. *leptosoma* Flor. — I. Isaszeg, Kecskemét. IV. Varannó.
97. *Fieberi* Scott. — I. Isaszeg.
98. *venosa* Germ. — I. Passim obvia. II. Simontornya, Szent-Lőrincz (Baranya), Kup, Ruszt. IV. Forró, Szerencs, S.-A.-Ujhely, Szécs-Polyánka, Varannó, Beregszász. VI. Pancsova.
99. *Bohemani* Stål. — III. Tátra. IV. Varannó, Juszko-Volya.
100. *lugubrina* Boh. — IV. Tokaj, Kaponya, S.-A.-Ujhely, Varannó. V. Gyeke. VII. Vrdnik.
101. *Aubéi* Perr. — I. Budapest, Kis-Szent-Miklós, Farkasd. II. Simontornya. IV. Forró. VI. Petrovoszelo, Deliblat, Grebenácz. VII. Otočac, Melnice, Breze. VIII. Fiume, Buccari, Cirkvenica, Grižane, Novi.
102. *exigua* Boh. — I. Budapest, Rákos-Palota, Csepel, Kecskemét. III. Lucski. IV. Forró, S.-A.-Ujhely, Szomotor. VI. Deliblat, Duplaj.
103. *spinosa* Fieb. — I. Budafok, Isaszeg. II. Simontornya. IV. Varannó, Nagymihály, Batarcs, Gyula. V. Tasnád, Pele-Szarvad, Szent-Gothárd, Szucsák. VI. Marilla.
104. *brevipennis* Boh. — III. Stubnya. IV. Szécs-Polyánka, Nagy-Szőllős, Fekete-Ardó, Kis-Gércze. V. Pele-Szarvad. VII. Zágráb.
105. *Mocsáryi* Horv. — I. Szeged.
106. *straminea* Stål. — I. Budapest, Kecskemét, Dorozsma, Gyoma, Nyiregyháza. VII. Pékla.
107. *flaveola* Flor. — I. Paulis. II. Velencze. IV. Varannó. V. Görgény, Tihucza.

Metropis Fieb.

108. *Mayri* Fieb. — I. Budapest, Rákos-Palota.
109. *flavipes* Sign. — I. Budapest, Budakesz, Isaszeg, Gödöllő, Csèpel. II. Pécs, Kúp.
110. *latifrons* Kb. — I. Budapest, Isaszeg, Szendrő. IV. Varannó. V. Szent-Gothárd.
111. *lugubris* Sign. — I. Budapest, Rákos-Palota, Farkasd. Femina unica macroptera ad I. Isaszeg.

Dicranotropis Fieb.

112. *hamata* Boh. — In regionibus I—VII. haud rara; in regione VIII. nondum reperta.
113. *divergens* Kb. — III. Csorba.
114. *carpathica* Horv. — IV. Pop-Iván.
115. *flavipes* Sign. — I. Farkasd.

Stiroma Fieb.

116. *montana* Horv. — V. Görgény.
117. *albomarginata* Curt. — III. Késmárk.
118. *Pteridis* Boh. — III. Tátrafüred. VI. Bozovics. VII. Károlyváros, Plitvica, Melnice.
119. *bicarinata* H.-Sch. — IV. Pop-Iván. V. Tömös, Bucsecs.
120. *affinis* Fieb. — III. Késmárk. V. Görgény, Tihucza.
121. *ruficeps* Melich. — I. Sajó-Szent-Péter.

Sectio. STERNORHYNCHA.

Fam. PSYLLIDAE.

Livia Latr.

1. *Juncorum* Latr. — I. Rákos-Palota, Felső-Pakony, Gyón, Kecskemét. II. Simontornya, Badacsony. III. Stubnya, Lucski, Késmárk. IV. Torna, Velejte, Varannó, Zsalobina. V. Tihucza, Görgény, Tusnád, Felső-Bajom. VI. Ujvidék. VII. Varasd-Teplicz.
2. *limbata* Waga. — II. Simontornya.

Euphyllura Först.

3. *olivina* Costa. — VIII. Sušak, Sv.-Jelena, Cirkvenica, Selce.
4. *Phillyreae* Först. — VIII. Sušak.

Rhinocola Först.

5. *Aceris* L. — I. Budapest, Isaszeg, Farkasd. III. Trencsén. IV. Csicsva, Szatmár-Németi. V. Alsó-Zsuk. VII. Lipik.
6. *bicolor* Scott. — V. Felső-Bajom.
7. *Ericae* Curt. — III. Pozsony. VII. Breze.
8. *speciosa* Flor. — I. Passim frequens. II. Tata, Soóly, Lelle, Simontornya. IV. Alsó-Kemencze, Kis-Azar, Bély. VI. Duplaj. VIII. Buccari, Cirkvenica, Novi.
9. *subrubescens* Flor. — VIII. Buccari, Novi.

Aphalara Först.

10. *Kochiae* Horv. — I. Kis-Szent-Miklós.
11. *Artemisiae* Först. — IV. Sátoralja-Ujhely. V. Szamosfalva.
12. *conspersa* Löw. — VI. Langenfeld.
13. *nebulosa* Zett. — IV. Körtvélyes (Torna). V. Görgény.
14. *nervosa* Först. — I. Budapest, Gödöllő, Szendrő. II. Szegszárd. IV. Passim haud rara. V. Tihucza. VI. Jazova, Orsova. VII. Lipik.
15. *subpunctata* Först. — IV. Kis-Azar. V. Görgény, Tihucza. VI. Berzászka.

16. *affinis* Zett. — V. Görgény.
17. *Calthae* L. — In regionibus I—VI. sat frequens.
18. *innoxia* Först. — I. Budapest. IV. Tarczal. V. Tasnád, Sző-Demeter, Pele-Szarvad.
19. *picta* Zett. — I. Budapest. III. Selmeczbánya, Trencsén, Stubnya, Turcsek, Késmárk, Szepes-Béla. IV. Bártfa, Orosz-Ruszka. V. Borgó-Prund, Tihucza, Borszék, Csik-Szent-Domokos, Görgény. VII. Stalak, Vaganski vrh.

Psyllopsis Löw.

20. *fraxinicola* Först. — I. Budapest, Horgos. II. Simontornya. IV. Széphalom. VII. Komorsko-Moravice.
21. *meliphila* Löw. — VIII. Fiume, Selce.
22. *Fraxini* L. — I. Budapest, Kalocsa. II. Szegszárd. IV. Szádellő. VI. Baziás.
23. *discrepans* Flor. — II. Simontornya, Szegszárd. V. Kolozsvár.

Calophya Löw.

24. *Rhois* Löw. — I. Budapest. VIII. Fiume, Martinšćica.

Psylla Geoffr.

25. *breviantennata* Flor. — III. Rajecz. IV. Torna, Szádellő. VII. Podsused, Stalak, Breze.
26. *Pyri* L. — I. Budapest, Farkasd, Eger, Tarczal, Horgos. II. Simontornya, Pápa, Oroszvár, Bonyhád. IV. S.-A.-Ujhely, Kassa, Körtvélyes (Torna). V. Szent-Gothárd, Görgény.
27. *pyricola* Först. — II. Simontornya. IV. Csicsva. V. Görgény-Szent-Imre.
28. *simulans* Först. — IV. Szomotor. V. Brassó.
29. *Crataegi* Schrk. — I. Budapest, Isaszeg, Gödöllő, Farkasd. II. Pécs. IV—V. Passim obvia. VI. Marilla, Mehádia, Orsova, Szent-Helena. VII. Vrdnik, Podsused, Melnice, Gospić.
30. *pyrisuga* Först. — I. Budapest, Visegrád, Farkasd, Szendrő. II. Pécs, Oroszvár. III. Isztebnik, Csorba. IV. Passim frequens. V. Pele, Bánffy-Hunyad, Torda, Besztercze. VI. Ada.
31. *peregrina* Först. — I. Budakesz, Farkasd. IV. Jabloncza, Csicsva. V. Szent-Gothárd, Görgény, Zernest, Törcsvár. VI. Deliblat, Marilla. VII. Lipik, Varasd, Breze.
32. *Mali* Schmdbg. — II. Simontornya, Sárvár, Magyar-Óvár, Oroszvár. III. Trencsén, Lucski. IV. Körtvélyes (Torna), Mád, Vihorlat, Szatmár-Németi. V. Törcsvár.
33. *Ulmi* Först. — I. Budapest. V. Gyergyó-Vasláb.
34. *Viburni* Löw. — V. Mező-Záh, Puszta-Kamarás, Szent-Gothárd.
35. *Visci* Curt. — I. Isaszeg. II. Simontornya.
36. *fusca* Zett. — III. Késmárk, Tátraháza, Javorina. V. Tihucza.
37. *Alni* L. — II. Sárvár. III. Késmárk. IV. Kassa, Körtvélyes (Torna). V. Görgény, Kovászna, Barczaság, Tömös.
38. *Foersteri* Flor. — II. Zircz, Kup, Zákány. III. Borosznó, Stubnya, Késmárk, Tátraháza. IV—V. Passim frequens. VI. Fehértemplom, Mehádia.
39. *Buxi* L. — I. Budapest, Göd, Gödöllő, Eger. II. Sárvár. III. Pozsony.
40. *Pruni* Scop. — In omnibus regionibus sat frequens.
41. *melanoneura* Först. — Per totum regnum frequens.
42. *affinis* Löw. — II. Sárvár. V. Tasnád.
43. *nigrita* Zett. — II. Simontornya, Pécs. III. Szent-György (Pozsony). IV. Szatmár-Németi.
44. *elegantula* Zett. — III. Lucski. V. Görgény, Puj. VI. Marilla.
45. *saliceti* Först. — I. Farkasd. II. Simontornya, Zákány. IV. Kassa.
46. *rhamnicola* Scott. — V. Mező-Záh, Szent-Gothárd.
47. *ambigua* Först. — III. Lucski. V. Görgény. VI. Ujvidék. VII. Pétervárad, Vrdnik.
48. *suturalis* Horv. — VII. Breze. VIII. Cirkvenica, Zengg.
(*salicicola* Först. apud nos hucusque haud inventa; species sub hoc nomine e III. Lucski enumerata [Horváth, 97, Löw, 148] est = *P. elegantula* Zett.)

Amblyrrhina Löw.

49. *maculata* Löw. — I. Budapest, Rákos-Palota, Monor, Nagy-Kőrös, Szeged. IV. Szomotor. VI. Deliblat, Grebenácz.
(*Arytaina Genistae* Latr. in Hungaria haud occurrit; specimina irrite sub hoc nomine e IV. Szomotor et VI. Grebenácz enumerata [Horváth, 97, Löw, 148] ad speciem præcedentem pertinent.)

Livilla Curt.

50. *Ulicis* Curt. — IV. Vihorlat. V. Vöröstorony. VI. Plavisevicza.

Floria Löw.

51. *Horváthi* Scott. — IV. S.-A.-Ujhely, Szőllőske, Szécs-Polyánka, Kapnikbánya.

Alloeoneura Löw.

52. *radiata* Först. — I. Budapest, Rákos-Palota, Isaszeg, Szendrő. II. Simontornya, Szegszárd. III. Pozsony. IV. Passim haud rara. V. Brassó. VI. Deliblat, Grebenácz, Zlaticza, Mehádia. VII. Pétervárad, Čerević, Vrdnik.

Homotoma Guér.

53. *Ficus* L. — VIII. Sušak, Tersatto, Buccari, Cirkvenica, Selce, Novi.

Bactericera Put.

54. *Perrisii* Put. — I. Budapest, Monor.

Trichopsylla Thoms.

55. *Walkeri* Först. — I. Budapest, Göd, Farkasd, Eger, Felső-Tárkány. II. Ercsi, Simontornya, Balatonfüred. III. Nemes-Podhrágy. IV. Torna, Szin.

Trioza Först.

56. *trisignata* Löw. — VIII. Cirkvenica.

57. *Centranthi* Wall. — I. Budapest. II. Szegszárd, Pécs. III. Lucski. V. Nagy-Enyed. VIII. Novi.

58. *velutina* Först. — I. Budapest. V. Szent-Gothárd. VI. Marilla.

59. *Chenopodii* Reut. — I. Budapest, Nyiregyháza. II. Simontornya. III. Magyar-Bél, Szent-György (Pozsony), Modor. IV. Beregszász.

60. *Galii* Först. — I. Budapest, Rákos-Palota, Farkasd, Szendrő. II. Pécs, Nagy-Kanizsa. IV. Nagymihály. V. Szent-Gothárd, Görgény. VI. Deliblat, Duplaj. VII. Vrdnik, Melnice. VIII. Fiume.

61. *recondita* Flor. — VIII. Fiume, Grižane, Novi.

62. *mesomela* Flor. — I. Kecskemét, Szeged. II. Dörgicse. IV. Forró, S.-A.-Ujhely, Varannó. V. Medgyes. VI. Deliblat.

63. *coriacea* Horv. — V. Lotrióra.

64. *alacris* Flor. — VIII. Fiume.

65. *Horváthii* Löw. — I. Budapest, Gödöllő, Farkasd, Paulis. II. Simontornya, Szegszárd. IV. Szikszó, Tarczal, Varannó. V. Tasnád, Felső-Bajom. — Etiam in Gallia meridionali legi.

66. *dichroa* Scott. — II. Duna-Földvár. IV. Tarczal.

67. *Scottii* Löw. — VII. Podsused.

68. *versicolor* Löw. — I. Kis-Szent-Miklós, Kecskemét, Szeged. VI. Deliblat, Duplaj.

69. *albiventris* Först. — I. Budapest, Budafok. II. Simontornya, Nagy-Kanizsa. IV. Horváti (Torna), S.-A.-Ujhely, Varannó. V. Szent-Gothárd, Görgény. VII. Podsused.

70. *fraudatrix* Horv. — VIII. Sušak, Novi.

71. *Rhamni* Schrk. — I. Farkasd.

72. *remota* Först. — I. Budapest, Rákos-Palota, Göd, Farkasd, Felső-Tárkány, Debreczen. II. Simontornya, Badacsony. IV. Czéke, Szécs-Polyánka. V. Tasnád. VI. Marilla. VII. Varasd-Teplicz, Podsused.

73. *Urticae* L. — In regionibus I—VII. valde frequens; in regione VIII. nondum reperta.

74. *curvatinervis* Först. — III. Stubnya, Lucski. IV. S.-A.-Ujhely, Szécs-Polyánka, Kassa.

75. *Saundersi* M. D. — V. Csik-Szent-Domokos.

76. *maura* Först. — IV. Varannó-Csemernye. VII. Varasd. VIII. Grižane, Novi.

77. *nigricornis* Först. — I. Budapest. II. Pécs. III. Szent-György (Pozsony). VIII. Zengg.

78. *acutipennis* Zett. — III. Lucski, Tátra. IV. Szádellő, Sátoralja-Ujhely, Szöllőske, Pop-Iván. V. Tihucza, Borszék, Csik-Szent-Domokos, Görgény, Tömös.

79. *striola* Flor. — II. Simontornya.

80. *abdominalis* Flor. — III. Csorba.

81. *Aegopodii* Löw. — I. Budapest. VII. Varasd-Teplicz.

82. *Chrysanthemi* Löw. — III. Lucski.

83. *Cirsii* Löw. — III. Lucski.

84. *Cerastii* H. Löw. — III. Borosznó, Rajecz, Csorba, Tátrafüred. IV. Pop-Iván. V. Görgény, Csik-Szent-Domokos, Zernest, Törcsvár. VI. Marilla.

85. *Greisigeri* Horv. — III. Késmárk.

86. *proxima* Flor. — VII. Podsused. VIII. Buccari.

87. *dispar* Löw. — III. Lucski, Oszadka. IV. Kapnikbánya. V. Görgény, Göde-Mesterháza, Tihucza, Domuk, Csik-Szent-Domokos, Tömös, Törcsvár, Zernest. VI. Marilla.

(*marginepunctata* Flor apud nos hucusque haud reperta; species sub hoc nomine e VIII. Sušak enumerata [Horváth, 97, Löw 148] est = *fraudatrix* Horv.)

Fam. APHIDIDAE.

Siphonophora Koch.

1. *Kochii* Ferr. (*Artemisiae* Koch, nec Boy.) — I. Budapest.

2. *Rosae* L. — Per totum regnum vulgaris.

3. *Cyparissiae* Koch. — IV. Zsalobina.

4. *granaria* Kirby (*cerealis* Kalt.) — In regionibus I—VI. frequens.

5. *Chelidonii* Kalt. — V. Nagyszeben.

6. *Urticae* Schrk. — IV. Forró, Varannó.

7. *Solani* Kalt. — IV. Forró.

8. *Malvae* Mosl. — II. Zircz. V. Nagyszeben.

9. *Ulmariae* Schrk. — In regionibus I—VI. frequens.

10. *Sonchi* Pass. — I. Budapest, Kecskemét.
11. *Viciae* Koch. — I. Budapest.
12. *Absinthii* L. — I. Kecskemét.
13. *Millefolii* Fabr. — I. Budakesz. II. Simontornya. IV. Hidas-Németi, Detek, Varannó, V.-Csemernye, Nagy-Domása. V. Nagyszeben.
14. *circumflexa* Buckt. — In tepidariis: I. Budapest. V. Nagyszeben.
15. *Artemisiae* Boy. — I. Apostag. IV. Forró, Varannó.
16. *Solidaginis* Fabr. — I. Budakesz.
17. *Serratulae* Kalt. — IV. Forró, Varannó.
18. *Picridis* Fabr. — I. Budapest. IV. Forró, Ránk, Varannó, Zsalobina, Dobra. V. Nagyszeben.
19. *Jaceae* L. — I. Budapest, Budakesz. IV. Forró, Nagy-Domása. V. Nagyszeben.

Phorodon Pass.

20. *Cannabis* Pass. — I. Budapest.
21. *Humuli* Schrk. — V. Nagyszeben.

Drepanosiphum Koch.

22. *platanoides* Schrk. — I. Budapest.
23. *acerinum* Walk. (*Aceris* Koch.) — I. Farkasd. IV. Kelcse. V. Alsó-Zsuk.

Rhopalosiphum Koch.

24. *Lactucae* Kalt. — IV. Forró, Varannó. V. Tasnád.
25. *Ligustri* Kalt. — I. Budapest.
26. *Persicae* Sulz. — IV. Varannó. V. Kolozsvár, Nagyszeben.
27. *Staphyleae* Koch. — I. Budapest.
28. *Nympheae* L. — V. Ér-Kőrös, Nagyszeben.

Myzus Pass.

29. *Cerasi* Fabr. — In regionibus I—II. et IV—VI. passim obvius.
30. *Lychnidis* Koch. — I. Budapest, Rákos-Palota. IV. Forró, Varannó, Dobra. V. Nagyszeben.
31. *Oxyacanthae* Koch. — I. Budapest, Szent-Endre.
32. *Mali* Ferr. — V. Tasnád.
33. *Tanaceti* L. — V. Nagyszeben.
34. *tetrarhoda* Walk. — V. Nagyszeben.
35. *Ribis* L. — In regionibus III—IV. passim occurrit.
36. *Lythri* Schrk. — V. Nagyszeben.
37. *Mahaleb* Koch. — I. Budapest.
38. *Sorbi* Kalt. — I. Budapest.

Hyalopterus Koch.

39. *Pruni* Fabr. — I. Budapest, Budafok. IV. Forró, Aranyos-Megyes. V. Nagyszeben.
40. *Arundinis* Fabr. — IV. Tarczal, Varannó. V. Nagyszeben.

Toxoptera Koch.

41. *Graminum* Rond. — In regionibus I—IV. et VI. passim valde frequens.

Aphis L.

42. *Padi* L. — I. Székelyhid. IV. Varannó. V. Nagyszeben.
43. *Crataegi* Kalt. — I. Budapest. IV. Tarczal, Juszko-Volya. VI. Ada.
44. *Brassicae* L. — In regionibus I—II. et IV—V. passim frequens.
45. *Avenae* Fabr. — I. Bessenszög.
46. *Clematidis* Koch. — I. Budapest.
47. *Grossulariae* Kalt. — I. Budapest. V. Nagyszeben.
48. *saliceti* Kalt. — V. Nagyszeben.
49. *Urticae* Fabr. — I. Budafok. II. Duna-Földvár. IV. Varannó, Nagy-Domása. V. Nagyszeben.
50. *Ballotae* Pass. — IV. Forró.
51. *Symphyti* Schrk. — I. Budapest. II. Ménfő. IV. Varannó.
52. *Cucurbitae* Buckt. — I. Jász-Kisér.
53. *Plantaginis* Schrk. — I. Budakesz, Parád. II. Simontornya. IV. Varannó, Tavarna. V. Pele, Nagyszeben.
54. *Capsellae* Kalt. — IV. Forró, Varannó.
55. *Mali* Fabr. — I. Budapest, Alattyán, Kápolna. IV. Nagymihály. V. Tasnád, Nagyszeben.
56. *Cardui* Kalt. — I. Budapest, Budakesz. IV. Forró. V. Nagyszeben.
57. *Medicaginis* Koch. — IV. Forró, Megyaszó.
58. *craccivora* Koch. — II. Alap, Sajtos-Kál. VI. Futtak.
59. *Sedi* Kalt. — V. Nagyszeben.
60. *Epilobii* Kalt. — I. Mátra.
61. *Evonymi* Fabr. — I. Budapest, Szeged. II. Simontornya. V. Kolozsvár, Nagyszeben. VI. Temesvár.
62. *Intybi* Koch. — IV. Varannó. V. Nagyszeben.
63. *Sambuci* L. — I. Budapest, Budakesz. IV. Kassa, Dobra. V. Nagyszeben.
64. *Viburni* Scop. — I. Budapest. IV. Varannó. V. Nagyszeben.
65. *Laburni* Kalt. — I. Passim valde frequens. VI. Baja.
66. *Papaveris* Fabr. — In regionibus I—VI. vulgaris.
67. *ochropus* Koch. — IV. Forró, Varannó.
68. *Rumicis* L. — I. Budapest. V. Nagyszeben, Pele. VI. Zombor.
69. *Craccae* Schrk. — I. Budapest. V. Nagyszeben.
70. *Galii* Kalt. — V. Nagyszeben.
71. *Genistae* Scop. — I. Budakesz.

72. *Euphorbiae* Kalt. — IV. Komarócz. V. Nagyszeben.
73. *Atriplicis* L. — I. Budapest. II. Simontornya. V. Nagyszeben.
74. *Persicae* Boy. — In regionibus I—II. et IV—V. passim frequens.
75. *Centaureae* Koch. — IV. Forró.
76. *Tragopogonis* Kalt. — IV. Varannó-Csemernye. V. Nagyszeben.
77. *Pyri* Koch. — I. Szent-Endre. IV. Forró. V. Nagyszeben.
78. *Angelicae* Koch. — V. Nagyszeben.
79. *Heraclei* Koch. — V. Nagyszeben.
80. *Lappae* Koch. — IV. Forró. V. Tasnád.
81. *gallarum* Kalt. — I. Budapest.

Siphocoryne Pass.

82. *Capreae* Fabr. — I. Budapest, Parád. IV. Forró, Dargó, Varannó. V. Nagyszeben. VI. Cséb.

Melanoxanthus Buckt.

(*Clavigerus* Szépligeti.)

83. *Salicis* L. — I. Budapest, Parád. V. Nagyszeben. VII. Plitvica.

Cladobius Koch.

84. *Lantanae* Koch. — V. Nagyszeben.
85. *populeus* Kalt. — In regionibus I—II. et IV—V. inventus.

Chaitophorus Koch.

86. *Capreae* Koch. — IV. Varannó-Csemernye.
87. *salicivora* Walk., Pass. — V. Nagyszeben.
88. *Aceris* L. — I. Budapest, Sajó-Kaza. IV. Csicsva. V. Nagyszeben. VI. Marilla. VII. Lipik. VIII. Novi.
89. *Populi* L. — Per totum regnum frequens.
90. *leucomelas* Koch (*versicolor* Koch). — In omnibus regionibus frequens.
91. *salicti* Schrk. — V. Nagyszeben.

Sipha Pass.

92. *Maydis* Pass. — I. Gyöngyös, Karácsond, Bánhegyes. II. Simontornya, Sátoristye. V. Nagyszeben. VI. Futtak.

Bradyaphis Mordw.

93. *antennata* Kalt. — I. Sajó-Kaza. V. Törcsvár.

Myzocallis Pass.

94. *Ononidis* Kalt. — I. Békés.
95. *Quercus* Kalt. — I. Budapest, Szendrő. IV. Tavarna.
96. *Coryli* Goeze. — I. Budapest. V. Nagyszeben.

Pterocallis Pass.

97. *Platani* Kalt. (*elegans* Koch). — I. Budapest. IV. Forró, S.-A.-Ujhely.
98. *Tiliae* L. — IV. Kelcse. V. Nagyszeben.
99. *Alni* Fabr. — IV. Varannó-Csemernye. V. Nagyszeben.
100. *nigritarsis* Heyd. (*Betulae* Koch). — I. Sajó-Kaza. IV. Juszko-Volya. V. Puszta-Kamarás. VII. Varasd-Teplicz.

Callipterus Koch.

(*Ptychodes* Buckt.)

101. *Juglandis* Frisch. — I. Leányfalu. II. Simontornya, Lelle, Soóly. IV. Forró, Varannó-Csemernye, Aranyos-Megyes. V. Nagyszeben.

Phyllaphis Koch.

102. *Fagi* L. — I. Budapest. III. Osztrigrum-Hrabicsó, Felső-Hámor (Bars). IV. Bártfa. V. Rogozsel.

Symydobius Mordw.

103. *oblongus* Heyd. — IV. Bánszka, Juszko-Volya.

Pterochlorus Rond.

(*Dryobius* Koch.)

104. *Roboris* L. — V. Tasnád.
105. *longipes* Duf. (*croaticus* Koch). — In regionibus I—II., IV—V. et VII—VIII. passim occurrit.

Stomaphis Buckt.

106. *Quercus* L. — I. Debreczen. II. Soóly. VI. Fehértemplom.
107. *longirostris* Pass. — I. Kun-Madaras.

Lachnus Illig.

108. *viminalis* Boy. — I. Budapest, Keczel. II. Sárvár. V. Nagyszeben.
109. *grossus* Kalt. (*Piceae* Panz.) — III. Tátrafüred, Csorba, Lucski. V. Gernyeszeg.
110. *nudus* De Geer (*Pini* Koch). — I. Budapest. IV. Dobra. V. Nagyszeben.
111. *pinicola* Kalt. — I. Szendrő. III. Tátrafüred, Csorba. IV. Dobra. V. Nagyszeben.
112. *pineus* Mordw. (*pineti* Koch). — IV. Zsalobina.
113. *Juniperi* De Geer. — I. Bugacz. IV. Varannó, Csicsva, Zsalobina. VII. Podsused. VIII. Cirkvenica.

Mindarus Koch.

114. *abietinus* Koch. — I. Ér-Mihályfalva.
115. *pineti* Fabr., Kalt. — V. Nagyszeben.

Paracletus Heyd.

116. *cimiciformis* Heyd. — I. Farkasd, Békés-Csaba. V. Alsó-Zsuk. VI. Csősztelek.

Trama Heyd.

117. *troglodytes* Heyd. — I. Farkasd. V. Nagyszeben.

118. *radicis* Kalt. — I. Kunágota. II. Gödre-Szent-Márton.

Pachypappa Koch.

119. *vesicalis* Koch. — III. Borosznó.

Schizoneura Hart.

120. *lanuginosa* Hart. — I—II. Passim sat frequens. III. Mons Szitnya. IV. Torna, Tarczal, Szőllőske. V. Passim obvius. VI. Szabadka, Tisza-Szent-Miklós. VII. Podsused. VIII. Buccari, Cirkvenica, Grižane.

121. *Ulmi* L. — I. Passim haud rarus. II. Simontornya, Magyar-Óvár. III. Selmeczbánya. IV. Széphalom, Kassa. V. Sat frequens. VI. Tisza-Szent-Miklós. VIII. Cirkvenica, Novi, Zengg.

Anoecia Koch.

122. *Corni* Fabr. (*vagans* Koch.) — I—IV. Sat frequens. V. Kolozsvár, Mező-Záh, Nagyszeben. VII. Podsused, Breze, Žutalokva.

123. *venusta* Pass. (*Corni* Koch, nec Fabr.) — Per totum regnum frequens.

Myzoxylus Blot.

124. *laniger* Hausm. — I. Szeged, Arad, Ménes, Paulis, Radna, Tornya (Csanád). II. Passim valde frequens. III. Puszta-Födémes. VI. Passim valde diffusus. VIII. Buccari (hic jam penitus exstinctus).

Colopha Monell.

125. *compressa* Koch. — I. Budapest, Göd, Monor, Szeged, Sajó-Kaza. II. Keszthely. III. Ujbánya. V. Nagyszeben.

Thecabius Koch.

(*Bucktonia* Licht.)

126. *affinis* Kalt. — Per totum regnum passim obvius.

Kessleria Licht.

127. *spirothecae* Pass. — Per totum regnum vulgaris.

Pemphigus Hart.

128. *Bumeliae* Schrk. — I. Budapest. II. Magyar-Óvár. IV. Tolcsva. V. Nagyszeben, Brassó. VII. Podsused. VIII. Cirkvenica.

129. *nidificus* Löw. — I. Horgos. V. Kolozsvár.

130. *Xylostei* De Geer. — III. Szepes-Béla. V. Kolozsvár.

131. *vesicarius* Pass. — II. Pilis-Marót. VIII. Buccari, Cirkvenica, Grižane, Novi.

132. *bursarius* L. — Per totum regnum vulgaris.

133. *pyriformis* Licht. — In omnibus regionibus frequens.

134. *protospirae* Licht. — I. Csongrád, Megyes-Bodzás. II. Esztergom, Kéménd. III. Mária-Nosztra. V. Kolozsvár, Peér, Görgény-Szent-Imre. VI. Tisza-Szent-Miklós, Deliblat, Duplaj.

135. *Populi* Courchet. — I. Budapest, Kis-Szent-Miklós, Megyes-Bodzás. II. Lelle, Badacsony. IV. Szomotor. V. Kolozsvár, Alsó-Zsuk. VIII. Buccari.

136. *ovato-oblongus* Kessler. — I. Budapest, Kis-Szent-Miklós, Szeged, Megyes-Bodzás. II. Simontornya, Badacsony. III. Felka. V. Bánffy-Hunyad, Alsó-Zsuk, Görgény-Szent-Imre, Nagyszeben. VI. Deliblat, Grebenácz.

137. *lactucarius* Pass. — II. Lesencze-Tomaj.

138. *Ranunculi* Kalt. — I. Szendrő.

Tetraneura Hart.

139. *utricularia* Pass. — VIII. Fiume, Sušak, Tersatto, Sv.-Jelena, Cirkvenica, Novi, Jablanac.

140. *cornicularia* Pass. — VIII. Fiume, Sušak, Tersatto, Sv.-Jelena, Cirkvenica, Bribir, Novi.

141. *semilunaria* Pass. — VIII. Fiume, Sušak, Tersatto, Buccari, Sv.-Jelena, Cirkvenica, Novi.

142. *follicularia* Pass. — VIII. Fiume, Martinšćica, Buccari, Sv.-Jelena, Cirkvenica, Selce, Novi, Jablanac.

143. *Setariae* Pass. — I. Farkasd, Bánhegyes, Megyes-Bodzás, Apácza, Hajdu-Dorog. II. Simontornya. IV. Tarczal. V. Brassó. VI. Tisza-Szent-Miklós. VII. Čerević.

144. *pallida* Halid. — I. Passim haud rara. II. Simontornya, Lelle, Badacsony, Keszthely. IV. Torna. V. Szent-Gothárd. VI. Szabadka, Titel. VII. Lipovljane.

145. *gallarum Ulmi* De Geer. — Per totum regnum valde frequens. Etiam forma radicicola: *Zeae-Maydis* Duf.

146. *rubra* Licht. — I. Budapest, Monor, Farkasd, Hódmező-Vásárhely, Paulis. II. Székesfehérvár, Simontornya. V. Bánffy-Hunyad, Nagy-Enyed, Medgyes. VI. Szabadka, Tisza-Szent-Miklós, Titel, Plavisevicza. VIII. Novi.

147. *caerulescens* Pass. (*fuscifrons* Koch.) — I. Orosháza, Bánhegyes, Mező-Kovácsháza, Megyes-Bodzás, Mező-Berény, Debreczen, Hajdu-Dorog. VI. Nagy-Zsám, Ó-Lécz, Grabácz.

148. *Phaseoli* Pass. — II. Esztergom, P.-Kéty (Esztergom). VI. Uj-Arad.

Pentaphis Horv.

149. *marginata* Koch. — I. Sat frequens. II. Simontornya. VI. Futtak, Tisza-Szent-Miklós, Zsombolya, Nagy-Zsám.

150. *trivialis* Pass. — I. Passim valde frequens. II. Szend, Nagy-Esztergár, Szigetvár, Német-Ujfalu. IV. Tarczal. V. Visa, Szent-Gothárd, Simontelke. VI. Futtak, Ó-Lécz, Gyér.

Forda Heyd.

151. *formicaria* Heyd. — II. Gödre-Szent-Márton.

Amycla Koch.

152. *fuscicornis* Koch. — I. Farkasd.

Phloeomyzus Horv.

(*Löwia* Licht.)

153. *Passerinii* Sign. — I. Budapest.

Vacuna Heyd.

154. *dryophila* Schrk. — I. Budapest, Budakesz, Sajó-Kaza. V. Nagyszeben. VI. Orsova. VIII. Fiume, Martinšćica.

Glyphina Koch.

155. *Betulae* Kalt. — V. Nagyszeben.

Chermes L.

156. *Abietis* L. — In regionibus I—VII. passim frequens. Etiam forma laricicola: *Laricis* Hart.

157. *strobilobius* Kalt. — III. Borosznó, Lucski. V. Kolozsvár, Göde-Mesterháza, Törcsvár. VII. Varasd-Teplicz.

158. *pectinatae* Cholodk. (*coccineus* Ratzb., Cholodk.) — IV. Kelecseny. VI. Marilla.

159. *Pini* Koch. — V. Nagyszeben (Henrich, 45: sub nomine *Ch. corticalis* Kalt.)

160. *Strobi* Hart. (*corticalis* Kalt.) — VI. Temesvár: Vadászerdő.

Phylloxera Boy.

161. *vastatrix* Planch. — Vitium hæc pestis in regionibus I—VII. jam valde diffusa; nunc etiam regionem VIII. invasit, vineta pagi Kostrena-Sv.-Barbara inficiens.

162. *coccinea* Heyd. — I. Budapest, Farkasd, Fel-Német, Nagyvárad: Püspökfürdő, Nagy-Kőrös, Kecskemét, Szeged. VI. Szabadka. Præsertim var. *punctata* Licht.

163. *corticalis* Kalt. — VI. Temesvár: Vadászerdő.

164. *spinulosa* Targ. — I. Budapest, Fel-Német, Felső-Tárkány, Bakta (Heves), Bogács. II. Simontornya, Pécs.

Fam. ALEURODIDAE.

Aleurodes Latr.

1. *proletella* L. — I. Budapest.

2. *Brassicae* Walk. — II. Simontornya.

3. *Phillyreae* Halid. — II. Lesencze-Tomaj.

4. *immaculata* Heeg. — IV. Tarczal. VIII. Novi.

5. *Aceris* Geoffr. — I. Budapest, Farkasd. II. Simontornya. V. Kolozsvár.

Fam. COCCIDAE.

Orthezia Bosc.

1. *Urticae* L. — In regionibus I. et III—VII. haud rara.

2. *cataphracta* Shaw. — III. Tátra: Vöröstó. VII. Karst: Višnjevica.

Ortheziola Šulc.

3. *Vejdovskyi* Šulc. — III. Pozsony. IV. Runyina.

Westwoodia Sign.

4. *Hordei* Lind. — I. Maglód, Farkasd, Bánhegyes. II. Kéty (Esztergom).

Pseudococcus Westw.

5. *Aceris* Sign. — VI. Marilla.

6. *Mespili* Geoffr. — II. Pápa.

Dactylopius Costa.

7. *Adonidum* L. — In tepidariis: I. Budapest, III. Pozsony.

8. *brevispinus* Targ. (*Vitis* Nedz., nec L.) — I. Szent-Endre, Farkasd. II. Kis-Barát.

Acanthococcus Sign.

9. *Aceris* Sign. — I. Budapest.

Gossyparia Sign.

10. *Ulmi* Geoffr. — I. Budapest, Kecskemét, Horgos. II. Keszthely, Sajtos-Kál.

Kermes Targ.

11. *variegatus* Gmel. — IV. Deregnyő. VIII. Sv.-Križ prope Zengg.

12. *reniformis* Geoffr. — I. Nagy-Kőrös, Kecskemét. IV. Lelesz, Battyán, Deregnyő, Csonka-Papi.

13. *gibbosus* Sign. — I. Budapest.

Lecanopsis Targ.

14. *rhizophila* Targ. — I. Szent-Endre.

Physokermes Targ.

15. *hemicryphus* Dalm. (*racemosus* Ratzbg.) — I. Ér-Mihályfalva. II. Muraszombat. III. Polhora. VII. Zágráb.

Lecanium Illig.

16. *Corni* Bouché. — I. Budapest. III. Selmeczbánya.
17. *Tiliae* L. — I. Budapest, Kecskemét.
18. *Pyri* Schrk. — II. Csurgó, Simonfa. III. Losoncz, Selmeczbánya.
19. *Aesculi* Koll. — I. Kecskemét.
20. *Prunastri* Boy. — In regionibus I—IV. et VI. passim occurrit.
21. *Capreae* L. — I. Monor.
22. *Aceris* Schrk. — I. Nagy-Kovácsi, Szentes. III. Selmeczbánya.
23. *Robiniarum* Dougl. — In regionibus I—III. et VI. passim vulgare.
24. *Vini* Bouché. — In regionibus I—V. passim obvium.
25. *Ulmi* L. — I. Budapest, Farkasd. III. Selmeczbánya. VI. Zombor.
26. *Persicae* Geoffr. (*rotundum* Sign.) — III. Palást. IV. Encs. VIII. Fiume.
27. *Coryli* L. — I. Kis-Várda. II. Puszta-Nána, Moson. III. Selmeczbánya, Ajnácskő, Liptó-Ujvár. V. Abrudbánya.
28. *Rosarum* Voll. — III. Selmeczbánya.
29. *Juglandis* Bouché. — I. Nagy-Kovácsi.
30. *cymbiforme* Targ. (*Mori* Sign.) — I. Budapest, Rákos-Palota, Monor, Kecskemét, Szeged. II. Szegszárd. III. Nagy-Maros.
31. *Hesperidum* L. — VIII. Fiume, Cirkvenica.

Pulvinaria Targ.

32. *Evonymi* Goureau. — I. Rákos-Palota, Kis-Szent-Miklós, Balsa.
33. *Ribesiae* Sign. — II. Esztergom.
34. *Vitis* L. — I. Szent-Endre. II. Pápa, Simontornya, Lengyel.

Ceroplastes Gray.

35. *Rusci* L. — VIII. Jablanac.

Asterodiaspis Sign.

36. *quercicola* Bouché. — I. Budapest, Szeged.

Aonidia Targ.

37. *Lauri* Bouché. — VIII. Fiume, Sušak, Cirkvenica.

Leucaspis Targ.

38. *Pini* Hart. — IV. Sztavna.

Mytilaspis Targ.

39. *conchiformis* Gmel. — I. Horgos.
40. *Pomorum* Bouché. — In omnibus regionibus passim frequens.
41. *linearis* Geoffr. — I. Csepel, Göd, Péczel, Kecskemét, Szeged.
42. *Ficus* Sign. — VIII. Novi, Jablanac.
43. *confusus* Horv. (*Abietis* Sign., nec Schrk.) — VI. Marilla.

Chionaspis Sign.

44. *Populi* Baer. — I. Budapest, Kecskemét. III. Ajnácskő.
45. *Planchonii* Sign. — I. Saár. II. Csákvár.
46. *Fraxini* Sign. — I. Horgos. VI. Marilla.
47. *Vaccinii* Bouché. — III. Tátra.

Diaspis Costa.

48. *Rosae* Sandb. — I. Budapest, Csorvás, Arad. II. Simonfa.
49. *fallax* Horv. (*ostreaeformis* Sign., nec Curt.) — I. Eger.
50. *Leperii* Sign. — I. Budapest.

Aspidiotus Bouché.

51. *ostreaeformis* Curt. — I. Vácz. II. Keszthely.
52. *spurcatus* Sign. — I. Kecskemét, Szeged. VI. Orsova.
53. *Nerii* Bouché. — Per totum regnum frequens.
54. *Hederae* Vall. — VIII. Novi.
55. *Abietis* Schrk. — I. Ér-Mihályfalva. VI. Marilla. VII. Breze.

Subordo. APTERA.

Auctore R. Kohaut.

Ez alrendbe tartozó állatokat ez ideig hazánkban pontosabban nem kutatták. A Nemzeti Muzeum gyűjteményét kivéve, nincs is tudomásom, hogy hazánkban valaki rendszeresen gyűjtötte volna őket, irodalmilag pedig épen nincsenek feldolgozva. A külföldi irodalomban, tudomásom szerint, Giebelnek *Insecta epizoa* czimü műve az egyetlen, melyben nehány ide tartozó állat hazánkból is emlitve van, a melyeket mind magam is megtaláltam.

Ez állatok valamennyien élősdiek lévén, nem volna értelme földrajzi elterjedésüket ugy kitüntetni, mint a többi csoportokban történt, azért egyszerüen az illető faj neve után hozzá teszem a gazda-állat nevét, a melyen tartózkodik.

Az anyag legnagyobb része Dr. Lendl Adolf úr dermatoplasztikai intézetéből került, a ki szives volt részemre ezeket gyűjtetni. Ezen kivül még Ehmann Ferencz, Dr. Kertész Kálmán, Dr. Madarász Gyula, Paszlavszky József, valamint Wachsmann Ferencz és János urak voltak szivesek a gyűjtés fáradságos munkájában részt venni.

Animalibus ad hunc subordinem pertinentibus nemo hucusque in patria nostra exactius studuerat. Excepta collectione Musæi Nationalis Hungarici neminem puto res ejusmodi systematice legisse, eo minus aliquid de iis juris publici dedisse. In litteris extraneis solum Giebel-i opus «Insecta epizoa» inscriptum mihi notum, quo nonnulla et e solo Hungariæ commemorantur, quæ tamen et ego collegi.

Cum cunctæ subordinis huius species vitam parasiticam degant, non fuisset rationis distributionem earumdem geographicam aliis ordinibus congruenter exhibere, ideo enumeratis speciebus simpliciter nomina animalium adjeci, quæ speciem illam alunt.

Maxima pars investigatæ materiæ ex instituto dermatoplastico Domini A. Lendl oritur, qui nunquam omisit hasce bestiolas ad usum meum colligere. Præterea Domini Fr. Ehmann, Dr. C. Kertész, Dr. J. Madarász, J. Paszlavszky, nec non Fr. et J. Wachsmann me collectionibus in perscrutando elucubrandoque hocce subordine adiuvaverunt.

Subordo. APTERA.

Fam. MALLOPHAGA.

Trichodectes Nitzsch.

1. *latus* Nitzsch. — Canis familiaris L.
2. *crassus* Nitzsch. — Meles taxus L.
3. *retusus* Nitzsch. — Putorius fœtidus Gray.
4. *climax* Nitzsch. — Capra domestica L.
5. *Equi* Denny. — Equus caballus L.
6. *scalaris* Nitzsch. — Bos taurus L.

Docophorus Nitzsch.

7. *brevicollis* Nitzsch. — Vultur monachus L.
8. *lobatus* Giebel. — Aquila nævia Gm.
9. *platystomus* Nitzsch. — Aquila imperialis Bechst.
10. *eurygaster* Giebel. — Buteo lagopus Gm.
11. *gonorhynchus* Nitzsch. — Astur nisus L.
12. *macrocephalus* Nitzsch. — Haliætus albicilla L.
13. *pictus* Giebel. — Aquila chrysætus L.
14. *cursor* Nitzsch. — Bubo ignavus Forst. et Asio Otus L.
15. *heteroceras* Nitzsch. — Bubo ignavus Forst. (In collectione Musæi Nationalis Hungarici.)
16. *semisignatus* Nitzsch. — Corvus corax L. (In collectione Musæi Nationalis Hungarici.)
17. *ocellatus* Nitzsch. — Corvus monedula L.
18. *atratus* Nitzsch — Corvus frugilegus L.

19. *crassipes* Nitzsch. — Nucifraga caryocatactes Briss.
20. *subcrassipes* Nitzsch. — Pica caudata Ray.
21. *fulvus* Nitzsch. — Garrulus glandarius L.
22. *communis* Nitzsch. — In pluribus avibus ex ordine Passeriformium.
23. *fuscicollis* Nitzsch. — Lanius minor L.
24. *Merulae* Denny. — Turdus merula L.
25. *ornatus* Nitzsch. — Oriolus galbula L.
26. *leontodon* Nitzsch. — Sturnus vulgaris L., Pastor roseus Temm.
27. *bifrons* Nitzsch. — Merops apiaster L.
28. *latifrons* Nitzsch. — Cuculus canorus L.
29. *serrilimbus* Nitzsch. — Yunx torquilla L.
30. *superciliosus* Nitzsch. — Picus major L.
31. *integer* Nitzsch. — Grus cinerea Bechst.
32. *incompletus* Nitzsch. — Ciconia nigra L.
33. *sphenophorus* Nitzsch. — Platalea leucorodia L.
34. *auratus* Nitzsch. — Scolopax rusticola L.
35. *Ralli* Denny. — Rallus aquaticus L. (In collectione Musæi Nationalis Hungarici.)
36. *gonothorax* Giebel. — Larus ridibundus L., Sterna nigra Briss.
37. *icterodes* Nitzsch. — Anas boschas L.
38. *ferrugineus* Giebel. — Anas clypeata Boie.

Nirmus Nitzsch.

39. *fuscus* Nitzsch. — Aquila nævia Gm., Buteo vulgaris L.
40. *rufus* Nitzsch. — Falco rufipes Bes., Falco tinnunculus L., Circus cyaneus L., Circus æruginosus L.
41. *nisus* Giebel. — Astur nisus L.
42. *angustus* Giebel. — Buteo vulgaris L. (In collectione Musæi Nationalis Hungarici.)
43. *phlyctopygus* Nitzsch. — Pernis apivorus L.
44. *olivaceus* Nitzsch. — Nucifraga caryocatactes Briss.
45. *affinis* Nitzsch. — Garrulus glandarius L.
46. *nebulosus* Burm. — Sturnus vulgaris L.
47. *Apiastri* Denny. — Merops apiaster L.
48. *marginalis* Nitzsch. — Turdus pilaris L.
49. *merulensis* Denny. — Turdus merula L.
50. *lais* Giebel. — Luscinia philomela Bp. (In collectione Musæi Nationalis Hungarici.)
51. *subcuspidatus* Nitzsch. — Coracias garrula L.
52. *fenestratus* Nitzsch. — Cuculus canorus L.
53. *annulatus* Nitzsch. — Oedicnemus crepitans Temm.
54. *pileus* Nitzsch. — Recurvirostra avocetta L.
55. *decipiens* Nitzsch. — Recurvirostra avocetta L.
56. *phaeonotus* Nitzsch. — Sterna nigra Briss.
57. *punctatus* Nitzsch. — Larus ridibundus. L.

Goniocotes Burm.

58. *hologaster* Denny. — Gallus domesticus Briss.

Goniodes Nitzsch.

59. *dispar* Nitzsch. — Perdix cinerea Lath.
60. *chelicornis* Nitzsch. — Tetrao urogallus L.
61. *falcicornis* Nitsch. — Pavo cristatus L.
62. *stylifer* Nitzsch. — Meleagris gallopavo L.
63. *dissimilis* Nitzsch. — Gallus domesticus Briss.

Lipeurus Nitzsch.

64. *quadripustulatus* Nitzsch. — Aquila nævia Gm.
65. *bacillus* Nitzsch. — Turtur auritus Bp.
66. *heterographus* Nitzsch. — Gallus domesticus Briss.
67. *cinereus* Nitzsch. — Coturnix dactylisonans Mey.
68. *ochraceus* Nitzsch. — Tetrao urogallus L.
69. *versicolor* Nitzsch. — Ciconia alba L.
70. *maculatus* Nitzsch. — Ciconia nigra L.
71. *hebraeus* Nitzsch. — Grus cinerea Bechst.
72. *stellaris* Denny. — Botaurus stellaris L.
73. *rhaphidius* Nitzsch. — Ibis falcinellus L.
74. *temporalis* Nitzsch. — Mergus albellus L.
75. *bucephalus* Giebel. — Cygnus olor L.
76. *squalidus* Nitzsch. — Anas boschas L.

Gyropus Nitzsch.

77. *ovalis* Nitzsch. — Cavia cobaya Schreb.

Eureum Nitzsch.

78. *cimicoides* Nitzsch. — Cypselus apus L.

Laemobothrium Nitzsch.

79. *giganteum* Nitzsch. — Milvus ater Gm., Circætus gallicus Boie.
80. *hastipes* Nitzsch. — Falco æsalon Gm.
81. *atrum* Nitzsch. — Larus ridibundus. L.

Physostomum Nitzsch.

82. *Bombycillae* Denny — Bombycilla garrula L.

Trinotum Nitzsch.

83. *luridum* Nitzsch. — Dafila acuta L., Anas boschas L.

Colpocephalum Nitzsch.

84. *flavescens* Nitzsch. — Haliaëtus albicilla L.
85. *inaequale* Nitzsch. — Picus martius Boie.
86. *importunum* Nitzsch. — Ardea cinerea L.
87. *zebra* Nitzsch. — Ciconia alba L.

Menopon Nitzsch.

88. *camelinum* Nitzsch. — Lanius minor L.
89. *pulicare* Nitzsch. — Cypselus apus L.
90. *phanerostigma* Nitzsch. — Cuculus canorus L.
91. *pallidum* Nitzsch. — Gallus domesticus Briss.
92. *phaeostomum* Nitzsch. — Pavo cristatus L.
93. *fulvomaculatum* Denny. — Coturnix dactylisonans Mey.
94. *phaeopus* Nitzsch. — Larus ridibundus L.

Fam. PEDICULIDAE.

Pediculus L.

1. *capitis* Deg. — Homo sapiens L.
2. *vestimenti* Burm. — Homo sapiens L.

Haematopinus Leach.

3. *piliferus* Denny. — Canis familiaris L.
4. *macrocephalus* Nitzsch. — Equus caballus L.
5. *eurysternus* Denny. — Bos taurus L.
6. *urius* Moufet. — Sus scrofa L. domestica et fera.
7. *serratus* Denny. — Mus musculus L.
8. *lyriocephalus* Denny. — Lepus timidus L.; unicum juvenile specimen a Dr. C. Kertész detectum.

Phthirius Leach.

9. *inguinalis* Redi. — Homo sapiens L.

Conspectus familiarum, generum et specierum.

HETEROPTERA.

Geocorisæ.

Familia	Genus	Species
1. Pentatomidæ	56	112
2. Coreidæ	26	47
3. Berytidæ	5	14
4. Lygæidæ	57	141
5. Tingitidæ	14	68
6. Aradidæ	3	17
7. Hebridæ	1	3
8. Gerrididæ	5	16
9. Phymatidæ	1	1
10. Reduviidæ	14	28
11. Cimicidæ	17	35
12. Capsidæ	103	279
13. Saldidæ	3	23

Hydrocorisæ.

14. Naucoridæ	2	2
15. Nepidæ	2	2
16. Notonectidæ	2	3
17. Corixidæ	2	23
	313	814

HOMOPTERA.

Auchenorhyncha.

Familia	Genus	Species
1. Jassidæ	44	267
2. Membracidæ	2	2
3. Cercopidæ	4	13
4. Cicadidæ	5	12
5. Fulgoridæ	32	121

Sternorhyncha.

6. Psyllidæ	15	87
7. Aphididæ	42	164
8. Aleurodidæ	1	5
9. Coccidæ	20	55
	165	726

APTERA.

1. Mallophaga	13	94
2. Pediculidæ	3	9
	16	103

Summa

Familiarum	28
Generum	494
Specierum	1643

INDEX GENERUM.

Classis. MYRIOPODA.

ab E. Daday de Deés conscripta.

A magyar fauna Százlábuira vonatkozó legelső, tudományos és megbizható adatokat C. L. Koch. nagyszabású művében találjuk, a melynek nyomán aztán a 60-as évek elején Sill V. szolgáltatott nehány további adatot. A Sill V. feljegyzéseinek megjelenése óta közel két évtized telt el, míg 1878-ban Tömösváry Ö. első dolgozatával ujolag felkölté ez állatok iránt az érdeklődést. Tömösváry Ö. 1884-ig megjelent több rendbeli dolgozatában nagy mértékben gyarapította a fajokra vonatkozó ismereteket és számos új, azonkívül hazánkból még addig nem ismert fajt jegyzett fel, de e mellett az anatomiai viszonyokra vonatkozó adatokat is közölt. Tömösváry Ö.-nek különben az úttörő nehéz szerepe jutott. Igen nagy lendületet nyert a magyar fauna Myriopodáira vonatkozó irodalom Latzel R. azon művének megjelenésével, a mely az Osztrák-magyar monarchia különböző vidékein gyüjtött fajok beható ismertetését tartalmazza s a mely e tekintetben igazi alapmunka. E mellé sorakozik aztán a Daday J. monographicus munkája, a mely Tömösváry Ö. hagyatéka és feljegyzései, valamint Latzel R. nagy munkája alapján összefoglalja és kibővíti a magyar fauna Százlábuira vonatkozó ismereteket.

Az említett búvárok mellé sorakozik Chyzer K., a ki 1886-ban a Zemplénmegyében megfigyelt fajokat enumerálja; Horváth G., a ki 1887-ben a Podsused határán gyüjtött fajokat jegyzi fel és végre Jurinac A. E., a ki 1887-ben horvátországi fajokat ismertet.

A magyar faunából eddig megfigyelt fajok száma (149) tetemesen fölülmúlja a többi európai faunaterületekét, a melyek közül ez idő szerint a leggazdagabbnak mondható Ausztriából csupán 79, Isztriából 76 és Karinthiából 74 fajt jegyeztek fel.

A fajok legnagyobb része, nem tekintve az újakat s még eddig csupán a magyar faunában megfigyelteket, olyan, a mely a többi európai faunaterületeken is közönséges, vagy otthonos; de van 33 oly faj is, a mely többé-kevésbbé Európán kivüli területeken is tenyészik. Ezek között legérdekesebb a *Scolopendrella notacantha* Gerv. és *Scolopendrella nivea* Scop. faj, a mely Európán kivül Északamerikában is

Primus omnium C. L. Koch res, quæ ad Myriopoda in Hungaria occurrentia pertinent, in libro suo egregie et cum fide litteris mandavit, eumque secutus A. Sill sub annum 1860 nova quædam protuilt; quibus editis viginti fere anni præterierunt, cum anno 1878 E. Tömösváry primis publicationibus, animos iterum ad bestiolas has convertit. Tömösváry compluribus publicationibus, usque ad annum 1884 editis et cognitionem specierum magnopere augebat, et multas species novas, necnon ad id locorum in Hungaria non repertas annotabat, res etiam nonnullas, quæ ad anatomiam spectant publici juris faciebat, itaque multis suis publicationibus litterariis aliis viam patefecerat. Edito opere R. Latzel-i, in quo species, diversis locis regni Austriæ et Hungariæ collectæ, accuratius examinantur et litteræ Myriopoda Hungariæ pertractantes magnopere augebantur. Latzel-um secutus, operibusque, quæ Tömösváry in scriniis reliquerat usus E. Daday in Monographia Myriopodorum Hungariæ notitiam eorum comprehendit et ampliavit.

His viris doctis adjungendi sunt C. Chyzer, qui a. 1886 species in comitatu Zempleniensi repertas enumerat, deinde G. Horváth et A. E. Jurinac, quorum primus species anno 1887 in finibus pagi Croatiæ, nomine Podsused, collectas enumeravit, alter autem species Croatiæ exposuit.

Hungaria multitudine specierum usque adhuc repertarum — cum eæ 151 essent — ceteras Europæ regiones facile superat, nam in Austria, nostris temporibus copiosissima, 79, in Istria 76, in Carinthia autem 74 tantum species inveniebantur.

Maxima pars specierum, exceptis novis usque adhuc in finibus Hungariæ solum repertis, et in ceteris Europæ regionibus ubique occurrit, vel certe inveniri potest; sunt tamen species 33, quæ et extra Europam degunt, quarum aptissimæ ad excitandos legentium animos sunt *Scolopendrella notacantha* Gerv. et *Scolopendrella nivea* Scop., quarum altera et in septemptrionali parte Americæ

közönséges. A *Paradesums gracilis* C. K. Európában még eddig csak hazánkból s itt Budapest mellett a Margitszigetről ismeretes, eredeti hazája pedig az Antillák, a Viti-szigetek és Pululoz.

A régiók között leggazdagabb az V. és VI., melyek mellé sorakozik aztán a III. és IV.; a legszegényebb ellenben az I.; a mi minden esetre a természeti viszonyok másféleségével áll szoros kapcsolatban. Az V. VI. VII. és VIII. régió területén számos oly faj van, a melyek legnagyobb részben a mediterrán alterülethez tartoznak, ellenben a II., III., IV. régió fajai inkább az európai alterületnek a képviselői.

ubique gignitur. *Paradesmus gracilis C. K.*, cum ex montibus Antillarum, ex insulis Viti et Pululoz originem duceret, in Europa nonnisi in patria nostra, et quidem in finibus urbis Budapest in insula, quæ hungarice «Margitsziget» vocatur, inveniebatur.

Regionum copiosissimæ sunt V. et VI, deinde III et IV, egentissima vero I., quod dissimilitudini locorum respondet. Species complures regionum V., VI., VII., VIII. maxima parte ad subregionem Mediterraneam, species autem regionum II., III., IV. plerumque ad subregionem Europæam pertinent.

LITTERATURA.

1. Chyzer K., Adatok a felsőmagyarországi Myriopodák ismeretéhez. Rovartani Lapok. 3. kötet. 1886. p. 64.
2. Daday J., Erdély faunájának százlábui. Term.-rajz. füz. 12. kötet. 1889. p. 85.
3. — A magyarországi Myriopodák magánrajza. Budapest, 1889. 3. táb.
4. Horváth G., Izlet u Podsused u zagrabaskojokolisi mjesasa novembra. Glasnik hrvatskoga naravoslovnoga druztva. II. p. 267. 1887.
5. Jurinac A. E., Prilog fauni zapodne Slavonije. Glasnik hrvatskoga naravoslovnoga druztva. II. p. 21. 1887.
6. Karlinski J., Wykáz wijóv (Myriopoda) tatrzanskich w roku 1881. Sprawozdanie komisyi fizyjogr. Tom. 17. 1883. p. 85.
7. Karsch F., Neue Juliden des Berliner Museums, als Prodromus einer Juliden.-Monographie. Zeitschr. f. d. gesammte Naturwiss. 54. B. J. 1881. p. 1.
8. Koch C., Die Myriopoden. 1863. 1—2 Bd. Halle.
9. Latzel R., Die Myriopoden der Österr. Ung. Monarchie. I. Die Chilopoden. 1880; II. Symphyla, Pauropoda, Diplopoda. 1884.
10. — Ein neuer Lithobius aus Ungarn und Serbien. Zool. Anzeiger. Nr. 114. 1882.
11. — Beitrag zur Myriopoden-Kenntnis Oesterreich-Ungarns und Serbiens. Verhandl. d. k. k. Zool. bot. Gesellsch. in Wien. 32. Bd. 1882.
12. Paszlavszky J., A százlábuak milliói. Term.-tud. Közl. 10. kötet. 1878.
13. — Massenhaftes Erscheinen von Tausendfüsslern in Alföld. Verhandl. d. k. k. Zool. bot. Gesell. in Wien. 28. Bd. 1878.
14. Sill V. Beiträge zur Kenntniss der Crustaceen, Arachniden und Myriopoden Siebenbürgens. Verhandl. u. Mittheil. d. Siebenb. Vereins f. Naturw. in Hermannstadt. 12. 13. Jahrg. 1861—62.
15. Silvestri F. Beitrag zur Kenntniss der Chilopoden- und Diplopoden-Fauna der palaearktischen Region. Zoologischer Anzeiger. 1895. Nr. 474. p. 177.
16. Tömösváry Ö., A százlábuak vándorlásához. Term.-tud. Közl. 10. kötet 1878. p. 109.
17. — Néhány hazánkban előforduló Myriopodáról. Orvos-Term.-tud. Ért. 4. évf. 1878.
18. — Adatok a hazánkban előforduló Myriopodákhoz. Term.-rajz. füz. 3. kötet. 1879.
19. — Hazánk erdélyi részében talált Glomeris-fajok. Orv. term.-tud. Ért. 1880. évf. 1. tábl.
20. — Beitrag zur Kenntniss der Myriopoden Ungarns. Zool. Anzeiger. 1880. Nr. 71.
21. — A Heterostomeák stigmája. Orv.-term.-tud. Ért. 1880. évf. p. 169. 1. táb.
22. — A Scutigera coleoptrata L. lélegzőszervéről. Marosvásárhely. 1881. 1. táb.
23. — A Myriopodák osztályának egy uj alakja Borneo szigetéről. Term.-rajz. füz. 5. kötet. 1882. 2. táb.
24. — A hazánkban előforduló Heterognathák. Math. és term.-tud. közl. 18. kötet, 12. sz. 1883. 1. táb.
25. — A Heterognathák egy új alakja hazánkban. Term.-rajz. füz. 7. kötet. 1883.
26. — A Scutigera-félék légzőszervéről. Math. és term.-tud. Ért. 1. kötet. 1883.
27. — Adatok a Scolopendrellák ismeretéhez. Orv.-term.-tud. Ért. 9. évf. 1883. 1. táb.
28. — A Geophilus-félék fonómirigyeinek szerkezete. Math. term.-tud. Ért. 2. kötet 1884.
29. — Kegyetlen anyák. Rovartani lapok. 1. kötet. 1884.
30. — Elektromos világításnál verekedő Myriopodák. Rovartani lapok. 1. kötet. 1884.
31. Verhoeff G., Beiträge zur Kenntniss palaearktischer Myriopoden. Verhandl. d. k. k. Zool. bot. Gesellsch. in Wien, 1895. Heft 7. p. 281.

Ordo. DIPLOPODA.

Fam. POLYZONIDÆ.

Polyzonium Brandt.

1. *germanicum* Br. — I. Budapest. IV. Bánszka, Bereczki, Beregszász, Beszkidhegy, S.-A.-Ujhely, Szinyérváralja, Szomotor, Torna, Czéke. V. Kolozsvár, Buzamező, Nagy-Szeben, Semesnye. VI. Zlaticza.

Fam. JULIDÆ.

Julus Brandt.

1. *strictus* Latz. — VI. Divics, Orsova, Sz. Heléna.
2. *Tömösváryi* Dad. VI. loco strictior incerto.
3. *occultus* C. K. — IV. Szomotor in com. Zemplén. VII. secundum R. Latzel.
4. *nanus* Latz. — IV. Nagy-Mihály. VI. Ó-Moldova, Zlaticza. VII. secundum R. Latzel.
5. *pelidnus* Latz. IV. Bártfa, Szinyérváralja. V. Vlegyásza in com. Kolos.
6. *dicentrus* Latz. — II. Nagy-Kanizsa, Vadé. VII. Podsused.
7. *pusillus* Leach. — I. Budapest, Hadház, Peér.
8. *luscus* Mein. — I. Budapest. II. Keszthely, Mocsolád, Vadé, Velencze. IV. Bártfa. V. Kolozsvár, Székelyudvarhely. VI. Zlaticza. VII. Zágráb, secundum R. Latzel.
9. *boleti* C. K. — Secundum data litteraturæ sat frequens esse videtur.
10. *cattarensis* Latz. — VI. Divics. VII. Zágráb, secundum R. Latzel.
11. *varius* Fabr. — V. Nagy-Szeben. VI. Mehádia, Rumunyesty. VIII. Fiume, Tersato.
12. *flavipes* C. K. — VI. Mehádia.
13. *foetidus* C. K. — Secundum data litteraturae sat frequens esse videtur.
14. *luridus* C. K. — Secundum data litteraturæ sat frequens esse videtur.
15. *platyurus* Latz. — V. Montes Retyezát et Vlegyásza. VI. Kossova in com. Krassó-Szörény.
16. *podabrus* Latz. — IV. Czéke, Olykabéla. V. Déva. VII. Zágráb, secundum R. Latzel.
17. *unilineatus* C. K. — Secundum data litteraturæ sat frequens esse videtur.
18. *Frivaldszkyi* Dad. — VI. loco strictior incerto.
19. *austriacus* Latz. — Secundum data litteraturæ ubique frequens esse videtur.
20. *sabulosus* L. — I. Nagyhagymás. II. Andrásfa in com. Vas, IV. S.-A.-Ujhely, V. Déva, Malomviz, Retyezát, Vlegyásza. VI. Kazán. VII. Podsused.
21. *trilineatus* C. K. — II. Simontornya. V. Déva, Retyezát. VIII. Fiume.
22. *montivagus* Latz. — III. Lucski. IV. Bánszka, Montes Beszkid, Kabolapolyána. V. Déva, Marosvásárhely, Szilágysomlyó, Vlegyásza. VI. Kazán. VII. Martinšćica.
23. *transylvanicus* Dad. — V. Retyezát.
24. *longabo* C. K. — II. Szentmárton. III. Tátra. IV. Czéke, Erdőbénye, Szőllőske, V. Retyezát, Vlegyásza.
25. *fallax* Mein. — Secundum data litteraturæ sat frequens esse videtur.
26. *rugifrons* Mein. — I. Hadház. IV. K. Azar, Szomotor, S.-A.-Ujhely. V. Szamosujvár. VI. Fehértemplom. VII. secundum R. Latzel.
27. *scandinavius* Latz. — IV. Szádellő. V. Buzamező.
28. *fuscipes* C. K. — III. Ad lacum Csorba, Erdőbénye, Feketehegy. V. Mons Vlegyásza. VII. secundum R. Latzel.
29. *hungaricus* Karsch. — IV. Montes Beszkid. V. Czód, Déva, Retyezát, Montis fauces Vöröstorony. VI. Mehádia, Plavisevicza, Sikevicza, Sz. Helena, Szvinicza.

Blaniulus Gerv.

30. *guttulatus* Gerv. — I. Haraszti in comit. Pest-Pilis-Solt-Kiskun.
31. *venustus* Mein. — I. Budapest, Péczel. II. Keszthely. IV. S.-A.-Ujhely. VI. Kazán.
32. *fuscus*, A. Stein. — I. Budapest, Péczel. IV. Tolcsva. VII. Lipovljani.

Isobates Menge.

33. *varicornis* C. K. — I. Budapest. IV. Czéke, Homonna, Tolcsva. V. Déva, Mons Vlegyásza.

Fam. LYSIOPETALIDÆ.

Lysiopetalum Brandt.

1. *degenerans* Latz. — VI. Orsova, Ó-Moldva, Szvinicza, Zlaticza.
2. *illyricum* Latz. — VIII. Fiume.
3. *fasciatum* Latz. — VI. Orsova.

Fam. CHORDEUMIDÆ.

Chordeuma C. K.

1. *sylvestre* C. K. — II. Sz.-Márton, Villány. V. Pete, Zilah.

Craspedosoma L. R.

2. *flavescens* Latz. — IV. et VII. secundum R. Latzel.
3. *mutabile* Latz. — I. Hadház. IV. Máramaros, S.-A.-Ujhely. V. Déva, Medgyes, Semesnye. VII. secundum R. Latzel.
4. *Rawlinsii* Leach. — I. Insula prope Ujpest. V. Kolozsvár. VII. secundum R. Latzel. VIII. Fiume.

Atractosoma Fanz.

5. *bohemicum* Ros. — V. Mons Vlegyásza.
6. *athesinum* Fedr. — V. Mons Vlegyásza. VII. sec. R. Latzel.
7. *carpathicum* Latz. — III. Montes Tátra.

Fam. POLYDESMIDÆ.

Strongylosoma Br.

1. *pallipes* Oliv. — Secundum data litteraturæ sat frequens esse videtur.

Paradesmus Sauss.

2. *gracilis* C. K. — I. Budapest, Insula Margitsziget.

Polydesmus Latr.

3. *albidus* Dad. — V. Zilah.
4. *edentulus* C. K. — VII. Martinšćica.
5. *macilentus* C. K. — V. Deés, Segesvár; VI. Kazán, Mehadia, Orsova.
6. *tatranus* Latz. — IV. Kabolapolyána, Szinnaikő; secundum R. Latzel et in regione III.
7. *collaris* C. K. — II. In cavernis Abaliget, Pécs; VI. Orsova, Coronini. VII. Kujnik, Zágráb.
8. *complanatus* L. — Secundum data litteraturæ ubique frequens esse videtur.
9. *montanus* Dad. — V. Mons Vlegyásza.
10. *transylvanicus* Dad. — V. Déva.
11. *denticulatus* C. K. — secundum data litteraturæ sat frequens esse videtur.
12. *Dadayi* Veh. — I. Budafok.
13. *banaticus* Dad. — VI. Orsova.
14. *subscabratus* Latz. — IV. S.-A.-Ujhely, Velejte.

Brachydesmus C. Hell.

15. *filiformis* Latz. — VI. secundum R. Latzel.
16. *Dadayi* Silvest. — IV. Máramaros.
17. *subterraneus* Hell. — VII. Oštarije (Latzel).
18. *hungaricus* Dad. — V. Peér.
19. *troglobius* Dad. — II. Caverna Abaliget.
20. *inferus* Latz. — VII. Oštarije (Latzel).
21. *superus* Latz. — II. Keszthely, secundum R. Latzel in regionibus III et IV.
22. *Chyzeri* Dad. — VIII. Fiume, vallis Recsina.

Fam. GLOMERIDÆ.

Gervaisia Waga.

1. *costata* Waga. — IV. Bártfa, Szinnaikő; V. Déva. Caverna Oncsásza in comit. Kolos.

Glomeris Leach.

2. *minima* Latz. — VII. Podsused.
3. *pustulata* Latr. — III. Beszkid. V. Kolozsvár VII. Oštarije. VIII. Buccari, Fiume.
4. *pulchra* C. K. — V. Déva, Tránvis in comit. Hunyad.
5. *connexa* C. K. — III. Javorina, Beszkid. Szádellő, Tátra. IV. Máramaros. V. Nagyhagymás, Tránvis, Viság, Mons Vlegyásza.
6. *ornata* C. K. — V. Mons Vlegyásza.
7. *multistriata* C. K. — VII. Skrad.
8. *hexasticha* Br. Secundum data litteraturæ sat frequens esse videtur.
9. *tridentina* Latz. — III. Beszkid. IV. Nagy-Mihály, S.-A.-Ujhely. V. Kolozsvár.
10. *conspersa* C. K. — VII. Zágráb. VIII. Martinšćica, Fiume.
11. *simplex* Töm. — V. Tránvis in comit. Kolos.
12. *tyrolensis* Latz. — V. Mezőhavas in comit. Bihar.
13. *marginata* Vill. — V. Déva, Mons Vlegyásza.

Fam. POLYXENIDÆ.

Polyxenus Latr.

1. *lagurus* Latr. — Secundum data litteraturæ sat frequens esse videtur.

Ordo. PAUROPODA.

Fam. PAUROPODA TARDIGRADA.

Eurypauropus Ryd.

1. *cycliger* Latz. — V. Déva.
2. *margaritaceus* Töm. — V. Pele, in Com. Szilágy.

Fam. PAUROPODA AGILIA.

Pauropus Lubb.

1. *Huxleyi* Lubb. — V. Déva, Puj. VI. Kosova.

Ordo. SYMPHYLA.

Fam. SCOLOPENDRELLIDÆ.

Scolopendrella Gerv.

1. *immaculata* Newp. — I. Budapest. V. Marosvásárhely. VIII. Fiume.
2. *nivea* Scop. — IV. Kis-Azar. V. Marosvásárhely.
3. *notacantha* Gerv. — VII. secundum R. Latzel.

Ordo. CHILOPODA.

Fam. GEOPHILIDÆ.

Himantarium C. K.

1. *Gabrielis* L. — VI. Mehadia, Orsova. VIII. Tersato.

Dignathodon. Mein.

2. *microcephalum* Luc. — V. Szamosujvár. VIII. Fiume, Tersato.

Chaetechelyne Mein.

3. *vesuviana* Newp. — I. Budapest. III. Torna. IV. Tapolcsány, Máramaros. V. Deés, Peér. VI. Coronini, Kusova, Ó-Moldava.

Scotophilus Mein.

4. *bicarinatus* Mein. — I. Budapest, Farkasd. II. Veszprém. III. Torna. VI. Ó-Moldava, Sikevicza.
5. *illyricus* Mein. — Secundum data litteraturæ sat frequens esse videtur.

Geophilus Leach.

6. *linearis* C. K. — IV. S.-A.-Ujhely, Szerencs. V. Kolozsvár, Nagyszeben, Szamosujvár, Mons Retyezát.
7. *sodalis* Bengs. et Mein. — III. Körtvélyes. IV. Szerencs.
8. *electricus* L. — I. Tahi. IV. Velejte, Szin. V. Kolozsvár. VII. Skrad.
9. *arenarius* Mein. — IV. Szerencs. V. Alsó-Jára, Szilágy-Somlyó. VI. Zlaticza. VIII. Fiume.
10. *longicornis* Leach. — Secundum data litteraturæ sat frequens esse videtur.
11. *proximus* C. K. — Secundum data litteraturæ sat frequens esse videtur.
12. *pygmaeus* Latz. — II. Simontornya, Simonfa. IV. Czéke, K.-Azar, Nagymihály, Szerencs. V. Peér. VII. Zágráb.
13. *flavidus* C. K. — Secundum data litteraturæ ubique frequens esse videtur.
14. *ferrugineus* C. K. — Secundum data litteraturæ sat frequens esse videtur.
15. *mediterraneus* Mein. — II. Baán in Comit. Baranya.

Schendyla Bergs et Mein.

16. *nemorensis* C. K. — I. Budapest, Péczel. II. Simontornya. IV. Homonna, Sátoralja-Ujhely, Tokaj, Tolcsva, Velejte. VI. Szvinicza. VII. Podsused.
17. *eximia* Mein. — I. Budapest, Insula S. Margaretæ (Margitsziget).

Scolioplanes Bergs et Mein.

18. *crassipes* C. K. — Secundum data litteraturæ ubique frequens esse videtur.
19. *acuminatus* Leach. — Secundum data litteraturæ ubique frequens esse videtur.

Mecistocephalus Newp.

20. *carniolensis* C. K. — IV. Szinnaikő, Szinyérváralja, Montes Vihorlát. V. Balla, Buzamező, Kolozsvár, Montes Retyezát et Vlegyásza. VI. Mehádia.

Fam. SCOLOPENDRIDÆ.

Cryptops Leach.

1. *hortensis* Leach. — Secundum data litteraturæ ubique frequens esse videtur.

2. *punctatus* C. K. — I. Budapest, Farkasd. IV. K.-Azar, Tolcsva. V. Kolozsvár, Marosvásárhely, Szamosujvár, Szucságh. VI. Orsova. VIII. Fiume.

Opisthemega Wood.

3. *erythrocephalum* C. K. — VIII. Buccari.

Scolopendra Newp.

4. *dalmatica* C. K. — VIII. Buccari.
5. *cingulata* Latr. — V. Déva. VI. Berzászka. VII. Oštarije. VIII. Fiume, Tersato.

Fam. LITHOBIIDÆ.

Henicops Newp.

1. *fulvicornis* Mein. — VI. Kazán.

Lithobius Leach.

2. *aeruginosus* L. K. — Secundum data litteraturæ ubique frequens esse videtur.
3. *crassipes* L. K. — I. Tahi. II. Velencze. IV. Czéke. V. Déva. VI. Kazán, Orsova.
4. *eximius* Mein. — I. Budapest. V. Tasnád.
5. *lucifugus* L. K. — IV. Bánszka, Perbenyik. V. Mons Retyezát.
6. *Dadayi* Töm. — V. Déva.
7. *muticus* C. K. — Secundum data litteraturæ ubique frequens esse videtur.
8. *erythrocephalus* C. K. — Secundum data litteraturæ ubique frequens esse videtur.
9. *dubius* Töm. — VII. Fužine.
10. *pusillus* Latz. — III. Gáboltó. IV. Homonna, Gálszécs, Szőllőske. V. Buzamező, Marosvásárhely, Medgyes.
11. *lapidicola* Mein. — Secundum data litteraturæ ubique frequens esse videtur.
12. *calcaratus* C. K. — V. Kis-Disznód. VI. Divics.
13. *microps* Mein. — V. Alsó-Jára in comit. Torda-Aranyos.
14. *latro* Mein. — I. Budapest. III. Körtvélyes. IV. Lucski. V. Mons Vlegyásza. VI. Báziás, Dupláj, Divics. VII. Béla-Brod.
15. *mutabilis* L. K. — Secundum data litteraturæ ubique frequens esse videtur.
16. *pelidnus* Haase. II. Sz.-Márton. IV. Szinnaikő.
17. *cyrtopus* Latz. — IV. Szinnaikő. V. Mons Vlegyásza.
18. *borealis* Mein. — VI. Kossova.
19. *Entzii* Dad. — IV. Gálszécs.
20. *glabratus* C. K. — I. Budapest, Tahi. II. Csáktornya. IV. Sátoralja-Ujhely, V. Déva. Viság. VI. Kazán, Orsova, Sikevicza. VII. Zágráb.
21. *aulacopus* Latz. — V. Buzamező.
22. *dentatus* C. K. — V. Déva. VIII. Fiume.
23. *anodus* Latz. — II. Sóly. VI. Zlaticza. VIII. Martinšćica.
24. *agilis* C. K. — V. Déva. VI. Orsova.
25. *tricuspis* Mein. — I. Farkasd. II. Szombathely. VI. Divics.
26. *nigrifrons* Latz et Haase. — I. Budapest. III. Gáboltó. IV. Sátoralja-Ujhely, Tolcsva. VII. Zágráb.
27. *hungaricus* Dad. II. Felsúth.
28. *piceus* L. K. — I. Péczel, Sz. István. II. Nagykanizsa. III. Gáboltó. IV. Czéke, Velejte. V. Medgyes, Zilah. VI. Orsova, Plavisevicza.
29. *peregrinus* Latz. — I. Péczel. IV. Sátoralja-Ujhely, Szomotor.
30. *dalmaticus* Latz. — IV. Szinnaikő, III. Lucski.
31. *forficatus* L. — Secundum data litteraturæ ubique frequens esse videtur.
32. *bonensis* Mein. — V. Viság in comit. Kolos.
33. *validus* Mein. — II. Vadé. VI. Mehádia.
34. *tridentinus* Tanz. — VII. Fužine.
35. *tenuipes* Daday. — III. Nagykanizsa. VIII. Fiume.
36. *leptopus* Latz. — VI. Divics.
37. *transylvanicus* Latz. — Karánsebes, Orsova, Mehádia, Sikevicza.
38. *brevicornis* Dad. — VI. Plavisevicza.
39. *grossipes* C. K. — VI. Mehádia, Sz.-Helena. VII. Skrad. VIII. Fiume, Tersato.

Fam. SCUTIGERIDÆ.

Scutigera Lam.

1. *coleoptrata* L. — I. Budapest, II. Páty. VI. Szeged, Coronini.

Conspectus familiarum, generum et specierum.

Familia	Genus	Species
1. Polyzonidæ	1	1
2. Julidæ	3	33
3. Lysiopetalidæ	1	3
4. Chordeumidæ	3	7
5. Polydesmidæ	4	22
6. Glomeridæ	2	13
7. Polyxenidæ	1	1
8. Pauropoda tardigrada	1	2
9. Pauropoda agilia	1	1
10. Scolopendrellidæ	1	3
11. Geophilidæ	7	20
12. Scolopendridæ	3	5
13. Lithobiidæ	2	39
14. Scutigeridæ	1	1
	31	151

Summa

Familiarum	14
Generum	31
Specierum	151

Classis. CRUSTACEA.

ab E. Daday de Deés conscripta.

A Rákok osztályának pár képviselőjét már a korábbi buvárok is ismerték. Ennek legelső nyomait Grossinger B. J. 1794. évi, latin nyelvű nagy művében találjuk. Ő utána azonban több mint 60 év telt el addig, mig hazai buváraink között olyanok is találkoztak, a kik tehetségüket ez osztály tanulmányozására szentelték. Az úttörők Chyzer K. és Tóth S. voltak 1857. évi társas dolgozatukkal, a melyben a Budapest környékén megfigyelt fajokat mutatták be. Chyzer K. 1861-ben önállóan irt dolgozatában a Budapest környékén talált *Phyllopodák* s illetőleg *Branchiopodák* magánrajzát nyujtja, Tóth S. pedig ugyanezen évben a *Cladocerákat* ismerteti s 1862. évi közleményében nehány ujabban talált *Ostracodát* mutat be. Az említett buvárokkal majdnem egyidejüleg Sill V. a Nagyszeben környékén megfigyelt fajok jegyzékét közli. A 60-as évek folyamán még csak két búvár nyujt némi adatot idevonatkozólag, névszerint Frivaldszky János 1865-ben a *Titanetes graniger* uj fajt irja le és Frivaldszky Imre 1866-ban ugyane fajt rajzban mutatja be.

A 70-es évek vége felé Károli J. és Bartsch S. az *Astacus leptodactylus* ismertetésével kezdik meg az uj sorozatot; melléjök sorakozik Budapest és környéke Crustaceáinak enumeratiojával 1879-ben Margó T., a vízaknai sóstavakban élő *Artemia salinának* bemutatásával pedig 1880-ban Friedenfels E. A 80-as évek elején Daday J. kezdett foglalkozni ez osztály alakjainak gyüjtésével és tanulmányozásával és 1882 óta megjelent számos apróbb dolgozatában a különböző rendekbe tartozó több fajt jegyzett fel; 1884-ben megirta a *Copepodák*, 1888-ban pedig a *Cladocerák* magánrajzát.

A Crustaceák egyik-másik csoportjára vonatkozó adatok feljegyzésével foglalkozó buvárok között még a következőkkel találkozunk. Koelbel L. 1884-ben leirja a Balaton mellékén gyüjtött *Diaptomus bacillifer* uj fajt. Wierzejski A. 1882—83. évi dolgozataiban a tátrai tavak faunáját mutatja be. Entz G. 1886-ban a vizaknai sóstavak *Artemiáit* vizsgálta és *biloba* meg *furcata* váriétásait különböztette meg.

Nonnullas ex classe Crustaceorum species jam investigatoribus prioris aetatis cognitas esse ex opere celeberrimo B. J. Grossingeri, a. 1794 lingva latina conscripto intelligimus. Post eum spatio fere sexaginta annorum C. Chyzer et A. Tóth primi in patria nostra exstiterunt, qui viribus collatis species in regione urbis Budapest repertas describerent, et hoc modo aliis viam aperirent. Deinde a. 1861 C. Chyzer Phyllopoda et Branchiopoda, loco supra memorato collecta, jam solus per se separatim descripsit, A. Tóth eodem anno *Cladocera*, insequenti autem *Ostracoda* aliquot, tum primum reperta exposuit. Simul cum his V. Sill species, in regione urbis Nagyszeben conquisitas percensuit. Postea J. Frivaldszky et E. Frivaldszky aliquid ad rem contulerunt, cum ab illo a. 1865 *Titanetes graniger* describeretur, ab hoc a. 1866 hæc eadem species, nova tum, pictura lineari oculis proponeretur.

Studium in hanc classem, aliquamdiu intermissum sub annum 1878 iterum reviviscit. Nam J. Károli et S. Bartsch *Astacum leptodactylum* descripserunt, deinde a. 1879 Th. Margó Crustacea regionis urbis Budapest notavit; ab E. Friedenfels a. 1880 *Artemia salina*, quæ prope urbem Vizakna in stagnis salsæ aquae gignitur, exposita est. Sub annum 1880 E. Daday in exploranda colligendaque hac classe operam collocavit, et multis publicationibus ab a. 1882 emissis species complures plurium ordinum enumeravit, postea autem a. 1884 *Copepoda*, a. 1888 *Cladocera* singillatim in monographiis exposuit.

Ex viris doctis, qui in colligendis perscribendisque rebus ad Crustacea pertinentibus versantur, proferimus præterea: L. Koelbel, qui a. 1884 novam speciem *Diaptomum bacilliferum*, ad lacum Balaton repertum annotavit; A. Wierzejski, qui in libris, a. 1882—83 editis faunam lacuum, qui in montibus Tátra sunt, descripsit; G. Entz, qui stagnis salsae aquae apud urbem Vizakna a. 1886 exploratis duas formas *Artemiarum*: *bilobam* et *furcatam* discreverat; L. Örley, qui eodem anno novas res de

Ugyanezen évben Örley L. ujabb adatokat közöl Budapest Crustacea-faunájára vonatkozólag. Mártonffy L. 1888-ban Szamosujvár környékéről jegyez fel pár fajt, és Sostaric D. ugyanezen évben a Horvátországban megfigyelt fajokat ismerteti. Kertész M. 1890-ben Daday J. feljegyzései alapján a Nagyvárad környékén megfigyelt fajokat enumerálja. Richard J. 1891-ben a Balatonból több *Entomostraca* fajt jegyez fel. Chyzer K. 1892-ben a hazánkban megfigyelt *Estheria*-fajokat mutatja be. Itt megjegyezhetem még, hogy Székely B. és Szigethy K. fejlődéstani és anatomiai tanulmányokat publikáltak; az utóbbi ezenkivül az *Astacus fluviatilis*- és *leptodactylus* átmeneti alakjait is kereste.

A hazai Crustacea-fajok, nem tekintve azokat, melyek ujak gyanánt irattak le s még eddig egyébünnen nem ismeretesek, legnagyobb részben olyanok, a melyek Európa más fauna-területein is közönségesek, vagy legalább is gyakoriak. A fajok általános számát illetőleg pedig bátran elmondhatjuk, hogy hazánk egyike a leggazdagabb faunaterületeknek, minek oka kétségkivül természeti viszonyainak sokféleségében keresendő.

Az életmód s illetőleg tartózkodás tekintetéből a fajok legnagyobb része olyan, a mely kizárólag édesvizben, egy kis része székes-, félsós- és még kisebb része sósvizben tenyészik. Az édes vizekben tenyészők tulnyomó száma minden álló vizben otthonos, de van nehány olyan is, a mely csak nagyobb tavakban s itt is csupán a nyilt tükrön él. A fajok egy része e mellett olyan, a mely a faunaterület minden részén otthonos, de vannak aztán olyanok is, a melyek az Alföldön, a hegyes vidékeken és a havasi tájakon a közönségesebbek, vagy épen csakis ezek valamelyikén tenyésznek.

Általános zoogeografiai tekintetből hazánk *Crustacea*-faunája olyan közbülső terület, a melyen az európai- és a mediterrán alterület egymással érintkezik, egymásba mintegy átmegy. A fajok legnagyobb része azonban az európai alterülethez tartozó, különösen a hegyes vidéken és a havasi tájakon tenyészők, a kisebb rész, nevezetesen az Alföld vizeiben élő fajok, inkább a mediterráni alterülethez tartoznak.

Crustaceis in regione urbis Budapest repertis notavit. Non multo post a. 1888 L. Mártonffy et D. Sostarič nonnullas species descripserunt, ille quidem eas, quæ in regione urbis Szamosujvár gignuntur, hic species Croatiae. M. Kertész eis, quae E. Daday perscripserat usus, a. 1890 species in regione urbis Nagyvárad observatas enumerat; J. Richard a. 1891 complures species *Entomostracorum*, quas in lacu Balaton animadverterat, descripsit. C. Chyzer a. 1892 *Estherias* regni Hungariae ad id locorum notas percensuit. Non sunt denique silentio praetermittenda, quae B. Székely et C. Szigethy de embryologia et anatomia Crustaceorum scripserunt; nec quae horum alter de formis transitionalibus *Astaci fluviatilis* et *leptodactyli* annotavit.

Species Crustaceorum regni nostri exceptis novis, aliunde adhuc non notis, magna parte ejusmodi sunt, quæ et in aliis Europae regionibus saepe occurrunt. Numero autem specierum generatim patriam nostram copiosissimam esse confirmo, quod sine dubio naturæ varietati attribuendum sit.

Pars maxima specierum regni Hungariæ in aqua dulci vitam agit; sunt paucae, quæ in aquis sodatis aut semisalsis vivant, minima pars in salsis domicilium habet. Plurimae deinde in aqua dulci gignentium pariter in omnibus stagnis reperiuntur, paucis solum exceptis in majoribus lacubus eisque in superficie aquarum viventibus. Sunt species, quae in omnibus regni regionibus notæ sint; sunt deinde, quæ in quadam parte regni, Hungarica lingva «Alföld» vocata, tum quæ locis acclivibus et in montibus summis reperiantur; sunt denique, quæ necbi, nisin in aliquo horum occurrant.

Quamquam Zoographiam generalem spectantibus patria nostra, quod ad Crustacea attinet, inter Subregionem Europæam et Mediterraneam quasi media, quae alteram cum altera conjungeret, posita est: tamen species nostrae, imprimis, quae in locis montuosis et montibus summis gignuntur, maximam partem ad Subregionem Europæam pertinent, cum reliqua pars, præcipue, quæ in aquis tractus, hungarice Alföld vocati inveniuntur, ad Subregionem Mediterraneam attineant.

LITTERATURA.

1. Bartsch S. Az Astacus leptodactylus táplálkozási és emésztési szervei. — Term.-rajz. füzetek. II. köt. 1878. p. 21. Tab. 2.
2. — Az Astacus leptodactylus Esch. ivarszervei. — Term.-rajzi füzetek. II. köt. 1878. p. 137. Tab. 1.
3. Brühl A. Ueber das Vorkommen einer Estheria (Isaura Joly) und der Branchipus torvicornis in Pest. — Verh. d. k. k. zool.-bot. Gesellschaft in Wien. Jahrg. 1860. pag. 115.
4. Chyzer K. Ueber die Crustaceenfauna Ungarns. — Verh. d. k. k. zool.-bot. Gesellschaft in Wien. Jahrg. 1858. p. 505.
5. — Crustacea Phyllopoda Faunæ Pesthinensis. — M. tud. Akad. math. term.-tud. közlem. I. köt. 1861. Tab. 1—7.
6. — Berichtigungen und Ergänzungen zu meiner Abhand-

lung «Ueber die Crustaceenfauna Ungarns». — Verhandl. d. k. k. zool.-bot. Gesellschaft in Wien. Jahrg. 1861. p. 111.
7. Chyzer K. Nachtrag zu Victor Sill's Mittheilungen über die in den Salzsoolteichen Siebenbürgens vorkommende Artemia. — Verhandl. u. Mittheil. d. siebenb. Vereins für Naturw. in Hermannstadt. Jahrg. 1862. p. 56.
8. — A magyarországi Estheria-rákokról. — Pótfüzetek. 1892. évf. 18. füz. p. 63.
9. Chyzer K. és Tóth S. Budapest vidékén eddig talált héjanczokról. — Magyarhoni természetbarát. I. évf. 1857. p. 71. Tab. I.
10. — Pótlékadat a Branchipus ferox ismeretéhez. — Magyarhoni természetbarát. II. köt. 1. füz. 1858.
11. Dadav J. Adatok Kolozsvár és környéke Crustacea-faunájának ismeretéhez. — Orv. term.-tud. Ért. 1882. évf. pag. 211.
12. — Adatok a dévai vizek faunájának ismeretéhez. — Orv. term.-tud. Ért. 1883. évf. p. 197. Tab. 1.
13. — Adatok a Szent-Anna és Mohostó faunájának ismeretéhez. — Orv. term.-tud. Ért. 1883. évf. p. 17. Tab. 1.
14. — Adatok a Retyezát tavai Crustacea-faunájának ismeretéhez. — Term.-rajzi füz. 7. köt. p. 41. Táb. 1.
15. — Catalogus Crustaceorum Faunae Transylvaniæ. — Orv. term.-tud. Ért. 1884. évf. p. 161.
16. — A Magyarországban eddig talált szabadon élő Evezőlábú rákok magánrajza. — Math. term.-tud. közl. 19. köt. p. 115. Tab. 4.
17. — Ujabb adatok Kolozsvár és Erdély Crustacea-faunájának ismeretéhez. — Orv. term.-tud. Értesitő. 1884. évf. pag. 305.
18. — Adatok Magyar- és Erdélyország néhány édesvizű medenczéjének nyilttükri faunájához. — Orv. term.-tud. Ért. 1885. évf. p. 227.
19. — Jelentés az 1884. év nyarán Magyarország különböző vidékein végzett crustaceologiai kutatások eredményéről. — Math. term.-tud. közl. 20. köt. 3. szám. 1885.
20. — Uj állatfajok Budapest édesvizi faunájából. — Term.-rajz. füz. 9. köt. 1885. p. 127. Tab. 1.
21. — Adatok a Balaton-tó faunájának ismeretéhez. — Math. term.-tud. Ért. 1885. évf.
22. — A magyarországi Cladocerák magánrajza. — Budapest, 1888. 4. Táb.
23. — A magyarországi Branchipus-fajok átnézete. — Math. term.-tud. közl. 23. köt. 3. szám. 1889—90. 2. tábl.
24. — Branchipus paludosus M. O. Fr. a magyar faunában. — Term.-rajz. füzet. 13. köt. 1890. p. 1. 3. ábr.
25. — A magyarországi Diaptomus-fajok átnézete. — Term. rajz. füz. 13. köt. p. 114. Tab. 3.
26. — Adatok az alföldi székesvizek mikrofaunájának ismeretéhez. — Math. term.-tud. Ért. 12. köt. p. 10.
27. — Adatok Magyarország édesvizi mikroskopos faunájának ismeretéhez. — Term.-rajz. füz. 14. köt. 1891. pag. 17. Tab. 1.
28. — A mezőségi tavak mikroskopos állatvilága. — Term.-rajz. füz. 15. köt. 1892. p. 1. Tab. 1.
29. — A Budapest környékén tenyésző kagylósrákok. — Term.-rajz. füz. 15. köt. 1892. p. 84.
30. — Ujabb adatok a Balaton mikrofaunájának ismeretéhez. Math. term.-tud. Ért. 1894. évf. p. 122.
31. — További pótlások Budapest kagylósrák-faunájához. — Term.-rajz. füz. 16. köt. 1893. p. 122.
32. Entz G. Az erdélyi sósvizekben élő Artemia salináról. — Orv. term.-tud. Ért. 8. köt. p. 101. Tab. 1.
33. Friedenfels E. v. Ueber Artemia salina und andere Bewohner der Soolentaiche in Salzburg. — Verhandl. u. Mittheil. d. siebenb. Vereins f. Naturw. in Hermannstadt. Jahrg. 1880. p. 112. Taf. 1.
34. — — Weitere Beobachtungen über Artemia und die Salzburger Soolenteiche. — Verhandl. u. Mittheil. d. siebenb. Vereins f. Naturw. in Hermannstadt. Jahrg. 1885. p. 24.
35. Frivaldszky Imre. Jellemző adatok Magyarország faunájához. — Budapest. 1866.
36. Frivaldszky János. Adatok a magyarhoni barlangok faunájához. — Math. term.-tud. közl. 1865. 5. köt.
37. Grossinger B. I. Universa historia physica regni Hungariæ. — Pozsony, 1794. Pars. IV.
38. Károli J. A karcsúollós rák (Astacus leptodactylus) ágasollóval. — Term.-rajz. füz. 1. köt. 1877. e. 28.
39. Kertész K. Adatok a Szeghalom környékén tenyésző kagylós rákok faunájához. — Term.-rajz. füz. 16. köt. 1894. p. 114. 1. táb.
40. Kertész M. A nagyváradi közönséges és meleg álló vizek górcsövi állatvilága. — 1890. p. 260.
41. Koelbel L. Carcinologisches. — Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss. in Wien. Math. naturw. Cl. 1. Abth. Bd. 90. 1884. p. 312. Taf. 3.
42. Margó T. Budapest és környéke állattani tekintetben. — Budapest, 1879.
43. Mártonffy L. Három érdekes kopoltyúlábú rák a szamosujvári faunából. — Orv. term. tud. Ért. 13. kötet. 1888. pag. 253.
44. Orley L. Budapest és környékének alsóbb rangú rákfajai. Term.-rajzi füz. 10. köt. 1886. p. 7. Tab. 2.
45. Richard J. Sur les Entomostracées du lac Balaton — Bull. de la Soc. zool. de France. 1891. Tam. 16. p. 135.
46. Sill V. Beitrag zur Kenntniss der Crustaceen, Arachniden und Myriopoden Siebenbürgens. — Verhandl. u. Mittheil. d. siebenb. Vereins f. Naturw. in Hermannstadt. Jahrg. 1861. — 62.
47. Sostarič D. Prilog poznavanju faune slatkovodnich korepnjaka hrvatske. — Zagreb. 1888.
48. Székely B. Tanulmányok a Diaptomus petefejlődésének első phasisairól. — Orv. term.-tud. Ért. 1882. Tab. 1.
49. Szigethy K. A folyami rák zöld mirigyének boncz-, szövet- és élettana. — Mathem. term.-tud. köz. 19. köt. 3. sz. 2. táb.
50. — Az Astacus fluviatilis és Astacus leptodactylus átmeneti alakjai. — Math. term.-tud. közl. 1885. 1. szám.
51. — A folyami rák életviszonya és tenyésztése. — Rovart. lapok. 3. köt. 1886. p. 206.
52. Tóth S. Die Rotatorien und Daphnien der Umgebung von Pest-Ofen. — Verhandl. d. k. k. zool.-bot. Gesellsch. in Wien. Jahrg. 1861.
53. — A budapesti Kandics-félék. — Math. term.-tud. közl. 1862. 1. köt. 4. táb.
54. — Pest-Budán 1861-ben talált Daphnidák. — Math. term.-tud. közl. 2. köt. 1. tábl.
55. — A Pest-Budán újabban talált kagylórákok s boncztani viszonyaik. — Term.-tud. közl. 1862. p. 56. Tab. 1.
56. — Die in neuester Zeit zu Pest-Ofen gefundenen Schalenkrebse. — Verhandl. d. zool.-bot. Gesellschaft in Wien. Jahrg. 1862.
57. Vángel J. Pótló adatok a Budapest környékén tenyésző kagylós rákokhoz. — Term.-rajz. füz. 15. köt. p. 209.
58. Wierzejski A. Materyjały do fauny jezior tatrzańskich. Spraw. Komisyi fizyjogr. Akad. Tom. 16. 1882.
59. — Zarys fauny stawów tatrzańskich. — Pamiętnik Tatrzansk. Tom. 8. 1883.

Subclassis. ENTOMOSTRACA.

Ordo. COPEPODA.

Fam. CYCLOPIDAE.

Cyclops M. O. Fr.

1. *Fischeri* Pogg. — V. Mikó-Ujfalu, Oltszem, in com. Háromszék.
2. *transylvanicus* Dad. — V. Szamosfalva prope Kolozsvár in stagnis semisalsis.
3. *Margói* Dad. — V. Kolozsvár et Kis-Nyires in com. Szolnok-Doboka.
4. *fimbriatus* Fisch. — II. Lacus Balaton. V. Oltszem in com. Háromszék. VII. Zágráb, secundum D. Sostarič.
5. *bathybius* Dad. — II. Lacus Balaton.
6. *ignaeus* Pogg. — V. Szamosfalva prope Kolozsvár.
7. *tenuicaudis* Dad. — Mikó-Ujfalu, Oltszem in com. Háromszék.
8. *nivalis* Dad. — V. Lacus Zenoga in montibus Retyezát.
9. *brevisetosus* Dad. — V. Deés in com. Sz.-Doboka.
10. *phaleratus* Koch. — Secundum data litteraturæ sat frequens esse videtur.
11. *affinis* Sars. — V. Mohos-tó in com. Csik, Déva in com. Hunyad.
12. *Clausii* Hell. — V. Kolozsvár, Szucságh, Csehtelke in comit. Kolozs, Maros-Ujvár in comit. Alsó-Fehér; VII. Zágráb, secundum D. Sostarič.
13. *Bradyi* Sost. — VII. Zágráb, secundum D. Sostarič.
14. *Frivaldszkyi* Dad. — V. Szamosfalva prope Kolozsvár in stagnis semisalsis, Deés, Gyula-Fehérvár.
15. *diaphanus* Fisch. — II. Lacus Balaton. V. Deés in com. Szolnok-Doboka, Kolozsvár, Apahida, M.-Sályi, Csehtelke in comit. Kolozs, Piski in com. Hunyad. VII. Zágráb, Varasd, secundum D. Sostarič.
16. *alpestris* Dad. — V. Lacus Zseminye in monte Retyezát.
17. *Horváthii* Dad. — V. Lomány, Oláh-Pián in com. Szeben, Oláh-Szilvás in com. Alsó-Fehér.
18. *macrurus* Sars. — VII. Varasd, secundum D. Sostarič.
19. *serrulatus* Tisch. — Secundum data litteraturæ ubique frequens esse videtur.
20. *insignis* Claus. — VII. Zágráb, secundum D. Sostarič.
21. *roseus* Dad. — V. Kolozsvár in com. Kolozs.
22. *simplex* Pogg. — V. Kolozsvár in com. Kolozs.
23. *hungaricus* Dad. — I. Debreczen. V. Kolozsvár, Mócs in com. Kolozs, Nagyszeben.
24. *aurantius* Fischer. — V. Szamosfalva prope Kolozsvár.
25. *Parádyi* Dad. — V. Kolozsvár.
26. *claudiopolitanus* Dad. — V. Szamosfalva prope Kolozsvár.
27. *pectinatus* Dad. — V. Apahida, Mócs in comit. Kolozs.
28. *Entzii* Dad. — V. Szamosfalva prope Kolozsvár in stagnis semisalsis, Déva in stagnis salsis.
29. *bicuspidatus* Cls. — Ubique frequens esse videtur.
30. *Leuckarti* Cls. — II. Lacus Balaton. V. Brátka, Deés, Torda, Ecsellő, in com. Szeben.
31. *vernalis* Fisch. — V. Nádpatak in com. Nagy-Küküllő. VII. Varasd, secundum D. Sostarič.
32. *strenuus* Fisch. — Secundum data litteraturæ in regione V. sat frequens esse videtur. IV. Lacus Halas-tó, in montibus Tátra secundum D. Wierzejski et VII. Zágráb, secundum D. Sostarič.
33. *viridis* Jur. — Secundum data litteraturæ ubique frequens esse videtur, secundum D. Wierzejski etiam in lacu Toporow in montibus Tátra.
34. *albidus* Jur. — Secundum data litteraturæ frequens esse videtur, præcipue in regione V., secundum D. Wierzejski etiam in lacu Toporow in montibus Tátra.
35. *fuscus* Jur. — Ubique frequens esse videtur, secundum D. Sostarič in regione. VII. Zágráb et Varasd, secundum D. Wierzejski etiam in lacu Toporow in montibus Tátra.
36. *elongatus* Cls. — Lacus Hinczó in montibus Tátra, secundum D. Wierzejski. V. Kolozsvár.

Fam. HARPACTIDAE.

Canthocamptus West.

1. *Treforti* Dad. — In stagnis salsis prope Déva in com. Hunyad, regio V.
2. *horridus* Fisch. — V. Kolozsvár in com. Kolozs.
3. *ornatus* Dad. — V. Lacus Zseminye in montibus Retyezát.
4. *minutus* Cls. — IV. Lacus Halas-tó in montibus Tátra secundum D. Wierzejski, V. in stagnis prope Déva. VII. Zágráb, secundum D. Sostarič.
5. *dentatus* Pogg. — V. Kolozsvár.

6. *staphylinus* Jur. — I. Budapest. II. Lacus Balaton. IV. Lacus montium Tátra secundum A. Wierzejski; V. Kolozsvár et lacus montium Retyezát.
7. *brevicornis* Dad. — In aquis salsis prope Torda et Vizakna.
8. *balatonicus* Dad. — II. Lacus Balaton.
9. *tentaculatus* Dad. — II. Lacus Balaton.
10. *hibernicus* Brady. — II. Lacus Balaton, secundum J. Richard.

Fam. CALANIDAE.

Diaptomus West.

1. *amblyodon* Marenz. — I. Budapest, Kalocsa. V. Szamosujvár.
2. *ungviculatus* Dad. — I. Kecskemét, Kisujszállás, Parád in com. Heves.
3. *denticornis* Wierz. — IV. Lacus Toporow in montibus Tátra, secundum A. Wierzejski.
4. *Zachariasi* Poppe. — In regione V. sat frequens esse videtur.
5. *transylvanicus* Dad. — In regione V. sat frequens.
6. *coeruleus* Fisch. — I. Kecskemét. V. Szamosujvár, Mócs in com. Kolozs.
7. *Lilljeborgii* G. et R. — V. Kolozsvár, Sz.-Ujvár.
8. *tatricus* Wierz. — IV. Czéke in com. Zemplén; lacus montium Retyezát Tatrensiumque.
9. *gracilis* Sars. — Secundum data litteraturæ ubique frequens esse videtur.
10. *Wierzejskii* Rich. — I. Kecskemét, Nagyvárad.
11. *spinosus* Dad. — I. Bugacz prope urbem Kecskemét. II. Lacus Fertő.
12. *salinus* Dad. — In aquis sálsiš prope Torda, Vizakna et Szamosfalva in regione V.
13. *bacillifer* Koelb. — Secundum data litteraturæ frequens esse videtur.

Heterocope Sars.

14. *saliens* Lillj. — Secundum A. Wierzejski in lacubus Toporow et Fekete-tó in montibus Tátra.

Fam. LERNAEOPODIDAE.

Basinistes v. Nord.

1. *huchonis* Schr. — Secundum Sostarič in piscibus Salmo hucho et Lucioperea sandra e fluminibus Drávą et Száva collectis.

Lernaeopoda Blainv.

2. *salmonea* Gis. — Secundum Sostarič parasita Salmonum huchonum e fluvio Száva collectorum.
3. *stellata* May. — VII. Zágráb, secundum Sostarič e Siluro glano collecta.

Achtheres v. Nordm.

4. *percarum* v. Nordm. — I. Budapest, secundum Margó. VII. Zágráb, Varasd, secundum Sostarič.

Tracheliastes v. Nord.

5. *polycolpos* v. Nordm. — I. Bpest, secundum Margó.

Fam. ERGASILIDAE.

Nicothoë Ant.

1. *astaci* Ant. — VII. Secundum Sostarič.

Ergasilus v. Nordm.

2. *Sieboldii* Nord. — I. Budapest, secundum Margó. VII. Zágráb, secundum Sostarič.
3. *trisecatus* Nord. — VII. Zágráb, secundum Sostarič.

Dichelestium Herm.

4. *sturionis* Herm. — I. Budapest, secundum Margó. VII. Zágráb, secundum Sostarič.

Fam. LERNAEIDAE.

Lernæocera Ant.

1. *cyprinacea* L. — I. Budapest, secundum Margó.
2. *esocina* Burm. — I. Budapest, secundum Margó.

Fam. ARGULIDAE.

Argulus M. O. Fr.

1. *foliaceus* L. — I. Budapest, secundum Margó. II. Lacus Balaton. VII. Zágráb, secundum Sostarič.

Ordo. OSTRACODA.

Fam. CYPRIDAE.

Cypria Zenk.

1. *ophthalmica* Jur. — I. Budapest. II. Balaton. V. Kolozsvár, N.-Pestény, Mező-Tóhát, Mező-Záh, Méhes, Báld, Katona, Gyeke, Czege.
2. *serena* Koch. — I. Budapest.

Cyclocypris Br. et Nr.

3. *laevis* M. O. Fr. — I. Budapest, Nagyvárad. V. Kolozsvár, Mócs, Mező-Záh, Segesvár, Brassó, Deés, Novaly, Réty, Mikó-Ujfalu, Oltszem. VII. Zágráb, Varasd.
4. *globosa* Sars. — I. Budapest, Szeghalom, Fülöpszállás. V. Katona, Gyeke.

Cypris M. O. Fr.

5. *fuscata* Jur. — I. Budapest, Dabas. V. Bonczhida. in com Szolnok-Doboka. VII. Varasd, Zágráb.
6. *incongruens* Ramd. — Secundum data litteraturæ ubique frequens esse videtur.
7. *pubera* M. O. Fr.— I. Budapest, Dabas, Szeghalom, Nagyvárad. V. Kolozsvár, Apahida, Deés, Nagyszeben, Kincses in com. Maros-Torda, Mohos-tó.
8. *virens* Jur. — I. Budapest, Szeghalom. V. Kolozsvár, Apahida. VII. Zágráb.
9. *reticulata* Zadd.—I. Bpest, Szeghalom. VI. Szeged.
10. *ornata* M. O. Fr. — I. Budapest, Dabas, Kun-Szt-Miklós, Szabadszállás, Fülöpszállás, Nagyvárad, Debreczen. V. Kolozsvár, Déva, Medgyes, Alsó-Venicze in com. Fogaras, Nagypestény in com. Hunyad, Gyulas, Nagyteremi, Uzdi-Szt-Péter in com. Maros-Torda, Apahida, Felek, Méhes, Réty, Mohos-tó. II. Fertő.
11. *clavata* Baird.— I. Budapest, Nánás in com. Hajdu.
12. *Fischeri* Lillj. — I. Budapest.

Erpetocypris Br. et Nr.

13. *reptans* Baird.—I. Bpest. V. Kolozsvár. VII. Varasd.
14. *strigata* M. O. Fr. — I. Budapest, Szeghalom. VII. Zágráb, Varasd.
15. *Zenkeri* Chyz. et T. — I. Budapest. V. Kolozsvár.
16. *olivacea* Br. et Nr. — I. Nánás in com. Hajdu.

Cypridopsis Brady.

17. *vidua* M. O. Fr. — I. Budapest, Nagyvárad. V. Kolozsvár, Mező-Tóhát, Mező-Záh, Méhes, Báld, Katona, Gyeke, Czege. VII. Zágráb, Varasd.
18. *Newtoni* Br. et Nr. — I. Budapest, Dabas, Gyón. V. Katona, Gyeke.
19. *verrucosa* Dad. — II. Lacus Balaton prope Kenese.
20. *aculeata* Lillj. — I. Fülöpszállás. V. Kolozsvár, Nagyszeben, Boldogváros, Rozsnyó, Kolozs-Monostor, Szamosfalva.
21. *villosa* Zadd. — I. Kun-Szt-Miklós, Fülöpszállás, Nánás.

Notodromas Lillj.

22. *monacha* M. O. Fr. — I. Budapest, Nagyvárad, Szeghalom. V. Kolozsvár, Nagy-Sármás, Mező-Záh, Brassó, Besimbák, Alsó-Venicze, Novaly, Nagy-Pestény, Déva, Gyulafehérvár, Szamosfalva, Csehtelke.

Cyprois (Zenk).

23. *dispar* (Chyz.).— I. Budapest. II. In stagnis prope lacum Balaton.

Candona Baird.

24. *candida* M. O. Fr. — I. Budapest. V. Kolozsvár, Katona. VII. Zágráb, Svabica.
25. *pubescens* Koch. — I. Budapest. V. Kolozsvár.
26. *rostrata* Br. et Nr. — I. Budapest, Fülöpszállás. II. Lacus Balaton.
27. *fabaeformis* Fisch. — I. Kun-Szent-Miklós, Fülöpszállás. II. Lacus Balaton. V. Mező-Záh, Katona, Gyeke, Czege.
28. *granulata* Dad. — I. Kun-Szent-Miklós, Szabadszállás, Fülöpszállás, Dabas, Gyón, Dorog. VI. Dorozsma.
29. *balatonica* Dad. — II. Lacus Balaton prope urbem Keszthely
30. *Kingslei* Br. et Rob. — VII. Varasd, secundum Sostarič.

Iliocypris Br. et Nr.

31. *gibba* Ramd. — I. Budapest, Szeghalom, Kun-Szent-Miklós, Fülöpszállás, Dabas, Dorog. II. Lacus Balaton. V. Apahida, Mező-Záh, Gyeke, Czege, Katona. VI. Szeged.

Typhlocypris Vejd.

32. *eremita* Vejd. — VII. Zágráb, Demetrovoj, secundum Sostarič.

Fam. DARWINULIDAE.

Darwinula Br.

1. *Stewensoni* Br. — I. Budapest. II. Lacus Balaton.

Fam. CYTHERIDAE.

Limnicythere Br. et Nr.

1. *inopinata* Baird. — I. Bpest, lacus natronici planiciei hungaricæ. II. Lacus Balaton. V. Lacus Czege.

Ordo. PHYLLOPODA.

Subordo. CLADOCERA.

Fam. LEPTODORIDAE.

Leptodora Lillj.

1. *hyalina* Lillj. — I. Budapest. II. Lacus Balaton et Tata.

Fam. POLYPHEMIDAE.

Polyphemus M. O. Fr.

1. *pediculus* De Geer. — IV. Lacus Halas-tó et Poprád-tó in montibus Tátra secundum A. Wierzejski. V. Mohos-tó, Réty.

Fam. LYNCEIDAE.

Monospilus Sars.

1. *tenuirostris* Fisch. — II. Lacus Balaton et Tata. V. Csapó, Brassó.

Chydorus Leach.

2. *punctatus* Hell. — IV. Lacus Toporow in montibus Tátra secundum Wierzejski.
3. *sphaericus* M. O. Fr. — Secundum data litteraturæ ubique frequens esse videtur.
4. *coelatus* Schoedl. — IV. Lacus Halas-tó in montibus Tátra secundum D. Wierzejski. VI. Versecz, Retisova.
5. *latus* Sars. — V. Kincses in com. Maros-Torda. VII. Zágráb.
6. *globosus* Baird. — Secundum data litteraturæ frequens esse videtur.

Pleuroxus Baird.

7. *exiguus* Lillj. — Secundum data litteraturæ sat frequens esse videtur.
8. *excisus* Fisch. — Ubique sat frequens, præcipue in regione V.
9. *tusnadensis* Dad. — V. Lacus Szent-Anna-tó in com. Csik.
10. *hastatus* Sars. — Sat frequens esse videtur.
11. *trigonellus* M. O. Fr. — I. Budapest, Kisujszállás, Püspök-Ladány. — II. Lacus Balaton. III. Liptó-Szent-Miklós, Szielnicz, Deménfalu, Besnyőfalu, Cserna. V. Kolozsvár, Nagyszeben. VI. Szeged, Palics, Dorozsma.
12. *transylvanus* Dad. — V. Novaly in com. Kolozs.
13. *nanus* Baird. — I. Debreczen, Nagy-Károly, Szatmár. III. Liptó-Szent-Miklós, Deménfalu, Besenyőfalu, Cserna. V. Kolozsvár, Brassó, Oltszem, Mező-Sályi, lacus Szent-Anna-tó et Mohos. VI. Versecz, Retisova.
14. *griseus* Fisch. — V. Brassó.
15. *striatus* Schoedl. — III. Liptó-Szent-Miklós, Szielnicz, Besenyőfalu, Cserna, Deménfalu. V. Szkara in com. Fogaras.
16. *aduncus* Jur. — Sat frequens esse videtur.
17. *truncatus* M. O. Fr. — Secundum data litteraturæ sat frequens esse videtur.
18. *personatus* Leyd. — V. Alsó-Rákos.
19. *uncinatus* Baird. — V. Alsó-Rákos, Novaly in com. Kolozs.
20. *balatonicus* Dad. — II. Lacus Balaton.

Crepidocercus Binge.

21. *setiger* Binge. — I. Kecskemét, Debreczen, Konyár. V. Nagyteremi, Kötelend, Medgyes. VI. Arad.

Alona Baird.

22. *Leydigi* Schoedl. — I. Budapest. II. Lacus Balaton. V. Lacus montium Retyezát, Alsó-Rákos, Besimbák, Piski.
23. *acanthocercoides* Fisch. — II. Lacus Balaton. V. Besimbák in com. Fogaras, Mező-Záh, Gyeke.
24. *balatonica* Dad. — II. Lacus Balaton.
25. *affinis* Leyd — Secundum data litteraturæ ubique frequens esse videtur.
26. *quadrangularis* M O. Fr. — I. Debreczen. II. Lacus Balaton. III. Liptó-Szt-Miklós. Szielnicz, Besenyőfalu, Deménfalu. IV. Lacus montium Tátra. V. Alsó-Rákos, Alsó-Vist, Báld, Malomviz, Mező-Záh, secundum Wierzejski etiam in lacubus montium Tátra.
27. *guttata* Sars. — Secundum data litteraturæ ubique frequens esse videtur.
28. *stagnalis* Dad. — V. Alsó-Rákos in com. Háromszék.
29. *lineata* Fisch. — Secundum data litteraturæ sat frequens esse videtur.
30. *reticulata* Baird. — I. Kisujszállás, Kecskemét. V. Alsó-Rákos, Apahida.
31. *oblonga* M. P. E. — IV. In lacubus montium Tátra, secundum D. Wierzejski. V. Lacus Fekete-tó in montibus Retyezát.
32. *costata* Sars. — Secundum data litteraturæ sat frequens esse videtur.
33. *latissima* Kurz. — V. Segesd in com. Nagy-Küküllő. VI. Versecz.

34. *camptocercoides* Schoedl. — V. Kolozsvár, Apahida, Oltszem.
35. *parvula* Kurz. — V. Alsó-Rákos, Apahida.
36. *tuberculata* Kurz. — V. Lacus Mohos-tó in com. Csik.
37. *tenuicaudis* Sars. — Secundum data litteraturæ ubique frequens esse videtur.
38. *lacustris* Dad. — V. Alsó-Rákos.
39. *rostrata* Koch. — I. Debreczen. II. Lacus Balaton. V. Mező-Sályi, Szovát, Héviz, Mező-Tóhát, Mező-Záh.
40. *testudinaria* Fisch. — Secundum data litteraturæ sat frequens esse videtur.

Alonopsis Sars.

41. *elongata* Sars. — Secundum data litteraturæ sat frequens esse videtur.

Acroperus Baird.

42. *leucocephalus* Koch. — Secundum data litteraturæ ubique frequens esse videtur.
43. *transylvanicus* Dad. — V. Apahida in comit. Kolozs.
44. *angustatus* Sars. — V. Brassó, Oltszem, Réty, Alsó-Rákos.

Camptocercus Baird.

45. *macrourus* M. O. Fr. — IV. Lacus Toporow in montibus Tátra, secundum Wierzejski.
46. *rectirostris* Schoedl. — II. Lacus Balaton. V. Lacus Szent-Anna- et Mohos-tó in com. Csik.
47. *Lilljeborgi* Schoedl. V. Lacus montium Retyezát, Brassó, Katona.

Eurycercus Baird.

48. *lamellatus* M. O. Fr. — I. Budapest, Nagyvárad IV. Lacus montium Tátra, secundum Wierzejski.

Fam. LYNCODAPHNIDAE.

Acantholeberis Lillj.

1. *curvirostris* M. O. Fr. — IV. Lacus Szmrecsin in montibus Tátra, secundum Wierzejski.

Streblocerus Sars.

2. *serricaudatus* Fisch. — — IV. Lacus Toporow in montibus Tátra, secundum Wierzejski. V. Lacus Mohos-tó.

Macrothrix Baird.

3. *laticornis* Jur. — Secundum data litteraturæ ubique frequens esse videtur.
4. *serricaudata* Dad. — III. Liptó-Szent-Miklós, Szielnicz, V. Besimbák in comit. Fogaras.
5. *hirsuticornis* Norm. — I. Kecskemét IV. Lacus montium Tátra, secundum A. Wierzejski.
6. *rosea* Jur. — Ubique sat frequens esse videtur.

Fam. BOSMINIDAE.

Bosmina Baird.

1. *cornuta* Jur. — Secundum data litteraturæ sat frequens esse videtur.
2. *curvirostris* Fisch. — III. Szielnicz in comit. Liptó. V. Réty, in Comit. Háromszék.
3. *longirostris* M. O. Fr. — I. Budapest, Kisujszállás, Karczag, Debreczen. V. Lacus Balaton, Mezőzáh, Katona, Czege. IV. Lacus montium Tátra.
4. *longispina* Leyd. — V. Mezőzáh.
5. *longicornis* Schoedl. — III. Deménfalu. V. Mezőzáh.

Fam. DAPHNIDAE.

Ceriodaphnia Dana.

1. *reticulata* Jur. — Secundum data litteraturæ ubique frequens esse videtur.
2. *megops* Sars. — V. Piski, Novaly, Nagyteremi, Déva, Alsóvist, Héjjasfalva.
3. *pulchella* Sars. — Secundum data litteraturæ ubique frequens esse videtur.
4. *quadrangula* M. O. Fr. — Secundum data litteraturæ ubique frequens esse videtur.
5. *laticaudata* M. P. E. var. *transylvana*. — V. Kolozsvár. VII. Varasd, secundum D. Sostarič.
6. *rotunda* Strans. — Secundum data litteraturæ ubique frequens esse videtur.

Moina Baird.

7. *brachiata* Jur. — Secundum data litteraturæ ubique frequens esse videtur.
8. *rectirostris* Jur. — Sat frequens esse videtur.
9. *salina* Step. — In aquis salsis prope urbem Torda.
10. *Fischeri* Hell. — III. Liptó-Szent-Miklós, Szielnicz. VII. Orijovac in comit. Pozsega, Ledina.
11. *Bánffyi*. Dad. — V. Lacus Mohos-tó, Nádpatak in comit. Nagyküküllő.

Simocephalus Schoedl.

12. *vetulus* M. O. Fr. — Secundum data litteraturæ ubique frequens esse videtur.
13. *exspinosus* Koch. — I. Kecskemét. III. lacus montium Tátra, secundum A. Wierzejski. IV. Sátor-

alja-Ujhely, V. Vizakna. VIII. Zágráb, Varasd, secundum D. Sostarič.

14. *congener* Koch. — V. Fekete patak, Szamosfalva, Marosvásárhely, Kisosztró, Déva, Sárkány, Csehtelke, Medgyes.

15. *serrulatus* Koch. — V. Piski, Oltszem, Magyarnádas, Uzdi-Szent-Péter, Déva, Novaly, Szamosfalva.

Scapholeberis Schoedl.

16. *bispinosa* De Geer. — Secundum data litteraturæ ubique frequens esse videtur.

17. *mucronata* M. O. Fr. — Ubique frequens esse videtur.

18. *obtusa* Schoedl. — I. Kun-Szent-Miklós, Kecskemét. V. Déva, Nagysármás, Csápor, Sárkány.

Daphnia (M. O. Fr).

19. *Kahlbergiensis* Schoedl. — II. Lacus Balaton et Tata.

20. *Hermani* Dad. — V. Mezőzáh.

21. *aquilina* Sars. — VI. Versecz.

22. *lacustris* Sars. — III. Liptó-Szent-Miklós. V. Lacus montium Retyezát, Szkorén, Fehéregyháza, Héjasfalva. VI. Szeged, Versecz, Temesvár.

23. *longispina* Leyd. — Secundum data litteraturae ubique frequens esse videtur.

24. *caudata* Sars. — II. Parád. IV. Lacus Toporow in montibus Tátra, secundum Wierzejski.

25. *rosea* Sars. — IV. Diósgyőr. VI. Temesvár.

26. *Schaedleri* Sars. — IV. Diósgyőr. V. Novaly, Oltszem, VI. Temesvár, Versecz, Retisova, Szeged.

27. *alpina* Dad. — V. In stagnis montium Retyezát.

28. *obtusa* Kurz.— IV. Lacus montium Tátra, secundum Wierzejski. V. In stagnis montium Retyezát. VII. Zágráb, secundum Sostarič.

29. *ornata* Dad. — V. Alsó-Árpás in com. Fogaras.

30. *brevispina* Dad. — V. Nalácz, Malomviz, stagnaque montium Retyezát.

31. *hyalina* Leyd. — V. Mező-Záh, Gyeke, Czege.

32. *Atkinsoni* Baird. — I. Püspök-Ladány, Karczag, Kisujszállás, Kun-Szent-Miklós, Dorog, Nánás. V. Gyulafehérvár. VI. Versecz, Retisova. VII. Varasd.

33. *psittacea* Baird. — I. Kecskemét. V. Gyulafehérvár, Nagyszeben, stagna montium Retyezát.

34. *pulex* De Geer. — Secundum data litteraturæ ubique frequens esse videtur.

35. *pennata* M. O. Fr. — I. Kun-Szt-Miklós, Dorog. Nánás. IV. Lacus montium Tátra, secundum, Wierzejski. V. Kolozsvár, Zilah, Mócs. VII. Zágráb, secundum Sostarič.

36. *Schäfferi* Baird. — Sat frequens esse videtur.

37 *magna* Str. — Sat frequens esse videtur.

Fam. SIDIDAE.

Daphnella Baird.

1. *brachyura* Liév. — Secundum data litteraturæ ubique frequens esse videtur, præcipue in lacubus majoribus.

Sida Straus.

2. *crystallina* M. O. Fr. — I. Budapest. II. Lacus Balaton. V. Mező-Záh. VI. Szeged, Palics, Dorozsma, Temesvár, Versecz, Retisova.

Fam. HOLOPEDIDAE.

Holopedium Zadd.

1 *gibberum* Zadd. — IV. Lacus Halas-tó in montibus Tátra, secundum Wierzejski.

Fam. BRANCHIPODIDAE.

Branchipus Schäff.

1. *stagnalis* L. — I. Budapest, Kecskemét. V. Deés.

2. *ferox* Miln. E. — I. Tass, Kecskemét.

3. *claviger* Fisch. — I. Budapest.

4. *birostratus* Fisch. — I. Kecskemét.

5. *diaphanus* Prav. — V. Lacus Fekete-tó in montibus Retyezát.

6. var. *Chyzeri*. IV. Király-Helmecz et Szomotor.

7. *lacunae* Guerr. I. Kecskemét. II. Parndorf.

8. *torvicornis* Waga. — I. Budapest, Kecskemét, Tokaj. V. Kolozsvár. VII. Varasd.

9. *paludosus* M. O. Fr. — IV. Lacus montium Tátra.

Artemia Auc.

10. *salina* Leach et varietates *biloba* et *furcata* in aquis salsis Szék, Torda, Vizakna in regione V.

Fam. ESTHERIDAE.

Estheria Rüpp.

1. *dahalacensis* Rüpp. — I. Budapest.

2. *ticinensis* Criv. — IV. Sátoralja-Ujhely.

3. *cycladoides* Sol. — I. Budapest, Tokaj. IV. Sátoralja-Ujhely, Szőllőske, A.-Bereczki, Király-Helmecz, B.-Zsadány.

4. *tetracera* Krin. — V. Szamosujvár.

Limnetis Lon.

5. *brachyurus* M. O. Fr. — I. Budapest.

Fam. APODIDAE.

Apus Frisch.

1. *cancriformis* Schäff. — I. Budapest. V. Szamosujvár, Marosvásárhely, Gyalu, Kolozsvár, Nagyszeben. VII. Zágráb.

Lepidurus Br.

2. *productus* Bos. — I. Budapest. V. Szamosujvár.

Subclassis. ARTHROSTRACA.

Ordo. AMPHIPODA.

Fam. GAMMARIDAE.

Gammarus Fabr.

1. *pulex* L. — Secundum data litteraturæ ubique frequens esse videtur.
2. *Roeseli* Gerv. — I. Budapest. VII. Plitvica, secundum Sostarič.

Niphargus Schiöd.

3. *puteanus* Casp. — I Budapest. VII. Zágráb, secundum Sostaric.
4. *croaticus* Jurinac. — VII. Spilja, Zagorje, secundum Sostarič.
5. *stigius* Schiöd. — V. Kisnyires in com. Szolnok-Doboka, Ugra in com. Maros-Torda.

Ordo. ISOPODA.

Fam. ONISCIDAE.

Oniscus L.

1. *murarius* L. — Ubique frequens.

Porcellio L.

2. *scaber* Leach. — I. Budapest.
3. *laevis* Leach. — I. Budapest.
4. *dilatatus* Leach. — I. Budapest.
5. *pictus* Brandt. — I. Budapest.
6. *granulatus* M. Edw. — I. Budapest.
7. *spinifrons* Brandt. — I. Budapest.

Armadillo L.

8. *vulgaris* Latr. — I. Budapest.

Fam. ASELLIDAE.

Asellus Geoffr.

1. *aquaticus* L. — Ubique frequens.

Subclassis. THORACOSTRACA.

Ordo. PODOPHTHALMATA.

Fam. ASTACIDAE.

Astacus L.

1. *fluviatilis* L. — Ubique frequens.
2. *leptodactylus* Esch. — In fluminibus Danubio, Tibisco et in lacu Balaton.
3. *saxatilis* Koch. — In rivis montanis.

Conspectus familiarum, generum et specierum.

Familia	Genus	Species
1. Cyclopidæ	1	36
2. Harpactidæ	1	10
3. Calanidæ	2	14
4. Lernæopodidæ	4	5
5. Ergasilidæ	3	4
6. Lernæidæ	1	2
7. Argulidæ	1	1
8. Cypridæ	10	32
9. Darwinulidæ	1	1
10. Cytheridæ	1	1
11. Leptodoridæ	1	1
12. Polyphemidæ	1	1
13. Lynceidæ	9	48
14. Lyncodaphnidæ	3	6
15. Bosminidæ	1	5
16. Daphnidæ	5	37
17. Sididæ	2	2
18. Holopedidæ	1	1
19. Branchipodidæ	2	10
20. Estheridæ	2	5
21. Apodidæ	2	2
22. Gammaridæ	2	5
24. Oniscidæ	3	8
24. Asellidæ	1	1
25. Astacidæ	1	3
	61	241

Summa

Familiarum	25
Generum	61
Specierum	241

III.

ARTHROPODA.

(ARACHNOIDEA.)

Classis. ARACHNOIDEA.

Ordo. SCORPIONES.

Conscripti a Cornelio Chyzer.

E rendből faunánkban csak egy nem van.

A skorpiókra vonatkozó első megbizható adatokat 1794-ben Grossinger könyvében találjuk (7), ki oly pontosan irja le őket, hogy abbeli állitásához, mely szerint ő hosszabb keresés után a komáromi vár földalatti átjáróiban is talált skorpiókat, nem férhet kétség. Jelenleg azonban a skorpió Komáromban ismeretlen. Azt, hogy Pécsett a házakban és Petervárad on is van skorpió, Grossinger csak mások után mondja.

Most e két helyütt sem ismerik a skorpiót.

Több régi szerző a Kárpátokról is azt mondja, hogy bennök tanyázik skorpió. Ezen azonban csakis a Déli-Kárpátokat érthették, mert a közönségesen Kárpátnak nevezett Tátrában skorpió nem fordul elő.

Az alább felsorolt irodalom egyes helyes, téves vagy felszínes adatait czélirányosabb lesz az egyes fajoknál emliteni.

Fauna Hungariæ ex ordine Scorpionum unicum genus habet.

Mentionem primam Scorpionum Hungariam incolentium apud Grossingerum invenimus (7) cuius descriptio accuratissima fide digna videtur.

Autor hic præterito sæculo scripsit: «Nec apud nos intra Regni fines desunt Scorpiones; post diutinam indaginem comperi Scorpios in cuniculis, viisque subterraneis, utraque in arce Comaromiensi delitescere: sæpius visi sunt Scorpii in ædibus civitatis Quinque-Ecclesiarum item Petrovaradini».

Nostro tempore attamen Scorpiones locis memoratis nemo novit. Antiquiores autores nonnulli Scorpiones Carpathos incolere dicunt, quod sollummodo ad Carpathum australem referri potest, nam montes Tatrenses vulgo Carpathi dicti, Scorpiones certe non alunt.

Quæ de genere hoc libri variorum autorum continent, alia certissima, alia erronea et lævia ad singulas species citabo.

LITTERATURA.

1. Becker Léon. Communications arachnologiques. Arachnides de Hongrie recueillies par M. de Horváth. Comptes-rendus de la Société entomologique de Belgique. Bruxelles 1880.
2. Entz Géza. dr. Egy Kolozsvárt fogott skorpió s néhány szó a skorpióknak hazánkban való előfordulásáról. Kolozsvári orvostermészettudományi Értesitő 1880. V. évfolyam 1. füzet.
3. — Utószó a Kolozsvárt fogott skorpiót tárgyaló közleményhez. U. o. II. füzet.
4. Frivaldszky Imre. Jellemző adatok Magyarország faunájához. — A M. T. Akadémia Évkönyvei XI. k. 4. darab. Pesten. 1865.
5. Frivaldszky János. A Herkules-fürdő és környéke, irta Dr. Munk Manó, az állattani részt Fr. J. Pest. 1872.
6. — Adatok Temes és Krassó megyék faunájához. Math. és Term. Közlemények, vonatkozólag a hazai viszonyokra. Kiadja a M. T. Akadémia Budapest. 1877. XIII. k. 10. sz.
7. Grossinger Ioannes. Universa historia physica regni Hungariæ secundum tria regna naturæ digesta. Pars quarta. Entomologia. Posonii et Comaromii 1794.
8. Grube A. E. Ein Ausflug nach Triest und dem Quarnero. Berlin 1861.
9. Koch C. L. et Hahn C. W. Die Arachniden getreu nach der Natur abgebildet und beschrieben. Nürnberg 1831—1848.
10. Simon Eugène. Les Arachnides de France; Tome VII-ème. Paris 1879.
11. Thorell T. Etudes scorpiologiques. Milano. 1877. (Pag. 137. 138. [212.]).
12. Tömösváry Ödön. A skorpió előfordulása hazánk erdélyi részében. — Kolozsvári orv.-term.-tud. Értesitő. 1880. V. évfolyam. 2. füzet.

Fam. ISCHNURIDÆ.

Euscorpius Thorell.

1. *italicus*. Herbst. — V. Kolozsvár? (2. 3.) VI. Mehádia et Oravicza (11). Exempla complura Musæi Nationis Hungaricæ *Euscorpio banatico* mixta loco originis «Mehadia» notata, huic speciei adnumeranda sunt. Idem locus originis dicitur exemplorum *Euscorpii italici*, quæ vidi in collectione Kimakovicz-i conservatorum.

Equidem regionem VI. banaticam et præcipue Mehadiam pluries perscrutâvi, locisque diversissimis exempla *Euscorpii* ultra mille legi, sed præter *banaticum* nec *italicum* nec ullam aliam speciem aut formam inveni; etiam inter exempla Scorpionum certe in hac regione collecta, ab amicis mihi communicata, nullum *Euscorpium italicum* vidi.

Species in regione adriatica sat frequens, præcipue ædificia incolens. VIII. Fiume, Buccari, Crkvenica, Zengg, Vratnik.

2. *banaticus* C. L. Koch. *(Oravicensis* C. L. Koch, *rufus* C. L. Koch, *concinnus* C. L. Koch [9], *carpathicus* Thorell [11], Simon [10], Friv. Joannes neque Koch [6], *europaeus* Friv. nec Linné [4, 5], *germanus*? Töm. [12.]).

V. Zsilvölgy (vallis Zsil in comitatu Hunyad) VI. Mehádia, Bogoltin (Polyana Lunga) Herkules-fürdő, Pecsenyeska, Orsova, Plavisevicza, Drenkova, Berzászka, Eibenthal, St. Helena, ad antrum Veterani, Uj Moldova, Szászkabánya, Bozovics, (mons Mosniak, et vallis Kusek) Ponyászka.

3. *tergestinus* C. L. Koch (? *sicanus* C. L. Koch) — VI. Mehádia? (exemplum unicum Musæi Nationis Hungaricæ.)

VII. Perušić, Kuterevo. VIII. Fiume, Orehovica, Sušak, Martinšćica, Meja, San Cosmo, Costrena Sta Lucia, Portoré, Buccari, Buccarizza, Crkvenica, Novi, Sveto Marino insula (ad Novi), Breze, Francikovac, Vratnik, Carlopago, Velebit, (Crni Dabar).

4. *bosnensis* Moellendorf. — VII. Pazarište (ad antrum Milinković pećina dictum). VIII. Orehovica (in litore amnis Fiumaræ ad molem Flavonensem), Velebit.

5. *germanus* H. Schäffer. — VI. Mehadia? (exempla Musæi Nationis Hungaricæ). VII. Zágráb, Vrata, Plitvica, Kriviput, Lič (cacumen Visevica), Risnjak (in altitudine 900—1500 valde frequens). VIII. Fiume, Vratnik, Stalak (ad Novi), Breze, Velebit (Vaganski vrh.).

— *(germanicus)*. Herbst. — In regione IV. ad Varanno non occurrit (1.). Teste G. Horváth exemplum de quo hic agitur ad Mehadiam lectum est.

Ordo. PSEUDOSCORPIONES.

Ab E. Daday de Deés conscripti.

A magyar fauna Álskorpióira vonatkozó pontosabb adatokat Sill V. 1861—1862. évi közleményének megjelenése előtt hazai irodalmunkban nem találunk. Sill V. volt az első, a ki a hazai fauna ezen állatfajait először tanulmányozta behatóbban és Nagyszeben környékéről néhányat feljegyzett. Frivaldszky János és Imre idevonatkozólag 1865—66-ban szintén nyujtanak néhány adatot s nevezetesen az első *Blothrus brevipes* néven egy új hazai fajt is ir le. A 80-as években Daday J. és Tömösváry Ö. specziális tanulmány tárgyává tették a hazai Álskorpiókat; az első megirta teljes anatomiájokat, az utóbbi pedig leirta a rendelkezésére álló fajokat, még pedig összesen 33-at s ezek között hetet új gyanánt mutatott be. Daday J. 1888. és 1889. évi közleményeiben a fajokra is kiterjesztette figyelmét s pár oly fajt is jegyzett fel, a melyek hazánkból még addig ismeretlenek voltak. Horváth G. különböző növényeken talált pár fajt mutat be.

A magyar faunából eddig megfigyelt fajok, nem tekintve az új s még eddig csupán hazánkból ismeretes fajokat, valamennyien olyanok, a melyek más európai területen is otthonosak, esetleg gyakoriak; különben a fajok számára való tekintetben a magyar fauna tetemesen fölülmúlja az eddig átkutatott többi európai fauna-területeket.

De Pseudoscorpionibus regni Hungariae non prius quidquam accuratius scriptum in litteris nostris invenimus, quam V. Sill in studium eorum se contulit, et annis 1861—62 nonnullos ad urbem Nagy-Szeben inventos percensuit. Postea a. 1865—66 J. Frivaldszky et E. Frivaldszky aliquid ad rem attulerunt, eorumque primus novam speciem, in nostra terra repertam: *Blothrum brevipedem* descripsit.

Sub annum 1880 E. Daday et Ö. Temesváry Pseudoscorpionibus Hungariae maximam operam dabant, et ille quidem anatomiam, hic species, ad id locorum collectas litteris mandaverunt. Postea a. 1888 et 1889 et E. Daday in libellis, quos ediderat, compluribus aliquot species, ante id tempus in Hungaria ignotas annotavit.

G. Horváth species nonnullas, in variis plantis conquisitas exhibuit.

Species Hungariæ adhuc descriptæ, exceptis novis, necubi nisi in nostra terra adhuc repertis, omnes et alias Europae regiones incolunt, nonnunquam saepius quoque occurrunt. Ceterum species terræ nostræ alias Europæ regiones, usque adhuc exploratas, numero longe superant.

LITTERATURA.

1. Daday J. Az álskorpiók vérkeringési szeryéről. Természetrajzi füz. 4. köt. 1880. 1. táb.
2. — A magyarországi álskorpiók. Orv. term.-tudom. Ért. 5. köt. 1880.
3. — Az álskorpiók boncztana. Orv. term.-tud. Ért. 7. köt. 1882. 4. táb.
4. — A magyar nemzeti muzeum álskorpióinak áttekintése. Term.-rajzi füz. 11. köt. 1888. 4. táb.
5. — Ujabb adatok a magyar fauna álskorpióinak ismeretéhez. Term.-rajzi füz. 12. köt. 1889. 2. táb.
6. Frivaldszky Imre. Jellemző adatok Magyarország faunájához. Budapest, 1866.
7. Frivaldszky János. Adatok a magyarországi barlangok faunájához. Math. term.-tud. közl. 1865. 5. köt.
8. Horváth G. Álskorpiók növényeken. Rovartani lapok. 2. köt. 1885.
9. Sill V. Beiträge zur Kenntniss der Crustaceen, Arachniden und Myriopoden Siebenbürgens. Verhandl. und Mittheil. d. Siebenb. Vereins f. Naturwiss. in Hermannstadt. Bd. XII. 1861.
10. — Systematisches Verzeichniss bisher bekannter Arachniden Siebenbürgens. Verhandl. und Mittheil. d. Siebenb. Vereins f. Naturw. in Hermannstadt. Bd 16. 1865.
11. Tömösváry Ö. Egy új alak hazánk Arachnoida faunájában Zemplén megyéből. Term.-rajzi füz. 5. köt. 1882. pag. 226. 1. táb.
12. — A magyar fauna álskorpiói. Math. term.-tud. közl. 18. köt. 7. sz. 1883. 4. táb.

Fam. CHELIFERIDÆ.

Chernes Menge.

1. *Chyzeri* Töm. — II. Vadé. III. Nyitra, Torna. IV. Kis-Azar, Tárkány, Szinnai kő. V. Baán, Déva. VI. Rumunyesty.
2. *nodosus* Schr. — V. Kolozsvár.
3. *scorpioides* Herm. — V. Déva. II. Visz in comit. Somogy.
4. *cyrneus* L. K. — II. Szentmárton incomit. Baranya, Vadé, Visz.

5. *montigenus* Sim.— I. Péczel. V. Déva. VI. Rumunyesty.
6. *cimicoides* Fr. — Secundum data E. Tömösváry ubique frequens esse videtur.
7. *phaleratus* Sim. — II. Visz. Sóly in comit. Veszprém. IV. Sátoralja-Ujhely, Tárkány, Bereczki, Kis-Azar, Homonna.
8. *hungaricus* Dad. — VI. Paulis in com. Arad.
9. *Wideri* C. K. VI. Rumunyesty in comit. Krassó-Szörény.
10. *lacertosus* L. K. — II. Vadé.

Chelifer Geoffr.

11. *cancroides* L. — Secundum data litteraturæ ubique frequens esse videtur.
12. *peculiaris* L. K. — II. Sóly in comit. Baranya. IV. Homonna, Nagymihály, Bereczki, Galambos, Sátoralja-Ujhely.
13. *rutilans* Töm.—V. Ponor-Ohaba in com. Hunyad.
14. *subruber* Sim. — II. Sóly in comit. Veszprém. V. Puj in com. Hunyad.
15. *tegulatus* Töm. — V. Borbátviz in com. Hunyad.
16. *disjunctus* L. K. — I. Békás-Megyer. II. Sóly. VI. Mehádia.
17. *quadrimaculatus* Töm. — IV. Homonna in comit. Zemplén.
18. *Entzii* Dad. et Tömösváry. — V. Sz.-Udvarhely.
19. *De Geeri* C. K. — Secundum data E. Tömösváry frequens esse videtur.

Fam. GARYPIDÆ.

Cheiridium Menge.

1. *muscorum* Leach. — Secundum data litteraturæ sat frequens esse videtur.
2. *tetrophthalmum* Dad.—II. Vadé in com. Veszprém.

Garypus Koch.

3. *hungaricus* Töm. — IV. Sátoralja-Ujhely.

Fam. OBISIIDÆ

Blothrus Schiödte.

1. *brevipes* Friv. — V. In antris Oncsásza, Fericse, Pestera. VI. Mehadia, in cavernis.

Roncus L. K.

2. *lubricus* L. K. — Secundum data litteraturæ sat frequens esse videtur.
3. *alpinus* L. K. — IV. Zbojna, Vihorlát, Szinnai kő, Olyka, in comit. Zemplén.
4. *euchirus* Sim. — VI. Mehadia.

Obisium Ill.

5. *praecipuum* Sim. — VI. Mehádia, Szelistye, Rumunyesty.
6. *validum* L. K. — II. Somlyó-Ujlak, Sárvár. IV. Homonna, Varannó. VII. Zágráb.
7. *carcinoides* Herm. — II. Simontornya. IV. Varannó, Nagy-Mihály, Lucski, Bártfa. V. Vlegyásza. VI. Divics. VII. Podsused.
8. *dumicola* C. K. — Secundum data litteraturæ sat frequens esse videtur.
9. *erythrodactylum* L. K. — II. Vadé, Mocsolás. III. Király-Lehota. IV. Tokaj. VI. Berzászka. VII. Podsused.
10. *muscorum* Leach. — Secundum data litteraturæ frequens esse videtur.
11. *manicatum* L. K. — VI. Szvinyicza, Berzászka.
12. *macrodactylum* Dad. — VI. Mehádia.
13. *Simoni* L. K. — V. Zsil in comit. Hunyad.
14. *sylvaticum* C. K. — II. Diós-Gyenes in comi. Zala, Sz.-Márton, Pécs. IV. Sátoralja-Ujhely, Velejte, Varannó, Homonna, Szinnaikő, Vihorlát, Bártfa. III. Torna, Áj. V. Deés, Oroszmező, Retyiczel, Kolozsvár. VI. Zombor. VIII. Fiume.
15. *seminudum* Dad. et Töm. — V. Zsil in comit. Hunyad.

Chthonius C. K.

16. *tetrachelatus* Preyss. — IV. Szinnaikő, Sátoralja-Ujhely. VI. Mehádia.
17. *diophthalmus* Dad. — VI. Mehádia.
18. *orthodactylus* Leach. — I. Budapest. V. Déva VI. Divics (com. Krassó-Szörény).

Conspectus familiarum, generum et specierum.

	Genus	Species
Cheliferidæ	2	19
Garypidæ	2	3
Obisiidæ	4	18
Summa	8	30

Ordo. OPILIONES.

Conscripsit Dr. Eugenius Daday de Deés.

A magyar fauna Kaszáspókjai felöl egyes adatokat ugyan már Grossinger B. J. és Földi J. műveiben is találunk, de a legelső tudományos feljegyzéseket mégis a V. Sill közleményei nyujtják. E buvár ugyanis 1861. és 1862. évi dolgozataiban erdélyi termőhelyekről öt fajt jegyzett fel. Utána Seidlitz G. enumerál a Koch L. meghatározásai alapján öt fajt 1867-ben szintén erdélyi termőhelyekről. Később Herman O. is figyelmére méltatja ezen állatokat és «Beitrag zur Kenntniss der Arachnidenfauna Siebenbürgens» czimü 1871. évi dolgozatában 7 fajt sorol fel Erdélyből, a melyek között *Nemastoma Sillii* néven egy ujat is ismertet. Sokkal gazdagabb adatokat közölt azonban «Magyarország pókfaunája» czimü nagy munkájának 1879. évi III. kötetében a 330. és 331. lapon, a hol összesen 26 fajt sorol fel. De a legtöbb adatot a hazai kaszáspókok felől Lendl A. nyujtotta. «A magyar nemzeti Muzeum kaszáspók-gyüjteménye» czimű, 1894. évi dolgozatában részben Sörensen, részben saját maga meghatározásai alapján. E dolgozatban ugyanis 45 fajt találunk s közöttük nem kevesebb mint 10 ujat és egy uj varietást.

Az alább következő összeállitásban a Simon E.-től megállapitott systematikai sorrendet és nomenclaturát követem.

Nonnulla de Opilionibus Hungariæ iam in operibus J. B. Grossinger et J. Földi inveniuntur; adnotationes tamen disciplinæ conformes solum V. Sill publici iuris dedit.

Autor hic publicationibus suis annorum 1861. et 1862. quinque e regione transylvanica species nominat.

Tum G. Seidlitz secundum determinationes Ludovici Koch etiam quinque species enumerat e regionibus transylvanicis. Postea et O. Herman attento animo scrutavit hasce bestiolas et anno 1871 in opere «Beitrag zur Kenntniss der Arachnidenfauna Siebenbürgens» 7 enumerat species e Transylvania, quarum una, nomine *Nemastoma Sillii* nova sit. Plura adnotat idem auctor anno 1879. typis promulgati operis «Magyarország pókfaunája» inscripti tomo III. pp. 330. et 331. quo 26 species enumerat. Copiosissima adtulit autem ad cognitionem Opilionum hungaricarum A. Lendl anno 1894 in publicatione «A magyar nemzeti muzeum kaszáspókgyüjteménye» inscripta, qua partim sua, partim Sörenseni auctoritate 45 confert species, quarum 10 novæ sint species et una nova varietas.

In subsequenti enumeratione systema et nomenclaturam ab E. Simon adoptatam sequor.

LITTERATURA.

1. Herman O. Beitrag zur Kenntniss der Arachnidenfauna Siebenbürgens. — Verhandl. u. Mittheil. d. Siebenbürg. Vereins für Naturwiss. in Hermannstadt. Jahrg. XXI. 1871. p. 23.
2. — Magyarország pókfaunája. (Ungarns Spinnen-Fauna). III. köt. 1879. p. 330—331.
3. Lendl A. A magyar nemzeti muzeum kaszáspók-gyüjteménye. — Term. rajzi füz. XVII. köt. p. 15. Tab. 1—2.
4. Seidlitz G. Arachniden aus Siebenbürgen. — Verhandl. u. Mittheil. d. Sieb. Vereins f. Naturw. in Hermannstadt. Jahrg. XVIII. 1867. p. 157.
5. Sill V. Beitrag zur Kenntniss der Crustaceen, Arachniden u. Myriopoden Siebenbürgens. — Verhandlungen u. Mittheilungen d. Siebenbürg. Vereins für Naturwiss. in Hermannstadt. Jahrg. XII. 1861. pag. 7.; Jahrg. XIII. 1862. p. 46.

Fam. PHALANGIDÆ.

Astrobonus. Th.

1. *laevipes* Can. — Specimina 13. in collectione Musæi Nationalis Hungarici ex Hungaria, loco originis non notato oriuntur.
2. *croaticus* Sörens. — VII. Jassenak. Specimen unicum in collectione A. Lendl.

Liobunum C. K.

3. *rotundum* Latr. — III. Pozsony. Specimina numerosa in collectione Musæi Nationalis Hungarici. V. Kolozsvár.
4. *rupestre* Herbst. — III. Budatin. Specimina tria in collectione Musæi Nationalis Hungarici ex Hungaria septentrionali, sine loco propiori; V. Kolozsvár, Bihar, Mons Vlegyásza et Caverna Oncsásza.
5. *glabrum* L. Koch. — V. ad ripas fluminis Kőrös; secundum O. Herman.
6. *opilio* L. — I. Budapest. II. Kőszeg. III. Zuberecz in comit. Árva, IV. Ungvár. V. Nagyszeben. VII. Mostanje; præterea specimina numerosa in collectione Musæi Nationalis Hungarici ex Hungaria sine loco promanationis.
7. *parietinum* de Geer. — I. Budapest, Pilis, Nagy-Várad; II. Dombóvár, Szántód, Tolna; V. Balánbánya, Kolozsvár, Mons Vlegyásza, Mezőhavas, Nagyszeben, Kis-Disznód; VI. Resicza; VII. Jasenak; præterea in collectione Musæi Nationalis Hungarici ex Hungaria absque loco natali.
8. *saxatile* C. K. — II. Tüske in comit. Tolna; VII. Jasenak, Mostanje; præterea specimen unicum in collectione Musæi Nationalis Hungarici ex Hungaria absque loco natali.
9. *dentatum* C. K. — VII. Jasenak.
10. *molluscum* C. K.—V. Montes in com. Csik; apud O. Herman sub nomine *Cerastoma molluscum* L. K.
11. *instratum* C. K. — I. Budapest; V. Nagyszeben, Montes Vlegyásza et Mezőhavas; apud O. Herman sub nomine *Opilio instratus* L. K.
12. *vorax* L. K. — Mons Vlegyásza; apud O. Herman sub nomine *Opilio vorax* L. K.
13. *pristis* C. K. — V. Kolozsvár, Nagyszeben; apud O. Herman sub nomine *Opilio pristis* C. K.

Platybunus C. K.

14. *bucephalus* C. K. — III. Német-Próna in comit. Nyitra, Zuberecz in comit. Árva; IV. Lacus Poprád; Barlangliget; Kriván, Bártfa; V. Mons Hargita.
15. *corniger* Herm. — II. Tüske in comit. Tolna; præterea numerosa in collectione Musæi Nationalis Hungarici ex Hungaria loco natali non notato.
16. *robustus* Sörens. — Specimen unicum in collectione Musæi Nationalis Hungarici ex Hungaria loco natali non notato.
17. *montanus* C. K. — V. Nagyszeben.
18. *rufipes* C. K. — V. Mons Hargita, Nagyszeben
19. *pinetorum* C. K. — IV. Tátrafüred; V. Kolozsvár, Mons Hargita; Bihar, Nagyszeben; apud O. Herman sub nomine *Platylophus pinetorum et alpestris* C. K.
20. *strigosus* L. K. — V. Kolozsvár, Nyárádszereda, secundum O. Herman.

Gyas E. S.

21. *titanus* E. S. — I. Rézbánya, V. Kolozsvár, Nagyszeben.
22. *annulatus* Oliv. — V. Montes in comit. Csik; Nagyszeben; apud O. Herman sub nomine *Leiobunum nigricans*; apud G. Seidlitz sub nomine *Opilio nigricans* C. K.

Egaenus C. K.

23. *variegatus* Lendl. — I. Budapest.
24. *mordax* C. L. K. — V. Nagyszeben; præterea numerosa in collectione Musæi Nationalis Hungarici loco natali non notato.
25. *convexus* var. *icterica* C. K. — III. Pozsony; V. Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagyszeben.
    var. *convexa* C. K. — Specimina nonnulla in collectione Musæi Nationalis Hungarici ex Hungaria loco natali non notato; I. Nagyvárad; V. Déva, Kolozsvár, Mező-Záh, Nagy-Disznód, Nagyszeben.
    var. *atrata* V. Lendl. Nagyvizvölgy, specimina numerosa in collectione Musæi Nationalis Hungarici.
26. *maximus* Lendl. — VII. Vinkovce; ex collectione A. Lendl.
27. *hungaricus* Lendl. — I. Budapest, Farkasd; ex collectione A. Lendl.

Oligolophus C. K.

28. *palpinalis* Herbst. — VII. Jasenak, Podsused, ex collectione A. Lendl.
29. *morio* F. — V. Kolozsvár, Nagyszeben; apud O. Herman sub nomine *Opilio grossipes* Herbst.
30. *alpinus* Herbst. — V. Montes Nagy-Hagymás, Mezőhavas, Vlegyásza; apud O. Herman sub nomine *Opilio alpinus* Herbst; apud G. Seidlitz sub nomine *Opilio rufescens* C. K.
31. *lucorum* C. K. — V. Kis-Disznód; apud V. Sill. sub nomine *Opilio lucorum* C. K.

32. *cinecrascens* C. K. — IV. Tátra-Füred, Kriván; V. Comit. Bihar; apud O. Herman sub nomine *Opilio Rhododendri* L. K.
33. *palliatus* Lat. — I. Pilis. III. Német-Próna in com. Nyitra. Zuberecz in com. Árva; præterea specimina numerosa in collectione Musæi Nationalis Hungarici ex Hungaria et Hungaria septentrionali, loco originis proprio non notato.

Acantholophus C. K.

34. *tridens* C. K. — I. Caverna Rumunyest in com. Bihar.
35. *Lendlii* Sör. — Specimen unicum in collectione A. Lendl ex Hungaria, loco natali non notato.
36. *bellicosus* Sörens. — III. Német-Próna in com. Nyitra, in collectione A. Lendl.
37. *horridus* Panz. — Specimina numerosa in collectione Musæi Nationalis Hungarici ex Hungaria, loco natali non notato.
38. *ephippiatus* C. K. — Specimen unicum in collectione Musæi Nationalis Hungarici ex Hungaria, loco natali non notato
39. *ephippiger* E. S. — Specimina in collectione Musæi Nationalis Hungarici ex Hungaria, loco natali proprio non notato.
40. *hispidus* Herbst. — III. Pozsony.

Fam. ISCHYROPSALIDÆ.

Ischyropsalis C. K.

1. *Kollari* C. K. — Specimina collectionis A. Lendl ex Hungaria, loco natali proprio non notato.
2. *Hellwigii* Panz. — I. Bihar. V. Kis-Disznód, præterea specimina ex Hungaria orientali, loco natali proprio non notato in collectione Musæi Nationalis Hungarici.
3. *manicata* L. K. — V. Nagyszeben; præterea specimina numerosa in collectione A. Lendl ex Hungaria, loco natali proprio non notato.

Fam. NEMASTOMIDÆ.

Nemastoma C. K.

1. *elegans* Sörens. — Specimina in collectione Musæi Nationalis Hungarici ex Hungaria, loco natali proprio non notato.
2. *lineatum* Sörens. — IV. Nagyvizvölgy; specimen unicum in collectione Musæi Nationalis Hungarici.
3. *gigas* Sörens. — In collectione Musæi Nationalis Hungarici ex Hungaria orientali, loco natali proprio non notato.
4. *Kochii* Sörens et Lendl. — I. Caverna Segestyel in comit. Bihar, IV. Bártfa, Nagyvizvölgy.
5. *triste* C. K. — III. Pozsony, IV. Bártfa, V. Görgény-Szent-Imre.
6. *chrysomelas* Herm. — IV. Bártfa.
7. *lugubre* M. O. F. — Specimina in collectione Musæi Nationalis Hungarici ex Hungaria, loco natali proprio non notato.
8. *quadrimaculatum* Pest. — IV. Caverna Plopa in comit. Krassó-Szörény; V. Montes in comit. Csik, Nagyszeben; apud O. Herman et G. Seidlitz sub nomine *Nemastoma flavimanum* L. K.
9. *daciscum* L. K. — V. Görgény-Szent-Imre.
10. *Sillii* Herm. — V. Nagyszeben.

Fam. TROGULIDAE.

Dicranolasma Sörens.

1. *scabrum* Herbst. — IV. Nagyvizvölgy.

Anelasmocephalus E. S.

2. *niger* C. K. — V. Nagyszeben.

Trogulus Latr.

3. *rostratus* Latr. — V. Rézbánya, Malomviz.
4. *tricarinatus* L. — IV. Máramaros, V. Malomviz.

Conspectus familiarum, generum et specierum.

	Genus	Species
Phalangidæ	8	41
Ischyropsalidæ	1	3
Nemastomidæ	1	10
Trogulidæ	3	4
Summa	13	58

Ordo. ARANEÆ.

Conscripta a Cornelio Chyzer et Ladislao Kulczyński.

A magyarországi pókokról szóló első adatokat Hahn C. W. és Koch K. L. «*Die Arachniden*» (1831—1848) című nagy munkájában találjuk, kik abban 11 magyarországi fajt említenek.

1852-ben dr. Doleschal L. közölte az «*osztrák császárságban*» található pókokat (13.), mely füzetében hat oly fajon kívül, melyeket Hahn és Koch adatai alapján sorol fel, még 26 oly fajt mond magyarországinak, melyeket a bécsi császári-királyi muzeum gyűjteményében talált, és körülbelül 18 fajról azt állítja, hogy mindenütt közönségesek.

Az első búvár, ki a hazai pókokat itthon tanulmányozni kezdte, dr. Böckh György volt, pozsonyi törvényszéki- és gyakorló orvos, s később az ottani főreáliskola tanára; az ő figyelme azonban csak Pozsony vidékének pókjaira terjedt ki. Tanulmányának eredményeként, mely alább idézett értekezésében olvasható (6) 88 fajt sorol fel.

1861-ben Grube A. E. közölt néhány fajt Fiume környékéről (15).

A hatvanas évek elején igen élénk természettudományi mozgalom indult meg az ország erdélyi részeiben, a miáltal a pókfauna is behatóbb figyelemben részesült. Sill Viktor és Herman Ottó vetekednek egymással a pókok tanulmányozásában. Sill egymásután három részletes jegyzéköket közli és e téren való tevékenységét bezáró 1865-ben megjelent általános jegyzékében 77 fajt említ (46).

Köztudomású, hogy Thorell Tamerlán tanárnak következő című munkái «*On European Spiders*» és «*Remarks on Synonyms of European Spiders*» melyek ez időtájban (1869—73.) jelentek meg, mily rendkívül nagy hatással voltak az arachnologiára általában. Ezen munkák teszik a határt a régi és az új póktudomány közt; miért is természetes, hogy a magyar pókfaunára vonatkozó fentebb említett adatokat, melyek a Thorell munkáinak megjelenése előtti időszakra esnek, csakis kellő elővigyázattal szabad használnunk.

Azon időszakban kevés búvár volt képes a tudományt állandó és megbízható adatokkal gazdagítani. Egyike ezeknek Koch Lajos nürnbergi orvos, a nagy-

Mentionem primam Aranearum Hungariæ C. W. Hahn et C. L. Koch fecerunt, qui in opere magno, «*Die Arachniden*» inscripto, undecim species Hungariam incolentes commemorant. (1831—1848).

Anno 1852. Dr. Ludovicus Doleschal in publicum dedit indicem Aranearum Imperii Austriaci (13), quo in opusculo, præter sex species secundum Hahn et Koch enumeratas, viginti sex in Hungaria et Croatia inventas et in Musæo Cæsareo-Regio Vindobonensi conservatas nominavit, circa octodecim species vero ubique communes esse posuit.

Primus investigator, qui studio Aranearum Hungariæ se dedit, Dr. Georgius Böckh fuit, medicus practicus atque forensis Posonii, posterius magister scientiarum naturalium scholae realis ibidem, qui tamen nonnisi Araneas regionis circa Posonium sitæ perscrutabatur. Summam studiorum eius opusculum infra citatum (6) continet, indicem octoginta octo specierum proponens.

Anno 1861. A. E. Grube nonnullas species circa Flavonam (Fiume) collectas nominavit (15).

Decennio septimo huius sæculi summa adhibebatur industria ad res naturales scrutandas præsertim in Transylvania; quo tempore etiam faunæ Aranearum non parum operæ dabatur. Viri præclari V. Sill et O. Herman certabant inter se studio investigandarum Aranearum. Sill tres deinceps in lucem edidit catalogos earum particulares, quos subsecuta est anno 1865. dissertatio ultima, species aranearum 77 continens.

Opera Celeberrimi T. Thorellii, annis 1869—1873 edita, quæ inscribuntur: *On European Spiders* et *Remarks on Synonyms of European Spiders*, maximi fuisse momenti in eis, quæ ad arachnologiam spectant, omnes sciunt. Disiungitur operibus his arachnologia recens et nova ab antiquiore; nec mirum, si eis, quæ tempore superiore scripta sunt de araneis Hungariæ, non sit sine ulla dubitatione confidendum. Perpaucis data tum erat potestas arachnologiæ certis constantibusque incrementis augendæ; unus eorum, vir illustrissimus, Dr. L. Koch Norimbergensis, de litteris arachnologicis optime

nevű arachnologus, ki alkalmilag a magyar fauna érdekében is közreműködött; ugyanis ő határozta meg az Erdélyben dr. Seidlitz György gyűjtötte pókokat, melyeknek jegyzéke 1867-ben jelent meg (42); s a *Drassidák* családjának monographiájában (24), továbbá az *Amaurobius*, *Coelotes* és *Cybaeus* nemekről szóló művében (25) számos magyarországi fajt irt le.

Herman Ottó, ki a pókokkal való foglalkozását az arachnologia régibb időszakában kezdé, e téren való sikeres működését 1879-ben fejezte be.

Erdélyben kezdett tanulmányai arra ösztönözték, hogy az egész ország pókfaunáját átkutassa, mit a királyi magyar Természettudományi Társulat támogatásával, kitartó buzgalommal és nagy sikerrel teljesített is. Három kötetes nagy munkája «*Magyarország pókfaunája*» (21), melyben 328 fajt ir le, alapköve a magyar pókfaunának. Időközben meghatározta több állatbúvárnak pókgyűjteséit is, melyeket azok értekezéseikben közzétettek.

A Herman Ottó nagy művének és «*Araneae Hungariae*» című munkánknak (8) megjelenése közti időszakból több külföldi és belföldi búvárról kell megemlékeznünk, kiknek tanulmányai a magyarországi pókok ismeretét előmozdították.

Simon E., a nagyhírű franczia pókász, húsz ugró pókot sorol fel Orsováról a Keyserling gróf gyűjteményéből, melyek közül nyolcz faj új volt Magyarországra nézve (47).

A belga Becker Léon részint apróbb irataiban (1—3), részint a belga pókokról szóló nagy művében (4) húsznál több, Magyarországra nézve új fajról tesz említést.

A Magyarországot Lengyelországtól elválasztó Magas Tátrát egyikünk kutatta át behatóbban (25—28).

A belföldi állatbúvárok közül dr. Lendl Adolf a *keresztes pókokat* és a *Tetragnatha-féléket* tanulmányozta különösen (32—38) s Damin Narcisz, a buccarii tengerész iskola tanára, főleg a pókok biologiájának tanulmányozására fordította figyelmét (11—12), de gyűjteséivel nagyban elősegítette Tengermellékünk pókfaunájának ismeretét is; dr. Entz Géza tanár pedig az Atypus szervezetét és életmódját fürkészte behatóbban (48).

A mi munkálkodásunk eredményét «*Araneae Hungariae*» című művünk tartalmazza, melylyel a magyar pókfaunát jelentékeny számú új adattal gazdagítottuk és még gazdagítani fogjuk. Azt, a mit elérnünk sikerült, jórészt természettudományi barátainknak köszönhetjük s nem is mulaszthatjuk el, hogy nekik e helyütt is hálás köszönetünket ki ne fejezzük buzgalmukért és készségükért, melylyel gyűjteséiket hazánk különböző vidékeiről velünk meritus, oblata occasione faunam aranearum Hungaricam illustrabat, namque et araneas determinavit a Dr. Seidlitz collectas, quarum index anno 1867 foras emissus est, et complures species Hungaricas quum in tractatu de generibus *Amaurobio*, *Coelota*, *Cybaeo*, tum in excellenti monographia *Drassidarum* descripsit.

Cel. O. Herman investigationes suas, quas tempore veterioris arachnologiæ inchoavit, anno 1879. gloriose absolvit. Studia initio in Transylvania suscepta ad faunam totius Regni Hungariæ investigandam eum impulere; quod et, adiuvante Societate Regia Scientiarum Naturalium Hungarica, operæ laborique non parcens prospere confecit, summamque observationum conclusit in librum egregium, *Magyarország Pók-faunája* inscriptum (21), quo numerus aranearum e Hungaria notarum usque ad 328 auctus est. Tantisper aliis inquisitoribus rerum naturæ succurrebat, araneas ab eis collectas digerens, ut in ipsorum dissertationibus arte tractari possent.

Spatio temporis, quod interfuit editioni operis magni Cel. O. Hermani atque libri nostri, qui «*Araneae Hungariae*» inscribitur, crescebat cognitio faunæ aranearum Hungaricæ quum externorum tum indigenorum industria.

Cel. E. Simon, præclarus ille Galliæ arachnologus, *Attidas* in collectione Comitis Keyserling tractans (47), viginti species circa Orsovam lectas nominavit, quarum, octo superiore tempore in Hungaria inventæ non erant. Scriptor eruditus Belgicus Leo Becker, quum opusculis minoribus (1—3), tum opere magno insignique, descriptiones aranearum in Belgia occurrentium continenti (4), numerum specierum Hungaricarum plus viginti novis auxit.

Partem quandam montium Carpaticorum, quibus Hungaria a Polonia seiungitur, nostrum unus explscatus est (25—28).

In Hungaria Dr. Adolphus Lendl summa cum prudentia præcipue *Epeiridas* et *Tetragnathidas* acutissime indagavit (32—38). Narcissus Damin, magister scholæ nauticæ Buccariensis, studium operamque in aranearum biologiam explorandam collocavit, simulque diligentia accurata in araneis colligendis adhibita multum ad cognoscendam faunam nostram litoralem contulit; (11—12). Dr. Géza Entz vero organisationem vitamque Atyporum exploravit (48).

Nos iam plus quam decem annos in studio arachnidarum Hungariæ versamur. Studiorum nostrorum L. Becker quoque per aliquot annos particeps fuit. Summam laboris nostri liber continet, nondum absolutus, qui «*Araneae Hungariae*» inscribitur; insigne ille incrementum faunæ aranearum

közölni szivesek voltak s ezáltal lehetővé tették, hogy hazánk pókfaunáját annyira fejleszthettük.

Említett munkánk befejező kötetében összes dolgozótársainkról név szerint is meg fogunk emlékezni.

A magyar pókfauna kétségkívül a gazdagabbak és jól átkutatottak közé tartozik. Alább 741 fajt sorolunk fel s munkánk utolsó kötetében még mintegy 50 újat fogunk leírni. Európában, úgylátszik, csak Franciaország faunája gazdagabb ennél, mely, Corsicát bele nem értve, mintegy 1054 fajt mutat fel. A pókcsaládok közül csupán a *Pisauridák* és *Tetragnathinák* alcsaládjában (különösen a «*Nesticus*» genusban) van több faj Magyarországon, mint Franciaországban, néhány más kisebb család egyforma számú fajjal van mindkét országban képviselve. A *Linyphiinákra* nézve Anglia is gazdagabb Magyarországnál, hol mintegy 250 faj található, (Francziaországban 300, Magyarországon 173), de összes ismert pókfajainak száma, mintegy 560, meg sem közelíti a Magyarországiakét; hasonlóan nem közelíti meg a jól átfürkészett Galiczia (502), Tirol (487), Scandinavia (398), Németalföld (391), Cseh- és Morvaország (391) ismert fajaikkal.

Egész Európában körülbelül 1960 jól megkülönböztetett pókfaj található, melyeknek $^3/_8$ része Magyarországon is tenyészik.

Az alább felsorolt fajokból Magyarországon kívül nem találtak idáig 58 fajt; bizonyos azonban, hogy későbbi tanulmányok útján ezek közül többeket másutt is meg fognak találni s a csak itt található fajok száma jelentékenyen apadni fog. A többi 683 fajnak mintegy $^5/_7$ része Közép-Európa lakója, részben a lapályon, részben a hegyeken; mintegy 160 faj déleurópainak és a Földközi-tenger környékén lakónak mondható, 13 faj Kárpátjaink sajátja (u. m.: *Euophrys monticola* Kulcz., *Lycosa albata* L. Koch, *L. sordidata* Thorell — ezt azonban a Sudeteken is megtalálták — *Cryphoeca carpatica* O. Herm.? *Clubiona alpicola* Kulcz., *Micaria hospes* Kulcz., *Xysticus alpicola* Kulcz., *Lephthyphantes varians* Kulcz., *L. arciger* Kulcz., *Bathyphantes torrentum* Kulcz., *Kulczyńskiellum gibbiferum* Kulcz., *Walckenaëra suspecta* Kulcz., *Mecynargus longus* Kulcz.; mintegy 15 faj keleti vagy délkeleti, részben azonban nyugat felé Magyarországon túl is nyúlik (ezek: *Attus Dzieduszyckii* L. Koch, *Yllenus vittatus* Thorell, *Aelurillus gilvus* E. Simon, *Lycosa nebulosa* Thor., *Tarentula Eichwaldii* Thor., *T. Cronebergii* Thor.?, *Trochosa Singoriensis* Laxm., *Tr. infernalis* Motsch., *Trachelas maculatus* Thor., *Synaema ornatum* Thor., *Xysticus marmoratus* Thor., *Enophlognatha cruci-*

nostræ iam attulit et adhuc allaturus est. — Quod assecuti sumus, magna ex parte amicis nostris debemus; facere non possumus, quin eis omnibus hoc loco maximas agamus gratias pro admirabili industria atque liberalitate, quibus commoti in omnibus Regni partibus colligebant et nobiscum communicabant materiam faunæ aranearum Hungaricæ exstruendæ. Tomo ultimo operis nostri supra dicti omnium nostrorum collaboratorum nominatim meminerimus.

Fauna aranearum Regni Hungariæ certo inter opulentas et melius cognitas ponenda est. Quæ infra nominantur species, numerum 741 explent, in volumine tertio operis nostri, quod Araneæ Hungariæ inscribitur, circiter 50 aliæ describentur. Inter Europæ terras Gallia sola Hungariæ antecellere videtur numero aranearum notarum, quarum 1054 possidet saltem (Corsica excepta). *Pisauridarum* familia et subfamilia *Tetragnathinarum* (præsertim genus: *Nesticus)* solæ locupletiores sunt in Hungaria quam in Gallia, paucæ familiæ aliæ, parvæ quidem, numero specierum æquales in hac et in illa. Copia *Linyphiinarum* Hungariam etiam Britannia superat, ut quæ earum circiter 250 species alit (Gallia circiter 300, Hungaria 173); ad summam omnium aranearum (ca. 560) tamen Britannia non parum inferior est, ut etiam ex. gr. Galicia (502), Tirolia (487), Scandinavia (398), Hollandia (391), Bohemia cum Moravia (391).

Europam totam circiter 1960 sufficienter notæ species inhabitare nobis videntur; earum fere $^3/_8$ etiam in Hungaria vivunt.

E speciebus, quæ hac enumeratione continentur, extra fines Regni Hungariæ ad hoc tempus inventæ non sunt 58; earum tamen nonnisi partem quandam parvam re vera finibus his terminari, investigationes arachnologicæ ulteriores certo docebunt. Specierum, quæ restant 683, circiter $^5/_7$ incolæ sunt Europæ mediæ, modo eius planities, modo montes inhabitantes; circiter 160 mediterraneæ et meridionali-europeæ sunt species, 13 fortasse montibus Carpaticis propriæ *(Euophrys monticola* Kulcz., *Lycosa albata* L. Koch, *L. sordidata* Thor. — quæ tamen etiam in Sudetis occurrit, — *Cryphoeca carpatica* O. Herm., *Clubiona alpicola* Kulcz., *Micaria hospes* Kulcz., *Xysticus alpicola* Kulcz., *Lephthyphantes varians* Kulcz., *L. arciger* Kulcz., *Bathyphantes torrentum* Kulcz., *Kulczyńskiellum gibbiferum* Kulcz., *Walckenaëra suspecta* Kulcz., *Mecynargus longus* Kulcz.), circiter 15 species præcipue orientem, aut etiam meridiem incolunt, pro parte tamen occidentem versus ultra Hungariam plus minusve procedunt

fera Thor., *Scotophaeus loricatus* L. Koch, *Prosthesima Caucasia* L. Koch, *Dysdera longirostris* Dobl.), végül egy faj (*Tarentula pinetorum* Thor.) északi, mely néhol Közép-Európának hegyein is előfordul.

A mi nyolcz régiónk közül, melyre az ország e műben fel van osztva, a VIII-dik, vagyis az ádriai, a földközi-tengeri zoogeografiai altájhoz tartozik s nagyon elüt a többi tájtól. Ebben 65 oly faj található, melyeket a többi tájakon hiába keresünk s legfeljebb egyesek hatolnak be a szomszéd VII-ik horvát-szlavon tájba. Mindezen fajok déliek, a *Lycosa cursoria* C. L. Koch kivételével, mely, hegyi faj lévén, úgy látszik, az Alpesekből szállt ide le, valamint az *Attus alpicola* Kulcz. is, melyet idáig csak a horvát-szlavon táj hegyein találtunk.

Nem található az adriai tájban mintegy 80 oly faj, mely a többi hét tájban többé-kevésbbé közönséges, a mit részben az állóvizek hiányának tulajdoníthatni.

Déli fajokban való gazdagságára nézve második a bánsági táj, mely e tekintetben a horvát-szlavon tájat jelentékenyen felülmúja. Úgy látszik, hogy a következő déli fajok: *Cyrba algerina* Luc. *Micaria Lucasii* Thor. *Monaeses caudicula* E. Sim. *Diplocephalus crassiloba* E. Sim. valamint a *Trochosa Singoriensis* Laxm. másutt nem fordulnak elő.

Az adriai tájban többé-kevésbbé gyakori következő fajok: *Epiblemum mutabile* Luc., *Menemerus semilimbatus* Hahn, *Phlegra Bresnieri* Luc., *Tarentula albofasciata* Brullé, *Philodromus glaucinus* E. Sim.?, *Chiracanthium Mildei* L. Koch, *Ch. pelasgicum* C. L. Koch, *Dipoena convexa* Blackw., *Prosthesima oblonga* C. L. Koch, *Aphantaulax cinctus* L. Koch, melyeket a horvát-szlavon tájban idáig nem találtunk, itt ismét fellelhetők.

Megemlítendőnek tartjuk, hogy némely déli faj Magyarországon nagyonis szélesen van elterjedve s hogy sokkal jobban nyúlik fél észak felé, mint Európa többi országaiban, vagy legalább nem kevésbbé, mint Franciaországban. Ilyenek például a következő fajok: *Heliophanus simplex* E. Sim., *H. Kochii* E. Sim., *Attus penicillatus* E. Sim., *Maevia Castriesiana* Grube, *Tarentula radiata* Latr., *Zora pardalis* E. Sim., *Thanatus vulgaris* E. Sim., *Epeira grossa* C. L. Koch., *Micryphantes retroversus* O. Cambr., *Mimetus laevigatus* Keys., melyek mindannyian az észak-keleti tájban is találhatók.

A szerint, hogy tájaink közül melyik mutat fel sajátos, más tájakban eddig nem talált fajokat, a tájak sorrendje a következő: VIII. az ádriai 65 fajjal, IV. az északkeleti 39, III. az észak-nyugati 31, I. (*Attus Dzieduszyckii* L. Koch, *Yllenus vittatus* Thor., *Aelurillus gilvus* E. Sim., *Lycosa nebulosa* Thor., *Tarentula Eichwaldii* Thor., *T. Croneberyii* Thor.?, *Trochosa Singoriensis* Laxm., *Tr. infernalis* Motsch., *Trachelas maculatus* Thor., *Synaema ornatum* Thor., *Xysticus marmoratus* Thor., *Enoplognatha crucifera* Thor., *Scotophaeus loricatus* L. Koch, *Prosthesima Caucasia* L. Koch, *Dysdera longirostris* Dobl.), una (?) denique species est septemtrionalis etiam in montibus Europæ mediæ passim occurrens (*Tarentula pinetorum* Thor.).

E regionibus nostris Regni Hungariæ octava: «Adriatica», ad subregionem zoogeographicam Mediterraneam pertinens, non parum differt a reliquis omnibus: 65 alit species, quæ modo desunt in regionibus ceteris, modo fines regionis vicinæ (Croaticæ) solius, parum quidem, transgrediuntur. Meridionales sunt hæ species omnes, excepta una: *Lycosa cursoria* C. L. Koch; haec species montana ex Alpibus huc advenisse videtur, ut etiam *Attus alpicola* Kulcz., apud nos ad hoc tempus nonnisi in montibus regionis Croaticæ inventus. Desunt rursus in regione Adriatica 80 species ceteris omnibus aut plerisque saltem communes, quod non nisi ex parva quadam parte inopiæ aquarum stagnantium in illa tribuendum videtur.

Secundo loco regio Banatica crebritate specierum meridionalium excellet et regionem Croaticam non parum superat; extra eam apud nos *Cyrba algerina* Luc., *Micaria Lucasii* Thor., *Monaeses caudicula* E. Sim., *Diplocephalus crassiloba* E. Sim. — ut etiam *Trochosa Singoriensis* Laxm. — non occurrere videntur; *Epiblemum mutabile* Luc., *Menemerus semilimbatus* Hahn, *Phlegra Bresnieri* Luc., *Tarentula albofasciata* Brullé, *Philodromus glaucinus* E. Sim.?, *Chiracanthium Mildei* L. Koch, *Ch. pelasgicum* C. L. Koch, *Dipoena convexa* Blackw., *Prosthesima oblonga* C. L. Koch, *Aphantaulax cinctus* L. Koch, in regione Adriatica plus minusve frequenter occurrentia, hic iterum comparent, in regione Croatica autem frustra ad hoc tempus indagabantur.

Commemorandum nobis videtur, species meridionales nonnullas in Hungaria adeo diffusas esse, ut hic septemtrionem versus longius quam in Europæ terris aliis, aut non minus saltem quam in Gallia, procedant, ex. gr. *Heliophanus simplex* E. Sim., *H. Kochii* E. Sim., *Attus penicillatus* E. Sim., *Maevia castriesiana* Grube, *Tarentula radiata* Latr., *Zora pardalis* E. Sim., *Thanatus vulgaris* E. Sim., *Epeira grossa* C. L. Koch, *Micryphantes retroversus* O. Cambr., *Mimetus laevigatus* Keys.;

a központi 24, VI. a bánáti 20, V. az erdélyi, illetőleg keleti 14, VII. a horvát-szlavon 7, s végül II. a nyugati táj 5 fajjal. Ha azonban valamennyi táj egyaránt át volna kutatva, akkor a harmadik táj bizonyosan fölülmúlná a negyediket, mert IV. tájunk fajai többnyire olyanok, melyek Magyarország határain túl is nagyon el vannak terjedve, holott III. tájunkban a Magas Tátrával több havasi faj rejtőzik, melyek az Alpesek s a Tátra csúcsainak lakói, de a Kárpátok alacsonyabb hegyeire le nem szállnak s részben egészen a Magas Tátrának sajátjai.

Az V. vagyis keleti tájból sokkal kevesebb sajátos faj került idáig, mint a hogy remélni lehetett volna. Csakis keleti fajaink: a *Salticus Simonis* O. Herm.? *Nesticus Hungaricus* Chyz., *N. puteorum* Kulcz., *Troxochrota scabra* Kulcz. Feltűnő e tájban, hogy hiányzik belőle több oly faj, mely valamennyi, vagy a legtöbb többi tájban el van terjedve. Csakis ezen ezen tájban nem találtuk eddig a következő fajokat: *Leptorchestes berolinensis* C. L. Koch. *Euophrys confusa* Kulcz. *Tarentula radiata* Latr. *Clubiona brevipes* Blackw. *Lephthyphantes flavipes* Blackw. *Erigone vagans* Sav. Hiányzanak továbbá az V-ik és a kevésbbé átkutatott III. tájban: *Heriaeus hirsutus* Walck. *Philodromus rufus* Walck. *Prosthesima accepta* O. Herm. *Pr. Hermani* Chyz. *Aphantaulax Albini* Sav. *Scytodes thoracica* Latr. — Oly fajok, melyek az V. és VIII-ik s részben a VI. tájban sem találtattak, a *Drapetisca socialis* Sund. *Gongylidium rufipes* L. — *Entelecara acuminata* Wid. és az V. s VII-ik tájból hiányzik: az *Uloborus Walckenaëri* Latr. — Nincs kétség azonban, hogy későbbi buvároknak sikerülni fog az említett hiányzó fajok egy részét ezen a vidéken is feltalálhatni.

Bár bizonyos megelégedéssel tekintünk vissza azon munkásságunkra, mit a magyarországi pókfaunának megismertetése érdekében kifejtettünk, s dicsekedhetünk is az elért eredménynyel, mindazonáltal jól tudjuk, hogy a mű még nincs befejezve.

Magyarországnak — néhány vidékét nem tekintve — a legtöbb és a legkülönbözőbb vidékein tett kutatásokkal pókfaunánk általában jobban át van fürkészve, mint az Osztrák-Magyar birodalom Lajthán túli fele tartományainak faunája, hol csupán Tirol és Galicia van részben és Csehország középszerűen átkutatva.

Hátra van még nem kis számú vidék, mely alig van tanulmányozva, vagy majdnem teljesen figyelmen kívül hagyva s mely vidékeknek átkutatása, főleg a mennyiben hegységen terülnek, nem csekély fontosságú volna.

Különösen a *Lyniphiinák* alcsaládja az, melynek quæ species omnes etiam in regione septemtrionali-orientali inveniuntur.

Regiones nostræ, ad numerum aranearum non nisi in una earum ad hoc tempus inventarum, ita se excipiunt: VIII. Adriatica (65 species), IV. septemtrionali-orientalis (39), III. septemtrionali-occidentalis (31), I. centralis (24), VI. Banatica (20), V. Transsilvanica (14), VII. Croatica (7), II. Pannonica (5). Si omnes pariter perquisitæ essent, certo regio III-a IV-am insigniter superaret; species enim regioni IV-æ peculiares pleræque ex numero aranearum sunt longe ultra fines Regni Hungariæ diffusarum, regio III-a contra, summos nostros montes continens, species nonnullas alit alpinas, partim Alpibus et montibus Tatricis — non tamen Carpatis humilioribus — communes, partim montibus Tatricis proprias.

Regio V. Transylvanica, contra exspectationem, perpaucas ad hoc tempus suppeditavit species peculiares (*Salticus Simonii* O. Herm?, *Nesticus Hungaricus* Chyz., *N. puteorum* Kulcz., *Troxochrota scabra* Kulcz.); notabilis ea est defectu aranearum nonnullarum per regiones reliquas omnes aut plerasque saltem diffusarum (desunt in regione V-a sola: *Leptorchestes berolinensis* C. L. Koch. *Euophrys confusa* Kulcz., *Tarentula radiata* Latr., *Clubiona brevipes* Blackw., *Lephthyphantes flavipes* Blackw., *Erigone vagans* Sav.; desunt modo in regione V-a et III-a, quæ minus diligenter explorata est: *Heriaeus hirsutus* Walck., *Philodromus rufus* Walck., *Prosthesima accepta* O. Herm., *Pr. Hermani* Chyz., *Aphantaulax Albini* Sav., *Scytodes thoracica* Latr., in regione V-a et VIII-a aut etiam in VI-a: *Drapetisca socialis* Sund., *Gongylidium rufipes* L., *Entelecara acuminata* Wid.; in regione V-a et VII: *Uloborus Walckenaëri* Latr.); dubitari tamen non potest, quin investigationes ulteriores in regione Transylvanica partem saltem quandam harum aranearum detecturæ sint.

Quamquam nunc non sine satisfactione quadam contemplamur, quæ opera in araneis Regni Hungariæ cognoscendis consumpta sit, qualemque fructum tulerit, non fugit nos tamen, rem longe non esse absolutam.

Per investigationes, pro parte leves quidem, sed locis susceptas permultis eisque in toto fere Regno dispersis, explorata est fauna aranearum nostra in universum melius, quam ex. gr. fauna alterius partis Austro-Hungariæ, ubi Tirolia et Galicia solæ affatim, Bohemia mediocriter perscrutatæ sunt; restant tamen tractus non pauci vix leviter attacti aut omnino neglecti, quorum exploratio accurata, præser-

ismeretét a későbbi kutatók leginkább fogják majd gyarapíthatni, a mennyiben már most is a régi «*Erigone*» nem számos magyarországi nősténynek birtokában vagyunk, melyeket hímek hiányában meghatároznunk nem sikerült.

Áttérünk most Magyarország pókjainak és azon termőhelyeiknek felsorolására, a hol magunk gyűjtöttünk; közben felsoroljuk azon fajokat és termőhelyeket is, melyekről más irók műveiből szereztünk tudomást, kikre azonban névleg csak oly termőhelyeknél hivatkozunk, a honnan saját magunknak példányaink nincsenek, vagy a melyeket nem láttunk.

Figyelmen kívül hagyjuk azonban a Boeckh művében felsoroltakat, a mennyiben azok nagyon is kétesek.*

* Lásd Herman Ottó Magyarország pókfaunája III. kötet, 335. lap.

tim quatenus in montibus iacent, non parvi esset momenti.

Subfamilia *Linyphiinarum* ea est, cui investigationes ulteriores maximum incrementum allaturæ videntur, quum etiam nunc complures decades feminarum Hungaricarum veteris generis «*Erigone*» possideamus, quarum nomina expiscari nobis non contigit.

Sequitur litteratura et dein enumeratio aranearum Regni Hungariæ eorumque locorum secundum nostras collectiones, cui intexuimus species et locos ab aliis traditos auctoribus, quos testes nominamus solum apud eos locos, unde ipsi exempla non vidimus. Omisimus ea, quæ Boeckhii opusculum (6) habet; hæc enim nimis dubia videntur.*

* Cfr. O. Herman, Magyarország pókfaunája. Vol. III. pag. 335.

LITTERATURA.

1. Becker Léon, Aranéides recueillies en Hongrie par M. de Horváth. Comptes-rendus de la Société Entomologique de Belgique. Bruxelles, 1878.
2. — Aranéides de Russie recueillies a Jaroslaw (Russie centrale) par M. Kokouyew. Comptes-rendus de la Société Entomologique de Belgique. Bruxelles, 1879.
3. — Communications arachnologiques par Léon Becker. Arachnides de Hongrie recueillies par M. de Horváth. Comptes-rendus de la Société Entomologique de Belgique. Bruxelles, 1880.
4. — Les Arachnides de Belgique. I. partie avec un Atlas de 27. planches in folio. Annales du Musée Royal d'Histoire naturelle de Belgique. Tome X. Bruxelles, 1882.
5. Biró Lajos, Magyarországi mérges pókok. Természettudományi Közlöny 304. füz. Budapest, 1895.
6. Böckh Georg Dr., Ueber die Spinnen der Umgebung Pressburgs. Verhandlungen des Vereins für Naturkunde zu Pressburg. II. Jahrgang. 1857.
7. — (et Frauenfeld), Ueber unterirdisch lebende Spinnen und Fische. Ibidem.
8. Chyzer Cornelius et Kulczyński Ladislaus, Araneae Hungariae secundum collectiones a Leone Becker pro parte perscrutatas conscriptæ a Cornelio Chyzer et Ladislao Kulczyński. Budapestini. Tomus I. 1892. Tomi II-di pars prior 1894.
9. Chyzer Cornelius Dr., Ueber eine neue Spinnenfauna Ungarns. Mathematische und naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn. Band X. Berlin und Budapest, 1892.
10. — Magyarország új pókfaunájáról. Mathematikai és természettudományi Értesítő. Kiadja a M. T. Akadémia. X. kötet, 5. füzet. Budapest, 1892.
11. Damin Narciss, O pauku: Uloborus Walckenaërii Latr. Glasnik Hrvatskoga Naravoslovnoga družtva VI. godina. Zagreb, 1891.
12. — Ueber Parthenogenesis bei Spinnen. Verhandlungen der k. k. zoolog.-botan. Gesellschaft in Wien. XLIII. Band. 1893.
13. Doleschal Ludwig, Systematisches Verzeichniss der im Kaiserthum Oesterreich vorkommenden Spinnen (Sitzungsberichte der k. Akademie der Wissenschaften in Wien). Math.-naturwiss. Classe. Bd. IX. Pag. 622—651. 1852.
— Entz Géza (lásd — vide 48).
14. Frivaldszky János, Adatok Temes és Krassó megyék faunájához. Mathematikai és természettudományi közlemények. XIII. kötet. 1876.
15. Grube Ad. Ed. Dr., Ein Ausflug nach Triest und dem Quarnero. Berlin, 1861.
16. Hahn Carl W., Die Arachniden, getreu nach der Natur abgebildet und beschrieben. Nürnberg (I. und II. Bd. 1831—34; fortgesetzt von C. L. Koch. Bd. III—XVI. 1836—1848.)
17. Herman Ottó, Adatok Erdély pókfaunájához. Erdélyi muzeum-egylet évkönyvei. III. kötet. Kolozsvárt, 1864—65.
18. — Adatok Erdély pókfaunájához. II. ibid. IV. kötet. 1866—68.
19. — A mezőség. II. ibid. VI. kötet. 1870.
20. — Beitrag zur Kenntniss der Arachnidenfauna Siebenbürgens. (Verhandlungen und Mittheilungen des siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaft in Hermannstadt. Jahrgang XXI.) 1870.
21. — Magyarország pókfaunája. (Ungarns Spinnenfauna.) Irta a k. m. természettudományi társulat megbizásából. Három kötet 10 könyomatú táblával. Budapest, 1876—79.
22. Kempelen Ludwig von, Thysa pythonissaeformis. Eine neue Gattung und Art. Verhandlungen der k. k. zoolog.-botan. Gesellschaft in Wien. XVII. Band. 1867.
23. Koch Karl Ludwig, Die Arachniden getreu nach der Natur abgebildet und beschrieben. Sechzehn Bände mit 563 color. Kupfertafeln. (I. und II. Bd. von dr. C. W. Hahn.) Nürnberg. 1836—1848.
24. Koch Ludwig Dr., Die Arachniden-Familie der Drassiden. Nürnberg, 1866—67.
25. — Die Arachnidengattungen Amaurobius, Coelotes und Cybaeus. Abhandlungen der naturhistorischen Gesellschaft zu Nürnberg. IV. Band. 1868.
26. Kulczyński Władysław, Wykaz pajaków z Tatr, Babiej góry i Karpat szlazkich z uwzglednieniem pionowegj. rozsiedlenia pajaków zyjacych w Galicyi zachodnieo Sprawozdanie Komisyi fizjograficznej Akademii Umiejetnosci w Krakowie. XV. 1881.
27. — Araneae novae in montibus Tatricis, Babia Gora, Carpatis Silesiae collectae descriptae. (Osobne odbicie z Pamietnika Akademii umiejetnosci. Wydz. matem.-przyr., tom VIII. Krakow, 1882.)

28. Kulczyński Ladislaus, Spinnen aus der Tatra und den westlichen Beskiden. Krakau, 1882.
29. — Conspectus Attoidarum Galiciae. Rozprawy i Sprawozdania Wydziały matem.-przyrodn. Akedem-Umiej. XII. 1884.
30. — Ueber die Theridioiden der Spinnenfauna Ungarns. Mathematische und naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn. XII. Bd. Berlin u. Budapest, 1895.
31. Kulczyński Ulászló, A magyarországi Theridioida pókokról. Természetrajzi füzetek. XVIII. kötet. 3—4. füzet. Budapest, 1895.
32. Lendl Adolf, A magyarországi Tetragnatha-félékről. Mathematikai és természettudományi közlemények. Kiadja a Magyar tudományos Akadémia. Budapest, 1886. XXII. kötet. III. szám.
33. — Adatok az Argyope Brünnichii (Scop.) életmódjának ismeretéhez. Budapest, 1887.
34. — A Trochosa infernalis (Motsch.) párzásáról és párzási szerveiről. — Ueber die Begattung und die Copulationsorgane von Trochosa infernalis Motsch. Természetrajzi füzetek. Vol. XI. 1887—88.
35. — A pókok, különösen a kerekhálós pókok (Epeiridae) természetes osztályozásának kisérlete. (A magyarországi kerekhálós pókok rendszeres felsorolása.) Értekezések a természettudományok köréből. XVIII. k. II. szám. 1888.
36. — Három magyarországi kevéssé ismert pókfajnak leirása. — Descriptiones Araneidarum trium minus cognitarum. Természetrajzi füzetek. Vol. XIII. P. I. 1890.
37. — Tanulmány az Epeira cucurbitina Cl. E. alpica L. K. és E. inconspicua E. S. nevü fajokról. Adatok az újabbirányú descendentia elmélethez. Mathematikai és természettudományi közlemények. XXIV. 1891.
38. — A pókokról és hálóikról. Pótfüzetek a Természettudományi közlönyhöz. XIII. pótfüzet. 1893. januárius.
39. Mocsáry Sándor, Adatok Biharmegye faunájához. Mathematikai és természettudományi közlemények. X. kötet. 1872.
40. — Adatok Zemplén és Ung megyék faunájához. Mathematikai és természettudományi közlemények. Kiadja a M. T. Akadémia. XIII. kötet. 1877.
41. Munk Manó, A Herkules-fürdő és környéke, természettudományi, orvosi, fürdészeti, történelmi és statistikai tekintetben. Az állattani részt irta Frivaldszky János. Pest, 1872.
42. Seidlitz G., Arachniden aus Siebenbürgen, gesammelt im Sommer 1864 von Dr. Seidlitz G., bestimmt von Dr. L. Koch in Nürnberg. Verhandlungen und Mittheilungen des naturwissenschaftlichen Vereins in Hermannstadt. Jahrgang XVIII. 1867.
43. Sill Viktor, Beitrag zur Kenntniss der Crustaceen, Arachniden und Myriapoden Siebenbürgens. Verhandl. und Mittheil. des siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften in Hermannstadt. Jahrg. XII. Nr. I. 1861.
44. — Zweiter Beitrag zur Kenntniss der Crustaceen und Arachniden Siebenbürgens. Ibidem Nr. 11, 12. 1861.
45. — Dritter Beitrag zur Kenntniss der Crustaceen und Arachniden Siebenbürgens. Ibidem Jahrgang XIII. 1862.
46. — Systematisches Verzeichniss der bisher bekannten Arachden Siebenbürgens. Verhandl. und Mittheil. des siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaft. Hermannstadt. 16. Jhg. 1865.
47. Simon Eugène, Liste des espèces européennes et algériennes de la famille des Attidae composant la collection de M. le comte de Keyserling. (Annales de la Société Entomologique de France.) Paris, 1878.
48. Entz Géza dr., Adatok egy hazai csőzőpók pontosabb ismeretéhez. Három táblával. Rovartani Lapok. 1885. évf. II. köt.

Fam. AVICULARIIDÆ.

Nemesia Savigny.

1. *Sauvagesii* Dorth. — I. Budapest.
2. *pannonica* O. Herm. — VII. Zimony.

Fam. ATYPIDÆ.

Atypus Latreille.

1. *muralis* Bertk. — (? *Sulzeri* O. Herm. [19] ? *piceus* O. Herm. [21]). V. Kolozsvár (Házsongárd), Szucsák, Nagy-Baczon, ? Mező-Záh (19).
2. *piceus* Sulz. (*Sulzeri* Latr. — V. Kolozsvár (?), ? Hammersdorf = Sz. Erzsébet (43)
3. *affinis* Eichw. — I. Budapest (Mária-Remete, Hidegkút) ? II. Sopron.
4. *anachoreta* L. Koch (?), var. *castanea* Ausser. VIII. Fiume.*

Fam. ULOBORIDÆ.

Uloborus Latreille.

1. *Walckenaëri* Latr. — I. Budapest, Rákospalota (21), Kecskemét, Monor. II. Pécs, Simontornya, Felcsuth. III. Zavadka. IV. Monok, Körtvélyes. VI. Báziás, Grebenácz, Orsova (21). VIII. Buccari, St. Jelena, Crkvenica, Zengg, Novi.

Hyptiotes Walckenaër.

2. *paradoxus* C. L. Koch. — I. Vacs, Püspökfürdő. II. Kám. III. Vág-Tepla. IV. S.-A.-Ujhely, Szinna, Munkács, Bártfa. V. Sárpatak (21), Szász-Veszős (21). VI. Buziás, Rékás, Orsova. VII. Diakovár, Plitvica, Mrzla vodica. VIII. frequens.

Fam. ZOROPSIDÆ.

Zoropsis E. Simon.

1. *ocreata* C. L. Koch. — VIII. Martinšćica, Crkvenica.

Fam. DICTYNIDÆ.

Amaurobius C. L. Koch.

1. *claustrarius* Hahn. — I—V. frequens.
2. *ferox* Walck. — I—VII, frequens.
3. *fenestralis* Stroem (*atrox* de Geer). — I—VII. frequens (? VIII. Fiume [15]).

* A. Ausserer, Beiträge zur Kenntniss der Arachniden-Familie der Territelariæ Thor. (Mygalidae Autor.) Verhandl. d. k. k. Zoolog.-botan. Gesellsch. in Wien. XXI. 1871.

4. *obustus* L. Koch. — VII. Risnjak (in altitudine 1000—1500 metr.) VIII. Kriviput.
5. *pallidus* L. Koch. — IV. S.-A.-Ujhely, Szőllőske. VI. Zlaticza, Mehadia (24, 21), Herkulesfürdő, Orsova (21), ad antrum Veterani, Ogradena (21), Buziás (21).
6. *Erberi* Keys. — I. Budapest (21). IV. S.-A.-Ujhely. VII. Plitvica. VIII. Fiume, Draga-Gornja, Sušak, Buccari, Francikovac.

Titanoeca Thorell.

7. *quadriguttata* Hahn. (*Theridium quadriguttatum Sill ?, Th. obscurum* O. Herm. [20] ?) — I—VI. frequens.
8. *Schineri* L. Koch. — I—IV. frequens.
9. *tristis* L. Koch. — VIII. frequens.
10. *Veteranica* O. Herm. — I. Budapest. II. Almádi. IV. Tokaj, Szerencs. VI. Pádé, Jazova, Jeselnicza (21) et ad antrum Veterani (21).

Protadia E. Sim.

11. *subnigra* O. Cambr. ? (*Lathys puta* Chyz. et Kulcz.) — IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj.

Lathys E. Simon.

12. *humilis* Blackw. — III. Vág-Tepla. IV. S.-A.-Ujhely, B.-Szögh, Homonna, Körtvélyes. VIII. Fiume, Buccari, Crkvenica.
13. *heterophthalma* Kulcz. — VIII. Buccari.

Dictyna Sundevall.

14. *Szabói* Chyz. — I. Kecskemét.
15. *civica* Lucas. — VIII. Buccari, Draga-Gornja, Portoré, Zengg.
16. *vicina* E. Sim. — II. Felcsuth, Almádi. IV. Tokaj (21). VII. Diakovár. VIII. Tersato, Buccari.
17. *uncinata* Thor. — I—VII. frequentissima.
18. *arundinacea* Linn. (*benigna* Walck.) — I—VII. frequens.
19. *pusilla* Thor. — I. Kalocsa. III. Tátra. IV. Bártfa, Pietroz. V. Tasnád, Borszék.
20. *latens* Fabr. — I. Biharmegye (39), II. Pécs. V. Transylvania (42). VII. Plitvica. VIII. Orehovica, Buccari.
21. *flavescens* Walck. (*variabilis* C. L. Koch.) — I—VI. frequens.
22. *viridissima* Walck. — In omnibus regionibus frequens.

Argenna Thorell.

23. *minima* Kulcz. — IV. S.-A.-Ujhely, Szerencs.
24. *Lendlii* Kulcz. — I. Kecskemét. II. Felcsuth, Almádi.

Fam. ERESIDÆ.

Eresus Walckenaër.

1. *niger* Petagna *(cinnabarinus* Oliv., *quatuorguttatus* Hahn, ? *illustris* C. L. Koch, *rufica-pillus* C. L. Koch?, O. Herm.). I. Budapest (21) Kis-Tétény. II. Pilis-Maróth, Várpalota, Ozora, Pécs, Villány, Almádi. III. Selmeczbánya (21). Léva. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj, Szerencs, Kapivár. V. Kolozsvár (21), M.-Záh (19), Szamosujvár. VI. Báziás (14), Pádé, Jazova, Herkulesfürdő (41), Orsova (21). VII. Velebit. VIII. Fiume, Buccari, Crkvenica.

(fulvus Rossi. — VII. Syrmia [13], fortasse lapsus pro «Syria»; cfr. Rossi Neue Arten von Arachniden des k. k. Museums).

Fam. FILISTATIDÆ.

Filistata Latreille.

1. *insidiatrix* Forsk. — VII. Plitvica. VIII. Carlopago, Zengg.
2. *nana* E. Sim. — VII. Plitvica. VIII. frequens.

Fam. SICARIIDÆ.

Scytodes Latreille.

1. *thoracica* Latr. — I. Budapest (21), Szarvas (21), Baja (21), Kalocsa, Békés. II. Pécs. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj. VI. Temesvár, Rékás, Baja, VII. Zimony (21), Jasenak, Eszék. VIII. frequens.

Fam. DYSDERIDÆ.

Dysdera Latreille.

1. *longirostris* Dobl. *(D. longitarsis* O. Herm.) — IV. S.-A.-Ujhely. VI. Oravicza, Orsova (21), Herkulesfürdő (21), VII. Diakovár.
2. *Westringii* (?) Cambr. — I. Budapest (21). III., IV., V. sat frequens. VI. Rékás. VII. Eszék.
3. *crocota* (?) C. L. Koch. — VIII. Zengg.
4. *Cambridgei* Thorell. *(erythrina* C. L. Koch). — I. Alsó-Hámor (21), Nagyvárad (21), IV. Ungvár (21), S.-A.-Ujhely. V. Nagy-Szeben (44), VI. Báziás (21), Orsova (21).
5. *Ninnii* Can. et Pav. — IV. S.-A.-Ujhely, Beregzász, Gáboltó, Paszika. V. Zilah, Nagy-Szeben. VI. Herkulesfürdő (21). VII—VIII. frequens.

Harpactes Templeton.

6. *rubicundus* C. L. Koch. *(Dysdera erythrina* O. Herm. 19?, Mocs. 39?) — I—VI. frequens. (? VIII. Fiume) (15).
7. *Hombergii* Scop. — I. Mátra (Kékes). II. Várpalota, felső-gallai barlang. IV. S.-A.-Ujhely, Szőllőske, Velejte (in nido Lasii fuliginosi), Szinnaikő. V. ad antrum Pestere, Sztana. VI. Herkulesfürdő, Drenkova.
8. *saevus* O. Herm. — VI. Szászkabánya, Drenkova, Herkulesfürdő, Orsova (Allion), Ogradena (21).
9. *lepidus* C. L. Koch. — VII. Brusanje, Mrzla vodica.

Segestria Latreille.

10. *florentina* Rossi *(perfida* Walck.) — VIII. Fiume, Buccari, Novi, Zengg.
11. *bavarica* C. L. Koch. — II. Sopron. V. Kolozsvár. VIII. Buccari, Martinšćica (?). Zengg (?).
12. *senoculata* Linn. — I—VII. frequens.
13. *croatica* Dolesch. — VIII. Buccari, Martinšćica.

Fam. DRASSIDÆ.

Drassodes Westring.

1. *lapidicola* Wk. — I—VIII. communis.
2. *pubescens* Thor. — I. Vlegyásza (21). III. Alpes Chocs, Krivan. IV. S.-A.-Ujhely V. Brassó. VI. Oravicza.
3. *cognatus* Westr. — V. Görgény-Sz.-Imre (? ♂).
4. *silvestris* Bl. — IV. S.-A.-Ujhely, Beregszász. V. Kolozsvár, Torda, Nagy-Szeben, Hátszeg.
5. *troglodytes* C. L. Koch. — I. Budapest, Kalocsa, Kecskemét. III. Kriván, Léva, Budatin. IV. sat frequens. V. Szamosujvár, vallis Lotriora, Kolozsvár (21).
6. *umbratilis* L. Koch. — I. Alsó-Hámor (21). IV. S.-A.-Ujhely, Szerencs. VI. Orsova (21).
7. *minusculus* L. Koch. — II. Almádi. IV. Szerencs, Kassa (1). VI. Jazova, Orsova (21). VIII. Fiume, Zengg.
8. *microps* Menge. — IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj, Vinna.

(murinus Hahn. — V. N.-Szeben [45]).

(sericeus C. L. Koch. — V. N.-Szeben [45]).

Leptodrassus E. Simon.

9. *femineus* E. Sim. — VIII. Crkvenica.

Echemus E. Simon.

10. *Rhenanus* Bertk. ? *(Drassus angustifrons* O. Herm.?) — I. Budapest (Svábhegy), Alsó-Hámor (21). II. Várpalota (loco «Burok» silvæ Bakony). VI. Orsova.

Phoecocedus E. Simon.

11. *braccatus* L. Koch. — IV. Szinnaikő ♂ VIII. Fiume, ♀ Zengg.

Scotophaeus E. Simon.

12. *quadripunctatus* L. (*Drassus rubens* O. Herm.?) — I. Kecskemét, Alsó-Hámor (21). II. pluribus locis. III. Felfalu, Léva. IV. Ungvár. V. Kolozsvár, Bethlen, Hátszeg. VI. Doroszló. VII. Jasenak.

13. *scutulatus* L. Koch. (*Drassus cinereus* O. Herm. [19.]?) — I—VI. frequens. VIII. Zengg.

14. *loricatus* L. Koch. — II. Felsuth, Hédervár. III. Szenicz, Selmeczbánya (21), Léva. 5. Kolozsvár, Urik. VI. Doroszló (21).

(*viator* L. Koch. — IV. Forró [1].)

(*rubens* Walck. — IV. Ungvár [40.] VI. Doroszló [21]).

Poecilochroa Westring.

15. *variana* C. L. Koch. — I. Pecze-Sz.-Márton. II. Pécs. IV. Tolcsva.

16. *conspicua* L. Koch. — I. Hadház, Püspökfürdő, Mátra (Saskő). II. Kőszeg (21). IV. Széphalom. VI. Mehádia (21). Orsova (24).

Prosthesima L. Koch.

17. *pedestris* C. L. Koch. — I—II., IV—VIII. non rara.

18. *pusilla* C. L. Koch. (*P. nigrita* F.) — I. Esztergom. II. Pécs (21). IV. S.-A.-Ujhely, Szomotor, Körtvélyes. V. Szamosujvár, Torjai büdös. VI. Orsova (23). VII. Diakovár.

19. *pumila* C. L. Koch. — II. Almádi. IV. S.-A.-Ujhely. VI. Orsova (Allion). VIII. Crkvenica.

20. *accepta* O. Herm. (*P. calceolata* O. Herm.) — I. Budapest (Hárshegy). II. Almádi, Sopron. IV. S.-A.-Ujhely, Szerencs, Torna (? iuv.) VI. Uj-Moldova, Herkulesfürdő, Orsova (21). VII. Diakovár. VIII. Buccari, Crkvenica.

21. *gracilis* Can.? II. Almádi, Berhida, Felsuth. IV. Tokaj, Szerencs. VIII. Crkvenica.

22. *lutetiana* L. Koch. — I. Kecskemét. II. Almádi, Lelle.

23. *caucasia* L. Koch. (*P. allionica* O. Herm.) — I. Budapest. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj. VI. Orsova (Allion) (21), Báziás.

24. *barbata* L. Koch. — VIII. Fiume, Crkvenica, Zengg.

25. *secreta* Thor. — VIII. Crkvenica, Zengg.

26. *praefica* L. Koch. — II. Almádi, Abaliget. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj, Szerencs, Szőllöske. VI. Mehadia, Orsova (23, 21). VIII. Kriviput.

27. *petrensis* C. L. Koch. — I. Vacs, Alsó Hámor (21). III. Trencsén IV. et V. frequens.

28. *serotina* L. Koch. — I. Budapest, Érmihályfalva, Pecze Sz. Márton. II. Várpalota. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj, Szomotor. V. Gyulafehérvár. VI. Orsova (21), Herkulesfürdő.

29. *Latreilli* E. Sim. (*atra* O. Herm.). — I. Kalocsa. II. Lelle, Pécs. III. Tátra Léva. IV. S.-A.-Ujhely, Körtvélyes, Kriván. V. Kolozsvár,? N.-Szeben (20). VII. Eszék (21), Diakovár.

30. *apricorum* C. L. Koch. — I—VII. sat frequens.

31. *subterranea* C. L. Koch. (*Petiverii* O. Herm.?). — I. ? Alsó Hámor (21). III. Babiagora, Tátra. IV. Kassa (1),? S.-A.Ujhely (21), Szinnaikő. V. Präsba (46), ?? Mező-Záh (19). VI. ? Mehádia (21), Orsova (24).

32. *similis* Kulcz. — VI. Herkulesfürdő.

33. *longipes* L. Koch. — I. Budapest (21), Kecskemét. IV. Tokaj.

34. *Hermani* Chyzer. (*P. tragica* * O. Herm.) — I. Budapest (Sashegy). II. Kám. IV. S.-A.Ujhely, Szerencs, Tokaj, Szőllőske, Bánszka, Torna. VI. Orsova (21). VII. Vrata. VIII. Buccari, San Cosmo, Zengg, Francikovac, Kuterevo.

35. *clivicola* L. Koch. — I. Pop Ivan. VII. Risnjak.

36. *femella* L. Koch. — VI. Orsova (21).

37. *oblonga* L. Koch. — V. ?? Mező-Záh (19). VI. Báziás, ad antrum Veterani, Orsova (21). VIII. frequens.

38. *erebea* Thor. — I. Budapest. IV. S.-A.-Ujhely, Széphalom, Szinna, Körtvélyes. VI. Herkulesfürdő.

39. *rustica* L. Koch. — VIII. Buccari (unica ♀).

40. *electa* C. L. Koch. — I. Budapest, Kecskemét, N. Kőrös. II. Pozsony. IV. S.-A.-Ujhely, Szomotor. VIII. Velebit.

41. *bimaculata* C. L. Koch. — VI. Pancsova (21).

Aphantaulax E. Simon.

42. *Albinii* (Sav.) L. Koch. — I. Budapest, Kecskemét, Hadház. II. Lelle, Simontornya. IV. Sárospatak? VI. Orsova. Szvinyicza. VII. Vrdnik. VIII. frequens.

43. *cinctus* L. Koch. — VI. Orsova (24, 21). VIII. Buccari.

Gnaphosa Latreille.

44. *lucifuga* Walck. (*Thysa pythonissaeformis* Kempelen). ** — I—VIII. non rara.

45. *dolosa* O. Herm. — VI. Orsova (21), Berzászka.

46. *lugubris* C. L. Koch. — IV. S.-A.-Ujhely, Szerencs, Tokaj, Kis Toronya, Torna. V. Brassó.

47. *montana* L. Koch. — III. Tátra. IV. Suliguli. V. Borszék, Bodzai hegység (Tejkő).

* Nomen praeoccupatum.

** L. v. Kempelen, Thysa pythonissæformis. Eine neue Gattung und Art. (Verhandl. d. k. k. Zoolog. botan. in Wien. Bd. XVII. 1867.

48. *opaca* O. Herm. *(suspecta* O. Herm.) — I. Budapest, Hatvan, Vacs. II. Almádi, Berhida. IV. S.-A.-Ujhely, Szerencs, Tokaj. VI. Orsova (21).
49. *soror* O. Herm. — I. Budapest (Sashegy) (21), Kecskemét?
50. *zeugitana* Pav. — VIII. Crkvenica.
51. *bicolor* Hahn. — I. Alsó Hámor (21). IV. S.-A.-Ujhely, Szőllőske, Körtvélyes. V. Malomvíz. VIII. Velebit.
52. *leporina* L. Koch. — V. Montes Retyezát, Felső Árpás.
53. *fumosa* C. L. Koch? — IV. S,-A.-Ujhely (21).
54. *molesta* O. Herm. — VI. Orsova (21), Berzászka.
55. *fallax* O. Herm. — IV. S.-A.-Ujhely (21). VI. Orsova (21).

Callilepis Westring.

56. *nocturna* L. — I. Kecskemét, Szeged. IV. S.-A.-Ujhely. V. Kolozsvár (21), N. Szeben (21), Hátszeg, Malomviz. VI. Herkulesfürdő, Orsova (24, 21), Pancsova (21). VII. Vrata. VIII. Velebit (Kubus), Kriviput.
57. *Schuszteri* O. Herm. — II. Badacsony. III. Trencsén-Teplitz. IV. S.-A.-Ujhely, Sárospatak, Torna. VI. Orsova (21). VII. Plitvica. VIII. Fiume, Buccari, Crkvenica.
58. *cinerea* Menge. — I. Budapest, Kalocsa, Kecskemét, Hadház. II. ad lacum Balaton.
59. *exornata* C. L. Koch. — I. Budapest. II. Almádi, V. Szamosujvár. VI. ad antrum Veterani, Orsova (21), Báziás (21). VII. Vrdnik. VIII. frequentissima.
60. *Aussereri* L. Koch. VIII. Meja, Portoré, Crkvenica, Zengg, Carlopago.

Fam. ZODARIIDÆ.

Zodarium Thorell.

1. *elegans* E. Sim. — VIII. Buccari, Crkvenica. Carlopago.
2. *germanicum* C. L. Koch. — I—VII. sed non frequens.
3. *graecum*? C. L. Koch. — VIII. Crkvenica, Zengg.
4. *italicum* Can. et Pav. — VIII. Buccari.
5. *gallicum* E. Sim. VIII. Buccari, Crkvenica.

Fam. UROCTEIDÆ.

Uroctea Dufour.

1. *Durandii* Latr. *(Clotho anthracina* C. L. Koch?). — VIII. Fiume (21), Buccari, Costrena-Sta-Lucia, Martinšćica, Portoré, Crkvenica, Novi, Zengg.

Fam. PHOLCIDÆ.

Pholcus Walckenaër.

1. *opilionoides* Schr. *(phalangioides* Dolesch.? Sill, *Ph. Pluchii* Scop.). — I—VIII. frequens.
2. *phalangioides* Fuessly. — I. Budapest, Rákospalota (21). II. Sopron, N.-Barom (21). IV. S.-A.-Ujhely. V. Kolozsvár (21). VII. Otočac. VIII. Fiume, Buccari, Crkvenica, Novi, Zengg.

Holocnemus E. Simon.

3. *Forskalii* Thor. — I. Kecskemét, Nagyvárad. VI.* frequens. VII. Eszék, Jasenak, Pazua-Sztara.

Spermophora Hentz.

4. *senoculata* Dug. — Species meridionalis. In litorali adriatico. VIII. sat frequens.

Fam. THERIDIIDÆ.

Episinus Latreille.

1. *lugubris* E. Sim. *(truncatus* O. Herm.). I—VIII. frequens.
2. *truncatus* Latr. — IV. S.-A.-Ujhely, Beregszász, Bártfa, Forró. VI. Szászkabánya, Herkulesfürdő. VIII. Orehovica, Buccari, Crkvenica.

Euryopis Menge.

3. *acuminata* Luc. — VIII. Fiume, Costrena St. Lucia, Crkvenica.
4. *laeta* Westr. — I. Budapest (Rákos) duo exempla feminea.
5. *Orsovensis* Kulcz. — VI. Orsova (in monte Allion).
6. *argenteomaculata* E. Sim. — I. Budapest.
7. *flavomaculata* C. L. Koch. — II. Sopron. IV. Pluribus locis. VI. Zlaticza. VII. Podsused, Velebit.

Theridium Walckenaër.

8. *herbigradum* E. Sim. — VIII. Buccari, Martinšćica, Crkvenica, Skrljevo.
9. *bimaculatum* Linn. *(dorsiger* Hahn.) — I. Hadház. II. et VII. non inventum. III—VI. frequens. VIII. Orehovica.
10. *lineatum* Clerck. *(redimitum* Clerck.) — I—VIII. commune.
11. *lepidum* Walck. *(Phyllonethis instabilis* Kulcz.). — III. Babia gora. IV. Erdőbénye, Varannó.
12. *sisyphium* Clerck. — Exceptis regionibus I., VI. et VIII. commune.

* T. Thorell, Remarks on Synonyms of European Spiders. Upsala 1870—73.

13. *impressum* L. Koch. *(sisyphium* O. Herm. pro parte), — In omnibus regionibus commune.
14. *nigrovariegatum* E. Sim. *(Frivaldszkyi* O. Herm.). I. Budapest, Kalocsa. II. Almádi, Várpalota, Pécs. III. Salgó. IV. frequens. V. Mező-Szakáll, Marosujvár. VI. et VIII. frequens.
15. *Blackwallii* O. P. Cambr. — I. Nagyvárad (duo exempla).
16. *pallens* Blackw. — IV. Bártfa, Körtvélyes.
17. *pinastri* L. Koch. — II. Tüskepuszta. III. Szulyó. IV. frequens. V. Kolozsvár, Borszék, Görgény-Szent-Imre. VI. Báziás, Berzászka, Plavisevicza. VIII. Fiume, Orehovica, Portoré, Buccari, Novi.
18. *varians* Hahn. — Excepta regione adriatica (VIII.) commune.
19. *pictum* Walck. — III. et IV. frequens. V. Szatmár, VII. Eszék.
20. *tinctum* Walck. — Excepta regione VIII. frequ.
21. *denticulatum* Walck. — In omnibus regionibus frequens.
22. *simile* C. L. Koch — I. Kecskemét. II. et V. non inventum. III. et IV. frequ. VI. Báziás, Deliblat. VII. Fužine, Diakovár. VIII. Buccari, Crkvenica.
23. *umbraticum* L. Koch. — III. Tátra (Kriván, Tátrafüred, Csorbai tó).
24. *riparium* Blackw. *(saxatile* C. L. Koch). — I. Kecskemét. III. Tátra, N. Rőcze, Tarnócz. IV. S.-A.-Ujhely, Szinnaikő, Eperjes, A. Meczenzéf. V. N. Disznód (46), Präsba (46). VI. Plavisevicza.
25. *formosum* Clerck *(sisyphum* Walck). — I—VIII. commune.
26. *tepidariorum* C. L. Koch. — II. Sopron, Esztergom, IV. Perbenyik. V. Kolozsvár, (21). Görgény-Szt-Imre (21). VI. Podporány, Fehértemplom, Ogradena (21). VII. Eszék, Jaska. VIII. Portoré.
27. *pulchellum* Walck. — VIII. Buccari, Velebit.
28. *vittatum* C. L. Koch (*pulchellum* O. Herm. ?) — II. Sopron. IV. Szőllőske, K. Azar, Regete-Ruszka. V. Transylvania (42). VI. ? Palanka (21), Rékás. VII. Varasd-Teplicz, Podsused, Jaska.

Ulesanis L. Koch.

29. *paradoxa* Lucas. — VIII. Fiume (unicum exemplum).

Dipoena Thorell.*

30. *melanogaster* C. L. Koch. — I—IV. frequens. V. Kis Disznód. VI. et VII. frequens. VIII. Novi.

* Inclusa *Lasaeola* E. Sim.

31. *tristis* Hahn. — I. Budapest. IV. Tokaj (21), Homonna, Regete-Ruszka, Bocskó, Bártfa. VIII. Velebit.
32. *braccata* C. L. Koch. — In omnibus regionibus modice frequens.
33. *erythropus* E. Sim. — IV. S.-A.-Ujhely. VI. Báziás.
34. *croatica* Chyzer. — VIII. Buccari, Crkvenica.
35. *inornata* O. P. Cambr. — IV. Széphalom, Szinnaikő, Mezőlaborcz, Bártfa. V. Vallis Lotriora. VIII. In litorali adriatico frequens.
36. *torva* Thor. — Hungaria (ubi ?)
37. *prona* Menge. — IV. S.-A.-Ujhely, Szomotor, N. Tárkány, Beregszász.
38. *nigroreticulata* E. Sim. — IV. S.-A.-Ujhely. V. N.-Szeben. VII. Diakovár.
39. *nigrina* E. Sim. — IV. Beregszász. V. Tasnád. VII. Plitvica. VIII. Buccari, Martinšćica, Crkvenica.
40. *convexa* Blackw. — VI. Szvinicza. VIII. In litorali adriatico frequens.

Lathrodectus Walckenaër.

41. *tredecim-guttatus* Rossi. — VIII. Buccari, Zengg.

Crustulina Menge.

42. *scabripes* E. Sim. — VIII. Martinšćica, Buccari, Crkvenica, Novi.
43. *guttata* Wid. — I. N.-Kőrös, Kecskemét, Hadház, Alsó-Hámor (21). II. Várpalota, Berhida. IV., VI. et VIII. frequens.
44. *rugosa* Thor. — Rarissima. IV. S.-A.-Ujhely (duae ♀).

Steatoda Sundevall.

45. *bipunctata* Linn. *(Theridium 4 punctatum* Dolesch. ?) — I—VII. communis.

Teutana E. Simon.

46. *castanea* Clerck. — I—VII. communis.
47. *grossa* C. L. Koch. — I. Budapest (Zugliget), Kecskemét. II. Sopron, Kám, Felcsuth. III. Uj-Bánya. VI. Uj Moldova, VIII. Buccari.
48. *triangulosa* Walck. — I. non rara. II. Pécs. III. Selmeczbánya, Ujbánya. IV. deesse videtur. V. Kolozsvár, Gyulafehérvár. VI—VIII. frequens.

Lithyphantes Thorell.

49. *corollatus* Linn. *(Theridium maculatum* Walck., *Phrurolithus maculatus* E. Sim.) — I—VIII. non rarus.
50. *Paykullianus* Walck. — V. Brassó, Kolozsvár (21), Lotrioravölgy, Verestorony. VIII. Fiume, Orehovica.

Asagena Sundevall.

51. *phalerata* Panz. (*Theridium quadrisignatum* Hahn). — I—V. frequens. VI. Doroszló (21). VII. Fužine. VIII. Buccari.
52. *meridionalis* Kulcz. — II. Sopron.

Enoplognatha Pavesi.

53. *maritima* E. Sim. — I. Kecskemét. VI. Pádé.
54. *crucifera* Thor. — IV. Tokaj.*
55. *corollata* Bertk. — I. Budapest (Sashegy). II. Várpalota.
56. *ambigua* Kulcz. — I. Budapest (Sashegy), Kecskemét.
57. *thoracica* Hahn. — I. Gödöllő. IV. Pluribus locis. V. N. Baczon. VI. Orsova (Allion). VII. Diakovár. VIII. Buccari.

Pedanostethus E. Simon.

58. *neglectus*. O. P. Cambr. — IV. Czéke, (unicus mas).
59. *Clarkii* O. P. Cambr. — I. Kalocsa, Kecskemét. IV. S.-A.-Ujhely, B. Szerdahely, Széphalom, A.-Meczenzéf. V. Tömös.
60. *Frivaldszkyi* Chyz. — I. Szegyestel (antrum Semsey). VI. Herkulesfürdő.
61. *lividus* Blackw. — Excepta regione II. non rarus.
62. *truncorum* L. Koch. — I. Biharfüred. III. Tátra. V. Nagy-Szeben.

Pholcomma Thorell.

63. *gibbum* Westr. — IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj.

Fam. ARGIOPIDÆ.

Subfamilia LINYPHIINÆ.

ERIGONEÆ.

Comaroma Bertkau.

1. *Simoni* Bertk. — Hungaria.**

Ceratinella Emerton.

2. *maior* Kulcz. — IV. Lelesz, Homonna.
3. *brevis* Wid. — I. Vaskoh. IV. communis. V. Pele. VII. Zágráb.
4. *scabrosa* O. P. Cambr. — II. Zircz, IV. S.-A.-Ujhely.

Brachycentrum Dahl.

5. *elongatum* Wid. — I. Kalocsa. II. Kám, Zircz, Soóly. III. Tátra, Dobsina. IV. S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Varannó, Sztropkó, Stoósz. V. Borszék, Nagyszeben, Vallis Lotriora. VI. Zlaticza, Báziás. VIII. Fiume, Buccari.
6. *parallelum* Wid. — IV. S.-A.-Ujhely, Lelesz, Varannó. VIII. Fiume.
7. *nemorale* Blackw. — V. Nagyszeben.
8. *thoracatum* O. P. Cambr. — VI. Zlaticza.
9. *medusa* E. Sim. — VIII. Buccari.

Trichopterna Kulczyński.

10. *Blackwallii* O. P. Cambr. — I. Érmihályfalva. IV. Lelesz. VIII. Buccari.

Cnephalocotes E. Simon.

11. *interjectus* O. P. Cambr. — IV. Czigánd.
12. *silus* O. P. Cambr. — VIII. Fiume.

Abacoproeces E. Simon.

13. *ascitus* Kulcz. — VI. Temesvár.

Troxochrus E. Simon.

14. *scabriculus* Westr. — I. Debreczen. IV. S.-A.-Ujhely, Páczin, Nagymihály, Varannó, Homonna, Sztropkó, Királyháza. V. Brassó, Retyezát.

Troxochrota Kulczyński.

15. *scabra* Kulcz. — V. Tasnád.

Tiso E. Simon.

16. *vagans* Blackw. — I. Kalocsa.
17. *aestivus* L. Koch (*Erigone carpathica* Kulcz.). III. Tátra (Kriván).

Minyriolus E. Simon.

18. *pusillus* Wid. — IV. Tokaj, Varannó.

Panamomops E. Simon.

19. *sulcifrons* Wid. — II. Berhida. IV. S.-A.-Ujhely, Monok, Czéke.
20. *diceros* O. P. Cambr. — IV. Czéke.

Diplocephalus Bertkau.

21. *crassiloba* E. Sim. — VI. Petnik prope Mehadia.
22. *cristatus* Blackw. — I. Lunka, Biharfüred. III. IV. pluribus locis. V. Retyezát. VI. Herkulesfürdő. VII. Diakovár.
23. *connectens* Kulcz. — VIII. Orehovica.
24. *humilis* Blackw. — I. Kecskemét. II. Almádi. IV. Tokaj, Szőllőske, Czigánd, Szaláncz, Alpes,

* E. Simon, Matériaux pour servir à la Faune des Aachnides de la Grèce. (Ann. Soc. ent. France. (6). T. 4.)

** Ph. Bertkau in: Correspondenzblatt des Naturhistorischen Vereins der preussischen Rheinlande und Westfalens. 1889. Nr. 2.

Hoverla. VI. Báziás, Grebenac. VII. Ruma, Diakovár. VIII. Buccari.

25. *subelevatus* L. Koch. — III. Tátra. (Cserveni Vrh.)

26. *Helleri* L. Koch. *(Erigone tatrica* Kulcz.) — III. Tátra. IV. Bártfa. V. Retyezát.

27. *latifrons* O. P. Cambr. *(? Plaesiocraerus opacithorax* E. Sim.*) — I. Vaskoh. III. Tátra. IV. ? Tokaj *(opacithorax)*, Varannó, Suliguli. V. Borszék, N. Szeben, Mons Præsba.

28. *picinus* Blackw. — II. Zircz. IV. Szőllőske, Szinnaikő, Mezőlaborcz, Szaláncz. V. N.-Szeben. VI. Uj-Moldova.

Tapinocyba E. Simon.

29. *Beckii* O. P. Cambr. — I. Biharfüred. III. Tátra (Javorina). IV. S.-A.-Ujhely, Szinnaikő, Sztropkó, Mezőlaborcz, Zboró, Suliguli. V. N.-Szeben. VI. Marilla völgy, VII. Risnjak.

30. *insecta* L. Koch. — I. N.-Kőrös, Kecskemét, Debreczen. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj, Szőllőske, Páczin, Lelesz, Varannó, Sztropkó. VII. Diakovár.

31. *pallens* O. P. Cambr. — VII. Velebit.

Metopobactrus E. Simon.

32. *Rayi* E. Sim. — VIII. Buccari.

Pocadicnemis E. Simon.

33. *pumila* Blackw. — IV. Varannó.

Entelecara E. Simon.

34. *acuminata* Wid. *(altifrons* O. P. Cambr.) — Exceptis regionibus V. et VIII. frequens.

35. *congenera* O. P. Cambr. — III. Koritnicza.

36. *erythropus* Westr. — III. Tátrafüred, Tátraháza, Igló. IV. Suliguli. V. Tasnád, Borszék.

Styloctetor E. Simon.

37. *romanus* O. P. Cambr. — I. Visegrád. II. Almádi.

Mœbelia Dahl.

38. *penicillata* Westr. — I. Érmihályfalva. II. Tarcsa. IV. Sátor-Alja-Ujhely, Bodrog-Szögh, Királyhelmecz, Terebes, Udva. VI. Kazán. VII. Diakovár, Velebit.

Dicymbium Menge.

39. *nigrum* Blackw. — IV. Bodrog-Szögh, Varannó, Hoverla. VI ? Diakovár.

40. *tibiale* Blackw. — V. Nagy-Szeben.

Lophomma Menge.

41. *herbigradum* Black. — V. Peér. VI. Herkulesfürdő.

42. *punctatum* Blackw. — IV. Sátor-Alja-Ujhely. Tokaj.

Scotinotylus E. Simon.

43. *aries* Kulcz. — III. Tátra.

Acartauchenius E. Simon.

44. *scurrilis* O. P. Cambr. — IV. S.-A.-Ujhely.

Mecynargus Kulczyński.

45. *longus* Kulcz. — III. Tátra.

Walckenaëra Blackwall.

46. *acuminata* Blackw. — III. Tátra.

47. *nudipalpis* Westr. — IV. S.-A.-Ujhely.

48. *obtusa* Blackw. — IV. S.-A.-Ujhely.

49. *capito* Westr. — I. Budapest. II. Sopron. IV. Beregszász. VI. Pádé.

50. *cucullata* C. L. Koch. — IV. Lelesz, Podhering. V. Szamosujvár, N.-Szeben.

51. *mitrata* Menge. — IV. S.-A.-Ujhely, Czéke. V. N.-Szeben.

52. *antica* Wid. — IV. S.-A.-Ujhely, Páczin. V. Zilah, N.-Szeben.

53. *suspecta* Kulcz. — III. Tátra (Cserveni Vrh.)

54. *melanocephala* O. P. Cambr. — III. Tátra.

55. *simplex* Chyzer. — IV. Czéke.

56. *Kochii* O. P. Cambr. — III. Tátra. (Csorbai tó.)

57. *cuspidata* Blackw. — III. Tátra. (pluribus locis).
« *var. obsoleta* Chyz. et Kulcz. — V. N.-Szeben.

58. *vigilax* Blackw. — IV. B.-Szerdahely, Szaláncz.

59. *fugax* O. P. Cambr. — IV. S.-A.-Ujhely.

Gonatium Menge.

60. *rubens* Blackw. — IV. S.-A.-Ujhely (21), Varannó

61. *isabellinum* C. L. Koch. — I. Biharfüred, Rézbánya. III. Tátra (21). IV. pluribus locis. V. Zilah, Kolozsvár (21), ? Mező-Záh (19), N.-Disznód (44), N.-Szeben (21), Verestorony. VII. Mrzla vodica.

62. *hilare* Thor. — III. Igló. VIII. Fiume, Crkvenica.

63. *corallipes* O. P. Cambr. — I. Kóly, Vaskoh. VI. Zlaticza.

Hypomma Dahl.

64. *bituberculatum* Wid. — IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj, Királyhelmecz, Szinna. V. Mojád, Brassó, Mező-Záh (19).

Dicyphus Menge.

65. *cornutus* Blackw. — I. Kecskemét, Kalocsa, Hadház, Püspökfürdő. III. Léva. IV. frequens. V. Szamosujvár. VI. Pancsova (21). VII. Diakovár.

* E. Simon, Les Arachnides de France. Vol. V.

Dismodicus E. Simon.

66. *elevatus* C. L. Koch. — III—VII. non rarus.
67. *bifrons* Blackw. — IV. Varannó.

Trichoncus E. Simon.

68. *scrofa* E. Simon. — IV. Tokaj. VIII. Crkvenica.
69. *sordidus* E. Simon. — VIII. Buccari, Meja, Novi.
70. *affinis* Kulcz. — IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj, Szinnaikő. V. Vallis Lotriora Montium Cibiniensium. VI. Herkules-fürdő, Zlaticza. VII. Vrdnik, Plitvicza. VIII. Martinšćica, Buccari, Crkvenica, Novi.
71. *saxicola* O. P. Cambr. — IV. Szomotor.

Gongylidium Menge.

72. *rufipes* Linn. — I. Nyiregyháza, Nagyvárad (21) II. Zákány. III. Pozsony. IV. S.-A.-Ujhely, Varannó, Sztropkó, Kassa, Bártfa, Zboró. VI. Temesvár, Báziás. VII. Eszék.

Kulczyńskiellum F. O. P. Cambr.

73. *apicatum* Blackw. — I. Kalocsa, Vencsellő. II. Almádi, Zákány. III. Tátra. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj, Szomotor, Mezőlaborcz, Kuzi. V. Torda. VI. Ruszkabánya, Pancsova (21), Doroszló (21).
74. *retusum* Westr. — II. Almádi. IV. Tolcsva, Véke, Varannó, Királyháza, Szalánc, Körtvélyes. V. Szatmár, Torda. VI. Ruszkabánya. VII. Eszék, Mrzla vodica.
75. *gibbiferum* Kulcz. — IV. Bártfa.
76. *fuscum* Blackw. — II. Almádi. IV. S.-A.-Ujhely, Varannó.
77. *agreste* Blackw. — III. Tátra, Tarnócz, Kis-Kriván, Csorbai-tó. IV. Mezőlaborcz, Bártfa. VI. pluribus locis. VII. Ruma, Mrzla vodica.

Trachygnatha Kulczyński.

78. *dentata* Wid. — I. Kalocsa, Vencsellő. II. Almádi. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj, B.-Szerdahely, Szőllőske, Páczin, Bacska, Lelesz, Szinna. V. Brassó. VII Diakovár.

Trematocephalus Dahl.

79. *cristatus* Wid. — IV. S.-A.-Ujhely, Sztropkó Mons Pop.-Iván.

Gongylidiellum E. Simon.

80. *murcidum* E. Sim. — I. Kecskemét.

Erigone Audouin.

81. *tirolensis* L. Koch. — III. Tátra (in altissimis cacuminibus et vallibus).
82. *atra* Blackw. — I. Rákosfalva. II. Felcsúth, Péth, ad lacum Fertő. III. Tátra. IV. pluribus locis. V. Görgény-Szt-Imre.
83. *dentipalpis* Wid. — I—VIII. frequens.
84. *vagans* Aud. — I. Kecskemét, Rakamaz. II. Almádi, Felcsúth, ad lacum Fertő. III. Csorbai-tó. IV. S.-A.-Ujhely. VI. Berzászka, Plavisevica. VII. Diakovár, Eszék, Plitvica. VIII. Fiume, Orehovica, Buccari, Crkvenica.
— *(graminicola* Sund. *Micryphantes rubripes* C. L. Koch. — I. Biharmegye (39). V. N.-Szeben (20).

Minicia Thorell.

85. *marginella* Wid. — V. Tusnád.

Maso E. Simon.

86. *Sundevallii* Westr. — III. Tátraháza. IV. Bártfa Mezőlaborcz, Beregszász. V. Retyezát. VI. Marillavölgy.
87. *Carpathicus* Chyzer. — IV. Suliguli.

Nematogmus E. Simon.

88. *sanguinolentus* Walck. — I. Szeged, Rézbánya. V. Tasnád, N.-Ajta. VI. VII. frequens. VIII. Buccari, Vratnik.
89. *obscurus* Blackw. — I. Rézbánya, Lunka. IV. Torna.

Lasiargus Kulczyński.

90. *hirsutus* Menge. — IV. Körtvélyes.

FORMICINEÆ.

Formicina Canestrini.

91. *mutinensis* Canestr. — V. Hátszeg. VI. Langenfeld. VIII. Orehovica, Buccari.
var. pallida Canestr. — VI. Orsova. VIII. Martinšćica, Buccari.

LINYPHIEÆ.

Donacochara E. Simon.

92. *speciosa* Thorell. — II. Simontornya.

Hilaira E. Simon.

93. *rudis* O. P. Cambr. *(nigra* F. O. P. Cambr.) — III. Tátra (in altissimis cacuminibus et vallibus).

Porrhomma E. Simon.

94. *pygmaeum* Blackw. — I. Hadház, Rakamaz. II. Sopron. IV. frequ. VI. Duplaj. VII. Diakovár.
95. *Thorellii* O. Herm. *(errans* Chyz. et Kulcz., *Linyphia microphthalma* Kulcz.). In cavis et antris. — I. Rézbánya, Szegyestel, Alsó-Hámor (21). II. Abaliget. III. Tátra, Selmeczbánya (fodina Glanzenberg) (21). IV. Mád (in cellis subterraneis).

96. *Rosenhaueri* L. Koch. — III. Aggtelek (in antro Baradla [21]).

Centromerus Dahl.

97. *bicolor* Blackw. — IV. S.-A.-Ujhely, Kapnik.
98. *expertus* O. P. Cambr. — IV. Beregszász. V. Szatmár.
99. *pabulator* O. P. Cambr. — I. Biharfüred. III. Babiagora, Kis-Kriván, Tátra, Tátrafüred.
100. *sylvaticus* Blackw. — I. N.-Kőrös, Kecskemét, Rézbánya. III. Tátra. IV. frequens. V. Kolozsvár, Borszék, Retyezát, Brassó. VI. Ruszkabánya.
101. *similis* Kulcz. — II. Sopron. IV. Szinnaikő. VIII. Buccari.
102. *silvicola* Kulcz. — IV. Szinnaikő. VII. Risnjak.
103. *incilium* L. Koch. — II. Pécs. IV. Torna, Körtvélyes.
104. *arcanus* O. P. Cambr. — III. Tátra (Matlárháza).

Leptorhoptrum Kulczyński.

105. *Huthwaithii* O. P. Cambr. — III. Tátra. IV. Bustyaháza. V. Kolozsvár.

Macrargus Dahl.

106. *rufus* Wid. — IV. Szőllőske, Homonna. V. Borszék, N.-Szeben, Retyezát.
107. *adipatus* L. Koch. — III. Tátra.

Microneta Menge.

108. *glacialis* L. Koch. *(Erigone cacuminum* Kulcz.) — III. Tátra.
109. *viaria* Blackw. — I. Visegrád, N.-Kőrös, Kecskemét. II. Berhida, Puszta-Péth. IV. frequens. V. N.-Szeben, Retyezát. VI. Herkulesfürdő, Uj-Moldova, Ruszkabánya. VII. Zágráb.
110. *conigera* O. P. Cambr. — IV. Suliguli. V. Borszék.

Sintula E. Simon.

111. *aërius* O. P. Cambr. — II. Sopron. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj, B.-Szerdahely, Lelesz, Sztropkó. V. N.-Szeben.

Micryphantes C. L. Koch.

112. *corniger* Blackw. — VII. Velebit.
113. *retroversus* O. P. Cambr. — I. Hadház. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj. VIII. Buccari.
114. *rurestris* L. Koch *(fuscipalpis* Kulcz. olim.) In omnibus regionibus frequens.
115. *fuscipalpis* C. L. Koch. — I—VII. non rarus.

Syedra E. Simon.

116. *gracilis* Menge. *(pholcommoides* O. Cambr.) — I. Rézbánya. III. Tátra (Csorbai-tó). IV. Szinnaikő.

Bathyphantes Menge.

117. *concolor* Wid. — I—VIII. frequens.
118. *pullatus* O. P. Cambr. — IV. Bodrog-Szerdahely unica femina.
119. *dorsalis* Wid. — I—V. non rarus. VII. Eszék.
120. *nigrinus* Westr. — IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj, Nagy-Mihály, Munkács. VI. Temesvár.
121. *approximatus* O. P. Cambr. — I. Gödöllő, Rákosfalva.
122. *gracilis* Blackw. — IV. S.-A.-Ujhely, Szerencs, Varannó. VII. Eszék, Diakovár.
123. *similis* Kulcz. — VI. Herkulesfürdő.
124. *torrentum* Kulcz. — III. Tátra. IV. Alpes Pietroz.
125. *cyaneonitens* Kulcz. — II. Almádi. IV. S.-A.-Ujhely.

Pœciloneta Kulczyński.

126. *variegata* Blackw. — III. Tátra, Tátrafüred. IV. Bártfa, Varannó.

Lephthyphantes Menge.

127. *collinus* L. Koch. — I. Budapest (Lipótmezei kőbánya), Visegrád. II. Sopron, Velencze.
128. *nebulosus* Sund. *(? Linyphia circumflexa* C. L. Koch). — I. Gödöllő, ? Biharmegye (39). IV. Munkács. V. Kolozsvár. VI. Szászkabánya.
129. *minutus* Blackw. *(Linyphia domestica* Wider). — I. Budapest (Orczykert). II. Kám. III. Szepes-Béla. IV. S.-A.-Ujhely, Velejte, Homonna. V. Transsilvania (42). VII. Mrzla vodica.
130. *leprosus* Ohlert. — I—VII. frequens.
131. *alacris* Blackw. *(Linyphia terricola* C. L. Koch). — In montibus regionum I. III—V. et VII. non rarus.
132. *annulatus* Kulcz. — III. Tátra (1700—2200m .)
133. *pulcher* Kulcz. — III. Tátra, Korytnicza.
134. *varians* Kulcz. — III. Tátra (1400—2400 m.).
135. *crucifer* Menge. — II. Berhida. IV. S.-A.-Ujhely, Varannó, Szinnaikő, Szin. V. Kolozsvár. VII. Ruma.
136. *angulipalpis* Westr. — IV. Czéke, Sztropkó, Podhering.
137. *monticola* Kulcz. — III. Tátra (1400—2400 m.), non rarus.
138. *pallidus* O. P. Cambr. — *(pallens* Kulcz.). — I. Kecskemét. III. Tátra.
139. *mansuetus* Thor. — II. Sopron. IV. Szinna.
140. *arciger* Kulcz. — III. Tátrafüred, Kriván, Dobsina. IV. Bártfa, Pietroz.
141. *lepidus* O. P. Cambr. — III. Tátra, Igló.
142. *mughi* Fick. *(Linyphia alpina* O. Herm). — I. Biharfüred. In montibus altioribus regionum III—V. non rarus.
143. *cristatus* Menge. — III. Turcsek. IV. Czéke,

Szinna, Mezőlaborcz, Klastromalja, Pietroz. V. Zilah, Vallis Lotriora (montium Cibiniensium). VII. Mrzla vodica. VIII. Buccari.

144. *tenebricola* Wid. — In montibus regionum III. Tátra. IV. Szinnaikő, Polonina runa, Suliguli, Bártfa, Szalánc, Stoósz. V. Zilah (Meszes). VI. Ruszkabánya. VII. Kukljič, Vrata, Risnjákhegy, Mrzla vodica.

145. *tenuis* Blackw. — I—VIII. passim occurrit.

146. *Mengei* Kulcz. — I. Biharfüred. IV. S.-A.-Ujhely, Szinna, A.-Meczenzéf. VI. Báziás, Orsova.

147. *flavipes* Blackw. (*Henricae* Six. Chyzer et Kulcz). — I. Biharfüred, antrum ad Pestere. II. Kám. III. Lucski IV. pluribus locis. VI. Herkulesfürdő, Marillavölgy, Uj-Moldova. VII. Ruma, Plitvica, Vrdnik, Vrata. VIII. Francikovac.

148. *obscurus* Blackw. — III. Tátrafüred, Javorina, Mons Szitnya. IV. Suliguli, Pietroz, Bártfa, Stoósz.

149. *Keyserlingii* Auss. — I. Hadház. II. Almádi. IV. S.-A.-Ujhely, Szőllőske, Szerencs, Tokaj. VI. Langenfeld, Orsova. VIII. Buccari.

150. *notabilis* Kulcz. — VIII. Martinšćica, Crkvenica.

Drapetisca Menge.

151. *socialis* Sund. — I. Biharfüred, Rézbánya. II. Felcsuth, Kám. III. IV. frequens. VII. Mrzla vodica.

Taranucnus E. Simon.

152. *croaticus* Chyzer. — VII. Vrata (prope Fužine).

153. *herculanus* Kulcz. — VI. Herkulesfürdő (in antro «Tatarczy»).

Labulla E. Simon.

154. *thoracica* Wid. — III. Turcsek. IV. Visk, Bártfa. VII. Vrata, Mrzla vodica. VIII. Vratnik.

Linyphia Latreille.

155. *phrygiana* C. L. Koch. — In montibus altioribus regionum III. IV. V. non rara.

156. *montana* Clerck. — (*resupina* C. L. Koch). — I—VII. communis.

157. *triangularis* Clerck. — (*montana* C. L. Koch, Walck). — I—VIII. communis.

158. *emphana* Walck. — I. Mátra Kékes, Diósgyőr (21), Alsó Hámor (21). III. Lucskifürdő, N.-Rőcze, Árvaváralja. IV. S.-A. Ujhely, Kabola-Polyána. V. Kolozsvár, N.-Baczon. VI. Herkulesfürdő. VII. Crni-Lug, Risnják, Mrzla-Vodica. VIII. Ad antrum Konjsko.

159. *marginata* C. L. Koch. — In omnibus regionibus valde frequens.

160. *peltata* Wid. — III—VII. frequens,

161. *frutetorum* C. L. Koch. — I—VIII. frequens. *var. punctiventris* Chyzer et Kulcz. II. Pécs. IV. S.-A.-Ujhely. V. Szamosujvár. VII. Diakovár. VIII. Buccari, Crkvenica, Novi, Zengg, Vratnik.

162. *hortensis* Sund. — In regionibus I., II., IV., V. non rara. VI. Doroszló (21). VII. Plitvica.

163. *pusilla* Sund. — (*pratensis* Wid.). — I—VII. frequ.

164. *impigra* O. P. Cambr. — I. Kalocsa, Insula Csepel. IV. Tokaj, Bacska. VII. Eszék.

165. *clathrata* Sund. — I—VII. frequens.

166. *furtiva* O. P. Cambr. — II. Felcsuth. IV. Széphalom.

167. *insignis* Blackw. — III. Szepes-Béla, Tarnócz.

Stemonyphantes Menge.

168. *bucculentus* Clerck. — (*Theridium reticulatum* Hahn). — In regionibus I., III—VI. sat frequens. VII. Velebit. VIII. Crkvenica.

Bolyphantes C. L. Koch.

169. *alticeps* Sund. — I. Biharfüred. III. Tátra, Tátrafüred. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj, Kapnik.

170. *luteolus* Blackw. — III. Tátra, Igló. IV. Tokaj, Torna. V. Borszék.

Floronia E. Simon.

171. *frenata* Wid. — I. Püspökfürdő. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj, Királyhelmecz, Széphalom, Varannó, Komarócz, Radvány.

Tapinopa Westring.

172. *longidens* Wid. — II. Várpalota, Felcsúth, Velencze, Almádi. III. Csorbai tó. IV. Sárospatak, Czéke, Varannó, Zboró.

(*Theridium bicolor* Hahn, Sill. *Micryphantes bicolor* O. Herm. [20]. — V. Alter Berg [46]).

Subfam. TETRAGNATHINAE.

PACHYGNATHEÆ.

Pachygnatha Sundevall.

173. *Clerckii* Sund. — I—VII. non rara.

174. *Listeri* Sund. — I. Budapest (Ujpesti sziget) IV. Varannó, Sztropkó, Ungvár (Vidra) (40), Torna. V. Szamosujvár, N.-Szeben. VI. Temesvár.

175. *Degeerii* Sund. — (*Listeri* O. Herm. sec. exempla in Musæo Nationali conservata). I—VIII. communis.

TETRAGNATHEÆ.

Tetragnatha Latreille.

176. *extensa* Linn. — In omnibus regionibus frequ. — *extensa var. pulchra* Kulcz. — II. Ad lacum Fertő. V. Felső-Bajom.

177. *pinicola* L. Koch. *(Eugnatha picta* Lendl). — I. Budapest, Kalocsa, Tiszalök, Berkesz. II. Ad lacum Fertő. III. Ujbánya. IV—V. sat frequens. VI. Deliblat (32). VII. Plitvica, Eszék. VIII. Fiume, Draga-Gornja.

178. *nigrita* Lendl. — I. Kalocsa, Berkesz, Püspökfürdő, Pecze-Sz.-Márton. III. Kis Kriván. IV. Orosz-Ruszka, Mezőlaborcz. V. Kolozsvár, Szamosujvár, N.-Ajta. VI. Buzád (32), Bázos (32), Rékás (36).

179. *Solandrii* Scop. — *(extensa var. montana* Lendl, et *extensa var. deserticola* Lendl.). — Excepta regione VIII. frequens.

180. *obtusa* C. L. Koch. — *(chrysochlora* Beck, Lendl). — I—IV. sat frequens. V. Görgény-Sz.-Imre. VI. Szvinyicza, Doroszló (21), Deliblat (32), Grebenacz (14), Apatin (21). VII. frequens. VIII. Sušak.

— *obtusa forma intermedia* Kulcz. — I. Hadház, Rakamaz. III. Tarnócz. IV. Tokaj, Széphalom. V. Kolozsvár, Szamosujvár, Tömös. VII. Eszék.

— *obtusa forma maior* Kulcz. — II. Ad lacum Balaton.

— *obtusa forma propior* Kulcz. — I. Vencsellő. II. Hédervár.

181. *striata* L. Koch. — *(Eugnatha striata* Lendl. ♂ neque ♀). — Tokaj (mas unicus)

Eucta E. Simon.

182. *lutescens* Lendl. — VI. Rékás (36), Deliblat (30). VII. Eszék

METEÆ.

Meta C. L. Koch.

183. *segmentata* Clerck. — *(Epeira inclinata* Walck. *Zilla reticulata* C. L. Koch.). — I—VIII. communis.

— *segmentata var. Mengei* Thor. I. Budapest, Hadház. IV. Szőllőske, Kapnikbánya. V. Nagy-Szeben, Szamosujvár, Buzamező, Gyulafehérvár, Bodzai hegység. VI. Herkulesfürdő. VII. Diakovár. VIII. Buccari, Brezje.

184. *Merianae* Scop. — *(fusca* de Geer). — In regionibus. I., III—VIII. praesertim in antris et fodinis frequens.

— *Merianae var. celata* Blackw. — III. Szepes Béla.

185. *Menardi* Latr. — *(fusca* Walck., *Epeira fusca* Dolesch.). — In antris, fodinis, cellis subteraneis regionum. I—V. frequens. VIII. Antrum Konjsko (Velebit).

NESTICEÆ.

Nesticus Thorell.

186. *cellulanus* Clerck. — I—VI. frequens.

187. *affinis* Kulcz. — III. Selmeczbánya (in fodina 250 m. profunda).

188. *fodinarum* Kulcz. — In fodinis et antris ad I. Rézbánya, Fonácza, Szegyestel (József-főherczeg, — Semsey, — Márvány bányabarlang).

189. *hungaricus* Chyz. — V. Petrozsény (in fodinis).

190. *Birói* Kulcz. — I. In antro Fericsensi.

191. *puteorum* Kulcz. — V. Nagy-Ág.

Subfam. ARGIOPINAE.

Argiope Savigny.

192. *lobata* Pall. — I. Budapest, Isaszeg, K.-Szt-Miklós. III. Com. Nógrád. (21). VI. Grebenácz. VII. Fruska gora. VIII. Zeng.

193. *Brünnichii* Scop. — *(Nephila fasciata* C. L. Koch.) — Compluribus locis regionum I—II., IV—VIII.

Cyclosa Pallas.

194. *conica* Pall. — I—VIII. communis.

195. *oculata* Walck. — IV. Varannó, Bártfa. V. Tasnád, Kolozsvár, Szamosujvár.
(trituberculata Luc. — Hungaria [35]).
(caudata L. Koch. — Hungaria [35]).

Mangora O. Cambridge.

196. *acalypha* Walck. — In omnibus regionibus communis.

Epeira Walckenaër.

Subgenus Epeira.

197. *angulata* Clerck. — *(regia* C. L. Koch.) — I—VII. frequens.

198. *saeva* L. Koch. (?) — V. In alpe Dubrino prope Oláh-Fenes mas unicus.

199. *Nordmannii* Thor. — I. Biharfüred. III. Tátrafüred.

200. *grossa* C. L. Koch. — I—VIII. rara.

201. *Circe* Savign. — I. Kecskemét. II. Esztergom. III. Trencsén, Ujbánya. V. Kolozsvár. In regionibus VI—VIII. frequens.

202. *dromedaria* Walck. — In omnibus regionibus frequentior.

203. *Ullrichii* Hahn. — I. Budapest, Isaszeg, Kecskemét, Dános. II. Várpalota. VI. Bielo Brdo.

204. *omoeda* Thor. — I. Budapest, Vencsellő. II. Sárvár. III. Mons Szitnya, Tátra. IV. Szinna, Terebes, Bártfa, Torna. V. In montibus «Bodzai

hegység» nominatis, Borszék. VI. Rékás. VIII. Brezje.

205. *gibbosa* Walck. (*bicornis* Walck., *arbustorum* C. L. Koch.) — I. Budapest, Kalocsa. III. Koritnicza, Léva. IV. S.-A.-Ujhely, Sárospatak, Tokaj, Csarnahó, Munkács, Körtvélyes. V. Szamosujvár, Déva (43), Nagy-Csür (45), Nagy-Szeben (21). VI. Temesvár. VII. Diakovár.

206. *dalmatica* Dol. — I. Budapest. VI. Rékás et Fužine, Crni-Lug, Varasd-Toplicza, Syrmia (13). ad antrum Veterani. VIII. Buccari, Crkvenica, St-Jelena, Novi.

207. *diademata* Clerck. (*diadema* L., Walck., *pulchra* C. L. Koch ?) — In omnibus regionibus communis.

208. *marmorea* Clerck. — a) *forma principalis* Thor. — In omnibus regionibus frequens. — var. β. IV. Podhering. b) *forma pyramidata* Clerck. (*scalaris* Walck., *analis* Sill ?) — I—VII. frequens.

209. *alsine* Walck. (*lutea* C. L. Koch.) — I. Budapest. II. Simontornya. III. Ujbánya, Borosznó, Szepes-Béla (Barlangliget), Tátra (Felkavölgy). IV. S.-A.-Ujhely, Sztropkó, Szinna, Felső-Schönborn, Kabola-Polyána, Torna. V. Bányabükk, Görgény-Szt-Imre, Nagy-Disznód (44). Bodzai hegység, Mező-Záh (19).

210. *quadrata* Clerck. — In regionibus I—VII. frequens, in VIII. non inventa.

211. *cucurbitina* Clerck. — In omnibus regionibus communis.

212. *alpica* L. Koch. — I. Alsó-Hámor (21). III—V. frequens. VI. Herkules-fürdő. VII. frequens.

213. *inconspicua* E. Sim. — I. Budapest, comitatu Borsod (37).

214. *Sturmii* Hahn (*agalena* C. L. Koch, Sill ?). — I. Kalocsa. II. Zircz. III—V. frequens. VI. Marillavölgy, Orsova, Uj-Moldova. VII. frequens.

215. *triguttata* Fabr. (*agalena* Walck., *aurantiaca* C. L. Koch). — I—VII. frequens.

216. *Redii Scop.* (*sollers* Walck., *Atea sclopetaria* C. L. Koch). — In omnibus regionibus frequens.

217. *ceropegia* Walck. (? *Miranda exornata* C. L. Koch). — In montibus altioribus regionum II—VI. sat frequens. — VII. Croatia (13).

218. *Victoria* Thor. — I. Budapest (21), Rákospalota (21), N.-Várad, Pecze-Szt.-Márton. III. Mons-Szitnya, Léva. V. Kolozsvár (21), Gyeke (21), Szamosujvár, Marosujvár, Gyulafehérvár.

219. *Armida* Aud. in Sav. — VIII. Zengg.

220. *umbratica* Clerck. — In omnibus regionibus non rara.

221. *sclopetaria* Clerck. (*sericata* C. L. Koch, *sericea* E. Sim.) — I—VI. non rara.

222. *ixobola* Thor. (*sclopetaria* O. Herm., secundum exempla in Musæo Nationali conservata). — In regionibus I—VI. frequens. VII. Eszék.

223. *cornuta* Clerck. (*arundinacea* C. L. Koch, *apoclisa* Walck p. p.) — I—VII. communis.

224. *patagiata* Clerck. (*dumetorum* Hahn). — Excepta regione VIII. communis.

225. *adianta* Walck. (*Miranda pictilsi* C. L. Koch). — I. Csepelsziget, Debreczen, Berkesz, com. Bihar (39). II. Kám, Badacsony. IV. Körtvélyes. V. Pele, Kolozsvár, Mező-Záh (21). VI. Báziás, Plavisevicza, Grebenácz. VII. et VIII. frequens.

226. *diodia* Walck. — Exceptis regionibus V. Kolozsvár (21) et VII. non rara.

(*Westringii* Thor. — Hungaria [35]).

Subgenus Singa C. L. Koch.

227. *hamata* Clerck. (*tubulosa* Walck). — I—VII. frequens.

228. *Lucina* Sav. — I. Budapest (Aquincum), Kecskemét, Szeged. II. Ad lacum Balaton (21). V. Szamosujvár. VI. Doroszló (21).

229. *nitidula* C. L. Koch. (*hamata var. a.* O. Herm.). I—VII. frequens.

230. *Herii* Hahn. — In regionibus I., III., IV., V. modice frequens. VI. Pancsova (21), Temesvár. VII. Diakovár, Eszék.

231. *albovittata* Westr. — I. Farkasd, N.-Kőrös, Kecskemét. II. Sopron. III. Ujbánya. IV. Körtvélyes. V. Kolozsvár (21), Bányabükk, Borszék. VI. Bielo Brdo.

232. *pygmaea* Sund. — Exceptis regionibus III. et VIII. sat frequens.

233. *sanguinea* C. L. Koch. — In regionibus I—VII. sat frequens. VIII. Buccari.

(*rufula* E. Sim. — Hungaria [35]).

Subgenus Cercidia Thorell.

234. *prominens* Westr. — II. Sopron. IV. modice frequens. V. Tasnád, Kolozsvár. VI. Herkules-fürdő, Orsova, Ogradena (21), Apatin (21). VII. Diakovár, Zágráb. VIII. Buccari, Zengg.

Subgenus Zilla C. L. Koch.

235. *atrica* C. L. Koch. — IV. Szőllőske. VII. Plitvica. VIII. frequens.

236. *Keyserlingii* Auss. — VIII. Fiume, Tersato, Buccari, St. Jelena, Crkvenica, Novi, Zeng.

237. *x-notata* Clerck. — III. Pozsony (21). IV. S.-A.-Ujhely, Varannó, Bártfa. VIII. Buccari. Martinšćica, Crkvenica.

238. *montana* C. L. Koch. — In montibus altioribus regionum III—V. non rara.

239. *Thorellii* Auss. — I. Pecze-Szt.-Márton. III. Modor (21). IV. Szőllőske, N.-Szőllős. VI. Rékás, Szvinicza.

240. *Stroemii* Thor. — III. Alsó-Kubin, Felfalu. IV. Bártfa. V. Szamosujvár, Borszék, Görgény-Sz.-Imre (21). VI. Pancsova (21), Doroszló (21). VII. Vrdnik, Eszék.
(Kochii Thor. — Hungaria [35]).

Fam. MIMETIDAE.

Ero C. L. Koch.

1. *furcata* Will. *(thoracica* Wid.). — IV. sat frequens. VI. Temesvár, Doroszló (21). VII. Mrzla-Vodica. VIII. Buccari.

2. *aphana* Walck. — I. Budapest, Kalocsa, Hadház. II. Pilis-Marót. III. Felfalu. IV. Szőllőske, Széphalom, Beregszász. V. Szamosujvár. VI. Temesvár, Deliblat. VII. Diakovár, Eszék. VIII. Orehovica, Crkvenica.

3. *tuberculata* Deg. — I. Kecskemét, Hadház, Rakamaz (21). IV. Széphalom, Őrmező. V. Kolozsvár. VI. Buziás, Deliblat. VII. Podsused.

Mimetus Hentz.

4. *laevigatus* Keys. — I. Monor. II. Almádi. IV. Tokaj (21). VI. Báziás. VII. Buccari, Crkvenica, Selce, Novi.

Fam. THOMISIDAE.

Tmarus E. Simon.

1. *piger* Walck. *(cuneolus* C. L. Koch.) — In regione II. non inventus, cæterum frequens.

2. *stellio* E. Sim. (*Monaeses cuneolus* O. Herm. pro parte saltem.) — I. Püspökfürdő, IV. S. A.-Ujhely (iuv.?), Tokaj, Körtvélyes.

Monæses Thorell.

3. *caudiculà* E. Sim. — Rarissima species. VI. Báziás par exemplorum adultorum.

Coriarachne Thorell.

4. *depressa* C. L. Koch. — Rarissima. II. Tarcsa, exemplum unicum.

Thomisus Walckenaër.

5. *albus* Gm. *(onustus* Walck., *diadema* C. L. Koch *auriculatus* Prach.) — I—VIII. frequens.

Runcinia E. Simon.

6. *lateralis* C. L. Koch. — *(Thom. cerinus* C. L. Koch.) I. Kalocsa, Szeged, Dorozsma. II. Badacsony, Fonyód. VI. Deliblat, Orsova, Oravicza. (16). VIII. frequens.

Pistius E. Simon.

7. *truncatus* Pallas — *(Thomisus horridus* C. L. Koch). I—VIII. frequens.

Misumena Latreille.

8. *vatia* Clerck. — *(Thomisus citreus* Walck., *Th. calycinus* C. L. Koch, ? *Th. viridis* Dolesch. ? *Thomisus devius* C. L. Koch.) I—VIII. communis.

9. *tricuspidata* Fabr. — *(Thom. capparinus* C. L. Koch?, *Th. Diana* Walck.) I—VIII. communis.

Heriæus E. Simon.

10. *Savignyi* E. Sim. — I. Kalocsa. VII. Diakovár, Eszék. VIII. Fiume, Portoré, Buccari, Martinšćica, Crkvenica, Zengg, Jablanac.

11. *hirsutus* Walck. — *(Misumena villosa* O. Herm.?) I. Budapest, Kalocsa. II. ? Kőszeg (21), Várpalota, Szántód. IV. S.-A.-Ujhely, Torna? Komjáti (21). VI. Báziás. VII. Ruma. VIII. Zengg.

Diæa Thorell.

12. *dorsata* Fabr. — In regione I. et II. ad hoc tempus non inventa. III—V. frequens. VI. Rékás. VII. Jasenak, Leskovac. VIII. Buccari, Crkvenica.

Oxyptila E. Simon.

13. *horticola* C. L. Koch. — I. Budapest. III. Trencsén. IV. frequens. V. Borszék, Czod (46), Gyulafehérvár, ? Mező-Záh (19). VI. Langenfeld, VII. Varasd-Teplicz, Velebit. VIII. Buccari.

14. *grata* Thor. ? VIII. Buccari.

15. *trux* Blackw. — II. Felcsuth. III. Brankóhegy. V. Kolozsvár. VII. Risnjak, Vrata. VIII. Velebit (Visevica).

16. *sanctuaria* O. P. Cambr. — Rarissima. Unicum exemplum. II. N.-Kanizsa.

17. *rauda* E. Sim. *(obsoleta* Kulcz.) — III. Tátra (Tiefergrund). IV. Tokaj, S.-A.-Ujhely, Királyháza, Szerencs, Szinnaikő. V. Kolozsvár, Görgény Szt.-Imre. VIII. Fiume, Buccari.

18. *scabricula* Westr. — I. Budapest, Kecskemét, Ér-Mihályfalva. II. Szegszárd. IV. S.-A.-Ujhely, Velejte, Torna. V. Szamosujvár. VI. Langenfeld. VII. Velebit. VIII. Kriviput.

19. *nigrita* Thor. — I. Kalocsa. IV. S.-A.-Ujhely,

Szerencs, Torna, Körtvélyes. V. Pele, Szamosujvár. VI. Herkulesfürdő, Berzászka. VII. Diakovár.

20. *Blackwallii* E. Sim. — IV. S.-A.-Ujhely, Forró, Torna, Kassa (1), Szin. V. N.-Szeben. VII. Podsused, VIII. Buccari, Costrena-Santa-Lucia, Crkvenica.

21. *praticola* C. L. Koch. — In omnibus regionibus frequens.

22. *simplex* O. P. Cambr. — Rara species. II. Sopron, Badacsony. IV. Czéke, Homonna.
(*brevipes* Hahn. Hungaria [1]).

Xysticus C. L. Koch.

23. *bifasciatus* C. L. Koch. — II. Sopron, Kőszeg. III—V. frequens. VI. Mehadia (21), Orsova (21), Doroszló (21). VII—VIII. non inventus.

24. *alpicola* Kulcz. — III. Tátra in limite Hungariæ et Poloniæ in cacumine montis «Voloveczo».

25. *luctator* C. L. Koch (*impavidus* Thor.; ? *fucatus* Herm. 19). — I. A.-Dabas (21), Berkesz. II. Várpalota, Tolna, Tüskepuszta. IV. Mátra-Kékes, Kőkút, S.-A.-Ujhely, Sztropkó-Olyka. V. pluribus locis. VI. Báziás (14).

26. *gallicus* E. Sim. — Species valde rara, quæ in regione V. (Bodzai hegység) in cacumine Csukáshegy, in vallibus Babarunka et Döblény porro VI. Herkulesfürdő inventa est.

27. *Kochii* Thor. (*viaticus* C. L. Koch.) — I—VIII. communis.

28. *cristatus* Clerck. (*audax* C. L. Koch p. p., Seidlitz). — I—VII. communis. In regione VIII. non inventus.

29. *ferrugineus* Menge. — Rarissimus. IV. Szinna (Zemplén).

30. *pini* Hahn. — III—V. sat frequens. VI. Marillavölgy, Báziás, Plavisevicza. VII. Fužine, Vrata.

31. *lateralis* Hahn. (*lanio* C. L. Koch p. p., Seidl., Beck.) — I—VIII. frequens.

32. *erraticus* Blackw. — II. Pécs. V. Kolozsvár, Szamosujvár.

33. *ulmi* Hahn. — I—VII. sat frequens.

34. *sabulosus* Hahn. — I. Kecskemét. IV. Tokaj. V. Kolozsvár (21). VI. Grebenácz (iuv. ?) (? VIII. Fiume [15]).

35. *marmoratus* Thor. — I. Budapest, Dános, Kecskemét, Rákospalota (21), Kalocsa, Szeged. VI. Doroszló.

36. *Ninnii* Thor. — I. Farkasd, Monor, N.-Kőrös, Hadház. II. Almádi. IV. S. A.-Ujhely, Tokaj, Szádelő, Körtvélyes. V. Szamosujvár, Szucsák. VI. Herkulesfürdő. VIII. Fiume, Buccari, Meja, Portoré, Zengg.

37. *albomaculatus* Kulcz. — III. Pozsony, Ujbánya. IV. S. A.-Ujhely, Szomotor.

38. *striatipes* L. Koch. (*perogaster* Thor.) — I—V. modice frequens. VI. Peszák. VII. Eszék.

39. *acerbus* Thor. — I—VIII. non rarus.

40. *luctuosus* Blackw.— IV. Zboró. V. Görgény-Szt.-Imre. VII. Visevica. VIII. Vrata, Crni-Dabar.

41. *Kempelenii* Thor. (*X. frater* O. Herm.) —VI. Palánka (21), Oravicza, Trnovácz. VII. Diakovár. VIII. Fiume, Orehovica, Buccari.

42. *robustus* Hahn. — III. Trencsén. V. Szász-Veszszős (21). VII. Velebit.

43. *graecus* C. L. Koch. — Species meridionalis, in regione VIII. non rara.
(*X. graecus* C. L. Kochi-i, in VI. Oravicza captus [16], dubia est species, ut etiam *Thomisus graecus* ex VI. Herkulesfürdő [41]).

Synæma E. Simon.

44. *globosum* F. (*Thomisus rotundatus* Walck.) — I—VIII. frequens.

45. *ornatum* Thor. — I. Budapest, Örkény, Dános, Monor, Kecskemét, Kalocsa. V. Gyulafehérvár. VI. Deliblat.

Philodromus Walckenaër.

46. *dispar* Walck. (*limbatus* Sund.) — In omnibus regionibus frequens.

47. *margaritatus* Clerck. (*Thomisus laevipes* Hahn, *Artamus laevipes* C. L. Koch.) — II. Kám, Baranya-Szent-Márton. IV. frequens. V. Biharfüred, N.-Szeben (45), ? Mező-Záh (19), Kolozsvár, Borszék. VII. Diakovár.
var. *tigrinus* Deg. — III. Lucskifürdő. IV. Szinna, Bártfa. V. Borszék, Görgény-Szt.-Imre.

48. *poecilus* Thor. — Excepta regione. VIII., ubi non inventus, frequens.

49. *emarginatus* Schrk. (*Artamus griseus* C. L. Koch.) — I. Budapest, Kalocsa. III—IV. frequens. V. Szamosujvár, Görgény-Szent-Imre. VI. Berzászka, Herkulesfürdő. VII. Diakovár, Leskovac, Plitvica.

50. *histrio* Latr. —I. Kalocsa, Kecskemét, Dorozsma. II. Boglár et ad lacum Fertő.

51. *rufus* Walck. (*pellax* O. Herm.) — I. Kalocsa. II. Hédervár, Péth, Tüskepuszta. IV. Sátoralja-Ujhely, Tokaj, Őrmező, Bártfa, Szepsi, Körtvélyes. VI. Rékás, Herkulesfürdő, Orsova (21), Berzászka. VII. Diakovár, Plitvica. VIII. Buccari, Crkvenica.

52. *glaucinus* E. Sim. — ? VI. Jazova. VIII. Zengg.

53. *alpestris* L. Koch. — III. Tátra (Kriván et valles: Tarpataki, Szmrecsinai, Hlinszkai, Mengus-

falvi nominatæ), Tátrafüred, Kis-Kriván. IV. Pietroz. V. Brassó (Alpes Dongó).

54. *collinus* C. L. Koch. (*auronitens* Kulcz., Beck.) — I. Budapest. III—V. sat frequens. VII. Eszék, Fužine, Mrzla vodica, Plitvica. VIII. Zengg.

55. *aureolus* Clerck *verus*. — I. Budapest, Kecskemét, Pecze-Szent-Márton. II. Sopron, Kám, Zircz. III. Tátra. IV. Szinnaikő, Regete-Ruszka, Podhering. V. Kolozsvár, Borszék, Brassó, Nagy Baczon. VI. Orsova, Plavisevicza. VII. Eszék. VIII. Buccari.

var. *variegata* Kulcz. — I. Budapest, Budafok, Isaszeg. II. Felsuth. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj, Szerencs, Bocskó. V. Borszék, Kolozsvár, Felső-Bajom. VI. Orsova. VII. Diakovár.

subspec. *caespiticola* Walck. — I—VII. frequens. In regione VIII. rara videtur (Crkvenica).

subspec. *similis* Kulcz. — I. Kalocsa, Vencsellő, Tisza-Lök, Kecskemét. II. Zákány. III. Tarnócz, Léva. IV. Tokaj, Homonna, Czigánd, Győröcske, Munkács. V. Szamosujvár, Nagyszeben. VI. Orsova. VII. Eszék.

subspec. *pallens* Kulcz. — VI. Báziás. VII. Velebit. VIII. Buccari, St. Jelena, Crkvenica, Zengg.

subspec. *rufolimbata* Kulcz. — I. Budapest, Biharfüred. III. Szenicz. V. Mező-Szaká. VII. Báziás, Orsova. VII. Crni-Lug, Otočac, Žutalokva. VIII. frequens.

subspec. *marmorata* Kulcz. — I. Kalocsa, Cserépfalu. II. Székesfejérvár, Velencze, Felcsúth, Kám, Sopron, Esztergom. IV. Tokaj, S.-A.-Ujhely, Szőllőske. VII. Eszék, Diakovár.

Thanatus C. L. Koch.

56. *pictus* L. Koch. — I. Budapest, Vacs, Monor, Isaszegh, Kecskemét. VI. Duplaj.

57. *formicinus* Clerck. (*rhombiferens* Walck.) — I. Budapest, Kalocsa. II. Veszprém (21). III—V. frequens. VI. Doroszló (21). VIII. Vratnik.

58. *arenarius* Thor. — I. Budapest, Kalocsa. II. B. Szántód. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj, Szerencs, Szőllőske, Vinna. V. Szamosujvár, Mező-Szakál.

59. *vulgaris* E. Sim. (?). — II. Almádi, Pécs. IV. Tokaj, Körtvélyes. VI. Plavisevicza, Orsova. VIII. Fiume, Buccari, Zengg, Francikovac.

60. *sabulosus* Menge. — I. Kalocsa, Pecze-Szent-Márton. V. Torjai-Büdös. VI. Zlaticza. VII. Vrdnik. VIII. Velebit.

61. *striatus* C. L. Koch? — I. Kecskemét. II. Lelle. IV. Bacska. VII. Eszék.

Tibellus E. Simon.

62. *vittatus* Thor. — I. Kecskemét. II. Székesfejérvár. V. Gyulafehérvár. VIII. Buccari, Portoré, Novi, Zengg.

63. *parallelus* C. L. Koch. (*Thanatus oblongus* O. Herm. pro parte saltem, *propinquus* Beck.) — I—VII. frequens.

64. *oblongus* Walck. (*Thanatus trilineatus* C. L. Koch?) — I—II. frequens. IV—VI. non rarus. VIII. Fiume.

Fam. CLUBIONIDAE.

Micrommata Latreille.

1. *virescens* Clerck. (*smaragdula* Fabr., *Sparassus smaragdinus* Sund.) — In omnibus regionibus frequens.

var. *ornata* Walck. — Ut prior, sed minus frequ.

Olios Walckenaër.

2. *spongitarsis* Dufour. — Species meridionalis, haud frequens. VIII. Buccari, Crkvenica.

Clubiona Latreille.

3. *phragmitis* C. L. Koch. (*holosericea* O. Herm.) — I. Kalocsa, Püspökfürdő, Pecze-Szt-Márton. II. Almádi, Lepsény. IV. et V. non rara. VI. Temesvár, Doroszló (21).

4. *germanica* Thorell. — I. Vencsellő. III., IV. et V. frequens. VI. Csákova. VII. Eszék, Diakovár, Velebit.

5. *terrestris* Westr. — I. Budapest. IV. Tokaj (21). VI. Herkulesfürdő. VII. Vrata. VIII. Orehovica.

6. *frutetorum* L. Koch. — I. Kalocsa, Kecskemét, Hadház. IV. Tokaj, Királyhelmecz, Csap, Ujfürdő. V. Szamosujvár. VI. Plavisevicza, Orsova (Allion) (24). VII. Diakovár.

7. *alpicola* Kulcz. — III. Babia gora, Tátra, Korytnicza.

8. *lutescens* Westr. — I. Budapest (21), Kalocsa, Püspökfürdő. II. Zákány. III—VI. frequens.

9. *neglecta* Cambr. (*montana* L. Koch). — I. Kalocsa, Szt-Lőrincz. II. Felsuth, Sopron, Berhida. III. Körmöczbánya (21), Szenicz. IV. Tokaj, Szinna. V. Borszék. VI. Orsova (24), VII. Plitvica, Velebit.

10. *similis* L. Koch. — I. Kalocsa. II. Esztergom. V. Szamosujvár, Járavize, Retyezát, Tömös. VI. Herkulesfürdő, Drenkova, Uj-Moldova. VII. Lipik, Mrzla-Vodica.

11. *coerulescens* L. Koch. — I. Kecskemét. II. Zircz. III., IV., V. frequens. VI. Palánka (21), Orsova (23), VII. Diakovár, Gospić, Crni Dabar.

12. *pallidula* Cl. — I.—VII. frequens, in regione VIII. non inventa.

13. *reclusa* Cambr. — III. Barlangliget. IV. Mező-Laborcz (♀ ?). VI. Ruszkabánya.
14. *grisea* L. Koch. — I. Rákosfalva.
15. *trivialis* C. L. Koch. — III., V., VI., VII. non rara. VIII. Fiume.
16. *subsultans* Thorell. *(erratica* C. L. Koch, Sill.?) — In montibus regionum III. et V. non rara.
17. *corticalis* Walck. — I. Mátra (Saskő). III. Selmeczbánya. V. Brassó. VI. Herkulesfürdő. VII. Vrata *(var. concolor)*, Crnilug.
18. *brevipes* Bl. *(paradoxa* L. Koch., *fuscula* L. Koch.) — I. Kalocsa. II. Felcsuth, Sárvár. III. Tallós. IV. Széphalom, Homonna. VI. Báziás, Orsova (24). VII. Diakovár (iuv. ?). VIII. Fiume.
19. *marmorata* L. Koch. — II. Felcsuth, Tüskepuszta. III. Selmeczbánya. IV. S.-A.-Ujhely.
20. *diversa* Cambr. — I. Rézbánya. IV. Varanno (3).
21. *decora* Bl. — I. Budapest. VI. Orsova (Allion), ad antrum Veteráni, Szvinicza. VII. Risnjak.
22. *compta* C. L. Koch. — I—VII. frequens.
23. *subtilis* L. Koch. — I. Kalocsa. IV. Velejte. *(holosericea* Latr. — I. Biharmegye (39). V. Mező-Záh [19]).
(amarantha Walck. — V. Mezőzáh [19]).

Chiracanthium C. L. Koch.

24. *Mildei* L. Koch. — VI. Báziás, Orsova, Szvinicza (juv.), Herkulesfürdő (juvenis). VIII. frequens.
25. *punctorium* Villers. *(nutrix* Walck., *italicum* Can. et Pav.) — I. Budapest, Budafok, Vacs, Cserépfalu. II. Tolna, Felcsuth, Pécs. V. frequens. VI. Doroszló (21), Grebenácz? (14). VIII. Orehovica, Buccari.
26. *elegans* Thorell. — I. non rarum. II. Kőszeg; in regione III. et IV. non inventum. V—VIII. haud frequens.
27. *Seidlitzii* L. Koch. — IV. Kassa? (1). VIII. Crkvenica.
28. *erraticum* Wk. (?) *(carnifex* O. Herm. ?) — I. ? Rakamaz (21), Nyiregyháza, Nagyvárad. III. Turcsek. IV. S.-A.-Ujhely. V. ? Kolozsvár (21), Szatmár-Németi, Torda. VII. Diakovár. VIII. Velebit.
29. *Pennyi* Cambr. — I., II., IV—VII. sat freqens.
30. *pelasgicum* C. L. Koch. — VI. Deliblat, VIII. Fiume, Buccari.
31. *lapidicolens* E. Sim. *(? nutrix* O. Herm.) — IV. S.-A.-Ujhely, Nagy-Mihály, Szinna. V. Torda, ? Kolozsvár (21), ? Mező-Záh (21), ? Gyeke (21), ? Szász-Vesszős (21), ? Nagyszeben (21). VI. ? Doroszló (21).
32. *rupestre* O. Herm. — I. Majláth (21).
33. *efossum* O. Herm. — IV. S.-A.-Ujhely (21).
34. *cuniculum* O. Herm. — I. Selmeczbánya (21).

Trachelas L. Koch.

35. *nitescens* L. Koch. — VI. Báziás, Orsova (Allion).
36. *maculatus* Thorell. — VIII. Fiume, Orehovica, Buccari, St.-Jelena, Crkvenica, Novi, Zengg.

Liocranum L. Koch.

37. *rutilans* Thorell. — I. Bodony. II. Almádi. IV. Szinnaikő. VI. Herkulesfürdő, ad antrum Veterani. VII. Plitvica. VIII. Bakarac.
38. *rupicola* Walck. *(domesticum* Wid.) — I. Mátra. II. Almádi, Felső-Eörs, Sopron. III. Pozsony (21), Léva, Szenicz. IV. S.-A.-Ujhely, Körtvélyes. V. frequens. VI. Báziás, ad antrum Veteráni.
39. *tenuissimum* L. Koch (?). — VIII. Buccari (♀).
40. *Kochii* O. Herman. — III. Selmeczbánya.

Agroeca Westring.

41. *Haglundii* Thor. — I. Apatin (21). II. Kám, Sopron. III. Zsolna. IV. S.-A.-Ujhely, Varannó (3), Lelesz, Mező-Laborcz, Szinnaikő, Bártfa. V. Kolozsvár, Nagyszeben, Székely-Keresztúr, Szász-Vesszős (21).
42. *brunnea* Black. — IV. Szerencs. VI. Langenfeld.
43. *chrysea* L. Koch. — I. Budapest, Hadház. II. Sopron. IV. S.-A.-Ujhely, Szőllőske, Szerencs, Körtvélyes. V. Szamosujvár, Nagyszeben. VI. Temesvár, Orsova.
44. *striata* Kulcz. — I. Kalocsa (iuv.?). VI. Orsova (Allion).
45. *celans* Blackw. — VIII. Fiume, Martinšćica, Buccari.

Phrurolithus C. L. Koch.

46. *festivus* C. L. Koch. — I—VIII. frequens.
47. *minimus* C. L. Koch. — I. Budapest. II. Várpalota. IV. Bodrog-Szögh, Klastromalja. V. Nagyszeben. VII. Gospič, Velebit, Diakovár. VIII. Fiume, Buccari.
48. *Szilyi* O. Herm. — II. Almádi. IV. S.-A.-Ujhely, Szerencs. VI. Orsova (21), ad antrum Veterani.

Apostenus Westring.

49. *fuscus* Westr. — I—VI. sat frequens.

Zora C. L. Koch.

50. *spinimana* Sund. *(maculata* Blackw.) — I—VIII. frequens.
51. *manicata* ? E. Sim. — I. Budapest.
52. *nemoralis* Black. — I—VII. non rara.
53. *pardalis* E. Sim. — IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj, Körtvélyes. VI. Báziás.

Micaria Westring.

54. *Lucasii* Thor. *(formicaria* L. Koch.) — VI. Orsova (24).
55. *formicaria* Sund. — I. Budapest. IV. Tokaj, Monok. VII. Vrdnik.
56. *fulgens* Walck. — III. Selmeczbánya. IV. Szerencs, Széphalom, Dargó, Mező-Laborcz, Vinna, Szin, Kassa (1). VI. Orsova (24). VII. Velebit, Vrata.
57. *pulicaria* Sund. — I—VII. non rara.
58. *nivosa* L. Koch. (?) — III. Szepes-Béla. V. Zilah (Meszeshegy), Járavize.
59. *albostriata* L. Koch. — II. Tarcsa, Balaton-Szántód. IV. Terebes, Bártfa.
60. *radiata* L. Koch. — I. Gombos (21).
61. *hospes* Kulcz. *(montana* Kulcz.) — III. Tátra (Kriván).
62. *Rogenhoferi* O. Herm. — VI. Orsova (21). VII. Ogulin. VIII. Crkvenica, Kriviput.

Micariolepis E. Simon.

63. *dives* Luc. — I. Budapest, Kecskemét, Érmihályfalva. II. Várpalota. IV. S.-A.-Ujhely, Szerencs, Szőllőske. VIII. Fiume, Buccari, Crkvenica.

Anyphaena Sundevall.

64. *accentuata* Walck. — I—VIII. frequens.
65. *sabina* L. Koch. — VIII. Fiume, Buccari, Portoré. *(erratica* Herm. — V. Mező-Záh [19]).

Fam. AGALENIDAE.

Cybaeus L. Koch.

1. *angustiarum* L. Koch. *(tetricus* O. Herm.?) — III—V. frequens. VI. Herkules-fürdő.
2. *tetricus* C. L. Koch. — VII. Mostanje, Risnjak, Mrzla vodica.

Cicurina Menge.

3. *cicurea* C. L. Koch. — I. Budapest (Lipótmező). II. Kám, Zircz. III. Tátra. IV. non rara. V. Szegyesteli márványbánya barlang. VIII. Velebit.
4. *arietina* Thor. var. *macrophthalma*. — IV. Szinnaikő. VII. Vrata, Mrzla vodica. VIII. Orehovica, Buccari, Velebit.

Argyroneta Latreille.

5. *aquatica* Cl. — I. Budapest (21), Kalocsa, Mezőkovácsháza, Com. Bihar (38). IV. S.-A.-Ujhely, Lelesz, Királyhelmecz, Oroszvég. V. non rara. VI. Doroszló (21). VII. Diakovár.

Coelotes Blackwall.

6. *atropos* Walck. *(solitarius* L. Koch, O. Herm. Kulcz.; *C. atropos* O. Herm. pro parte saltem). I. III—VI. frequens.
7. *terrestris* (Wid) L. Koch *(atropos* Kulcz.). — III—V. frequens.
8. *inermis* L. Koch. — I—VIII. non rarus.
9. *roscidus* C. L. Koch? — Species dubia, quam auctore Cel. O. Herman citamus. V. Brátka szoros.

Cryphoeca Thorell.

10. *sylvicola* C. L. Koch. — In montibus regionum I—VII. frequens.
11. *carpathica* O. Herm. — III. Tátra, Kis-Kriván. IV. Pietroz.
12. *mirabilis*? Thor. — VIII. Orehovica, unicus ♂ iuv.

Tegenaria Latreille.

13. *parietina* Fourcr. — VIII. Fiume, Buccari, Crkvenica, Zengg.
14. *domestica* Cl., Sill.? *(ferruginea* E. Sim.). — II—V. frequens. VII. Fužine, Mostanje, Otočac, Velebit.
15. *campestris* C. L. Koch. — Occurrit in regionibus I—VI. VIII. sed non frequens.
16. *sylvestris* L. Koch. — I. ad antrum Pestere. III. Koritnicza. IV. Erdőbénye, Szinnaikő, Bártfa, Suliguli. VI. Herkules-fürdő. VII. Risnjak, Mrzla vodica. VIII. Buccari.
17. *pagana* C. L. Koch. — VIII. Buccari, Zengg.
18. *Derhamii* Scop. *(civilis* Walck., *domestica* Linn. E. Sim.). — I—VIII. frequentissima.
19. *torpida* C. L. Koch. II—VIII. non rara.

Agalena Walckenaër.

20. *labyrinthica* Cl. — I—VIII. frequentissima.
21. *similis* Keys. — I—VIII. frequens.

Textrix Sundevall.

22. *denticulata* Oliv. — I—VI. non rara.
23. *caudata* L. Koch. — VIII. Buccari, Buccarizza.
24. *albosignata* E. Sim. — VIII. frequens.

Hahnia C. L. Koch.

25. *elegans* Bl. — II. Almádi. IV. frequ. VII. Diakovár.
26. *nava* Bl. — IV. S.-A.-Ujhely. VIII. Tersato, Buccari.
27. *pratensis* E. Sim. — I. Budapest. IV. Dargó. V. N.-Szeben. VII. Medak.
28. *Chyzeri* Becker. — IV. Szinnaikő.*

* Léon Becker, Diagnoses de quelques Arachnides nouveaux. Comptes-rendus de la Société Entomolog. de Belgique. 1886.

Fam. PISAURIDAE.

Dolomedes Latreille.

1. *limbatus* Hahn. — III. Tátra. V. Tusnád.
2. *fimbriatus* Clerck. — I. Kalocsa.(?) IV. Körtvélyes, S.-A.-Ujhely, Tokaj, Munkács, Beregszász. V. Ilva, Gyulafehérvár.
3. *plantarius* Cl. (D. *fimbriatus* O. Herm. pro parte). — I. Berkesz. V. Gyulafehérvár.

Pisaura E. Simon.

4. *mirabilis* Cl. (*Ocyale murina* C. L. Koch.). — In omnibus regionibus communis.

Fam. LYCOSIDAE.

Aulonia C. L. Koch.

1. *albimana* Walck. — Non rara ; in regione III. non inventa.

Lycosa Latreille.

2. *agricola* Thorell. — I—VI. sat frequens.
3. *torrentum* E. Sim. — V. Székely Keresztúr (unica ♀)
4. *agrestis* Westr. (*L. poecila* O. Herm.?) — I—VIII. Frequens.
5. *monticola* Clerck. — I—VIII. Frequens.
6. *saltuaria* L. Koch. — Species alpina in III. montibus Carpaticis frequens.
7. *albata* L. Koch. — III. Tátra. VI. Arsana ad Bogoltin (?)
8. *cursoria* C. L. Koch. — (V. Nagyszeben ? [21]). VIII. Francikovac, Breze.
9. *palustris* Linn. — I—VII. frequens.
10. *profuga* O. Herm. — I. Rakamaz.
11. *proxima* C. L. Koch. — In Hungaria septemtrionali ad IV. S.-A.-Ujhely solum inventa (4), ceterum modice frequens.
12. *festinans* O. Herm. — VI. Doroszló (21).
13. *annulata* Thor. (*saccata* C. L. Koch, *hortensis* Becker). — I—VIII. Frequens.
14. *pullata* Clerck. — I. Budapest. II. Ad lacum Fertő, Zákány. III. Tátra, Selmeczbánya. IV. S.-A.-Ujhely, Torna, Körtvélyes. V. Borszék, Nagyszeben (44).
15. *prativaga* L. Koch. — I. Kecskemét, Kalocsa, Rakamaz, Pecze-Szt.-Márton. II. Tata, Lepsény, Lelle, Balaton-Szt.-György, ad lacum Fertő. IV. et V. sat frequens. VI. Apatin (21). VII. Velebit.
16. *riparia* C. L. Koch. — I. Pecze-Szt.-Márton. III. Tátra. IV. Vitrova hora, Pietroz. V. Alpes Dubrino, Retyezát, Borszék, Brassó. VI. Marillavölgy. VII. Ogulin.
17. *lugubris* Walck. (*Pardosa alacris* C. L. Koch.) I—VIII. communis.
18. *morosa* L. Koch. — I. Szt.-Endre. III. Tátra, Vág-Tepla, Budatin. IV. Széphalom, Mezőlaborcz, Homonna, Roskócz, Runyina, Orosz-Ruszka, Hoverla, Bártfa. VI. Uj-Moldova, Orsova. VIII. Buccari, Martinšćica, Crkvenica.
19. *amentata* Clerck. (*paludicola* C. L. Koch.). — I—VIII. Omnium frequentissima.
20. *paludicola* Clerck. (*fumigata* C. L. Koch.). — I. Budapest, Farkasd, Pecze Szt-Márton,? Biharmegye (38). II. Kám, Sopron. III. Lucski, Léva. IV. sat frequens. V. Szamosujvár, Szelistye, ? Mező-Záh (19), Kis-Disznód (45). VII. Eszék, Velebit.
21. *sordidata* Thor. — III. Tátra. IV. ad originem Tibisci (Okolo).
22. *ferruginea* L. Koch. — Species alpina. III. Tátra. IV. Hoverla. V. Bihar, Brassó (Mons Suller).
23. *lignaria* Clerck. — I. Alsó-Hámor (21) ; III. Szmrekovicza. IV. Szinnaikő, Sztropkó-Olyka, Suliguli ; V. Borszék, Brassó, Járavize, Mons Bucsecs.
24. *nigra* C. L. Koch. (*lignaria* O. Herm. pr. p.) Species alpina. III. Tátra. V. Felső-Árpás (varietas). — (V. Mező-Záh (19) species dubia).
25. *Wagleri* Hahn. — I. Ad antrum Fericsense. III. Budatin. IV. Mező-Laborcz, Ungvár, Visk. VI. Berzászka. VIII. Crkvenica (Vinodol).
26. *Entzii* Cbyz. — In litoribus lacuum salsorum ; V. Szamosfalva, Torda, Szamosujvár, Vizakna et ad Székely-Keresztúr.
27. *nebulosa* Thor. — I. Budapest, Kecskemét, Solt, Kalocsa, Vencsellő. II. Kenese, Szántód, Sopron. IV. S.-A.-Ujhely, Szőllőske, B.-Szögh, Győröcske, Munkács. V. Szamosujvár, Kutyfalva (21), Szász-Vesszős (21). VI. Pancsova, Grebenácz (14), Orsova (21).
28. *vittata* Keys. — V. Szamosujvár. VIII. Crkvenica.
29. *bifasciata* C. L. Koch. — VI. Herkulesfürdő (unica ♂).
(*blanda* C. L. Koch. — I. Com. Bihar (39). V. Transylvania [42]).
(*crassipes* Walck. — Hungaria [13]).

Tarentula Sundevall.

30. *nemoralis* Westr. (*Lycosa nivalis* C. L. Koch.) — I—VIII. non rara.
31. *miniata* C. L. Koch. — I—VI. sat frequens. VII. Velebit. — In regione VIII. non inventa.
32. *Apuliae* Walck. — VIII. Fiume.
33. *inquilina* Clerck. (*fabrilis* C. L. Koch p. p., ? Kulcz. [25]). — I. Budapest (21), Cserépfalu

Alsó-Hámor (21). III., IV., V. non rara. VII. Velebit. VIII. Vratnik.

34. *striatipes* Dolesch. — I. Budapest, Kecskemét. II. Sopron. III. Budatin, Ujbánya, Léva. IV. S.-A.-Ujhely, Erdőbénye, Szerencs, Szőllőske, Kassa. V. Szamosujvár, Szász-Vesszős (21), Gyulafehérvár. VII. Eszék.

35. *Eichwaldii* Thor. — I. Budapest. IV. Szerencs, Nagy-Mihály.

36. *albofasciata* Brullé. — VI. Orsova (21). VIII. Fiume, Tersato, Martinšćica, Orehovica, Buccari, Zengg.

37. *accentuata* Thorell. (*Lycosa fabrilis* Dol., *farinosa* O. Herm., *Tarantula inquilina* C. L. Koch). — I. Budapest, Vacs, Kalocsa. II. Sopron, Inota, Lelle, Pécs. III., IV., V., VI. sat frequens. VII. Eszék. VIII. Vratnik, Francikovac.

(Romaroy apud [4] = Komarócz in regione IV).

38. *cursor* Hahn. I. Budapest, Rákospalota (21). II. Sopron, ad lacum Balaton. IV. Tokaj. VI. Deliblat. VIII. Fiume, Francikovac.

39. *pinetorum* Thor. III. Tátra, (Chocs), Tátrafüred, Matlárháza, Barlangliget.

40. *trabalis* Clerck. (*Lycosa vorax* Sund.). — I. Budapest. II. Kám, Sopron, Tolna, Simontornya. III. Selmecz. IV. S.-A.-Ujhely, Velejte, Zboró. V. sat frequens. VII. Ogulin, Velebit. VIII. Fiume (21), Brezje.

41. *cuneata* Clerck. (*clavipes* C. L. Koch.) — I. Bpest, Fóth, Rézbánya. II. Sopron, N.-Kanizsa, Zircz. III., IV., V. frequens. VI. Doroszló (21).

42. *pulverulenta* Clerck. (*cuneata* C. L. Koch). — I. Budapest, Kalocsa, Kecskemét. II. Felcsuth, ad lacum Fertő. III., IV. frequens. V. Szamosujvár, ? Mező-Záh (19), Hátszeg, Borszék. VI. Korniareva, Temesvár, Doroszló (21), Csákova. VII. Eszék, Diakovár. (Romaroy apud [4] = Komarócz in regione IV.)

var. aculeata Clerck. — In montibus Carpaticis sat frequens. V. Tusnád. VII. Risnjak.

43. *solitaria* O. Herm. — I—VIII. passim, parum frequ.

44. *Cronebergii* Thor. (?) — I. Budapest (21). IV. S.-A.-Ujhely (21), Komjáti (21), V. Szász-Vesszős (21).

45. *radiata* Latr. (*Lycosa exornata* O. Herm.) I. Budapest, Isaszeg, Kalocsa. II. Csákvár, Badacsony, Almádi, Pécs. III. Léva, Ujbánya. IV. Szin. Komjáti (21). VI. Báziás, Plavisevicza, Herkulesfürdő, Orsova. VII. Otočac. VIII. frequens.

Trochosa C. L. Koch.

46. *Sulzeri* Pav. — I. Budapest, Kecskemét, Debreczen, Hadház. II. Kőszeg. III. Léva, Ujbánya. IV. S.-A.-Ujhely, Szőllőske, Csarnahó, Torna, Körtvélyes. V. Szamosujvár. VI. Báziás.

47. *Singoriensis* Laxm. — VI. Drenkova, Temes-Kubin (5).

48. *infernalis* Motsch. — I. Budapest, Csepel-Sziget, Dunakesz, Tahi-Tóthfalu, Gödöllő, Farkasd, Kecskemét, Kalocsa, Mátra, Gyöngyös, Pásztó. II. Felcsúth, Illok (21), Szántód, Badacsony, Tolna. III. Léva. IV. Kassa (5), Eperjes (5). V. Kolozsvár. VI. Orsova, Deliblat, Temes-Kubin, Pancsova (21), Doroszló (21), Zombor (21), Palánka (21), Grebenácz (14). VII. Eszék.

49. *hungarica* O. Herm. — II. Balaton-Füred (21).

50. *robusta* E. Sim. — I. Budapest, Visegrád, Rézbánya. II. Sopron, Almádi. III. Léva, Ujbánya, Zsolna. IV., V. pluribus locis. VI. Rékás, VII. Eszék.

51. *ruricola* Deg. — In omnibus regionibus frequens.

var. rustica Thor. — II. Almádi. VII. Eszék. VIII. Fiume, Buccari.

52. *terricola* Thor. (*Trochosa trabalis* C. L. Koch.) — I. Budapest, N.-Kőrös. II. Sopron. Kám, Zircz. III., IV., V. communis. VI. Doroszló (21), Apatin (21), Krassova (14), Temesvár, Orsova (21). VII. Diakovár, Gomirje. VIII. Buccari.

53. *lucorum* L. Koch (?) — I. Kecskemét (iuv.). VII. Gospič (iuv.)

54. *cinerea* Fabr. — I. Gyöngyös (21), Hadház, Nagyvárad (21). II. Badacsony. III. Tátra, Felfalu, Budatin. IV. S.-A.-Ujhely, B.-Szögh, Szomotor, Mező-Laborcz, Munkács. V. Kolozsvár (21), Kolozs, Szamosfalva, Kutyfalva (21), Retyiczel (21), Nagyszeben. VI. Herkulesfürdő, Orsova (21), Báziás, Oravicza (14), Krassova (14), Grebenácz (14).

55. *amylacea* C. L. Koch. — I. Pilis-Maróth. II. Sopron, Kőszeg. III. Alsó-Kubin, Turcsek, Zsolna. IV. Bártfa, Körtvélyes. V. Zilah, Szamosujvár, Kolozsvár, Verestorony. VI. frequens. VII. Mrzla vodica, Risnjak, Ogulin, Eszék. VIII. Fiume, Draga gornja.

56. *perita* Latr. — I. Budapest, Kecskemét, Hadház, Debreczen. II. Lelle. III. Javorina. IV. pluries lecta.

57. *variana* C. L. Koch. — VIII. Buccari, Crkvenica.

58. *stigmosa* Thor. — III. Rózsahegy (21). IV. Bártfa, Kassa, Varannó, Szomotor, Ungvár (40), Királyháza. V. Szamosujvár. VI. Eibenthal, Orsova (21).

59. *leopardus* Sund. — In omnibus regionibus non rara.

Pirata Sundevall.

60. *Knorrii* Scop. — I. Lunka. II. Pécs. III. Zsolna, Lucski. IV. Bártfa, Kassa (4). V. Czibles, Buzamező, Brassó. VI. Herkulesfürdő, Szászkabánya, Báziás, Uj-Moldova, Doroszló (21). VII. Mrzla vodica, Risnjak.
61. *hygrophilus* Thor. — I. Budapest, Pecze-Szt-Márton, Lunka. III. Felfalu, Korytnicza, Tátrafüred. IV. Bártfa, Szinna, S.-A.-Ujhely, Liszárnya. V. Buzamező, Nagyszeben, Hargita. VI. Temesvár.
62. *piscatorius* Clerck. (*Trochosa umbraticola* C. L. Koch.) — III. Csorbaitó. IV. S.-A.-Ujhely, Királyhelmecz. V. Kolozsvár, Torda, ? Déva (44).
63. *piraticus* Clerck. — I—VII. communis.
64. *latitans* Blackw. — In toto regno sat frequens.

Fam. OXYOPIDAE.

Oxyopes Latreille.

1. *lineatus* Latr. (*O. transalpinus* Walck.) — IV. S.-A.-Ujhely, Velejte. V. Brassó. VI. frequens. VII. Diakovár, Vrdnik, Podsused. VIII. Buccari, Crkvenica.
2. *ramosus* Panz. (*Sphasus variegatus* C. L. Koch.) — I. Budapest, Érmihályfalva, Nyiregyháza, Nagyvárad (21), Püspökfürdő. II. Simontornya. III. Kis-Kriván. IV., V. et VI. sat frequens. VII. Diakovár.
3. *heterophthalmus* Latr. (*O. lineatus* Doleschal ?, O. Herm., Friv.). — I. Budapest, Monor, Nagy-Kőrös, Kecskemét, Kalocsa, Szeged. IV. Monok, H.-Rokitó. V. Kolozsvár (21), Szamosujvár, Gyula-Fehérvár. VI. Doroszló (21), Bielo brdo, Grebenácz, Oravicza (14), Orsova (21). VII. Diakovár, Syrmia (13). VIII. Crkvenica, Novi, Zengg.

Fam. ATTIDAE.

Salticus Latreille.

1. *formicarius* Deg. — In omnibus regionibus passim non rarus.
2. *Simonis* O. Herm. — V. Feketető (21). — VIII. Fiume ?

Leptorchestes Thorell.

3. *berolinensis* C. L. Koch. (*L. formicaeformis* O. Herm.) — I. Budapest, Parád (21). II. Kám, Szántód, Almádi. III. Léva. IV. pluribus locis. VI. Apatin (21), Pancsova (21), Berzászka, Szvinicza, Orsova. VII. Illok (21), Diakovár. VIII. Fiume, Meja, Crkvenica.
4. *mutilloides* Luc. — VIII. Crkvenica, Novi.

Synageles E. Simon.

5. *venator* Luc. — IV. Körtvélyes, exemplum unicum.
6. *confusus* Kulcz. — IV. Győröcske (iuv. ?). V. Szamosujvár (?). VI. Mehádia.
7. *dalmaticus* Keys. — VIII. Buccari, Crkvenica.
8. *hilarulus* C. L. Koch. — I. Kalocsa.

Heliophanus C. L. Koch.

9. *cupreus* Walck. — In omnibus octo regionibus communis.
10. *aeneus* Hahn (*truncorum* C. L. Koch.) — I. ? Com. Bihar (39). IV. Tokaj, Vihorlát, Áj, Torna. V. Kolozsvár (4), Nagyszeben (46), Czód (46).
11. *dubius* C. L. Koch. — II. Ad lacum Balaton. III. Koritnicza. IV. Körtvélyes, Bocskó. V. Brassó. VII. Plitvica.
12. *patagiatus* Thor. — IV. O.-Ruszka. V. Kolozsvár.
13. *simplex* E. Sim. (*H. metallicus* E. Sim. p. p.) — I. Budapest. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj, Zombor, Oroszvég, Körtvélyes, Szín. V. Domuk. VI. non rarus. VIII. Fiume, Crkvenica, St.-Jelena.
14. *lineiventris* E. Sim. — I. Monor, N.-Kőrös. II. Ad lacum Fertő. VI. Grebenácz. VII. Risnjak. VIII. Buccari.
15. *Kochii* E. Sim. — I—VIII. Frequens.
16. *flavipes* Hahn. (*varians* E. Sim., Chyz. et Kulcz.). In omnibus regionibus frequens.
17. *auratus* C. L. Koch. — I—VIII. Frequens.
18. *melinus* L. Koch. — VIII. Fiume, Buccari, Crkvenica, Zengg.
19. *Cambridgei* E. Sim. — IV. Bártfa (4), Sárospatak (4), Czéke. VIII. Meja, Buccari, Crkvenica, Zengg.
(*exsultans* E. Sim. VI. Orsova = *H. auratus.*)

Epiblemum Hentz.

20. *scenicum* Clerck. (*Calliethera histrionica* C. L. Koch.). — Species in regionibus. I—VII. communis, in regione Adriatica. (VIII.) non inventa.
21. *mutabile* Lucas. — VI. Orsova (47). VIII. Buccari, Zengg.
22. *cingulatum* Panz. — III. Lucski. V. Szamosujvár, Kolozsvár, Székely-Keresztúr, Hátszeg, Görgény-Szent-Imre, Borszék. VI. Doroszló (21), Orsova (47). VII. Eszék.
23. *zebraneum* C. L. Koch. (*E. tenerum* O. Herm). — I—VIII. Non rarum.

Pseudicius E. Simon.

24. *picaceus* E. Simon. — VIII. Fiume.
25. *encarpatus* Walck. — In omnibus I—VIII. regionibus, sed haud frequens.

26. *epiblemoides* Chyzer. — IV. Szomotor. VI. Uj-Moldova. VII. Eszék.

Icius E. Simon.

27. *striatus* Walck. — VIII. Fiume, Tersato.

Hyctia E. Simon.

28. *Nivoyi* Luc. — I. Kecskemét. IV. S. A.-Ujhely, Varannó. VI. Temesvár.

29. *Canestrinii* Can. et Pav. — I. Kalocsa, Kecskemét. II. Almádi. V. Szamosujvár, Brassó. VI. Doroszló (21), Apatin (21).

Marptusa Thorell.

30. *muscosa* Clerck. (*Attus tardigradus* Walck.) Frequens; in regione VIII. non inventa.

31. *pomatia* Walck. — In regionibus IV. V. VI. non rara. I. Monor (4).

32. *radiata*. Grube. — I. Kalocsa. II. Simontornya. IV. S.-A.-Ujhely, K.-Helmecz, Lelesz, Varannó, Szatmár. V. M.-Záh (21), VI. Doroszló (21), Fehértemplom, Peszák.

Dendryphantes C. L. Koch.

33 *rudis* Sund. — In montibus omnium regionum frequens.

34. *nidicolens* Walck. — Frequens.

Menemerus E. Simon.

35. *semilimbatus* Hahn. — VI. Orsova (47). VIII. Fiume, Buccari, Portoré, Selce, Crkvenica, Zengg.

Philaeus Thorell.

36. *chrysops* Poda. (*Aranea sanguinolenta* L.) — I. Budapest, Kecskemét, Bükkhegység (21), Rákos-Palota (21). II. Almádi, B.-Tomaj, Veszprém (21), Szántód, Bal.-Füred (21). III. Szumjacz, Demanova (21). IV. Czéke, Torna, Tokaj (21). V. Pele, Kolozsvár, Brassó. VII. Ogulin, Velebit. In regionibus VI. et VIII. frequens.

var. *bilineata* Walck. — I. Kalocsa, Szeged, Isaszeg. II. Simontornya. V. Szamosujvár, Kutyfalva (21). VI. Palánka (21), Peszák.

37. *bicolor* Walck. (*Dendryphantes mucidus* C. L. Koch.) — I—VIII. frequens.

Attus Walckenaër.

38. *pubescens* F. — I—VIII. frequens.

39. *terebratus* Clerck. — V. Szamosujvár.

40. *Daminii* Chyzer. — VIII. Buccari, Crkvenica, Selce.

41. *alpicola* Kulcz. — VII. Risnjak, Crnilug.

42. *floricola* C. L. Koch. — I. Tiszafüred, Kalocsa. II. Nagy-Kanizsa, Balaton-Szántód. IV. sat frequens. V. Szász-Vesszős (21), N.-Szeben (20). VI. Báziás. VII. Eszék.

43. *rupicola* C. L. Koch. — In montibus Carpaticis communis.

44. *Zimmermannii* E. Simon. — I. Kecskemét. II. Lelle. IV. Bacska.

45. *caricis* Westring. — IV. Bacska, exemplum unicum.

46. *Dzieduszyckii* L. Koch. (*Wagae* E. Sim.). — I. Budapest, Kecskemét. II. Felsuth, Sopron. III. Csorbaitó (21), Ujbánya. IV. Frequens. V. Gyulafehérvár. VI. Temesvár, Hernyakova. VII. Eszék.

47. *saxicola* C. L. Koch. — III. Tátra, Chocs, Szmrekovicza. IV. Suliguli. V. Borszék. VII. Risnjak.

48. *distinguendus* E. Sim. — II. Kenese, Lelle. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj, Mád, B.-Szerdahely, Szomotor, Szinnaikő.

49. *hungaricus* Kulcz. — I. Budapest (Sashegy), Kalocsa, Kecskemét, Ér-Mihályfalva. VI. Deliblat.

50. *saltator* E. Sim. — I. Budapest, Ér-Mihályfalva. II. Lelle. IV. S.-A.-Ujhely, Erdőbénye, Szomotor, N.-Tárkány.

51. *penicillatus* E. Simon. — I. Budapest. II. Almádi. IV. S.-A.-Ujhely, Szőllőske. VII. Plitvica. VIII. Buccari, Buccarizza, Costrena St. Lucia, Meja, Crkvenica.

(*viridimanus* Dolesch. — Hungaria [13]).

Yllenus E. Simon.

52. *arenarius* E. Simon. — I. Kecskemét. V. Transylvania (t. E. Simon.)*

53. *vittatus* Thor. — I. Monor, Kecskemét, Szeged, Dános.

54. *Horváthii* Chyzer. — I. Kalocsa, Kecskemét.

Aelurillus E. Simon.

55. *V-insignitus* Clerck. (*Salticus quinquepartitus* Hahn, *Aelurops insignita* Beck.) — I. Budapest. II. Lelle. IV. Szomotor. V. Kolozsvár, Nagyszeben (43), ? Mező-Záh (19). VIII. Zengg.

var. obsoleta Kulcz. — I. Budapest, Szt.-Endre, Visegrád. II. Inota. VIII. Carlopago?

56. *gilvus* E. Sim. — II. Veszprém (21).

57. *simplex* O. Herm. — VI. Doroszló (21).

58. *festivus* C. L. Koch. (*Euophrys striata* C. L. Koch.). — I. Budapest, Szendrő, Com. Bihar (39). II. Almádi, Tolna. IV. Frequens. V. Mező-

* E. Simon. Monographie des espéces européennes de la famille des Attidae. Ann. Soc. entom. France, ser. 4. vol. VIII.

Záh (19), Kolozsvár (21), Sebesváralja (21), Szamosujvár, Hátszeg, Görgény. VI. Zlaticza.

59. *M-nigrum* Kulcz. — I. Budapest (Sashegy).

Phlegra E. Simon.

60. *Bresnieri* Luc. — VI. Orsova (47). VIII. Fiume, Martinšćica, Jablanac, Carlopago.

61. *fasciata* Hahn. — I. Visegrád, Hatvan, Érmihályfalva. II. Almádi, Sopron. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj, Szerencs, Szöllőske, Kassa, Szin (?), Szatmár. V. Szamosujvár, Torda, F.-Bajom, Hátszeg. VI. Herkulesfürdő, ad antrum Veterani. VII. Diakovár. VIII. Fiume.

62. *fuscipes* Kulcz. — I. Budapest (Sashegy). IV. Tokaj. VIII. Francikovac.

Pellenes E. Simon.

63. *tripunctatus* Walck. (*Attus crucigerus* Walck.) — I. Budapest (21). II. Sopron. III. Trencsén. IV. S.-A.-Ujhely, Mád, Vinna, Körtvélyes. V. Kapnikbánya, Kolozsvár. VIII. Francikovac.

64. *Bedelii* E. Sim. (*Attus Brassayi* O. Herm., *Pellenes Bedelii* Chyz. et Kulcz. pro parte : ♂ neque ♀). I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa. VI. Angustiae Danubii : Kazan ; Orsova (21). — Juniores, pro parte saltem huius speciei : I. Szeged, Érmihályfalva. II. Felcsuth. IV. S.-A.-Ujhely, Szőllőske, B.-Szerdahely. V. Szamosujvár. VI. Deliblat. VII. Plitvica. VIII. Meja.

Ergane Keyserling.

65. *iucunda* Luc. — In regione VIII. Frequens.

66. *laetabunda* C. L. Koch. — I. Budapest. II. Sopron. III. Léva. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj, Szomotor, Körtvélyes. VI. Orsova (47).

67. *falcata* Clerck. (*Attus abietis* Dolesch.) — In regionibus I—VII. valde frequens, in regione VIII. rara videtur, Crni Dabar, Velebit (Vaganski Vrh.).

68. *arcuata* Clerck. (*grossipes* de Geer, *Marpissa grossa* C. L. Koch?, *Attus farinosus* O. Herm., *A. falcatus* O. Herm. pro parte). — Communis ; in regione VIII. non inventa.

Maevia C. L. Koch.

69. *castriesiana* Grube. (*M. multipunctata* E. Sim. Chyz. et Kulcz., *M. Pavesii* E. Sim.). — I. Kecskemét, Kalocsa. IV. Körtvélyes, Torna. VI. Báziás, Plavisevicza, Orsova, Temesvár. VII. Ruma, Diakovár.

Cyrba E. Simon.

70. *algerina* Luc. VI. Kazán, Orsova (47).

Euophrys C. L. Koch.

71. *erratica* Walck. (*E. tigrina* C. L. Koch., O. Herman pro parte ?) — In regionibus I—VIII. non rara.

72. *confusa* Kulcz. (*Attus erraticus* O. Herm. p. p. saltem). — I. Budapest, Szt.-Endre, Kalocsa, Visegrád. II. Almádi, Felső-Eörs, Inota, Badacsony. III. Aggtelek, Léva. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj, Szerencs, Szőllőske, Zboró. VI. Báziás, Orsova. VII. Eszék. VIII. Fiume, Buccari, Crkvenica, Portoré, Carlopago.

73. *finitima* E. Sim. — II. Pécs. IV. S.-A.-Ujhely. VIII. non rara.

74. *imitata* E. Sim. — VIII. non rara.

75. *frontalis* Walck. — I—VIII. non rara.

76. *rufibarbis* E. Sim. VII. Plitvicza. VIII. non rara.

77. *aequipes* O. P. Cambr. — I. Visegrád, Kecskemét. II. Simontornya. IV. B.-Szerdahely. VII. Lipik.

78. *monticola* Kulcz. (*petrensis* Kulcz. [25].) — III. Tátra, Babia gora.

79. *Thorellii* Kulcz. — IV. S.-A.-Ujhely. (*petrensis* Koch. — I. Com. Bihar (39). V. Nagy-Szeben [20]).

Chalcoscirtus Bertkau.

80. *infimus* E. Sim. — VIII. Martinšćica, Crkvenica, Zengg.

Neon E. Simon.

81. *Rayi* E. Sim. — VIII. Martinšćica.

82. *reticulatus* Blackw. — In montibus humilioribus (III—VII.) non rarus. VIII. Crkvenica, Velebit (Vaganski vrh).

83. *pictus* Kulcz. — I. Budapest (Lipótmező). IV. Torna, Körtvélyes. VI. Herkulesfürdő, Orsova, Zlaticza. VIII. Buccari, Martinšćica, Orehovica.

Neaetha E. Simon.

84. *membrosa* E. Sim. (?) — VIII. Crkvenica.

Oedipus Menge.

85. *aenescens* E. Sim. — I. Visegrád. II. Lelle. IV. Varannó.

Ballus C. L. Koch.

86. *depressus* Walck. (*brevipes* Hahn.) — In omnibus regionibus communis.

Conspectus familiarum, generum et specierum.

	Genus	Species
Avicularidæ	1	2
Atypidæ	1	4
Uloboridæ	2	2
Zoropsidæ	1	1
Dictynidæ	6	24
Eresidæ	1	1
Filistatidæ	1	2
Sicariidæ	1	1
Dysderidæ	3	13
Drassidæ	10	60
Zodariidæ	1	5
Urocteidæ	1	1
Pholcidæ	3	4
Theridiidæ	14	63
Argiopidæ	70	240
Mimetidæ	2	4
Thomisidæ	15	64
Clubionidæ	13	65
Agalenidæ	9	28
Pisauridæ	2	4
Lycosidæ	5	64
Oxyopidæ	1	3
Attidæ	26	86
	189	741

Summa

Familiarum	23
Generum	189
Specierum	741

INDEX GENERUM.

Ordo. ACARINA.

Auctore Josepho Jablonowski.

Az atkákkal hazánkban behatóan senki sem foglalkozott. Az alább közölt fajokat dr. Karpelles Lajos értekezése (1. 2.) alapján állitottam össze. Néhány fajt felsorol dr. Margó Tivadar is (7.). A *Phytoptus vitis* Land ismeretéhez dr. Szaniszló Albert (3.) szolgáltatott adatokat; a gubacsalkotó atkákat Szépligeti Győző (4. 5.) sorolta el s végre nehány fajt, kettőnek diagnózisával F. Supino foglalt össze.

Hisce animalculis nemo Hungarorum operam navavit et species quas hic enominatas invenis, secundum Clarissimi L. Karpelles publicationes (1. 2.) enumeravi. Nonnullas species enumeravit dr. Th. Margó (7.) Ad cognitionem *Phytopti vitis* Land, attulit notitias dr. A. Szaniszló (3.). Acaros gallificos enumeravit Gy. Szépligeti (4. 5.). Deinde enumerationem nonnullarum et diagnosin duarum specierum dederat F. Supino.

LITTERATURA.

1. Dr. L. Karpelles «Adalékok Magyarország atkafaunájához.» (Mathem. és Természettudományi Közlemények. Kiadja a M. T. Akadémia, Budapest XXV. 1893).
2. — Egy érdekes uj atkafaj. (Mathemath. és Természettud. Értesitő. Kiadja a M. Tud. Akadémia, Budapest, IV. 1886.)
3. Dr. Szaniszló Alb. (A Phytoptus Vitis Landois életmódjához, különösen annak áttelelési és kártékonysági kérdéséhez. (Term.-rajzi füz., Budapest, IV. 1880. p. 196.)
4. Szépligeti Gy. Adatok a gubacsok elterjedésének kérdéséhez. (Természetrajzi Füzetek. VIII. 1890. p. 12.)
5. — Adatok a magyarországi gubacsok ismeretéhez. Term.-rajzi Füz. XVIII. 1895. p. 214).
6. Felice Supino, Contribuzione all'acarofauna dell' Ungheria. In Bulletino della Società Veneto-Trentina di Scienze Naturali. Tom. V. 1894. No. 4.)
7. Dr. Margó F. Budapest és környéke állattani tekintetben. Budapest, 1879.

I. ACARINA TRACHEATA.

Fam. ORIBATIDAE.

Pelops Koch.

1. *torulosus* Koch. — V. Tusnád.
2. *phaeonotus* Koch. — VI. Zombor.
3. *occultus* Koch. — VII. Podsused.

Oribata Latr.

4. *homodactyla* Karp. — IV. Czéke, Nagy-Mihály, Gálszécs, Visk, Pop-Iván, Kis-Majtény. — V. Kolozsvár.
5. *distincta* Karp. — IV. In cacumine montis Pop-Iván.
6. *globula* Koch. — III. Tátra. VII. Lipovljani, Diakovár, Gospić, Medak.
7. *alata* Herm. — I. Budapest, Kecskemét. IV. S.-A.-Ujhely, Czéke et in montibus Beszkid.
8. *pyriformis* Nic. — VII. Podsused.
9. *agilis* Nic. — VII. Lipovljani.
10. *punctum* K. — I. Kecskemét. IV. Tátra. VII. Kukljić, Vaganski vrh. (Mons in Velebit). VIII. Velebit.

Tritia K.

11. *decumana* Berl. — VII. Gospić. VIII. Velebit.

Belba Heyd.

12. *mirabilis* Karp. — IV. S.-A.-Ujhely, Czéke. V. Peér. VII. Podsused.
13. *geniculata* L. — VII. Gospić.

Nothrus Koch.

14. *corticalis* Karp. — VIII. Sušak.
15. *horridus* Herm. — IV. Czéke.

Cepheus Koch.

16. *tegeocranus* Herm. — IV. Czéke.
17. *minutus* Koch. — I. Farkasd, Kun-Madaras. VII. Lipovljani.
18. *latus* Nic. — VII. Podsused.

Oppia Koch.

19. *hungarica* Karp. — V. Tusnád.

Hoplophora Koch.

20. *ferruginea* Koch. — I. Budapest. IV. Kassa.*
21. *dasypus* K. — VII. Montes Karst.

Damaeus Koch.

22. *bulbipes* Karp. — I. Farkasd.
23. *auritus* K. — III. Tátra.
24. *geniculatus* L. — VII. Gospić.

Eremaeus Koch.

25. *oblongus* Koch. — I. Farkasd, Bánhegyes. VII. Lipovljani.
26. *tibialis* Nic. — VII. Podsused.

Leiosoma Nic.

27. *ovatum* Koch. — III. Fekete-Balog (Szikla).
28. *lativentre* Nic. — VII. Podsused.

Hermania Nic.

29. *oblonga* Karp. — I. Farkasd, Kecskemét, Fehértemplom, Zombor.

Fam. GAMASIDAE.

Gamasus Latr.

1. *hirtus* Kram. — IV. Szerencs. V. Tusnád.
2. *quinquespinosus* Kram. — II. Sóly. IV. Czéke, Szomotor, Királyháza et in cacumine montis Pop-Iván. V. Peér. VII. Sušak.
3. *attenuatus* Koch. — I. Kun-Madaras. IV. S.-A.-Ujhely.
4. *Krameri* Karp. — IV. Kis-Majtény. V. Sztána.
5. *multispinosus* Karp. — IV. Visk, Mons Pop-Iván. Czéke.
6. *fucorum* De Geer. — I. Kecskemét.
7. *crassipes* L. — III. Tátra. IV. Gospić, Medak, Vaganski vrh. (Mons in Velebit). Kukljić. VII. Velebit (Crni Dabar).
8. *magnus* K. — VII. Paganist (Antra Milinkovic).
9. *coleoptratorum* Latr. — I. Budapest. VII. Vaganski vrh. (Mons in Velebit).
   var. *lunaris* Berl. — I. Kecskemét. In sabuletis præcipue in larvis et imaginibus *Polyphyllae fullonis* ubique frequens.
10. *similis* Kram. — IV. Komjáti.

Antennophorus Haller.

11. *Uhlmanni* Hall. — IV. Körtvélyes (Abauj).
12. *calcaratus* Koch. — VII. Kukljić. Sveto-Brdo.
13. *hungaricus* Sup. — VII. Kukljić, Sveto-Brdo.

Uropoda De Geer.

14. *tridentina* Can. et Fanz. — I. Farkasd, Kecskemét. IV. Szerencs.
15. *ovalis* Koch. — II. Pécs. IV. Komjáti.
16. *scutulata* Megnin. — I. Budapest.
17. *vegetans* de Geer. — In scarabæis frequens: I. Budapest. IV. Körtvélyes, Komjáti, Nagy-Mihály. VI. Fehér-Templom.
18. *tecta* Kram. — IV. Komjáti.

Trachynotus Kram.

19. *simplex* Karp. — IV. Visk.

Dermanyssus Dugès.

20. *hirundinis* Herm. — V. Tusnád. (In nido *Chelidonis urbicae.*)
21. *avium* De Geer. — I. Budapest (in nido *Fringillae canariae*).

Diplotaspis Berlese.

22. *arcuata* Kol. — IV. S.-A.-Ujhely.

Hypoaspis Canestr.

23. *aculeifer* Can. — I. Ó-Buda, Farkasd.

Holotaspis Kolen.

24. *tridentinus* Can. — I. Szendrő.

Nicoletiella Can.

25. *cornuta* Can. et Fanz. — IV. Czéke, Visk. VII. Podsused.
26. *lutea* Kr. — VII. Medak.

Pteroptus Duf.

27. *vespertilionis* Herm. — I. Budapest in *Plecoto aurito.*

* Dr. A. Szaniszló (Orvos Term.-tud. Értesitő. Kolozsvár. V. (1880). p. 35—44. Hoplophoram arctatam (an Riley ?) in V. Kolozsvár copiose degere affirmat; Dr. Karpelles l. c. (1. p. 13) vero, qui ex Hungaria plura Hoplophoræ arctatæ similia et in radicibus Vitis viniferæ viventia exempla vidit, hanc speciem nostræ faunæ incertam esse censet.

28. *myoti* Kol. — I. Budapest in *Vespertilione murino.*

Fam. BDELLIDAE.

Bdella Latr.

1. *maculata* Karp. — V. Majád.
var. *pilosa* Karp. — I. Kecskemét.
2. *longipalpis* Karp. — IV. In monte Pop-Iván.
3. *lapidaria* Kram. — I. Pócsmegyer.
4. *arenaria* Kram. — VII. Lipovljani.
5. *crassirostris* Kram. — I. Kecskemét.
6. *vulgaris* H. — I. Budapest.
7. *nigerrima* Can. et Fanz. — VII. Sveto-Brdo.
8. *Birói* Sup. — VII. Medak.

Ammonia K.

9. *leucocephala* Koch. — III. Comit. Liptó.

Fam. RHYNCHOLOPHIDAE.

Smaridia Dugès.

1. *hungarica* Karp. — V. Tusnád.

Smaris K.

2. *expalpis* K. — VII. Medak.

Megamerus Dugès.

3. *ocellatus* Karp. — IV. Czéke.

Rhyncholophus Dugès.

4. *trimaculatus* Herm. I. Budapest. III. Tátra. IV. Varannó. V. Peér. VII. Gospić. VIII. Buccari.
5. *cinereus* Dugès. — IV. S.-A.-Ujhely. V. Peér.
6. *electoralis* Koch. — I. Szarvas. IV. Visk. Mons Pop-Iván.
7. *phalangioides* De Geer. — I. Kecskemét. IV. Pop-Iván.
8. *longus* Karp. — VI. Zenta. VIII. Fiume.
9. *papillosus* Herm. — V. Peér. VIII. Carlopago.
10. *crocatus* Koch. — VI. Duplaj. VII. Szt-Péter. (Gospić), Vaganski vrh.
11. *miniatus* Herm. — VII. Kukljić, Buccari.
12. *nemorum* Koch. — VII. Medak.
13. *Cavannae* Berl. — VIII. Buccari.

Fam. TROMBIDIIDAE.

Trombidium Latr.

1. *holosericeum* L. — I. Budapest, Nyiregyháza, Nagy-Várad. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj.
2. *fuliginosum* Herm. — I. Békés-Gyula. II. Sárvár.
3. *phalangii* De Geer. — I. Budapest.

Ottonia Kram.

4. *trigona* Herm. — I. Farkasd. IV. S.-A.-Ujhely.
5. *spinosa* Can. — VII. Medak.

Fam. EUPODIDAE.

Eupodes Koch.

1. *variegatus* Koch. — I. Mezőkovácsháza. VIII. Buccari.

Scyphiodes Karp.

2. *maxillatus* Karp. — VI. Baziás. VII. Podsused.

Tydeus Koch.

3. *sulcatus* Karp. — I. Budapest.
4. *velox* Koch. — II. Simontornya.

Fam. TETRANYCHIDAE.

Tetranychus Duf.

1. *telarius* Lin. — Frequens.

Fam. HOPLOPIDAE.

Hoplopus Can. et Fanz.

1. *sculptus* Karp. — VIII. In valle fluminis Fiumara dicta.

Fam. ARGASIDAE.

Argas Latr.

1. *reflexus* Fabr. — I. Budapest, Kun-Szt-Madaras. VI. Temesvár.

Fam. IXODIDAE.

Ixodes Latr.

1. *reduvius* Charl. — *(ricinus* auct). I. Budapest, Nyiregyháza. II. Sárvár. IV. S.-A.-Ujhely, Sárospatak, Bereczki, Vihorlát. V. Tusnád-Szántó.
2. *crenulatus* Koch. — IV. Bereczki, Czéke.
3. *hungaricus* Karp.— IV. Torna, Szőllőske. V. Tusnád. VII. Fehértemplom.*

Rhipicephalus Can. et Fanz.

4. *bursa* Can. et Fanz. — VII. Skrljevo.

Fam. ERYTHRAEIDAE.

Erythræus Latr.

1. *parietinus* Herm. — I. Budapest.
2. *ruricola* Dug. — VII. Szt. Péter (Gospić). VIII. Carlopago.

* L. Karpelles in p. 43. opusculi citati (1) Dermacentrem pardalinum a Kochio secundum specimina hungarica descriptum cum Ixode hungarico eandem speciem esse censet.

Actineda Koch.

3. *pallescens* Koch. — I. Kecskemét.
4. *vitis* Schr. — I. Farkasd, Kecskemét, Budapest. II. Pécs, Szegzárd. VII. Vaganski vrh. (Mons in Velebit), Gospić, Sveto-Brdo, Kukljić. VIII. Buccari.

Fam. CHEYLETIDAE.

Cheyletia Haller.

1. *laureata* Hall. — I. Farkasd.

Cheyletus Latr.

2. *eruditus* Schr. — V. Drassó.

Fam. TARSOMENIDAE.

Tarsomenus Can. et Fanz.

1. *intectus* Karp. — I. Budapest.

Fam. MYOCOPTIDAE.

Myocoptes Clap.

1. *musculinus* Koch. — I. Budapest.

Fam. HYDRACHNIDAE.

Hydrachna Müller.

1. *globosa* Müll. — VI. Doroszló (in palude Misztonga).
2. *cruenta* O. Fr. Müll. — I. Budapest.

Eylais Latr.

3. *extendens* Latr. — IV. Szőllőske.

Limnochares Kram.

4. *holosericeus* Latr. — I. Budapest.

Atax Bruzel (Fabr.).

5. *spinipes* Fabr. — IV. S.-A.-Ujhely.
6. *ypsilophorus* Bonz. — I. Budapest.

II. ACARINA ATRACHEATA.

Fam. TYROGLYPHIDAE.

Glyciphagus Hering.

1. *cursor* Gerv. — V. Tusnád.
2. *prunorum* Hev. — I. Budapest, Nagyvárad.
3. *fecularum* Guér. — I. Budapest, Nagyvárad.

Tyroglyphus Latr.

4. *Mégninii* Hall. — I. Kun-Madaras. V. Medgyes.
5. *Canestrinii* Karp. — I. Farkasd.
6. *longior* Gerv. (farinæ Latr.). — I. Budapest. III. Com. Liptó.
7. *siro* Gerv. — I. Budapest. Frequens.

Fam. NODIPALPIDAE.

Nodipalpus Kap.

1. *ulmi* Karp. — I. Farkasd.

Fam. SARCOPTIDAE.

Sarcoptes Latr.

1. *scabiei* Dug. — Occurrit.
2. *suis* Gerl. — Occurrit.
3. *cati* Herm. — Occurrit.

Symbiotes Gerlach.

4. *equi* Gerl. — I. Budapest.

Fam. DEMODICIDAE.

Demodex Sim.

1. *folliculorum* Sim. — Non rarus.

Dermatodectes Delaf. et Bourg.

2. *equi* Herm. — I. Budapest.

Fam. PHYTOPTIDAE.

Phytoptus De Geer.

1. *pyri* Scheut. In foliis *Pyri communis* frequenter occurrit. III. Bazin (in *Sorbo*).
2. *mali* Am. — In foliis *Pyri communis* frequens.
3. *marginalis* Am. — In foliis *Pyri communis*.
4. *mollis* Br. — In foliis *Pruni spinosae*.
5. *hypocratiformis* Br. — I. Monor.
6. *attenuatus* Br. — III. Tátrafüred.
7. *populi* Nal. — I. Budapest. II. Balatonfüred.
8. *tristriatus* Nal. — I. Budakesz.
9. *geranii* Can. — I. Budapest.
10. *tiliae* Karp. — Communis.

11. *inglandis* Karp. — II. Simontornya.
12. *vitis* Land. — Ubique communis.
13. *quercus* Karp. — II. Simontornya.
14. *fraxini* Karp. — In foliis *Fraxini* frequens.
15. *longior* Nal. — I. Budapest.
var. *drabae* Nal. — I. Budapest, Parád.
16. *cotoneastri* Can. — III. Borosznó.
17. *chondrillae* Can. — I. Budapest, Csepel.
18. *macrotrichus* Nal. — In *Acere campestri* communis.
19. *xylosti* Can. — III. Borosznó.
20. *viburni* Nal. — Frequens.
21. *brrviounctatus* Nal. — I. Budapest.
22. *Thomasinii* Nal. — I. Csepel.
23. *macrochelus* Nal. — In *Acere compestri* communis.
24. *macrorhynchus* Nal. — I. Budapest. II. Pilis-Szt.-Kereszt (Dobogókő), Balatonfüred.
25. *laevis* Nal. — III. Borosznó, Tátrafüred, Dobsina.
26. *artemisia* Can. — I. Budapest.
27. *stenaspis* Nal. — I. Budapest.
28. *nervisequus* Can. — I. Budapest.
29. *anthonomus* Nal. — I. Budapest.
30. *salvie* Nal. — In foliis *salviarum* communis.
31 *quercinus* Can. — I. Budapest, Mátra. II. Balatonfüred.
32. *teucrii* Nal. — In foliis Teucrii chamædris frequ.

Phyllocoptes Nal.

33. *populinus* Nal. — I. Budapest. III. Tátrafüred.
34. *setiger* Nal. — I. Budapest, Mátra. II. Hidegkút. (Mária-Remete).
35. *convolvuli* Nal. — I. Budapest.
36. *minutus* Nal. — III. Szepes-Váralja.

Cecidophyes Nal.

37. *trilobus* Nal. — In *Sambuco* frequens.
38. *nudus* Nal. — I. Budaörs (Csikhegy, Hárshegy), Mátra. II. Visegrád. III. Tátra (Hosszútó).
39. *galii* Nal. — I. Haraszti.
40. *heterogaster* Nal. — In *Clematide recta* communis.
41. *Smardae* Nal. — I. Budapest. III. Tátrafüred.
42. *convolvens* Nal. — I. Parád.

Conspectus familiarum, generum et specierum.

	Genus	Species		Genus	Species
Oribatidæ	11	29	Erythræidæ	2	4
Gamasidæ	8	28	Cheyletidæ	2	2
Bdellidæ	2	98	Tarsomenidæ	1	1
Rhyncholopidæ	4	13	Myoptidæ	1	1
Trombidiidæ	2	5	Hydrachnidæ	1	6
Eupodidæ	3	4	Tyroglyphidæ	2	6
Tetranychidæ	1	1	Nodipalpidæ	1	1
Hoplopidæ	1	1	Sarcoptidæ	2	4
Argasidæ	1	1	Demodicidæ	2	2
Ixodidæ	2	4	Phytoptidæ	3	42
				42	164

Summa

Familiarum	20
Generum	52
Specierum	164

Ordo. TARDIGRADA.

Auctore E. Daday de Deés.

Fam. ARCTISCOIDEAE.

Macrobiotus S. Schultze.

1. *Hufelandii* S. Sch. — I. Budapest, in stagnis, rivisque inter algas secundum Th. Margó.*

Arctiscon Schr.

2. *tardigradum* Doy. — I. Budapest, sub muscis tectorum antiquorum, teste Th. Margó.*

Echiniscus S. Schultze.

3. *testudo* Doy. — V. Kolozsvár, sub muscis tectorum antiquorum.

* Budapest és környéke állattani tekintetben. Budapest, 1879.

Ordo. LINGUATULINA.

Auctore E. Daday de Deés.

Fam. PENTASTOMIDAE.

Pentastomum Rud.

1. *taenioides* Rud. — Larvæ (P. denticulatum Rud.) in hepate hominis, raro (Genersich), et copiosissimæ in hepate Leporis cuniculi. I. Budapest. (Margó*). V. Kolozsvár. Imagines in choanis canum venatoriorum I. Budapest (Margó).

* Budapest és környéke állattani tekintetben. Budapest, 1879.

Addenda et corrigenda
ad conspectum Aranearum.

Magyarország pókfaunájának tüzetesebb megismeréséhez nem csekély adattal járult «Araneæ Hungariæ secundum collectiones a Leone Becker pro parte perscrutatas conscriptæ a Cornelio Chyzer et Ladislao Kulczyński» című, 1897-ben megjelent munkálatunk második része. Megokoltnak látszik ennélfogva, hogy három évvel ezelőtt e helyen közölt s némileg már avult összeállításunkat javítsuk és teljesebbé tegyük, úgy, hogy Magyarország pókfaunájának képe, a mennyire jelenleg ismeretes, a maga igaz valóságában és a külföldi ujabb szerzők irataival egyező vonásokban tünjék elő.

A Magyarországon talált fajok száma, 55 ujjal szaporodván, most 796-ra emelkedett. Ez ujabban megállapított azon fajok között, melyek Magyarországon kivül is előfordulnak, 8 déli, 16 középeurópai, 3 pedig (*Dictyna annulata* Kulcz., *D. mitis* Thor., *Pellenes campylophorus* Thor.) keleti fajnak látszik.

Az Adriai (VIII.) régióban most 73 olyan fajt ismerünk, melyeket az ország más régióiban ez idő szerint nem találtak. A déli fajok közül, melyeket összeállításunkban (4. lap) mint a VIII. és VI. régióban élőket említettük, törlendő az *Aphantaulax cincta* L. Koch, melyet ujabban a VII. régióban is megtaláltunk. Az egyes regiók azon fajok számát illetőleg, melyeket csak bizonyos regiókban gyüjtöttek (5. lap) jelenleg a következőleg sorakoznak: VIII (73 faj), IV (42), III (31), VI és I. (24), V (16), VII (9), II (7).

Az V. régiónak az 5. lapon elsorolt fajaihoz hozzájárul még a *Lycosa Entzii* Chyz.; az *Uloborus Walckenaëri* Latr. pedig csupán ebből hiányzik; az V. régióban ez ideig nem gyüjtött, a többi régióban pedig elszórva előforduló fajokhoz hozzácsatolandók: *Callilepis Schuszteri* O. Herm. (hiányzik az V és I regióból), *Theridium simile* C. L. Koch. (az V. és II-től), *Diplocephalus humilis* Blackw. (V és III.), *Liocranum rutilans* Thor (V és III.), *Tegenaria silvestris* L. Koch (V. és I-tól).

Ad melius cognoscendam faunam Aranearum Hungaricam, quam tribus ante annis in opere hoc adumbravimus, symbolam non levem contulit pars altera tomi secundi libelli nostri, quod inscribitur: Araneae Hungariæ secundum collectiones a Leone Becker pro parte perscrutatas conscriptæ a Cornelio Chyzer et Ladislao Kulczyński, anno 1897 in lucem edita. Non inutile videtur, conspectum illum, aliquantulum iam obsoletum, ita supplere atque emendare, ut Arachnofaunæ Hungaricæ, quatenus nunc nota est, imaginem veram atque scriptis auctorum extraneorum recentibus accommodatam præbeat.

Numerus specierum in Regno Hungariæ inventarum, quinquaginta quinque novis auctus, nunc 796 explet. Inter species nuper animadversas eas, quæ etiam extra Hungariam occurrunt, octo meridionales, sedecim Europæ mediæ propriæ, tres vero (*Dictyna annulata* Kulcz., *D. mitis* Thor., *Pellenes campylophorus* Thor.) orientales videntur.

Regio Adriatica (VIII) nunc 73 species Aranearum exhibet, quæ in reliquis Regni regionibus ad hoc tempus lectæ non sunt. E speciebus meridionalibus, quarum ut in regionibus VIII et VI solis occurrentium mentionem fecimus in conspectu nostro (pag. 4.), tollenda est *Aphantaulax cincta* L. Koch, nuper etiam in regione VII inventa. Ad numerum specierum, quæ in singulis modo regionibus lectæ sunt (pag. 5), regiones octo Regni Hungariæ nunc ita se excipiunt: regio VIII (73 species), IV (42), III (31), VI et I (24), V (16), VII (9), II (7).

Species regionis V (Transylvanicæ) peculiaris, præter eas, quas in pag. 5 nominavimus, etiam *Lycosa Entzii* Chyz. est. *Uloborus Walckenaërii* Latr. deest num regioni V soli; inter species ad hoc tempus in regione V non lectas, in reliquo Regno vero diffusas, nominandæ sunt: *Callilepis Schuszteri* O. Herm. (deest in regione V et I), *Theridium simile* C. L. Koch (V et II), *Diplocephalus humilis* Blackw. (V et III), *Liocranum rutilans* Thor. (V. et III), *Tegenaria silvestris* L. Koch (V et II).

Nomina mutanda.

Pag.

8. *Nemesia Sauvagesii* Dort. = *Nemesia* inc. sp.
Atypus piceus Sulz. = *A. Beckii* O. P. Cbr.
Protadia subnigra O. P. Cbr. = *Lathys stigmatisata* Mge.
Argenna minima Kulcz. = *Protadia subnigra* O. P. Cbr.
— *Lendlii* Kulcz. — *A. crassipalpis* Lendl.

10. *Prosthesima accepta* O. Herm. = *Pr. villica* Thor. ?
— *secreta* Thor. = *Pr. Lyonnetii* Aud.
Aphantaulax Albinii (Sav.) L. Koch. — *A. seminigra* E. Sim.

11. *Gnaphosa zeugitana* Pav. = *Gn. adriatica* Kulcz.
— *molesta* O. Herm. = *Gn. suspecta* O. Herm.
Callilepis (ex p.: *exornata, Aussereri, cinerea*) *Pythonissa* C. L. Koch.

13. *Cnephalocotes interiectus* O. P. Cbr. = *Cn. laesus* L. Koch.

16. *Bathyphantes cyaneonitens* Kulcz. = *B. mastodon* E. Sim.

20. *Oxyptila grata* Thor. = *O. confluens* C. L. Koch.

22. *Olios* Walck. = *Sparassus* Walck.

Pag.

23. *Clubiona grisea* L. Koch. = *Cl. stagnatilis* Kulcz.
Liocranum (ex p.: *tenuissimum*) — *Mesiotelus* E. Sim.
Agroeca (ex. p.: *celans*) = *Scotina* Menge.
Agroeca Haglundii Thor. = *A. brunnea* Blackw.
— *brunnea* Blackw. = *A. Thorellii* Kulcz.

24. *Micaria hospes* Kulcz. = *M. silesiaca* L. Koch.
Micariolepis E. Sim. = *Bona* Pav.
Cicurina (ex p.: *arietina*). = *Tetrilus* E. Sim.
Cicurina cicurea C. L. Koch. = *C. cicur* Menge.
Coelotes roscidus L. Koch ? = *C. falciger* Kulcz.
Cryphoeca (ex p.: *mirabilis*). = *Tuberta* E. Sim.
Cryphoeca carpathica O. Herm. = *Cr. silvicola* C. L. Koch var. *carpathica* O. Herm.
Hahnia pratensis E. Sim. = *H. Mengei* Kulcz.

27. *Synageles venator* Luc. = *S. lepidus* Kulcz.
— *confusus* Kulcz. = *S. venator* Luc. ?

29. *Pellenes Bedelii* E. Sim. = *P. nigrociliatus* L. Koch.
Euophrys confusa Kulcz. = *Eu. obsoleta* E. Sim.

Addenda et corrigenda ad pag. 8—29.

Pag.

8. *Nemesia radiata* Kulcz. = VIII. Buccari.

Brachythele Ausser. (Fam. Avicularіidarum.)
media Kulcz. — VIII. Buccari.
speculatrix Kulcz. — VIII. Crni Dabar.
(*Uloborus Walckenaërii* Latr.) — VII. Vrdnik.
(*Hyptiotes paradoxus* C. L. Koch) deleatur: VII. Diakovár, Plitvica, Mrzla vodica. VIII. frequens.
H. anceps (Walck.) Thor. ? — VII. Diakovár ?, Plitvica ?, Mrzla vodica. VIII. Crkvenica, Buccari, Costrena Sta Lucia.
Amaurobius obustus L. Koch.) — VII. Vrata.
(*Titanoeca Schineri* L. Koch.) — VI. Deliblat.

Devade E. Sim.
hirsutissima E. Sim. — V. Torda.
(*Lathys stigmatisata* Menge.) — IV. Szerencs. VIII. Buccari.
(— *humilis* Blackw.) — II. Felsuth. VII. Vrata.
(— *heterophthalma* Kulcz.) — VIII. Crkvenica.

Pag.

Dictyna annulata Kulcz. — I. Kalocsa, Kecskemét. VI. Jazova.
— *mitis* Thor. — I. Insula Csepel. IV. Tokaj.
— *brevidens* Kulcz. — I. Kecskemét. IV. Királyhelmecz.
(— *latens* Fabr.) — VI. Orsova. VII. Vrdnik, Diakovár. VIII. Fiume.
(*Argenna crassipalpis* Dahl.) — II. Zákány, Bal. Szántód. IV. Lelesz.

9. *Filistata pallida* Kulcz. — VIII. Crkvenica.
(*Dysdera Westringii* O. P. Cbr.) — II. Várpalota (?), Almádi (?).
— *crocota* C. L. Koch. var. *hamulata* Kulcz. — IV. Varannó.
— *Kollari* Dobl. — VIII. Fiume, Portoré, San Cosmo ?
— *hungarica* Kulcz. — I. Budapest, Kalocsa. II. Kám. IV. S.-A.-Ujhely, Körtvélyes. V. sat frequens. VI. Marillavölgy.
var. *adriatica* Kulcz. — VII. Vrata, Risnjak. VIII. Orehovica, Bakarac, Martinschizza.

Pag.

Harpactes egregius Kulcz. — V. Verestorony, Malomviz. VI. Mehádia, Herkulesfürdő.
— *amoenus* Kulcz. — VIII. Crkvenica.
— *Canestrinii* L. Koch. — VI. Herkulesfürdő, Orsova, Oravicza, Marillavölgy? VII. Gošpić? VIII. Buccari, Bakarac, Martinschizza.

Stalita Schiödte.

spinosissima Kulcz. — VII. In antro Bukovac.
gracilipes Kulcz. — VII. In antro Kusica pecina ad Pazaristje.
Drassodes lapidicola Walck. var. *macer* Thor. — I—V, VII, VIII. modice frequens.
(— *troglodytes* C. L. Koch). Adde synonymum: *Drassus umbratilis* O. Herm. p. p.?
(— *umbratilis* L. Koch, loca: Alsó-Hámor (21) et Orsova (21) dubia sunt!).
— *moderatus* Kulcz. — II. Lelle.
— *minor* O. P. Cbr. — IV. S.-A.-Ujhely. V. Torda. VI. Padé.
10. *Scotophaeus Blackwallii* Thor. (*Drassus immundus* Kulcz.) — I. Hadház. IV. S.-A.-Ujhely.
— *montenegrinus* Kulcz. — VIII. Fiume.
(*Prosthesima apricorum* L. Koch.) Adde synonym. *Pr. Petiverii* O. Herm. p. p. saltem.
(— *subterranea* C. L. Koch.). Deleatur: I. Alsó-Hámor (21) et VI. Orsova (24).
(— *electa* C. L. Koch.) — V. Szamosujvár.
— *vinealis* Kulcz. — IV. Tokaj, Tarczal.
— *circumspecta* E. Sim. — VIII. Crkvenica, Zeng.
— *munda* Kulcz. — I. Kecskemét.
— *declinans* Kulcz. — IV. Tokaj.
(*Aphantaulax cincta* L. Koch.) — VII. Vrdnik.
11. (*Gnaphosa opaca* O. Herm.) Deleatur, synon.: *suspecta* O. Herm., adde synon.: *molesta* O. Herm?
— *modestior* Kulcz. — II. Almádi. VI. Baziás, Orsova. VII. Diakovár.
— *laeta* Kulcz. — IV. Szerencs.
— *spinosa* Kulcz. — I. Budapest. Kecskemét.
Zodarium aculeatum Chyz. — VI. Orsova.

Plocamis E. Sim.

cavernicola Kulcz. — VIII. Antrum Spilja Škabac prope Križišće.
(*Theridium bimaculatum* L.) — II. Pápa.
12. (— *Blackwalli* O. P. Cbr. — II. Pápa.
(— *riparium* Blackw.) — II. Pápa. IV. Kapnikbánya.
13. (*Asagena meridionalis* Kulcz. fortasse varietas est *A. phaleratae*). — VII. Eszék.

Pag.

(*Enoplognatha thoracica* Hahn). — II. Boglár. VII. Vrdnik.
14. (*Diplocephalus picinus* Blackw.) — VII. Velebit, Gošpić.
(*Dicymbium nigrum* Blackw.) — VII. Lipik.
(*Gonatium hilare* Thor.) — VI. Orsova. VIII. Carlopago.
(— *corallipes* O. P. Cbr.) — VII. Medak. VIII. Fiume.
(*Hypomma bituberculatum* Wid.) — VII. Eszék.
15. (*Kulczynskiellum agreste* Blackw.) — I. Lunka.
(*Maso Sundevallii* Westr.) — VII. Gošpić. VIII. Visevica
(*Nematogmus obscurus* Blackw.) — III. Léva.
(*Donacochara speciosa* Thor. — I. Kalocsa.

Hylyphantes E. Sim.

nigritus E. Sim. — II. Lajtha hegység. *
(*Porrhomma pygmaeum* Blackw.) — Deleatur: I. Hadház, Rakamaz. VII. Diakovár.
— *microphthalmum* O. P. Cbr. — I. Hadház, Rakamaz. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj, Szerencs, Széphalom. VII. Diakovár.
— *Egeria* E. Sim. — III. Tátra.
16. (*Bathyphantes nigrinus* Westr.) — VII. Lipik.
(*Lephthyphantes collinus* L. Koch). — VI. Oravica.
(— *angulipalpis* Westr.) — I. Budapest.
(— *pallidus* O. P. Cbr). — I. Antrum prope Kalota.
(— *mansuetus* Thor.) — I. Budapest. VI. Oravica.
17. (— *Mengei* Kulcz.) — II. Pápa.
(— *flavipes* Blackw.) — I. Budapest.
(*Taranucnus herculanus* Kulcz.) — Antra ad I. Kalota et ad Vár-Sonkolyos.
(*Labulla thoracica* Wid.) — VI. Marillavölgy.
(*Linyphia peltata* Wid.) — VIII. Breze.
18. (*Tetragnatha pinicola* L. Koch). — VI. Marillavölgy.
(— *nigrita* Lendl). — VII. Vrdnik.
(— *obtusa* f. *propior* Kulcz.) — V. Tusnád.
(— *striata* L. Koch. — I. Kecskemét (pullus unicus).
(*Meta Menardi* Latr.) — VIII. Pazaristje (antrum Milinković pećina).
(*Nesticus fodinarum* Kulcz.). — V. Ponor; in antris.

* Cfr.: Vl. Kulczyński, Symbola ad faunam Aranearum Austriae Inferioris. (Dissertat. mathem. et physic. Acad. Litter. Cracoviensis, vol. XXXVI. 1898) pag. 21.

Pag.

(*Birói* Kulcz.) — I. Vár-Sonkolyos (Kőbányabarlang), Remecz (Izwor-barlang).

(*Epeira angulata* Clerck). — VIII. Breze.

(— *omoeda* Thor.) — VIII. Vrata.

19. (— *alpica* L. Koch). — VIII. Breze, Vratnik.

(— *Sturmii* Hahn). — VIII. Breze.

(— *Lucina* Sav.) — II. Lelle.

(— *prominens* Westr.) — I. Budapest.

(— *atrica* C. L. Koch). — Deleatur: VII. Plitvica. VIII. frequens. (Exempla in his regionibus lecta, non adulta, probabiliter *Epeirae Keyserlingii* Auss. subiungenda sunt.)

20. (*Tmarus stellio* E. Sim.) — VIII. Novi.

(*Runcinia lateralis* C. L. Koch). — VII. Vrdnik.

21. (*Oxyptila Blackwallii* E. Sim.).—VI. Marillavölgy.

(— *simplex* O. P. Cbr.) — VII. Lipik.

— *Kotulai* Kulcz. — IV. S.-A.-Ujhely, Körtvélyes. *

(*Xysticus bifasciatus* C. L. Koch). — VII. Vrdnik.

(— *Ninnii* Thor.) — III. Léva. VII. Vrdnik.

(— *albomaculatus* Kulcz.) — II. Pápa.

— *cor* Can. (*comptulus* E. Sim.). —VIII. Portoré, Crkvenica, Zeng.

— *Lendlii* Kulcz. — I. Örkény.

— sp? (*acerbus* O. Herm. p. p. nec Thor.). — VI. Pancsova, Fehértemplom, Temesvár.

22. (*Philodromus collinus* C. L. Koch). — VI. Marillavölgy.

(*Clubiona alpicola* Kulcz.). — IV. Szinnaikő, Pietrosz.

23. (*marmorata* L. Koch). — VII. Vrdnik.

(*Chiracanthium elegans* Thor.) — IV. S.-A.-Ujhely.

(— *lapidicolens* E. Sim.) — I. Kalocsa, Rákosfalva, Szeged.

(— *rupestre* O. Herm.). — I. Budapest. II. Várpalota. III. Ujbánya.

(— *effossum* O. Herm.). — I. Budapest, Kalocsa. II. Felcsuth. III. Igló, Ujbánya. IV. Csarnahó, Oroszvég. VI. Klopodia.

(— *cuniculum* O. Herm.). — IV. S.-A.-Ujhely? — *montanum* L. Koch? — IV. S.-A.-Ujhely. V. Brassó.

— *qratum* Kulcz. — I. Kecskemét.

Liocranum perarmatum Kulcz. — VIII. Bakarac, Buccari, Crkvenica.

Mesiotelus annulipes Kulcz. — II. Kám, Felcsuth, Pápa. IV. Szőllőske, Királyhelmecz,

* Cfr.: Vl. Kulczyński, l. c. pag. 93.

Pag.

Munkács, Klastromalja. VII. Eszék, Jaska.

Scotina gracilipes Blackw. — VIII. Fiume.

Phrurolithus pullatus Kulcz. — I. Budapest. II. Berhida, Kenese. IV. S.-A.-Ujhely, Tokaj, Szerencs, Szőllőske, Torna.

(*Zora nemoralis* Blackw.) — Adde synonym.: *Z. spinimana* O. Herm. p. p. salt.

— *silvestris* Kulcz. — IV. Szerencs.

24. (*Micaria fulgens* Walck.). — VI. Marillavölgy.

(— *Rogenhoferi* O. Herm.). — I. Kecskemét.

— *chalybeia* Kulcz.—VIII. Fiume, Portoré, Zeng.

— *sociabilis* Kulcz. — I. Vencsellő. IV. S.-A.-Ujhely, Munkács.

Cybaeus minor Chyz. — VI. Herkulesfürdő, Szászka, Marillavölgy.

(*Cicurina cicur* Menge). — VI. Marillavölgy, Oravicza.

(*Coelotes terrestris* Wid.). — VI. Marillavölgy.

— *falciger* Kulcz. — V. Zilah, Brátka, Gyulafehérvár. VI. Herkulesfürdő.

— *anoplus* Kulcz. — VII. Crnilug, Risnjak, Mosunje. VIII. Fiume, Buccari, Crkvenica.

— *longispina* Kulcz. — I. Budapest. IV. S.-A.-Ujhely, Szőllőske, Beregszász. V. Szamosujvár. VI. Uj-Moldova, Marillavölgy, Oravicza.

(*Tegenaria domestica* Clerck). — VI. Ponyászka.

(— *silvestris* L. Koch). — Adde synonym.: T. campestris O. Herm.

— *Hasperi* Chyz. — VIII. Buccari, Cesta Mej, Crkvenica.

— *velox* Chyz. — VI. Herkulesfürdő.

— *laeta* Kulcz. — VI. Szászkabánya, Herkulesfürdő, Marillavölgy, Oravicza.

— *sinuata* Kulcz. — I. Pestere. V. Malomviz.

— *luxurians* Kulcz. — VII. sat frequens. VIII. Buccari.

(*Hahnia nava* Blackw.). — I. Budapest, Nagy-Kőrös.

— *pusilla* C. L. Koch. — III. Tátra. VII. Velebit.

— *picta* Kulcz. — I. Hadház.

25. (*Lycosa saltuaria* L. Koch). — V. Retyezát.

(— *morosa* L. Koch). — V. Retyezát.

(— *vittata* Keys.). — VII. Lipik.

26. (*Trochosa infernalis* Motsch.). — III. Ujbánya.

27. (*Pirata piraticus* Clerck.). — VIII. Buccari.

28. (*Aelurillus V. insignitus* Clerck). —VI. Marillavölgy.

29. *Pellenes campylophorus* Thor. — I. Kecskemét. VI. Padé, Jazova.

(*Euophrys aequipes* O. P. Cbr.). — VII. Velebit.

A Királyi Magyar Természettudományi Társulat kiadványainak jegyzéke

1841-től 1900. aug. 10-ig.

Megrendelhetők a Társulatnál Budapest, VII. Erzsébet-körut 1. sz.; továbbá a Társulat bizományosainál, nevezetesen **Kilián F. utóda** Budapest, IV. Váczi-utcza 28, és **Lampel-Wodianer** könyvárusnál, Budapest, VI. Andrássy-út 21.

(A nagyobb számok a bolti árat jelentik, a kisebbek pedig a tagtársainknak szóló kedvezményes árat abban az esetben, ha csak egy művet vásárolnak. 100 kor. bolti árú könyv vásárlásakor 33% árelengedés számittatik.)

Abafi Aigner Lajos, A lepkészet története Magyarországon. Budapest 1898, 8 r. VI + 202 lap, 3—2 kor.

Alföldy Dénes, A meteorólogiai műszerek és elemek, 28 ábrával és kilencz táblával. Átvizsgálta: Hegyfoky Kabos. Budapest 1899, Kv. 64, 8 r. XIV + 194 lap. 4·60—4 kor.

Állatvilág, *A magyar birodalom állatvilága.* A m. birodalomból eddig ismert állatok rendszeres lajstroma. Magyarország ezeréves fennállásának emlékére kiadta a K.M.T.T. III. Arthropoda. Budapest 1900, 4. r. (magyar és latin szöveggel és térképpel. Lásd Fauna Regni Hungariæ alatt is). Az eddig megjelent Arthropodák füzetének bolti ára 35 korona, társulati tagoknak 20 kor.

Bartsch Samu, A sodró állatkák és Magyarországon megfigyelt fajaik. Rotatoria Hungariæ. Négy kőnyomatu táblával. (A K.M.T.T. megbizásából.) Budapest 1877, 4 r. IX + 51 l. (Elfogyott.)

Békessy László, A tejgazdaság és a sajtkészités elméleti és gyakorlati szempontból 202 rajzzal. (A K.M.T.T. megbizásából.) Budapest 1885, 8 r. X + 300 l. (Elfogyott).

Bereczki Máté, Gyümölcsészeti vázlatok. Nagy 8 r. I. kötet, második kiadás Arad 1886, IV + 510 l. — II. kötet, második kiadás, 1899. IV + 517 l. — III. köt., Arad 1884, IV + 551 l. — IV. kötet. Arad 1887. IV + 541. + Jegyzéke a «Gyümölcsészeti Vázlatok» mind a négy kötetében leirt gyümölcsöknek. Nagy 8 r. Arad 1887, 14 l. — E mű a szerző hagyatékából maradt Társulatunkra, mely az elfogyott részleteket és kötetet ujra nyomatván, kiegészitette. A teljes négy kötet, mely az általános értekezéseken kivül 312 almafajtát, 364 fajta körtét és 116 fajta szilvát ir le, tagtársaink 16 koronáért, kötve 20 koronáért szerezhetik meg. Bolti ára kötve 24 kor.

Brehm E. Alfréd, Az északi sarktól az egyenlitőig. Népszerü előadások, 32 képpel és 17 műmelléklettel, Forditotta: Geőcze Sarolta és Paszlavszky József. Budapest 1892, Kv. 48, nagy 8 r. VIII + 476 l. 14—8 kor.

Buza János, Kultivált növényeink betegségei, különös tekintettel az élősdi növények által okozottakra. (A K.M.T.T. által a Bugát-féle alapból pályadijjal koszorúzott mű.) Budapest 1879, 8 r. VII + 132 l. (Elfogyott.)

Chemiai Folyóirat, Lásd lentebb Természetud. Társulat folyóiratai alatt.

Chernel István (Chernelházi), Magyarország madarai különös tekintettel gazdasági jelentőségökre. A Földmivelési magyar kir. Minister megbizásából. — Képekkel ellátta Háry Gyula és Nécsey István; intézte Herman Ottó. Első könyv XI táblával, 49 szövegrajzzal 1899, nagy 8 r. XXIV + 187. — Második könyv 1 színes táblával, 5 műlappal és 9 szövegképpel, 1899, nagy 8 r. XIX + 830 l. — Bizomány. Bolti ára füzve 40 kor, kötve 46 kor. Társulati tagok, gazd. egyesületek, intézetek, kincstári erdőhivatalok, hazai könyvtárak 24 koronáért, félbőrbe kötve 30 koronáért kapják.

Cotta, Bernhard von, A jelen geologiája. A szerző acélmetszetü arczképével és 6 fametszetü ábrával. Az eredeti harmadik kiadás után forditotta: Petrovits Gyula. Budapest 1873, Kv. 1. 8 r. XVI + 472 l. (Elfogyott.)

Csanády Gusztáv és **Plósz Pál,** A borászat könyve tekintettel hazánk bortermelésére, 47 rajzzal. Budapest 1885, 8 r. X + 653 l. (Elfogyott.)

Csopey László és Kuppis József, A világforgalom, 131 rajzzal. Budapest 1889, Kv. 36. kis 8 r. XV + 607 l. 7—6 kor.

Czógler Alajos, A fizika története életrajzokban. I. kötet: tizenkét arczkép melléklettel, Budapest 1882, Kv. 20. 8 r. XVI + 590 l. — II. kötet: tizenegy arczkép melléklettel, u. o. 1882, Kv. 21. 8 r. IX + 592 l. 16—12 kor.

— Fizikai egységek, két ábrával. (A K.M.T.T. megbizásából.) Budapest 1891, kis 8 r. VII + 194 l. 4—3 kor.

Daday Jenő, A magyar állattani irodalom ismertetése 1870-től 1880-ig bezárólag. (Eredeti források alapján.) Budapest 1882, nagy 8 r. VII + 185 l. 4—3 kor.

— A magyar állattani irodalom ismertetése 1881-től 1890-ig bezárólag, tekintettel a külföldi alattani irodalom magyar vonatkozásu termékeire is. Budapest 1891, VII + 308 l. 4—3 kor.

— A magyarországi cladocerák magánrajza, 4 tábla rajzzal. (A K.M.T.T. megbizásából.) — Crustacea Cladocera faunae Hungaricae. E commissione Regiae societatis Hungaricae scientiarum naturalium elaboravit Dr. Eugenius Daday de Deés cum 4 tabulis. Budapest 1888, 4 r. VIII + 128 l. (Elfogyott.)

— A magyarországi myriopodák magánrajza, 3 tábla rajzzal, (A K.M.T.T. megbizásából.) — Myriopoda regni Hungariae. E commissione Regiae soc. Hung. scient. naturalium elaboravit Dr. Eugenius Daday de Deés cum tribus tabulis. Budapest 1889, 4 r. IV + 126 l. 4—3 kor.

— Rovartani műszótár. A leiró rovartan legfontosabb műszavainak foglalatja, 103 ábrával. (A K.M.T.T. megbizásából s külön bizottságának közreműködésével.) Budapest 1894, kis 8 r. VII — 56 l. 1·40—1 kor.

— A magyarországi tavak halainak természetes tápláléka. (A magyarországi tavak mikroszkópi állatvilága.) 62 szövegközti ábrával. Budapest 1897, 8 t. XVI + 481 l. 6—5 kor.

Darvai Móricz, Üstökösök és meteorok, 58 rajzzal, átnézte: Heller Ágost. Budapest 1888, Kv. 34. kis 8 r. VIII + 2721, 3·20—2·60 kor.

Darwin Charles, A fajok eredete a természeti kiválás utján vagyis az előnyös válfajok fenmaradása a létérti küzdelemben. Az eredeti hatodik bővitett s javitott kiadás után forditotta: Dapsy László. Revideálta: Margó Tivadar. I. kötet: Budapest 1873, Kv. 2. 8 r. XVI + 303 l. II kötet: A szerző acélmetszetü arczképével. U. o. 1874, Kv. 3. 8 r. VII + 361 l. (Elfogyott.)

— Az ember származása és az ivari kiválás. A második javitott és bővitett eredeti kiadásból forditották: Török Aurél és Entz Géza. Az eredetivel összehasonlitotta és Darwin életrajzát irta hozzá: Margó Tivadar. I. kötet: 78 fametszetü ábrával, Budapest 1884, Kv. 23. 8 r. LXXI + 542 l. II. kötet: 78 fametszetü ábrával, u. o. 1884, Kv. 24. 8 r. VII + 436 l. 16—12 kor.

De Candolle Alphonse, Termesztett növényeink eredete. 61 képpel. Forditotta: Pavlicsek Sándor, az eredetivel összehasonlitotta: Mágócsy Dietz Sándor. Budapest 1894, Kv. 52. 8 r. XV + 515 l. 8—7 kor.

Emery Henry, A növények élete, a növényvilág leírása. A nagy közönség használatára. 432 ábrával és műlappal. Forditották: Mendlik Alajos és Király Pál. Az eredetivel összehasonlitotta és jegyzetekkel kisérte: Klein Gyula. Budapest 1883, Kv. 22. nagy 8 r. XIV + 783 l. 16—12 kor.

Emlékkönyv, Lásd lentebb Természettud. Társ. alatt.

Entz Géza, Tanulmányok a véglények köréből. Első rész: A véglények ismeretének fejlődése. Történeti és kritikai átpillantás. (A K. M. T. T. megbizásából.) — Studien über Protisten; im Auftrage der K. Ung. Naturwiss. Gesellsch. verfasst von Géza Entz. I. Theil: Entwickelung der Kenntniss der Protisten. Ein historisch-kritischer Überblick, übersetzt von Aladár Rózsahegyi. Budapest 1888, 4 r. XV + 464 l. 12—8 kor.

Erisman Frigyes, Népszerű egészségtan. Az eredeti második kiadás után forditotta: Dr. Imre József. Az eredetivel összehasonlitotta: Dr. Fodor József. Budapest 1880, Kv. 18. 8 r. XI + 391 l. (Elfogyott.)

Évi jelentés, Lásd Term. tud. Társ. alatt.

Fauna Regni Hungariæ, Animalium Hungariæ hucusque cognitorum enumeratio systematica. III. Arthropoda. In memoriam Regni Hungariæ mille abhinc annis constituti, edidit Regia Societas Scientiarum Naturalium Hungarica. Budapest 1900, 4 r. 35—20 kor.

Felletár Emil és **Jáhn József,** A törvényszéki chemia elemei, 16 ábrával és 12 táblával. (A Chemiai folyóirat III. évfolyamának melléklete.) Budapest 1897, nagy 8 r. VII + 243 l. 6—4 kor.

Filarszky Nándor, A charafélék (Characeae L. Cl. Richard) különös tekintettel a magyarországi fajokra. — Die Characeen mit besonderer Rücksicht auf die in Ungarn beobachteten Arten. Röviditett német szöveggel, húsz ábrával és öt tábla rajzzal. (A K.M.T.T. a Bugát-alapból jutalmazott pályamű.) Budapest 1893, 4 r. VIII + 129 l. 4—3 kor.

Francé Rezső, A craspedomonadinák szervezete, (A K. M. Természettud. Társ. megbizásából). 78 eredeti rajzzal. — Der Organismus der Craspedomonaden, mit 78 Originalzeichnungen. Budapest 1897, 8 r. VIII + 248 l. 4—3 kor.

Freycinet C. de, A természettudományi megismerés alapjai. Analizis. Mechanika. Forditotta Salgó Ernő. Az eredetivel összehasonlitotta: Szily Kálmán. Budapest 1898, Kv. 61. 8 r. VI + 212 l. 4—3 kor.

Gothard Jenő, A fotografia gyakorlata és alkalmazása tudományos czélokra. Negyven ábrával. Budapest 1890, Kv. 43. kis 8 r. VI + 183 l. 2·50—2 kor.

Graber Vitus, Az állatok mechanikai műszerei. 315 rajzzal. Forditotta Thanhoffer Lajos. Budapest 1895, Kv. 54. 8 r. 415 l. 6—5 kor.

Greguss Gyula összegyüjtött értekezései, Emlékbeszéddel: Greguss Ágosttól. A szerző arczképével. Budapest 1876, Kv. 11. 8 r. XXX + 376 l. (Elfogyott.)

Grittner Albert, Szénelemzések, különös tekintettel a magyarországi szenekre. Budapest 1895, 4 r. 34 l. (Bővitett kiadásban 1900-ban.)

— Szénelemzések, különös tekintettel a magyarországi szenekre. Második bővitett kiadás. Budapest 1900, nagy 8 r. VIII + 40 l. 3—1·50 kor.

Gruber Lajos, Útmutatás földrajzi helymeghatározásokra. 28 ábrával és 12 táblázattal. (A K.M.T.T. megbizásából.) Budapest 1883, 8 r. VIII + 307 l. (Elfogyott.)

Guillemin Amadée, A mágnesség és elektromosság, 579 rajzzal, XVIII táblával és szines műlappal. Forditották: Bartoniek Géza és Czógler Alajos. Az eredetivel összehasonlitotta: Szily Kálmán. Budapest 1885, Kv. 25, nagy 8 r. XI + 875 l. 14—12 kor.

Hartman Róbert, Az emberszabásu majmok és szervezetök, 57 rajzzal. Forditotta; Dr. Thirring Gusztáv, az eredetivel összehasonlitotta: Paszlavszky József. Budapest 1888, Kv. 35, kis 8 r. 261 l. 4—3 kor.

Hazslinszky Frigyes, A magyar birodalom zuzmó flórája. (A K.M.T.T. megbizásából.) Budapest 1884, kis 8 r. VIII + 300 l. (Elfogyott.)

— A magyar birodalom moh-flórája. (A K.M.T.T. megbizásából). Budapest 1885, kis 8 r. VIII + 280 lap. (Elfogyott.)

Hegyfoky Kabos, A május havi meteorológiai viszonyok Magyarországon. (A K.M.T.T. megbizásából.) — Die meteorologischen Verhältnisse des Monats Mai in Ungarn. Budapest 1886, 4 r. IV + 200 l. 5—4 kor.

— A szél iránya a magyar szent korona országaiban. A barométerállás és az eső czimü függelékkel, 18 rajzzal és öt térképpel. — Ueber die Windrichtung in den Ländern der ungarischen Krone, nebst einem Anhang über Barometerstand und Regen. — Budapest 1894, nagy 4 r. IV + 173 l. 4—3 kor.

Héjas Endre, A zivatarok Magyarországon az 1871-től 1895-ig terjedő megfigyelések alapján. (A KM.T.T. megbizásából), huszonhárom táblával. — Die Gewitter in Ungarn, nach den Beobachtungen von den Jahren 1871—1895. — Budapest 1898. nagy 8 r., 174 lap, 4—3 kor.

Heller Ágost, Az időjárás, 31 razzal. Kv. 33. Budapest 1888, kis 8 r., X + 408 l. 5—4 kor.

— A physika története a XIX. században, két kötetben. (A magyar tudományos akadémia segélyével.) I. kötet: Budapest 1891, Kv. 45. 8 r. XI + 574 l. 10—8 kor. (A Term. Társ. könyveinek czimjegyzéke. Lásd T. T. T. alatt.)

Helmholtz H., Népszerű tudományos előadások, 51 fametszetü ábrával. Forditották: B. Eötvös Loránd és Jendrassik Jenő. Budapest 1874, Kv. 6. 8 r. XI + 389 l. (Elfogyott.)

Hensch Árpád, Az okszerű talajmivelés elmélete és gyakorlata, 117 rajzzal. (A K. M. T. T. megbizásából.) Budapest 1885, 8 r. XII + 279 l. (Elfogyott.)

Herman Ottó, Magyarország pókfaunája. (A K.M.T.T. megbizásából). I. kötet: Általános rész, magyar és német nyelven, három kőnyomatu táblával. Budapest 1876, 4 r. XIX. + 119 l. — II. kötet: A rendszer, három kőnyomatu táblával. U. o. 1878, 4 r. VI + 100 l. — III. kötet: Leiró rész, négy kőnyomatu táblával és két függelékkel. Budapest 1879, 4 r. VI + 394 l. — Ungarns Spinnenfauna. I. Band. Allgemeiner Theil, mit 3 lithographirten Tafeln; II. Band. Das System, mit 3 lith. Tafeln; III. Band. Beschreibender Theil, mit 4 lith. Tafeln. — Csak a II. és III. kötet kapható 12 kor.

— A fillokszéra, vészkiáltás a magyar szőlők érdekében, egy ábrával és egy szines kőnyomatu táblával. (A K.M.T.T. megbizásából.) Budapest 1879, nagy 8 r. 10 l. (Elfogyott.)

— A magyar halászat könyve, 300 rajzzal, 12 műlappal és 9 kőnyomatu táblával. (A K.M.T.T. megbizásából.) I. kötet: Budapest 1887, Kv. 27, nagy 8 r. XV + 552 l. — II. kötet: Budapest 1887, Kv. 28, nagy 8 r., 308 lap. 24—16 kor.

— A halgazdaság rövid foglalatja, 43 képpel. Budapest 1888, Kv. 31., kis 8 r. VII + 200 l. 3—2.40 kor.

— Petényi J. S., a magyar tudományos madártan megalapitója 1799—1855. Életkép, arczképpel és szines mellékletlettel. (Chernel István, Dr. Madarász Gyula és Vastagh Géza közreműködésével). — J. S. v. Petényi, der Begründer der wissenschaftlichen Ornithologie in Ungarn. Budapest 1891, 4 r. 128 l. 8—6 kor.

— Az északi madárhegyek tájáról, 75 képpel, három szines táblával és egy térképpel. (A K.M.T.T. megbizásából.) Budapest 1893, Kv. 50., 8 r. VIII + 572 l. 10—9 kor.

Hidegh Kálmán, Magyar fakóérczek chemiai elemzése. (A K.M.T.T. által a Bugát-féle alapból pályadijjal koszoruzott mű, magyar és német nyelven.) — Chemische Analyse ungarischer Fahlerze. — Budapest 1879, 4 r. 8 lap. (Elfogyott.)

Horváth Géza, Magyarország bodabácsféléinek magánrajza. (Monographia lygæidarium Hungariæ), egy szines

nyomású táblával. (A K.M.T.T. megbizásából.) Budapest 1875, 4 r. VI + 109 l. (Elfogyott.)

Houzeau J. C. A csillagászat történelmi jellemvonásai megvilágitva a csillagászat elveinek és az egyetemes művelődés tényezőinek fejlődésével, 5 ábrával, forditotta: Czógler Alajos főreáliskolai tanár. Budapest 1889, Kv. 38. kis 8 r. VII + 552 l. 6—5 kor.

Huxley Th. H., Előadások az elemi élettan köréből, czimképpel és 86 fametszetü ábrával. Forditotta: Magyar Sándor. Átvizsgálta: Balogh Kálmán. Budapest 1873, Kv. 4. 8 r. XXIII + 293 l. (Elfogyott.)

Ilosvay Lajos, A chemia alapelvei. 70 rajzzal. Budapest 1888, Kv. 30 kis 8 r. XV + 447 l. (Elfogyott).

— A torjai büdös barlang levegőjének chemiai és fizikai vizsgálata. (A K.M.T.T. megbizásából.) 2 képpel. Budapest 1895, 8 r. 63 l. 2—1 kor.

Inkey Béla, Nagyág földtani és bányászati viszonyai 4 térkép melléklettel és 23 ábrával a szöveg között. Magyar és német nyelven. (A K.M.T.T. megbizásából.) — Nagyág und seine Erzlagerstätten. — Budapest 1885, 4 r. VIII + 175 l. 5—4 kor.

Jablonowski József, A szőlő betegségei és ellenségei. 3 szines, 1 fekete táblával és 76 rajzzal. Budapest 1895, 8 r. VIII + 296 l. 5—4 kor.

Johnson W. Sámuel, Hogy nő a vetés. Kézikönyv a növény chemiai alkatáról, szerkezetéről és életéről, mezőgazdasággal foglalkozók számára. 71 a szöveg közé nyomatott fametszetü ábrával. Eredetiből forditotta: Duka Marczel. A forditást átvizsgálták: Balás Árpád és Csanády Gusztáv. Budapest 1876, Kv. 12. 8 r. XVII + 402 l. (Elfogyott.)

— Miből lesz a termés. Kézikönyv a légkörről és a talajról, a gazdasági növények táplálása szempontjából. 9 a szöveg közé nyomtatott fametszetü ábrával. Eredetiből forditották: Balás Árpád és Mendlik Alajos. Budapest 1878, Kv. 15 8 r. VIII + 360 l. (Elfogyott.)

Kátai Gábor, A K.T.T. története. Lásd Term.tud.Társ. alatt.

Keller Konrád, A tenger élete. 271 ábrával és 10 szines táblával. Botanikai toldalékkal: Dr. Cramer Károly és Dr. Hans Schinz tanártól. Forditotta: Csopay László, az eredetivel összehasonlitotta: Paszlavszky József. Budapest 1897, Kv. 60. nagy 8 r. XV + 699 l. 20—16 kor.

Kerpely Antal, Magyarország vaskövei és vasterményei különös tekintettel a vas legfőbb chemiai és physikai tulajdonságaira. 3 táblázattal a szövegben, 4 rajz melléklettel és 11 fametszettel. (A K.M.T.T. megbizásából.) Budapest 1877, 4 r. 83 l. (Elfogyott.)

Kirándulók zsebkönyve, utmutatás ásvány- és földtani gyüjtésekre, magasságmérésekre, állat- és növénytani megfigyelésekre és gyüjtésekre, 70 ábrával. Dr. Schafarzik Ferencz, ifj. Bodola Lajos, Kriesch János, Dr. Czakó Kálmán. Budapest 1888, Kv. 32. kis 8 r. VIII + 199 l. 4—3 kor.

Klug Nándor, Az érzékszervek élettana. 93 ábrával. Budapest 1896, Kv. 57. 8 r. VIII + 263 l. 5—4 kor.

Kohaut Rezső, A magyarországi szitakötő-félék természetrajza. (Libellulidae auct., odonata Fabr.) 3 tábla rajzzal. (A K.M.T.T. megbizásából.) Budapest 1896, 4 r. 78 l. 3—2 kor.

Kosutány Tamás, Magyarország jellemzőbb dohányainak chemiai és növényélettani vizsgálata. (A K.M.T.T. megbizásából.) I. rész: Budapest 1877, 4 r. VIII + 32 l. (Elfogyott.) II—III. rész: U. o. 1881, 4 r. 70 l. 2—1 kor.

— Ungarns Tabaksorten. I. rész. Budapest 1882, 4 r. 47 l. (Elfogyott).

Krenner József Sándor, A dobsinai jégbarlang. 6 könyomatu táblával és 3 fametszettel. (Magyar és német nyelven, a K.M.T.T. megbizásából.) — Die Eishöhle von Dobschau. — Budapest 1874, 8 r. 23 l. 3—2 kor.

Krümmel Ottó, Az oczeán. 66 rajzzal. Forditotta: Csopey László. Az eredetivel összehasonlitotta: Heller Ágost. Budapest 1888, Kv. 29. kis 8 r. VII + 288 l. 4—3 kor.

Kurländer Ignácz, Földmágnességi mérések a magyar korona országaiban 1892—1894 években. 3 táblával. A M. Tudományos Akadémia megbizásából. (Kiadta a M.T.A. segitkezésével a K.M.T.T.) — Erdmagnetische Messungen in den Ländern der ungarischen Krone in den Jahren 1892—1894. — Budapest 1896, 4 r. IV + 66 l. 3—2 kor.

László Ede Dezső, Magyarországi agyagok chemiai és mechanikai elemzése, tekintettel ipari alkalmazhatóságukra. (A K.M.T.T. megbizásából.) Budapest 1886, 8 r. VI + 84 l. 2—1 kor.

Laufenauer Károly, Előadások az idegélet világából, öt táblával és 62 képpel. Budapest 1899, Kv. 63. 8 r. VIII + 235 l. 5—4 kor.

Lengyel Béla, A quantitativ chemiai analysis elemei. 17 rajzzal és egy fénynyomattal. (A magyar chemiai folyóirat II. évfolyamának melléklete.) Budapest 1896, nagy 8 r. VIII + 232 l. 6—4 kor.

Lengyel István, Névjegyzék és tárgymutató a K. M. Természettudományi Társulatnak 1841-től 1883-ig megjelent folyóiratához. (Évkönyvek 1841—1859, K. M. Term. tud. Társulat közlönye 1860—1867 és Természettudományi Közlöny 1869—1883.) Budapest 1884, nagy 8 r. IV + 80 l. 2—1 kor.

Lóczy Lajos, A khinai birodalom természeti viszonyainak és országainak leirása. 200 rajzzal és egy térképmelléklettel. (Gróf Széchenyi Béla keletázsiai utazása alatt 1877—1880-ban szerzett tapasztalatai alapján és a meglevő irodalom fölhasználásával.) Budapest 1886, Kv. 26. nagy 8 r. XIV + 884 l. 20—16 kor.

Lubbock Sir John, A történelem előtti idők, megvilágitva a régi maradványok s az ujabbkori vadnépek életmódja és szokásai által. Az eredeti harmadik kiadás után forditotta: Öreg János. A forditást átvizsgálta: Pulszky Ferencz. I. kötet: három mülappal és 198, a szöveg közé nyomott fametszetü ábrával. Budapest 1876, Kv. 9. 8 r. XXIII + 350 l.; II. kötet: egy mülappal és 58, a szöveg közé nyomott fametszetü ábrával. u. o. 1876, Kv. 10. 8 r. LVIII + 324 l. (Elfogyott.)

— A virág, a termés és a levél, 122 képpel. Forditotta: Dr. Mágócsy-Dietz Sándor. Budapest 1889, Kv. 37. kis 8 r. VII + 178 l. 3—2 kor.

Maderspach Livius, Magyarország vasércz-fekhelyei. 14 térkép melléklettel és 79 ábrával a szöveg között. (A K.M.T.T. megbizásából.) Budapest 1880, nagy 4 r. IX + 111 l. (Elfogyott.)

Mágócsy-Dietz Sándor, Előmunkálat a növénytani magyar műszótárhoz. (A K.M.T.T. megbizásából.) Budapest 1894, kézirat gyanánt lithografoztatta a K.M.T.T. nagy 8 r. 323 l. (Elfogyott.)

Naptár, Lásd Term. tud. Társ. alatt.

Népszerü természettudományi előadások, Faraday, Helmholtz és Pettenkofer munkáiból. 18 a szöveg közé nyomott fametszettel. Forditották: Déry Miksa, Hoitsy Pál, Keleti Gusztáv és Sajóhelyi Frigyes. Budapest 1878, Kv. 14. 8 r. XXIV + 307 l. (Elfogyott.)

Népszerü term. előadások gyüjteménye, Lásd Term. tud. Társ. alatt.

Névkönyv, Lásd Term. tud. Társ. alatt.

Nuricsán József, Utmutatás a chemiai kisérletezésekben. (A magyar chemiai folyóirat IV. évfolyamának melléklete.) 138 ábrával. Budapest 1898, nagy 8 r. IV + 254 l. 6—4 kor.

Original-Abhandlungen, Lásd Term. tud. Társ. alatt.

Petrovits István, A homoki szőlők telepitése és művelése eredeti megfigyelések és gyakorlati tapasztalatok alapján. 12 rajzzal. Budapest 1894, 8 r. X + 224 l. 4—2 kor.

Primics György, A csetráshegység geológiája és érctelérei, egy térkép-melléklettel és kilencz ábrával. (A K.M.T.T. megbizásából). Budapest 1896, nagy 4 r. VI + 122 l. 3—2 kor.

Proctor Richard, Más világok mint a mienk: a világok sokasága a legujabb tudományos vizsgálatok fényénél tanulmányozva. Hét műlappal és hét, a szöveg közé nyomott fametszetü ábrával. A harmadik kiadás után forditotta: Dr. Császár Károly, a forditást átvizsgálta: Szily Kálmán. Budapest 1875, Kv. 8. 8 r. XIII + 240 l. (Elfogyott.)

Pungur Gyula, A magyarországi tücsökfélék természetrajza. (Histoire naturelle des gryllides de Hongrie.) Franczia kivonattal és hat tábla rajzzal. (A K.M.T.T. megbizásából.) Budapest 1891, 4 r. VI + 79 lap. 5—4 kor.

Reclus Elisée, A föld. A földgömb életjelenségeinek leirása. Az eredeti negyedik kiadás után forditották: Király Pál és Révész Samu. Az eredetivel összehasonlitotta: Hunfalvy János. I. kötet: A kontinensek, 25 műlappal és a szöveg közé nyomott 253 ábrával. Budapest 1879, Kv. 16. nagy 8 r. XII + 640 l. II. kötet: Az Oczeán, a légkör, az élet, 29 műlappal és a szöveg közé nyomott 217 ábrával. U. o. 1880, Kv. 17. nagy 8 r. VI + 671 l. (Elfogyott.)

— A hegyek története. 18 eredeti képpel. Forditotta: Geőcze Sarolta. Budapest 1891, Kv. 44. kis 8 r. VIII + 209 l. 3—2·40 kor.

— A patak élete. 16 eredeti képpel. Forditotta: Hentaller Elma. Budapest 1894, Kv. 53. 8 r. VIII + 173 l. 3—2·40 kor.

Roiti Antonio, A fizika elemei. Forditotta: Czógler Alajos. A forditást kiegészitette és felülvizsgálta: Bartoniek Géza. I. kötet: 408 ábrával, Budapest 1895, Kv. 55. 8 r. XXIII + 639 l. II. kötet: 473 ábrával és három szines táblával. U. o. 1895, Kv. 56. 8 r. XVIII + 806 l. 22—12 kor.

Róna Zsigmond, A légnyomás a magyar birodalomban 1861-től 1890-ig. (Német kivonattal, hat ábrával és tizennégy térképpel.) — Die Luftdruckverhältnisse Ungarns. Budapest 1897, nagy 8 r. IV + 204 l. 4—3 K.

Rudolf trónörökös Főherczeg, Tizenöt nap a Dunán. Forditotta: Paszlavszky József. Budapest 1890, Kv. 40. kis 8 r. VI + 816 l. 4—3 kor.

Schenzl Guido, Utmutató meteoritek megfigyelésére. Két fametszetü ábrával. (A K.M.T.T. megbizásából.) Budapest 1876, kis 8 r. 18 l. 20 fillér.

— Adalékok a magyar koronához tartozó országok földmágnességi viszonyainak ismeretéhez. Két táblázattal és hat térképpel. Magyar és német nyelven. (A K.M.T.T. megbizásából.) — Beiträge zur Kenntniss der erdmagnetischen Verhältnisse in den Ländern der ungarischen Krone. Budapest 1881, 4 r. XII + 539 l. 18—14 kor.

— Utmutatás földmágnességi helymeghatározásokra. 113 ábrával. (A K.M.T.T. megbizásából.) Budapest 1884, 8 r. XII + 321 l. 4—3 kor.

Schmidt F., A gyakorlati fotografozás kézikönyve. 89 ábrával és két táblával. A negyedik kiadás után forditotta Pfeifer Ignácz, az eredetivel összehasonlitotta Wartha Vincze. Budapest 1897, Kv. 59. 8 r. XIX + 406 l. 6—5 kor.

Schmidt Sándor, A drágakövek. I. kötet: 19 eredeti rajzzal. Budapest 1890, Kv. 41. kis 8 r. VIII + 416 l. II. kötet: 34 eredeti rajzzal. U. o. 1890, Kv. 42. kis 8 r. VII + 318 l. 8—7 kor.

Simonkai Lajos, Erdély edényes flórájának helyesbitett foglalatja. (A K.M.T.T. megbizásából.) — Enumeratio floræ Transsilvanicæ vasculosæ critica. Budapest 1886, 8 r. XLIX + 678 l. (Elfogyott.)

Simonyi Jenő, A sarkvidéki fölfedezések története. 51 rajzzal. Budapest, 1890, Kv. 39. kis 8 r. VIII + 312 l. 4·40—4 kor.

Smith Edward, A tápszerek, négy rajzszerü táblával és 18 a szöveg közé nyomott fametszettel. Forditotta: Hőgyes Endre, átvizsgálta: Fodor József. Budapest 1877, Kv. 13. 8 r. XIV + 443 l. (Elfogyott.)

Stahlberger Emil, Az árapály a fiumei öbölben, nyolcz táblával. (A K.M.T.T. által jutalmazott és kiadott értekezés, magyar és német nyelven.) — Die Ebbe und Fluth in der Rhede von Fiume. Budapest 1874, 4 r. 109 l. 4—3 kor.

Szabó József, Előadások a geológia köréből 201 képpel. Budapest 1893, Kv. 51. 8 r. XIII + 375 l. 7—6 K.

Szádeczky Gyula, A zempléni szigethegység geológiai és kőzettani tekintetben. Egy táblával, egy térképpel és három ábrával. (A K.M.T.T. megbizásából.) Budapest 1897, 4 r. IV + 63 l. 2·40—2 kor.

Szilasi Jakab, Czukrok, czukros anyagok és megvizsgálásuk. (Kézikönyv czukorgyárak, kereskedelmi és gazdasági iskolák és chemiai laboratoriumok számára.) 32 ábrával. Budapest 1892, 8 r. VIII + 180 l. 3—2 K.

Szinnyei József és **Dr. Szinnyei József,** Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete 1472—1875. (Bibliotheca hungarica historiæ naturalis et matheseos.) Száz aranynyal jutalmazott pályamű. Budapest 1878, nagy 8 r. VIII + 1007 l. 8—6 kor.

Természettudományi Értekezések, Arago, Bessel, Dove, Haeckel, Heer, Herschel, Humboldt, Kirchhoff, Liebig, Lyell, Melloni, Virchov népszerű munkáiból. Két czimképpel, egy táblával és 39 fametszetü ábrával. Budapest 1875, Kv. 7. 8 r. VIII + 355 l. (Elfogyott.)

Természettudományi Társulat folyóiratai:

a) *Évkönyvek,* 1841—1859. A K. M. T. T. Évkönyvei, I—IV. kötet, 8 r.

I. kötet 1841—1845, 4 szines táblával, szerk. Török József IV + 232 l. (Elfogyott.)

II. kötet 1845—1850, 3 szines táblával, szerk. Gáspár János, IV + 260 l. (Elfogyott.)

III. kötet 1851—1856, 4 tábla rajzzal s 1851—1856-ig terjedő időről szóló «Évijelentés»-sel, szerk. Szabó József, IV + 291 l. Ára 2 kor.

IV. kötet 1857—1859, 7 rajzzal, szerk. u. a. IV + 224 l. Ára 2 kor.

Original-Abhandlungen. Aus dem III. Bande der Jahrbücher des ungarischen naturwissenschaftlichen Vereins zu Pest, in deutscher Uebersetzung. Redigirt von dem ersten Secretär Dr. Joseph Szabó. 4 könyomású táblával, 1858. nagy 8 r. IV + 200.

b) *Közlöny* 1860—1868. A K.M.T.T. közlönye. (Folytatása az eddigi évkönyveknek.) I—VII. kötet, 8 r.

I. kötet 1860, 1 térképpel és 7 ábrával, szerk. Szabó József VI + 279 l. 2 kor.

II. kötet 1861, 3 táblával és 3 rajzzal, szerk. u. a. IV + 241 l. (Elfogyott.)

III. kötet 1862, I. rész: 3 táblával és 4 rajzzal, szerk. Tóth Sándor, IV + 19 l.; II. rész: 1 könyomatu táblával, szerk. Tóth Sándor és Schmidt György, II + 150 l. (Elfogyott.)

IV. kötet 1863—1864, I. rész: 5 táblával, szerk. Vész János Ármin, IV + 137 l.; II. rész: 1 táblával, szerk. u. a. IV + 67 l. (Elfogyott.)

V. kötet 1865, 2 táblával és könyvek czimjegyzékével, szerk. Kátai Gábor CLXXVI + 287 l. Ára 2 kor.

VI. kötet 1866, 5 táblával és 3 rajzzal, szerk. u. a. II + 264 l. Ára 2 kor.

VII. kötet 1867, 5 táblával és 13 rajzzal, szerk. Kátai Gábor, 407 l. (Elfogyott.)

c) *Természettud. Közlöny* 1869—1899, I—XXXI. köt. Havi folyóirat közérdekü ismeretek terjesztésére. Kiadja a Királyi Magyar Természettudományi Társulat, nagy 8 r. 1. kötet 1869, 1—9 füzet, 3 rajzlappal és 15 a szöveg közé nyomatott ábrával, szerk. Szily Kálmán, VIII + 448 lap.

(Folytatása a boritékon)

[Természettudományi közlöny :]

II. kötet 1870, 10—18 füzet, 3 rajzlappal, 7 a szöveg közé nyomott ábrával és egy színnyomatu táblával, szerk. Szily Kálmán, XII + 456 l.

III. kötet 1871, 19—28 füzet, színezett térkép melléklettel és 33 a szöveg közé nyomott fametszetü ábrával, szerk. Szily Kálmán, Lengyel Béla és Petrovits Gyula IX + 504 l.

IV. kötet 1872, 29—40 füzet, 38 a szöveg közé nyomott fametszetü ábrával, szerk. Szily Kálmán és Petrovits Gyula, VIII + 472 l.

V. kötet 1873, 41—52 füzet, 31 a szöveg közé nyomott fametszetü ábrával és 1 kőnyomatu melléklettel, szerk. u. a. VII + 488 l.

VI. kötet 1874, 53—64 füzet, 46 a szöveg közé nyomott fametszetü ábrával, szerk. u. a., VIII + 472 l.

VII. kötet 1875, 65—76 füzet, 34 a szöveg közé nyomott fametszetü ábrával, szerk. u. a., VIII + 488 l.

VIII. kötet 1876, 77—88 füzet, 20 a szöveg közé nyomott fametszetü ábrával, szerk. u. a., VIII + 488 l.

IX. kötet 1877, 89—100 füzet, 34 a szöveg közé nyomott fametszetü ábrával, szerk. Szily Kálmán, Paszlavszky József és Pethő Gyula, VIII + 480 l.

X. kötet 1878, 101—112 füzet, 34 a szöveg közé nyomott fametszetü ábrával, szerk. Szily Kálmán és Paszlavszky József, VII + 480 l.

XI. kötet 1879, 113—124 füzet, 37 a szöveg közé nyomott fametszetü ábrával és 1 kőnyomatu színes táblával, szerk. u. a., VIII + 488 l.

XII. kötet 1880, 125—136 füzet, 46 a szöveg közé nyomatott fametszetü ábrával és 1 grafikai táblával, szerk. Szily Kálmán, Fodor József és Paszlavszky József, VIII + 480 l.

XIII. kötet 1881, 137—148 füzet, 72 fametszetü ábrával, 10 képpel és 2 kőnyomatu táblával, szerk. u. a., VIII + 520 l.

XIV. kötet 1882, 149—160 füzet, 67 ábrával, szerk. u. a., VIII + 528 l.

XV. kötet 1883, 161—172 füzet, 56 ábrával, szerk. u. a., VIII + 544 l.

XVI. kötet 1884, 173—184 füzet, 56 razzal, szerk. u. a., XII + 524 l.

XVII. kötet 1885, 185—196 füzet, 96 rajzzal, szerk. u. a. XII + 520 l.

XVIII. kötet 1886, 197—208 füzet, 54 rajzzal szerk. u. a. XII + 536 l.

XIX. kötet 1887, 209—220 füzet, 84 rajzzal, szerk. Szily Kálmán, Lengyel Béla és Paszlavszky József XI + 520 l.

XX. kötet 1888, 221—232 füzet és I—IV Pótfüzet 89 rajzzal, szerk. u. a. XII + 488 l.; Pótf. IV + 192 l.

XXI. köt. 1889, 233—244 füzet és V—VIII Pótf., 128 rajzzal, szerk. u. a. XI + 628 lap; Pótfüzet IV + 192 l.

XXII. kötet 1890, 245—256 füzet és IX—XII Pótfüzet, 178 rajzzal, szerk. Szily Kálmán közreműködésével Entz Géza, Lengyel Béla és Paszlavszky József, XV + 656 l.; Pótf IV + 192 l.

XXIII. kötet 1891, 257—268 füzet és XIII—XVI Pótf., 141 rajzzal és két táblával, szerk. u. a., XV + 656 l., Pótfüzet IV + 192 l.

XXIV. kötet 1892, 269—280 füzet és XVII—XXI Pótf., 190 rajzzal, szerk. u. a., XVI + 656 l., Pótfüzet IV + 240 l.

XXV. kötet 1893, 281—292 füzet és XXII—XXVI Pótf., 151 rajzzal, szerk. u. a., XVI + 656 l., Pótfüzet IV + 240 l.

XXVI. kötet 1894, 293—304 füzet és XXVII—XXXI Pótf., 121 rajzzal, szerk. Szily Kálmán közreműködésével Entz Géza, Paszlavszky József és Wartha Vincze, XVI + 656 l., Pótfüzet IV + 240 l.

XXVII. kötet 1895, 305—316 füzet és XXXII—XXXV Pótfüzet, 160 rajzzal, szerk. u. a. XVI + 656 l.: Pótfüzet IV + 192 l.

[Természettudományi Közlöny :]

XXVIII. kötet 1896, 317—328 füzet és XXXIV—XXXIX Pótfüzet, 160 rajzzal, szerk. u. a., XVI + 656 l., Pótfüzet IV + 192 l.

XXIX. kötet 1897, 329—340 füzet és XL—XLIV Pótf., 196 rajzzal és színes műlappal, szerk. Szily Kálmán közreműködésével Csopey László, Entz Géza, Paszlavszky József és Wartha Vincze, XVI + 648 l., Pótfüzet IV + 240 l.

XXX. kötet 341—352 füzet és XLV—XLVIII Pótfüzet, 158 rajzzal, szerk. Szily Kálmán közreműködésével Csopey László és Paszlavszky József, XVI + 680 l., Pótfüzet IV + 192 l.

XXXI. kötet 1899, 353—364 füzet és XLIX—LII Pótfüzet, 190 rajzzal és 2 színes képpel, szerk. u. a. XVI + 736 l., Pótfüzet IV + 200 l.

Kapható az I, VI, IX, XII, XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXIX, 6—4 kor., Pótfüzetekkel 8—6 koronájával. — Egyes számok 60 fillérjével.

d) *Népszerű természettud. előadások gyüjteménye;*

I. kötet, 1—8 füzet, 1877—1878. 49 fametszetü ábrával. Pulszky Ferencz, Klein Gyula, Lengyel Béla, Wartha Vincze, Fodor József, Szabó József, Than Károly és Thanhoffer Lajos előadásai: Az őstörténelmi leletekről Magyarországban, a rovarevő növényekről, a szénről és fontosabb vegyületeiről, a festő anyagokról, az egészséges házról és lakásról, az ivóviz kérdése Budapesten, a Gramme-féle dynamo-elektrikus gépről és a táplálkozásról. Bpest 1878, kis 8 r. IV + 393 l. (Elfogyott.)

II. kötet, 9—14 füzet, 1878—1879. 146 ábrával és 1 térképpel. Lengyel Béla, Klug Nándor, Paszlavszky József, Pethő Gyula, Keleti Károly és Mihálkovics Géza előadásai: A robbanó anyagokról, a látásról, az állatok rokonságáról, a kagylókról és gyöngyökről, Magyarország népesedési mozgalma 1876-ban és vázlatok az állatok fejlődéstörténete köréből. Budapest 1879, kis 8 r. IV + 431. l. (Elfogyott.)

III. kötet 15—25 füzet, 1879—1880. 56 ábrával és 2 térképpel. Hermann Ottó, Kriesch János, Kőnig Gyula, Wartha Vincze, Balogh Kálmán, Schuller Alajos, Klein Gyula, Korányi Frigyes, Lóczy Lajos, Janny Gyula és Dezső Béla előadásai: A nagy út (a madárvilág tavaszi mozgalma alkalmából), az állatok társadalmi viszonyairól, a természettudományok kezdetei, a viz szerepe a föld életében, a vér szétosztásáról az emberi testben, a levegőről és folyóssá tételéről, a virágok színéről, az ujabbkori kór- és gyógytan módszereiről, Gróf Széchényi Béla expeditiójáról, az ujabbkori sebkezelésről és a fiumei tengeröböl állatvilágáról.) Budapest 1880, kis 8 r. IV + 419 l. (Elfogyott.)

IV. kötet, 26—31 füzet, 1881. 81 ábrával és 5 képmelléklettel. Herman Ottó, Gerando Attila, Schulek Vilmos, Szabó József, Vámbéry Ármin és Kétli Károly előadásai: Az átalakulások világáról, két hét a székelyföldön, a nézésről munkálkodás közben, a mikroskop a geológiában, a legujabb népvándorlási mozgalmak keleten és az idegrendszer némely rendes és beteges működéséről.) Budapest 1881, kis 8 r. IV + 245 l. (Elfogyott.)

V. kötet 32—36 füzet, 1882. 51 ábrával. Müller Kálmán, Paszlavszky József, Thanhoffer Lajos, Say Móricz és Lengyel Béla előadásai: A tüdőről és lélekzésről, az ausztráliaiszigetvilág életéről, a nagyitókról és a mikroskópról, a gyufa történetéről és egy lap a chemia történetéből. Szerkesztette: Fodor József és Paszlavszky József. Budapest 1882, kis 8 r. IV + 240 l. (Elfogyott.)

VI. kötet 37—41 füzet, 1883. 27 ábrával és 1 világitó lappal. Antal Géza, Ring Ármin, Réczey Imre, Kerpely Antal és Szabó József előadásai: Az elvérzésről, a világitó kőről és festékről, hogyan mozgunk, a vasról és gyártásáról, éjszak-amerikai utam vonala. Szerkesz-

[Népszerű természettud. előadások gyüjteménye:]
tette: Horváth Géza és Paszlavszky József. Budapest 1883, kis 8 r. IV + 284 l. 3 kor.

VII. kötet, 42—46 füzet, 1884. évfolyam. 35 rajzzal. Lauſenauer Károly, Schmidt Sándor, Ring Ármin, Hollósy Pál és Staub Móricz előadásai: Az emlékező tehetségről, a kristályokról, a fotografozásról, mikor lesz eső és a megkövesült növényekről. Szerkesztette: Fodor József és Paszlavszky József. Budapest 1884, kis 8 r. IV + 250 l. 3 kor.

VIII. kötet 47—51 füzet, 1885. 30 rajzzal és 1 táblával. Oláh Gusztáv, Ilosvay Lajos, Kriesch János, Szabó József és Kiss Károly előadásai: A lángész és az elmekór, a torjai büdös barlangról, a rovarok világa különösen az ipar és kereskedelem szempontjából, Stassfurt kálisóbányáiról és a chemiai változásokról. Szerkesztette: Fodor József és Paszlavszky József. Budapest 1885, kis 8 r. IV + 255 l. 3 kor.

IX. kötet, 52—56. füzet, 1886. 47 rajzzal és egy műlappal. Őrley László, Gothárd Jenő, Konkoly Miklós, Chyzer Kornél és Lauſenauer Károly előadás: Az állatok színéről, az újabbkori csillagászat eszközeiről és megfigyelés-módjairól, az égitestek alkotásáról, a magyar fürdőkről és az idegességről. Szerkesztette: Fodor József és Paszlavszky József. Budapest 1886, kis 8 r. IV + 263 l. 3 kor.

X. kötet, 57—60 füzet, 1887. 104 rajzzal. Kont Gyula, Dollinger Gyula, Klug Nándor és Rózsahegyi Aladár előadásai: A levegő nyomásáról, az emberi test elferdüléseiről, az emberi hangról és beszédről és a baktériumokról. Szerkesztette: Lengyel Béla és Paszlavszky József. Bpest 1887, kis 8 r. IV + 252 l. 3 kor.

e) *Chemiai Folyóirat* (Magyar). Havi szaklap a chemiai ismeretek fejlesztésére. Kiadja a Királyi Magyar Természettudományi Társulat chemia-ásványtani szakosztálya.

I. évfolyam 1895. Than, Franzenau, Ilosvay, Jármay, Karlovszky, Lengyel, Wartha közreműködésével szerkesztette Winkler Lajos. Nagy 8 r. VIII + 192 l. Melléklete «A qualitativ chemiai analysis elemei», irta Than Károly, nagy 8 r. VIII + 232 l., szines műmelléklettel.

II. évfolyam 1896. Szerk. u. a. nagy 8 r. XII + 192 l. Melléklete: A quantitativ chemiai analysis elemei. Irta Lengyel Béla, 17 rajzzal és egy fénynyomattal, nagy 8 r. VIII + 232 l.

III. évfolyam 1897. Szerk. u. a. bizottság közreműködésével Ilosvay Lajos és Molnár Nándor. Nagy 8 r. VIII + 192 l. Melléklete: A törvényszéki chemia elemei, irták Dr. Felletár Emil és Jahn József. 16 ábrával és 12 táblával, nagy 8 r. VII + 243 l.

IV. évfolyam 1898. Szerk. u. a., nagy 8 r. X + 192 l. Melléklete: Utmutatás a chemiai kisérletezésben, irta Dr. Nuricsán József, 138 ábrával, nagy 8 r. IV + 251 l.

V. évfolyam 1899. Than, Fabinyi, Franzenau, Karlovszky, Lengyel, Wartha, Winkler bizotts. tagokkal szerk. Ilosvay Lajos és Molnár Nándor, nagy 8r. VIII + 192 l. Melléklet: Gyógyszerészi chemia, irta Winkler Lajos. — Ára évfolyamonként 10—6 kor. A mellékletek külön 6—4 kor.

f) *Névkönyv, naptár, évi jelentés.* A Királyi Magyar Természettudományi Társulat névkönyve és naptára 1847-re. Szerkeszték: Dr. Montedegói Albert Ferencz és Dr. Török József. 8 r. 111 l. (Elfogyott.) Névkönyv 1847/8-ra. 8 r. 32 l. A Királyi Magyar Természettudományi Társulat évi jelentése tagjairól és működéséről. Hat füzet. Szerkesztették: az I—II-ikat Szabó József, a III-ikat Vész János Ármin, a IV—VI-ikat Dr. Kátai Gábor. kis 8 r. 50 l.; 32 l.; 43 l.; 64 l.; 50 l.; 38 l. 1857—1867. (Elfogyott.)

Tagok jegyzéke 1877 február 22-én. Budapest 1877, nyomt: Khór és Wein. 8 r. IV + 50 l. (Elfogyott.)

Természettud. Társ. *Története* alapittatásától fogva máig. A Társulat 1868-ik évi február 1-én tartott 25 évi jubileuma alkalmára, irta Kátai Gábor. Pesten 1868, 8 r. 248 l. (Elfogyott.)

— *Multja és jelene.* 1885. Kis 8 r. 32 l. (Elfogyott.)

— *Die Vergangenheit und Gegenwart der Kön. Ung. Naturwissenschaftlichen Gesellschaft* 1885. Kis 8 r. 36 l. (Elfogyott.)

— *Le passé et le présent de la Société royale Hongroise des sciences naturelles.* 1885, Kis 8 r. 36 l. (Elfogyott.)

— *Emlékkönyve* a Királyi Magyar Természettudományi Társulat félszázados jubileumára. A választmány megbizásából szerkesztette: A titkárság. 150 rajzzal és hét műlappal. Budapest 1892, Kv. 47. nagy 8 r. XII + 831 l. A társulat történetére vonatkozó értekezéseken kivül 52 szerzőnek népszerüen irt ismertető vagy önálló buvárkodáson alapuló dolgozatait foglalja magában. Ára 12—8 korona.

— *Könyveinek czímjegyzéke:*

1. füzet két részben, szerk. Somogyi Rudolf, 1866. nagy 8 r. két részben, 109 l.
2. füzet szerk. Somogyi Rudolf. 1871, 41 l.
3. füzet szerk. Bene Rudolf és Somogyi Rudolf. 1873.
4. füzet szerk. Heller Ágost. 1877. 8 r. VIII + 330 l.
5. füzet szerk. Heller Ágost 1886. 8 r. IV + 179 l. (Elfogytak.)

Than Károly, A qualitativ chemiai analysis elemei. (A magyar chemiai folyóirat 1-sö évfolyamának melléklete.) Szines műlappal. Budapest 1895, nagy 8 r. VII + 232 l. 6—4 kor.

Thanhoffer Lajos, Előadások az anatómia köréből 10, részben szines táblával és 330 rajzzal. Budapest 1896, Kv. 58. 8 r. XVI + 431 l. 7—6 kor.

Tissié Ph., Az elfáradás és a testgyakorlás, 22 ábrával. Francziáról forditotta: Csapodi István. Az eredetivel összehasonlitotta: Klug Nándor. Budapest 1898, Kv. 62. 8 r. XVI + 324 l. 6—5 kor.

Topinárd Pál, Az anthropológia kézikönyve, a szöveg közé nyomott 52 ábrával. A párisi orvosi fakultás által arany éremmel kitüntetett s a franczia tudományos akadémia által első dijjal jutalmazott mü. Az eredeti harmadik kiadás után forditották: Pethő Gyula és Török Aurél. Előszót irt hozzá: Broca Pál, tanár. Budapest 1881. Kv. 19. 8 r. XXXII + 768 l. (Elfogyott.)

Tyndall John, A hő mint a mozgás egyik neme, 109 fametszetű ábrával. Forditotta: Jezsovics Károly. Az eredeti negyedik kiadásával összehasonlitotta, előszót és függeléket irt hozzá: Szily Kálmán. Budapest 1874. Kv. 5. 8 r. XXVIII + 590 l. (Elfogyott.)

Ulbricht Richárd, Adatok a bor és mustelemzés módszeréhez, 6 ábrával, (a M.K.T.T. megbizásából.) Budapest 1889. 8 r. IV + 116 l. 2—1 kor.

Vángel Jenő, Az állatok konzerválása gyüjtemények számára. Kiváló tekintettel a gerinctelen állatokra, 27 ábrával. Bpest 1892. kis 8 r. IV + 160 lap. 2—1 kor.

Wartha Vince, Az agyagipar technológiája, 103 rajzzal és 25 táblával. Budapest 1892, Kv. 49. 8 r. VI + 240 l. 6—5 kor.

Xantus János, Utasitás a természetrajzi tárgyak gyüjtésére, elkészitésére, megtartására és tovaszállitására. Legujabb általánosan elfogadott elvek alapján irta több a szövegbe nyomott ábrával. Pest 1862, 50 l. (Elfogyott.)

Franklin-Társulat könyvsajtója.